
# **Intro Delivery**

# Friedman 3



Station	児頭先進部	児頭最大径の位置	所見	第1頭位	第2頭位
-5	骨盤入口部				_
-4 -3	濶部				
-2 -1		骨盤入口部	固定	右 を 後	右 を 後
				(骨盤横径に一致)	(骨盤横径に一致)
±0	峡部	入口部 - 濶部	嵌入	(骨盤横径に一致)	(骨盤横径に一致)
±0 +1	峡部		嵌入		-
	峡部・	- 濶部	嵌入 坐骨棘触知可能	前	前
+1		- 濶部		右 を 後	右



右 養 左

(骨盤縦径に一致)

(骨盤縦径に一致)

分娩時

第一前方後頭位

第二前方後頭位

# Labor 10

#### 分娩第2期 正常陣痛間隔 / 持続時間

#### <u>一緒に いきんでくれて サンキュー!</u>

一緒に	1~4分(陣痛間隔)	
いきんでくれて	腹圧をかける第二期	
サンキュー!	30~90秒(持続時間)	

#### 微弱陣痛と過強陣痛の定義と経過

10 G		3要素	子宫口間大度			
	74 M		4~6 cm	7~8 cm	9 cm	~分娩第2期
		子和内压	40 mmHg	45 mmHg	50 mmh	le e
正常(平均) 障痛		传统机构	39	2分30秒	25)	
		peatsem	7089	70 to	608	
	79	子宫内庄	10 mmHg以下	10mmHg以下	40 mmir	KUT
8550074 KK		网络用用	0.00.0000000000000000000000000000000000	6分以上	初度海	4分以上
90307438			6分30秒以上		经股场	3分30秒以上
		19465600	4089379	40秒以內	30 HU	P)
		子和内圧	70 mmHgtJ.E	80 mmHglLL	55 mmh	t.Lt
過回車高		种纳地和	1分30秒以內	1分以内	1907	3
		paatsam	2分以上	2分以上	15930	POLE

#### 陣痛持続時間

	分娩第1期	分娩第2期	
過強	2分以上	1分30秒以上	
微弱	40秒以内	30秒以内	

#### 陣痛周期

	分娩第1期	分娩第2期	
過強	1分30秒以内	1分以内	
微弱	6分以上	4分以上	

#### 初産と経産の一般的な分娩時間

経過		初産婦	経産婦
1期	陣痛発来 - 子宮口全開大	<u>10 - 12 hr</u>	4 - 6 hr
2期	子宮口全開大 - 胎児娩出	2 - 3 hr	1 - 1.5 hr
3期	胎児娩出 - 胎盤娩出	15 - 30 mi	10 - 20 mi

# Canal 產道 1

対角結合線

解剖学的真 結合線	岬角の中央 - 恥骨上縁の中央	
産科的真結 合線	岬角中央 - 恥骨結合後面	Min

岬角 - 恥骨結合下縁

# 娩出物


#### 胎盤剥離の徴候

Ahlfeld徴候	胎盤は剝離すると下降するため、	臍帯
	も児娩出後に比べさらに10cm以_	上陰
	裂より出てくる.	


Küstner徴 手指で恥骨結合直上部を押さえると、

骨盤横径	左右腸骨弓状線間	
骨盤斜径	左右の仙骨関節 - それぞれ反対 側の腸骨隆起	

#### 骨産道の径



児頭の位置と周辺の解剖



### Rotation 8

候	胎盤剝離前には臍帯は腟内に引き込ま
	れるが、剝離後は少し押し出される

# Schröder徴

剝離前には球状をしていた子宮が剝離 後は細長くなり、子宮底が上昇し、右 に傾く.

# 徴候

Strassmann 片方の手で臍帯を持ち、他方の手で子 宮底を叩くと、 剝離前は臍帯を持った 手に衝撃が伝わるが、剝離後は伝わら ない.

### Phase 期 6

第1期	陣痛発来	- 子宮口全開大
第2期	子宮口全開大	- 児娩出
第3期	児娩出	- 胎盤娩出


	1期	2期	3期
初産婦	10-12 hr	2-3 hr	15-30 min
経産婦	4-6 hr	1-1.5 hr	10-20 min

# Leopold 2

# Position 6

### Presentation 5

# Station 4



# Amniorrhexis 破水 4

前期破水	陣痛発来前に破水
早期破水	子宮口全開大前に破水

# Molding 骨重積 3

仙骨側の頭蓋骨が恥骨部の頭蓋骨の下に

子宮内胎児死亡

- ↓脳容積
- ⇒ 頭蓋骨が重なる
- ⇒ 骨重積(+)

# Partogram パルトグラム 1

頸管開大部

先進部の下降度

回旋

母体のバイタルサイン

CTG

- 陣痛周期
- 陣痛間隔
- 胎児心音

# Hemorrhage 3

出血量 ≤ 500 mL

# Internal Examination 2

#### 排臨

Sp+5まで下降, 陣痛発作時に陰裂間より児頭が見える, 間欠時には隠れる

#### 発露

Sp+5以上下降

陣痛に関係なく、常に児頭が陰裂間に観察される

#### 収縮輪

子宮体部の収縮,子宮下部の伸展によって生じるくびれ

#### Quiz

37 Qs / {#} 37 (#)