

第二章 矩阵代数

2.5 分块矩阵





主要内容

一、分块矩阵的定义

二、分块矩阵的运算



一、分块矩阵的定义

- ❖ 由于某些条件的限制，我们经常会遇到大型文件无法上传的情况，如何解决这个问题呢？
- ❖ 这时我们可以借助**WINRAR**把文件分块，依次上传.
- ❖ 家具的拆卸与装配



问题一：什么是矩阵分块法？

定义：用一些横线和竖线将矩阵分成若干个小块，这种操作称为**对矩阵进行分块**；

每一个小块称为**矩阵的子块**；

矩阵分块后，以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11} & a_{12}} & \boxed{a_{13} & a_{14}} \\ \boxed{a_{21} & a_{22}} & \boxed{a_{23} & a_{24}} \\ \boxed{a_{31} & a_{32}} & \boxed{a_{33} & a_{34}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix}$$

这是2阶
方阵吗？



问题二：为什么提出矩阵分块法？

答：对于行数和列数较高的矩阵 A ，运算时采用分块法，可以使大矩阵的运算化成小矩阵的运算，体现了化整为零的思想.



$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}, \quad O \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = (A_1 \ A_2 \ A_3 \ A_4), \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

注：

分块时首先满足0，再考虑对角或三角矩阵，然后考虑E以及其它的特殊矩阵。

按行分块或按列分块是两种特殊的分块形式。



1. 分块矩阵的加法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} \end{pmatrix}$$



若矩阵 A 、 B 是同型矩阵，且采用相同的分块法，即

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

则有

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}$$



形式上看成
是普通矩阵
的加法！



2. 分块矩阵的数乘

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} \end{pmatrix}$$



若 λ 是数, 且 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$

则有 $\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$



形式上看成
是普通的数
乘运算!



3. 分块矩阵的运算——乘法

一般地, 设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},$$

$$C = AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & C_{s2} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}, \quad C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \\ (i = 1, \cdots, s; j = 1, \cdots, r)$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{tj}$ 的行数.



例1. 设 $A = \begin{bmatrix} \overset{r}{A_1} & \overset{n-r}{A_2} \\ \mathbf{0} & A_4 \end{bmatrix}$ 的列分块法与 $B \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ \mathbf{0} & B_4 \end{bmatrix}_{n-r}^r$ 的行分块法一致, 求 AB .

解: 根据分块矩阵的乘法规则, 有

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ \mathbf{0} & A_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ \mathbf{0} & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 + A_2 B_4 \\ \mathbf{0} & A_4 B_4 \end{bmatrix}$$



4. 分块矩阵的转置

若 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$

例如: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$

$$A^T = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \\ \alpha_4^T \end{pmatrix}$$

分块矩阵不仅形式上进行转置，而且每一个子块也进行转置。



5. 分块对角矩阵

定义： 设 A 是 n 阶矩阵，若

1. A 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块，
 2. 其余子块都为零矩阵，
 3. 对角线上的子块都是方阵，
- 那么称 A 为**分块对角矩阵**。

例如：

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{8} & \boxed{3} \\ 0 & 0 & \boxed{5} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$



分块对角矩阵的性质

设 A 与 B 为同型矩阵, 采用相同的分块法, 有

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & & \\ & A_2 B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s B_s \end{pmatrix},$$



$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix},$$

若 A 的每一子块都可逆, 则 A 可逆, 且

$$A = \begin{pmatrix} \hline & & A_1 \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ A_s & & \hline \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \hline & & A_s^{-1} \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ A_1^{-1} & & \hline \end{pmatrix},$$



例2 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix},$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix}$$

求 $A + B, \quad ABA.$



解 将 A, B 分块

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ \mathbf{0} & a \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a & \mathbf{0} \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} b & \mathbf{0} \\ 1 & b \end{pmatrix};$$



$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 + B_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1 + B_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ \mathbf{0} & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & \mathbf{0} \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 1 \\ 1 & 2a \end{pmatrix},$$

$$A_2 + B_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & \mathbf{0} \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b & 1 \\ 2 & 2b \end{pmatrix},$$

$$\therefore A + B = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 + B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 1 & 2a & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2b & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 & 2b \end{pmatrix}.$$



$$ABA = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 B_2 A_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1 B_1 A_1 = \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 \\ a^2 & a^3 + a \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_2 A_2 = \begin{pmatrix} b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \therefore ABA &= \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 B_2 A_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ a^2 & a^3 + a & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix}. \end{aligned}$$



例3

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^n.$$

$$\text{解: 分块 } A = \begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}, \quad A^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix}.$$

$$B^n = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^n = \left(\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)^n = (3E + M)^n \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^n = (3E)^n + n(3E)^{n-1}M \quad \text{二项式公式}$$

$$B^n = \begin{bmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{bmatrix} + n3^{n-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3^n & n3^{n-1} \\ 0 & 3^n \end{bmatrix}$$



$$C = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \quad C^n = \left(\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right)^n = \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \right)^n$$

$$C^n = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} (6)^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C^n = 6^{n-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} = 6^{n-1} \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 6^{n-1} & 9 \cdot 6^{n-1} \\ 6^{n-1} & 3 \cdot 6^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \cdot 6^{n-1} & 9 \cdot 6^{n-1} \\ 0 & 0 & 6^{n-1} & 3 \cdot 6^{n-1} \end{bmatrix}$$



例4. 设 A, B 都是 n 阶上三角阵, 证明: AB 是上三角阵。

证一: 对 n 做数学归纳法。当 $n = 1$ 时, $A = a, B = b, AB = ab$, 结论成立;
假设两个 $n - 1$ 阶上三角阵的乘积是上三角阵, 下面考虑 n 阶的情况,
对 A, B 做如下的分块:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & A_2 \\ \mathbf{0} & A_4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & B_2 \\ \mathbf{0} & B_4 \end{bmatrix}$$

其中, A_4, B_4 都是 $n - 1$ 阶上三角阵, 由归纳假设, $A_4 B_4$ 是 $n - 1$ 阶上三角阵,
则

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}B_2 + A_2B_4 \\ \mathbf{0} & A_4B_4 \end{bmatrix}$$

于是, AB 是上三角阵, 由归纳法, 命题结论成立。



证法二： A, B 为上三角阵，故当 $n \geq i > j \geq 1$ 时， $a_{ij} = 0, b_{ij} = 0$,

设 $C = (c_{ij})_{n \times n} = AB$ ，则当 $n \geq i > j \geq 1$ 时

$$\begin{aligned} c_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=i}^n a_{ik} b_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^{i-1} 0 \times b_{kj} + \sum_{k=i}^n a_{ik} \times 0 = 0, \end{aligned}$$

故， AB 为上三角阵。



6. 对分块矩阵的广义的初等变换

1. 交换两行(列)

2. 用一个可逆阵左乘以某行(右乘以某列)

3. 用一个矩阵左乘以某一行后加到另一行上
(用一个矩阵右乘以某一列后加到另一列上)

$$\begin{bmatrix} 0_{32} & A_{33} \\ B_{22} & 0_{23} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{bmatrix} B_{22} & 0_{23} \\ 0_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} B_{22}^{-1} \cdot r_1 \\ A_{33}^{-1} \cdot r_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} E_{22} & 0_{23} \\ 0_{32} & E_{33} \end{bmatrix}$$



练习

1. 设 n 阶方阵 A 对 $\forall x \in R^n$ 有 $Ax = 0$, 证明 $A = 0$.
2. 设 B, C 为 n 阶方阵且对 $\forall x \in R^n$ 有 $Bx = Cx$, 证明 $B = C$.