

# 离散概率 (I)

离散数学课程组

南京大学计算机科学与技术系

# 内容提要

- 引论
- 概率论

## 引论

- 起源于17世纪的赌博游戏
- 奠基人之一：法国数学家拉普拉斯
  - ▣ Pierre-Simon Laplace (1749-1827)
- 军事、经济、政治、社会
  - ▣ 运筹帷幄
- 计算机科学：算法设计与分析
  - ▣ 设计概率算法
  - ▣ 分析算法的平均复杂度



## 有限概率

- 试验
  - 从一组可能的结果中得出一个结果的过程
- 试验的样本空间
  - 可能结果的集合
- 一个事件
  - 样本空间的一个子集

## 有限概率

## ● 事件的概率

- 如果S是结果具有相等可能性的有限样本空间，E是其中的一个事件，即是S的一个子集，则事件E的概率是

$$p(E) = |E|/|S|$$

- 易见  $0 \leq p(E) \leq 1$

## 举例

● 掷两个骰子，点数之和等于7的概率？

□  $|S|=6*6=36$

□  $|E|=?$

□  $(x, y), x+y=7, x \geq 1, y \geq 1$

□  $(x', y'), x'+y'=5, x' \geq 0, y' \geq 0$

□  $C(5+2-1, 5)=C(6,1)=6$

□  $p(E) = |E|/|S|=6/36=1/6$

## 举例

- 标准扑克牌52张，一手牌（5张牌组成）出现满堂红(AAAKK)，即3张同一类且其余2张在另一类，概率是多少？
  - ▣  $P(13, 2)C(4, 3)C(4, 2)/C(52, 5) \approx 0.0014$
- 标准扑克牌52张，一手牌（5张牌组成）正好含有4种相同面值(AAAAK)的概率是多少？
  - ▣  $C(13, 1)C(4, 4)C(48, 1)/C(52, 5) \approx 0.00024$

## 事件组合的概率

定理 1: 设 $E$ 是样本空间 $S$ 中的一个事件。事件 $\overline{E}$  (事件 $E$ 的补事件)的概率是

$$p(\overline{E}) = 1 - p(E).$$

证明:  $|\overline{E}| = |S| - |E|,$

$$p(\overline{E}) = \frac{|S| - |E|}{|S|} = 1 - \frac{|E|}{|S|} = 1 - p(E). \quad \blacktriangleleft$$



## 事件组合的概率（举例）

随机生成10位0-1串，其中至少一位为0的概率？

解：设E是10位中至少一位是0的事件。事件E的补事件是所有位都是1的事件。

$$p(E) = 1 - p(\overline{E}) = 1 - \frac{|\overline{E}|}{|S|} = 1 - \frac{1}{2^{10}} = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}.$$

## 事件组合的概率（续）

定理2: 设 $E_1$ 和 $E_2$ 是样本空间 $S$ 中的事件。那么

$$p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2)$$

证明: 
$$\begin{aligned} p(E_1 \cup E_2) &= \frac{|E_1 \cup E_2|}{|S|} = \frac{|E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2|}{|S|} \\ &= \frac{|E_1|}{|S|} + \frac{|E_2|}{|S|} - \frac{|E_1 \cap E_2|}{|S|} \\ &= p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2). \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

## 事件组合的概率（举例）


从不超过100的正整数中随机选一个，它能被2或5整除的概率？

解：设 $E_1$ 是选出一个被2整除的事件， $E_2$ 是选出一个被5整除的事件。则 $E_1 \cap E_2$ 是选出一个被10整除的事件。

$$\begin{aligned} p(E_1 \cup E_2) &= p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2) \\ &= 50/100 + 20/100 - 10/100 = 3/5. \end{aligned}$$

## 概率推理

- 常见问题：两个事件中哪个更有可能发生？
- 蒙蒂·霍尔游戏(电视节目, Monty Hall Puzzle)



- $1/3$  (总是不变)
- $2/3$  (总是改变)

# 概率论

概率指派

事件的组合

条件概率

独立性

伯努利（Bernoulli）试验与二项分布

随机变量

蒙特卡洛（Monte Carlo）算法

## 概率指派

假定：各种结果的可能性都是相等的。取消这个假定。

- 设 $S$ 是某个具有可数个结果的试验的样本空间。我们赋给每个结果 $s$ 一个概率  $p(s)$ ，满足下列条件：

i.  $0 \leq p(s) \leq 1 \quad (\forall s \in S)$

ii.  $\sum_{s \in S} p(s) = 1$

这个函数  $p:S \rightarrow [0,1]$  称为概率分布。

## 概率指派（举例）

掷一枚均匀的硬币，结果 $H(\text{heads})$ 和 $T(\text{tails})$ 应该赋予什么概率？对于一枚不均匀的硬币，如果如果头像向上常常是头像向下的两倍，相应的概率又如何？

解： 我们有 $p(H) = 2p(T)$ .

因为  $p(H) + p(T) = 1$ ,

所以  $2p(T) + p(T) = 3p(T) = 1$ .

从而,  $p(T) = 1/3$  ,  $p(H) = 2/3$ .

## 均匀分布

定义：假设 $S$  是一个含 $n$ 个元素的集合. 均匀分布 (*uniform distribution*) 赋给 $S$ 中每个元素 $1/n$  的概率.

举例：对于均匀的硬币， $p(H) = p(T) = 1/2$ .



## 一个事件的概率

定义：一个事件 $E$ 的概率是 $E$ 中各结果的概率之和。

$$p(E) = \sum_{s \in S} p(s)$$

举例：掷一个不均匀的骰子，3这一面出现的次数是其他面的两倍，其它五个面的出现是均等的，出现奇数点的概率？

解：令 $E = \{1, 3, 5\}$ 表示出现奇数点的事件。我们有 $p(3) = 2/7$ ， $p(1) = p(2) = p(4) = p(5) = p(6) = 1/7$ 。因此， $p(E) = p(1) + p(3) + p(5) = 4/7$ 。

## 事件的组合

- 补事件:  $p(\overline{E}) = 1 - p(E)$
- 事件的并:  $p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2)$
- 定理: 如果 $E_1, E_2, \dots$  是样本空间 $S$ 中两两互不相交的事件序列, 那么

$$p\left(\bigcup_i E_i\right) = \sum_i p(E_i)$$

## 条件概率

定义：设 $E$ 和 $F$ 是事件，且 $p(F) > 0$ .  $E$ 在给定 $F$ 条件下的概率，记作 $p(E|F)$ ，定义为：

$$p(E|F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)}$$

## 条件概率（举例）

随机产生的4位二进制串，16个串是均匀产生的，那么在第一位是0的条件下，串中含有2个连续0的概率？

解：设 $E$ 是串中含有2个连续0的事件， $F$ 是第一位为0的事件。

$$\square E \cap F = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100\}.$$

$$\square p(E \cap F) = 5/16.$$

$$\square p(F) = 8/16 = 1/2.$$

$$\square \text{所以, } p(E|F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)} = \frac{5/16}{1/2} = \frac{5}{8}.$$

## 条件概率（举例）

在至少有一个男孩的条件下，有两个孩子的家庭正好均是男孩的条件概率？假设BB, BG, GB, 和GG是等可能的。

解：令 $E$ 是家庭有两个男孩的事件， $F$ 是家庭至少有一个男孩的事件。我们有 $E = \{BB\}$ ,  $F = \{BB, BG, GB\}$ ,  $E \cap F = \{BB\}$ .

□  $p(F) = 3/4$  ,  $p(E \cap F) = 1/4$ .

□ 因此,  $p(E|F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$ .

## 独立性

定义：事件 $E$ 和 $F$ 是独立的，当且仅当

$$p(E \cap F) = p(E)p(F).$$

举例. 一个有两个孩子的家庭有四种情形 ( $BB, GG, BG, GB$ ), 假设是等可能的。事件 $E$ 是两个孩子的家庭有两个男孩，事件 $F$ 是两个孩子的家庭至少有一个男孩。事件 $E$ 和 $F$ 是否独立？

解：  $p(E) = 1/4, p(F) = 3/4, p(E \cap F) = 1/4,$

$p(E)p(F) = 3/16 \neq 1/4 = p(E \cap F).$   $E$ 和 $F$ 不是独立的.

## 伯努利（Bernoulli）试验



**Jacob Bernoulli (James or Jacques)**  
**瑞士数学家 (1654 – 1705)**

**定义：假设一个试验只有两种可能的结果。**

- ❑ 这种试验的每一次实行称为一次伯努利试验。
- ❑ 两种结果之一称为“成功”，另一种称为“失败”。
- ❑ 如果成功的概率为  $p$ ，失败的概率为  $q$ ，那么  $p + q = 1$ 。

## 伯努利试验（举例）

掷一个不均匀硬币，头像向上的概率为 $2/3$ 。掷硬币7次，正好4次出现头像的概率是多少？

解：掷的7次中出现4次头像的方式共 $C(7,4)$ 种。

每一种的概率为 $(2/3)^4(1/3)^3$ ，因此，所求概率为：

$$C(7,4) (2/3)^4(1/3)^3 = (35 \cdot 16) / 3^7 = 560 / 2187.$$



在 $n$ 次独立的伯努利试验中有 $k$ 次成功的概率

定理2: 在成功概率为 $p$ 、失败概率为 $q = 1 - p$ 的 $n$ 次独立的伯努利试验中，有 $k$ 次成功的概率是

$$C(n, k)p^k q^{n-k}.$$

证明:  $n$ 次伯努利试验的结果表示为 $n$ 元组

$(t_1, t_2, \dots, t_n)$ ,  $t_i = S$  (成功) 或  $F$  (失败). 有 $C(n, k)$ 个元组正好包含 $k$ 个 $S$ , 对应于一种 $k$ 次成功的方式。

每种的概率为 $p^k q^{n-k}$ . 所以，有 $k$ 次成功的概率是

$$C(n, k)p^k q^{n-k}. \quad \blacktriangleleft$$

## 二项分布

- $b(k; n, p) = C(n, k)p^k q^{n-k}$
- 作为 $k$ 的函数,  $b(k; n, p)$  称为二项分布

## 随机变量 ( random variable )

定义:一个随机变量是从样本空间到实数集的一个函数，也就是对每个可能结果指派一个实数。

- 一个随机变量是一个函数。它既不是一个变量，也不是随机的。
- In the late 1940s W. Feller and J.L. Doob flipped a coin to see whether both would use “random variable” or the more fitting “chance variable.” Unfortunately, Feller won and the term “random variable” has been used ever since.

## 随机变量

举例：假设一个硬币被掷3次. 令  $X(t)$  是头像在结果 $t$ 中出现的次数。那么随机变量  $X(t)$  取值如下：

$$X(HHH) = 3, X(TTT) = 0,$$

$$X(HHT) = X(HTH) = X(THH) = 2,$$

$$X(TTH) = X(THT) = X(HTT) = 1.$$

8种结果的每一个出现的概率为 $1/8$ . 因此,  $X(t)$ 的(概率)分布

$$p(X = 3) = 1/8,$$

$$p(X = 2) = 3/8,$$

$$p(X = 1) = 3/8,$$

$$p(X = 0) = 1/8.$$

## 随机变量的分布

定义:  $X$  是样本空间  $S$  上的随机变量,  $X$  的分布是形如  $(r, p(X = r))$  的二元组集合, 其中

$$r \in X(S),$$

$p(X = r)$  是  $X$  取值为  $r$  的概率。

## 生日问题

- 367人中至少有2人生日相同。
- 人数？使得至少2人有相同生日的概率大于1/2

解：假定生于某天是等可能的，相互独立的，一年有366天。 $p_n$ ：n个人的生日互不相同的概率。

□  $p_1 = 1$

□  $p_n = (365/366)(364/366) \cdots (367 - n)/366. \quad n=2, \dots, 366$

□  $1 - p_n = 1 - (365/366)(364/366) \cdots (367 - n)/366$

□  $1 - p_{22} \approx 0.457, 1 - p_{23} \approx 0.506。$

$1 - p_{57} \approx 0.99$

## 蒙特卡洛（Monte Carlo）算法

- 概率算法：在一步或多步作随机选择的算法
- 蒙特卡洛算法：用来回答判定问题的概率算法
  - 一系列测试，每个测试结果为“真”或者“未知”
  - 如果有一个为“真”，算法结束，返回结果为“真”。
  - 指定的一系列测试完成，且每个测试结果都是“未知”，则算法输出“假”。

## 蒙特卡洛算法的一个例子

- 判定“ $n$ 是合数吗？”（素数的概率测试）
  - 随机选取正整数  $1 < b < n$ ，实施以  $b$  为基的米勒测试，如果测试失败（表明  $n$  必为合数），返回“真”。如果通过测试，返回“未知”。
  - 重复上述过程  $k$  次，若每次都是“未知”，则返回“假”。
  - //备注：合数通过米勒测试的概率小于  $1/4$ 。
  - //一个合数通过  $k$  次米勒测试( $b$ 随机)的概率小于  $(1/4)^k$ 。
  - // $k=10$ ，误判的概率小于  $1/10^6$ 。



# 作业

- 教材[6.1, 6.2]

- p. 307: 8, 10, 12, 18, 38

- p. 318: 8, 19, 20, 34, 35

教材（第7版）[7.1, 7.2]

P.382: 8, 10, 12, 18, 38

P.394: 8, 19, 20, 34, 35