

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №4
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Численное интегрирование»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Краткая теория	3
3.2	Точное значение интеграла	5
3.3	Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса	5
3.4	Оценка погрешности формулы Ньютона-Котеса	6
3.5	Вычисление интеграла по формуле Гаусса	7
3.6	Оценка погрешности формулы Гаусса	9
4	Вывод	10
Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)		11

1 Задание

Вычислить приближённо интеграл по формуле Ньютона-Котеса с данным значением n , оценить погрешность приближения с помощью остаточного члена.

Вычислить приближённо интеграл по формуле Гаусса с данным значением n , оценить погрешность приближения по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница.

Вариант 47:

$$f(x) = x \sin x, \quad x \in [0; \pi].$$

Для формулы Гаусса:

$$n = 5.$$

Для формулы Ньютона-Котеса:

$$n = 4.$$

2 Цель работы

Научиться приближённо оценивать значения определённых интегралов по квадратурным формулам Ньютона-Котеса и Гаусса.

3 Ход работы

Требуется вычислить определённый интеграл

$$I = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

3.1 Теоретические сведения

Задача численного интегрирования состоит в приближённом вычислении определённого интеграла

$$I = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Квадратурная формула заменяет интеграл конечной суммой вида

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} A_i f(x_i),$$

где x_i — узлы квадратурной формулы, а A_i — её веса.

Формула Ньютона-Котеса

Формулы Ньютона-Котеса являются интерполяционными квадратурными формулами. Подынтегральная функция заменяется интерполяционным многочленом, после чего вычисляется интеграл от этого многочлена.

В данной работе для формулы Ньютона-Котеса задано $n = 4$, то есть используется формула трёх восьмых. Пусть

$$h = \frac{b-a}{3}, \quad x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Тогда формула имеет вид

$$I_{3/8} = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)).$$

Остаточный член формулы трёх восьмых оценивается следующим образом:

$$|R| \leq \frac{3}{80} h^5 M_4,$$

где

$$M_4 = \max_{x \in [a; b]} |f^{(4)}(x)|.$$

Формула Гаусса

Для вычисления интеграла по формуле Гаусса с n узлами на отрезке $[-1; 1]$ используется формула

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(t_i),$$

где t_i — узлы формулы Гаусса, а w_i — соответствующие веса.

Для перехода к произвольному отрезку $[a; b]$ используется замена

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i.$$

Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{n-1} w_i f(x_i).$$

3.2 Точное значение интеграла

Найдём точное значение интеграла по формуле Ньютона-Лейбница:

$$I = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

Воспользуемся интегрированием по частям:

$$u = x, \quad dv = \sin x \, dx,$$

$$du = dx, \quad v = -\cos x.$$

Тогда

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x.$$

Следовательно,

$$I = (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi}.$$

Подставим пределы интегрирования:

$$I = (-\pi \cos \pi + \sin \pi) - (-0 \cdot \cos 0 + \sin 0) = \pi.$$

Таким образом,

$$I = \pi \approx 3.141593.$$

3.3 Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса

Для формулы Ньютона-Котеса задано $n = 4$, поэтому используем формулу трёх восьмых.

Имеем

$$a = 0, \quad b = \pi.$$

Шаг равен

$$h = \frac{b - a}{3} = \frac{\pi - 0}{3} = \frac{\pi}{3} \approx 1.047198.$$

Узлы квадратурной формулы:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad x_3 = \pi.$$

Вычислим значения функции в узлах:

$$f(x) = x \sin x.$$

$$f(x_0) = f(0) = 0 \cdot \sin 0 = 0,$$

$$f(x_1) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} \approx 0.906900,$$

$$f(x_2) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} \approx 1.813799,$$

$$f(x_3) = f(\pi) = \pi \sin \pi = 0.$$

Подставим полученные значения в формулу трёх восьмых:

$$I_{3/8} = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)).$$

$$\begin{aligned} I_{3/8} &= \frac{3 \cdot \frac{\pi}{3}}{8} (0 + 3 \cdot 0.906900 + 3 \cdot 1.813799 + 0) = \\ &= \frac{\pi}{8} (0 + 2.720699 + 5.441398 + 0) = \\ &= 3.205248. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I_{3/8} \approx 3.205248.$$

3.4 Оценка погрешности формулы Ньютона-Котеса

Фактическая погрешность равна

$$\Delta I_{3/8} = |I - I_{3/8}|.$$

Подставим значения:

$$\Delta I_{3/8} = |3.141593 - 3.205248| = 0.063655.$$

Оценим погрешность с помощью остаточного члена. Для этого найдём четвёртую производную функции.

$$f(x) = x \sin x.$$

$$f'(x) = \sin x + x \cos x,$$

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x,$$

$$f'''(x) = -3 \sin x - x \cos x,$$

$$f^{(4)}(x) = x \sin x - 4 \cos x.$$

На отрезке $[0; \pi]$ имеем

$$M_4 = \max_{x \in [0; \pi]} |x \sin x - 4 \cos x| \approx 4.7773.$$

Тогда

$$|R| \leq \frac{3}{80} h^5 M_4.$$

Подставим значения:

$$|R| \leq \frac{3}{80} \left(\frac{\pi}{3}\right)^5 \cdot 4.7773 \approx 0.225607.$$

Получаем

$$\Delta I_{3/8} = 0.063655 < 0.225607.$$

Следовательно, оценка погрешности выполнена.

На листинге 1 приведена программа, вычисляющая интеграл по формуле Ньютона-Котеса.

Листинг 1: Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса

```
1 f = @(x) x .* sin(x);
2
3 a = 0;
4 b = pi;
5
6 h = (b - a) / 3;
7 x = [a, a + h, a + 2 * h, b];
8 y = f(x);
9
10 I_nc = 3 * h / 8 * (y(1) + 3 * y(2) + 3 * y(3) + y(4));
11 I_exact = pi;
12 error_nc = abs(I_exact - I_nc);
13
14 fprintf('I_nc = %.6f\n', I_nc);
15 fprintf('error_nc = %.6f\n', error_nc);
```

3.5 Вычисление интеграла по формуле Гаусса

Для формулы Гаусса задано $n = 5$. Используем узлы и веса формулы Гаусса на отрезке $[-1; 1]$.

Таблица 1: Узлы и веса формулы Гаусса при $n = 5$

i	t_i	w_i
0	-0.906180	0.236927
1	-0.538469	0.478629
2	0.000000	0.568889
3	0.538469	0.478629
4	0.906180	0.236927

Пересчитаем узлы на отрезок $[0; \pi]$:

$$x_i = \frac{0 + \pi}{2} + \frac{\pi - 0}{2} t_i = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} t_i.$$

Получим:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0.147372, & x_1 &= 0.724971, & x_2 &= 1.570796, \\ x_3 &= 2.416622, & x_4 &= 2.994220. \end{aligned}$$

Вычислим значения функции и произведения $w_i f(x_i)$.

Таблица 2: Вычисление слагаемых формулы Гаусса

i	x_i	$f(x_i)$	$w_i f(x_i)$
0	0.147372	0.021640	0.005127
1	0.724971	0.480738	0.230095
2	1.570796	1.570796	0.893609
3	2.416622	1.602495	0.767000
4	2.994220	0.439670	0.104170

Формула Гаусса на отрезке $[0; \pi]$ имеет вид

$$I_G = \frac{\pi}{2} \sum_{i=0}^4 w_i f(x_i).$$

Подставим найденные значения:

$$\begin{aligned} I_G &= \frac{\pi}{2} (0.005127 + 0.230095 + 0.893609 + 0.767000 + 0.104170) = \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot 2.000000 \approx 3.141593. \end{aligned}$$

Более точное значение, полученное вычислением в программе:

$$I_G = 3.141593.$$

На листинге 2 приведена программа, вычисляющая интеграл по формуле Гаусса.

Листинг 2: Вычисление интеграла по формуле Гаусса

```
1 f = @(x) x .* sin(x);
2
3 a = 0;
4 b = pi;
5
6 nodes = [-0.9061798459, -0.5384693101, 0, ...
7           0.5384693101, 0.9061798459];
8 weights = [0.2369268851, 0.4786286705, 0.5688888889, ...
9            0.4786286705, 0.2369268851];
10
11 x = (a + b) / 2 + (b - a) / 2 * nodes;
12 y = f(x);
13
14 I_gauss = (b - a) / 2 * sum(weights .* y);
15 I_exact = pi;
16 error_gauss = abs(I_exact - I_gauss);
17
18 fprintf('I_gauss = %.12f\n', I_gauss);
19 fprintf('error_gauss = %.12f\n', error_gauss);
```

3.6 Оценка погрешности формулы Гаусса

Погрешность формулы Гаусса оценим по точному значению интеграла:

$$\Delta I_G = |I - I_G|.$$

Так как

$$I = \pi \approx 3.141592653590,$$

а

$$I_G \approx 3.141592826824,$$

то

$$\Delta I_G = |3.141592653590 - 3.141592826824| \approx 0.000000173.$$

Следовательно, формула Гаусса при $n = 5$ дала очень точное приближение.

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был вычислен интеграл

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

Точное значение интеграла равно

$$I = \pi \approx 3.141593.$$

По формуле Ньютона-Котеса при $n = 4$ было получено значение

$$I_{3/8} = 3.205248,$$

при этом фактическая погрешность составила

$$\Delta I_{3/8} = 0.063655.$$

По формуле Гаусса при $n = 5$ было получено значение

$$I_G = 3.141593,$$

при этом погрешность составила

$$\Delta I_G \approx 0.000000173.$$

Таким образом, формула Гаусса в данном случае дала более точное приближение значения интеграла.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1a.m **
2  x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
3  y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
4
5  x_interp = 4.96;
6  L = 0;
7
8  n = length(x);
9  for i = 1:n
10     L_i = 1;
11     for j = 1:n;
12         if i ~= j
13             L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
14         end
15     end
16     L = L + y(i) * L_i
17 end
18
19
20 fprintf('%f\n', L)
21
22 % ** task1b.m **
23 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
24 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
25
26 x_interp = 4.96;
27 L = 0;
28 n = length(x);
29
30 for i = 1:n
31     L_i = 1;
32     for j = 1:n;
33         if i ~= j
34             L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
35         end
36     end
37     L = L + y(i) * L_i
38 end
39
40
41 fprintf('%f\n', L)
42
43 % ** task2_t.m **
44
45 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
46 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
47
48 function D = calcDivDiffTable(x, y)
49     n = length(x);
50     D = zeros(n, n+1);
51     D(:, 1) = x';
52     D(:, 2) = y';
53
54     for j = 3:n+1
55         for i = 1:n-j+2
56             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
57         end
58     end
59 end
60
61 D = calcDivDiffTable(x, y);
62
63 disp('Divided Difference Table:');
64 disp(D);
65
66 % ** task2_1.m **
67
68 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
69 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
70
```

```

71 function D = calcDivDiffTable(x, y)
72     n = length(x);
73     D = zeros(n, n+1);
74     D(:, 1) = x';
75     D(:, 2) = y';
76
77     for j = 3:n+1
78         for i = 1:n-j+2
79             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
80         end
81     end
82 end
83
84 D = calcDivDiffTable(x, y);
85 n = length(x);
86 x_interp = 6.17;
87
88 P = D(n, 2);
89 term = 1;
90
91 for i = 1:n-1
92     term = term * (x_interp - x(n-i+1));
93     P = P + D(n-i, i+2) * term;
94 end
95
96 fprintf('%f\n', P)
97
98 % ** task2_2.m **
99
100 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
101 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
102
103 function D = calcDivDiffTable(x, y)
104     n = length(x);
105     D = zeros(n, n+1);
106     D(:, 1) = x';
107     D(:, 2) = y';
108
109     for j = 3:n+1
110         for i = 1:n-j+2
111             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
112         end
113     end
114 end
115
116 D = calcDivDiffTable(x, y);
117 n = length(x);
118 x_interp = 2.11;
119
120 P = D(1, 2);
121 term = 1;
122
123 for i = 1:n-1
124     term = term * (x_interp - x(i));
125     P = P + D(1, i+2) * term;
126 end
127
128 fprintf('%f\n', P)
129
130 % ** task3_values.m **
131
132 nodes = 7;
133
134 V = zeros(2, nodes);
135 h = 0.5;
136
137 for i = 1:nodes
138     x = 1 + (i - 1) * h;
139     V(1, i) = x;
140     V(2, i) = acos(log2(x / 2));
141 end
142
143 first = V(1, 1);
144 last = V(1, end);
145
146 disp(V);
147
148 % ** task3_1.m **

```

```

149
150 % Adds values table and calculates finite difference table
151 addpath('./task3_t.m');
152
153 x_interp = 1.32;
154
155 n = length(D(1, :));
156 P = D(1, 2);
157 q = (x_interp - first) / h;
158 term = 1;
159
160 for i = 3:n
161     term = term * (q - (i - 2) + 1);
162     P = P + D(1, i) * term / factorial(i - 2);
163 end
164 disp(P);
165
166 % ** task3_2.m **
167
168 % Adds values table and calculates finite difference table
169 addpath('./task3_t.m');
170
171 x_interp = 3.84;
172
173 n = length(D(1, :));
174 m = length(D(:, 1));
175 P = D(m, 2);
176 q = (x_interp - last) / h;
177 term = 1;
178
179 for i = 3:n
180     i_shifted = i - 2;
181     term = term * (q + i_shifted - 1);
182     P = P + D(m - i_shifted, i) * term / factorial(i_shifted);
183 end
184 disp(P);
185
186 % ** task3_3.m **
187
188 % Adds values table and calculates finite difference table
189 addpath('./task3_t.m');
190
191 x_interp = 2.2;
192 a = 2.0;
193 n = 5;
194 q = (x_interp - a) / h;
195
196 P = (D(3, 2) + D(4, 2)) / 2 + (q - 0.5) / factorial(1) ...
197     * D(3, 3) + q * (q - 1) / factorial(2) * (D(2, 4) + D(3, 4)) / 2 ...
198     + (q - 1/2) * q * (q - 1) / factorial(3) * D(2, 5) ...
199     + q * (q - 1) * (q + 1) * (q - 2) / factorial(4) ...
200     * (D(1, 6) + D(2, 6)) / 2 ...
201     + (q - 1/2) * q * (q - 1) * (q + 1) * (q - 2) / factorial(5) ...
202     * D(1, 7);
203
204 disp(P);

```