



Fig - 1




চিত্রঃ কাঁচের পাত্রে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ দীর্ঘসময় রাখা হলে পাত্রের SiO₂ দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সিলিকেট বা পটাসিয়াম সিলিকেট তৈরি করে, ফলে কাঁচের পাত্রের ক্ষয় হয় ও দুর্ঘটনাও ঘটে পারে।

Fig - 2




চিত্রঃ স্পিরিট ল্যাম্পে ইথানলের দহন।

Fig - 3



চিত্রঃ বুনসেন বার্নারে মিথেনের দহন।

Fig - 4




চিত্রঃ সোডিয়াম ধাতুর সাথে পানির বিক্রিয়া।

Fig - 5



চিত্রঃ ডেসিকেটরে শুষ্ককারক পদার্থ ব্যবহার করে কঠিন রাসায়নিক পদার্থকে জলীয়বাস্পমুক্ত রাখা।

Fig - 6



চিত্রঃ Pb^{++} ভারী ধাতু দ্বারা হিমোগ্লোবিন তৈরিকারক এনজাইম এর ক্ষতিসাধন ও ফলস্রুতিতে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে বিঘ্নতা।

