

The family Threskiornithidae includes 36 species of large terrestrial and wading birds falling into two subfamilies: the ibises and the spoonbills. It was formerly known as Plataleidae. The spoonbills and ibises are related to other groups of long-legged wading birds in the order Ciconiiformes including the storks, the herons and the bitterns. Whether the two subfamilies are reciprocally monophyletic is an open question. The South American Checklist Committee's entry for the Threskiornithidae includes the following comment: Two subfamilies are traditionally e.g. Matheu del Hoyo 1992 recognized: Threskiornithinae for ibises and Plataleinae for spoonbills because the main distinction has to do with bill shape; additional information, especially genetic, is required to recognize a major deep split in the family. 1

Members of the family have long, broad wings with 11 primary feathers and about 20 secondaries. They are strong fliers and rather surprisingly given their size and weight, very capable soarers. The body tends to be elongated, the neck more so with rather long legs. The bill is also long, decurved in the case of the ibises, straight and distinctively flattened in the spoonbills. They are large birds, but mid-sized by the standards of their order, ranging from the Olive Ibis *Bostrychia olivacea* at 48 cm (19 in) and 500 g (1.1 lb) to the Giant Ibis *Thaumatibis gigantea* at 100 cm (40 in) and 4.2 kg (9.2 lb).

They are distributed almost world-wide, being found near almost any area of standing or slow-flowing, fresh or brackish water. Ibises are also found in drier areas, including city rubbish tips. All are diurnal, spending the day feeding on a wide range of invertebrates and small vertebrates: ibises by probing in soft earth or mud, spoonbills by swinging the bill from side to side in shallow water. At night, they roost in trees near water. They are gregarious, feeding, roosting and flying together, often in formation.

Nesting is colonial in ibises, more often in small groups or singly in

Till familjen ibisfåglar hör två underfamiljer: de egentliga ibisarna Threskiornithinae och skedstorkarna Plataleinae. Skedstorkarna är större än de andra ibisarna och deras näbbar är rundade och tillplattade längst ut. Till skedstorkarna förs släktena Platalea och Ajaia. Ibisfåglarna är den familj storkfåglar som mest liknar de äkta storkarna.

Ibisfåglarna är små men kraftigt byggda storkfåglar, har höga ben och kort hals. Deras främsta kännetecken är den förhållandevis mycket långa näbben som är välvd nedåt. Vernäbben har en långsgående fåra på var sida. De har breda vingar, kort stjärt, riklig fjäderdräkt. Tårna är långa och har bindhud. De flyger svävande, tar få vingslag och har en graciös hållning i luften med utsträckt kropp. De flesta arter är dagaktiva.

Fåglarna bor i varma områden över hela världen. De trivs bäst i lite våtare områden, bland vass eller i sumpmarker eller i skogar. De häckar i regel kolonivis, men häckningsplatserna skiljer sig åt för olika arter. Vissa arter häckar i bergen, andra i träd och flera i strandkanter. Äggen är vanligtvis vita med prickar eller fläckar. Deras föda är animalisk och utgörs av maskar, insekter, mindre fiskar och andra vattendjur. Flera arter är asätare.

Ibisfågeln var i forntida Egyptens religion en av guden Thots många gestalter och många ibisfåglar mumifierades till hans ära.