KORT YFIR AÐFERÐIR Í RAUNTÍMA

Hvað get ég gert, núna?

1. Taktu eftir hvar þú ert á skalanum.
2. Veldu aðferð sem aðstæður leyfa.

← Of lítil orka

ÞOLGLUGGINN

Of mikil spenna →



Tóm/ur, dofin/n	Þreytt/ur	Í jafnvægi	Á fullu	Á yfirsnúningi
Aftenging, „mér er sama“	Þungt, hægt, orkulítið	Til staðar, get hugsað skýrt	Spenna í öxlum, hraðinn eykst	Pirringur, „ég ræð ekki við þetta“

Aðferðir eftir því hvað aðstæður leyfa. Prófaðu þig áfram og finndu hvað hjálpar þér.

10 sekúndur
Í miðjum aðstæðum, með öðrum

- **Ein löng útöndun**
  Blástu hægt út, eins og á kerti
- **Fætur í gólfið**
  Finndu iljarnar þrýsta niður
- **Nefndu tilfinninguna**
  „Þetta er streita“, í huganum
- **Njóttu augnabliksins**
  Staldraðu við eitthvað gott
- **Bros og augnsamband**
  Leitaðu að vinalegu andliti

1–2 mínútur
Get stigið aðeins til hliðar

- **Tvöfalt andvarp**
  Inn, smá meira inn, langt út
- **Hæg öndun**
  Inn á fjórum, út á sex
- **Stoppa og staldra við**
  Anda, taka eftir, velja næsta skref
- **Spenna og sleppa**
  Axlir upp í 5 sek., svo sleppa
- **Taktu eftir umhverfinu**
  3 sem þú sérð, 2 heyrir, 1 finnur
- **Mild orð við þig**
  „Þetta er erfitt. Ég má vera mild/ur.“

5 mínútur eða meira
Get verið ein/n smástund

- **RAIN, mild athygli**
  Taktu eftir, leyfðu, kannaðu, nærðu
- **Hjartaöndun**
  Hæg öndun og hlý tilfinning
- **Hreyfing og dagsbirta**
  Út, ganga, teygja sig
- **Hlé með einhverjum**
  Kaffi eða ganga saman
- **Leitaðu til einhvers**
  Manneskju sem þér líður vel með

Allar aðferðirnar eru útskýrðar á næstu síðu, ásamt rannsóknunum sem þær byggja á.

© 2026 Dr. Sigrún Þóra Sveinsdóttir, sálfræðingur

AÐFERÐIRNAR ÚTSKÝRÐAR

Svona gerirðu hverja aðferð

Öndun

Ein löng útöndun
Andaðu hægt út, lengur en þú andar inn, eins og þú blásir á kerti.

Laborde o.fl., 2022

Tvöfalt andvarp
Inn um nefið, smá meira inn ofan á, svo langt og hægt út um munninn. 2–5 sinnum.

Balban o.fl., 2023

Hæg öndun
Inn á meðan þú telur upp að fjórum, út upp að sex. Nokkrar mínútur í senn.

Laborde o.fl., 2022; Zaccaro o.fl., 2018

Hjartaöndun
Hönd á bringu og hægari öndun. Hugsaðu um einhvern sem þér þykir vænt um.

McCraty o.fl., 2009

Líkaminn

Fætur í gólfið
Finndu iljarnar þrýsta niður og þyngd líkamans í stólnum.

Klínísk aðferð

Spenna og sleppa
Lyftu öxlunum upp að eyrum í fimm sekúndur, slepptu og finndu muninn.

Manzoni o.fl., 2008

Hreyfing og dagsbirta
Stattu upp, teygðu þig, rúllaðu öxlum eða gakktu út. Jafnvel 2–5 mínútur skipta máli.

Albulescu o.fl., 2022; Lee o.fl., 2015

Taktu eftir umhverfinu
Nefndu þrjá hluti sem þú sérð, tvö hljóð sem þú heyrir og eitt sem þú finnur.

Klínísk aðferð

Hugurinn og mildi

Nefndu tilfinninguna
Segðu í huganum: „Þetta er streita.“ Að setja orð á tilfinningu dregur úr henni.

Lieberman o.fl., 2007

Stoppa og staldra við
Stoppaðu, andaðu einu sinni, taktu eftir líkama og hugsunum, veldu svo næsta skref.

Khoury o.fl., 2015

Mild orð við þig
Hönd á hjartað: „Þetta er erfitt augnablik. Ég er ekki ein/n um þetta. Ég má sýna mér mildi.“

Neff, 2003; Ferrari o.fl., 2019

Njóttu augnabliksins
Staldraðu við eitthvað gott í þrjá andardrætti: birtu, hlátur, kaffibolla.

Bryant & Veroff, 2007

Tengsl

Bros og augnsamband
Leitaðu að vinalegu andliti. Taugakerfið róast í návist fólks sem okkur líður vel með.

Palumbo o.fl., 2017

Hlé með einhverjum
Kaffi eða stutt ganga með einhverjum, um eitthvað annað en vinnuna.

Kim o.fl., 2017; Cohen & Wills, 1985

Leitaðu til einhvers
Til manneskju sem þér líður vel með. Ef vanlíðan varir: heilsugæslan eða Hjálparsíminn 1717.

Coan o.fl., 2006

RAIN: mild athygli
- **R** **Taktu eftir:** Hvað er að gerast í mér núna?
- **A** **Leyfðu:** Það má vera svona, í smástund.
- **I** **Kannaðu með mildi:** Hvað þarf ég?
- **N** **Nærðu:** Hvað myndi ég segja við góðan vin?

Recognize, Allow, Investigate, Nurture · Brach, 2019

„Klínísk aðferð“: notuð í meðferð en lítið rannsökuð ein og sér. Kortið sjálft byggir á þolglugganum (Siegel, 1999).

© 2026 Dr. Sigrún Þóra Sveinsdóttir, sálfræðingur