



ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL

Cuidados alimentares durante quimioterapia e tratamento oncológico

NOME: _____	NASC.: ____/____/____	CIDADE: _____	IDADE: _____
-------------	-----------------------	---------------	--------------

OBJETIVO

Manter peso, força muscular, hidratação e segurança alimentar. Prefira alimentos bem higienizados e, quando houver baixa imunidade, priorize preparações cozidas. Suplementos devem ser usados somente com orientação médica ou nutricional.

PREFERIR / PODE COMER	EVITAR / NÃO CONSUMIR
Proteínas: frango, peixe, carne magra bem passada, ovos com gema dura, feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu e soja. Carboidratos: arroz, macarrão, pão, torrada, batata, mandioca, inhame, aveia, tapioca e cuscuz. Gorduras boas: azeite de oliva, abacate, pasta de amendoim e castanhas em pequena quantidade. Frutas: bem lavadas e descascadas; preferir banana, maca, pera, mamão, melão, manga e compotas caseiras. Vegetais: preferir cozidos ou refogados: cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba, brócolis, couve-flor, espinafre e couve. Líquidos: 2 a 3 litros/dia, salvo restrição médica. Água filtrada ou fervida, chás suaves, caldos, sopas e sucos naturais coados. Laticínios seguros: leite UHT/caixinha e iogurtes pasteurizados dentro da validade.	Crus ou malpassados: sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, kibe cru, carnes, frango, peixes e ovos com gema mole. Produtos sem inspeção: leite cru, queijos artesanais de feira, maionese caseira, mousses não pasteurizados e iogurtes artesanais. Embutidos e ultraprocessados: salsicha, linguiça, mortadela, presunto, bacon, salgadinhos, miojo e temperos prontos. Doces em excesso: refrigerantes, sucos industrializados, balas, biscoito recheado, bolos industrializados e sorvetes de origem duvidosa. Alcool: evitar cerveja, vinho, cachaca, whisky, vodca, licores e bebidas fermentadas. Irritantes: pimentas, frituras, condimentos fortes, alimentos muito quentes ou gelados. Em mucosite, evitar cítricos. Água e gelo inseguros: água de torneira/poço sem tratamento e gelo de origem desconhecida.

DICAS PRÁTICAS

Lave as mãos antes das refeições. Higienize frutas e verduras. Fracione a alimentação em 5 a 6 pequenas refeições ao dia. Em náuseas, prefira pequenas porções frias e secas, como torrada ou biscoito de água e sal. Mastigue devagar e avise a equipe se houver perda de peso, falta de apetite, vômitos persistentes, diarreia ou dificuldade para engolir.

Data: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA



SINAIS DE ALARME

Quando procurar pronto-socorro durante tratamento oncológico

NOME: _____	NASC.: ____/____/____	CIDADE: _____	IDADE: _____
-------------	-----------------------	---------------	--------------

FEBRE $\geq$ 37,8°C OU CALAFRIOS: PROCURE PRONTO-SOCORRO IMEDIATAMENTE.

SINAIS DE INFECÇÃO	COMPLICAÇÕES GRAVES
• Febre acima de 37,8°C, calafrios ou tremores, mesmo sem febre alta. • Dor, vermelhidão, calor local, secreção ou pus em cateter, ferida ou acesso venoso. • Tosse associada a falta de ar, dor no peito ou queda importante do estado geral. • Dor ao urinar, urina turva, sangue na urina ou cheiro forte. • Feridas na boca, dor de garganta, placas brancas ou dificuldade para engolir. • Fraqueza intensa, sonolência fora do habitual ou confusão mental.	• Sangramento que não para: nariz, gengiva, fezes, urina ou vômitos com sangue. • Manchas roxas extensas ou pontinhos vermelhos na pele. • Falta de ar súbita, dor ao respirar, dor no peito ou inchaço nas pernas. • Dor forte que não melhora com remédio prescrito. • Convulsão, desmaio, confusão, dificuldade para falar ou fraqueza em um lado do corpo. • Pouca urina, inchaço no corpo, vômitos repetidos ou sinais de desidratação.

NA DÚVIDA, NÃO ESPERE

Durante quimioterapia, infecções podem evoluir rapidamente. Leve este documento, lista de medicamentos e, se possível, os exames mais recentes ao pronto-socorro.

ANOTAÇÕES DO PACIENTE

PRESSÃO	____/____ mmHg	____/____ mmHg	____/____ mmHg
VÔMITOS	() nenhum	() 1-2x	() 3-5x () >5x/dia
DIARREIA	() nenhuma	() 1-3x	() 4-6x () >6x/dia
DOR 0-10	() 0	() 1-3 leve	() 4-6 moderada () 7-10 forte

Data: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA



RECEITA MEDICA - SINTOMATICOS

Medicacoes de apoio durante quimioterapia - ajustar conforme prescricao individual

NOME: _____	NASC.: ____/____/____	CIDADE: _____	IDADE: _____
-------------	-----------------------	---------------	--------------

VIA ORAL

MEDICAMENTO	ORIENTACAO
PANTOPRAZOL 20 mg	Tomar 1 comprimido em jejum, 30 minutos antes da primeira refeicao, durante a quimioterapia, salvo orientacao contraria.
ONDANSETRONA 8 mg	Tomar 1 comprimido de 8/8h por 2 dias apos a quimioterapia, mesmo sem nauseas; depois usar se necessario.
METOCLOPRAMIDA 10 mg	Tomar 1 comprimido de 8/8h por 2 dias apos a quimioterapia, mesmo sem nauseas; depois usar se necessario.
DIMENIDRINATO 50 mg	Tomar 1 comprimido de 8/8h por 2 dias apos a quimioterapia, mesmo sem nauseas; depois usar se necessario.
DEXAMETASONA 4 mg	Tomar 1 comprimido na noite anterior e 1 comprimido no dia seguinte. Nao tomar no dia da quimioterapia, salvo orientacao medica.
LOPERAMIDA 2 mg	Se diarreia: tomar 2 comprimidos no inicio e 1 comprimido a cada 2 horas. Maximo 8 comprimidos/dia. Se nao melhorar, procurar pronto-socorro.
LACTULOSE xarope	Se ficar 3 dias sem evacuar: 15 a 30 mL de 12/12h, salvo contraindicacao.
SIMETICONA 125 mg	Se gases ou distensao abdominal: 1 comprimido de 8/8h apos as refeicoes.

VIA ENDOVENOSA / PRONTO ATENDIMENTO

MEDICAMENTO	ORIENTACAO
COMPLEXO B + HIDRATACAO	2 ampolas em 500-1000 mL de SF, em 3 horas. Repetir por 2 dias pos-quimioterapia, conforme avaliacao.
ONDANSETRONA EV 8 mg	Diluir em 50-100 mL de SF, infundir em 15 minutos. Usar 8/8h a 12/12h se necessario.
METOCLOPRAMIDA EV 10 mg	Diluir em 50-100 mL de SF, infundir em 20 minutos. Usar 6/6h a 8/8h se necessario.
NORIPURUM EV, se anemia	100-200 mg em 100-250 mL de SF, em 30 minutos. Monitorar durante a infusao.
BUSCOPAN COMPOSTO EV	1-2 ampolas em 100-250 mL de SF, em 30 minutos. Nao fazer bolus.
DEXAMETASONA EV	4-10 mg EV lento (1 minuto) ou diluido em 50-100 mL de SF, em 15 minutos.

OBSERVACAO AO MEDICO PLANTONISTA

Nao ha contraindicacao oncologica geral para medicacoes ou antibioticos clinicamente indicados. Avaliar alergias, interacoes, funcao renal/hepatica, comorbidades e condicao clinica. Em febre durante quimioterapia, nao retardar atendimento.

Data: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA



REQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS

Controle de segurança durante tratamento oncológico

NOME:	NASC.:	CIDADE:	IDADE:

ORIENTACAO AO PACIENTE

Coletar os exames na data mais próxima da consulta e trazer o resultado impresso ou digital para avaliação médica. Se houver febre, sangramento, falta de ar ou piora importante, procurar atendimento imediatamente.

EXAME	CICLO 1 Data: / /	CICLO 2 Data: / /	CICLO 3 Data: / /	CICLO 4 Data: / /
HEMOGRAMA	()	()	()	()
UREIA	()	()	()	()
CREATININA	()	()	()	()
TGO (AST)	()	()	()	()
TGP (ALT)	()	()	()	()
BILIRRUBINAS	()	()	()	()
FOSFATASE ALCALINA	()	()	()	()
GAMA-GT	()	()	()	()
SODIO/POTASSIO	()	()	()	()
MAGNESIO	()	()	()	()

EXAMES ADICIONAIS / OBSERVACOES	CICLO 1	CICLO 2	CICLO 3	CICLO 4
	()	()	()	()
	()	()	()	()
	()	()	()	()
	()	()	()	()
	()	()	()	()
	()	()	()	()
	()	()	()	()

Data: / /

CARIMBO E ASSINATURA



RELATORIO MEDICO ONCOLOGICO

Documento para fins periciais e administrativos - modelo para preenchimento medico

NOME: _____	IDADE: _____	NASC.: ____/____/____
CIDADE: _____	CPF: _____	CID: _____

Afastamento sugerido por 6 meses, passivel de renovacao conforme evolucao clinica.

1. DECLARACAO MEDICA

Atesto, para fins de pericia medica e demais fins administrativos, que o(a) paciente acima identificado(a) foi diagnosticado(a) com neoplasia informada no cabecalho e encontra-se em vigencia de tratamento oncologico sistemico com quimioterapia, sob meus cuidados no Hospital do Bem - Unidade Oncologica, Patos/PB.

O tratamento quimioterapico pode ocasionar fadiga, astenia, nauseas, vomitos, diarreia, mucosite, dor, neuropatia, anemia, neutropenia, plaquetopenia, maior risco infeccioso e necessidade de consultas, exames, infusoes e reavaliacoes recorrentes.

Considerando o diagnostico, o tratamento ativo e os riscos associados, recomendo afastamento das atividades laborais por 6 (seis) meses, a contar de ____/____/____, passivel de renovacao apos reavaliacao medica. A permanencia em atividade laboral durante a quimioterapia deve ser avaliada conforme a funcao exercida, pois efeitos colaterais e condicoes do ambiente de trabalho podem oferecer riscos ao paciente e a terceiros, conforme a atividade especifica.

2. DIREITOS SOCIAIS QUE PODEM SER AVALIADOS

- **INSS:** beneficio por incapacidade temporaria ou permanente, conforme pericia, qualidade de segurado e incapacidade laboral.
 - **FGTS:** saque quando trabalhador ou dependente for acometido por neoplasia maligna, conforme Lei 8.036/1990, art. 20, XI.
 - **PIS/PASEP:** saque de cotas quando existentes e preenchidos os criterios do fundo.
 - **Imposto de renda:** isencao sobre aposentadoria, reforma ou pensao, conforme Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV.
- **Transporte:** gratuidade conforme legislacao local; Passe Livre interestadual quando houver criterios legais.
 - **Veiculo adaptado:** IPI, ICMS, IPVA e CNH especial quando houver deficiencia/sequela funcional, conforme laudo especifico.
 - **Financiamento habitacional:** possivel quitacao se houver invalidez total/permanente e cobertura securitaria contratual.
 - **Servico Social:** orientar sobre TFD/SUS, medicacoes, transporte e formularios especificos.

Observacao: o acesso a beneficios depende de documentacao, avaliacao pericial, regras do orgao competente, condicao laboral, renda, deficiencia/sequela e legislacao local vigente. Este relatorio deve ser acompanhado de exames, laudos e documentos solicitados pela pericia ou instituicao responsavel.

Dr. Silas Negrao Serra Jr. - CRM-PB 17341
RQE Oncologia Clinica 9099 | RQE Clinica Medica 9098
Data: ____/____/____

CARIMBO
ASSINATURA DO MEDICO