

Coronavirus COVID-19

Dpto. de Salud Ocupacional

Dra. Espinosa , Silvana.

Definición de Casos

CASO SOSPECHOSO

- Toda persona que presente fiebre **y** uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, **Y**
 - Que haya estado en contacto con casos confirmado o probable de COVID-19 **Ó**
 - Que tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de SARS CoV-2*
- *Las zonas que se consideran con transmisión local • China • Europa . Corea del Sur • Japón • Irán.
- Chile EEUU. Brasil.

- **CASO CONFIRMADO :**
- **Todo caso probable que presenta una secuencia genómica homóloga al SARS CoV-2.**
- **Medio de transmisión:**
- **Es a través de la Saliva y por contacto**

CORONAVIRUS

TELÉFONO DE
CONSULTAS




0800 555 6549

*Comunicate con nosotros
si venís del exterior
o presentás algún síntoma*

Coronavirus
#SaberParaPrevenir

Ministerio
de Salud

**PROVINCIA
DE SANTA FE**



Diferentes Cuadros Clínicos

APRENDE A DIFERENCIAR LOS SINTOMAS

SINTOMAS	CORONAVIRUS	DENGUE	GRIPE	RESFRIADO
FIEBRE ALTA	SI	SI	SI	NO
TOS	SI	NO	SI	SI
MOCO	NO	NO	SI	NO
CONGESTION NASAL	NO	NO	NO	SI
ESTORNUDOS	ES POSIBLE	NO	SI	SI
DOLOR DE GARGANTA	ES POSIBLE	ES POSIBLE	NO	SI
DIFICULTAD PARA RESPIRAR	SI	NO	NO	NO
FLEMA(AMARILLA/VERDOSA)	SI	NO	NO	NO
VOMITO	NO	ES POSIBLE	SI	NO
DIARREA	NO	ES POSIBLE	SI	NO
MUY CANSADO/DEBIL	SI	SI	NO	NO
RX DE PULMON-MANCHA	SI	NO	NO	NO

Definición de Contactos

Contacto estrecho:

En la comunidad:

- Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable ó confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
- Ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad o.

- Ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha determinado tiempo de exposición específico).

En un avión/bus:

- Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

Recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón;
- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo .
- Usar un pañuelo descartable al toser o estornudar;
- ventilar los ambientes;
- Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia ,celulares, computadoras, grifos, picaportes .
- No compartir MATE.
- No estrechar la manos , ni besarse, ni abrazarse.(NO SALUDAR)
- No concurrir a lugares con muchas personas (Bares, Concierto, recitales ,restaurants)

- Evite tocarse los ojos , la nariz, y boca .
- Distanciamiento de las personas. Mínimo un metro.
- En caso que el personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se **OBLIGA** a permanecer en el domicilio (**Cuarentena**)sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días., de no ser así es delito penal y multas .
- Evite compartir vaso , platos y otros utensilios de uso personal .
- Se recomienda a paciente mayores de 65 años que se vacunen contra el neumococo, antigripal .

Si conoces a alguien que regresó
de zonas de circulación de Coronavirus
y no está cumpliendo con la medida
preventiva de cuarentena en su domicilio.
PODES DAR AVISO AL:



0800 222 1002
(OPCIÓN 1)

Factores de Riesgo

- Las personas mayores de 65 años .
- Afecta mas al hombre que a la mujer .
- Hipertensos .
- Diabéticos.
- Obesos.
- Immunodeprimidos (transplantados, cancer, medicados con corticoides, adictos)
- Tabaquistas , EPOC.
- Insuficiencias Renal y hepáticas, cardiacas, Respiratorias.

Tratamiento

- Aislamiento estricto.
- Hidratación .
- Paracetamol para bajar la temperatura.
- Se contraindica ibuprofeno.

Instructivos de lavados de manos y desinfección de la OMS

DESINFECCION

- **Lavandina comercial (común)**: Colocar un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua
- **Alcohol líquido**: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado del fuego, no se aconseja el uso en la cocina.


¡¡Eficaz y económico!!



Mezclamos



+



7 partes de
ALCOHOL PURO

3 partes de
AGUA DE CANILLA

Lo colocamos en un difusor
para utilizarlo
de la misma manera
que el alcohol en gel



EJEMPLO

100 ml
30 ml de agua
70 ml de alcohol



¡IMPORTANTE!

El alcohol puro NO es un DESINFECTANTE
Solamente su DILUCION con AGUA
lo convierte en desinfectante

Actualización del Ministerio de Salud.

15/03/2020

Recomendaciones

- Suspendir ciclo lectivo
- Suspensión de actividades no esenciales
- Licenciamiento laboral – personas con factores de riesgo, mayores de 60 años) – Personal esencial >60 años minimizar riesgo
- Distanciamiento social (actividades masivas) – Recreativas, deportivas, turísticas, recitales.

- De la única manera que podemos cambiar esta enfermedad es
CUIDARNOS ENTRE
TODOS .