


Отчёт по семинару 1. Метагеномика: данные mice

Шилина Виктория


Качество сырых данных

FastQC по 58 файлам, сводка через MultiQC.



MultiQC: Mean Quality Scores по всем файлам

Качество около 35-37 примерно до 140 позиции, дальше кривые расходятся на два пучка: прямые прочтения доходят до конца на 28-30, обратные после 180 уходят в жёлтую зону и к 250 падают до 15-20.




MultiQC: Per Sequence Quality Scores

Зелёный по всем файлам - субпопуляции плохих прочтений нет. Дупликация 76-90% и красный Per base sequence content ожидаемы для ампликонов: все риды покрывают один участок 16S, перекося в начале даёт праймер. GC стабильно 52-54%.

Импорт и статистика сырых прочтений

```
qiime tools import \
  --type 'SampleData[PairedEndSequencesWithQuality]' \
  --input-path $MICE/metadata_for_input.tsv \
  --output-path qza/mice_reads.qza \
  --input-format PairedEndFastqManifestPhred33V2
```

```
qiime demux summarize --i-data qza/mice_reads.qza \
  --o-visualization qzv/mice_reads.qzv
```



Длина прочтений по demux summarize ровно 250 нт во всех перцентилях. Forward до 200 позиции держит медиану 36-38, к 240 она опускается до 32 при нижнем квантиле 24. Reverse сыпется раньше: на 200 позиции медиана уже 30, нижний квантиль 13, а к 240 медиана падает до 13 и четверть прочтений оказывается на уровне 2. --p-trunc-len-f 240 и --p-trunc-len-r 200. Нижний ус на этих графиках - 9-й перцентиль, а не минимум: у forward он опускается до 2 уже на 240 позиции, у reverse - на 200.

DADA2

```
qiime dada2 denoise-paired \
  --i-demultiplexed-seqs qza/mice_reads.qza \
  --p-trim-left-f 19 \           # праймер 515F
  --p-trim-left-r 20 \          # праймер 806R
```


QIIME 2

File: mice_ASV_table.qzv X

VisualizationCitationsProvenanceMetadata

qime2.view


OverviewInteractive Sample DetailFeature Detail

Table summary

Summary Statistic	Value
Number of samples	29
Number of features	517
Total frequency	89 198

Frequency per sample

	Frequency
Minimum frequency	1 257
1st quartile	2 264
Median frequency	3 340
3rd quartile	3 640
Maximum frequency	4 681
Mean frequency	3 075.8



Download as PDF

Frequency per feature

29 образцов, 517 ASV, суммарно 89 198 прочтений. Глубина от 1257 (W1) до 4681 (LR2), медиана 3340.

Таксономия

```
qiime feature-classifier classify-sklearn \
  --i-classifier $MICE/2022.10.backbone.v4.nb.sklearn-1.4.2.qza \
  --i-reads qza/mice_rep_seq.qza \
  --o-classification qza/mice_taxonomy.qza --p-n-jobs 16
```

QIIME 2

File: mice_taxonomy.qza X

DataCitationsProvenanceMetadata

qime2.view


Your DataArtifact Structure

taxonomy.tsv X

Feature ID Taxon Confidence

d3a2696532691ccf112c52166b8b4c9 d__Bacteria; p__Campylobacterota; c__Campylobacteri...
ac0b2a9b697f38da21538173cf98c19 d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Parabacteroides; g__Parabacteroides...
23a4486e8c234ddc24a0f58b0c26c4 d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Altiples; g__Altiples; s__Altiples...
e6257c7a365a6b0b3e9a64ccc8b01 d__Bacteria; p__Deferribacterota; c__Deferribacteres; o__Deferribacteres; f__Mucispirillum; g__Mucispirillum...
e51c8b5b58aae71b8d17b012f2a5bc97 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__COE1; s__COE1 sp000403215 0.983122141...
91c8605f8b7d68677f53789eb3dc5f d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__COE1; s__COE1 sp000403215 0.999998845...
b2b2fb2f08691b75c2d946b4b49c3fe7 d__Bacteria; p__Desulfobacterota; c__Desulfobacteriales; o__Desulfobacteriales; f__Desulfobacteriales; g__Desulfobacteriales...
923e2b4b0ae9f0b5c2d946b4b49c3fe7 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
e5c25f35198d7023cd12bcfb3d6582 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
e2475a0d4b3301548a474228a436605 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__COE1; s__COE1 sp000403215 0.984755083...
acd5bae2e9302a851824d5852d6f78 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
1e37513aaa8ee9970a53cd69057a203 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Lachnospiraceae; s__Lachnospiraceae...
7acfb64f46d5e0e289f02126908013 d__Bacteria; p__Campylobacterota; c__Campylobacteri...
aa5d8f5136c1bd1265706189b0ddfb01 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__CAG-95; s__CAG-95 sp00066375 0.9583...
c903c57f1d1586f3af25748156eedd3 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
e73dcf1a64562fa68f49e51623f623 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
aadbf4447c97b3a67b08e5493ec1855 d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinifilaceae; g__Odoribacter; s__Odoribacter laneus 0.5...
d8ea78a442f3b873c6b6b6a7ac3b16 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__UBA3282; s__UBA3282 sp003611805 0.5...
9dde28f54292b399bdaed5c97a5fb350 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__UBA3282; s__UBA3282 sp003611805 0.5...
e98b0ba99f3e1211e0d857ab35cc1c9 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Christensenellales; s__Christensenellales...
0ff4d1ae6d916a1ee5aae2dd3072a7 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__COE1; s__COE1 sp000403215 0.942548316...
01d17e4e095c3b07f4e0c4b01199cf d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__C-33; s__C-33 sp000946677800884...
68b0373cde1112b6f786a651837c377 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__UBA3282; s__UBA3282 sp003611805 0.5...
ef32a4b3ab30cdfb2d9a6f7fe11ae d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Acetatifactor; s__Acetatifactor sp011...
997867466d7e1a415b2a0e29ac766739 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
a5ee868e56da8e20eb16c9ebaa7f320 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
ec6bd0fd14b586688a4cdbc41cc9d3 d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacteriales; f__Enterobacteriales; g__Escherichia; s__Escherichia...
8ecea0bda69cae3b9f34ba17e6cdfd d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Kineothrix; s__Kineothrix sp000403272...
cb964e96ae712ac5cd8016199c138477 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Enterococcus; s__Enterococcus...
3d4f3891f2f7f18694986c939ac14d77 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__1X042-69; s__1X042-69 sp003612565 0.5...
a792289aacc88a9f56962f9f572abeb d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Peptococcus; s__Peptococcus...
2c4950b6716a5c52f2c4c2c24a905 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__999613422290521...
f98da0862353a226a4a8e4a031ae8 d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Bacteroidales; g__Bacteroides; s__Bacteroides...
98a7bcb1a65e985f7eccc4a6971a13 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Desulfobacteriales; s__Desulfobacteriales...
da00e482b18c5f861708ef582b07dd d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__TANB77; s__TANB77 sp00041335 0.944986682151812...
f579f8e3d2407bc478a0a354c8187c d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Robinsoniella; s__Robinsoniella...
9d9a397274a5e87a648898fe278dd d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__TANB77; s__TANB77 sp0003507395 0.9475380223300108...
611c1adb190518650ba15938958a0d93 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__Butyrivibrio; s__Butyrivibrio...
fe127623c6325d448de996c139f031 d__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Lachnospirales; f__Lachnospiraceae; g__TANB77; s__TANB77 sp0003507395 0.9475380223300108...

Классификатор GreenGenes2 2022.10. классифицирует на V4. Confidence в основном 0,94-0,99; часть ASV обрывается на семействе Lachnospiraceae - классификатор уверен в семействе, но не выбирает род.



Download metadata TSV file

This file will necessarily reflect dynamic sorting or filtering options based on the interactive table below.

Feature ID	Taxon	Confidence
01627329.0.76728956476e73e058	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Acetivibrioaceae_g__Acetivibrio_s__Acetivibrio_muts	0.9857316851167072
016614203056.0a6f8e8f80a1e1e1c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__UBA1381_s__UBA1381_g__CAG-41_s__CAG-41_sp01941225	0.999974841120961
0161765935.0ab7e6e1e6a0199c7	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Lachnospiraceae_g__C-53_s__	0.990946677800964
0262055672.026059544e36a889	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Clostridiaceae_g__B309_s__	0.979623283416596
03038866.66168e51739c45c0e7c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__UBA3282_s__UBA3282_sp00611805	0.98451627575427
044636763c0e4ad7c7a8d8f0c3	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__Paraclostridium_s__	0.9849748448306
04630505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Lachnospiraceae_g__UBA3282_s__UBA3282_sp00611805	0.9764416057315173
05630505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Lachnospiraceae_g__Clostridium_AP	0.7382419124077975
05715982.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Clostridiaceae_g__B309	0.999993051801113
06104380.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__Acetivibrio_s__	0.941773978962746
06300505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__CCE1_s__CCE1_sp00040335	0.948164326539091
07633605.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Chlorimicrobiales_f__Bifidobacteriaceae_g__Bifidobacterium_s__	0.999999743058683
07633605.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__Clostridium_AP	0.83099597100231
07704305.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Bacteroidia_o__Bacteroidia_f__Bacteroidaceae_g__Parabacteroides_g__Bacteroides_s__	0.95547438480476
08845022.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Bacteroidia_o__Bacteroidia_f__Bacteroidaceae_g__Alloprevotella_s__Alloprevotella_sp0293585	0.9999999293602
08923050.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__TBA4_s__TBA4_sp00087945	0.7715473774856024
09673050.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Anaerotruncaceae_g__Capnocytophaga_s__	0.99060189324821
09843050.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Ruminococcaceae_g__Ruminococcus_s__Ruminococcus_lactiformans	0.986464112396195
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Desulfobacterota_o__Desulfobacterota_f__Desulfobacteraceae_g__Bifidobacterium_s__Bifidobacterium_wadsworthii	0.908860289328585
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__UBA3282_s__UBA3282_sp00611805	0.968167037734284
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__Paraclostridium_s__	0.9819623149033
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Lachnospiraceae_g__Paraclostridium_s__	0.99999606060416
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Chlorimicrobiales_f__Bifidobacteriaceae_g__Bifidobacterium_s__	0.99060189324821
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Lachnospirales_f__Lachnospiraceae_g__Klebsiella_s__Klebsiella_sp00040335	0.752962701153397
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Ruminococcaceae_g__Angustibacterium_s__Angustibacterium_massiliensis	0.984144278215117
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__TAN077_f__CAG-508_g__UBA3282_s__UBA3282_sp00611805	0.99060189324821
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Firmicutes_A__Clostridia_o__Clostriales_f__Ruminococcaceae_g__Paraclostridium_s__Paraclostridium_pseudoclostridium	0.95547438480476
09850505.0505a6e6e171e0a6f0c	d__Bacteria_p__Bacteroidia_o__Bacteroidia_f__Bacteroidaceae_g__Alloprevotella_s__Alloprevotella_sp0293585	0.9999999293602

У L доминируют Clostridia: медиана 75,8% (68,3-79,7), у LR ещё выше - 85,2% (73,9-89,6). У W доля падает до 29,8% при огромном разбросе между особями, от 10,1 до 60,4%, зато поднимаются Campylobacter, Desulfovibrio и Gammaproteobacteria. WR наследует набор таксонов дикого профиля, но не пропорции: Clostridia там держится на 57,1% (46,6-66,8).

Названия не совпадают со статьёй: GreenGenes2 использует GTDB, где Firmicutes разделены на Firmicutes_A/B/D, а часть бывших Proteobacteria вынесена в Campylobacterota и Desulfobacterota.


Филогенетическое дерево

Команда не работала (плагины нет в базовом дистрибутиве amplicon): qiime empress tree-plot \ --i-tree <path-to-qza-dir>/mice_rooted_tree.qza \ --m-feature-metadata-file <path-to-qza-dir>/mice_taxonomy.qza \ --o-visualization <path-to-qzv-dir>/mice_tree.qzv

Выполнено: qiime phylogeny align-to-tree-mafft-fasttree \ --i-sequences qza/mice_rep_seq.qza \ --o-alignment qza/aligned_mice_rep_seq.qza \ --o-masked-alignment qza/masked_aligned_mice_rep_seq.qza \ --o-tree qza/mice_unrooted_tree.qza \

```
--o-rooted-tree qza/mice_rooted_tree.qza
```

Дерево нужно для UniFrac и Faith PD.




Альфа-разнообразие

```
qiime diversity core-metrics-phylogenetic \  
  --i-phylogeny qza/mice_rooted_tree.qza \  
  --i-table qza/mice_ASV_table.qza \  
  --p-sampling-depth 2000 \  
  --m-metadata-file $MICE/metadata.tsv \  
  --output-dir mice_core_metrics_results
```


Порог разрежения 2000 - значение из семинара. Выпадают L5 (1973) и W1 (1257), остаётся 27: L = 7, LR = 7, W = 6, WR = 7.

Alpha Diversity Boxplots




У диких мышей индекс Шеннона самый низкий, медиана 4,77, и бокс самый широкий (4,26-5,21). У L промежуточное значение 5,19, самые высокие у LR и WR - 5,82 и 5,75, то есть колонизация germ-free мышей даёт разнообразие выше, чем у обоих доноров. Крускал-Уоллис по всем группам: $H = 17,78$, $p = 0,0005$; попарно L vs LR $H = 9,02$, $q = 0,008$, а LR vs WR неразличимы ($q = 0,65$).

Alpha Diversity Boxplots




Alpha Diversity Boxplots



[Download raw data as TSV](#)

Alpha Diversity Boxplots




Три дополнительные метрики показывают, за счёт чего у W низкий индекс Шеннона: observed features - число ASV, равномерность Пielou - насколько ровно распределены обилия, Faith PD - филогенетическая ширина.

Число ASV у W (медиана 64) от лабораторных мышей не отличается (67 у L, $q = 0,27$), Faith PD тоже сопоставимы (7,22 против 6,65, $q = 0,25$). Значимо ниже только равномерность: 0,816 против 0,865 ($q = 0,013$). Линий у диких мышей столько же, и филогенетически сообщество не уже, обилие перекошено в пользу нескольких доминантов, отсюда и низкий Шеннон. У колонизированных групп картина другая: LR и WR несут больше ASV, чем их доноры (94 против 67 и 94 против 64, $q = 0,004$), а у WR ещё и самый высокий Faith PD - 8,66.

Бета-разнообразие

```
qiime diversity beta-group-significance \  
  --i-distance-matrix ../weighted_unifrac_distance_matrix.qza \  
  --m-metadata-file $MICE/metadata.tsv --m-metadata-column group \  
  --p-method permanova --p-pairwise \  
  --o-visualization qzv/mice_weighted_unifrac_permanova.qzv
```



Pairwise permanova results

[Download CSV](#)

Group 1	Group 2	Sample size	Permutations	pseudo-F	p-value	q-value
L	LR	14	999	6.096405	0.001	0.0015
	W	13	999	26.908902	0.001	0.0015
	WR	14	999	29.989305	0.003	0.0030
LR	W	13	999	27.124229	0.001	0.0015
	WR	14	999	24.709670	0.001	0.0015
W	WR	13	999	12.162013	0.003	0.0030

Overview

	PERMANOVA results
method name	PERMANOVA
test statistic name	pseudo-F
sample size	27
number of groups	4
test statistic	21.675099
p-value	0.001
number of permutations	999


PERMANOVA по weighted UniFrac: pseudo-F = 21,68, p = 0,001 (27 образцов, 4 группы, 999 перестановок). Все попарные сравнения значимы, но величина различий разная: L vs LR всего 6,01 - перенос лабораторной микробиоты в germ-free воспроизводит донора почти точно, на PCoA эти группы лежат одним облаком. W vs WR - 12,16, ровно вдвое больше: дикая микробиота приживается хуже. Любая пара «дикое против лабораторного» - от 24,8 до 29,9.

Первая ось забирает 67,34% и разделяет дикий и лабораторный профили, вторая (12,04%) отделяет WR от остальных. WR оказывается не копией дикого сообщества, а третьим состоянием: набор таксонов дикий, пропорции свои.

Overview

	PERMDISP results
method name	PERMDISP
test statistic name	F-value
sample size	27
number of groups	4
test statistic	8.198082
p-value	0.002
number of permutations	999

PERMDISP по weighted UniFrac: F = 8,20, p = 0,002. Дисперсии по группам неоднородны, так что часть значимости PERMANOVA может идти от разного разброса, а не только от сдвига центроидов. Но на PCoA группы разнесены пространственно, а не отличаются шириной облака.



Overview	
method name	PERMANOVA
test statistic name	pseudo-F
sample size	27
number of groups	4
test statistic	11.241078
p-value	0.001
number of permutations	999

Weighted UniFrac учитывает обилие, unweighted - только присутствие, поэтому сравнение двух метрик показывает природу различий. Unweighted: pseudo-F = 11,24, $p = 0,001$, первая ось 43,26%, вторая 14,52%; PERMDISP F = 9,42, $p = 0,006$.

Overview	
method name	PERMDISP
test statistic name	F-value
sample size	27
number of groups	4
test statistic	9.420417
p-value	0.006
number of permutations	999

По unweighted все пары остаются значимыми, но pseudo-F везде ниже: L vs LR 3,15 против 6,01, W vs WR 5,73 против 12,16, «дикое против лабораторного» 10,5-19,5 против 24,8-29,9. Меньше и доля дисперсии на первой оси: 43,26% против 67,34%. Расстановка групп при этом та же - PC1 отделяет L и LR от W и WR, а WR лежит отдельно от W по второй оси. Значит донор и реципиент различаются и по набору линий, и по их обилиям, но по обилиям заметно сильнее: состав переносится, пропорции - нет.

OTU или ASV

У нас везде ASV: DADA2 не задаёт порога сходства, он строит по данным модель ошибок секвенирования и решает, можно ли объяснить редкую последовательность ошибками прочтения более частой. Если нельзя, то это отдельный реальный вариант.

В статье использованы OTU: парные прочтения объединяли в USEARCH v7.0.1090, кластеризовали алгоритмом UPARSE по порогу сходства 97%, а таксономию определяли картированием OTU с идентичностью 97% на оптимизированную версию SILVA 128, содержащую только область V4.

При этом авторы сами перепроверили данные алгоритмом subOTU (Callahan et al., 2016), который лежит в основе DADA2, и получили, что основные выводы OTU-анализа подтверждаются. Так что наш подход методически ближе к их дополнительному анализу, и принципиальных расхождений не ожидается. Отличаются базы: SILVA 128 против GreenGenes2 2022.10, отсюда разница в названиях таксонов, особенно на уровне рода.