1 Funktionen

1.1 Rect

$$a \cdot rect\left(\frac{t - t_0}{2T}\right) = \begin{cases} a & |t - t_0| < T\\ \frac{a}{2} & |t - t_0| = T\\ 0 & sonst \end{cases}$$

1.2 step

$$b \cdot \epsilon(a \cdot (t - t_0)) = b \cdot \epsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ \frac{b}{2} & t = t_0 \\ b & t > t_0 \end{cases}$$

1.3 tri

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 0 & |t| > 1\\ 1 - t & 0 \le t \le 1\\ 1 + t & -1 \le t \le 0 \end{cases}$$

1.4 dirac Impuls

1.4.1 Normal

$$\delta(a \cdot (t - t_0)) = \frac{1}{|a|} \delta(t - t_0) = \begin{cases} \neq 0 & t = t_0 \\ 0 & t \neq t_0 \end{cases}, \quad \delta(-t) = \delta(t) \quad , \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Sifting bzw. Siebung: $\delta(t-t_0) \cdot f(t) = f(t_0) \cdot \delta(t-t_0)$, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot f(t) dt = \begin{cases} f(t) & t = t_0 \\ 0 & sonst \end{cases}$

1.4.2 Impulssequenz

$$w_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

1.5 si

$$si(t) = \frac{sin(t)}{t}$$
 , $si(0) = 1$,
$$\int_{-\infty}^{\infty} si(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} si^{2}(t)dt = \pi$$

1.6 ramp

$$\rho(t) = \epsilon(t) \cdot t$$

 $1.7 \quad sgn$

$$sgn(x) = \frac{x}{|x|} = 2\epsilon(t) - 1$$
 , $|x(t)| = sgn(x(t)) \cdot x(t)$

2 Symmetrien

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

2.1 Gerade

$$x_e(t) = x_e(-t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

2.2 Ungerade

$$x_o(t) = -x_o(-t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

1

2.3 Komplex

 \boldsymbol{x}_R sei der Realteil, \boldsymbol{x}_I sei der Imaginaerteil.

$$x(t) = x^*(t) \Rightarrow x_R(t) = x_e(t) \text{ und } j \cdot x_I(t) = x_o(t)$$

$$x(t) = -x^*(t) \Rightarrow x_R(t) = x_o(t) \text{ und } j \cdot x_I(t) = x_e(t)$$

3 Leistung und Energie von Signalen

Fuer eine Funktion x(t).

3.1 Energie

Energiesignale haben keine (0) Leistung.

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

3.2 Leistung

Leistungssignale haben unendliche Energie.

$$P_x = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

4 Verschiedenes

4.1 Trigonometrie

$$sin(-t) = -sin(t)$$
 , $cos(-t) = cos(t)$, $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} sin^{2}(t)dt = \frac{1}{2}$