SILVÈRE MARTIN-MICHIELLOT & ANTIGRAVITY

LA VOIE DU NOMBRE

Une Odyssée Constructive, du Premier Caillou au Baccalauréat

58 chapitres d'histoire vivante, de manipulations motrices, de calculs posés et de pure clarté logique

ÉDITION INTÉGRALE DE RÉFÉRENCE — 2026

DIDACTIQUE CONSTRUCTIVISTE • INTUITION GÉOMÉTRIQUE • RIGUEUR FORMELLE

LA VOIE DU NOMBRE

Silvère Martin-Michiellot & Antigravity

LA VOIE DU NOMBRE

Une Odyssée Constructive, du Premier Caillou au Baccalauréat

ÉDITION INTÉGRALE DE RÉFÉRENCE — 2026

Diffusion ouverte sous licence libre CC BY-SA 4.0

LA VOIE DU NOMBRE — Une Odyssée Constructive, du Premier Caillou au Baccalauréat

Édition Numérique Intégrale de Référence — 58 chapitres en 6 volumes avec Guide de l'Accompagnateur et Annexes de Référence.

Auteurs : Silvère Martin-Michiellot & Antigravity
Ingénierie didactique & Conception pédagogique : Didactique constructiviste, méthode de Singapour, sémiotique visuelle d'Oliver Byrne
Composition typographique : Typst v0.15, polices Liberation Serif & Sans, KaTeX mathématique
Sémiotique graphique : Figures vectorielles SVG conformes à la palette historique d'Oliver Byrne (1847)
Illustration de couverture : Synthèse graphique haute résolution dédiée
Photographies de frontispice (Mathématiques dans la Nature) : Wikimedia Commons sous licences CC BY-SA 3.0 et CC BY-SA 4.0 (voir Index des sources photographiques en Annexe C)
Dépôt légal : Octobre 2026

Licence Libre : Cet ouvrage est mis à disposition sous licence **Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**.
Vous êtes libre de partager, copier, distribuer et adapter cet ouvrage sous réserve de citer expressément les auteurs d'origine et de diffuser vos modifications sous une licence identique.
La diffusion de cet ouvrage à des fins pédagogiques, d'instruction en famille (IEF) ou d'enseignement scolaire est encouragée et autorisée sous réserve du maintien des crédits didactiques d'origine.

> *« La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux — je veux dire l'Univers —, mais on ne peut le comprendre si l'on n'apprend pas d'abord à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique. »*
>
> **— Galileo Galilei, L'Essayeur (1623)**

À tous les enfants et à tous les jeunes esprits qui ont un jour cru ne « pas être faits pour les maths », et aux parents et éducateurs qui les guident avec bienveillance, clarté et exigence.

Sommaire Détaillé de l’Œuvre

VOLUME I — L'ÂGE DE LA MAIN ET DE LA SAVANE 11
CHAPITRE 1 : Les Yeux du Singe et le Sac de Cailloux 13
CHAPITRE 2 : La Main à Cinq Doigts et les Paquets de Dix 25
CHAPITRE 3 : La Chasse Partagée et la Balance de Justice 35
CHAPITRE 4 : Le Boulier du Marchand et la Retenue Voyageuse 45
CHAPITRE 5 : Le Mur de Briques et les Rectangles Magiques 55
CHAPITRE 6 : La Coudée du Pharaon et le Sablier 67
CHAPITRE 7 : Les Formes du Monde et la Ficelle du Jardinier 77
VOLUME II — LE SECRET DU PARTAGE ET LES GRANDEURS DU MONDE 87
CHAPITRE 8 : Les Pierres Rebelles et les Nombres Solitaires 89
CHAPITRE 9 : Le Reste du Festin et les Équipes de Jeu 97
CHAPITRE 10 : La Galette Brisée et le Tamis de Mesure 107
CHAPITRE 11 : Les Dixièmes de Simon Stevin 117
CHAPITRE 12 : Le Mètre de la Révolution 125
CHAPITRE 13 : La Recette de la Grand-Mère et la Règle de Trois 133
CHAPITRE 14 : L’Ardoise du Marchand et le Trou de Sable 141
VOLUME III — L'ÉTOILE D'ALEXANDRIE ET L'ESPACE EUCLIDIEN 151
CHAPITRE 15 : La Crue du Nil et la Corde à Treize Nœuds 153
CHAPITRE 16 : La Roue du Potier et le Secret d’Archimède 165
CHAPITRE 17 : L’Ombre de la Pyramide et le Bâton Planté 175
CHAPITRE 18 : Le Grain de Riz sur l’Échiquier 185
CHAPITRE 19 : Le Secret Interdit des Pythagoriciens 195
CHAPITRE 20 : L’Île au Trésor et les Deux Sentiers 207
CHAPITRE 21 : Le Percepteur et les Cent Morceaux 217
VOLUME IV — L'ALCHIMIE DES SYMBOLES ET LE FEU ALGÉBRIQUE 227
CHAPITRE 22 : Le Sac Mystère sur la Balance d’Al-Khwarizmi 229
CHAPITRE 23 : Le Carré Complété et les Identités Remarquables 235
CHAPITRE 24 : Les Deux Marchands et les Inégalités 249
CHAPITRE 25 : La Machine à Doubler et la Droite du Tarif 263
CHAPITRE 26 : Le Pliage de Papier et le Miroir Magique 275
CHAPITRE 27 : Le Découpage des Terres et la Boîte du Potier 287
CHAPITRE 28 : Ératosthène et le Tour de la Terre 293
CHAPITRE 29 : Le Partage d’Euclide 305
CHAPITRE 30 : La Roulette du Destin et la Survie du Chasseur 317
VOLUME V — LE MOUVEMENT, L'ANGLE ET LE SPECTRE DE LA FORME 331
CHAPITRE 31 : Le Tribunal de la Logique 333
CHAPITRE 32 : Le Voilier dans la Tempête et la Flèche Libre 341
CHAPITRE 33 : La Ligne de Mire 355
CHAPITRE 34 : Le Métier Jacquard et la Boîte à Fabriquer 367
CHAPITRE 35 : La Fontaine de Galilée et la Parabole 379
CHAPITRE 36 : Les Marches de l’Escalier et le Prêt de l’Usurier 393
CHAPITRE 37 : La Grande Roue et le Cercle qui s’Enroule 405
CHAPITRE 38 : Tirer la Corde et l’Ombre Efficace 413

CHAPITRE 39 : Le Skieur et la Planche sous la Semelle 425
CHAPITRE 40 : La Colonie de Bactéries 439
CHAPITRE 41 : Le Sondeur et l’Écart-Type 451
CHAPITRE 42 : Le Médecin, le Test et l’Arbre des Possibles 465
VOLUME VI — L'INFINI APPRIVOISÉ ET L'ÉDIFICE MODERNE 479
CHAPITRE 43 : L’Escalier sans Fin et les Dominos 481
CHAPITRE 44 : Le Coureur qui ne Touche jamais la Ligne 489
CHAPITRE 45 : L’Horizon des Courbes 505
CHAPITRE 46 : Le Fil sans Coupure 519
CHAPITRE 47 : Le Jardin qui Grandit et la Chaîne d’Engrenages 535
CHAPITRE 48 : Le Logarithme de Napier et les Tables des Navigateurs 549
CHAPITRE 49 : La Balançoire et les Fonctions qui Ondulent 571
CHAPITRE 50 : Le Tonneau Rempli de Tranches d’Eau 589
CHAPITRE 51 : La Tasse de Thé qui Refroidit 607
CHAPITRE 52 : La Cathédrale dans l’Espace 619
CHAPITRE 53 : Le Cadenas à Code et les Façons de Choisir 633
CHAPITRE 54 : Les Mille Lancers de la Pièce 647
CHAPITRE 55 : Le Tourbillon à Angle Droit 663
CHAPITRE 56 : Les Messages Secrets et l’Horloge des Restes 679
CHAPITRE 57 : Le Métier Jacquard Revisité : Matrices et Graphes 693
CHAPITRE 58 : La Fin du Voyage 709
CONCLUSION GÉNÉRALE & ÉPILOGUE : L’ÉDIFICE DU NOMBRE ET LA LIBERTÉ DE L’ESPRIT 719
Les Trois Enseignements Fondamentaux 719
L’Envoi au Lecteur 720
ANNEXE A : FORMULAIRE & VALEURS REMARQUABLES DE RÉFÉRENCE 721
I. Table Exacte des Lignes Trigonométriques Remarquables 721
II. Formules Trigonométriques d’Addition et de Duplication 721
III. Table Universelle des Dérivées Usuelles & Opérations 721
ANNEXE B : TABLE UNIVERSELLE DES NOTATIONS & SYMBOLES 723
ANNEXE C : INDEX DES SOURCES PHOTOGRAPHIQUES ET PATRIMONIALES 725
I. Grandes Planches de Frontispice (Les Mathématiques dans la Nature) 725
II. Documents Historiques & Archéologiques dans le Corps du Texte 725
INDEX THÉMATIQUE DÉTAILLÉ 727
BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE & DIDACTIQUE ANNOTÉE 729

VOLUME I — L'ÂGE DE LA MAIN ET DE LA SAVANE

6 - 8 ans / CP - CE1

De l'éveil du regard préhistorique aux premières manipulations de cailloux, ce premier volume pose les fondations concrètes du sens du nombre, de la numération décimale et des opérations élémentaires.

Chapitres du Volume I :

Chapitre 1 : Les Yeux du Singe et le Sac de Cailloux
Chapitre 2 : La Main à Cinq Doigts et les Paquets de Dix
Chapitre 3 : La Chasse Partagée et la Balance de Justice
Chapitre 4 : Le Boulier du Marchand et la Retenue Voyageuse
Chapitre 5 : Le Mur de Briques et les Rectangles Magiques
Chapitre 6 : La Coudée du Pharaon et le Sablier
Chapitre 7 : Les Formes du Monde et la Ficelle du Jardinier

En regard : Le pavage hexagonal des alvéoles d'abeilles (Apis mellifera).

CHAPITRE 1 : Les Yeux du Singe et le Sac de Cailloux

> « Avant d'apprendre à compter avec des mots et des chiffres, les humains ont commencé par regarder le monde avec leurs yeux et toucher la terre avec leurs doigts. Un caillou pour une bête, une entaille pour un jour : c'est ainsi qu'est née la plus belle aventure de l'esprit humain. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi tes yeux reconnaissent 1, 2 ou 3 objets en un éclair sans compter, mais s'embrouillent dès qu'il y en a 5 ou plus (le secret du *subitizing*).
- L'incroyable mémoire visuelle du chimpanzé Ayumu.
- Comment un berger de la Préhistoire protégeait ses bêtes sans connaître aucun mot de nombre, grâce au **caillou-témoin** (la correspondance un-pour-un).
- Ce que signifient vraiment les mots magiques : **autant que**, **plus que**, **moins que**.
- Comment tracer proprement et reconnaître les dix chiffres de **0** à **9**.

---

1. Le problème : le troupeau au coucher du soleil

Ferme les yeux. Fais un voyage dans le temps de vingt mille ans en arrière. Il n'y a ni école, ni livre, ni montre, ni téléphone portable. Le monde est une immense savane d'herbes dorées, de forêts profondes et de collines rocheuses.

Tu as sept ans, et dans ta tribu, tu as une mission capitale : chaque matin, tu dois faire sortir le troupeau de brebis de la caverne pour l'emmener brouter sur l'herbe fraîche de la colline.

Mais il y a un problème qui te fait battre le cœur très vite : **dans la langue de ta tribu, les mots pour compter n'existent pas encore.** Personne ne sait ce que veulent dire « douze », « vingt » ou « cinquante ». Tu ne connais pas le nombre de tes bêtes.

Le soir arrive. Le ciel rougit, puis devient bleu sombre. Au loin, dans la forêt, les premiers loups commencent à hurler. Tu fais rentrer les brebis au galop dans la grotte, et tu refermes la lourde barrière d'épines.

Tu restes planté devant la barrière, inquiet : *« Sont-elles toutes rentrées ? Ou bien une brebis est-elle restée coincée dans les ronces là-haut, toute seule dans le noir ? »*

Si tu ne sais pas compter, comment peux-tu en être absolument certain ?

---

2. Le coup d'œil magique : le subitizing

Avant de résoudre le mystère du berger, faisons une expérience avec tes propres yeux.

Demande à la personne qui t'accompagne de poser sur la table deux boutons, ou deux noisettes. Ferme les yeux. Ouvre-les un quart de seconde — juste un battement de paupière — et referme-les aussitôt.

Combien d'objets as-tu vus ? Tu réponds sans hésiter une seconde : **« Deux ! »**

Recommence avec trois boutons. Tu clignes des yeux : tu réponds **« Trois ! »** tout de suite. Tu n'as pas eu besoin de pointer ton doigt en disant : *« un… et puis encore un… »*. Ton cerveau a « photographié » le trois en un seul bloc.

Maintenant, demande qu'on jette sur la table **huit boutons** en vrac, éparpillés n'importe comment. Ferme les yeux. Ouvre-les un éclair. Referme-les.

Combien y en avait-il ? Cette fois, c'est impossible à dire ! Tu hésites : *« Peut-être six ? Ou neuf ? »* Pour être sûr, tu es obligé de poser ton doigt sur chaque bouton et de compter lentement : *« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 »*.



Fig. 1. – Le phénomène du subitizing : perception immédiate vs saturation cognitive

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Le Subitizing** Le **subitizing** (un mot qui vient du latin *subitus*, qui veut dire « soudain, immédiat »), c'est la capacité de notre cerveau à voir **d'un seul coup d'œil**, sans compter un par un, le nombre exact d'objets d'une petite collection. Chez les humains, ce coup d'œil magique fonctionne parfaitement jusqu'à **3** ou **4** objets. À partir de **5**, notre œil commence à s'embrouiller si les objets sont disposés en désordre.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — Les dés à jouer et les dominos** Pourquoi les dés à jouer ont-ils toujours la même disposition de points ? Regarde la face du 5 sur un dé : quatre points aux coins et un point au milieu. Grâce à ce dessin en croix, ton œil voit immédiatement deux points en haut, deux en bas et un au centre : $2 + 2 + 1 = 5$! Les humains ont inventé ces motifs pour aider leurs yeux à reconnaître les nombres plus grands que 3 sans perdre de temps à compter.



Fig. 2. – Les six faces du dé : reconnaissance spatiale instantanée

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Le regard fulgurant du chimpanzé Ayumu**

À l'université de Kyoto, au Japon, un chercheur nommé Tetsuro Matsuzawa a étudié un jeune chimpanzé appelé **Ayumu**. Sur un écran d'ordinateur tactile, les chiffres de 1 à 9 s'affichent éparpillés, puis disparaissent sous des carrés blancs en moins de deux dixièmes de seconde ! Un être humain adulte est incapable de se rappeler où étaient les chiffres. Mais Ayumu, lui, tape sur les carrés blancs dans l'ordre exact : 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, presque sans jamais se tromper ! Pourquoi un singe a-t-il ce super-pouvoir ? Parce que dans la forêt, repérer en une fraction de seconde le nombre de fruits mûrs sur une branche ou le nombre de prédateurs cachés dans les feuilles est une question de survie.

Mais alors, si nous, les humains, n'avons pas ce super-pouvoir pour les grands nombres, comment avons-nous fait pour survivre et bâtir des villes ? Nous avons inventé une ruse bien plus puissante que les yeux : **la manipulation d'objets**.

3. La correspondance un-pour-un : le sac de cailloux

Revenons à notre berger de la Préhistoire. Le soleil se lève, et les brebis trépignent derrière la clôture. Voici l'astuce de génie qu'il invente :

1. Il ramasse un sac en cuir vide et le suspend à sa ceinture.
2. Il ouvre la barrière juste assez pour laisser passer les brebis **une par une**.
3. La première brebis sort ? Le berger ramasse un petit caillou et le met dans son sac : *Ploc !*
4. La deuxième brebis sort ? Un autre caillou dans le sac : *Ploc !*
5. Chaque fois qu'une bête franchit la porte, **un caillou et un seul** entre dans le sac.

Quand la dernière brebis s'élance sur la colline, le berger referme son sac. Il ne sait toujours pas le nombre de ses brebis. Pourtant, il sait une chose immense : **il y a dans son sac exactement autant de cailloux que de bêtes vivantes sur la colline !** Chaque caillou est le jumeau secret d'un mouton.



Fig. 3. – Correspondance un-pour-un : le caillou-témoin du berger

Le soir venu, les brebis reviennent. Le berger se place à l'entrée de la grotte :

- À chaque bête qui entre, il plonge la main dans son sac, sort un caillou et le pose par terre : *Clac !*

Regarde ce qui peut se passer :

- **Le sac est vide à la fin ?** Soulagement ! Il y avait exactement **autant** de brebis que de cailloux. Tout le monde est à l'abri.
- **Il reste un caillou dans le sac ?** Alerte ! Ce caillou n'a pas retrouvé sa brebis. Il y a **moins** de brebis rentrées que de cailloux : une brebis est restée dehors ! Le berger allume une torche et part la chercher.
- **Une brebis se présente et le sac est déjà vide ?** Surprise joyeuse : une brebis a donné naissance à un agneau pendant la journée ! Il y a **plus** de brebis que de cailloux.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — La Correspondance un-pour-un** Faire une **correspondance un-pour-un** (on dit aussi terme à terme), c'est associer chaque objet d'un groupe à un objet et un seul d'un autre groupe, sans en oublier aucun et sans en répéter aucun. C'est le principe fondateur de tout le calcul mathématique.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — D'où vient le mot « calcul » ?** En langue latine, un petit caillou poli ramassé au bord du ruisseau s'appelait **calculus**. C'est de ce caillou glissé dans la poche du berger préhistorique que vient notre mot moderne : **calculer** !

4. Autant que, plus que, moins que

Avant d'utiliser les chiffres, les mathématiciens utilisent trois expressions fondamentales pour comparer deux collections d'objets :

- **Autant que** : chaque rond a trouvé son carré, et il ne reste rien de côté. Les deux groupes ont la même quantité.
- **Plus que** : le groupe des carrés a des éléments en trop. Il y a **plus de carrés que de ronds**.
- **Moins que** : le groupe des ronds s'est épuisé le premier. Il y a **moins de ronds que de carrés**.

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — L'illusion de la place occupée

Regarde ces deux lignes de boutons :

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu — Comparaison Visuelle en Lignes Parallèles

- Ligne 1 :
- Ligne 2 :

> *La première ligne a l'air plus longue parce que les ronds sont très écartés ! Mais si tu relies chaque rond à un carré avec ton doigt, tu découvres qu'il y a 4 ronds et 6 carrés : il y a donc **plus** de carrés que de ronds, même si les ronds prennent plus de place sur la table. **En mathématiques, ce n'est pas la place qui compte, c'est la quantité !***

---

5. Du caillou au trait gravé : l'os d'Ishango

Le sac de cailloux a un défaut : si ton troupeau compte 80 brebis, ton sac devient lourd comme une pierre et déchire ta poche.

Nos ancêtres ont alors inventé un support plus léger : **le bâton d'encoches**. Chaque fois qu'une bête passe, on donne un petit coup de pierre tranchante sur un os poli ou un morceau de bois plat : *Cric !*

L'Os d'Ishango (~20 000 av. J.-C.) : entailles groupées par paquets de 5

Fig. 4. – L'os d'Ishango : les premières encoches de dénombrement par paquets

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Le bâton d'Ishango** Au bord du lac Édouard, entre la République Démocratique du Congo et l'Ouganda en Afrique, des archéologues ont découvert un os fossilisé vieux de plus de **20 000 ans** : le **bâton d'Ishango**. Il porte des encoches soigneusement regroupées en séries régulières. Si certains chercheurs y ont vu un système de dénombrement par paquets de 5 ou de 10, d'autres ethnomathématiciens et préhistoriens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un calendrier lunaire, d'un jeu arithmétique ou d'une notation rythmique. C'est l'un des plus anciens témoignages de l'esprit mathématique humain et de l'inscription des quantités dans la matière.



Fig. 5. – L'os fossilisé d'Ishango (~20 000 ans av. J.-C., Congo) : les premières encoches de dénombrement et groupements de nombres de l'humanité

6. Écrire le monde : les dix chiffres de 0 à 9

Faire des traits sur un os prend encore beaucoup de place. Pour aller plus vite, les humains ont fini par inventer des **symboles**, des petits dessins rapides à tracer. Il n'en faut que dix pour écrire tous les nombres de l'univers :

$$\mathbf{0},\quad \mathbf{1},\quad \mathbf{2},\quad \mathbf{3},\quad \mathbf{4},\quad \mathbf{5},\quad \mathbf{6},\quad \mathbf{7},\quad \mathbf{8},\quad \mathbf{9}$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Chiffre et Nombre**

- Un **chiffre** est un signe d'écriture, comme une lettre de l'alphabet. Il n'y en a que 10 : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Un **nombre** exprime une quantité ou une mesure, comme un mot formé avec des lettres. *Par exemple : avec les chiffres 2 et 5, on écrit le nombre 25.*

Comment bien tracer les chiffres avec ta main

Voici le secret pour bien les former sans trembler, en partant toujours du bon endroit :

- **0 (Zéro)** : pars du haut, tourne vers la gauche en descendant comme pour faire un grand rond, touche la ligne du bas et remonte refermer tout en haut.
- **1 (Un)** : commence par une petite pente qui monte vers la droite, puis descends tout droit comme un piquet vertical.
- **2 (Deux)** : pars en haut, fais un pont arrondi vers la droite, descends en biais vers le bas à gauche, puis trace un trait couché bien droit vers la droite.
- **3 (Trois)** : dessine un petit ventre en haut vers la droite, reviens au milieu sans lever le crayon, et fais un deuxième petit ventre en bas.
- **4 (Quatre)** : descends droit, tourne à angle droit vers la droite, lève le crayon, puis coupe ce trait avec une ligne droite verticale.
- **5 (Cinq)** : pars du haut, descends un petit trait droit vertical, fais un grand ventre bien rond vers la droite, puis coiffe-le d'un petit chapeau plat horizontal en haut.
- **6 (Six)** : pars du haut, descends en courbe vers la gauche comme pour un grand toboggan, et en bas, roule une boucle bien fermée.
- **7 (Sept)** : trace un toit plat horizontal de gauche à droite, descends en grand toboggan penché vers le bas à gauche, puis ajoute une petite ceinture au milieu.
- **8 (Huit)** : ne fais pas deux ronds posés l'un sur l'autre ! Dessine un serpentin qui serpente en « S », puis remonte croiser au milieu pour refermer la boucle en haut.
- **9 (Neuf)** : commence par tracer un rond complet en haut (comme un ballon), puis descends son fil tout droit vers le bas avec une petite canne courbée vers la gauche.

---

7. Cinq exemples résolus et ateliers de manipulation

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Le goûter des écureuils *Énoncé :* Trois petits écureuils ramassent des noisettes. Noisette l'écureuil en a trouvé 3, Panache en a trouvé 5, et Châtaigne en a trouvé 3. Qui en a autant que qui ? *Résolution pas à pas :* 1. Comparons Noisette (3 noisettes) et Châtaigne (3 noisettes). Faisons la correspondance terme à terme :

- 1re noisette de Noisette ↔ 1re noisette de Châtaigne
- 2e noisette ↔ 2e noisette
- 3e noisette ↔ 3e noisette

2. Toutes les noisettes sont associées, il n'en reste aucune de côté : **Noisette a autant de noisettes que Châtaigne**.
3. Panache en a 5 : il a deux noisettes de plus que Noisette et que Châtaigne. Panache en a **plus que** les autres.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Mettre la table sans compter *Atelier pratique :* Tu dois mettre la table pour 4 personnes. Tu as une boîte de fourchettes. *Méthode du berger :* Tu ne comptes pas les fourchettes dans la boîte. Tu passes devant chaque assiette posée sur la table :

- Devant l'assiette de maman : tu poses **une** fourchette.
- Devant l'assiette de papa : **une** fourchette.
- Devant l'assiette de ta sœur : **une** fourchette.
- Devant ton assiette : **une** fourchette. *Conclusion :* Chaque assiette a reçu une fourchette et une seule. Il y a **autant** de fourchettes sur la table que d'assiettes, sans avoir eu besoin de compter !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Comparer deux collections étalées

Énoncé : Sur une feuille, il y a 5 étoiles rouges très serrées les unes contre les autres, et 4 grands cœurs bleus très espacés. Y a-t-il plus d'étoiles ou plus de cœurs ? *Méthode :* Relions chaque cœur à une étoile avec un trait de crayon :

- Cœur 1 → Étoile 1
- Cœur 2 → Étoile 2
- Cœur 3 → Étoile 3
- Cœur 4 → Étoile 4 Il reste **une étoile rouge** qui n'a pas de cœur associé. *Conclusion :* Il y a **plus d'étoiles rouges que de cœurs bleus**, bien que les cœurs occupent plus de largeur sur la feuille.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — L'atelier du cintre et des pinces à linge

Atelier pratique : Prends un cintre en plastique. Accroche 3 pinces à linge rouges à gauche et 3 pinces bleues à droite. *Observation :* Si tu tiens le cintre par son crochet au bout de ton index, le cintre reste parfaitement horizontal ! Les deux côtés s'équilibrent car il y a **autant** de pinces à gauche qu'à droite. Si tu ajoutes une pince rouge à gauche, le côté gauche penche vers le bas : il y a **plus de pinces à gauche que de pinces à droite**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Détecter l'intrus avec le zéro

Énoncé : Dans un nid, il y a 3 oisillons. Dans un deuxième nid, il y a 1 oisillon. Dans un troisième nid abandonné, il n'y a aucun oisillon. Quel chiffre écris-tu pour chaque nid ? *Résolution :*

- Premier nid : le chiffre **3**.
- Deuxième nid : le chiffre **1**.
- Troisième nid : le nid est vide. Pour écrire l'absence d'oiseau, la quantité nulle, nous écrivons le chiffre **0**. *Conclusion :* Le zéro sert à dire qu'il n'y a **rien**, la boîte est vide !

Ce qu'il faut retenir

1. **Le subitizing** permet à nos yeux de reconnaître immédiatement des quantités de 1, 2 ou 3 objets sans compter.
2. Pour les quantités plus grandes, nous utilisons la **correspondance un-pour-un** : associer chaque objet d'un groupe à un objet d'un autre groupe (comme un caillou par mouton).
3. **Autant que** signifie que les deux groupes ont exactement la même quantité.
4. **Plus que** signifie qu'il reste des objets non associés dans le premier groupe ; **moins que** signifie qu'il en manque.

5. On n'a pas besoin de compter pour comparer : la comparaison directe évite les pièges de la taille et de l'espace occupé.
6. Il existe **10 chiffres** : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils permettent d'écrire tous les nombres. Le chiffre **0** représente la quantité vide.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 1.1 Coup d'œil flash ! Regarde les trois dessins ci-dessous pendant un seul battement de cil. Donne la quantité de ronds de chaque boîte sans pointer ton doigt :

- Boîte A :
- Boîte B :
- Boîte C :

Exercice 1.2 Les chevaux et les selles. Dans un pré, il y a 4 chevaux. Dans l'écurie, il y a 4 selles. Y a-t-il assez de selles pour que chaque cheval en reçoive une ? Utilise l'expression exacte.

Exercice 1.3 Les lapins et les carottes. Sur la table, tu as 3 lapins en peluche et 5 carottes en plastique. Relie chaque lapin à une carotte. Reste-t-il des carottes ? Y a-t-il plus de lapins ou plus de carottes ?

Exercice 1.4 Tracer les chiffres. Prends une feuille blanche et trace cinq fois de suite, bien proprement entre deux lignes : le chiffre **2**, le chiffre **4** et le chiffre **7**.

Exercice 1.5 Le nid vide. Sur une branche, il y a 3 nids. Le premier contient 2 œufs, le deuxième contient 4 œufs, le troisième ne contient rien du tout. Écris sur ton cahier la liste des trois chiffres qui correspondent aux œufs de ces nids.

Niveau (Je réfléchis et je compare)

Exercice 1.6 Le jeu du loup et du berger. Un berger a 6 cailloux dans sa bourse au départ du matin. Le soir, 5 brebis sont rentrées dans l'enclos, et le berger a retiré un caillou pour chacune d'elles. 1. Combien de cailloux reste-t-il dans la bourse ? 2. Toutes les brebis sont-elles à l'abri ? Que doit faire le berger ?

Exercice 1.7 Le piège des grands pas. Lola pose 4 gros coussins très espacés dans le salon. Tom pose 5 petites gommes serrées sur son bureau. Lola dit : *« C'est moi qui ai le plus d'objets, car ma ligne va d'un bout à l'autre du salon ! »* A-t-elle raison ? Explique pourquoi avec la correspondance un-pour-un.

Exercice 1.8 Les oiseaux sur le fil. Sur un fil électrique, 5 moineaux sont posés. 3 moineaux s'envolent d'un coup. Y a-t-il maintenant plus d'oiseaux sur le fil ou plus d'oiseaux dans le ciel ?

Exercice 1.9 Les bougies du gâteau. Pour son anniversaire, Léo a planté 6 bougies sur son gâteau. Sa petite sœur Maya a 4 bougies sur le sien. 1. Qui est le plus âgé ? 2. Combien de bougies Léo a-t-il de plus que Maya ?

Exercice 1.10 Chiffre ou nombre ? Dans les phrases suivantes, dis si l'élément en gras est utilisé comme un **chiffre** (un symbole d'écriture) ou un **nombre** (une quantité) :

1. « Pour écrire le nombre 38, j'utilise le **3** et le **8**. »
2. « Dans ce panier, il y a **38** pommes. »
3. « Mon numéro de dossard pour la course est le **7**. »

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 1.11 Le festin des écureuils gourmands. Quatre écureuils (Grisou, Roux, Noisette et Câlin) ont chacun ramassé des glands :

- Grisou a ramassé autant de glands que Roux.
- Noisette a ramassé plus de glands que Grisou.
- Câlin a ramassé moins de glands que Roux.

Range les quatre écureuils du plus gourmand (celui qui a le plus de glands) au moins gourmand.

Exercice 1.12 Le troupeau mystère. Un berger sort son troupeau le matin avec son sac de cailloux. Pendant la journée dans la prairie, deux brebis donnent naissance chacune à un petit agneau tout neuf. Le soir, toutes les bêtes (brebis et agneaux) rentrent dans l'enclos, et le berger retire un caillou de sa bourse pour chaque bête qui passe la porte. Que va-t-il se passer à la fin pour le berger ?

Exercice 1.13 Les dominos menteurs. Observe ces trois dominos :

- Domino 1 : ●● | ●●● (2 points à gauche, 3 points à droite)
- Domino 2 : ●●●● | ● (4 points à gauche, 1 point à droite)
- Domino 3 : ●●● | ●●● (3 points à gauche, 3 points à droite)

Deux de ces dominos portent au total exactement le même nombre de points. Lesquels ?

Exercice 1.14 Le code secret de la caverne. Pour ouvrir la porte secrète de la grotte, il faut taper un code formé de trois chiffres différents :

- Le premier chiffre est le nombre d'yeux que tu as sur ton visage.
- Le deuxième chiffre est le nombre de pattes d'un chien.
- Le troisième chiffre est le chiffre qui indique qu'il n'y a rien du tout.

Quel est le code secret à trois chiffres ?

Exercice 1.15 Le défi d'Ayumu à la maison. Prends 5 cartes à jouer numérotées de 1 à 5. Mélange-les et pose-les face cachée sur la table devant toi. Demande à ton accompagnateur d'en retourner 3 au hasard pendant 2 secondes, puis de les recouvrir. Peux-tu nommer de mémoire les cartes révélées ? Recommence en essayant de battre ton record de vitesse !

Solutions

Solution 1.1 - Boîte A : **2**. - Boîte B : **1**. - Boîte C : **3**.

Ton œil a reconnu ces quantités par subitizing sans avoir besoin de les compter une à une.

Solution 1.2 Chaque cheval reçoit une selle et il ne reste aucune selle. Il y a **autant** de selles que de chevaux.

Solution 1.3 Si on relie chaque lapin à une carotte, 3 lapins prennent 3 carottes. Il reste 2 carottes toutes seules. Il y a **plus de carottes que de lapins** (ou moins de lapins que de carottes).

Solution 1.4 Vérifie avec ton accompagnateur que ton crayon est bien parti du haut pour le 2 et le 7, et que les traits du 4 se coupent bien droit à angle droit.

Solution 1.5 Les chiffres à écrire sont : **2**, **4**, et **0** pour le nid vide.

Solution 1.6 1. Il y avait 6 cailloux. On en a retiré 5 pour les 5 brebis rentrées. Il reste donc **1 caillou** au fond de la bourse ($6 - 5 = 1$). 2. Non, toutes les brebis ne sont pas à l'abri : il manque une brebis dehors. Le berger doit prendre sa torche et partir la chercher dans la nuit.

Solution 1.7 Lola a tort ! Même si les coussins prennent plus de place sur le sol, il n'y a que 4 coussins, alors qu'il y a 5 gommes chez Tom. Si on associe chaque coussin à une gomme, il reste une gomme sans coussin. Il y a donc **plus de gommes que de coussins**. L'espace occupé ne change pas la quantité d'objets.

Solution 1.8 Il y avait 5 moineaux. 3 s'envolent dans le ciel. Il en reste 2 sur le fil. Comme 3 est plus grand que 2, il y a **plus d'oiseaux dans le ciel que sur le fil**.

Solution 1.9 1. Léo a 6 bougies et Maya en a 4. C'est **Léo** le plus âgé car il a plus de bougies. 2. Si on associe 4 bougies de Léo aux 4 bougies de Maya, il reste 2 bougies à Léo. Léo a **2 bougies de plus** que sa sœur ($6 - 4 = 2$).

Solution 1.10 1. Des **chiffres** (les briques de base servant à écrire les nombres). 2. Un **nombre** (une quantité réelle d'objets dénombrés). 3. Un **chiffre** utilisé comme identifiant (sur un dossard ou un maillot, le 7 sert d'étiquette nominale pour désigner un coureur, non pour mesurer une quantité).

Solution 1.11 Analysons les informations une par une :

- Grisou et Roux sont à égalité : ils ont la même quantité.
- Noisette en a plus que Grisou, donc Noisette est devant Grisou et Roux.

- Câlin en a moins que Roux, donc Câlin est derrière Roux et Grisou.

Du plus gourmand au moins gourmand, l'ordre est donc : **Noisette**, puis **Grisou et Roux (ex æquo)**, puis **Câlin**.

Solution 1.12 Le berger avait un caillou par brebis au départ. Mais deux agneaux sont nés ! Le soir, il y a donc 2 bêtes de plus que de cailloux dans la bourse. Quand toutes les bêtes seront rentrées, la bourse sera vide alors qu'il restera encore **2 agneaux** devant la porte. Le berger va comprendre avec joie que son troupeau s'est agrandi de deux bêtes !

Solution 1.13 Comptons les points :

- Domino 1 : $2 + 3 = 5$ points.
- Domino 2 : $4 + 1 = 5$ points.
- Domino 3 : $3 + 3 = 6$ points.

Ce sont les **dominos 1 et 2** qui portent exactement le même nombre total de points (5 points chacun).

Solution 1.14 - Nombre d'yeux sur ton visage : 2. - Nombre de pattes d'un chien : 4. - Quantité nulle (rien du tout) : 0.

Le code secret de la caverne est donc : **2 - 4 - 0**.

Solution 1.15 Bravo pour ton entraînement ! Plus tu t'exerces à photographier rapidement des petites quantités sans compter avec les doigts, plus ton cerveau développe sa mémoire visuelle immédiate, exactement comme le jeune singe Ayumu.

La question qui ouvre la suite…

Te voilà désormais capable de surveiller n'importe quelle collection d'objets grâce au sac de cailloux et aux encoches sur l'os.

Mais imagine que ton village s'agrandisse. Tu n'as plus six brebis, tu en as **trois cents** ! Et le meunier a récolté des milliers de grains de blé dans ses sacs.

Si tu devais mettre trois cents cailloux dans ton sac, il pèserait tellement lourd que tu ne pourrais plus marcher ! Et si tu devais graver trois mille encoches sur un os, il se briserait en deux.

Comment les humains ont-ils réussi à compter de très grands nombres sans s'épuiser sous des tonnes de pierres ? La réponse est merveilleuse : ils ont regardé tout simplement **au bout de leurs bras** !

Rendez-vous au **Chapitre 2 : La Main à Cinq Doigts et les Paquets de Dix** !

CHAPITRE 2 : La Main à Cinq Doigts et les Paquets de Dix

> « Si nous avions eu six doigts à chaque main comme certains animaux de contes de fées, le monde entier compterait d'une autre façon. Les mathématiques des humains sont nées au bout de leurs dix doigts. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi presque toute la planète compte par paquets de **10** (le système décimal).
- Les peuples qui comptaient aussi avec leurs orteils par paquets de **20** (et pourquoi on dit « quatre-vingts »).
- Le troc magique : échanger 10 petits cailloux contre 1 bouchon ou 1 coquillage (la **dizaine**).
- Comment fabriquer des **centaines** et des **milliers** avec la boîte de 10 œufs.
- Le secret de la **valeur de position** : pourquoi le 1 de 14 ne vaut pas du tout la même chose que le 1 de 41 !
- Le rôle indispensable du chiffre **zéro** pour garder la place vide (la différence entre 45 et 405).
- Se promener sur la droite graduée de 0 à 100, et comparer avec les signes $<$ et $>$.

---

1. Le problème : le sac qui pèse une tonne

Le troupeau de brebis a prospéré au cours des saisons. Des agneaux sont nés au printemps, et d'autres bergers ont rejoint ton campement. Ce matin, tu n'as plus seulement sept ou huit moutons à faire sortir.

Tu en as **quarante-cinq** !

Tu ouvres la barrière et tu commences à faire la correspondance un-pour-un dans ton sac de cuir : *Ploc, ploc, ploc…* Au quarantième mouton, ton sac est lourd comme un pavé. Il cogne contre ton genou, tire sur ta ceinture et menace de se déchirer en deux !

Tu essaies alors de remplacer les cailloux par des traits gravés au couteau sur un bâton de bois, comme les anciens chasseurs :



Fig. 6. – Le bâton d'entailles : saturation cognitive des 45 traits continus

Regarde cette longue rangée de bâtons. Es-tu capable de voir d'un coup d'œil s'il y a 44, 45 ou 46 traits ? C'est impossible ! Tes yeux piquent, les barres dansent, et si une mouche te dérange pendant que tu pointes ton doigt, tu es obligé de tout recommencer depuis le premier trait.

Pour compter de grandes quantités sans porter une montagne de pierres et sans t'abîmer les yeux, il faut inventer une nouvelle astuce. Et cette astuce, tu la portes sur toi depuis le premier jour de ta vie.

---

2. Le secret au bout de tes bras : la dizaine

Lève tes deux mains ouvertes devant toi. Regarde tes doigts :

- Sur ta main gauche : 5 doigts (pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire).

- Sur ta main droite : 5 doigts.
- Ensemble : $5 + 5 = 10$ doigts !



Fig. 7. – Les deux mains ouvertes : 5 + 5 = 10, fondement de la base décimale

Un matin, devant le troupeau qui défile, un jeune berger a une illumination. Au bord du sentier, il a ramassé des petits gravillons gris ordinaires, et dans sa poche, il a gardé de gros bouchons de liège légers taillés dans l'écorce d'un chêne (ou des coquillages blancs).

Il invente une règle de troc géniale : 1. Chaque fois qu'une bête passe, il lève un doigt : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, **dix** ! 2. Ses dix doigts sont levés. Ses mains sont pleines ! Il n'a plus aucun doigt libre pour la onzième brebis. 3. Alors, il baisse tous ses doigts d'un coup. 4. Et au lieu de garder 10 petits cailloux lourds dans son sac, il fait un échange : il range les 10 petits cailloux dans un panier au sol, et **il glisse 1 seul bouchon de liège dans sa poche** !

Ce bouchon de liège n'est pas un caillou ordinaire. Il a un super-pouvoir : à lui tout seul, il murmure : *« Je vaux dix petits cailloux. Je vaux dix brebis ! »*



Fig. 8. – L'échange régulier : 10 unités isolées deviennent 1 dizaine groupée

Le berger peut continuer avec ses mains libres :

- Dix nouvelles brebis passent ? Un deuxième bouchon de liège dans la poche.
- Dix autres ? Un troisième bouchon.
- Dix autres ? Un quatrième bouchon.
- Et pour les cinq dernières brebis qui ferment la marche ? Il n'y en a pas dix, la main n'est pas pleine : il garde simplement **5 petits cailloux gris** dans sa main.

À la fin de la sortie des 45 brebis, que trouve le berger dans sa poche ?

- Seulement **4 bouchons de liège** (qui valent $4 \times 10 = 40$),
- Et **5 petits cailloux gris** (qui valent 5).

Au total : 9 petits objets légers au lieu de 45 grosses pierres qui lui brisaient le dos !

Définition Fondamentale

Définition — Unité et Dizaine

- Une **unité**, c'est un objet tout seul (1 caillou, 1 bille, 1 doigt).
- Une **dizaine**, c'est un paquet fermé de **10 unités** rassemblées ensemble ($1 \quad \text{dizaine} = 10 \quad \text{unités}$).

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — La boîte de 10 œufs** Dans ta cuisine, regarde la boîte d'œufs en carton. Elle comporte deux rangées de 5 alvéoles, soit exactement 10 places. Une boîte fermée pleine, c'est **1 dizaine d'œufs**. Si tu as 3 boîtes pleines et 4 œufs posés sur la table, tu sais instantanément que tu as 34 œufs, sans avoir besoin de les compter un par un !

---

3. Les peuples qui comptaient avec leurs orteils : la base 20

Tous les peuples de la Terre n'ont pas choisi de s'arrêter à 10 doigts.

Dans les pays chauds d'Amérique centrale, il y a des milliers d'années, les **Mayas** et les **Aztèques** marchaient pieds nus toute l'année. Pour compter, ils utilisaient leurs 10 doigts de la main… plus leurs **10 orteils des pieds** !

Ils comptaient donc par paquets de **20** : c'est ce qu'on appelle la **base vigésimale** (du latin *vicesimus*, vingtième).

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Pourquoi dit-on « quatre-vingts » en français ?** Nos lointains ancêtres, les Gaulois et les Celtes, comptaient eux aussi par paquets de vingt ! C'est pour cela qu'en France, au lieu de dire « octante » comme en Suisse ou en Belgique, nous disons encore aujourd'hui :

$$\text{« quatre-vingts »} = 4 \quad \text{paquets de} \quad 20 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80$$

Et pour 90, nous disons « quatre-vingt-dix » ($4 \quad \text{paquets de} \quad 20 + 10$). Notre langue française garde la mémoire vivante de ces chasseurs aux pieds nus !

---

4. La grande pyramide : dizaines, centaines et milliers

Et si le troupeau devient gigantesque ? Imaginons que tu aies dix bouchons de liège dans ta poche :

$$10 \quad \text{bouchons de liège} = 10 \quad \text{dizaines} = 100 \quad \text{brebis !}$$

Ta poche de bouchons commence à son tour à être pleine. Que fais-tu ? Tu inventes un nouveau troc :

- Tu échanges tes **10 bouchons de liège** contre **1 grosse pomme de pin dorée** !
- Cette pomme de pin s'appelle **une centaine**. Elle vaut 100 brebis.

Et si ton village réunit un jour dix pommes de pin dorées ?

$$10 \quad \text{centaines} = 1\,000 \quad \text{brebis !}$$

Tu les échanges contre **1 grand galet peint** : c'est **un millier** (mille).



Fig. 9. – La pyramide décimale : unités, dizaines, centaines, milliers

Chaque fois que tu as 10 objets d'un niveau, tu les emballes dans un seul paquet du niveau suivant ! C'est ce qu'on appelle notre **système décimal** (du latin *decem*, qui veut dire dix).

---

5. La valeur de position : la place fait le pouvoir !

Pour écrire ces quantités avec nos chiffres de 0 à 9 sans dessiner des bouchons ou des pommes de pin toute la journée, les savants ont trouvé une astuce magistrale : **la valeur de position**.

Regarde bien ces deux nombres écrits avec les mêmes chiffres 1 et 4 :

$$\mathbf{14} \qquad \text{et} \qquad \mathbf{41}$$

Sont-ils identiques ? Absolument pas !

- Dans **14** :
  - Le chiffre de droite (**4**) indique les unités toutes seules : 4 cailloux.
  - Le chiffre de gauche (**1**) indique les dizaines : 1 paquet de 10.
  - Au total : $10 + 4 = 14$.
- Dans **41** :
  - Le chiffre de droite (**1**) indique 1 petite unité toute seule.
  - Le chiffre de gauche (**4**) indique 4 dizaines, c'est-à-dire 4 paquets de 10 ($10 + 10 + 10 + 10 = 40$) !
  - Au total : $40 + 1 = 41$.

Le Tableau des Maisons de Numération

Dizaines (d) (Paquets de 10)	Unités (u) (Cailloux isolés)	
1	4	→ 10 + 4 = 14
4	1	→ 40 + 1 = 41

Fig. 10. – Tableau des maisons CDU : centaines, dizaines et unités

> **Règle d'or — La valeur de position**
>
> En mathématiques, la valeur d'un chiffre dépend entièrement de la **place** (la colonne) qu'il occupe dans le nombre :
>
> - Tout à droite : la colonne des **unités** (u).
> - Juste à gauche : la colonne des **dizaines** (d).
> - Encore à gauche : la colonne des **centaines** (c).
> - Plus à gauche : la colonne des **milliers** (m).

---

6. Le héros invisible : le zéro qui garde la place vide

Imagine que tu aies dans ta boîte :

- **4 pommes de pin** (4 centaines = 400),
- **0 bouchon de liège** (aucune dizaine),

- **5 cailloux gris** (5 unités).

Comment écris-tu ce nombre ? Si tu écris simplement le 4 et le 5 côte à côte : **45**, la personne qui lit ton papier va comprendre : 4 dizaines et 5 unités, soit 45 brebis ! Les quatre cents brebis ont disparu par magie !

Pour que le 4 reste bien installé dans la colonne des centaines, nous devons poser un gardien dans la colonne vide des dizaines : **le chiffre zéro (0)**.

$$405 = 4 \text{ centaines, } 0 \text{ dizaine et } 5 \text{ unités}$$

📐 Règle Fondamentale — Le Rôle du Zéro Gardien de Place

- Centaines Dizaines Unités
- 4 0 5 —> 405
- Le zéro empêche le 4 et le 5 de se coller !

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — L'invention du zéro** Le zéro est l'une des plus grandes inventions de toute l'histoire de l'humanité ! Il a été perfectionné par les savants en **Inde** il y a environ 1 500 ans. Son nom indien était *shûnya*, qui signifie « vide ». Il est passé chez les Arabes sous le nom de *sifr* (qui a donné à la fois notre mot « zéro » et notre mot « chiffre » !).

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Oublier le zéro du milieu** Deux cent trois ne s'écrit pas 23 ! $23 = 2$ dizaines et 3 unités. Deux cent trois, c'est 203 : il y a 0 dizaine au milieu. Ne laisse jamais une colonne vide s'écrouler sans son gardien 0 !

---

7. La droite graduée et les signes d'inégalité : $<$ et $>$

Pour ranger les nombres comme des perles sur un collier, nous traçons une ligne droite bien droite : **la droite graduée**. Elle part de 0 à gauche et s'envole vers la droite en grandissant pas à pas :



Fig. 11. – La droite numérique orientée de 0 à 100

Plus un nombre est placé vers la droite, plus il est grand.

La bouche du crocodile gourmand : $<$ et $>$

Pour comparer deux nombres et dire lequel est le plus grand, nous utilisons deux petits symboles très pratiques :

- **Le signe $<$** se lit « **plus petit que** » ou « **inférieur à** ». *Exemple :* $3 < 8$ (3 est plus petit que 8).
- **Le signe $>$** se lit « **plus grand que** » ou « **supérieur à** ». *Exemple :* $9 > 4$ (9 est plus grand que 4).

🧭 Méthode — Le crocodile gourmand

Imagine que les signes $<$ et $>$ sont la **bouche grande ouverte d'un crocodile très gourmand**. Le crocodile ouvre toujours sa grande gueule vers le plus gros festin (le plus grand nombre) ! La petite pointe fermée montre le tout petit nombre.

Fig. 12. – Le crocodile de comparaison : la gueule s'ouvre vers la plus grande quantité

---

8. Cinq exemples résolus pas à pas

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Décomposer un nombre en dizaines et unités

Énoncé : Décompose le nombre **63** avec des boîtes de 10 œufs et des œufs isolés. *Résolution pas à pas :* 1. Dans 63, le chiffre de gauche est 6 : il représente **6 dizaines**. $6 \text{ dizaines} = 6 \text{ boîtes de } 10 = 60 \text{ œufs}$. 2. Le chiffre de droite est 3 : il représente **3 unités** isolées. 3. On écrit :

$$63 = 60 + 3 = (6 \times 10) + 3$$

Conclusion : 63 œufs, c'est 6 boîtes pleines et 3 œufs à côté.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Comparer 37 et 52 *Énoncé :* Quel est le plus grand nombre entre 37 et 52 ? Écris le résultat avec le bon signe. *Méthode :* 1. On regarde d'abord le chiffre des **dizaines** (les gros paquets) :

- Dans 37, il y a 3 dizaines (30).
- Dans 52, il y a 5 dizaines (50).

2. Comme $5 \text{ dizaines} > 3 \text{ dizaines}$, le nombre 52 a plus de dizaines que 37. Pas besoin de regarder les unités !
3. Le crocodile ouvre sa bouche vers 52 :

$$37 < 52 \qquad (37 \text{ est plus petit que } 52)$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Comparer deux nombres ayant les mêmes dizaines : 74 et 79 *Énoncé :* Compare 74 et 79. *Méthode :* 1. On regarde les dizaines : 7 dizaines pour 74, et 7 dizaines pour 79. C'est une égalité ! 2. Puisque les dizaines sont identiques, on départage avec le chiffre des **unités** :

- 74 a 4 unités.
- 79 a 9 unités.

3. Comme $4 < 9$, on en déduit que :

$$74 < 79$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Encadrer un nombre à la dizaine près

Énoncé : Encadre le nombre **47** entre la dizaine juste avant et la dizaine juste après. *Méthode :* 1. 47 a 4 dizaines et 7 unités. 2. La dizaine pleine juste avant 47, c'est **40** (4 dizaines). 3. La dizaine pleine juste après 47, c'est la suivante : **50** (5 dizaines). 4. On écrit le double encadrement avec les crocodiles :

$$40 < 47 < 50$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Découvrir le nombre mystère *Énoncé :* « Je suis un nombre compris entre 60 et 70. Mon chiffre des unités est le double de 3. Qui suis-je ? » *Méthode :* 1. Le nombre est entre 60 et 70 : sa dizaine commence donc par **6**. 2. Son chiffre des unités est le double de 3 : $3 + 3 = 6$. Le chiffre des unités est donc **6**. 3. En réunissant 6 dizaines et 6 unités, on obtient : **66**.

Ce qu'il faut retenir

1. Notre système de numération est en **base dix** car nous avons dix doigts sur nos deux mains.
2. **1 dizaine = 10 unités**. 1 centaine = 10 dizaines = 100 unités. 1 millier = 10 centaines = 1 000 unités.
3. La **valeur de position** : un chiffre n'a pas la même valeur selon sa place. Dans 82, le 8 vaut 80 (huit dizaines). Dans 28, le 8 vaut 8 (huit unités).
4. Le chiffre **zéro (0)** est un gardien indispensable : il réserve la place d'une colonne vide (ex. 306 a 0 dizaine).
5. Pour comparer deux nombres à deux chiffres :
   - On compare d'abord le **chiffre des dizaines**. Celui qui a le plus de dizaines gagne toujours !
   - Si les dizaines sont égales, on compare le **chiffre des unités**.
6. Les signes d'inégalité : $<$ (plus petit que) et $>$ (plus grand que). La bouche du crocodile s'ouvre toujours vers le plus grand nombre.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 2.1 Combien d'œufs ? Écris sous forme d'un nombre : 1. 3 boîtes pleines de 10 œufs et 6 œufs isolés. 2. 5 boîtes pleines de 10 œufs et 1 œuf isolé. 3. 8 boîtes pleines de 10 œufs et aucun œuf isolé.

Exercice 2.2 Dizaines ou unités ? Dans le nombre **73** : 1. Quel est le chiffre des unités ? 2. Quel est le chiffre des dizaines ? 3. Que vaut le chiffre 7 ? (7 ou 70 ?)

Exercice 2.3 La bouche du crocodile. Complète avec le signe $<$ ou $>$:

- $24 \quad ... \quad 42$
- $68 \quad ... \quad 61$
- $89 \quad ... \quad 90$
- $50 \quad ... \quad 15$

Exercice 2.4 Décomposer en somme. Décompose ces nombres comme dans l'exemple ($25 = 20 + 5$) :

- $48 = ... + ...$
- $72 = ... + ...$
- $36 = ... + ...$
- $94 = ... + ...$

Exercice 2.5 La droite graduée. Sur une droite graduée de 10 en 10, quel nombre se trouve exactement à mi-chemin entre 20 et 30 ? Et entre 70 et 80 ?

Niveau (Je réfléchis et je compare)

Exercice 2.6 Le gardien zéro. Écris en chiffres : 1. Cinq centaines, trois dizaines et deux unités. 2. Sept centaines, zéro dizaine et quatre unités. 3. Deux centaines, six dizaines et zéro unité. Que se passerait-il pour le deuxième nombre si on oubliait d'écrire le zéro ?

Exercice 2.7 Le plus grand nombre possible. Avec deux étiquettes portant les chiffres **3** et **8**, fabrique : 1. Le plus petit nombre à deux chiffres possible. 2. Le plus grand nombre à deux chiffres possible. Compare-les ensuite avec le signe $<$.

Exercice 2.8 Ranger dans l'ordre croissant. Range les nombres suivants du plus petit au plus grand (ordre croissant), en utilisant le signe $<$:

$$54 \quad ; \quad 19 \quad ; \quad 72 \quad ; \quad 45 \quad ; \quad 78 \quad ; \quad 9$$

Exercice 2.9 Le compte du marchand de billes. Un marchand range ses billes dans des sacs de 10. Il a 67 billes en vrac. 1. Combien de sacs complets de 10 billes peut-il remplir ? 2. Combien de billes lui restera-t-il hors des sacs ? 3. Combien de billes lui manque-t-il pour remplir un sac de plus ?

Exercice 2.10 Encadrement à la dizaine. Trouve la dizaine qui vient juste avant et la dizaine qui vient juste après chaque nombre :

- $... < 34 < ...$
- $... < 58 < ...$
- $... < 81 < ...$

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 2.11 Le nombre mystère de grand-mère. « Mon nombre possède 2 chiffres. La somme de mes deux chiffres fait 10 ($d + u = 10$). Mon chiffre des dizaines est 7. Qui suis-je ? »

Exercice 2.12 Le défi des Mayas et des Gaulois. 1. Un sage maya compte avec ses mains et ses orteils. Il dit : « J'ai 3 vingtaines et 5 unités ». Combien cela fait-il en tout pour nous ? 2. Écris le nombre 85 à la manière d'un Gaulois qui parle de paquets de 20.

Exercice 2.13 Les pirates et le coffre d'or. Des pirates ouvrent un coffre contenant 132 pièces d'or. Le capitaine veut faire des bourses de 10 pièces chacune. 1. Combien de bourses de 10 pièces entières les pirates peuvent-ils former ? 2. Combien de pièces d'or restera-t-il sur la table ?

Exercice 2.14 Le nombre inversé. Prends un nombre à deux chiffres dont le chiffre des dizaines est supérieur à celui des unités (par exemple 62). Inverse ses deux chiffres (cela donne 26). Est-ce que le nouveau nombre est toujours plus petit que le nombre de départ ? Explique pourquoi en parlant de la valeur des dizaines.

Exercice 2.15 Le jeu du loto des dizaines. Trouve tous les nombres à deux chiffres possibles dont le chiffre des dizaines est **5**, et dont le chiffre des unités est strictement plus grand que 6. Range-les ensuite du plus petit au plus grand.

Solutions

Solution 2.1 1. 3 boîtes de 10 et 6 œufs = **36**. 2. 5 boîtes de 10 et 1 œuf = **51**. 3. 8 boîtes de 10 et 0 œuf = **80**.

Solution 2.2 1. Le chiffre des unités est **3**. 2. Le chiffre des dizaines est **7**. 3. Le 7 est dans la colonne des dizaines : il représente 7 paquets de 10, donc il vaut **70**.

Solution 2.3 - $24 < 42$ (2 dizaines est plus petit que 4 dizaines). - $68 > 61$ (même dizaine 6, mais $8 > 1$). - $89 < 90$ (8 dizaines est plus petit que 9 dizaines). - $50 > 15$ (5 dizaines contre 1 dizaine).

Solution 2.4 - $48 = 40 + 8$ - $72 = 70 + 2$ - $36 = 30 + 6$ - $94 = 90 + 4$

Solution 2.5 - Entre 20 et 30, le milieu exact est **25** ($20 + 5$). - Entre 70 et 80, le milieu exact est **75** ($70 + 5$).

Solution 2.6 1. $500 + 30 + 2 = \mathbf{532}$. 2. $700 + 0 + 4 = \mathbf{704}$. 3. $200 + 60 + 0 = \mathbf{260}$. Si on oubliait le zéro dans le deuxième nombre, on écrirait 74, ce qui signifierait 7 dizaines et 4 unités au lieu de 7 centaines et 4 unités. Le zéro est indispensable pour garder la place vide !

Solution 2.7 1. Le plus petit nombre : on met le plus petit chiffre en dizaine, soit **38**. 2. Le plus grand nombre : on met le plus grand chiffre en dizaine, soit **83**. Comparaison : $38 < 83$.

Solution 2.8 En observant d'abord le nombre de chiffres (9 n'a qu'un chiffre, c'est le plus petit), puis les dizaines :

$$9 < 19 < 45 < 54 < 72 < 78$$

Solution 2.9 1. Dans 67, il y a 6 dizaines : il peut remplir **6 sacs complets** de 10 billes. 2. Il lui reste **7 billes** isolées. 3. Pour former un sac de 10 avec 7 billes, il lui manque $10 - 7 = \mathbf{3}$ billes.

Solution 2.10 - $30 < 34 < 40$ - $50 < 58 < 60$ - $80 < 81 < 90$

Solution 2.11 Le chiffre des dizaines est 7. On cherche le chiffre des unités tel que $7 + u = 10$. C'est l'ami de 7 pour faire 10, c'est-à-dire 3 ($7 + 3 = 10$). Le nombre mystère est donc **73**.

Solution 2.12 1. 3 vingtaines, c'est $20 + 20 + 20 = 60$. Avec 5 unités en plus, cela donne $60 + 5 = \mathbf{65}$. 2. 85, c'est $80 + 5$, soit 4 paquets de vingt et 5 unités. Le Gaulois dirait : « **quatre-vingt-cinq** ».

Solution 2.13 1. Dans 132, il y a 13 dizaines entières ($13 \times 10 = 130$). Les pirates peuvent donc remplir **13 bourses** entières. 2. Il restera **2 pièces d'or** toutes seules hors des bourses.

Solution 2.14 Oui, c'est toujours vrai ! Prenons un nombre dont les dizaines sont plus grandes que les unités, par exemple 62 ($6 > 2$). Au départ, il a 6 dizaines (soit 60). En inversant les chiffres pour obtenir 26, il n'a plus que 2 dizaines (soit 20). Comme 2 dizaines est strictement inférieur à 6 dizaines, le nombre inversé sera **toujours plus petit** que le nombre de départ.

Solution 2.15 Le chiffre des dizaines doit être 5. Le chiffre des unités doit être strictement supérieur à 6, ce qui laisse le choix entre 7, 8 et 9. Les nombres possibles sont donc : **57**, **58** et **59**. Rangés dans l'ordre croissant : $57 < 58 < 59$.

La question qui ouvre la suite…

Te voilà désormais capable de rassembler tes objets par paquets de dix, de fabriquer des centaines et de comparer d'immenses nombres grâce à la valeur de position.

Mais que se passe-t-il quand deux chasseurs de la tribu reviennent le soir avec deux paniers différents remplis de fruits mûrs ? Comment faire pour **mettre ensemble** leurs récoltes ? Et que se passe-t-il si un panier a un trou au fond et que des fruits se perdent sur le chemin du retour ?

Pour apprendre à réunir, à retirer et à partager avec une absolue justice, nous allons fabriquer un instrument magique à deux plateaux suspendus…

Rendez-vous au **Chapitre 3 : La Chasse Partagée et la Balance de Justice** !

CHAPITRE 3 : La Chasse Partagée et la Balance de Justice

> « Rien ne ressemble plus à la justice qu'un bâton de bois suspendu par le milieu, dont les deux bras refusent d'un côté comme de l'autre de pencher dans le vide. C'est de cet équilibre des mains que sont nés nos signes les plus précieux. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment réunir deux récoltes dans un grand panier grâce à **l'addition (+)**.
- Comment mesurer ce qui s'est envolé ou ce qui manque grâce à **la soustraction (−)**.
- Pourquoi le signe = n'est pas un bouton de calculette qui dit « donne la réponse », mais **une balance à deux plateaux en équilibre absolu**.
- Les **amis de 10** (les compléments à 10 indispensables pour calculer vite comme l'éclair) et les compléments à 100.
- Les astuces magiques de calcul mental (comme ajouter 9 en faisant $+10 - 1$).
- Comment résoudre de vrais petits problèmes : « combien reste-t-il ? », « qui en a le plus ? », « combien en manque-t-il ? ».

---

1. Le problème : le chaudron du soir et le voleur de la nuit

Le soleil décline derrière la forêt. Les chasseurs et les cueilleurs reviennent vers le grand feu de camp du village.

Toi, tu es allé dans le verger sauvage au bord du ruisseau : dans ton panier d'osier, tu rapportes **4 belles pommes rouges**. Ta grande sœur a grimpé sur les rochers ensoleillés : dans son tablier de toile, elle rapporte **3 grosses poires jaunes**.

Ce soir, le clan tout entier prépare le banquet. Tu verses tes 4 pommes dans la grande marmite en terre cuite : *Poc, poc, poc, poc !* Ta sœur s'approche et verse ses 3 poires par-dessus : *Poc, poc, poc !*

Combien de fruits attendent au fond de la marmite ? Tes yeux et tes doigts le voient aussitôt : **sept fruits** !

Fig. 13. – La marmite d'addition : mise en commun de deux quantités

Ce geste magnifique où deux mains s'unissent pour mettre deux tas ensemble dans un seul récipient, c'est **l'Addition**. Pour noter ce geste sans dessiner des paniers toute la journée, les humains ont tracé une petite croix droite : **le signe** $+$ (plus).

$$4 + 3 = 7$$

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — D'où vient le signe + ?** Au Moyen Âge, les marchands écrivaient en latin le petit mot *et* pour dire « et puis encore ». En écrivant très vite avec leur plume d'oie, ils ont relié les lettres : la boucle du *e* et la barre du *t* ont fini par former une simple croix droite : + ! Le mot latin *ad-dere* veut dire « donner en plus », ce qui a donné notre mot **addition**.

---

2. L'ordre n'a pas d'importance : la commutativité

Imagine que ta sœur soit rentrée la première au campement, fatiguée par sa marche. C'est elle qui verse ses **3 poires** au fond de la marmite. Puis tu arrives un peu plus tard avec tes **4 pommes**, et tu les verses par-dessus.

Y a-t-il plus de fruits ? Y en a-t-il moins ? Pas un seul gramme n'a changé ! Dans la marmite, il y a toujours exactement **7 fruits**.

$$3 + 4 = 7$$

Qu'on verse les pommes d'abord ou les poires d'abord, le résultat dans la marmite est rigoureusement identique :

$$4 + 3 = 3 + 4$$

📐 Propriété — La Commutativité de l'addition

Dans une addition, on peut **changer l'ordre des nombres** sans changer le résultat final. On dit que l'addition est **commutative**. *Astuce pratique :* Pour calculer mentalement $2 + 19$, c'est beaucoup plus facile de retourner le calcul dans sa tête et de faire $19 + 2 = 21$!

---

3. La nuit du renard : la soustraction

Mais la vie n'est pas faite que d'ajouts joyeux. Il arrive que des réserves diminuent ou qu'un voleur passe dans l'ombre.

Ce soir-là, les pêcheurs ont rapporté **7 beaux poissons** de la rivière. On les a suspendus à une branche au-dessus de la braise pour qu'ils fument lentement. Tout le village s'endort paisiblement.

Au milieu de la nuit, un renard roux affamé s'approche à pas feutrés. Sans faire de bruit, il grimpe sur un rocher, saute sur la branche, décroche **2 poissons** avec ses dents et s'enfuit à toute vitesse dans la forêt obscure !

Au petit matin, tu t'étires et tu regardes la branche :

- Il y avait 7 poissons hier soir.
- Le renard en a emporté 2.
- Combien de poissons reste-t-il pour le petit-déjeuner ?



Fig. 14. – La soustraction concrète : 7 poissons moins 2 dérobés

Il en reste **5** !

Ce geste où l'on retire de la matière, où une quantité est mangée, perdue ou cachée, c'est **la Soustraction**. Pour l'écrire, on trace un petit trait couché horizontal : **le signe —** (moins).

$$7 - 2 = 5$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — La Soustraction et l'opération inverse** La soustraction sert à trouver ce qui reste quand on a retiré un morceau, ou ce qui manque pour compléter un tout. La soustraction est **l'opération inverse de l'addition** : elle défait ce que l'addition avait construit.

$$7 - 2 = 5 \qquad \text{parce que} \qquad 5 + 2 = 7$$

---

4. La balance de justice et le véritable secret du signe $=$

Voici l'une des idées les plus importantes de toutes les mathématiques, de la maternelle jusqu'aux fusées de l'espace !

Deux marchands se disputent sur la place du marché. L'un dit : *« Mes 5 sacs de blé valent autant que tes 3 sacs de farine et tes 2 sacs d'olives ! »* L'autre crie : *« C'est faux, tu cherches à me tromper ! »*

Pour savoir qui dit vrai, le chef du village ne crie pas. Il apporte **la Balance de Justice** : un grand fléau de bois suspendu par une corde exactement au milieu, avec deux plateaux suspendus de chaque côté.



Équilibre parfait : le signe « = » affirme l'égalité exacte des deux plateaux

Fig. 15. – La balance de justice : état d'équilibre parfait

Le chef pose les 5 sacs de blé sur le plateau de gauche. Il pose les 3 sacs de farine et les 2 sacs d'olives sur le plateau de droite. Le fléau tremble… hésite… et s'immobilise **parfaitement horizontal**. Les deux plateaux sont à la même hauteur exacte !

Le chef déclare : *« C'est une égalité ! »*

📐 Règle d'or — Le signe $=$ est une balance

Le signe $=$ (égal) ne veut **PAS** dire : « appuie sur le bouton et calcule le résultat ». Le signe $=$ veut dire : **« CE QUI EST À GAUCHE PÈSE EXACTEMENT LA MÊME CHOSE QUE CE QUI EST À DROITE »**. Les deux côtés sont en équilibre parfait !

On a le droit d'écrire :

$$5 = 5$$
$$4 + 1 = 5$$
$$5 = 2 + 3$$
$$3 + 4 = 5 + 2 \qquad (\text{car les deux côtés valent } 7\ !)$$

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Les deux barres jumelles de Robert Recorde** En l'an 1557, un médecin et mathématicien gallois nommé **Robert Recorde** en avait assez d'écrire en toutes lettres dans ses livres : *« est esgale à »*. Il a choisi de dessiner deux petits segments de droite parallèles : $=$. Pourquoi deux lignes parallèles ? Il a écrit dans son livre : *« Rien au monde ne peut être plus égal que deux lignes jumelles de même longueur ! »*

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — L'erreur de la calculette** Si tu écris : $3 + 4 = 7 + 2 = 9$, c'est **complètement faux** ! Pourquoi ? Parce que le premier plateau vaut 7, et le plateau suivant vaut 9. La balance s'écroule : 7 n'est pas égal à 9 ! Il faut écrire chaque équilibre séparément :

$$3 + 4 = 7 \qquad \text{puis} \qquad 7 + 2 = 9$$

---

5. Les amis de 10 : les super-héros du calcul mental

Puisque nous avons dix doigts sur nos mains, le nombre **10** est la forteresse la plus solide de notre calcul. Si tu connais par cœur les paires de nombres qui font dix, tu pourras faire des calculs dans ta tête à la vitesse de la lumière !
On les appelle **les amis de 10** ou les **compléments à 10** :

💡 Découverte & Histoire — Les Amis de 10 et les Paires Complémentaires

- 0 + 10 = 10 (et 10 + 0 = 10)
- 1 + 9 = 10 (et 9 + 1 = 10)
- 2 + 8 = 10 (et 8 + 2 = 10)
- 3 + 7 = 10 (et 7 + 3 = 10)
- 4 + 6 = 10 (et 6 + 4 = 10)
- 5 + 5 = 10 (les deux jumeaux des deux mains !)

🖐️ À toi de jouer — Le jeu du cintre et des pinces

Prends un cintre en plastique. Accroche-y exactement **10 pinces à linge**. Ferme les yeux. Demande à un ami de glisser un carton au milieu pour séparer les pinces : par exemple 4 pinces à gauche. Sans regarder sous le carton, devine combien de pinces sont cachées à droite ! C'est l'ami de 4 pour faire 10 : il y en a forcément **6** !

Et pour les grands : les amis de 100 !

C'est exactement la même chanson, mais avec des dizaines :

$$10 + 90 = 100 \qquad 20 + 80 = 100 \qquad 30 + 70 = 100 \qquad 50 + 50 = 100$$

---

6. Les ruses secrètes du calcul mental

Voici trois tours de magie que les champions utilisent pour calculer de tête sans crayon :

1. **Le saut par-dessus 10 :** Pour faire $8 + 5$:
   - Combien manque-t-il à 8 pour arriver à 10 ? Il lui manque 2 (son ami de 10).
   - On casse 5 en $2 + 3$.
   - On fait : $8 + 2 = 10$, et il reste 3, donc $10 + 3 = \mathbf{13}$!

2. **L'astuce magique du 9 (faire $+10$ puis -1) :** Ajouter 9, c'est presque ajouter 10 ! C'est juste un de moins. Pour faire $25 + 9$:
   - J'ajoute 10 d'un bond : $25 + 10 = 35$.
   - Je recule d'un tout petit pas : $35 - 1 = \mathbf{34}$!
3. **Retirer 9 (faire -10 puis $+1$) :** Pour faire $43 - 9$:
   - J'enlève une dizaine entière : $43 - 10 = 33$.
   - Comme j'avais enlevé un de trop, je le rends : $33 + 1 = \mathbf{34}$!

---

7. Cinq exemples résolus : les types de problèmes

En classe ou dans la vie, les problèmes ne sont jamais de bêtes calculs : ce sont des histoires. Voici comment trouver quelle opération choisir :

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Le problème de réunion (« Combien en tout ? ») *Énoncé :* Léo a 6 billes bleues dans sa poche droite et 7 billes rouges dans sa poche gauche. Combien de billes a-t-il en tout ? *Question magique :* Est-ce qu'on rassemble deux tas ensemble ? Oui ! Réunir = **addition**. *Calcul :*

$$6 + 7 = 6 + (4 + 3) = (6 + 4) + 3 = 10 + 3 = 13$$

Phrase réponse : Léo a **13 billes** en tout.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Le problème de perte (« Combien reste-t-il ? ») *Énoncé :* Un paquet contenait 12 gâteaux. Les enfants en ont mangé 4 pour le goûter. Combien de gâteaux reste-t-il dans le paquet ? *Question magique :* Est-ce que des objets ont disparu ? Oui ! Disparition = **soustraction**. *Calcul :*

$$12 - 4 = 12 - 2 - 2 = 10 - 2 = 8$$

Phrase réponse : Il reste **8 gâteaux** dans le paquet.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Le problème de comparaison (« Combien de plus que… ? ») *Énoncé :* Sophie a cueilli 15 marguerites. Son frère Hugo en a cueilli 9. Combien de fleurs Sophie a-t-elle de plus que son frère ? *Attention, piège classique !* Beaucoup d'enfants voient le mot « plus » et font une addition ! C'est une grande erreur ! On ne met pas leurs fleurs ensemble : on cherche **l'écart**, la différence de hauteur entre les deux bouquets. Pour trouver une différence, on fait une **soustraction** :

$$15 - 9 = 15 - 10 + 1 = 6$$

Phrase réponse : Sophie a **6 marguerites de plus** que son frère.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Le problème de complément (« Combien en manque-t-il ? ») *Énoncé :* Un album d'images compte 20 pages. Tom a déjà rempli 14 pages d'autocollants. Combien de pages doit-il encore remplir pour finir son album ? *Question magique :* Combien manque-t-il pour aller de 14 jusqu'à 20 ? C'est une addition à trou : $14 + \ldots = 20$. On cherche la différence :

$$20 - 14 = 6$$

Phrase réponse : Il manque **6 pages** à Tom pour terminer son album.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — La balance mystère *Énoncé :* Sur une balance en équilibre, le plateau de gauche contient un poids de 10 kg. Le plateau de droite contient un melon de 3 kg et un gros sac mystère. Combien pèse le sac mystère ? *Traduction en équilibre :*

$$\text{Plateau Gauche} = \text{Plateau Droit}$$

$$10 = 3 + \text{Sac}$$

C'est l'ami de 3 pour faire 10 !

$$\text{Sac} = 10 - 3 = 7 \ \text{kg}$$

Phrase réponse : Le sac mystère pèse **7 kg**.

Ce qu'il faut retenir

1. **L'addition ($+$)** réunit des quantités. On peut échanger l'ordre des nombres ($4 + 3 = 3 + 4$) : elle est commutative.
2. **La soustraction ($-$)** retire une quantité, mesure ce qui reste ou calcule une différence. Elle défait l'addition.
3. **Le signe $=$** est une balance à deux plateaux : les deux côtés doivent peser exactement la même chose ($6 + 2 = 5 + 3$).
4. **Les amis de 10** sont à connaître par cœur : $1 + 9$, $2 + 8$, $3 + 7$, $4 + 6$, $5 + 5$.
5. Pour ajouter 9, on ajoute 10 puis on retire 1 ($24 + 9 = 34 - 1 = 33$).
6. Dans un problème, on choisit l'opération en observant le film de l'histoire : rassembler ($+$), perdre ou enlever ($-$), chercher un écart ou un manque ($-$).

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 3.1 Les amis de 10. Complète les additions à trou sans compter sur tes doigts :

- $7 + ... = 10$
- $4 + ... = 10$
- $2 + ... = 10$
- $9 + ... = 10$
- $5 + ... = 10$

Exercice 3.2 La balance est-elle droite ? Dis si ces égalités sont **Vraies** (la balance est en équilibre) ou **Fausses** (la balance penche) :

1. $5 + 3 = 8$
2. $6 + 4 = 7 + 3$
3. $10 - 2 = 5 + 2$
4. $4 + 4 = 10 - 2$

Exercice 3.3 La ruse du 9. Calcule mentalement en ajoutant 10 puis en enlevant 1 :

- $15 + 9 = ...$
- $34 + 9 = ...$
- $62 + 9 = ...$

Exercice 3.4 Les poussins de la ferme. Dans la cour de la ferme, 8 poussins jaunes picorent des grains. 5 poussins noirs arrivent en courant pour manger avec eux. Combien de poussins y a-t-il maintenant dans la cour ?

Exercice 3.5 Le goûter d'anniversaire. Maman a préparé 16 parts de tarte aux pommes. À la fin du goûter, les enfants ont mangé 10 parts. Combien de parts de tarte reste-t-il sur le plat ?

Niveau (Je réfléchis et je résous)

Exercice 3.6 La bonne opération. Pour chaque phrase, écris si tu dois faire une **addition** ou une **soustraction** : 1. « Lucas a 8 billes. Il en gagne 4 à la récréation. Combien a-t-il de billes ? » 2. « Clara a 14 feutres. 3 feutres ne marchent plus et elle les jette à la poubelle. Combien de feutres lui reste-t-il ? » 3. « Arthur a 12 ans et sa cousine Léa a 7 ans. Combien d'années de différence ont-ils ? » 4. « Juliette a 8 images. Il lui en faut 15 pour terminer sa collection. Combien d'images lui manque-t-il ? »

Exercice 3.7 Équilibrer la balance. Trouve le nombre qui remplace le point d'interrogation pour que les plateaux soient parfaitement en équilibre :

- $8 + ? = 15$
- $? + 6 = 14$
- $13 - ? = 7$
- $20 = 12 + ?$

Exercice 3.8 Les amis de 100. Trouve le complément à 100 pour chaque dizaine pleine :

- $40 + \ldots = 100$
- $70 + \ldots = 100$
- $80 + \ldots = 100$
- $25 + \ldots = 100$ (Indice : pense d'abord à aller à 30 !)

Exercice 3.9 Le problème des crayons de couleur. Dans sa trousse, Jade a 18 crayons de couleur. Son amie Manon en a 11. Combien de crayons de plus Jade a-t-elle par rapport à Manon ? Écris le calcul et la phrase réponse.

Exercice 3.10 Décomposer pour franchir 10. Calcule en décomposant le deuxième nombre pour passer par 10 : *Exemple :* $9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15$ - $8 + 7 = 8 + \ldots + \ldots = \ldots$ - $7 + 5 = 7 + \ldots + \ldots = \ldots$ - $6 + 6 = 6 + \ldots + \ldots = \ldots$

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 3.11 Le tour de magie des 3 nombres. Choisis trois cartes : **2**, **5** et **7**. Écris deux additions différentes et deux soustractions différentes en utilisant uniquement ces trois nombres !

Exercice 3.12 La pyramide des additions. Dans une pyramide de briques, chaque brique est égale à la somme des deux briques posées juste sous elle :



Fig. 16. – La pyramide additive : somme des briques sous-jacentes

1. Vérifie le premier étage : $3 + 4 = 7$ et $4 + 4 = 8$.
2. Quel nombre doit-on inscrire dans la brique tout en haut ?

Exercice 3.13 Le mystère de l'écureuil économe. Un écureuil a caché 17 noisettes dans le creux d'un arbre le lundi matin.

- Le mardi, il en mange 5.
- Le mercredi, il en trouve 8 nouvelles et les ajoute à sa cachette.
- Le jeudi, un geai bleu lui vole 4 noisettes.

Combien de noisettes reste-t-il dans l'arbre le jeudi soir ?

Exercice 3.14 La balance à trois poids. Sur le plateau de gauche d'une balance, il y a deux poids de **6 kg** et **9 kg**. Sur le plateau de droite, il y a un seul poids de **8 kg** et une boîte fermée. Combien pèse la boîte fermée pour que la balance ne penche ni à gauche ni à droite ?

Exercice 3.15 Le problème de l'âge d'or. Quand son petit frère Noé est né, Sarah avait exactement 5 ans. Aujourd'hui, Noé fête son 8e anniversaire. Quel âge a Sarah aujourd'hui ? Écris le calcul qui permet de trouver sa réponse.

Solutions

Solution 3.1 - $7 + \mathbf{3} = 10$ - $4 + \mathbf{6} = 10$ - $2 + \mathbf{8} = 10$ - $9 + \mathbf{1} = 10$ - $5 + \mathbf{5} = 10$

Solution 3.2 1. $5 + 3 = 8$: **Vrai** ($8 = 8$). 2. $6 + 4 = 7 + 3$: **Vrai** (les deux côtés valent 10). 3. $10 - 2 = 5 + 2$: **Faux** ($8 \neq 7$, le plateau gauche est plus lourd). 4. $4 + 4 = 10 - 2$: **Vrai** ($8 = 8$).

Solution 3.3 - $15 + 9 = 15 + 10 - 1 = 25 - 1 = \mathbf{24}$. - $34 + 9 = 34 + 10 - 1 = 44 - 1 = \mathbf{43}$. - $62 + 9 = 62 + 10 - 1 = 72 - 1 = \mathbf{71}$.

Solution 3.4 On rassemble les deux groupes de poussins :

$$8 + 5 = 13$$

Il y a maintenant **13 poussins** dans la cour de la ferme.

Solution 3.5 On retire les parts mangées :

$$16 - 10 = 6$$

Il reste **6 parts de tarte** sur le plat.

Solution 3.6 1. Lucas gagne des billes : **addition** ($8 + 4 = 12$). 2. Clara jette des feutres : **soustraction** ($14 - 3 = 11$). 3. On cherche un écart d'âge : **soustraction** ($12 - 7 = 5$). 4. On cherche ce qui manque pour compléter : **soustraction** ($15 - 8 = 7$).

Solution 3.7 - $8 + \mathbf{7} = 15$ - $\mathbf{8} + 6 = 14$ - $13 - \mathbf{6} = 7$ - $20 = 12 + \mathbf{8}$

Solution 3.8 - $40 + \mathbf{60} = 100$ - $70 + \mathbf{30} = 100$ - $80 + \mathbf{20} = 100$ - Pour 25 : de 25 à 30 il y a 5, et de 30 à 100 il y a 70. Donc $25 + \mathbf{75} = 100$.

Solution 3.9 On cherche la différence entre 18 et 11 :

$$18 - 11 = 7$$

Jade a **7 crayons de plus** que Manon.

Solution 3.10 Décompositions pas à pas pour franchir la dizaine :

- $8 + 7 = 8 + \mathbf{2} + \mathbf{5} = 10 + 5 = \mathbf{15}$
- $7 + 5 = 7 + \mathbf{3} + \mathbf{2} = 10 + 2 = \mathbf{12}$
- $6 + 6 = 6 + \mathbf{4} + \mathbf{2} = 10 + 2 = \mathbf{12}$

Solution 3.11 Avec 2, 5 et 7 :

- Additions : $2 + 5 = 7$ et $5 + 2 = 7$.
- Soustractions : $7 - 2 = 5$ et $7 - 5 = 2$.

C'est la famille de nombres inséparables !

Solution 3.12 La brique du sommet est la somme des deux briques du dessous :

$$7 + 8 = 15$$

On doit inscrire le nombre **15** tout en haut de la pyramide.

Solution 3.13 Suivons les noisettes jour après jour :

- Lundi : 17 noisettes.
- Mardi : $17 - 5 = 12$ noisettes.
- Mercredi : $12 + 8 = 20$ noisettes.
- Jeudi : $20 - 4 = 16$ noisettes.

Il reste **16 noisettes** dans l'arbre le jeudi soir.

Solution 3.14 - Poids sur le plateau de gauche : $6 + 9 = 15$ kg. - Pour équilibrer, le plateau de droite doit peser 15 kg. - On a déjà un poids de 8 kg. - Poids de la boîte : $15 - 8 = \mathbf{7}$ **kg**.

Solution 3.15 Sarah a toujours 5 ans de plus que son petit frère, car le temps s'écoule à la même vitesse pour tous les deux ! Si Noé a 8 ans :

$$8 + 5 = 13$$

Sarah a **13 ans** aujourd'hui.

La question qui ouvre la suite…

Tu sais maintenant jongler avec l'addition, la soustraction et l'équilibre de la balance pour les petits nombres.

Mais imagine que le chef du village te demande de calculer l'addition des récoltes de toute la vallée : **47 sacs de blé** ramassés dans la plaine du nord, et **38 sacs de blé** récoltés dans la plaine du sud !

Faire cela de tête ou sur ses dix doigts commence à devenir dangereux : que faire si on a plus de 10 unités qui débordent ? Comment noter le calcul proprement en colonnes sur une ardoise sans jamais s'embrouiller ?

Les marchands de l'Antiquité ont inventé une machine en bois à glissières et une voyageuse clandestine que l'on appelle la **retenue**…

Rendez-vous au **Chapitre 4 : Le Boulier du Marchand et la Retenue Voyageuse** !

CHAPITRE 4 : Le Boulier du Marchand et la Retenue Voyageuse

> « Quand les nombres deviennent trop grands pour tenir dans la main, on leur bâtit une maison avec des étages et des colonnes. Et quand une pièce déborde, un invité grimpe par l'escalier secret pour frapper à la porte voisine : c'est le voyage de la retenue. »

Ce que tu vas découvrir

- Le secret du **boulier** et de la boîte à chaussures à compartiments (la colonne des Unités et la colonne des Dizaines).
- Poser et calculer une **addition en colonnes sans retenue**.
- Le mystère de **l'addition avec retenue** : quand $7 + 5 = 12$, la chambre des unités déborde ! Pourquoi et comment 1 nouvelle dizaine voyage tout en haut.
- Poser et calculer une **soustraction en colonnes avec retenue** grâce à la méthode ancestrale du « cassage de dizaine » (j'ouvre un paquet de 10).
- Le super-pouvoir du détective : **vérifier son calcul par l'opération inverse** pour être sûr à 100 % de ne jamais faire d'erreur.

---

1. Le problème : le grand chargement du marchand

Nous sommes sur les quais du port fluvial. Un chaland en bois vient d'accoster, chargé de sacs de grains.

Le contremaître du port tient une tablette d'argile. Il doit enregistrer le chargement de deux fermes :

- La ferme du Soleil apporte **47 sacs de blé**.
- La ferme de la Lune apporte **38 sacs d'orge**.

Le gouverneur de la ville exige de connaître le nombre total de sacs avant que le soleil ne se couche. Le contremaître commence à dessiner des petits traits sur son ardoise : $1, 2, 3, 4$... Mais c'est beaucoup trop long ! Ses yeux se troublent, il s'embrouille, et les marins s'impatientent sur le quai en criant : *« Alors, combien de sacs en tout ? Nous voulons décharger le bateau ! »*

Pour calculer sans jamais se tromper, même avec de grands nombres, les marchands n'alignent pas les cailloux par terre. Ils utilisent une machine merveilleuse : **le boulier**.

---

2. La machine à calculer : le boulier et la boîte à deux colonnes

Fabriquons ensemble le premier ordinateur de l'humanité ! Tu n'as besoin que d'une simple boîte à chaussures et d'un morceau de carton pour la séparer en deux compartiments :



Fig. 17. – L'abaque des marchands : compartiments d'unités et de dizaines

Rappelons la règle d'or découverte au chapitre 2 :

- Dans le compartiment des **Unités (u)**, on ne met que des petits cailloux (1 caillou = 1 sac).
- Dans le compartiment des **Dizaines (d)**, on ne met que des bouchons (1 bouchon = 10 sacs).
- **Règle absolue :** Dès qu'il y a **10 cailloux** dans le compartiment des unités, la boîte est pleine à craquer ! On doit aussitôt échanger ces 10 cailloux contre **1 bouchon**, qu'on fait passer dans le compartiment des dizaines.

Sur une feuille de papier, on dessine exactement la même maison en traçant des colonnes : c'est ce qu'on appelle **poser une opération**.

---

3. Poser une addition sans retenue : l'alignement parfait

Commençons par une addition tranquille :

$$23 + 45$$

Pour poser ce calcul sur du papier à carreaux, voici la règle d'or :

> 🧭 **Règle d'alignement — Chacun dans sa colonne !**
>
> On écrit les nombres l'un au-dessus de l'autre en alignant verticalement :
>
> - Les **unités sous les unités** (la colonne de droite).
> - Les **dizaines sous les dizaines** (la colonne de gauche).
> - On trace un grand trait horizontal sous le calcul : ce trait remplace le signe $=$.
> - **On commence TOUJOURS par calculer la colonne des unités** (de droite à gauche) !

```
    d   u
    2   3      (2 dizaines et 3 unités)
+   4   5      (4 dizaines et 5 unités)
----------
```

1. **Étape 1 : On additionne les unités.** Dans la colonne de droite : $3 + 5 = 8$. On écrit **8** sous le trait, dans la colonne des unités.
2. **Étape 2 : On additionne les dizaines.** Dans la colonne de gauche : $2 + 4 = 6$. On écrit **6** sous le trait, dans la colonne des dizaines.

```
    d   u
    2   3
+   4   5
----------
    6   8      Le résultat est 68 !
```

Tout s'est passé dans le calme : aucune colonne n'a dépassé 9, aucun caillou n'a débordé.

---

4. L'addition avec retenue : la voyageuse clandestine

Revenons maintenant aux sacs du bateau :

$$47 + 38$$

Posons le calcul dans nos colonnes :

```
    d   u
    4   7
+   3   8
----------
```

1. **Regardons la colonne des unités :** On doit réunir 7 cailloux et 8 cailloux.

   $$7 + 8 = 15$$

   Alerte ! Le nombre 15 a deux chiffres ! On ne peut pas écrire 15 dans la case des unités, car une case d'unité n'a de place que pour un seul chiffre (de 0 à 9).
2. **Le troc magique :** Que représente 15 cailloux ?

   $$15 \text{ unités} = 1 \text{ dizaine} + 5 \text{ unités}$$

   - Les **5 unités** restent bien sagement assises au fond de leur colonne, sous le trait.
   - Mais la **1 nouvelle dizaine** fabriquée ne peut pas rester là : elle prend son baluchon et **voyage tout en haut de la colonne des dizaines** !

Cette dizaine voyageuse s'appelle **la retenue**. On l'écrit en tout petit dans un petit rond en haut de la colonne des dizaines pour ne pas l'oublier :

```
   (1) <----- La retenue voyageuse !
    d   u
    4   7
+   3   8
----------
        5      (car 7 + 8 = 15 : je pose 5 et je retiens 1)
```

3. **Calculons maintenant la colonne des dizaines :** On n'oublie surtout pas d'ajouter la petite voyageuse !

   $$1 \text{ (la retenue)} + 4 + 3 = 8 \text{ dizaines}$$

```
    (1)
     d   u
     4   7
+    3   8
----------
     8   5      Le total est 85 sacs !
```

Définition Fondamentale

📐 **Définition — La Retenue** Dans une opération posée, la **retenue** est une dizaine (ou une centaine) créée par le débordement de la colonne précédente, qui vient s'ajouter en haut de la colonne voisine plus grande.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — L'oubli de la retenue** L'erreur la plus fréquente chez tous les écoliers du monde est d'oublier d'ajouter la petite retenue quand on additionne les dizaines ! Pour ne jamais l'oublier : 1. Écris-la immédiatement dès que tu poses l'unité. 2. Prends l'habitude de commencer l'addition des dizaines **par elle** : « 1 + 4 = 5, et 5 + 3 = 8 ».

Découverte & Histoire

L'histoire vraie — La Pascaline de Blaise Pascal (1642)

Pour aider son père qui était percepteur des impôts et passait ses nuits à additionner des colonnes de chiffres interminables, le savant français Blaise Pascal inventa à l'âge de 19 ans la première calculatrice mécanique de l'histoire : **la Pascaline**. À l'intérieur, un ingénieux mécanisme d'engrenages à sautoir transmettait automatiquement la retenue d'une roue à la suivante dès qu'une unité franchissait le 9 !



Fig. 18. – La machine arithmétique de Blaise Pascal (Pascaline, 1642) : le premier mécanisme à report de retenue décimale automatique

---

5. La soustraction posée : ouvrir un paquet de 10

Imaginons maintenant l'histoire inverse : Le bateau contenait **85 sacs** au départ. Les marchands en vendent **38** sur le port. Combien de sacs reste-t-il à bord ?

$$85 - 38$$

Posons la soustraction en colonnes :

```
    d   u
    8   5

-   3   8
----------
```

Comme toujours, on commence par la colonne des unités tout à droite : On a 5 cailloux, et on veut en enlever 8 :

$$5 - 8 = \ ??$$

C'est impossible ! Si tu as 5 bonbons dans ta poche, tu ne peux pas en donner 8 à tes amis !

Que fait le marchand ? Il ne panique pas. Il se tourne vers la colonne des dizaines, où il y a 8 gros paquets fermés de 10 sacs.

La méthode par cassage (l'échange) :

1. Le marchand prend **1 paquet de dix** dans la réserve des dizaines. Il restait 8 dizaines : il n'en reste plus que **7** ! (On barre doucement le 8 et on écrit 7 au-dessus).
2. Il ouvre ce paquet de dix : cela libère **10 unités toutes fraîches**.
3. Il donne ces 10 unités à la colonne des unités, qui en avait déjà 5 :

$$10 + 5 = 15 \text{ unités !}$$

(On écrit un petit 1 devant le 5 pour former 15).

```
      (7)  (15)
       d     u
      \8\   \5\

  -    3     8
  -------------
```

4. Maintenant, tout devient facile !
   - Dans les unités : $15 - 8 = \mathbf{7}$.
   - Dans les dizaines : $7 - 3 = \mathbf{4}$.

```
      (7)  (15)
       d     u
      \8\   \5\

  -    3     8
  -------------
       4     7      Il reste 47 sacs !
```

> 💡 **Le geste physique — Cassage de dizaine**
>
> Prends 8 boîtes d'allumettes pleines de 10 allumettes (80) et 5 allumettes libres (5). Tu dois retirer 8 allumettes. Tu ne peux pas en prendre 8 parmi les 5 libres. Tu prends donc **une boîte fermée**, tu l'ouvres et tu verses ses 10 allumettes sur la table avec les 5 autres : tu as maintenant 15 allumettes libres et 7 boîtes fermées. Tu peux retirer 8 allumettes sans aucun problème !

---

6. Le secret du détective : vérifier par l'opération inverse

Comment un bon mathématicien sait-il que son résultat est juste, sans attendre que le maître vienne corriger avec son stylo rouge ? Il fait **la preuve par l'opération inverse** !

- Tu viens de calculer la soustraction : $85 - 38 = 47$.
- Pour vérifier, tu fais l'inverse : tu reprends les 47 sacs restants, tu y rajoutes les 38 sacs vendus ($47 + 38$).
- Si ton calcul est juste, tu dois retrouver **exactement les 85 sacs du début** !

```
  Calcul fait :            Vérification magique :
     8 5                       4 7

   - 3 8                     + 3 8
   -----                     -----
     4 7                       8 5   <--- On retrouve 85 : c'est gagné !
```

Si tu ne retombes pas sur 85, c'est qu'un lutin farceur a glissé une erreur dans tes calculs : tu peux chercher où est la coquille avant que quiconque ne s'en aperçoive !

---

7. Cinq exemples résolus pas à pas

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Addition posée sans retenue *Calcul :* Poser et calculer $34 + 52$. *Pas à pas :*

```
    d   u
    3   4
+   5   2
---------
    8   6
```

- *Unités :* $4 + 2 = 6$.
- *Dizaines :* $3 + 5 = 8$. Résultat : $34 + 52 = 86$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Addition posée avec retenue voyageuse
Calcul : Poser et calculer $56 + 27$. *Pas à pas :*

```
   (1)
    d   u
    5   6
+   2   7
---------
    8   3
```

- *Unités :* $6 + 7 = 13$. *Je pose 3 dans la colonne des unités et j'écris la retenue 1 en haut des dizaines.*
- *Dizaines :* $1 \ \ (\text{retenue}) + 5 + 2 = 8$. Résultat : $56 + 27 = 83$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Addition à trois étages *Calcul :* Poser et calculer $25 + 18 + 34$. *Pas à pas :*

```
   (1)
    d   u
    2   5
    1   8
+   3   4
---------
    7   7
```

- *Unités :* $5 + 8 = 13$, *et* $13 + 4 = 17$. *Je pose 7 et je retiens 1.*
- *Dizaines :* $1 \ \ (\text{retenue}) + 2 + 1 + 3 = 7$. Résultat : $25 + 18 + 34 = 77$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Soustraction posée sans retenue

Calcul : Poser et calculer $69 - 25$. *Pas à pas :*

```
    d   u
    6   9

-   2   5
---------
    4   4
```

- *Unités :* $9 - 5 = 4$.
- *Dizaines :* $6 - 2 = 4$. Résultat : $69 - 25 = 44$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Soustraction posée avec cassage de dizaine

Calcul : Poser et calculer $72 - 36$. *Pas à pas :*

- Unités : $2 - 6$ est impossible !
- On casse une dizaine chez le 7 : il reste 6 dizaines.
- On donne 10 unités au 2 : il devient 12.

```
    (6)  (12)
     d    u
    \7\  \2\

-   3    6
------------
    3    6
```

- *Unités :* $12 - 6 = 6$.
- *Dizaines :* $6 - 3 = 3$. Vérification par addition :
  $36 + 36 = 72$. *Le résultat est parfaitement exact !*

Ce qu'il faut retenir

1. Pour poser une opération, on aligne **les unités sous les unités** et **les dizaines sous les dizaines**. On calcule toujours de droite à gauche.
2. **Dans l'addition**, si la somme des unités fait 10 ou plus, on pose le chiffre des unités et on envoie la dizaine en **retenue** au sommet de la colonne de gauche.
3. On ne doit jamais oublier d'ajouter la retenue lors du calcul des dizaines.
4. **Dans la soustraction**, si le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, on **casse une dizaine** : la colonne des dizaines perd 1, et la colonne des unités gagne 10.
5. On peut toujours vérifier une soustraction en additionnant le résultat avec le nombre retiré.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 4.1 Pose et calcule ces additions sans retenue : - $21 + 35$ - $42 + 16$ - $63 + 24$

Exercice 4.2 Pose et calcule ces additions avec une retenue voyageuse : - $38 + 25$ - $47 + 36$ - $59 + 14$

Exercice 4.3 Pose et calcule ces soustractions sans retenue : - $57 - 23$ - $88 - 41$ - $76 - 35$

Exercice 4.4 Trouver la retenue oubliée. Observe ce calcul d'un élève distrait :

```
  4 8
+ 2 5
-----
  6 3
```

Quelle erreur cet élève a-t-il commise ? Quel est le bon résultat ?

Exercice 4.5 Le plein d'essence. Le réservoir d'un camion contenait 24 litres de carburant. Le chauffeur rajoute 38 litres à la pompe. Combien de litres y a-t-il dans le réservoir ?

Niveau (Je réfléchis et je résous)

Exercice 4.6 Pose et calcule ces soustractions avec cassage de dizaine : - $53 - 28$ - $61 - 37$ - $84 - 49$

Exercice 4.7 La vérification du détective. Un camarade affirme que $75 - 39 = 46$. Fais l'addition inverse ($46 + 39$) pour vérifier s'il a raison ou s'il s'est trompé.

Exercice 4.8 Traverser la centaine ! Pose et calcule ces additions dont le résultat dépasse 100 :

- $65 + 47$
- $78 + 56$
- $89 + 35$ *(Indice : la colonne des dizaines va elle aussi fabriquer une retenue vers la colonne des centaines !)*

Exercice 4.9 Les moutons du grand troupeau. Dans un grand enclos, il y a 92 moutons. Le soir, le berger en fait sortir 35 pour les emmener boire à la rivière. Combien de moutons restent dans l'enclos ?

Exercice 4.10 L'addition à trois nombres. Pour décorer la fête de l'école, les élèves ont gonflé 28 ballons rouges, 34 ballons jaunes et 19 ballons bleus. Combien de ballons ont-ils gonflés au total ?

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 4.11 L'opération à trous. Retrouve les chiffres cachés sous les étoiles ($\star$) :

```
   3  ?
+  ?  4
--------
   8  1
```

Exercice 4.12 La soustraction mystère. Retrouve le chiffre caché sous le carré vert ($\blacksquare$) :

```
   6  4

-  2  ?
--------
   3  7
```

Exercice 4.13 Le cas difficile du zéro au milieu. Pose et calcule la soustraction suivante :

$$80 - 36$$

Explique comment tu fais pour casser une dizaine alors que le chiffre des unités est un zéro.

Exercice 4.14 Le trajet du bus. Un bus quitte le terminus avec 38 passagers à bord.

- Au premier arrêt, 15 passagers montent et 7 descendent.

• Au deuxième arrêt, 12 passagers montent et 9 descendent.

Combien de passagers restent dans le bus après le deuxième arrêt ?

Exercice 4.15 Le défi du boulier géant. En choisissant les chiffres de chaque nombre parmi **2**, **5** et **8** (sans répéter le même chiffre au sein d'un même nombre), forme deux nombres à deux chiffres pour obtenir la somme la plus grande possible. Calcule ensuite cette somme.

Solutions

Solution 4.1 - $21 + 35$: unités $1 + 5 = 6$, dizaines $2 + 3 = 5 \Longrightarrow \mathbf{56}$. - $42 + 16$: unités $2 + 6 = 8$, dizaines $4 + 1 = 5 \Longrightarrow \mathbf{58}$. - $63 + 24$: unités $3 + 4 = 7$, dizaines $6 + 2 = 8 \Longrightarrow \mathbf{87}$.

Solution 4.2 - $38 + 25$: unités $8 + 5 = 13$ (je pose 3 et je retiens 1) ; dizaines $1 + 3 + 2 = 6 \Longrightarrow \mathbf{63}$. - $47 + 36$: unités $7 + 6 = 13$ (pose 3, retiens 1) ; dizaines $1 + 4 + 3 = 8 \Longrightarrow \mathbf{83}$. - $59 + 14$: unités $9 + 4 = 13$ (pose 3, retiens 1) ; dizaines $1 + 5 + 1 = 7 \Longrightarrow \mathbf{73}$.

Solution 4.3 - $57 - 23$: unités $7 - 3 = 4$, dizaines $5 - 2 = 3 \Longrightarrow \mathbf{34}$. - $88 - 41$: unités $8 - 1 = 7$, dizaines $8 - 4 = 4 \Longrightarrow \mathbf{47}$. - $76 - 35$: unités $6 - 5 = 1$, dizaines $7 - 3 = 4 \Longrightarrow \mathbf{41}$.

Solution 4.4 L'élève a calculé $8 + 5 = 13$, il a bien posé 3 dans les unités, mais **il a oublié d'ajouter la retenue 1** dans la colonne des dizaines ! Il a fait $4 + 2 = 6$ au lieu de $1 + 4 + 2 = 7$. Le bon résultat est **73**.

Solution 4.5 On pose $24 + 38$:

• Unités : $4 + 8 = 12$ (je pose 2, retiens 1).
• Dizaines : $1 + 2 + 3 = 6$.

Il y a **62 litres** dans le réservoir.

Solution 4.6 - $53 - 28$: on casse 1 dizaine à 5 (reste 4), l'unité devient 13. $13 - 8 = 5$ et $4 - 2 = 2 \Longrightarrow \mathbf{25}$. - $61 - 37$: on casse 1 dizaine à 6 (reste 5), l'unité devient 11. $11 - 7 = 4$ et $5 - 3 = 2 \Longrightarrow \mathbf{24}$. - $84 - 49$: on casse 1 dizaine à 8 (reste 7), l'unité devient 14. $14 - 9 = 5$ et $7 - 4 = 3 \Longrightarrow \mathbf{35}$.

Solution 4.7 Calculons $46 + 39$:

• Unités : $6 + 9 = 15$ (pose 5, retiens 1).
• Dizaines : $1 + 4 + 3 = 8$. $46 + 39 = 85$, et non pas 75 ! Le camarade s'est trompé d'une dizaine. Le vrai résultat de $75 - 39$ est **36** (car $36 + 39 = 75$).

Solution 4.8

• $65 + 47$: unités $5 + 7 = 12$ (pose 2, retiens 1) ; dizaines $1 + 6 + 4 = 11$ dizaines $\Longrightarrow \mathbf{112}$.
• $78 + 56$: unités $8 + 6 = 14$ (pose 4, retiens 1) ; dizaines $1 + 7 + 5 = 13 \Longrightarrow \mathbf{134}$.
• $89 + 35$: unités $9 + 5 = 14$ (pose 4, retiens 1) ; dizaines $1 + 8 + 3 = 12 \Longrightarrow \mathbf{124}$.

Solution 4.9 On pose $92 - 35$:

• $2 - 5$ impossible. On casse 1 dizaine à 9 (reste 8), le 2 devient 12.
• Unités : $12 - 5 = 7$.
• Dizaines : $8 - 3 = 5$.

Il reste **57 moutons** dans l'enclos.

Solution 4.10 On pose $28 + 34 + 19$:

• Unités : $8 + 4 + 9 = 21$ (je pose 1 et je retiens **2** !).
• Dizaines : $2 \ \ (\text{retenue}) + 2 + 3 + 1 = 8$.

Ils ont gonflé **81 ballons** au total.

Solution 4.11 - Dans les unités : $\star + 4 = 11$ (car on voit 1 en bas avec une retenue vers les dizaines). Donc la première étoile vaut **7** ($7 + 4 = 11$). - Dans les dizaines : $1 \ \ (\text{retenue}) + 3 + \star = 8 \Longrightarrow 4 + \star = 8 \Longrightarrow \star = \mathbf{4}$.

L'opération était : $37 + 44 = 81$.

Solution 4.12 Dans les unités : $4 - \blacksquare = 7$ est impossible sans cassage. On casse donc 1 dizaine à 6 (qui devient 5), et le 4 devient 14. On a alors : $14 - \blacksquare = 7 \Longrightarrow \blacksquare = \mathbf{7}$. Vérification des dizaines : $5 - 2 = 3$. C'est parfait !

Solution 4.13 Dans $80 - 36$:

- Dans les unités, on a 0 caillou. On ne peut pas enlever 6 cailloux à zéro !
- On casse 1 dizaine parmi les 8 dizaines : il reste **7 dizaines**.
- Les 10 unités rejoignent le zéro : on a maintenant **10 unités**.
- On fait : $10 - 6 = 4$ pour les unités, et $7 - 3 = 4$ pour les dizaines.

Le résultat est **44**.

Solution 4.14 - Départ : 38 passagers. - Premier arrêt : $38 + 15 = 53$, puis $53 - 7 = 46$ passagers. - Deuxième arrêt : $46 + 12 = 58$, puis $58 - 9 = 49$ passagers.

Il reste **49 passagers** dans le bus.

Solution 4.15 Pour maximiser la somme de deux nombres à deux chiffres, il faut placer le plus grand chiffre possible au rang des dizaines pour chacun des deux nombres, soit **8** pour les dizaines des deux nombres. Pour les unités, on choisit les chiffres restants les plus grands, soit **5** pour le premier nombre et **2** pour le second. Les deux nombres cherchés sont donc **85** et **82**, et leur somme maximale vaut :

$$85 + 82 = \mathbf{167}.$$

La question qui ouvre la suite…

Tu sais désormais faire voyager la retenue et poser de grandes additions et soustractions avec des colonnes parfaites.

Mais imagine que le maçon du roi doive construire un immense mur de briques. Ce mur mesure **6 briques de long** et **4 briques de haut**. Pour connaître le nombre total de briques, il pourrait faire : $6 + 6 + 6 + 6$. Mais si le mur mesure 100 briques de long sur 8 briques de haut, additionner le même nombre encore et encore devient un cauchemar !

Comment les bâtisseurs ont-ils inventé un raccourci magique qui transforme les additions répétées en une danse de rectangles ?

Rendez-vous au **Chapitre 5 : Le Mur de Briques et les Rectangles Magiques** !

CHAPITRE 5 : Le Mur de Briques et les Rectangles Magiques

> « Pourquoi recompter dix fois ce que l'œil peut voir d'un seul bloc ? Ranger des objets en rangées régulières, c'est donner à notre esprit le super-pouvoir de multiplier l'espace et le temps. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi compter 24 briques une à une prend trop de temps, et comment la **multiplication (×)** fait gagner un temps précieux.
- La **commutativité sensible** : pourquoi tourner une tablette de chocolat d'un quart de tour (90°) ne change ni son goût ni le nombre de carrés ($4 \times 6 = 6 \times 4$).
- Comment apprendre les tables de multiplication sans souffrir grâce aux motifs géométriques et aux ruses des doigts (la table de 9 magique).
- Les **doubles** et les **moitiés**.
- Multiplier par 10 et par 100 en faisant glisser les chiffres d'une colonne vers la gauche.
- Ta première **multiplication posée** d'un nombre à deux chiffres par un chiffre.

---

1. Le problème : l'orage approche sur le chantier de briques

Les siècles ont passé. Les humains ne dorment plus dans des cavernes : ils ont bâti des villages solides au bord des fleuves.

Pour construire un grand grenier à grains capable de nourrir le village pendant l'hiver, les maçons ont moulé des briques d'argile et les ont posées au soleil pour sécher.

Soudain, un vent froid se lève. Le ciel bleu tourne au gris sombre, puis au noir d'encre : **un terrible orage d'été arrive** ! Le maître maçon crie en agitant les bras : *« Il faut couvrir les briques avec de grandes toiles goudronnées avant que l'averse ne les détrempe et ne les transforme en boue ! Combien de briques y a-t-il sur l'aire de séchage ? Dis-moi le compte exact, vite ! »*

Tu cours vers le chantier. Les briques ont été alignées par terre avec une grande propreté : Il y a **4 longues rangées**, et dans chaque rangée, il y a **6 briques**.

Fig. 19. – Le mur de briques : 4 rangées de 6 font 24

Si tu commences à pointer ton doigt sur chaque brique une par une : *« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… »* À la douzième brique, les premiers éclairs déchirent le ciel. À la quinzième, les premières gouttes de pluie s'écrasent dans la poussière. Tu n'auras jamais le temps de tout compter avant que tout soit détruit !

Tu pourrais faire une addition répétée :

$$6 + 6 + 6 + 6$$

$6 + 6 = 12$, puis $12 + 6 = 18$, puis $18 + 6 = 24$. C'est déjà bien plus rapide. Mais les bâtisseurs de l'Antiquité ont inventé un raccourci encore plus fulgurant : **la Multiplication**.

---

2. Le saut de géant : la multiplication

Regarde la forme dessinée par les briques au sol : ce n'est pas un désordre en vrac, c'est un magnifique **Rectangle** !

- Dans le sens de la hauteur : **4 lignes**.
- Dans le sens de la largeur : **6 colonnes**.

Au lieu de répéter l'addition « 6 plus 6 plus 6 plus 6 », on dit : *« J'ai 4 rangées de 6 briques. »* Et on écrit cela avec une petite croix oblique : **le signe** $\times$ (fois ou multiplié par).

$$4 \times 6 = 24$$

Ce petit signe $\times$ représente le croisement de deux directions : la ligne horizontale rencontre la colonne verticale pour tisser un quadrillage. **Multiplier, c'est fabriquer une surface rectangulaire en un éclair !**

Définition Fondamentale

📐 **Définition — La Multiplication** La **multiplication** est une opération qui remplace l'addition répétée d'un même nombre. Le symbole $\times$ se lit « **fois** » ou « **multiplié par** ».

$$4 \times 6 = \underbrace{6 + 6 + 6 + 6}_{4 \text{ fois le nombre } 6} = 24$$

Les nombres que l'on multiplie s'appellent les **facteurs**, et le résultat s'appelle le **produit**.

---

3. La tablette de chocolat : la commutativité à 90 degrés

Prends une tablette de chocolat dans ta cuisine. Elle a 4 rangées de 6 carrés. Pose-la devant toi en longueur : tu vois **4 rangées de 6 carrés** (4×6).

Maintenant, prends la tablette et fais-la pivoter d'un quart de tour sur la table (un angle droit de $90°$).



Fig. 20. – La commutativité par rotation 90°

Que vois-tu maintenant ? Tu vois **6 rangées de 4 carrés** (6×4).

Un seul carré de chocolat a-t-il fondu ? Non ! Quelqu'un a-t-il croqué un morceau pendant la rotation ? Non ! Le nombre de carrés sous tes yeux est rigoureusement le même :

$$4 \times 6 = 6 \times 4 = 24$$

> **📐 Propriété — La Commutativité de la multiplication**
>
> On peut **changer l'ordre des facteurs** sans changer le résultat. Tourner un rectangle sur le côté ne change jamais le nombre d'objets qu'il contient ! *Conséquence merveilleuse :* Quand tu apprends tes tables de multiplication, tu n'as que **la moitié du travail à faire** ! Dès que tu sais que $3 \times 8 = 24$, tu connais déjà automatiquement $8 \times 3 = 24$.

---

4. Les doubles et les moitiés

Avant d'explorer toutes les tables, il y a deux mots que tu entends tous les jours : le **double** et la **moitié**.



Fig. 21. – Double et moitié : symétrie multiplicative bilatérale

- **Le double**, c'est quand on prend une quantité **deux fois** ($n \times 2$ ou $n + n$).
  - Le double de 4, c'est $4 + 4 = 8$.
  - Le double de 10, c'est $10 + 10 = 20$.
- **La moitié**, c'est le partage équitable en deux parts exactement égales.
  - La moitié de 8, c'est 4.
  - La moitié de 20, c'est 10.

---

5. Voyage au cœur des tables de multiplication

Apprendre les tables par cœur en récitant comme un robot peut sembler ennuyeux. Mais quand on regarde les motifs cachés, chaque table a sa propre personnalité !

1. La table de 2 : les nombres pairs

Multiplier par 2, c'est simplement faire des pas de géant de deux en deux :

$$2, \quad 4, \quad 6, \quad 8, \quad 10, \quad 12, \quad 14, \quad 16, \quad 18, \quad 20$$

Tous les résultats sont des **nombres pairs** : ils se terminent toujours par 0, 2, 4, 6 ou 8.

2. La table de 5 : la danse de la main

Chaque main a 5 doigts. Donc deux mains font 10, trois mains font 15, quatre mains font 20… Les résultats de la table de 5 se terminent **toujours alternativement par 5 ou par 0** :

$$5, \quad 10, \quad 15, \quad 20, \quad 25, \quad 30, \quad 35, \quad 40, \quad 45, \quad 50$$

3. La table de 10 : le réveil du zéro

Multiplier par 10, c'est transformer chaque unité en dizaine ! Le chiffre glisse d'une colonne vers la gauche, et on place un 0 dans la colonne des unités :

$$3 \times 10 = 30 \qquad 7 \times 10 = 70 \qquad 12 \times 10 = 120$$

4. La table magique de 9 : le tour des dix doigts !

Pose tes dix doigts bien à plat devant toi sur la table. Tes doigts sont numérotés de 1 à 10, de gauche à droite (le pouce gauche est le 1, l'auriculaire droit est le 10).

> **🖐 Le tour de magie des doigts pour la table de 9**
>
> Tu veux calculer $\mathbf{9 \times 4}$? 1. Baisse ton 4e doigt (l'annulaire de la main gauche). 2. Regarde tes doigts :
> - À gauche du doigt baissé, il y a **3 doigts** debout : ce sont les dizaines (**30**).
> - À droite du doigt baissé, il y a **6 doigts** debout : ce sont les unités (**6**).
>
> 3. Réunis-les : **36** ! Et voilà : $9 \times 4 = 36$! *(Essaie avec 9×7 : baisse le 7e doigt. Il y a 6 doigts à gauche et 3 à droite : 63 ! C'est infaillible !)*

Fig. 22. – L'astuce magique des dix doigts pour la table de 9

---

6. Multiplier par 10, par 100 et par 1 000

Que se passe-t-il quand on multiplie un nombre par 10 ou par 100 ? Rappelons notre tableau de maisons :

Centaines	Dizaines	Unités	Valeur décimale
		4	4
	4	0	$4 \times 10 = 40$
4	0	0	$4 \times 100 = 400$

- Multiplier par **10** : chaque unité devient une dizaine. Le nombre glisse d'**une case vers la gauche**, et on ajoute un **0** à droite.
- Multiplier par **100** : chaque unité devient une centaine. Le nombre glisse de **deux cases vers la gauche**, et on ajoute **deux zéros** (**00**) à droite.

$$7 \times 100 = 700 \qquad 25 \times 100 = 2\,500$$

---

7. Poser une multiplication : un nombre à deux chiffres par un chiffre

Imaginons que tu doives préparer des paniers pour 3 classes d'école. Chaque classe a besoin de **24 cahiers**. Combien de cahiers dois-tu distribuer ?

$$24 \times 3$$

Posons le calcul en colonnes, exactement comme pour l'addition :

```
     d   u
     2   4
 ×       3
 ---------
```

1. **Étape 1 : Le 3 multiplie les unités.**

   $$3 \times 4 \text{ unités} = 12 \text{ unités}$$

   Dans 12, il y a 2 unités et 1 dizaine :

   - On pose le **2** sous le trait dans la colonne des unités.
   - On garde la **1 dizaine en retenue** dans sa tête ou dans un petit rond en haut des dizaines.

```
    (1) <--- retenue
     d   u
     2   4
 ×       3
 ---------
         2
```

2. **Étape 2 : Le 3 multiplie les dizaines.**

   $$3 \times 2 \text{ dizaines} = 6 \text{ dizaines}$$

   On n'oublie surtout pas d'ajouter la retenue :

   $$6 + 1 = 7 \text{ dizaines}$$

   On pose le **7** dans la colonne des dizaines.

```
    (1)
     d   u
     2   4
 ×       3
 ---------
     7   2      Le total est 72 cahiers !
```

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Multiplier d'abord, ajouter la retenue après !** Dans la colonne des dizaines, ne fais **jamais** l'addition avant la multiplication ! Si tu fais $(1 + 2) \times 3 = 3 \times 3 = 9$, c'est faux ! La règle sacrée : **on multiplie d'abord ($3 \times 2 = 6$), et on ajoute la retenue après ($6 + 1 = 7$)**.

7bis. Le grand raccourci : La multiplication posée à deux chiffres

Quand tu as compris comment multiplier par un chiffre, les marchands ont inventé un raccourci génial pour multiplier par un nombre à **deux chiffres** comme 146×23.
Ce calcul se fait en **deux étages** bien rangés :



Fig. 23. – La multiplication posée à deux étages avec retenue

```
     1   4   6
×        2   3
-------------
     4   3   8      <-- Étage 1 : 146 × 3 unités
+2   9   2   0      <-- Étage 2 : 146 × 2 dizaines (LE ZÉRO ROUGE OBLIGATOIRE !)
-------------
 3   3   5   8      <-- Somme finale des deux étages
```

🧭 L'Algorithme Mécanique en 4 Gestes Simples :

1. Multiplier

tout le nombre du haut par le chiffre des **unités** du bas ($146 \times 3 = 438$). 2. À la ligne du dessous, poser immédiatement un **zéro rouge** dans la colonne des unités (car on passe aux dizaines !). 3. Multiplier tout le nombre du haut par le chiffre des **dizaines** du bas ($146 \times 2 = 292$). 4. Tracer un trait et **additionner les deux étages**.

🛠️ Le Laboratoire des Cas Limites : Que se passe-t-il avec ZÉRO ?

(Cette section est isolée pour que tu puisses la lire tranquillement sans mélanger avec tes premières tables.)

Une fois que tu as compris que $4 \times 3 = 12$ briques, posons-nous deux questions extrêmes aux frontières du calcul :

1. Combien font 4×0 ?

- **L'expérience de pensée :** Imagine que le contremaître prépare un terrain de 4 briques de long, mais qu'il décide de ne poser **zéro rangée** de briques (il ne commence même pas le chantier). Combien y a-t-il de briques sur le sol ? **Aucune.**
- **La suite qui descend :**
  - $4 \times 3 = 12$
  - $4 \times 2 = 8$ (on retire 4)
  - $4 \times 1 = 4$ (on retire 4)
  - $4 \times 0 = 0$ (on retire encore 4 !)
- **La règle universelle :** Tout nombre multiplié par zéro donne toujours **zéro** :

$$a \times 0 = 0 \quad \text{et} \quad 0 \times a = 0$$

En mathématiques, on dit que **zéro est un élément absorbant** : il avale tout ce qu'il touche !

2. Et que fait 0×0 ?

- Tu n'as préparé aucune brique en largeur (0), et tu ne bâtis aucune rangée en hauteur (0).
- Il n'y a ni brique, ni mur, ni terrain : le résultat est tout simplement **0** !

Les Gammes du Praticien : Entraînement Mécanique (Chronométrable)

Pour devenir un maître du calcul, entraîne tes doigts comme un pianiste fait ses gammes. Réponds le plus vite possible sans recompter un par un :

Défi	Calcul	Ta réponse	Auto-évaluation
1	7×8	.....	
2	6×9	.....	
3	9×0	.....	
4	4×7	.....	
5	8×8	.....	
6	0×0	.....	
7	52×10	.....	
8	23×3 posé	.....	
9	15×4 posé	.....	
10	12×11	.....	

---

8. Cinq exemples résolus pas à pas

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Traduire une situation en multiplication
Énoncé : Un fleuriste prépare 5 bouquets. Dans chaque bouquet, il met 6 roses. Combien de roses utilise-t-il au total ? *Méthode :* C'est une addition répétée : $6 + 6 + 6 + 6 + 6$. On écrit la multiplication : 5×6. Dans la table de 5 (ou la table de 6) : $5 \times 6 = 30$. *Réponse :* Le fleuriste utilise **30 roses**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Trouver le double et la moitié
Énoncé : Léo a 14 billes. Son grand frère en a le double, et sa petite sœur en a la moitié. Combien de billes ont le frère et la sœur ? *Résolution :*
- Le frère a le double : $14 \times 2 = 14 + 14 = \mathbf{28}$ **billes**.
- La sœur a la moitié : on partage 14 en deux parts égales ($7 + 7 = 14$). La sœur a **7 billes**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Multiplier par 10 et 100 de tête
Énoncé : Calcule mentalement : 8×10, 8×100, et 43×10. *Résolution :*
- $8 \times 10 = \mathbf{80}$ (un zéro de plus).
- $8 \times 100 = \mathbf{800}$ (deux zéros de plus).
- $43 \times 10 = \mathbf{430}$ (on décale 43 vers la gauche et on ajoute 0).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Multiplication posée sans retenue

Calcul : Poser et calculer 32×3. *Pas à pas :*

```
    d   u
    3   2
×       3
---------
    9   6
```

- *Unités :* $3 \times 2 = 6$.
- *Dizaines :* $3 \times 3 = 9$. Résultat : $32 \times 3 = 96$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Multiplication posée avec retenue

Calcul : Poser et calculer 18×4. *Pas à pas :*

- Unités : $4 \times 8 = 32$. Je pose 2 et je retiens 3.
- Dizaines : $4 \times 1 = 4$, plus la retenue 3 : $4 + 3 = 7$.

```
   (3)
    d   u
    1   8
×       4
---------
    7   2
```

Résultat : $18 \times 4 = 72$.

Ce qu'il faut retenir

1. La **multiplication ($\times$)** remplace l'addition répétée de la même quantité ($4 \times 6 = 6 + 6 + 6 + 6$).
2. Elle est **commutative** : on peut inverser l'ordre des facteurs ($4 \times 6 = 6 \times 4 = 24$). C'est comme tourner un rectangle ou une tablette de chocolat d'un quart de tour !
3. **Le double** c'est multiplier par 2 ; **la moitié** c'est partager en deux parts égales.
4. Pour multiplier par **10**, on décale d'une colonne vers la gauche (on ajoute un zéro) ; pour multiplier par **100**, on décale de deux colonnes (on ajoute deux zéros).
5. Pour poser une multiplication : on multiplie d'abord les unités, on note l'éventuelle retenue, puis on multiplie les dizaines et on ajoute la retenue à la fin.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 5.1 De l'addition à la multiplication. Écris chaque addition sous la forme d'une multiplication, puis calcule le résultat :

- $5 + 5 + 5 = ... \times ... = ...$
- $7 + 7 = ... \times ... = ...$
- $3 + 3 + 3 + 3 = ... \times ... = ...$
- $10 + 10 + 10 + 10 + 10 = ... \times ... = ...$

Exercice 5.2 Les tables en éclair. Réponds le plus vite possible sans compter sur tes doigts :

- $2 \times 7 = ...$
- $5 \times 4 = ...$
- $3 \times 6 = ...$
- $9 \times 2 = ...$
- $10 \times 8 = ...$

Exercice 5.3 Doubles et moitiés. 1. Quel est le double de 6 ? de 9 ? de 15 ? 2. Quelle est la moitié de 10 ? de 16 ? de 40 ?

Exercice 5.4 Les zéros magiques. Calcule mentalement :

- $6 \times 10 = ...$
- $9 \times 100 = ...$
- $17 \times 10 = ...$
- $30 \times 10 = ...$

Exercice 5.5 La boîte de chocolats. Une boîte de délicieux chocolats contient 3 rangées de 8 chocolats. Combien y a-t-il de chocolats dans cette boîte ?

Niveau (Je réfléchis et je calcule)

Exercice 5.6 La ruse de la table de 9. Utilise l'astuce des dix doigts pour trouver :

- 9×3
- 9×6
- 9×8

Vérifie à chaque fois que la somme des deux chiffres du résultat fait toujours 9 !

Exercice 5.7 Pose et calcule ces multiplications sans retenue : - 21×4 - 33×2 - 42×2

Exercice 5.8 Pose et calcule ces multiplications avec retenue : - 26×3 - 35×2 - 17×5

Exercice 5.9 Le carrelage de la cuisine. Le sol d'une cuisine est recouvert d'un carrelage rectangulaire de 7 carreaux de large sur 9 carreaux de long. 1. Combien de carreaux y a-t-il en tout ? 2. Si le carreleur avait posé les carreaux dans l'autre sens (9 de large sur 7 de long), combien y aurait-il eu de carreaux ?

Exercice 5.10 Le paquet de biscuits. Un paquet contient 4 sachets de 6 biscuits chacun. 1. Combien de biscuits y a-t-il dans un paquet ? 2. Maman achète 3 paquets entiers pour la kermesse. Combien de biscuits a-t-elle achetés au total ?

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 5.11 Le rectangle mystère. « Je suis un nombre de la table de 4. Je suis aussi dans la table de 6. Je suis compris entre 20 et 30. Qui suis-je ? »

Exercice 5.12 Le produit mystère à trous. Retrouve le chiffre caché sous l'étoile :

```
   2  ?
×     4
--------
   9  6
```

Exercice 5.13 Les pattes dans la ferme. Dans un pré, il y a 4 poules (2 pattes chacune) et 3 vaches (4 pattes chacune). Combien de pattes y a-t-il au total dans le pré ? Écris toute l'opération en une seule ligne.

Exercice 5.14 Multiplier sans poser : la distributivité. Pour calculer mentalement 14×3, un champion décompose 14 en $10 + 4$:

- $10 \times 3 = 30$
- $4 \times 3 = 12$
- $30 + 12 = 42$!

Utilise cette astuce géniale pour calculer mentalement :

- 13×4
- 15×3

Exercice 5.15 Le tournoi d'échecs. Un échiquier possède 8 rangées de 8 cases carrées alternées blanches et noires. 1. Combien de cases l'échiquier compte-t-il au total ? 2. Comme la moitié des cases sont noires et l'autre moitié blanches, combien y a-t-il de cases noires sur l'échiquier ?

Solutions

Solution 5.1 - $5 + 5 + 5 = 3 \times 5 = \mathbf{15}$. - $7 + 7 = 2 \times 7 = \mathbf{14}$. - $3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3 = \mathbf{12}$. - $10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 5 \times 10 = \mathbf{50}$.

Solution 5.2 - $2 \times 7 = \mathbf{14}$ - $5 \times 4 = \mathbf{20}$ - $3 \times 6 = \mathbf{18}$ - $9 \times 2 = \mathbf{18}$ - $10 \times 8 = \mathbf{80}$

Solution 5.3 1. Doubles : $6 \times 2 = \mathbf{12}$; $9 \times 2 = \mathbf{18}$; $15 \times 2 = \mathbf{30}$. 2. Moitiés : la moitié de 10 est $\mathbf{5}$; la moitié de 16 est $\mathbf{8}$; la moitié de 40 est $\mathbf{20}$.

Solution 5.4 - $6 \times 10 = \mathbf{60}$ - $9 \times 100 = \mathbf{900}$ - $17 \times 10 = \mathbf{170}$ - $30 \times 10 = \mathbf{300}$

Solution 5.5 $3 \text{ rangées de } 8 = 3 \times 8 = \mathbf{24 \text{ chocolats}}$.

Solution 5.6 - $9 \times 3 = \mathbf{27}$ (doigt 3 baissé : 2 dizaines et 7 unités ; $2 + 7 = 9$). - $9 \times 6 = \mathbf{54}$ (doigt 6 baissé : 5 dizaines et 4 unités ; $5 + 4 = 9$). - $9 \times 8 = \mathbf{72}$ (doigt 8 baissé : 7 dizaines et 2 unités ; $7 + 2 = 9$).

Solution 5.7 - 21×4 : unités $4 \times 1 = 4$, dizaines $4 \times 2 = 8 \Longrightarrow \mathbf{84}$. - 33×2 : unités $2 \times 3 = 6$, dizaines $2 \times 3 = 6 \Longrightarrow \mathbf{66}$. - 42×2 : unités $2 \times 2 = 4$, dizaines $2 \times 4 = 8 \Longrightarrow \mathbf{84}$.

Solution 5.8 - 26×3 : unités $3 \times 6 = 18$ (pose 8, retiens 1) ; dizaines $3 \times 2 = 6$, plus retenue $1 : 6 + 1 = 7 \Longrightarrow \mathbf{78}$. - 35×2 : unités $2 \times 5 = 10$ (pose 0, retiens 1) ; dizaines $2 \times 3 = 6 + 1 = 7 \Longrightarrow \mathbf{70}$. - 17×5 : unités $5 \times 7 = 35$ (pose 5, retiens 3) ; dizaines $5 \times 1 = 5 + 3 = 8 \Longrightarrow \mathbf{85}$.

Solution 5.9 1. $7 \times 9 = \mathbf{63 \text{ carreaux}}$. 2. $9 \times 7 = \mathbf{63 \text{ carreaux}}$ également, grâce à la commutativité.

Solution 5.10 1. Dans un paquet : $4 \times 6 = \mathbf{24 \text{ biscuits}}$. 2. Dans 3 paquets : $3 \times 24 = 3 \times 20 + 3 \times 4 = 60 + 12 = \mathbf{72 \text{ biscuits}}$.

Solution 5.11 Table de 4 entre 20 et 30 : 24, 28. Table de 6 entre 20 et 30 : 24. Le nombre mystère commun est **24** ($4 \times 6 = 24$).

Solution 5.12 Dans les unités, $4 \times \star$ doit se terminer par 6. Dans la table de 4, $4 \times 4 = 16$ (se termine par 6) ou $4 \times 9 = 36$. Testons $\star = 4$: $4 \times 4 = 16$ (retenue 1). Dizaines : $4 \times 2 = 8$, plus la retenue $1 : 8 + 1 = 9$. Ça donne bien 96 ! Le chiffre caché est donc $\star = \mathbf{4}$.

Solution 5.13 Pattes de poules : $4 \times 2 = 8$. Pattes de vaches : $3 \times 4 = 12$. Total : $(4 \times 2) + (3 \times 4) = 8 + 12 = \mathbf{20 \text{ pattes}}$.

Solution 5.14 - Pour 13×4 : $(10 \times 4) + (3 \times 4) = 40 + 12 = \mathbf{52}$. - Pour 15×3 : $(10 \times 3) + (5 \times 3) = 30 + 15 = \mathbf{45}$.

Solution 5.15 1. $8 \text{ rangées de } 8 = 8 \times 8 = \mathbf{64} \text{ cases}$. 2. La moitié de 64, c'est la moitié de 60 (30) plus la moitié de 4 (2), soit **32 cases noires** (et 32 cases blanches).

Solution des Gammes du Praticien :

1. $7 \times 8 = \mathbf{56}$; 2. $6 \times 9 = \mathbf{54}$; 3. $9 \times 0 = \mathbf{0}$; 4. $4 \times 7 = \mathbf{28}$; 5. $8 \times 8 = \mathbf{64}$; 6. $0 \times 0 = \mathbf{0}$; 7. $52 \times 10 = \mathbf{520}$; 8. $23 \times 3 = \mathbf{69}$; 9. $15 \times 4 = \mathbf{60}$; 10. $12 \times 11 = \mathbf{132}$.

La question qui ouvre la suite…

Te voilà désormais capable de multiplier l'espace et de calculer le nombre de briques d'un mur en un éclair.

Mais quand les maçons veulent construire le mur, ils ont besoin de savoir : **quelle longueur fait ce mur ?** Les bâtisseurs de l'Égypte antique utilisaient leur propre corps : la longueur de leur avant-bras, de leur pied ou de leur pas. Mais le pharaon avait de grands bras, et son serviteur avait de petits bras ! Comment faire pour que les pierres taillées s'emboîtent sans jamais se briser ?

Et comment mesurer le temps qui passe ou le poids d'un sac d'or ?

Rendez-vous au **Chapitre 6 : La Coudée du Pharaon et le Sablier** !

CHAPITRE 6 : La Coudée du Pharaon et le Sablier

> « Pour mesurer le monde, les premiers humains ont utilisé ce qu'ils avaient de plus proche : leurs doigts, leurs pieds et leurs bras. Mais tant que la mesure change avec la taille de celui qui mesure, les maisons s'écroulent et les marchands se disputent. Il a fallu inventer une mesure universelle que personne ne peut tricher. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment les anciens mesuraient avec leur corps (le pouce, le pied, le pas, la coudée) et pourquoi cela créait des disputes géantes !
- L'invention de l'étalon unique : le **mètre (m)** et le **centimètre (cm)**.
- Comment mesurer un objet avec une règle graduée **sans jamais tomber dans le piège du zéro**.
- Peser le monde : la balance de Roberval, le **gramme (g)** et le **kilogramme (kg)**.
- Les liquides et les contenances : le **litre (L)**.
- Dompter le temps qui passe : le calendrier des saisons, les 12 mois, et **lire l'heure sur une horloge à aiguilles**.
- La monnaie de tous les jours : les pièces, les billets et les centimes d'euro.

---

1. Le problème : la discorde des tailleurs de pierre d'Égypte

Sous le soleil brûlant des bords du Nil, il y a quatre mille ans, des centaines d'ouvriers construisent un grand temple pour le pharaon.

L'architecte en chef trace les plans sur un papyrus : *« Je veux que chaque bloc de pierre pour le grand portail mesure exactement **trois coudées** de long ! »*

Deux tailleurs de pierre se mettent au travail dans la carrière :

- Le premier s'appelle Senned. C'est un colosse de deux mètres de haut, avec de longs bras puissants comme des troncs d'arbre.
- Le second s'appelle Bak. C'est un jeune homme menu et agile, avec des bras fins et courts.

Qu'est-ce qu'une **coudée** pour eux ? C'est la distance entre la pointe du coude et le bout du majeur (le doigt le plus long de la main) !



Fig. 24. – La coudée royale pharaonique : étalon anatomique de mesure

Chacun mesure trois coudées avec son propre bras, taille son bloc de pierre de calcaire blanc, et fait transporter son bloc sur le chantier.

Quand l'architecte veut assembler le linteau du portail, c'est la catastrophe ! Le bloc taillé par le géant Senned dépasse de vingt centimètres, tandis que le bloc taillé par le petit Bak est beaucoup trop court et s'effondre dans la poussière ! Les deux tailleurs de pierre s'empoignent et s'accusent mutuellement d'avoir triché.

Pourquoi cette catastrophe est-elle arrivée ? Parce que **le corps de chaque être humain est différent**. Si le pas d'un géant est plus grand que le pas d'un enfant, et si le pied d'un grand-père est plus long que le pied de son petit-fils, personne sur Terre ne pourra jamais bâtir une maison droite !

---

2. Du corps à la règle : le mètre et le centimètre

Pour mettre fin aux querelles, le pharaon ordonne une loi stricte : *« Désormais, il n'y aura plus qu'une seule coudée dans tout le royaume : **la coudée de mon propre bras** ! »*

Des sculpteurs gravent cette longueur dans une barre de granit noir poli, conservée précieusement dans le trésor royal. On fabrique des copies en bois pour tous les chantiers : c'est un **étalon de mesure**.

Des siècles plus tard, pendant la Révolution française, les savants ont voulu faire encore mieux : une mesure qui n'appartienne à aucun roi, mais à tous les habitants de la Terre. Ils ont inventé **le Mètre**.

💡 Découverte & Histoire — Les Mesures Anatomiques Historiques

- Le pouce : La largeur du pouce d'un adulte (~ 2 à 3 cm)
- Le pied : La longueur d'un pied chaussé (~ 30 cm)
- Le pas : Un grand pas d'adulte en marchant (~ 1 mètre)

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Le Mètre et le Centimètre**

- **Le mètre (m)** est l'unité officielle de longueur. C'est environ la largeur d'une grande porte de chambre, ou la longueur d'un grand pas d'adulte.
- Pour mesurer des petits objets (comme un crayon ou une gomme), on partage un mètre en 100 petites tranches égales : chaque tranche s'appelle un **centimètre (cm)**.
- Le mot « centimètre » veut dire : *centième de mètre*.

$$1 \text{ mètre } (m) = 100 \text{ centimètres } (cm)$$

Comment mesurer avec ta règle sans te faire piéger

Prends ta règle d'écolier en plastique.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Le bord de la règle n'est pas le zéro !** Beaucoup d'enfants posent le bout en plastique de leur règle contre le début de l'objet à mesurer. C'est une erreur ! Sur la plupart des règles, il y a un petit espace vide avant le premier trait. **Pour mesurer juste, tu dois aligner le trait du ZÉRO (0) avec le tout début de ton objet.** Ensuite, tu regardes quel nombre arrive exactement à la fin de l'objet.



Fig. 25. – Mesure à la règle graduée : alignement sur zéro et lecture directe

---

3. Les masses : la balance de Roberval et le kilogramme

Combien pèse ton cartable ? Combien pèse une plume d'oiseau ?

Pour peser, on utilise une balance à deux plateaux perfectionnée en 1669 par le mathématicien et physicien français **Gilles Personne de Roberval**. Contrairement aux balances antiques à simple fléau suspendu où l'équilibre dépendait de l'emplacement exact des objets sur le plateau, la balance de Roberval utilise un ingénieux mécanisme de parallélogramme articulé dissimulé sous les plateaux. Grâce à ce système, les plateaux restent rigoureusement horizontaux en toute position et la pesée est fidèle, que l'objet soit placé au centre ou sur le bord ! Sur un plateau, on pose l'objet à peser (par exemple un beau melon). Sur l'autre plateau, on pose des **masses marquées** en métal jusqu'à ce que l'aiguille soit parfaitement verticale au milieu.



Fig. 26. – Pesée du melon : équilibre de masse de 1 kilogramme

Définition Fondamentale

Définition — Le Kilogramme et le Gramme

- Pour les objets lourds, on utilise le **kilogramme (kg)**. Un paquet de farine ou une brique de lait pèse environ 1 kg.
- Pour les objets très légers, on partage un kilogramme en 1 000 petits morceaux : chaque morceau est un **gramme (g)**.
- Un trombone à papier ou un grain de maïs pèse environ 1 g.
- Le mot « kilo » vient du grec et veut dire **mille**.

$$1 \text{ kilogramme } (kg) = 1\,000 \text{ grammes } (g)$$

Une demi-livre (un demi-kilogramme) vaut 500 g.

---

4. Les contenances : le litre

Combien d'eau y a-t-il dans ton bain ? Combien de jus d'orange dans ton verre ? La quantité d'espace liquide qui tient à l'intérieur d'un récipient s'appelle sa **contenance** ou sa capacité.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Le Litre (L)** L'unité de mesure des liquides est **le litre (L)**.

- Une grande bouteille d'eau minérale ordinaire contient souvent 1 litre (ou $1,5$ L).
- Une brique de soupe de légumes contient 1 litre.
- Une petite canette de soda contient environ un tiers de litre (33 cL).
- Un grand seau d'eau contient environ 10 litres.
- Une baignoire pleine contient environ 150 litres.

---

5. Dompter le temps qui s'écoule : du sablier à l'horloge

Contrairement à une corde qu'on peut poser par terre ou à une pierre qu'on peut poser sur la balance, **le temps ne s'arrête jamais**. On ne peut pas le toucher avec les doigts.

Pour mesurer le temps, les humains ont commencé par observer le ciel : 1. **Le Jour et la Nuit** : la Terre tourne sur elle-même. Quand le soleil brille, c'est le jour ; quand il disparaît, c'est la nuit. Un jour complet dure **24 heures**. 2. **La Semaine** : elle dure **7 jours** (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche). 3. **Le Mois** : c'est le temps qu'il faut à la Lune pour faire son tour complet (environ 30 ou 31 jours, sauf février qui en a 28 ou 29). 4. **L'Année** : c'est le temps que met la Terre pour faire un grand tour autour du Soleil. Elle compte **12 mois** (365 jours) et traverse les quatre saisons (printemps, été, automne, hiver).

Comment lire l'heure sur une horloge à aiguilles

Sur le cadran rond d'une montre, il y a 12 nombres et deux aiguilles qui tournent toujours dans le même sens (le sens des aiguilles d'une montre) :



Fig. 27. – Le cadran circulaire : 12 heures et 60 minutes

- **La petite aiguille (courte et lente)** : c'est l'aiguille des **heures**. Elle met 12 heures à faire un tour complet. Elle avance très lentement d'un nombre à l'autre.
- **La grande aiguille (longue et rapide)** : c'est l'aiguille des **minutes**. Elle fait un tour complet en **60 minutes** (1 heure).

Méthode — Lire l'heure pas à pas

1. **L'heure pile :** Quand la grande aiguille pointe tout en haut sur le **12**, la petite aiguille donne l'heure exacte. *Exemple : petite aiguille sur 4, grande sur 12 → il est 4 heures pile (*$4\ \text{h}\ 00$*).* 2. **La demi-heure (30 minutes) :** Quand la grande aiguille pointe tout en bas sur le **6**, elle a fait la moitié du tour. On dit qu'il est « et demie ». *Exemple : petite aiguille entre 4 et 5, grande sur 6 → il est 4 heures et demie (*$4\ \text{h}\ 30$*).* 3. **Le quart d'heure (15 minutes) :** Grande aiguille à droite sur le **3** → « et quart » ($4\ \text{h}\ 15$). 4. **Trois quarts d'heure (45 minutes) :** Grande aiguille à gauche sur le **9** → « moins le quart » ($4\ \text{h}\ 45$).

$$1\ \text{heure}\ (h) = 60\ \text{minutes}\ (min)$$

$$1\ \text{minute}\ (min) = 60\ \text{secondes}\ (s)$$

---

6. La monnaie : pièces et billets d'euro

Pour acheter du pain chez le boulanger ou payer un livre, nous n'échangeons plus des chameaux ou des sacs de blé : nous utilisons **la monnaie**. En France et dans beaucoup de pays d'Europe, la monnaie est **l'Euro (€)**.

- **Les pièces métalliques :**
  - Les pièces rouges : $1\ \text{centime}$, $2\ \text{centimes}$, $5\ \text{centimes}$.
  - Les pièces jaunes : $10\ \text{centimes}$, $20\ \text{centimes}$, $50\ \text{centimes}$.
  - Les pièces bicolores (or et argent) : $\mathbf{1\ euro}$ et $\mathbf{2\ euros}$.
- **Les billets en papier :**
  - Billets de 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €.

Règle de troc — Les centimes et l'euro

Exactement comme pour le centimètre et le mètre :

$$1\ \text{Euro}\ (€) = 100\ \text{centimes}\ (c)$$

Pour fabriquer une pièce de 1 euro, il faut réunir cent centimes !

---

7. Cinq exemples résolus pas à pas

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Mesurer un pinceau à la règle *Énoncé :* On place un pinceau le long d'une règle. Le manche commence bien au trait 0. La pointe des poils arrive exactement au trait 14. Quelle est la longueur du pinceau ? *Résolution :* Comme le début est aligné sur 0, la longueur se lit directement à la fin : le pinceau mesure $\mathbf{14\ cm}$. *(Si le pinceau commençait au trait 2 et finissait au trait 14, il mesurerait* $14 - 2 = 12\ \text{cm}$*).*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Comparer des longueurs en mètres et centimètres *Énoncé :* Un ruban bleu mesure $1\ \text{m}\ 25\ \text{cm}$. Un ruban rouge mesure $140\ \text{cm}$. Quel ruban est le plus long ? *Méthode :* On convertit tout dans la même unité (les centimètres) :

- Ruban bleu : $1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$, donc $1\ \text{m}\ 25\ \text{cm} = 100 + 25 = 125\ \text{cm}$.
- Ruban rouge : $140\ \text{cm}$. Comme $140 > 125$, le **ruban rouge** est le plus long.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Équilibrer un panier sur la balance

Énoncé : Pour peser un sac de pommes, on le pose sur le plateau gauche de la balance de Roberval. Sur le plateau droit, on pose une masse de $1\ \text{kg}$, une masse de $500\ \text{g}$ et deux masses de $100\ \text{g}$. Les plateaux sont parfaitement équilibrés. Combien pèse le sac de pommes ? *Résolution :* Additionnons les masses en grammes :

- $1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$.
- Les autres masses : $500 + 100 + 100 = 700\ \text{g}$.
- Total : $1\,000 + 700 = 1\,700\ \text{g}$, ce qui s'écrit aussi $\mathbf{1\ kg\ 700\ g}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Calculer la durée d'un film *Énoncé :* Un dessin animé commence à $14\ \text{h}\ 15$ et se termine à $15\ \text{h}\ 15$. Combien de temps a duré le dessin animé ? *Résolution :* Les minutes sont identiques ($15\ \text{min}$). On regarde les heures : de 14 heures à 15 heures, il s'est écoulé exactement $\mathbf{1\ heure}$ (soit 60 minutes).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Rendre la monnaie à la boulangerie

Énoncé : Tu achètes une baguette de pain qui coûte $1\ €\ 20\ \text{c}$. Tu donnes une pièce de $2\ €$ à la boulangère. Combien d'argent doit-elle te rendre ? *Méthode :* Convertissons en centimes :

- $2\ € = 200\ \text{centimes}$.
- Le pain coûte $1\ €\ 20\ \text{c} = 120\ \text{centimes}$.
- On fait la soustraction : $200 - 120 = 80\ \text{centimes}$. La boulangère doit te rendre $\mathbf{80\ centimes}$ (par exemple une pièce de 50 c, une de 20 c et une de 10 c).

Ce qu'il faut retenir

1. Pour que tout le monde soit d'accord, on utilise des **unités officielles étalons** :
   - Longueurs : le **mètre (m)** et le **centimètre (cm)** ($1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$).
   - Masses : le **kilogramme (kg)** et le **gramme (g)** ($1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$).
   - Contenances : le **litre (L)**.
2. Pour mesurer avec une règle, on place toujours le trait **0** au début de l'objet.
3. Le temps s'organise en jours (24 h), semaines (7 j), mois (30 ou 31 j) et années (12 mois).
4. Sur une horloge : la petite aiguille indique les **heures**, la grande indique les **minutes**. $1\ \text{h} = 60\ \text{min}$.
5. $1\ \text{euro} = 100\ \text{centimes}$.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 6.1 Choisis la bonne unité (mm, cm ou m) :

1. La longueur d'une coccinelle : 7 ...
2. La hauteur de la porte du salon : 2 ...
3. La longueur d'un stylo à bille : 15 ...
4. La longueur de la cour de récréation : 30 ...

Exercice 6.2 Conversions simples. Complète les pointillés :

- $2\ \text{m} = \ldots\ \text{cm}$
- $4\ \text{m} = \ldots\ \text{cm}$
- $300\ \text{cm} = \ldots\ \text{m}$
- $1\ \text{kg} = \ldots\ \text{g}$
- $3\ \text{kg} = \ldots\ \text{g}$

Exercice 6.3 Choisis la bonne unité de masse (g ou kg) : 1. Un chaton nouveau-né : 150 ... 2. Un sac de ciment : 25 ... 3. Une tablette de chocolat : 100 ... 4. Un cartable rempli de livres : 3 ...

Exercice 6.4 Lire l'horloge. Quelle heure est-il dans chaque cas ? 1. La petite aiguille est sur le 8, la grande aiguille est sur le 12. 2. La petite aiguille est entre le 2 et le 3, la grande aiguille est sur le 6. 3. La petite aiguille est sur le 11, la grande aiguille est sur le 12.

Exercice 6.5 Compter la monnaie. Combien d'argent y a-t-il dans cette tirelire ?

- Un billet de 10 €
- Deux pièces de 2 €
- Une pièce de 1 €
- Trois pièces de 10 centimes

Niveau (Je réfléchis et je mesure)

Exercice 6.6 Le piège de la règle cassée. Un élève distrait a une règle cassée dont le bout est arraché : le zéro n'existe plus ! Il place sa gomme contre le trait de **3 cm**, et la gomme se termine exactement au trait de **7 cm**. Quelle est la longueur réelle de la gomme ? Écris le calcul.

Exercice 6.7 La potion magique du sorcier. Un chaudron contient déjà $3\ \text{litres}$ d'eau de source. Le sorcier y verse :

- 2 bouteilles de $1\ \text{litre}$ de jus de crapaud,
- 4 bouteilles de $1\ \text{demi-litre}$ ($50\ \text{cL}$) de bave d'escargot.

Combien de litres de potion magique y a-t-il au total dans le chaudron ? *(Indice : 2 demi-litres font 1 litre entier !)*

Exercice 6.8 Les jours de la semaine. 1. Si nous sommes mardi, quel jour serons-nous dans exactement 3 jours ? 2. Quel jour étions-nous avant-hier ? 3. Dans une semaine complète, combien y a-t-il de jours d'école si tu as classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi ?

Exercice 6.9 Le sac trop lourd pour l'avion. Pour monter dans l'avion de vacances, une valise ne doit pas peser plus de $20\ \text{kg}$. La valise de papa pèse $14\ \text{kg}$. Il veut y ajouter un gros dictionnaire de $3\ \text{kg}$ et une boîte de conserves de $4\ \text{kg}$. La valise pourra-t-elle monter dans l'avion ?

Exercice 6.10 Payer l'appoint. Un livre de contes coûte $7\ €\ 50\ \text{c}$. Trouve une façon de payer cette somme exacte en utilisant le plus petit nombre possible de pièces et de billets.

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 6.11 L'énigme de la bougie qui fond. Une bougie mesure $24\ \text{cm}$ de haut à 18 heures quand on l'allume. Chaque heure qui passe, elle brûle et perd exactement $3\ \text{cm}$ de hauteur. 1. Quelle taille fera la bougie à 21 heures ? 2. À quelle heure la bougie sera-t-elle complètement éteinte (hauteur 0 cm) ?

Exercice 6.12 Le saut de la grenouille mesuré. Une petite grenouille verte fait des sauts de $15\ \text{cm}$. Elle part du trait 0 d'un mètre gradué de $100\ \text{cm}$. Combien de sauts doit-elle faire pour dépasser la ligne d'arrivée des $100\ \text{cm}$? Sur quel centimètre atterrira-t-elle à la fin de son dernier saut ?

Exercice 6.13 Les douze coups de minuit. Une vieille horloge sonne un coup à 1 heure, deux coups à 2 heures, trois coups à 3 heures, et ainsi de suite jusqu'à 12 coups à midi. Combien de coups au total cette horloge sonne-t-elle entre 1 heure du matin et 6 heures du matin inclus ?

Exercice 6.14 Le mystère des deux bouteilles. Tu es au bord d'une rivière avec deux seaux non gradués : un seau de **3 litres** et un seau de **5 litres**. Comment peux-tu faire pour mesurer exactement **4 litres** d'eau à ramener au village ?

Exercice 6.15 Le trésor des centimes. Léo a une tirelire pleine de pièces de 20 centimes et de pièces de 50 centimes. Il a exactement 4 pièces au total, et elles valent ensemble $1 \text{ euro } 40 \text{ centimes}$ (140 c). Combien de pièces de 20 centimes et combien de pièces de 50 centimes possède-t-il ?

Solutions

Solution 6.1 1. Longueur d'une coccinelle : 7 $\boldsymbol{mm}$ (un insecte se mesure en millimètres !). 2. Hauteur de la porte : 2 $\boldsymbol{m}$. 3. Longueur d'un stylo : 15 $\boldsymbol{cm}$. 4. Cour de récréation : 30 $\boldsymbol{m}$.

Solution 6.2 Conversions directes :

- $2 \text{ m} = \mathbf{200} \text{ cm}$
- $4 \text{ m} = \mathbf{400} \text{ cm}$
- $300 \text{ cm} = \mathbf{3} \text{ m}$
- $1 \text{ kg} = \mathbf{1\,000} \text{ g}$
- $3 \text{ kg} = \mathbf{3\,000} \text{ g}$

Solution 6.3 1. Un chaton : 150 $\boldsymbol{g}$. 2. Sac de ciment : 25 $\boldsymbol{kg}$. 3. Tablette de chocolat : 100 $\boldsymbol{g}$. 4. Cartable : 3 $\boldsymbol{kg}$.

Solution 6.4 1. Il est **8 heures pile** ($8 \text{ h } 00$). 2. Il est **2 heures et demie** ($2 \text{ h } 30$). 3. Il est **11 heures pile** ($11 \text{ h } 00$).

Solution 6.5 - Billets et euros : $10 + 2 + 2 + 1 = 15$ €. - Centimes : $3 \times 10 = 30$ c.

Total : $\mathbf{15 \text{ € } 30 \text{ centimes}}$.

Solution 6.6 La gomme s'étend de 3 cm jusqu'à 7 cm. On calcule l'écart :

$$7 - 3 = 4 \text{ cm}$$

La gomme mesure réellement $\mathbf{4 \text{ cm}}$.

Solution 6.7 - Eau : 3 L. - Jus de crapaud : 2 L. - Bave d'escargot : 4 demi-litres = 2 litres entiers.

Total : $3 + 2 + 2 = \mathbf{7 \text{ litres}}$ de potion.

Solution 6.8 1. Mardi $+3$ jours (mercredi, jeudi, vendredi) : nous serons **vendredi**. 2. Avant-hier (deux jours avant mardi) : nous étions **dimanche**. 3. Il y a **4 jours** d'école dans la semaine.

Solution 6.9 Calculons la masse totale :

$$14 + 3 + 4 = 21 \text{ kg}$$

Comme $21 \text{ kg} > 20 \text{ kg}$, la valise dépasse la limite autorisée : **non**, elle ne pourra pas monter dans l'avion sans payer un supplément ou retirer un objet.

Solution 6.10 Pour faire $7 \text{ € } 50$ c avec le minimum de pièces et billets :

- 1 billet de 5 €
- 1 pièce de 2 € (ce qui fait $5 + 2 = 7$ €)
- 1 pièce de 50 centimes.

Soit **3 objets en tout** (un billet et deux pièces) !

Solution 6.11 1. De 18 h à 21 h, il s'écoule 3 heures. La bougie perd $3 \times 3 = 9$ cm. Sa taille sera : $24 - 9 = \mathbf{15 \text{ cm}}$. 2. Pour perdre ses 24 cm à raison de 3 cm par heure : $24 = 8 \times 3$, il faut 8 heures. $18 \text{ h} + 8 \text{ h} = 26 \text{ h}$, soit **2 heures du matin**.

Solution 6.12 Faisons les bonds de 15 en 15 : $15, 30, 45, 60, 75, 90, 105$. Au 6e saut, elle est à 90 cm (pas encore arrivée). Au **7e saut**, elle franchit les 100 cm et atterrit à $\mathbf{105 \text{ cm}}$. Il lui faut donc 7 sauts.

Solution 6.13 On additionne tous les coups sonnés :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ coups}$$

Elle aura sonné **21 coups** au total.

Solution 6.14 Voici la ruse des anciens : 1. Remplis le seau de 5 litres à ras bord. 2. Verse son eau dans le seau de 3 litres jusqu'à ce que celui-ci soit plein : il reste exactement **2 litres** dans le seau de 5 L ! 3. Vide le seau de 3 L par terre. 4. Verse les 2 litres restants dans le seau de 3 L (il reste de la place pour 1 L). 5. Remplis à nouveau le grand seau de 5 L à ras bord. 6. Remplis le seau de 3 L jusqu'au bord (tu verses exactement 1 L) : il reste exactement **4 litres** dans le grand seau ! Tu as réussi !

Solution 6.15 Testons méthodiquement les combinaisons possibles avec exactement 4 pièces de 50 c et 20 c :

- 4 pièces de 50 c = 200 c (2,00 €)
- 3 pièces de 50 c et 1 pièce de 20 c = $150 + 20 = 170$ c (1,70 €)
- 2 pièces de 50 c et 2 pièces de 20 c = $100 + 40 = 140$ c (1,40 €)
- 1 pièce de 50 c et 3 pièces de 20 c = $50 + 60 = 110$ c (1,10 €)
- 4 pièces de 20 c = 80 c (0,80 €)

Pour obtenir exactement 1 € 40 (140 c), Léo possède donc impérativement **2 pièces de 50 centimes et 2 pièces de 20 centimes**.

La question qui ouvre la suite…

Tu sais désormais mesurer les longueurs, peser les objets, vérifier l'heure qui tourne et faire tes courses avec des euros.

Mais as-tu déjà regardé la forme des pierres qui composent les maisons ? Certaines ont quatre côtés bien droits et des coins parfaits : ce sont des rectangles et des carrés. D'autres sont pointues comme des pyramides, rondes comme le soleil ou cubiques comme un dé à jouer.

Comment les bâtisseurs ont-ils appris à tracer un cercle parfait sur le sol avec une simple ficelle et deux bâtons ? Et comment une feuille de papier pliée en deux permet-elle de fabriquer un papillon magique ?

Rendez-vous au dernier grand voyage du Volume I : **Chapitre 7 : Les Formes du Monde et la Ficelle du Jardinier** !

CHAPITRE 7 : Les Formes du Monde et la Ficelle du Jardinier

> « Regarde autour de toi : la Terre ne parle pas seulement avec des nombres, elle parle avec des formes. Les troncs des arbres sont des cylindres, les rayons de miel sont des hexagones, et les pierres polies par le fleuve sont des sphères. Tracer une figure droite dans le sable, c'est commencer à dessiner le monde. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment reconnaître les figures planes partout autour de toi : le **carré**, le **rectangle**, le **triangle** et le **cercle**.
- Le secret de la ficelle du jardinier : tracer un cercle parfait sans compas avec deux piquets de bois.
- Entrer dans le monde en trois dimensions : les solides (le **cube**, le **pavé droit**, la **boule**, le **cylindre**).
- Le vocabulaire des bâtisseurs : **sommet**, **face** et **arête**.
- Utiliser la règle et fabriquer une **équerre en papier plié** pour tester les angles droits.
- La magie du miroir et le papillon en papier : **l'axe de symétrie**.
- Se repérer sur un quadrillage et programmer le chemin d'un robot avec des flèches pas à pas.

---

1. Le problème : le parterre de fleurs de la reine

Il y a bien longtemps, dans un beau royaume d'Orient, la reine fait appeler son jardinier en chef : *« Je veux que tu aménages un nouveau jardin devant le palais. Mais attention ! Je ne veux pas d'un fouillis d'herbes sauvages sans ordre. Je veux quatre grands parterres : - un parterre en forme de carré parfait pour mes rosiers blancs, - un parterre en forme de rectangle allongé pour mes tulipes rouges, - un parterre pointu en triangle pour mes herbes aromatiques, - et un bassin d'eau parfaitement rond au centre, où nageront mes carpes dorées ! »*

Le jardinier s'incline. Mais en arrivant sur le grand terrain de terre nue, il est bien embarrassé : Comment tracer un cercle parfait sans compas géant ? Comment être certain qu'un rectangle a des coins bien droits et ne ressemble pas à une boîte écrasée de travers ? Et comment guider les apprentis pour qu'ils creusent les allées au bon endroit sans se perdre sur le terrain ?

Pour réussir ce chef-d'œuvre, le jardinier va utiliser les outils les plus simples et les plus géniaux de l'histoire de la géométrie : **une ficelle, deux bâtons et une feuille de papier pliée**.

---

2. Les figures planes : les polygones et leurs secrets

Une figure plate (ou plane) est un dessin fermé qu'on peut tracer sur une feuille de papier ou sur le sol sans qu'il ne s'échappe en hauteur.

Quand une figure plate est délimitée uniquement par des segments de droite (des côtés droits tracés à la règle), on l'appelle un **polygone** (du grec *polus*, plusieurs, et *gônia*, angle ou coin).



Fig. 28. – Les trois formes fondamentales du plan géométrique

1. Le Carré

- Il a **4 côtés** qui mesurent **exactement la même longueur**.
- Il a **4 coins droits** (comme le coin d'une feuille de papier).
- Il a **4 sommets** (les pointes).

2. Le Rectangle

- Il a **4 côtés**, mais ils ne sont pas tous égaux : il a 2 grandes longueurs et 2 petites largeurs.
- Ses côtés opposés (ceux qui se font face) ont la même longueur.
- Il a **4 coins droits** et **4 sommets**.

3. Le Triangle

- Il a **3 côtés** droits et **3 sommets** (trois angles).
- Son nom veut dire : « trois angles ».

---

3. La ficelle du jardinier : tracer un cercle parfait

Contrairement au carré ou au triangle, **le cercle n'a aucun côté droit et aucun coin** ! C'est une ligne courbe fermée parfaitement harmonieuse.

Comment le jardinier trace-t-il le grand bassin rond de la reine ?



Fig. 29. – La ficelle du jardinier : tracé parfait du cercle

1. Il plante solidement un **piquet de bois bien droit au centre** du futur bassin (c'est le **centre** du cercle).
2. Il attache une corde solide à ce piquet.
3. À l'autre extrémité de la corde, il attache un deuxième piquet pointu (ou un morceau de craie).
4. Il tire la corde pour qu'elle soit **parfaitement tendue**.
5. Tout en gardant la corde tendue sans jamais la relâcher, il marche en tournant tout autour du piquet central en laissant la pointe gratter le sol.

Quand il a fait un tour complet, il a dessiné un **cercle parfait** !

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Le Cercle, le Rayon et le Diamètre**

- Un **cercle** est l'ensemble de tous les points situés **à la même distance** d'un point central appelé le **centre**.
- La longueur de la corde tendue s'appelle **le rayon** du cercle.
- La grande ligne droite qui traverse le cercle en passant par le centre (d'un bord à l'autre) s'appelle **le diamètre**. Le diamètre vaut toujours le double du rayon ($2 \times \text{rayon}$).

---

4. Le gabarit d'angle droit : fabriquer son équerre magique

Pour vérifier qu'un mur monte bien droit ou qu'une table a des coins parfaits, les menuisiers utilisent un outil triangulaire en métal ou en bois : **l'équerre**. Mais tu peux fabriquer une équerre infaillible en dix secondes avec n'importe quel morceau de papier déchiré !

🖐 Atelier — Fabrique ton équerre en papier plié

1. Prends

une feuille de papier quelconque, même avec un bord déchiré tout tordu. 2. Plie-la une première fois en deux, et écrase bien le pli avec ton ongle. Tu obtiens un bord parfaitement rectiligne. 3. Maintenant, plie à nouveau cette feuille en deux, **en amenant exactement le premier pli sur lui-même**, bord contre bord ! 4. Écrase le nouveau pli. 5. Le coin formé par ces deux plis est un **angle droit parfait à 90°** ! Pose ce coin magique sur le coin de ton cahier, de ta table ou de ta porte : il s'y loge au millimètre près !



Fig. 30. – Fabrication de l'équerre par pliage : l'angle droit à 90°

---

5. Les solides : le monde en trois dimensions

Sur une feuille, les figures sont plates. Mais dans la vraie vie, les objets ont une épaisseur, une profondeur : ils prennent du volume dans l'espace. On les appelle des **solides**.

Fig. 31. – Les solides géométriques fondamentaux : cube, pavé et cylindre

Apprenons le vocabulaire des bâtisseurs pour décrire un solide :

- Une **face** : c'est un mur plat du solide (la surface lisse sur laquelle il peut se poser).
- Une **arête** : c'est la ligne droite où deux faces se rencontrent (le bord tranchant).
- Un **sommet** : c'est le coin pointu où se croisent plusieurs arêtes.

Le Cube (comme le dé à jouer)

- Il possède **6 faces carrées**, toutes rigoureusement identiques.
- Il possède **12 arêtes** de même longueur.
- Il possède **8 sommets** pointus.

Le Pavé Droit (comme une boîte à chaussures ou une brique)

- Il possède **6 faces rectangulaires** (qui peuvent parfois inclure 2 faces carrées).
- Il possède **12 arêtes** et **8 sommets**.

La Boule ou Sphère (comme une bille, une orange ou un ballon de foot)

- Elle n'a aucune face plate, aucune arête droite et aucun sommet. Elle roule dans toutes les directions !

Le Cylindre (comme un rouleau de papier toilette ou une boîte de conserve)

- Il possède **2 faces planes circulaires** (deux disques ronds) en haut et en bas, et une surface arrondie qui lui permet de rouler en ligne droite.

---

6. Le miroir magique : l'axe de symétrie

Prends une feuille de papier blanc. Verse une goutte d'encre bleue ou de gouache au milieu. Plie aussitôt la feuille en deux le long d'une ligne droite, appuie bien avec la paume de ta main, puis rouvre la feuille :



Fig. 32. – Le papillon et la symétrie axiale bilatérale

Tu découvres un magnifique **papillon** ! L'aile de droite est la jumelle absolue de l'aile de gauche. Si tu repliais la feuille, les deux ailes se recouvriraient **exactement**, trait pour trait, point par point.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — L'Axe de symétrie** Un **axe de symétrie** est une ligne droite qui partage une figure en deux moitiés qui se superposent parfaitement par pliage. C'est l'effet d'un miroir posé tout droit sur la ligne !

Beaucoup de choses dans la nature possèdent un axe de symétrie : ton visage (un œil de chaque côté du nez), une feuille d'arbre, une coccinelle ou un flocon de neige.

---

7. Le quadrillage et le code du petit robot

Pour envoyer un apprenti déposer des graines à un endroit précis du jardin, le jardinier a divisé le terrain en carrés réguliers : **un quadrillage**.



Fig. 33. – Repérage sur quadrillage cartésien discret

Pour repérer une case, on donne son adresse avec deux indications : 1. D'abord la **colonne** (la lettre : A, B, C, D). 2. Ensuite la **ligne** (le nombre : 1, 2, 3). *Exemple :* Le petit robot est dans la case **B2**. L'étoile dorée brille dans la case **C3**.

Coder un déplacement avec des flèches :

Pour faire voyager le petit robot de sa case **B2** jusqu'à l'étoile en **C3**, nous écrivons un programme avec des flèches de direction :

- → : avancer d'une case vers la droite.
- ↑ : monter d'une case vers le haut.
- ← : avancer d'une case vers la gauche.
- ↓ : descendre d'une case vers le bas.

Le chemin le plus court pour aller de B2 à C3 est :

→ ↑

(Un pas vers la droite pour arriver en C2, puis un pas vers le haut pour atteindre C3 !)

---

8. Cinq exemples résolus pas à pas

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Reconnaître un carré parmi des rectangles

Énoncé : On te présente trois polygones à 4 angles droits :

- Figure A : largeur 5 cm, longueur 8 cm.
- Figure B : 4 côtés mesurant chacun 6 cm.
- Figure C : largeur 3 cm, longueur 7 cm. Laquelle de ces figures est un carré ? *Résolution :* Un carré doit avoir ses **4 côtés de même longueur** en plus de ses 4 angles droits. Seule la **Figure B** a ses 4 côtés égaux (6 cm). Les figures A et C sont des rectangles non carrés.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calculer le diamètre à partir du rayon

Énoncé : Le jardinier a tendu une corde de 4 mètres de long depuis le piquet central pour tracer son bassin. Quel sera le diamètre total de son bassin ? *Résolution :* Le rayon du cercle est de $4\ \ \mathrm{m}$. Le diamètre traverse tout le cercle d'un bout à l'autre en passant par le centre. Il vaut le double du rayon :

$$\text{Diamètre} = 4\ \ \mathrm{m} + 4\ \ \mathrm{m} = 2 \times 4\ \ \mathrm{m} = \mathbf{8}\ \ \mathbf{mètres}$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Compter les éléments d'un solide

Énoncé : Observe une boîte de mouchoirs en carton fermée (un pavé droit). Combien de morceaux de scotch te faudrait-il pour coller un morceau sur chaque sommet ? *Résolution :* Les sommets sont les coins pointus du pavé droit. Il y a 4 sommets sur la face du haut, et 4 sommets sur la face du bas :

$$4 + 4 = \mathbf{8}\ \ \mathbf{sommets}$$

Il te faudrait donc **8 morceaux de scotch**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Trouver les axes de symétrie d'un rectangle *Énoncé :* Combien d'axes de symétrie possède un rectangle non carré ? *Méthode pratique :* Prends une feuille rectangulaire A4. 1. Si tu la plies en deux dans la largeur (pli vertical au milieu), les deux côtés se recouvrent : c'est un premier axe ! 2. Si tu la plies en deux dans la longueur (pli horizontal au milieu), les deux côtés se recouvrent : c'est un deuxième axe ! 3. *Et la diagonale (de coin à coin) ?* Essaie de plier ta feuille de coin à coin : les pointes dépassent, elles ne se recouvrent pas ! La diagonale d'un rectangle n'est **pas** un axe de symétrie. *Conclusion :* Un rectangle non carré possède **2 axes de symétrie** (ses deux médiatrices).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Déplacer un pion sur un quadrillage

Énoncé : Un trésor se trouve en case **D4**. Un pirate part de la case **A1**. Écris le code de déplacement le plus court pour qu'il trouve le trésor. *Résolution :*

- Pour aller de la colonne A à la colonne D : il doit faire 3 pas vers la droite ($A \to B \to C \to D$) : $\to\to\to$.
- Pour monter de la ligne 1 à la ligne 4 : il doit monter de 3 cases ($1 \to 2 \to 3 \to 4$) : $\uparrow\uparrow\uparrow$. *Programme complet :* $\to\ \ \to\ \ \to\ \ \uparrow\ \ \uparrow\ \ \uparrow$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Le carré** a 4 côtés égaux et 4 angles droits. **Le rectangle** a des côtés opposés égaux et 4 angles droits. **Le triangle** a 3 côtés et 3 sommets.
2. **Le cercle** est l'ensemble des points situés à égale distance du centre. Cette distance est **le rayon** ; le **diamètre** est le double du rayon.
3. Un **angle droit (90°)** se vérifie avec une équerre ou une feuille pliée en deux deux fois.
4. Les solides ont des **faces** (surfaces planes), des **arêtes** (lignes de rencontre) et des **sommets** (pointes).
   - Cube et pavé droit : **6 faces**, **12 arêtes**, **8 sommets**.
5. Une figure a un **axe de symétrie** si les deux moitiés se superposent exactement par pliage.
6. Sur un quadrillage, une case se repère par sa **colonne** (lettre) et sa **ligne** (chiffre). On code un chemin avec des flèches.

Exercices

Niveau (Je m'entraîne et j'applique)

Exercice 7.1 Nomme chaque figure plane : 1. J'ai 3 côtés et 3 sommets. Qui suis-je ? 2. J'ai 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Qui suis-je ? 3. Je n'ai aucun côté droit et je ressemble à une roue de bicyclette. Qui suis-je ? 4. J'ai 4 angles droits et 2 grandes longueurs égales entre elles ainsi que 2 petites largeurs égales entre elles. Qui suis-je ?

Exercice 7.2 Sommet, face ou arête ? Sur un dé à jouer : 1. Que désigne la surface carrée portant le chiffre 5 ? 2. Que désigne le coin pointu où se rejoignent trois faces ? 3. Que désigne la ligne droite que l'on peut suivre avec son ongle le long du bord ?

Exercice 7.3 Les solides de la maison. Associe chaque objet quotidien au solide qui lui ressemble le plus :

- Une boîte de conserve → ...
- Une balle de tennis → ...
- Un paquet de céréales → ...
- Un dé à jouer → ...

Exercice 7.4 Le rayon et le diamètre. 1. Un cercle a un rayon de 5 cm. Quel est son diamètre ? 2. Un cercle a un diamètre de 12 cm. Quel est son rayon ?

Exercice 7.5 Repérage de cases. Regarde le quadrillage ci-dessous :

> 🛠️ **Application Pratique — Chasse aux Trésors sur Quadrillage**
>
> | | A | B | C |
> |---|---|---|---|
> | 2 | | Pomme | |
> | 1 | Banane | | Raisin |

Donne la case (Lettre, Chiffre) de chaque fruit : la pomme, la banane et le raisin.

Niveau (Je réfléchis et je construis)

Exercice 7.6 La chasse aux angles droits. Prends ton équerre en papier plié. Pose-la sur les formes suivantes : 1. Combien d'angles droits possède un triangle rectangle ? 2. Combien d'angles droits possède un cercle ? 3. Combien d'angles droits possède un carré ?

Exercice 7.7 Vrai ou Faux sur les solides ? Réponds par **Vrai** ou **Faux** : 1. Une boule a 1 face plate et 1 sommet. 2. Un cube a plus d'arêtes qu'il n'a de sommets. 3. Un cylindre peut rouler sur sa surface courbe et tenir debout sur ses faces rondes. 4. Toutes les faces d'un cube sont des carrés.

Exercice 7.8 Les lettres symétriques. Parmi ces lettres majuscules d'imprimerie, lesquelles possèdent un axe de symétrie vertical (qu'on peut plier de gauche à droite) ?

A **B** **M** **T** **F**

Exercice 7.9 Le code secret de la souris. Une petite souris part de la case **A1**. Elle suit ce code de déplacement :

$$\uparrow \ \uparrow \ \rightarrow \ \rightarrow \ \downarrow$$

Dans quelle case arrive la petite souris à la fin de son voyage ?

Exercice 7.10 Le patron du cube mystère. Un dé à jouer a 6 faces carrées. Si tu découpes une boîte en carton pour la mettre à plat, combien de carrés attaches-tu ensemble pour former le patron du cube ?

Niveau (Petits défis et énigmes)

Exercice 7.11 L'énigme des triangles dans le carré. Prends une feuille carrée. Trace une ligne droite qui relie deux coins opposés (la diagonale) et découpe le long de cette ligne. 1. Combien de morceaux obtiens-tu ? 2. Quelle est la forme géométrique précise de chaque morceau ?

Exercice 7.12 Le défi des allumettes. Avec 12 allumettes de même longueur posées à plat sur la table : 1. Peux-tu fabriquer un carré en utilisant toutes les allumettes ? Combien d'allumettes mettras-tu par côté ? 2. Peux-tu fabriquer un rectangle qui n'est pas un carré avec ces 12 allumettes ? Donne le nombre d'allumettes pour chaque côté.

Exercice 7.13 Les roues de la charrette. Une charrette possède deux grandes roues arrière de diamètre $80 \ \text{cm}$, et deux petites roues avant de diamètre $40 \ \text{cm}$. 1. Quel est le rayon d'une grande roue ? 2. Quel est le rayon d'une petite roue ? 3. Quand la charrette avance, quelle roue fait le plus de tours pour parcourir la même distance ?

Exercice 7.14 Le trajet de l'abeille butineuse. Sur un quadrillage de jardin, une abeille part de sa ruche en **B1**. Elle doit butiner une rose en **D3**, puis une lavande en **B4**, et enfin revenir à sa ruche en **B1**. Écris le chemin complet en flèches pour cette promenade de butinage.

Exercice 7.15 Le solide mystère. « J'ai 5 faces au total : ma base au sol est un carré bien plat, et mes 4 autres faces qui montent vers le ciel sont des triangles qui se rejoignent en une pointe tout en haut. Qui suis-je ? » Combien ai-je d'arêtes et de sommets ?

Solutions

Solution 7.1 1. Un **triangle**. 2. Un **carré**. 3. Un **cercle**. 4. Un **rectangle**.

Solution 7.2 1. La surface carrée est une **face**. 2. Le coin pointu est un **sommet**. 3. Le bord rectiligne est une **arête**.

Solution 7.3 - Boîte de conserve $\rightarrow$ **Cylindre**. - Balle de tennis $\rightarrow$ **Boule (Sphère)**. - Paquet de céréales $\rightarrow$ **Pavé droit**. - Dé à jouer $\rightarrow$ **Cube**.

Solution 7.4 1. Si le rayon est 5 cm : $\text{Diamètre} = 2 \times 5 = \mathbf{10 \ \ cm}$. 2. Si le diamètre est 12 cm : $\text{Rayon} = 12 \div 2 = \mathbf{6 \ \ cm}$ (la moitié).

Solution 7.5 - La pomme est en **B2**. - La banane est en **A1**. - Le raisin est en **C1**.

Solution 7.6 1. Un triangle rectangle possède exactement **1 angle droit**. 2. Un cercle ne possède aucun côté droit, donc **0 angle droit**. 3. Un carré possède **4 angles droits**.

Solution 7.7 1. Faux (la boule n'a ni face plate ni sommet). 2. Vrai (le cube a 12 arêtes et 8 sommets, et $12 > 8$). 3. Vrai (il roule sur sa face courbe et glisse ou tient stable sur ses deux bases rondes). 4. Vrai (les 6 faces du cube sont des carrés identiques).

Solution 7.8 - **A** : oui (axe vertical qui coupe la lettre au milieu). - **B** : non (elle a un axe horizontal, pas vertical). - **M** : oui (axe vertical au centre). - **T** : oui (axe vertical le long de la barre descendante). - **F** : non (aucun axe de symétrie).

Les lettres sont donc **A**, **M** et **T**.

Solution 7.9 Suivons le parcours :

- Départ en A1.
- $\uparrow\uparrow$: monte en A2 puis en A3.

- $\rightarrow\rightarrow$: avance en B3 puis en C3.
- $\downarrow$: descend en C2.

La souris arrive en **C2**.

Solution 7.10 Un cube a 6 faces : pour former son patron déplié, il faut découper et assembler exactement **6 carrés**.

Solution 7.11 1. On obtient **2 morceaux**. 2. Chaque morceau est un **triangle rectangle** (il possède un angle droit issu du coin du carré et deux côtés de même longueur). On l'appelle un **triangle rectangle isocèle** (un triangle qui possède à la fois un angle droit et deux côtés égaux).

Solution 7.12 1. Oui ! Un carré a 4 côtés égaux : $12 \div 4 = 3$. On met **3 allumettes par côté**. 2. Oui ! Il faut que deux longueurs et deux largeurs fassent 12 en tout ($2 \times L + 2 \times l = 12$, soit $L + l = 6$). On peut choisir : **4 allumettes pour chaque longueur** et **2 allumettes pour chaque largeur** ($4 + 2 + 4 + 2 = 12$). Ou bien 5 allumettes de long et 1 allumette de large ($5 + 1 + 5 + 1 = 12$).

Solution 7.13 1. Rayon de la grande roue : moitié de 80 cm = **40 cm**. 2. Rayon de la petite roue : moitié de 40 cm = **20 cm**. 3. La **petite roue** fait le plus de tours ! Comme son tour de roue est plus court, elle doit tourner deux fois plus vite pour suivre la grande roue.

Solution 7.14 - De la ruche (B1) à la rose (D3) : 2 pas à droite, 2 pas en haut $\rightarrow \quad \rightarrow \quad \uparrow \quad \uparrow$. - De la rose (D3) à la lavande (B4) : 2 pas à gauche, 1 pas en haut $\leftarrow \quad \leftarrow \quad \uparrow$. - De la lavande (B4) à la ruche (B1) : 3 pas vers le bas $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$.

Solution 7.15 Ce solide est une **pyramide** à base carrée (comme les grandes pyramides d'Égypte).

- Nombre d'arêtes : 4 au sol pour le carré $+4$ arêtes qui montent vers la pointe $= \mathbf{8 \ \ arêtes}$.
- Nombre de sommets : 4 coins au sol $+1$ pointe tout en haut $= \mathbf{5 \ \ sommets}$.

La fin du Volume I et l'ouverture vers le Volume II…

Tu as parcouru un chemin extraordinaire !

Tu as commencé comme le berger préhistorique qui regardait ses bêtes avec un caillou dans la poche. Tu as découvert le secret de tes dix doigts, appris à fabriquer des dizaines et des centaines, à peser sur la balance de justice, à aligner les opérations avec la retenue voyageuse, à multiplier l'espace avec des rectangles magiques, à mesurer la Terre avec le mètre et à apprivoiser les formes du monde.

Mais bientôt, un nouveau défi va se présenter à toi. Quand les marchands de la cité rapportent des sacs de 13 pierres précieuses à partager entre 4 guerriers, les pierres refusent de se partager équitablement : il reste toujours une pierre solitaire au fond du panier ! Et quand une maman doit partager une unique galette de pain entre 3 enfants affamés, il faut briser la pierre et inventer des nombres qui se cassent…

Prépare-toi à entrer dans **l'Âge du Marché et des Partages** avec le **Volume II : Les Pierres Rebelles et les Nombres Solitaires** !

VOLUME II — LE SECRET DU PARTAGE ET LES GRANDEURS DU MONDE

8 - 11 ans / CE2 - CM2

Du partage de la galette aux mesures astronomiques, l'élève apprivoise les fractions, les nombres décimaux, la proportionnalité et la géométrie de l'espace.

Chapitres du Volume II :

Chapitre 8 : Les Pierres Rebelles et les Nombres Solitaires
Chapitre 9 : Le Reste du Festin et les Équipes de Jeu
Chapitre 10 : La Galette Brisée et le Tamis de Mesure
Chapitre 11 : Les Dixièmes de Simon Stevin
Chapitre 12 : Le Mètre de la Révolution
Chapitre 13 : La Recette de la Grand-Mère et la Règle de Trois
Chapitre 14 : L'Ardoise du Marchand et le Trou de Sable

En regard : La spirale logarithmique du Nautile (Nautilus pompilius).

CHAPITRE 8 : Les Pierres Rebelles et les Nombres Solitaires

> « Il y a des nombres qui acceptent docilement d'être pliés, rangés en bataillons et découpés en rectangles. Et il y a les nombres rebelles, sauvages, qui refusent de plier et se dressent comme des pierres solitaires dans le désert. Ces pierres sauvages sont les atomes de tous les nombres. »

Ce que tu vas découvrir

- Ce que sont les **multiples** d'un nombre (les nombres sur lesquels on tombe en sautant toujours de la même longueur).
- Ce que sont les **diviseurs** d'un nombre (les longueurs de rangées qui tombent juste).
- Des **astuces de détective** pour savoir, sans faire de division, si un nombre se partage par 2, 3, 5, 9 ou 10.
- Les **nombres premiers**, ces nombres qui refusent de former des rectangles, et pourquoi ils sont les briques de tous les autres nombres.
- Le **crible d'Ératosthène**, une machine à trier les nombres inventée il y a plus de 2 000 ans.

---

1. Le problème : la parade des gardes du marché

Tu as maintenant huit ans. Le campement de tentes s'est transformé en une petite cité au bord du fleuve. Chaque matin, des marchands arrivent des oasis lointaines avec des chameaux chargés d'épices, de poteries et d'étoffes de laine.

Pour que personne ne vole sur les étals, le gouverneur a recruté une petite troupe de gardes. Aujourd'hui, c'est la grande fête des moissons : les gardes doivent défiler sur la grand-place.

Le capitaine a sous ses ordres **12 soldats**. Il crie : *« En formation rectangulaire ! Je veux des rangs parfaits, sans un seul soldat qui dépasse ! »*

Les 12 soldats obéissent avec le sourire :

- ils se rangent en **2 lignes de 6** : $2 \times 6 = 12$;
- puis en **3 lignes de 4** : $3 \times 4 = 12$;
- et pour passer la porte étroite de la ville, en **1 file de 12** : $1 \times 12 = 12$.



Fig. 34. – Organisation rectangulaire des soldats : 2 × 6 et 3 × 4

Tout le monde applaudit : 12 est un nombre **docile**. Il adore former des rectangles.

Mais soudain, un messager arrive au galop : un des soldats doit partir porter une lettre au roi. Il reste **11 soldats**. Le capitaine siffle : *« Reformez un rectangle ! »*

- Par rangs de 2 : cinq devant, cinq derrière… et le onzième se retrouve **tout seul** au bout !
- Par rangs de 3 : trois lignes de trois font 9… et **2 soldats** restent plantés là.
- Par rangs de 4 : $4 + 4 = 8$, il en reste **3** dehors.

- Par rangs de 5 : $5 + 5 = 10$, il en reste **1**.



Fig. 35. – La parité : nombres pairs associés vs soldat solitaire impair

Le capitaine transpire sous son casque. Il a beau essayer : **avec 11 soldats, aucun rectangle n'est possible**, sauf la longue file de 1 sur 11.

Ce n'est la faute ni des soldats ni du capitaine. C'est le nombre 11 lui-même qui **refuse** de se casser. Pourquoi certains nombres sont-ils si souples, et d'autres si têtus ? Pour le comprendre, nous allons apprendre deux mots très importants : **multiple** et **diviseur**.

> 🖐 **À toi de jouer —**
>
> Prends 12 objets (boutons, haricots, pièces). Fabrique tous les rectangles possibles. Puis enlève un objet et recommence avec 11. Ressens dans tes doigts la différence !

---

2. Les multiples : sauter toujours de la même longueur

Imagine une grenouille sur une longue ligne graduée. Elle part de 0 et fait toujours des sauts de **3 cases**.



Fig. 36. – Sauts réguliers de 3 en 3 de la grenouille

Les cases où elle pose ses pattes sont : $0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, \ldots$ Ce sont exactement les résultats de la **table de 3** : $3 \times 0, 3 \times 1, 3 \times 2, 3 \times 3 \ldots$

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Multiple** Un nombre est un **multiple de 3** s'il est dans la table de 3, c'est-à-dire s'il s'écrit $3 \times$ (un nombre entier). Plus généralement, un nombre est un **multiple de b** s'il s'écrit $b \times$ (un nombre entier).

Les trois petits points « ... » qu'on écrit à la fin d'une liste se lisent « **et ainsi de suite** ». Ils veulent dire : la liste continue toujours de la même façon, **sans jamais s'arrêter**. Car la grenouille peut sauter aussi longtemps qu'elle veut : il y a une **infinité** de multiples de 3 !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Est-ce un multiple ? *Question :* 42 est-il un multiple de 6 ? Et 45 ? *Je cherche dans la table de 6 :* $6 \times 7 = 42$. Oui, 42 est un multiple de 6. *Pour 45 :* $6 \times 7 = 42$ et $6 \times 8 = 48$. 45 est **entre** les deux, il n'est pas dans la table. 45 n'est **pas** un multiple de 6. (La grenouille de 6 saute par-dessus 45 sans s'y poser.)

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Les multiples communs *Question :* Quels nombres sont à la fois multiples de 4 et de 6, jusqu'à 40 ? Multiples de 4 : 0, 4, 8, **12**, 16, 20, **24**, 28, 32, **36**, 40. Multiples de 6 : 0, 6, **12**, 18, **24**, 30, **36**. Les nombres présents dans les deux listes : **0, 12, 24, 36**. Deux grenouilles, l'une sautant de 4 en 4, l'autre de 6 en 6, se retrouvent sur ces cases-là !

---

3. Les diviseurs : les rangées qui tombent juste

Retournons voir les soldats. Avec 12 soldats, on a pu faire des rangées de 1, 2, 3, 4, 6 et 12 (car 4×3 et 6×2 marchent aussi, en tournant le rectangle). Avec 11, seulement des rangées de 1 et de 11.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Diviseur** Un nombre b est un **diviseur** de a si l'on peut ranger a objets en rangées de b **sans qu'il en reste un seul**. Autrement dit : a est dans la table de b. On dit aussi : « $\boldsymbol{a}$ **est divisible par** $\boldsymbol{b}$ » ou « $\boldsymbol{b}$ **divise** $\boldsymbol{a}$ ».

Tu remarques que les deux mots vont ensemble, comme les deux faces d'une même pièce :

$$12 = 3 \times 4 \quad \Rightarrow \quad \{12 \text{ est un multiple de } 3 \\ 3 \text{ est un diviseur de } 12$$

La grosse flèche « $\Rightarrow$ » se lit « **donc** ».

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Plus tard, au collège et au lycée, les mathématiciens écriront « $3 \mid 12$ » (une petite barre verticale) pour dire « 3 divise 12 ». Ne confonds pas avec la barre de fraction, qui est couchée !

La méthode des paires pour trouver TOUS les diviseurs

Chaque rectangle donne **deux** diviseurs à la fois : sa largeur et sa longueur. Pour ne rien oublier, on cherche les paires dans l'ordre, en commençant par 1.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Tous les diviseurs de 24

- $1 \times 24 = 24$ → diviseurs 1 et 24
- $2 \times 12 = 24$ → diviseurs 2 et 12
- $3 \times 8 = 24$ → diviseurs 3 et 8
- 4 ? $4 \times 6 = 24$ → diviseurs 4 et 6
- 5 ? $5 \times 4 = 20$, $5 \times 5 = 25$: non.
- 6 ? Déjà trouvé avec 4 ! Les paires recommencent à l'envers : **on peut s'arrêter**.

Les diviseurs de 24 sont : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**. Il y en a 8, donc 4 rectangles différents.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Les diviseurs de 36 (un nombre carré)

1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6. Diviseurs : **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**. Il y en a 9 : un nombre **impair** de diviseurs ! Pourquoi ? Parce que le rectangle 6×6 est un **carré** : le 6 est à la fois la largeur et la longueur, on ne le compte qu'une fois.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les cas bizarres

- **1 est un diviseur de tous les nombres** : on peut toujours faire une seule file (1×12, 1×11…).
- **Tout nombre est un diviseur de lui-même** et un multiple de lui-même : $12 = 12 \times 1$.
- **0 est un multiple de tous les nombres** : $0 = 3 \times 0 = 7 \times 0$. La grenouille, avant de sauter, est déjà sur 0 !
- **On ne divise jamais par 0** : ranger 12 soldats en rangées de 0 soldat ? On pourrait faire des rangées vides pendant mille ans sans jamais placer personne. Cela n'a aucun sens.
- Ne mélange pas les mots : « 3 est un **diviseur** de 12 » mais « 12 est un **multiple** de 3 ». Le **petit** divise, le **grand** est multiple.

---

4. Les astuces du détective : les critères de divisibilité

Au marché, un marchand a 3 471 dattes. Peut-il en faire des sachets de 3 sans qu'il en reste ? Faire la division serait long. Heureusement, les mathématiciens ont trouvé des **critères** : des petits indices qui permettent de répondre en un clin d'œil.

Les critères du dernier chiffre : 2, 5 et 10

Rappelle-toi : un nombre comme 3 471, c'est des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Or **une dizaine (10) se range toujours parfaitement par 2, par 5 et par 10** : $10 = 2 \times 5 = 5 \times 2 = 10 \times 1$. Et une centaine, un millier, ce ne sont que des paquets de dizaines ! Donc, tout ce qui est « dizaines et plus » tombe juste. **Seules les unités peuvent poser problème.** C'est pour ça qu'il suffit de regarder le **dernier chiffre**.

📐 Critères de divisibilité par 2, 5 et 10

- Un nombre est divisible par **2** si son chiffre des unités est **0, 2, 4, 6 ou 8**. On dit qu'il est **pair**. Sinon il est **impair**.
- Un nombre est divisible par **5** si son chiffre des unités est **0 ou 5**.
- Un nombre est divisible par **10** si son chiffre des unités est **0**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Le dernier chiffre parle

- 3 476 : se termine par 6 → divisible par 2 ; pas par 5 ; pas par 10.
- 985 : se termine par 5 → divisible par 5 ; impair, donc pas par 2 ; pas par 10.
- 7 230 : se termine par 0 → divisible par 2, par 5 **et** par 10.

Les critères magiques de la somme des chiffres : 3 et 9

Pour 3 et 9, regarder le dernier chiffre ne marche pas du tout ! (13 finit par 3, mais $13 = 3 \times 4 + 1$ n'est pas divisible par 3.) Il faut une astuce plus fine.

Regarde bien :

$$10 = 9 + 1 \qquad 100 = 99 + 1 \qquad 1\,000 = 999 + 1$$

Or 9, 99, 999 se rangent parfaitement par paquets de 9 (et donc aussi par paquets de 3, puisque $9 = 3 \times 3$). Chaque dizaine, chaque centaine, chaque millier laisse donc **exactement 1 objet qui dépasse**.

Prenons 234 : c'est 2 centaines, 3 dizaines et 4 unités.

- Les 2 centaines laissent dépasser **2** objets (1 chacune).
- Les 3 dizaines laissent dépasser **3** objets.
- Les 4 unités sont **4** objets.

En tout, ce qui dépasse, c'est $2 + 3 + 4 = 9$ objets : **la somme des chiffres** ! Et 9 se range parfaitement par 9 et par 3. Donc 234 est divisible par 9 et par 3. (Vérifie : $234 = 9 \times 26$.)

📐 Critères de divisibilité par 3 et 9

- Un nombre est divisible par **3** si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 3.
- Un nombre est divisible par **9** si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 9.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Les dattes du marchand 3 471 : $3 + 4 + 7 + 1 = 15$. 15 est dans la table de 3 (3×5), donc **3 471 est divisible par 3** : le marchand peut faire ses sachets ! ($3\,471 = 3 \times 1\,157$.) Mais 15 n'est pas dans la table de 9 : 3 471 n'est **pas** divisible par 9.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 7 — Quand la somme est encore grosse 98 769 : $9 + 8 + 7 + 6 + 9 = 39$. Est-ce un multiple de 3 ? On recommence le truc : $3 + 9 = 12$, et $12 = 3 \times 4$. Oui ! Donc 98 769 est divisible par 3. Par 9 ? 39 n'est pas dans la table de 9 ($9 \times 4 = 36$, $9 \times 5 = 45$) : non.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !**

- Pour 3 et 9, **on ne regarde pas le dernier chiffre** : 23 finit par 3 mais n'est pas divisible par 3 ($2 + 3 = 5$). 27 finit par 7 et il est divisible par 3 ($2 + 7 = 9$).
- **Divisible par 9 $\Rightarrow$ divisible par 3**, car $9 = 3 \times 3$. Mais **l'inverse est faux** : 12 est divisible par 3, pas par 9.
- **Divisible par 2 et par 5 $\Rightarrow$ divisible par 10** (le dernier chiffre doit être pair ET être 0 ou 5 : c'est forcément 0).
- Un nombre **impair** n'est jamais divisible par 10, ni par 4, ni par 6 (car tous ces nombres sont pairs).

🖐️ À toi de jouer — Le jeu du détective

Un joueur annonce un grand nombre. L'autre doit dire le plus vite possible par quels nombres parmi 2, 3, 5, 9 et 10 il est divisible. Chaque bonne réponse rapporte un point ; une erreur en fait perdre un.

---

5. Les nombres premiers : les atomes des nombres

Revenons à notre soldat têtu. Le nombre 11 n'a que **deux** diviseurs : 1 et 11. Il ne forme aucun vrai rectangle.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Nombre premier** Un **nombre premier** est un nombre entier qui a **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même. Un nombre (plus grand que 1) qui a plus de deux diviseurs est dit **composé** : on peut le « composer » en rectangle.

Le mot « premier » vient du latin *primus* : « le premier, celui qui vient avant tout ». Ce sont les nombres qui existent **avant** les autres, puisque tous les autres sont fabriqués avec eux, comme tu vas le voir.

Faisons l'inventaire des premiers nombres :

Nombre	Rectangles possibles	Diviseurs	Premier ?
1	1 × 1	1	**Non** (un seul diviseur)
2	1 × 2	1, 2	Oui
3	1 × 3	1, 3	Oui
4	1 × 4, 2 × 2	1, 2, 4	Non
5	1 × 5	1, 5	Oui
6	1 × 6, 2 × 3	1, 2, 3, 6	Non
7	1 × 7	1, 7	Oui
8	1 × 8, 2 × 4	1, 2, 4, 8	Non
9	1 × 9, 3 × 3	1, 3, 9	Non
10	1 × 10, 2 × 5	1, 2, 5, 10	Non
11	1 × 11	1, 11	Oui

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! — Le cas de 1 et de 2**

- **1 n'est pas premier.** Il n'a qu'**un seul** diviseur (lui-même), et la définition en demande exactement deux. Les mathématiciens l'ont exclu exprès : tu verras bientôt que sinon, la belle règle « chaque nombre se casse d'une seule façon en nombres premiers » ne marcherait plus (on pourrait ajouter autant de « × 1 » qu'on veut).
- **2 est le seul nombre premier pair.** Tous les autres nombres pairs sont divisibles par 2, donc ils ont au moins trois diviseurs : 1, 2 et eux-mêmes.
- **Impair ne veut pas dire premier !** 9, 15, 21, 25, 27 sont impairs… et composés ($9 = 3 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $21 = 3 \times 7$…). Méfie-toi surtout de **51** ($= 3 \times 17$) et de **91** ($= 7 \times 13$) : ils ont l'air premiers, mais ce sont des imposteurs !

Casser un nombre jusqu'aux atomes : l'arbre des facteurs

Prends n'importe quel nombre composé, par exemple **60**. Casse-le en deux morceaux multipliés, puis recasse chaque morceau tant que c'est possible :



Fig. 37. – Arbre de décomposition en facteurs premiers

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Les nombres qu'on multiplie s'appellent des **facteurs**. Ici, tous les facteurs sont premiers : on dit qu'on a **décomposé 60 en produit de facteurs premiers**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 8 — Un autre chemin pour 60 Et si on avait commencé par $60 = 4 \times 15$? $4 = 2 \times 2$ et $15 = 3 \times 5$. On trouve encore $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$! Quel que soit le chemin, **on arrive toujours aux mêmes atomes** (seul l'ordre peut changer). C'est une loi très profonde des nombres, que le Grec **Euclide** connaissait déjà et que tu démontreras au lycée.

C'est pour cela qu'on dit que les nombres premiers sont **les atomes des nombres** : comme toutes les choses sont faites d'atomes, **tous les nombres entiers plus grands que 1 sont faits de nombres premiers multipliés entre eux**.

CHAPITRE 9 : Le Reste du Festin et les Équipes de Jeu

> « Partager, c'est distribuer la justice à tour de rôle. Mais quand les objets ne peuvent pas être coupés en morceaux, que fait-on de ce qui demeure au centre de la table ? C'est dans le reste que se cache toute la vérité de la division. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi la division naît de deux questions quotidiennes : **partager équitablement** (combien chacun reçoit-il ?) et **faire des paquets** (combien de paquets peut-on former ?).
- Les **quatre acteurs** de la division euclidienne : le *dividende*, le *diviseur*, le *quotient* et le *reste*.
- La **relation fondamentale** $a = b \times q + r$ et la **règle d'or inviolable** : le reste doit toujours être strictement plus petit que le diviseur ($r < b$).
- La **technique posée avec la potence**, expliquée pas à pas, sans jamais paniquer.
- Comment **vérifier** ton calcul d'un coup d'œil grâce à la « preuve par la multiplication ».

---

1. Le problème : les quatorze esturgeons du grand fleuve

La brume du matin flotte sur les eaux lentes du grand fleuve. La lourde pirogue de pêche du village accoste contre les rondins de bois du débarcadère. Les pêcheurs sautent dans l'eau fraîche et tirent sur la berge un filet ruisselant : ils ont capturé **14 gros esturgeons dorés**, luisants sous le soleil naissant.

Quatre familles de pêcheurs se rassemblent sur la grand-place, autour d'une immense table de pierre plate. Chaque famille a envoyé son représentant. Les 14 poissons sont alignés sur la table, l'œil brillant et les écailles étincelantes.

Le chef du village s'avance, le regard grave : *« Ces poissons doivent nourrir nos enfants. Mais attention : chaque famille doit recevoir exactement la même quantité. Pas une arête de plus, pas une écaille de moins ! Sinon, les jalousies déchireront notre village. »*



Fig. 38. – Les deux sens de la division : partage équitable et groupement

Tu es chargé de faire le partage. Comment t'y prendre pour ne commettre aucune injustice ?

Tu ne te lances pas dans de grands calculs compliqués. Tu poses tes mains sur les poissons et tu accomplis un geste universel, le même que font les enfants pour distribuer les cartes d'un jeu : **tu distribues un poisson à la fois, tour après tour**.

Regarde la table après le troisième tour :

- Chaque famille a reçu **3 gros poissons**. Tout le monde est parfaitement égal.
- Mais au centre de la pierre, il reste **2 poissons entiers**.

Peux-tu distribuer un quatrième tour ? Non ! Si tu donnes un poisson à la famille A et un à la famille B, les familles C et D vont crier au scandale : *« Pourquoi eux et pas nous ? C'est de l'injustice ! »*

Comme ces poissons sont vivants et doivent être salés entiers pour se conserver, on ne peut pas les découper en morceaux aujourd'hui. Le partage des objets entiers est terminé.

Tu viens de réaliser une opération fondamentale des mathématiques : **la division euclidienne**, appelée ainsi en l'honneur du savant grec **Euclide**, qui vécut à Alexandrie il y a plus de 2 300 ans.

---

2. Les quatre acteurs du partage : l'anatomie de la division

Donnons des noms précis aux quatre grandeurs qui ont joué un rôle dans cette distribution :

Fig. 39. – Anatomie de la potence de division euclidienne

Définition Fondamentale

📐 Définition — Les quatre rôles de la division euclidienne

Lorsqu'on partage un nombre entier a en b parts égales : 1. Le **dividende** (a) est la quantité totale d'objets à partager. 2. Le **diviseur** (b) est le nombre de parts égales que l'on veut former (il ne peut jamais être égal à 0 !). 3. Le **quotient** (q) est la part équitable reçue par chacun. 4. Le **reste** (r) est ce qui demeure non distribué à la fin.

Ces quatre nombres sont liés par une égalité essentielle, que tout mathématicien garde en tête :

$$a = (b \times q) + r$$

On lit à voix haute : « **Le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient, plus le reste.** »

La règle d'or absolue : la condition sur le reste

Imagine qu'un distributeur maladroit te dise : *« J'ai partagé les 14 poissons entre les 4 familles. J'ai donné 2 poissons à chacun, et il m'en reste 6 sur la table ! »*

Regarde l'égalité correspondante :

$$14 = (4 \times 2) + 6$$

En calcul pur, c'est exact : $4 \times 2 = 8$, et $8 + 6 = 14$. Pourtant, ce partage est **faux** ! Pourquoi ? Parce qu'avec les 6 poissons restants sur la table, il y avait largement de quoi donner un poisson de plus à chacune des 4 familles ($6 \geq 4$). Le distributeur s'est arrêté trop tôt par paresse !

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! — La règle d'or inviolable** Dans toute division euclidienne, **le reste doit TOUJOURS être strictement inférieur au diviseur** :

$$r < b$$

Et bien sûr, le reste ne peut pas être négatif : $0 \leq r < b$.

Si tu divises par 4, les seuls restes possibles sont : **0, 1, 2 ou 3**. Dès que ton reste est égal ou supérieur à 4, c'est que ton quotient est trop petit : tu peux encore distribuer !

Quand le reste vaut **0**, on dit que **la division tombe juste**. Le dividende est alors un multiple exact du diviseur (comme nous l'avons vu au Chapitre 8).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Reconnaître les acteurs Dans la division de 37 par 5 :

- Dans la table de 5, cherchons le plus grand multiple inférieur ou égal à 37 : $5 \times 7 = 35$, et $5 \times 8 = 40$ (trop grand).
- On a donc : $37 = (5 \times 7) + 2$.
- Le dividende est $a = 37$.
- Le diviseur est $b = 5$.
- Le quotient est $q = 7$.
- Le reste est $r = 2$.
- Vérification de la règle d'or : $2 < 5$. La condition est bien respectée !

---

3. Deux sens pour une même opération : partage ou groupement ?

La division répond en réalité à deux types de questions bien différentes dans la vie quotidienne. Il faut apprendre à les distinguer pour bien comprendre les problèmes.

Sens 1 : Le partage équitable (la distribution de cartes)

- **Ce qu'on connaît :** le nombre total d'objets (a) et le nombre de bénéficiaires (b).
- **Ce qu'on cherche :** la taille de la part reçue par chaque personne (q).
- *Exemple :* 35 bonbons partagés entre 4 enfants. Chaque enfant reçoit 8 bonbons, et il en reste 3 dans le sachet.

Sens 2 : Le groupement ou « contenance » (remplir des boîtes)

- **Ce qu'on connaît :** le nombre total d'objets (a) et la capacité d'une boîte (b).
- **Ce qu'on cherche :** combien de boîtes pleines on peut fabriquer (q).
- *Exemple :* Un boulanger a cuit 35 œufs en chocolat. Il les range dans des boîtes de 4 œufs. Combien de boîtes pleines peut-il fermer ? Il peut fermer 8 boîtes complètes, et il lui reste 3 œufs pour son goûter.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Partage ou groupement ? *Situation A :* Un maître dispose de 28 cahiers pour ses 7 élèves. Combien de cahiers reçoit chaque élève ? **Réponse :** C'est un **partage** (on cherche la part de chacun). $28 = 7 \times 4 + 0$. Chaque élève reçoit 4 cahiers.

Situation B : Une fleuriste a 28 roses. Elle compose des bouquets de 6 roses. Combien de bouquets fait-elle ? **Réponse :** C'est un **groupement** (on regroupe par paquets de 6). $28 = 6 \times 4 + 4$. Elle fabrique 4 bouquets complets et il lui reste 4 roses.

---

4. La division posée avec potence : sans panique, pas à pas

Quand les nombres deviennent grands, on ne peut plus distribuer un par un avec ses doigts. Il faut une méthode mécanique infaillible. Les mathématiciens ont inventé une grille spéciale appelée **la potence**.

Pourquoi cette disposition ? Parce qu'elle permet de diviser le nombre **morceau par morceau**, en commençant par la gauche (les plus grosses unités : centaines, puis dizaines, puis unités simples). C'est la seule opération posée qui commence par la gauche !

Étude de cas détaillée : Posons $75 \div 3$

Nous voulons partager 75 pièces d'or entre 3 coffres. 75, c'est **7 dizaines et 5 unités**.

```
 7 5  |  3
      |-------
      |
```

Étape 1 : Je m'occupe des dizaines. - Je pose mon doigt sur le 7. Dans 7 dizaines, combien de fois 3 ? - Dans la table de 3 : $3 \times 2 = 6 \leq 7$. On peut mettre **2** dizaines dans chaque coffre. - J'écris 2 au quotient. - Je retire les dizaines distribuées : $7 - 6 = 1$. Il reste **1 dizaine non distribuée**.

```
  7 5  |  3
       |
- 6   |-------
----  |  2
  1   |
```

Étape 2 : J'abaisse le chiffre suivant. - 1 dizaine seule ne peut pas être partagée entre 3 coffres. - Je l'échange contre 10 unités et j'abaisse le 5 à côté. Cela donne **15 unités**.

```
  7 5  |  3
       |
- 6   |-------
----  |  2 5
  1 5 |
```

Étape 3 : Je partage les unités. - Dans 15 unités, combien de fois 3 ? - Dans la table de 3 : $3 \times 5 = 15$ tout juste ! - J'écris 5 au quotient, à droite du 2. - Je retire les 15 unités : $15 - 15 = 0$.

```
  7 5  |  3
       |
- 6   |-------
----  |  2 5
  1 5 |
      |
- 1 5 |
-----  |
    0  |
```

Résultat : Le quotient est **25**, le reste est **0**. Chaque coffre reçoit 25 pièces d'or. La division tombe juste !

Un cas plus riche : Posons $473 \div 4$

Regardons ce qui se passe quand le premier chiffre est plus petit que le diviseur, ou quand il y a un reste final.

```
 4 7 3  |  4
        |-------
        |
```

1. **Les centaines :** En 4, combien de fois 4 ? Il y va **1** fois ($1 \times 4 = 4$). Reste : $4 - 4 = 0$.
2. **J'abaisse le 7 (dizaines) :** En 7, combien de fois 4 ? Il y va **1** fois ($1 \times 4 = 4$). Reste : $7 - 4 = 3$.
3. **J'abaisse le 3 (unités) :** On obtient 33. En 33, combien de fois 4 ? Table de 4 : $4 \times 8 = 32$. Il y va **8** fois. Reste : $33 - 32 = 1$.

```
  4 7 3  |  4
         |
- 4     |-------
----    |  1 1 8
  0 7   |
        |
-   4   |
-----   |
    3 3 |
        |
  - 3 2 |
  ----- |
      1 |
```

Résultat : $473 = (4 \times 118) + 1$. Le quotient est 118, le reste est 1. La condition $1 < 4$ est bien respectée !

> **Méthode — Les 4 gestes magiques de la potence**
>
> Pour chaque colonne de la division, on répète toujours les mêmes 4 gestes : 1. **D**iviser (combien de fois le diviseur tient-il dans le paquet ?) 2. **M**ultiplier (je calcule ce que je viens de distribuer : $q \times b$) 3. **S**oustraire (je calcule ce qu'il me reste) 4. **A**baisser (je fais descendre le chiffre suivant pour former un nouveau paquet)
>
> Retiens le mot magique : **D - M - S - A** (*Diviser, Multiplier, Soustraire, Abaisser*) !

---

5. Vérifier sa division : la preuve sans faille

En mathématiques, on ne rend jamais une copie sans avoir vérifié son calcul. Pour vérifier une division euclidienne, on fait l'opération inverse : **on remonte le chemin grâce à la multiplication**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Vérifier $473 = 4 \times 118 + 1$

1.

Multiplions le quotient par le diviseur :

$$118 \times 4 = (100 \times 4) + (10 \times 4) + (8 \times 4) = 400 + 40 + 32 = 472$$

2. Ajoutons le reste :

$$472 + 1 = 473$$

3. Retrouve-t-on le dividende de départ ? **Oui, exactement 473 !** Le calcul est certifié sans erreur.

> **⚠ Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Le piège du zéro au quotient** C'est l'erreur la plus fréquente chez les élèves de CM1 ! Posons $615 \div 3$:
>
> - En 6, combien de fois 3 ? 2 fois ($2 \times 3 = 6$). Reste 0.
> - J'abaisse le 1. En 1, combien de fois 3 ? **Il y va 0 fois !**
> - Beaucoup d'élèves oublient d'écrire le **0** au quotient et abaissent immédiatement le 5. Ils trouvent un quotient de 25 au lieu de **205** ! Or $3 \times 25 = 75$, ce qui est très loin de 615 ! Avec le 0, $3 \times 205 = 615$. **Dès que tu abaisses un chiffre, tu DOIS écrire un chiffre au quotient, même si c'est un zéro !**

---

6. Exemples résolus complémentaires

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Des paquets de billes Un enfant possède 146 billes. Il veut constituer des sacs de 6 billes. *Question :* Combien de sacs pleins obtiendra-t-il, et combien de billes lui restera-t-il ?

- En 1 : 6 ne tient pas. Prenons 14.
- En 14, combien de fois 6 ? $6 \times 2 = 12$. Reste : $14 - 12 = 2$.
- J'abaisse le 6 : on a 26.
- En 26, combien de fois 6 ? $6 \times 4 = 24$. Reste : $26 - 24 = 2$.
- Écriture euclidienne : $146 = (6 \times 24) + 2$. **Conclusion :** Il remplit **24 sacs pleins** et il lui reste **2 billes**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Répartir des passagers en minibus 83 personnes partent en excursion. Chaque minibus peut transporter au maximum 9 passagers. *Question :* Combien faut-il de minibus au minimum pour transporter tout le monde ?

- Faisons la division euclidienne de 83 par 9 : $83 = (9 \times 9) + 2$ (car $9 \times 9 = 81$).
- Le quotient est 9, le reste est 2.
- 9 minibus transporteront $9 \times 9 = 81$ personnes.
- Mais il reste 2 personnes sur le trottoir ! Va-t-on les abandonner ? Non ! **Conclusion :** Il faut commander **10 minibus** (9 minibus pleins et 1 minibus avec seulement 2 passagers). *Cet exemple montre qu'il faut toujours réfléchir au sens concret du problème : parfois la réponse est le quotient, parfois c'est quotient + 1 !*

5bis. L'épreuve des grands marchands : La division par un diviseur à DEUX chiffres

Au CM1 et CM2, les problèmes réels exigent souvent de diviser par un nombre à deux chiffres, comme partager $7\,845$ litres d'huile dans des fûts de 23 litres.

Face à un diviseur comme 23, personne ne connaît la « table de 23 » par cœur ! Les calculateurs utilisent alors une astuce infaillible : **le répertoire préparatoire au brouillon**.

Posons $7\,845 \div 23$ pas à pas :

1. **Le petit répertoire au brouillon :** On calcule rapidement les premiers multiples de 23 :
   - $23 \times 1 = 23$
   - $23 \times 2 = 46$
   - $23 \times 3 = 69$
   - $23 \times 4 = 92$
2. **On pose la potence :**
   - En 7, 23 ne tient pas. On prend **78**.
   - Dans notre répertoire : $23 \times 3 = 69 \leq 78$. On pose **3** au quotient.
   - Soustraction : $78 - 69 = 9$.
   - On abaisse le 4 : on a **94**.
   - Dans le répertoire : $23 \times 4 = 92 \leq 94$. On pose **4** au quotient.
   - Soustraction : $94 - 92 = 2$.
   - On abaisse le 5 : on a **25**.
   - En 25, combien de fois 23 ? Il y va **1** fois ($1 \times 23 = 23$). On pose **1** au quotient.
   - Soustraction finale : $25 - 23 = 2$.

```
  7 8 4 5  |  2 3
           |
- 6 9      |-------
-----      |  3 4 1
   9 4     |
           |
  - 9 2    |
  -----    |
     2 5   |
           |
    - 2 3  |
    -----  |
       2   |
```

Résultat : $7\,845 = (23 \times 341) + 2$ avec $2 < 23$. Tout est validé !

⚒️ Le Laboratoire des Cas Limites : Que se passe-t-il avec ZÉRO dans la division ?

(Cette section est isolée pour analyser les deux cas extrêmes sans perturber tes calculs habituels.)

Cas A : Zéro divisé par un nombre ($0 \div 5$)

- **La scène :** Tu as une corbeille totalement vide (0 pomme), et 5 enfants s'assoient à table. Combien de pommes reçoit chaque enfant ?
- Chacun reçoit **0 pomme**.
- Vérification : $5 \times 0 = 0$. Tout fonctionne parfaitement !
- **Règle :** Zéro divisé par n'importe quel nombre non nul donne toujours **zéro** :

$$\frac{0}{b} = 0 \quad (\text{pour tout} \quad b \neq 0)$$

Cas B : L'interdiction absolue : Diviser par ZÉRO ($5 \div 0$)

- Imagine que tu veuilles calculer $5 \div 0 = q$.
- Si ce quotient existait, la formule de vérification devrait donner :

$$0 \times q = 5$$

- Or, nous venons de prouver au chapitre 5 que **zéro multiplié par n'importe quel nombre donne TOUJOURS zéro** ($0 \times q = 0$) ! Il est rigoureusement impossible que cela fasse 5.
- Aucun nombre dans tout l'univers ne peut résoudre cette équation.
- **Règle absolue des mathématiques : ON NE DIVISE JAMAIS PAR ZÉRO.** C'est un trou noir mathématique qui détruit le sens des égalités.

⚡ Les Gammes du Praticien : Entraînement Mécanique (Chronométrable)

Trouve le quotient entier q et le reste r de tête ou posé le plus vite possible :

Défi	Division	Quotient q	Reste r	Vérification ($a = bq + r$)
1	$37 \div 5$	.....	.....	.....
2	$50 \div 6$	.....	.....	.....
3	$72 \div 8$	.....	.....	.....
4	$43 \div 7$	.....	.....	.....
5	$0 \div 9$	.....	.....	.....
6	$612 \div 3$	.....	.....	.....
7	$85 \div 4$	.....	.....	.....
8	$105 \div 10$	.....	.....	.....
9	$490 \div 7$	.....	.....	.....
10	$150 \div 25$	.....	.....	.....

Ce qu'il faut retenir

1. **La division euclidienne** sert à partager une quantité entière en parts égales ou à compter le nombre de paquets complets.
2. **Les 4 acteurs :**
$$\text{Dividende} = (\text{Diviseur} \times \text{Quotient}) + \text{Reste}$$
$$a = (b \times q) + r$$
3. **La règle d'or obligatoire :** Le reste doit toujours être plus petit que le diviseur :
$$0 \leq r < b$$
4. **La potence :** On traite les chiffres de gauche à droite selon la boucle : *Diviser* → *Multiplier* → *Soustraire* → *Abaisser*.
5. **Le zéro au quotient :** Dès qu'on abaisse un chiffre et qu'on ne peut rien distribuer, on écrit obligatoirement un `0` au quotient avant d'abaisser le chiffre suivant.
6. **Vérification :** On vérifie toujours en calculant $(b \times q) + r$.

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Écris l'égalité euclidienne $a = b \times q + r$ correspondant à cette phrase : « Quand je partage 29 gâteaux entre 4 amis, chacun en reçoit 7 et il en reste 1. »
2. Dans la division de 43 par 6, le quotient est 7 et le reste est 1. Quel est le dividende ? Quel est le diviseur ?
3. Parmi les égalités suivantes, lesquelles représentent une vraie division euclidienne ?
   a) $34 = 5 \times 6 + 4$
   b) $34 = 5 \times 5 + 9$
   c) $50 = 8 \times 6 + 2$
   d) $50 = 8 \times 5 + 10$
4. Quels sont tous les restes possibles si l'on effectue une division par 6 ?
5. Effectue mentalement les divisions suivantes (donne le quotient et le reste) :
   a) $23 \div 5$
   b) $31 \div 4$

c) $47 \div 9$
d) $58 \div 8$

6. Pose et effectue la division : $84 \div 4$.
7. Pose et effectue la division : $95 \div 3$.

Niveau (Réflexion et méthode)

8. Pose et effectue la division : $734 \div 5$. Vérifie ton résultat avec la multiplication.
9. Attention au zéro ! Pose et effectue la division : $816 \div 4$.
10. Un fleuriste a reçu 135 tulipes. Il veut fabriquer des bouquets de 8 tulipes.
    a) Combien de bouquets complets peut-il vendre ?
    b) Combien de tulipes lui manque-t-il pour faire un bouquet supplémentaire ?
11. Une école compte 172 élèves qui partent au musée. Les autocars ont chacun 50 places assises. Combien d'autocars faut-il réserver ?
12. Dans une division, le diviseur est 7, le quotient est 13 et le reste est 4. Quel était le dividende ?
13. Trouve le nombre mystère : « Je suis compris entre 40 et 50. Si on me divise par 6, il reste 3. Si on me divise par 7, il reste 3. Qui suis-je ? »

Niveau (Défis d'experts)

14. Un trésor de 925 pièces d'or doit être partagé équitablement entre 8 matelots. Le capitaine garde le reste pour lui.
    a) Combien chaque matelot reçoit-il ?
    b) Combien de pièces le capitaine empoche-t-il ?
    c) Le capitaine aurait-il pu empocher 9 pièces ? Justifie.
15. Un cycliste tourne sur une piste d'athlétisme circulaire de 400 mètres de long. Il parcourt 3 500 mètres au total.
    a) Combien de tours complets a-t-il effectués ?
    b) À quelle distance de la ligne de départ s'arrête-t-il ?
16. *Le problème du calendrier :* Aujourd'hui, nous sommes un mardi. Quel jour de la semaine serons-nous dans exactement 100 jours ? (Pense au diviseur 7 !).

Solutions

1. $29 = (4 \times 7) + 1$. **2.** Le dividende est $a = 43$, le diviseur est $b = 6$ (quotient $q = 7$, reste $r = 1$). **3.** - a) **Oui**, car le reste 4 est strictement plus petit que le diviseur 5 ($4 < 5$). - b) **Non**, car le reste 9 est plus grand que le diviseur 5 ($9 \geq 5$). On pouvait donner 1 part de plus : $34 = 5 \times 6 + 4$. - c) **Oui**, car $2 < 8$. - d) **Non**, car le reste 10 est plus grand que le diviseur 8 ($10 \geq 8$).

4. Les restes possibles sont les nombres entiers strictement inférieurs à 6 : **0, 1, 2, 3, 4 et 5**. **5.** - a) $23 = 5 \times 4 + 3 \Longrightarrow q = 4, r = 3$. - b) $31 = 4 \times 7 + 3 \Longrightarrow q = 7, r = 3$. - c) $47 = 9 \times 5 + 2 \Longrightarrow q = 5, r = 2$. - d) $58 = 8 \times 7 + 2 \Longrightarrow q = 7, r = 2$.

6. En $8 : 2 \times 4 = 8$ (reste 0). Abaisse le 4 : en 4, $1 \times 4 = 4$ (reste 0). **Quotient = 21, Reste = 0**. ($84 = 4 \times 21$). **7.** En $9 : 3 \times 3 = 9$ (reste 0). Abaisse le 5 : en 5, $1 \times 3 = 3$ (reste 2). **Quotient = 31, Reste = 2**. ($95 = 3 \times 31 + 2$). **8.** - En $7 : 1 \times 5 = 5$, reste 2. - Abaisse $3 \rightarrow 23 : 4 \times 5 = 20$, reste 3. - Abaisse $4 \rightarrow 34 : 6 \times 5 = 30$, reste 4. - **Quotient = 146, Reste = 4** ($4 < 5$). - *Vérification :* $146 \times 5 = 730$. Et $730 + 4 = 734$. C'est juste !

9. - En $8 : 2 \times 4 = 8$, reste 0. - Abaisse 1 : en 1, 4 va **0 fois** ! On pose **0** au quotient. - Abaisse $6 \rightarrow 16$: en 16, $4 \times 4 = 16$, reste 0. - **Quotient = 204, Reste = 0**. ($204 \times 4 = 816$).

10. a) $135 = 8 \times 16 + 7$. Il peut vendre **16 bouquets complets** (il lui reste 7 tulipes). b) Comme il lui reste 7 tulipes et qu'un bouquet en demande 8, il ne lui manque que **1 tulipe** ($8 - 7 = 1$) pour composer un bouquet de plus.

11. $172 = 50 \times 3 + 22$. 3 autocars ne suffisent pas car 22 élèves resteraient sur le trottoir. Il faut donc réserver **4 autocars**. **12.** On applique la formule : $a = (b \times q) + r = (7 \times 13) + 4 = 91 + 4 = 95$. Le dividende était **95**. **13.** Cherchons un nombre N compris entre 40 et 50 satisfaisant les deux conditions :

- Multiples de 6 augmentés de 3 compris entre 40 et 50 : $6 \times 7 + 3 = 45$.
- Vérifions avec la division par 7 : $45 = 7 \times 6 + 3$, le quotient est 6 et le reste est bien 3 !

Le nombre mystère est donc **45**.

14. a) $925 \div 8$:

- En 9 : $1 \times 8 = 8$, reste 1.
- Abaisse $2 \to 12$: $1 \times 8 = 8$, reste 4.
- Abaisse $5 \to 45$: $5 \times 8 = 40$, reste 5.

Chaque matelot reçoit **115 pièces**. b) Le capitaine empoche le reste : **5 pièces**. c) **Non**, c'est impossible ! D'après la règle d'or, le reste doit toujours être strictement inférieur au diviseur ($r < 8$). Le reste maximal possible est 7 pièces. S'il restait 9 pièces, les matelots réclameraient chacun 1 pièce de plus !

15. a) Division de 3 500 par 400 : $3\,500 = (400 \times 8) + 300$. Il a effectué **8 tours complets**. b) Le reste est de 300 : il s'arrête à **300 mètres** de la ligne de départ.

16. Une semaine compte 7 jours. On effectue la division de 100 par 7 : $100 = (7 \times 14) + 2$. 14 semaines complètes s'écoulent (ce qui nous ramène exactement à un mardi). Il reste ensuite **2 jours supplémentaires**. Deux jours après mardi : mercredi (+1), puis **jeudi** (+2). Dans 100 jours, ce sera un **jeudi** !

Solution des Gammes du Praticien :

1. $37 = 5 \times \mathbf{7} + \mathbf{2}$ ($q = 7, r = 2$) ; 2. $50 = 6 \times \mathbf{8} + \mathbf{2}$ ($q = 8, r = 2$) ; 3. $72 = 8 \times \mathbf{9} + \mathbf{0}$ ($q = 9, r = 0$) ; 4. $43 = 7 \times \mathbf{6} + \mathbf{1}$ ($q = 6, r = 1$) ; 5. $0 = 9 \times \mathbf{0} + \mathbf{0}$ ($q = 0, r = 0$) ; 6. $612 = 3 \times \mathbf{204} + \mathbf{0}$ ($q = 204, r = 0$) ; 7. $85 = 4 \times \mathbf{21} + \mathbf{1}$ ($q = 21, r = 1$) ; 8. $105 = 10 \times \mathbf{10} + \mathbf{5}$ ($q = 10, r = 5$) ; 9. $490 = 7 \times \mathbf{70} + \mathbf{0}$ ($q = 70, r = 0$) ; 10. $150 = 25 \times \mathbf{6} + \mathbf{0}$ ($q = 6, r = 0$).

La question qui ouvre la suite

Regarde à nouveau nos quatre familles de pêcheurs et leurs 14 poissons du début du chapitre. Chacune est repartie avec 3 magnifiques esturgeons entiers. Et il reste **2 gros poissons** sur la table de pierre.

Les familles ont encore faim. Les enfants regardent ces deux poissons avec envie. Le chef du village déclare alors : *« Ces deux poissons ne doivent pas être perdus ! Puisqu'on ne peut pas les distribuer entiers, nous allons sortir le grand couteau et les fendre en parts égales ! »*

Mais quand on brise un objet entier en morceaux, comment nommer ces parts ? Comment écrire avec des chiffres un morceau qui est plus petit que 1 ? C'est le grand saut vers le chapitre suivant : **La Galette Brisée et le Tamis de Mesure** !

CHAPITRE 10 : La Galette Brisée et le Tamis de Mesure

> « Jusqu'ici, nos nombres comptaient des objets entiers et solides : des cailloux, des moutons, des pièces d'or. Mais le monde réel est fait de pain que l'on rompt, de tissu que l'on découpe et de temps qui s'écoule par fractions d'heures. Pour mesurer le monde brisé, l'esprit a dû inventer la fraction. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi les nombres entiers ne suffisent plus quand on doit partager ce qui ne tombe pas juste.
- L'anatomie d'une fraction à deux étages : le **dénominateur** (qui nomme la taille des parts) et le **numérateur** (qui compte les parts prises).
- Savoir d'un coup d'œil si une fraction est **plus petite**, **égale** ou **plus grande que 1**.
- Comment décomposer une grande fraction en **unités entières plus une part restante** (comme $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$).
- Placer des fractions avec précision sur une **droite graduée**.
- Pourquoi $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$: le secret des **fractions équivalentes** grâce au pliage de papier.
- **Additionner et soustraire** des fractions qui ont le même dénominateur sans se tromper.

---

1. Le problème : la galette d'orge du boulanger

L'odeur du pain chaud et doré s'échappe de la bouche du four communal en briques d'argile. Le boulanger sort sur une grande planche de bois une magnifique galette d'orge, ronde comme un disque d'or, fumante et croustillante.

Autour de la table, **quatre enfants** ont le ventre qui gargouille d'impatience. Il n'y a qu'une seule galette pour quatre convives.

Fig. 40. – Le partage de la galette : les fractions de disque

Si le boulanger applique la division euclidienne du chapitre précédent :

$$1 = (4 \times 0) + 1$$

Le quotient est 0, le reste est 1 ! Les enfants recevraient 0 galette chacun, et la galette entière resterait sur la table à refroidir. Ce serait absurde et bien triste !

Le boulanger sourit, sort un grand couteau d'acier et pose la lame au centre de la galette : 1. *Premier coup droit :* la lame fend la galette de part en part. Voici **deux demi-galettes identiques**. 2. *Second coup perpendiculaire :* la lame recoupe à angle droit. La galette est maintenant partagée en **quatre quartiers rigoureusement égaux**.

Chaque enfant tend sa main et reçoit sa part. Combien a reçu chaque enfant ? Il n'a pas reçu 0 galette. Il n'a pas reçu 1 galette entière. Il a reçu **une part provenant d'un tout coupé en 4 morceaux égaux**.

Pour noter cette quantité nouvelle, les hommes ont inventé une écriture à deux étages, séparés par un trait horizontal :

$$\frac{1}{4}$$

Cette écriture se lit : **« un quart »**. Le mot vient du latin *fractio*, qui signifie « action de briser en morceaux ». Tu viens de franchir la porte du monde des **fractions**.

---

2. L'anatomie d'une fraction : le tamis et la récolte

Une fraction n'est pas un nombre ordinaire posé sur une ligne. C'est une alliance entre deux nombres entiers qui jouent deux rôles très différents :

Fig. 41. – Anatomie d'une fraction : rôle du numérateur et du dénominateur

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Numérateur et Dénominateur** Dans l'écriture d'une fraction $\frac{a}{b}$ (avec $b \neq 0$) :

- Le **dénominateur** (b, en bas) indique en combien de parts **égales** l'unité entière a été découpée. C'est la taille du « tamis ».
- Le **numérateur** (a, en haut) indique le nombre de parts que l'on a choisies, mangées ou coloriées. C'est la « récolte ».

Comment lire une fraction à voix haute ?

- Le bas se lit avec le suffixe **« -ième »** : $\frac{1}{5}$ se lit « un cinquième », $\frac{3}{7}$ se lit « trois septièmes », $\frac{7}{10}$ se lit « sept dixièmes ».
- Attention aux **trois exceptions historiques** :
  - $\frac{1}{2}$ se lit « un **demi** » (et pas « un deuxième ») ;
  - $\frac{1}{3}$ se lit « un **tiers** » (et pas « un troisième ») ;
  - $\frac{1}{4}$ se lit « un **quart** » (et pas « un quatrième »).

Le piège du dénominateur : plus il est grand, plus la part est petite !

Pose-toi cette question fondamentale : *Préfères-tu recevoir $\frac{1}{3}$ d'une tarte aux pommes ou $\frac{1}{8}$ de cette même tarte ?*

Un regard inattentif pourrait penser : *« 8 est plus grand que 3, donc $\frac{1}{8}$ est plus grand ! »* **C'est une erreur fatale pour un gourmand !**

Pense au geste physique du partage :

- Si tu partages une tarte entre **3 personnes** ($\frac{1}{3}$), tu n'as besoin que de trois parts : elles sont épaisses et copieuses.
- Si tu dois partager la même tarte entre **8 personnes** ($\frac{1}{8}$), tu dois donner beaucoup de coups de couteau : chaque tranche devient fine comme du papier !

$$\frac{1}{3} > \frac{1}{8}$$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — La règle du dénominateur** Pour des fractions ayant le **même numérateur** (par exemple 1 en haut) : **Plus le dénominateur est grand, plus la part est petite !**

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{10} > \frac{1}{100}$$

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Les fractions des scribes d'Égypte (le Papyrus Rhind)** Il y a plus de 3 500 ans, les scribes des pharaons ne notaient presque que des fractions avec un **1** au numérateur ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$). Pour exprimer une part comme $\frac{3}{4}$, ils la décomposaient en somme de fractions unitaires : $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. Le célèbre **Papyrus Rhind** (conservé au British Museum) contient des dizaines de tables de découpage pour partager équitablement le pain et la bière entre les ouvriers bâtisseurs de pyramides.

Fig. 42. – Le Papyrus mathématique Rhind (~1550 av. J.-C., Égypte ancienne) : tables de décomposition en fractions unitaires des scribes

---

3. Comparer une fraction à l'unité : petit, égal ou géant ?

Regarde une boîte de 6 chocolats. L'unité entière est la boîte complète (6 chocolats).

💡 Découverte — L'Unité Complète comme Fraction $6/6$

- o | o | o | o | o | o] <– 1 boîte complète = 6/6

1. **Si tu manges 4 chocolats :** tu as mangé $\frac{4}{6}$ de la boîte. Le numérateur (4) est plus petit que le dénominateur (6). Tu as mangé **moins d'une boîte entière** : $\frac{4}{6} < 1$.

2. **Si tu manges les 6 chocolats :** tu as mangé $\frac{6}{6}$ de la boîte. Le numérateur est égal au dénominateur. Tu as mangé **exactement 1 boîte entière** : $\frac{6}{6} = 1$.
3. **Si tu es très gourmand et que tu manges 11 chocolats** (en piochant dans une deuxième boîte) : Tu as mangé $\frac{11}{6}$ de boîte. Le numérateur (11) est plus grand que le dénominateur (6). Tu as mangé **plus d'une boîte entière** : $\frac{11}{6} > 1$.

📐 Propriété — Position par rapport à 1

Pour toute fraction $\frac{a}{b}$:

- Si le numérateur est strictement inférieur au dénominateur ($a < b$), alors $\frac{a}{b} < 1$.
- Si le numérateur est égal au dénominateur ($a = b$), alors $\frac{a}{b} = 1$.
- Si le numérateur est strictement supérieur au dénominateur ($a > b$), alors $\frac{a}{b} > 1$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Comparer à 1 Comparons les fractions suivantes à l'unité : $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{9}{4}$, $\frac{5}{6}$.

- Pour $\frac{3}{8}$: $3 < 8$, donc $\frac{3}{8} < 1$.
- Pour $\frac{7}{7}$: $7 = 7$, donc $\frac{7}{7} = 1$.
- Pour $\frac{9}{4}$: $9 > 4$, donc $\frac{9}{4} > 1$.
- Pour $\frac{5}{6}$: $5 < 6$, donc $\frac{5}{6} < 1$.

---

4. Décomposer une fraction : le pont entre division et fraction

Quand une fraction est plus grande que 1, elle cache en elle des unités entières complètes ! Regardons la fraction $\frac{7}{3}$ (sept tiers de galette). Chaque galette entière contient 3 tiers ($\frac{3}{3} = 1$). Combien de galettes entières peut-on fabriquer avec 7 tiers ?
Rappelons la division euclidienne de 7 par 3 :

$$7 = (3 \times 2) + 1$$

Dans 7, il y a **2 fois 3**, et il reste **1**. Cela signifie qu'avec 7 tiers, on fabrique **2 galettes complètes**, et il reste **1 tiers** !

$$\frac{7}{3} = \frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = 1 + 1 + \frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$$

🧭 Méthode — Écrire une fraction sous la forme « Entier + Fraction < 1 »

Pour décomposer une fraction $\frac{a}{b}$: 1. Effectue la division euclidienne de a par b : trouve le quotient q et le reste r ($a = b \times q + r$). 2. Écris directement :

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}$$

Comme $r < b$, la fraction $\frac{r}{b}$ est obligatoirement plus petite que 1 !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Décomposition d'une grande fraction
Décomposons $\frac{23}{5}$.

- Division de 23 par 5 : $23 = (5 \times 4) + 3$ (quotient 4, reste 3).
- On a donc : $\frac{23}{5} = 4 + \frac{3}{5}$. Cela veut dire que $\frac{23}{5}$ est compris entre 4 et 5 : $4 < \frac{23}{5} < 5$.

---

5. Placer des fractions sur une droite graduée

Une droite graduée est un chemin de mesure. Pour y placer des fractions : 1. Repère l'intervalle unité entre 0 et 1 (et entre 1 et 2, 2 et 3…). 2. Regarde le dénominateur : c'est le nombre de sous-parties égales qu'il faut créer entre chaque entier. 3. Fais des sauts réguliers pour compter le nombre de parts du numérateur.

Traçons une droite où chaque unité est partagée en **4 parts égales** (des quarts) :



Fig. 43. – La droite numérique graduée en quarts

- Le point A est situé à 1 quart du départ : c'est $\frac{1}{4}$.
- Le point B est situé sur le chiffre 1 : c'est $\frac{4}{4} = 1$.
- Le point C est situé à 7 quarts du départ : c'est $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Lire et placer sur la droite

Question : Sur une droite où l'unité est partagée en 5 parts égales (cinquièmes), où se place $\frac{8}{5}$? *Réponse :* On part de 0 et on avance de 8 petits crans de $\frac{1}{5}$. Comme $\frac{8}{5} = 1 + \frac{3}{5}$, le point se trouve entre 1 et 2, exactement 3 crans après le 1.

---

6. Les fractions équivalentes : le secret du pliage de papier

Prends une bande de papier blanc. Plie-la en deux exactement au milieu. Colorie la moitié en bleu. Tu as colorié **1 part sur 2** : c'est $\frac{1}{2}$.

Maintenant, sans rien découper et sans ajouter de couleur, replie ta bande en deux encore une fois. Déplie-la. Que constates-tu ? La bande entière est désormais partagée en **4 morceaux égaux**. Et la partie bleue contient désormais **2 morceaux sur 4** !



Fig. 44. – Fractions équivalentes par découpage de bandes : 1/2 = 2/4

La quantité de bleu a-t-elle augmenté ? Non ! La bande est-elle plus longue ? Non ! Seule la finesse du découpage a changé. Tu as multiplié par 2 le nombre total de tranches (en bas), mais tu as aussi multiplié par 2 le nombre de tranches bleues (en haut) :

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$

Si tu plies ta bande une troisième fois en deux, tu obtiens :

$$\frac{2}{4} = \frac{2 \times 2}{4 \times 2} = \frac{4}{8}$$

Toutes ces fractions désignent exactement **la même quantité de matière**. On dit que ce sont des **fractions équivalentes** (ou fractions égales).

📐 Règle d'or des fractions équivalentes

On ne change pas la valeur d'une fraction si l'on **multiplie** (ou si l'on **divise**) son numérateur et son dénominateur par un **même nombre entier** (différent de zéro) :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \qquad \text{et} \qquad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Fabriquer des fractions égales

- Trouver une fraction égale à $\frac{3}{5}$ ayant 20 pour dénominateur : Pour passer de 5 à 20, on multiplie par 4 ($5 \times 4 = 20$). On doit donc multiplier le haut aussi par 4 : $3 \times 4 = 12$.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$$

- Simplifier $\frac{6}{8}$: 6 et 8 sont tous les deux divisibles par 2 :

$$\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$$

---

7. Additionner et soustraire des fractions de même dénominateur

Imagine un grand gâteau coupé en 8 parts égales (des huitièmes).

- À midi, Léo mange 2 parts : il a mangé $\frac{2}{8}$ du gâteau.
- Au goûter, sa sœur Sarah mange 3 parts : elle a mangé $\frac{3}{8}$ du même gâteau.

Combien ont-ils mangé de gâteau à eux deux ? Ils ont mangé $2 \text{ parts} + 3 \text{ parts} = 5 \text{ parts}$ de taille « huitième ». Ils ont donc mangé $\frac{5}{8}$ du gâteau !

$$\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{2+3}{8} = \frac{5}{8}$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu — Partage du Gâteau en Huitièmes

- Gâteau en 8 parts :
- Léo | Léo | Sarah | Sarah | Sarah | | |]
- 2/8 —> <——- 3/8 ——->
- 5/8 ————>

📐 Règle — Addition et soustraction de même dénominateur

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions ayant le **même dénominateur** : 1. On **garde le même dénominateur** (on ne touche pas au bas !). 2. On **additionne (ou soustrait) les numérateurs** (on calcule sur le haut).

$$\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} \qquad \text{et} \qquad \frac{a}{c}-\frac{b}{c}=\frac{a-b}{c}$$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — L'erreur interdite** Ne jamais additionner les dénominateurs entre eux !

$$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}\neq\frac{1+2}{4+4}=\frac{3}{8} \quad \text{ARCHI-FAUX !}$$

Si tu ajoutes 1 quart de tarte et 2 quarts de tarte, tu obtiens 3 quarts de tarte ($\frac{3}{4}$), pas 3 huitièmes ! La taille du morceau ne change pas quand on en rassemble plusieurs dans la même assiette.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Calculs simples

- $A=\frac{3}{7}+\frac{2}{7}=\frac{3+2}{7}=\frac{5}{7}$
- $B=\frac{9}{10}-\frac{4}{10}=\frac{9-4}{10}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$
- $C=1-\frac{3}{5}$: Remplaçons le nombre entier 1 par une fraction ayant 5 pour dénominateur : $1=\frac{5}{5}$.

$$C=\frac{5}{5}-\frac{3}{5}=\frac{5-3}{5}=\frac{2}{5}$$

Ce qu'il faut retenir

1. **Une fraction** $\frac{a}{b}$ représente un partage équitable : le bas (b, dénominateur) donne le nombre de parts dans l'unité ; le haut (a, numérateur) donne le nombre de parts prises.
2. **Vocabulaire :** $\frac{1}{2}$ (un demi), $\frac{1}{3}$ (un tiers), $\frac{1}{4}$ (un quart), $\frac{a}{b}$ (a b-ièmes).
3. **Comparaison à 1 :**
   - $a<b \Longrightarrow \frac{a}{b}<1$
   - $a=b \Longrightarrow \frac{a}{b}=1$
   - $a>b \Longrightarrow \frac{a}{b}>1$
4. **Décomposition :** Pour $\frac{a}{b}>1$, on effectue la division euclidienne $a=b\times q+r$, ce qui donne $\frac{a}{b}=q+\frac{r}{b}$ (un nombre entier plus une fraction inférieure à 1).
5. **Fractions équivalentes :** En multipliant ou divisant haut et bas par le même nombre, la valeur de la fraction ne change pas ($\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{5}{10}$).
6. **Addition / soustraction :** De même dénominateur, on calcule uniquement sur le numérateur : $\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c}$.

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Écris sous forme de fraction en chiffres :
   a) trois cinquièmes
   b) sept huitièmes

c) un demi
d) quatre tiers

2. Dans la fraction $\frac{5}{9}$:
   a) Quel est le numérateur ? Que signifie-t-il concrètement ?
   b) Quel est le dénominateur ? Que signifie-t-il concrètement ?
3. Indique pour chaque fraction si elle est plus petite que 1, égale à 1 ou plus grande que 1 :

$$\frac{4}{7}, \quad \frac{9}{9}, \quad \frac{12}{5}, \quad \frac{1}{10}, \quad \frac{8}{3}, \quad \frac{15}{15}$$

4. Range dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) :

$$\frac{1}{9}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{5}, \quad \frac{1}{100}, \quad \frac{1}{3}$$

5. Complète les pointillés pour former des fractions égales :
   a) $\frac{1}{3} = \frac{\ldots}{6}$
   b) $\frac{2}{5} = \frac{\ldots}{10}$
   c) $\frac{3}{4} = \frac{9}{\ldots}$
   d) $\frac{10}{20} = \frac{1}{\ldots}$
6. Calcule les sommes et différences suivantes :
   a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$
   b) $\frac{5}{9} - \frac{1}{9}$
   c) $\frac{4}{12} + \frac{7}{12}$
   d) $\frac{8}{10} - \frac{5}{10}$

Niveau (Réflexion et géométrie)

7. Sur une droite graduée, l'unité est partagée en 6 intervalles égaux.
   a) Quelles fractions correspondent aux points situés à 1 cran, 5 crans et 8 crans de l'origine 0 ?
   b) Décompose la fraction du troisième point sous la forme « entier + fraction ».
8. Décompose les fractions suivantes sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 (comme dans l'exemple $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$) :
   a) $\frac{11}{4}$
   b) $\frac{17}{5}$
   c) $\frac{26}{8}$
   d) $\frac{31}{6}$
9. Calcule :
   a) $1 - \frac{2}{3}$
   b) $1 - \frac{5}{8}$
   c) $2 + \frac{3}{4}$ (écris le résultat sous forme d'une seule fraction)
10. Un groupe de 5 amis commande des pizzas de 8 parts chacune. Au total, ils mangent 22 parts.
    a) Quelle fraction d'une pizza ont-ils mangée au total ?
    b) Combien de pizzas entières ont été entièrement consommées ?
    c) Combien de parts reste-t-il sur la dernière pizza entamée ?
11. Vrai ou Faux ? Justifie ta réponse à chaque fois :
    a) $\frac{3}{4}$ est plus grand que $\frac{5}{4}$.
    b) $\frac{2}{3}$ est égal à $\frac{6}{9}$.
    c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
    d) $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{10}$.

Niveau (Défis d'arpenteurs et de marchands)

12. Trois enfants reçoivent chacun une tablette de chocolat identique de 24 carrés.
    - Manon mange $\frac{1}{2}$ de sa tablette.
    - Arthur mange $\frac{3}{8}$ de sa tablette.
    - Chloé mange $\frac{5}{12}$ de sa tablette. Combien de carrés de chocolat chacun a-t-il mangés ? Qui en a mangé le plus ?

13. Encadre chaque fraction entre deux nombres entiers consécutifs (qui se suivent) :

$$\ldots < \frac{14}{3} < \ldots \qquad \ldots < \frac{37}{5} < \ldots \qquad \ldots < \frac{49}{8} < \ldots$$

14. Nadia parcourt une piste de cross de 1 200 mètres.
    - Au premier arrêt, elle a parcouru $\frac{2}{6}$ du parcours.
    - Au second arrêt, elle a parcouru $\frac{5}{6}$ du parcours.

    a) Quelle fraction du parcours lui reste-t-il à faire au second arrêt ?
    b) Combien de mètres cela représente-t-il ?

15. *Le défi du ruban magique :* Un ruban mesure 1 mètre de long. On le coupe en deux parties égales. On prend l'un des deux morceaux et on le coupe à nouveau en deux parties égales. On répète cette opération encore deux fois. Quelle fraction du ruban de départ mesure le plus petit morceau obtenu ?

Solutions

1. a) $\frac{3}{5}$; b) $\frac{7}{8}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{4}{3}$. **2.** a) Le numérateur est 5 : il indique qu'on a pris 5 parts. b) Le dénominateur est 9 : il indique que l'unité a été partagée en 9 parts égales. **3.** - Plus petites que 1 : $\frac{4}{7}$, $\frac{1}{10}$ (car le haut est plus petit que le bas). - Égales à 1 : $\frac{9}{9}$, $\frac{15}{15}$ (car haut = bas). - Plus grandes que 1 : $\frac{12}{5}$, $\frac{8}{3}$ (car le haut est plus grand que le bas).
4. Même numérateur (1) : plus le dénominateur est grand, plus la fraction est petite.

$$\frac{1}{100} < \frac{1}{9} < \frac{1}{5} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$$

5. a) $\frac{1}{3} = \frac{1\times2}{3\times2} = \mathbf{\frac{2}{6}}$. b) $\frac{2}{5} = \frac{2\times2}{5\times2} = \mathbf{\frac{4}{10}}$. c) $\frac{3}{4} = \frac{3\times3}{4\times3} = \mathbf{\frac{9}{12}}$. d) $\frac{10}{20} = \frac{10\div10}{20\div10} = \mathbf{\frac{1}{2}}$.
6. a) $\frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$; b) $\frac{5-1}{9} = \frac{4}{9}$; c) $\frac{4+7}{12} = \frac{11}{12}$; d) $\frac{8-5}{10} = \frac{3}{10}$.
7. a) 1 cran = $\frac{1}{6}$; 5 crans = $\frac{5}{6}$; 8 crans = $\frac{8}{6}$. b) $\frac{8}{6} = \frac{6}{6} + \frac{2}{6} = 1 + \frac{2}{6}$ (ou $1 + \frac{1}{3}$).
8. a) $11 = 4 \times 2 + 3 \Longrightarrow \frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4}$. b) $17 = 5 \times 3 + 2 \Longrightarrow \frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$. c) $26 = 8 \times 3 + 2 \Longrightarrow \frac{26}{8} = 3 + \frac{2}{8}$ (ou $3 + \frac{1}{4}$). d) $31 = 6 \times 5 + 1 \Longrightarrow \frac{31}{6} = 5 + \frac{1}{6}$.
9. a) $1 - \frac{2}{3} = \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. b) $1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$. c) $2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$.
10. a) Une pizza = 8 parts. Ils ont mangé $\mathbf{\frac{22}{8}}$ de pizza. b) $22 = 8 \times 2 + 6 \Longrightarrow \frac{22}{8} = 2 + \frac{6}{8}$. Donc **2 pizzas entières** ont été complètement mangées. c) Sur la 3e pizza, ils ont mangé 6 parts sur 8. Il reste donc $8 - 6 =$ **2 parts**.
11. a) **Faux**, car $3 < 5$ avec le même dénominateur, donc $\frac{3}{4} < \frac{5}{4}$. b) **Vrai**, car $\frac{2\times3}{3\times3} = \frac{6}{9}$. c) **Vrai**, car $\frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} = 1$. d) **Faux**, on n'additionne pas les dénominateurs ! $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$, pas $\frac{4}{10}$.
12. - Manon : $\frac{1}{2}$ de 24 carrés = $24 \div 2 =$ **12 carrés**. - Arthur : 1 huitième vaut $24 \div 8 = 3$ carrés. Donc 3 huitièmes valent $3 \times 3 =$ **9 carrés**. - Chloé : 1 douzième vaut $24 \div 12 = 2$ carrés. Donc 5 douzièmes valent $5 \times 2 =$ **10 carrés**. C'est **Manon** qui en a mangé le plus (12 carrés).
13. - $14 = 3 \times 4 + 2 \Longrightarrow 4 < \frac{14}{3} < 5$. - $37 = 5 \times 7 + 2 \Longrightarrow 7 < \frac{37}{5} < 8$. - $49 = 8 \times 6 + 1 \Longrightarrow 6 < \frac{49}{8} < 7$.
14. a) Le parcours total vaut $\frac{6}{6}$. Au second arrêt, elle a parcouru $\frac{5}{6}$. Il lui reste donc $\frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ du parcours. b) Le parcours fait 1 200 m. $\frac{1}{6}$ de 1 200 m, c'est $1\,200 \div 6 =$ **200 mètres**.
15. - 1re coupe en deux : morceaux de $\frac{1}{2}$. - 2e coupe en deux : morceaux de $\frac{1}{4}$ (car $\frac{1}{2} \div 2 = \frac{1}{4}$). - 3e coupe en deux : morceaux de $\frac{1}{8}$. - 4e coupe en deux : morceaux de $\frac{1}{16}$.
Le plus petit morceau mesure $\mathbf{\frac{1}{16}}$ **de mètre** (soit 6,25 cm).

La question qui ouvre la suite

Grâce aux fractions, tu sais maintenant briser n'importe quelle galette en 3, en 4, en 7 ou en 12 parts égales. Mais les marchands et les ingénieurs de la Renaissance se heurtaient à un problème très agaçant : Pour comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$, ou pour faire des additions avec des tiers, des quarts et des cinquièmes mélangés, il fallait sans cesse chercher des dénominateurs communs compliqués.

En 1585, un ingénieur et mathématicien flamand de génie, **Simon Stevin**, poussa un grand cri : *« Pourquoi s'embêter avec tous ces dénominateurs différents ? Notre système de numération compte par paquets de 10 : unités, dizaines, centaines. Prolongeons simplement cette échelle sous le chiffre 1 : des dixièmes, des centièmes, des millièmes ! »*

Pour séparer le monde des objets entiers du monde des miettes décimales, il suffisait d'un petit signe magique : **la virgule**. Prépare-toi à découvrir les nombres décimaux au **Chapitre 11 : Les Dixièmes de Simon Stevin** !

CHAPITRE 11 : Les Dixièmes de Simon Stevin

> « Tout le monde admire la perfection de notre système qui compte par dizaines, centaines et milliers. Pourquoi s'arrêter à l'unité comme devant un mur infranchissable ? En franchissant ce seuil par dixièmes et centièmes, toutes les mesures deviennent aussi simples que des nombres entiers. » — *D'après Simon Stevin,* La Disme *(1585).*

Ce que tu vas découvrir

- L'incroyable coup de génie de l'ingénieur flamand **Simon Stevin** en 1585.
- Ce que sont les **fractions décimales** ($\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1\,000}$) et comment elles prolongent le tableau de numération.
- Le rôle de **la virgule** : la frontière étanche entre la partie entière et la partie décimale.
- Le piège classique : comprendre pourquoi **3, 2 est plus grand que 3, 18**, même si 18 est plus grand que 2 !
- **Encadrer et intercaler** des décimaux : découvrir qu'entre deux nombres, il y a toujours une infinité d'autres nombres.
- Poser **l'addition et la soustraction** de décimaux en alignant les virgules comme les boutons d'une chemise.
- Multiplier par 10, 100 et 1 000 en un clin d'œil en faisant glisser les rangs.

---

1. Le problème : le cauchemar des marchands de Bruges

Nous sommes en l'an 1585 dans la florissante cité de Bruges, en Flandre. Les canaux sont encombrés de péniches chargées de grains, d'épices, de tonneaux de bière et de rouleaux de drap flamand.

Sur les quais, les marchands et les percepteurs d'impôts s'arrachent les cheveux. Pour calculer le prix d'un chargement de blé, un marchand doit additionner :

- 14 florins entiers,
- plus $\frac{3}{7}$ de florin pour le transport en charrette,
- plus $\frac{5}{12}$ de florin pour la taxe de pontonnier,
- moins $\frac{1}{6}$ de florin de rabais !

Chaque marchand utilise des fractions avec des dénominateurs différents : des tiers, des septièmes, des douzièmes, des seizièmes. Il faut sans cesse chercher des dénominateurs communs, réduire au même bas, simplifier… Les calculs prennent des heures, les erreurs s'accumulent et les querelles éclatent sur les marchés.

Un homme observe ce désordre avec calme. Il s'appelle **Simon Stevin** (1548-1620). C'est un ingénieur, mathématicien et quartier-maître général de l'armée néerlandaise.

> 💡 **Découverte & Histoire — Simon Stevin (1548 - 1620)**
>
> « *Pourquoi compliquer ce qui peut être simple ? Nous comptons par dizaines, centaines et milliers. Faisons la même chose SOUS l'unité !* »

Stevin se pose une question lumineuse : *« Quand nous écrivons 111, le premier 1 vaut 100, le deuxième vaut 10, le troisième vaut 1. Chaque rang est 10 fois plus petit que le précédent. Pourquoi s'arrêter brutalement à 1 ? Continuons ! Le rang suivant sera 10 fois plus petit que 1, puis 10 fois plus petit encore ! »*

En 1585, Stevin publie un petit livre de 36 pages intitulé en flamand *De Thiende* (« La Dixième »), traduit en français sous le titre *La Disme*. C'est la naissance officielle des **nombres décimaux**.

---

2. Du gâteau découpé au tableau de numération : les fractions décimales

Pour comprendre le voyage sous le chiffre 1, prenons une grande bande unité de longueur 1 mètre.

Fig. 45. – Multiplication par 10, 100, 1000 : glissement des rangs décimaux et de la virgule

1. **Les dixièmes :** Coupons ce mètre en **10 parts égales**. Chaque morceau est une fraction décimale :

$$\frac{1}{10} \text{ de mètre (un dixième de mètre, ou } 1 \text{ décimètre)}$$

   Il faut 10 dixièmes pour faire 1 unité complète : $\frac{10}{10} = 1$.

2. **Les centièmes :** Prenons l'un de ces dixièmes et coupons-le encore en **10 morceaux minuscules**. Comme il y avait 10 dixièmes, l'unité entière est maintenant partagée en $10 \times 10 = 100$ petits morceaux ! Chaque miette s'appelle un **centième** :

$$\frac{1}{100} \text{ de mètre (un centième de mètre, ou } 1 \text{ centimètre)}$$

   Il faut 10 centièmes pour fabriquer 1 dixième ($\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$). Et il faut 100 centièmes pour faire 1 unité entière ($\frac{100}{100} = 1$).

3. **Les millièmes :** Coupons chaque centième en 10 poussières encore plus fines. L'unité entière est maintenant découpée en $100 \times 10 = 1\,000$ parts ! Chaque poussière s'appelle un **millième** :

$$\frac{1}{1\,000} \text{ de mètre (un millième de mètre, ou } 1 \text{ millimètre)}$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fraction décimale** Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est $10, 100, 1\,000, 10\,000\ldots$ (une puissance de 10).

---

3. La virgule : le poste frontière de la numération

Comment écrire ces fractions sans avoir à dessiner des barres de fraction à deux étages ? Regardons le grand tableau de numération étendu vers la droite :

…	Centaines (c)	Dizaines (d)	Unités (u)	,	Dixièmes ($\frac{1}{10}$)	Centièmes ($\frac{1}{100}$)	Millièmes ($\frac{1}{1\,000}$)
	100	10	1	**,**	$0,1$	$0,01$	$0,001$
			3	**,**	**4**	**7**	

Regarde ce nombre : $\mathbf{3,47}$. Il se compose de deux territoires bien distincts :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Nombre décimal, partie entière et décimale** Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

- La **partie entière** est située à gauche de la virgule (les unités, dizaines, centaines…).
- La **partie décimale** est située à droite de la virgule (les dixièmes, centièmes, millièmes…).
- **La virgule** est la frontière qui indique où se trouve le rang des unités simples.

Comment se lit $3,47$?

- À l'école : on dit souvent rapidement « trois virgule quarante-sept ».
- Mais la lecture mathématique précise est : « **3 unités et 47 centièmes** » ou bien « **3 unités, 4 dixièmes et 7 centièmes** ».

$$3,47 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100} = 3 + \frac{47}{100} = \frac{347}{100}$$

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Simon Stevin n'utilisait pas encore notre virgule moderne ! Il écrivait de petits cercles avec des numéros au-dessus des chiffres : $3\ \ (0)\ \ 4\ \ (1)\ \ 7\ \ (2)$ pour marquer les unités, les dixièmes et les centièmes. C'est l'Écossais **John Napier** (l'inventeur des logarithmes) qui popularisa la virgule ou le point décimal quelques années plus tard, en 1617. Dans les pays anglophones (Angleterre, États-Unis), on utilise un point (3.47) ; en France et dans la plupart des pays d'Europe, on utilise la virgule ($3,47$).

---

4. Le grand piège : pourquoi $3,2$ est plus grand que $3,18$!

C'est le piège numéro 1 de l'école primaire, celui dans lequel tombent presque tous les élèves au moins une fois !
Regarde ces deux nombres :

$$3,2 \quad \text{et} \quad 3,18$$

L'œil non averti regarde la partie droite et se dit : *« 18 est plus grand que 2, donc 3,18 doit être plus grand que 3,2 ! »*
C'est complètement faux !
Pourquoi ? Parce qu'on ne compare pas des morceaux de même taille !

- Dans $3,2$, le 2 représente **2 dixièmes** de gâteau (2 grosses tranches).
- Dans $3,18$, le 1 représente **1 dixième** et le 8 représente **8 centièmes**.

Pour comparer équitablement, il faut donner à chacun la même unité de mesure (les centièmes). Ajoutons un **zéro inutile** à la fin de $3,2$:

$$3,2 = 3,20 \quad (3 \text{ unités et } 20 \text{ centièmes})$$

Maintenant, compare :

- $3,20$, c'est 3 gâteaux et **20 centièmes**.
- $3,18$, c'est 3 gâteaux et **18 centièmes**.

Comme $20 > 18$, il est évident que :

$$\mathbf{3,2 > 3,18}$$

🧭 Méthode — Comparer deux nombres décimaux sans jamais se tromper

1. On compare d'abord la **partie entière** :

$7,1 > 5,99$ car $7 > 5$. (Pas besoin de regarder après la virgule !). 2. Si les parties entières sont égales, on compare le **chiffre des dixièmes** : Dans $3,\mathbf{2}$ et $3,\mathbf{1}8$, le chiffre des dixièmes est 2 contre 1. Comme $2 > 1$, alors $3,2 > 3,18$. 3. Si les dixièmes sont encore égaux, on compare les **centièmes**, et ainsi de suite. *Astuce infaillible :* Tu peux ajouter des zéros à droite pour que les deux nombres aient le même nombre de chiffres après la virgule !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les zéros utiles et inutiles

- **Zéros inutiles :** On peut ajouter ou supprimer des zéros tout à fait à droite de la partie décimale sans changer le nombre :

$$4,5 = 4,50 = 4,500$$

- **Zéros indispensables :** Un zéro coincé entre la virgule et un autre chiffre ne peut JAMAIS être enlevé :

$$4,05 \neq 4,5$$

$4,05$ c'est 4 unités et 5 centièmes. $4,5$ c'est 4 unités et 5 dixièmes (soit 50 centièmes) ! C'est 10 fois plus de miettes !

---

5. Intercaler et encadrer : le monde infini entre deux nombres

Avec les nombres entiers, entre 3 et 4, il n'y a **rien**. Aucun entier ne peut se glisser entre eux. Mais avec les décimaux, le monde devient infiniment riche !

Regardons la règle graduée entre 3 et 4 :

Entre 3 et 4, nous avons intercalé 9 nombres au dixième : $3,1 ; 3,2 ; 3,3 \ldots$

Et maintenant, que se passe-t-il entre $3,1$ et $3,2$? Écrivons-les avec des centièmes : $3,10$ et $3,20$. Entre $3,10$ et $3,20$, nous pouvons glisser :

$$3,11 \quad ; \quad 3,12 \quad ; \quad 3,15 \quad ; \quad 3,19$$

Et entre $3,14$ et $3,15$? Nous pouvons écrire $3,140$ et $3,150$, et glisser des millièmes comme $3,145$!

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Entre deux nombres décimaux, aussi proches soient-ils, on peut TOUJOURS trouver un autre nombre décimal (et même une infinité !). Il n'y a jamais de trou vide que l'on ne puisse combler en zoomant plus fort.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Encadrer et intercaler

- *Encadrer 4,72 à l'unité près :* $4 < 4,72 < 5$.
- *Encadrer 4,72 au dixième près :* $4,7 < 4,72 < 4,8$ (car $4,70 < 4,72 < 4,80$).
- *Intercaler un nombre entre 6,3 et 6,4 :* On pense à $6,30$ et $6,40$. On peut choisir $6,35$ (ou $6,31$ ou $6,38$).

---

6. Addition et soustraction posées : les boutons de chemise

Pour additionner ou soustraire des nombres décimaux, la règle est royale et très simple : **Il faut impérativement aligner les virgules les unes sous les autres.**

Imagine que la virgule est la rangée des boutons de ta chemise : si le premier bouton est décalé d'un trou, toute la chemise est de travers !

Exemple posé : Calculons $43,7 + 8,56$

```
     d   u , dixièmes  centièmes
     1   1                <-- retenues
     4   3 ,    7      0   <-- on peut ajouter un 0 pour équilibrer
+        8 ,    5      6
-----------------------
     5   2 ,    2      6
```

1. J'aligne les virgules.
2. J'ajoute un zéro à droite de $43,7$ pour avoir deux chiffres après la virgule : $43,70$.
3. J'additionne colonne par colonne de droite à gauche :
   - Centièmes : $0 + 6 = 6$.
   - Dixièmes : $7 + 5 = 12 \rightarrow$ je pose 2 et je retiens 1 unité.
   - **Je pose tout de suite la virgule au résultat, bien alignée !**
   - Unités : $1 \quad (\text{retenue}) + 3 + 8 = 12 \rightarrow$ je pose 2 et retiens 1 dizaine.
   - Dizaines : $1 \quad (\text{retenue}) + 4 = 5$.
4. **Résultat :** $52,26$.

Exemple posé : Calculons $35,2 - 7,64$

```
     d   u , dixièmes  centièmes
     2  14     11     10   <-- retenues (méthode par cassage)
     3   5 ,    2      0   <-- le zéro ici est OBLIGATOIRE !

-        7 ,    6      4
-----------------------
     2   7 ,    5      6
```

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Le zéro obligatoire dans la soustraction** Dans $35,2 - 7,64$, on ne peut pas faire « rien moins 4 = 4 » ! C'est une erreur gravissime. Il faut obligatoirement écrire $35,2\mathbf{0}$. Ensuite on calcule : 0 centième moins 4 centièmes, impossible $\rightarrow$ on prend 1 dixième pour faire 10 centièmes, et $10 - 4 = 6$!

---

7. Multiplier par 10, 100 et 1 000 : le grand glissement

Que se passe-t-il quand on multiplie un nombre décimal par 10 ? Rappelle-toi : chaque unité devient une dizaine, chaque dixième devient une unité, chaque centième devient un dixième ! Tout le monde monte d'un rang vers la gauche. Sur le papier, cela donne l'illusion que **la virgule se déplace vers la droite**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calcul rapide

- $0,6 \times 10 = 6$
- $2,38 \times 100 = 238$
- $4,7 \times 100 = 470$ (on a déplacé d'un rang pour faire 47, puis on ajoute un zéro pour faire le deuxième rang !)
- $0,005 \times 1\,000 = 5$

Ce qu'il faut retenir

1. **Un nombre décimal** possède une partie entière et une partie décimale séparées par une virgule.
2. **Valeur de position :**
   - 1er chiffre après la virgule = **dixièmes** ($\frac{1}{10} = 0,1$) ;
   - 2e chiffre = **centièmes** ($\frac{1}{100} = 0,01$) ;
   - 3e chiffre = **millièmes** ($\frac{1}{1\,000} = 0,001$).
3. **Pour comparer deux décimaux :** On regarde d'abord la partie entière. Si elles sont égales, on compare les dixièmes, puis les centièmes. On peut ajouter des zéros à droite pour équilibrer ($3,2 = 3,20 > 3,18$).
4. **Pour poser une addition ou soustraction :** On aligne impérativement les virgules verticalement. On pense à poser un zéro en haut dans la soustraction si besoin ($5 - 2,3 = 5,0 - 2,3$).
5. **Multiplier par 10, 100, 1 000 :** On décale la virgule de 1, 2 ou 3 rangs vers la droite, en complétant par des zéros si nécessaire.

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Donne l'écriture décimale à virgule de chaque fraction décimale :
   a) $\frac{3}{10}$
   b) $\frac{45}{100}$
   c) $\frac{7}{100}$
   d) $\frac{128}{10}$
   e) $\frac{2\,456}{1\,000}$
2. Dans le nombre $84,375$:
   a) Quel est le chiffre des dizaines ?
   b) Quel est le chiffre des dixièmes ?
   c) Quel est le chiffre des centièmes ?
   d) Quel est le chiffre des millièmes ?
3. Supprime les zéros inutiles s'il y en a :
   $$045,20 \qquad 3,08 \qquad 7,500 \qquad 0,040 \qquad 120,0$$
4. Complète avec le symbole qui convient : $<$, $>$ ou $=$:
   a) $5,4 \ldots 5,19$
   b) $8,30 \ldots 8,3$
   c) $12,08 \ldots 12,8$
   d) $0,75 \ldots 0,705$
   e) $9,99 \ldots 10,1$
5. Calcule mentalement :
   a) $4,3 \times 10$

b) $0,75 \times 100$
c) $12,8 \times 100$
d) $0,006 \times 1\,000$
e) $3,25 \times 10$

Niveau (Opérations et encadrements)

6. Pose et effectue les additions suivantes :
   a) $24,6 + 8,75$
   b) $135,08 + 48,9$
   c) $7 + 14,35$
7. Pose et effectue les soustractions suivantes :
   a) $45,8 - 12,35$
   b) $82,4 - 37,86$
   c) $15 - 4,75$
8. Encadre chaque nombre décimal par deux nombres entiers qui se suivent :
   $\ldots < 7,38 < \ldots$ $\ldots < 0,84 < \ldots$ $\ldots < 29,99 < \ldots$
9. Encadre chaque nombre au dixième près :
   $\ldots < 5,47 < \ldots$ $\ldots < 12,83 < \ldots$ $\ldots < 0,39 < \ldots$
10. Trouve un nombre décimal à intercaler dans chaque cas :
    a) Entre $4,6$ et $4,7$
    b) Entre $8,15$ et $8,16$
    c) Entre $0,9$ et 1
11. Range ces cinq nombres dans l'ordre croissant :
    $4,25 \quad ; \quad 4,2 \quad ; \quad 4,05 \quad ; \quad 4,205 \quad ; \quad 4,5$

Niveau (Problèmes de la vie réelle)

12. Pour confectionner un costume de théâtre, une couturière achète :
    - un coupon de velours à $24,50$ €,
    - du galon doré à $8,75$ €,
    - une boîte de boutons à $3,80$ €. Elle paye avec un billet de 50 €.

    a) Quel est le montant total de ses achats ?
    b) Combien d'argent le commerçant lui rend-il ?
13. Un coureur s'entraîne pour le marathon. Le lundi, il parcourt $12,4$ km. Le mercredi, il parcourt $3,85$ km de plus que le lundi. Le vendredi, il court $15,2$ km. Quelle distance totale a-t-il parcourue au cours de la semaine ?
14. Un rouleau de grillage mesure 25 mètres. Un jardinier en coupe d'abord un morceau de $7,45$ m pour entourer son potager, puis un autre morceau de $11,8$ m pour protéger ses framboisiers. Quelle longueur de grillage reste-t-il sur le rouleau ?
15. *Le mystère du ticket effacé :* Sur une ardoise, une addition a été en partie effacée par la pluie :
    $$2\,?,4 + 6,7\,? = 35,18$$
    Retrouve les deux chiffres manquants représentés par les points d'interrogation.
16. *Le défi du centimètre :* Une feuille de papier a une épaisseur de $0,1$ mm (dixième de millimètre). Si on empile 100 feuilles identiques, quelle sera la hauteur de la pile en millimètres ? Puis en centimètres ?

Solutions

1. a) $0,3$; b) $0,45$; c) $0,07$; d) $12,8$; e) $2,456$. **2.** a) Dizaines : **8** ; b) Dixièmes : **3** ; c) Centièmes : **7** ; d) Millièmes : **5**. **3.** - $045,20 \to \mathbf{45,2}$ - $3,08 \to$ **aucun zéro inutile** (le 0 est coincé) - $7,500 \to \mathbf{7,5}$ - $0,040 \to \mathbf{0,04}$ (seul le dernier 0 est inutile) - $120,0 \to \mathbf{120}$

4. a) $5,40 > 5,19$ donc $5,4 > 5,19$. b) $8,30 = 8,3$. c) $12,08 < 12,80$ donc $12,08 < 12,8$. d) $0,750 > 0,705$ donc $0,75 > 0,705$. e) $9 < 10$ donc $9,99 < 10,1$.

5. a) 43 ; b) 75 ; c) $1\,280$; d) 6 ; e) $32,5$. **6.** a) $24,60 + 8,75 = \mathbf{33,35}$. b) $135,08 + 48,90 = \mathbf{183,98}$. c) $7,00 + 14,35 = \mathbf{21,35}$. **7.** a) $45,80 - 12,35 = \mathbf{33,45}$. b) $82,40 - 37,86 = \mathbf{44,54}$. c) $15,00 - 4,75 = \mathbf{10,25}$. **8.** - $7 < 7,38 < 8$ - $0 < 0,84 < 1$ - $29 < 29,99 < 30$

9. - $5,4 < 5,47 < 5,5$ (car $5,40 < 5,47 < 5,50$) - $12,8 < 12,83 < 12,9$ - $0,3 < 0,39 < 0,4$

10. a) Entre $4,60$ et $4,70$: par exemple $\mathbf{4,65}$. b) Entre $8,150$ et $8,160$: par exemple $\mathbf{8,155}$. c) Entre $0,90$ et $1,00$: par exemple $\mathbf{0,95}$.

11. Écrivons-les avec 3 décimales : $4,250$; $4,200$; $4,050$; $4,205$; $4,500$.

$$\mathbf{4,05} < \mathbf{4,2} < \mathbf{4,205} < \mathbf{4,25} < \mathbf{4,5}$$

12. a) Montant total : $24,50 + 8,75 + 3,80 = \mathbf{37,05}$ €. b) Monnaie rendue : $50,00 - 37,05 = \mathbf{12,95}$ €.

13. - Lundi : $12,4$ km. - Mercredi : $12,4 + 3,85 = 16,25$ km. - Vendredi : $15,2$ km. - Distance totale : $12,40 + 16,25 + 15,20 = \mathbf{43,85}$ **km**.

14. Longueur totale coupée : $7,45 + 11,80 = 19,25$ m. Reste sur le rouleau : $25,00 - 19,25 = \mathbf{5,75}$ **mètres**.

15. Posons l'addition :

- Aux centièmes : $0 + ? = 8 \Longrightarrow$ le centième du bas est **8** (on a donc $6,78$).
- Aux dixièmes : $4 + 7 = 11 \Longrightarrow$ on pose 1 et on retient 1.
- Aux unités : $1\ \text{(retenue)} + ? + 6$ doit donner un nombre finissant par 5 (donc 15). $1 + ? + 6 = 15 \Longrightarrow ? = 8$. Le premier nombre est donc $28,4$.
- Aux dizaines : $1\ \text{(retenue)} + 2 = 3$. Tout concorde !

L'opération était : $\mathbf{28,4 + 6,78 = 35,18}$. Les chiffres manquants étaient **8** et **8**.

16. - Hauteur en mm : $0,1 \times 100 = \mathbf{10}$ **mm**. - Comme 10 mm $= 1$ cm, la pile mesure exactement **1 centimètre** de haut !

La question qui ouvre la suite

Grâce aux décimaux de Simon Stevin, les humains disposent d'un outil parfait pour mesurer toutes les grandeurs de manière continue. Mais jusqu'à la fin du XVIII^{e} siècle, chaque ville de France utilisait des unités différentes : la lieue de Paris ne valait pas la lieue de Lyon, la pinte variait d'un village à l'autre, et le pied du Roi n'avait pas la même pointure que celui du voisin !

En 1789 éclate la Révolution française. Les savants et les citoyens décident d'unir le pays — et bientôt le monde entier — autour d'une seule et même mesure universelle, tirée de la Terre elle-même : **le Mètre**. Et pour toutes les mesures, de la longueur à la masse en passant par le volume, ils adoptent la magie du système décimal !

Comment mesurer la Terre, calculer le périmètre d'un champ ou l'aire d'un pré sans jamais trébucher ? Rendez-vous au **Chapitre 12 : Le Mètre de la Révolution** !

CHAPITRE 12 : Le Mètre de la Révolution

> « Rien de plus grand ni de plus sublime n'est sorti des mains des hommes que ce système métrique qui donne une même règle à tous les peuples et à tous les temps. » — *Décret de la Convention nationale (1795).*

Ce que tu vas découvrir

- La folle expédition des astronomes **Delambre et Méchain** pendant la Révolution française pour mesurer la Terre.
- Le secret des préfixes universels : le grec pour multiplier (kilo-, hecto-, déca-) et le latin pour diviser (déci-, centi-, milli-).
- Les trois grandes familles de mesure : **longueurs** (m), **masses** (g, kg, t) et **contenances** (L).
- La différence fondamentale entre le **périmètre** (le contour, en 1 dimension) et l'**aire** (la surface recouverte, en 2 dimensions).
- Calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle et d'un carré sans jamais confondre les deux formules.
- Reconnaître un **angle droit**, un **angle aigu** et un **angle obtus** à l'aide de ton équerre.

---

1. Le problème : la tour de Babel des mesures de l'Ancien Régime

Avant 1789, la France n'est pas unie dans ses mesures : c'est un véritable labyrinthe ! Chaque province, chaque ville, parfois même chaque seigneurie possède ses propres unités de mesure :

- À Paris, pour mesurer les étoffes, on utilise **l'aune de Paris** (environ 1,18 mètre). Mais à Rouen, l'aune est plus courte, et à Lyon, elle est plus longue !
- Pour mesurer les terrains, on utilise le **pied du Roi** (environ 32,5 cm), mais le pied de Bordeaux ne fait que 35,7 cm.
- Pour peser le blé, on utilise la **livre**, mais il existe plus de 50 sortes de livres différentes en France !
- Pour les liquides, la **pinte** de Saint-Denis est deux fois plus grosse que la pinte de Paris.

On estimait qu'il existait en France plus de **800 noms de mesures différents** et près de **250 000 façons différentes de les calculer** !

> 💡 **Découverte & Histoire — L'anarchie des mesures sous l'Ancien Régime**
>
> - Avant 1789 :
> - À Paris : 1 pied = 32,5 cm
> - À Bordeaux : 1 pied = 35,7 cm
> - À Strasbourg : 1 pied = 28,9 cm
> - Impossible de commercer honnêtement d'une ville à l'autre !

Les marchands en profitent pour tromper les acheteurs, les paysans sont ruinés par des seigneurs qui changent la taille des boisseaux de blé pour prélever plus d'impôts, et personne ne peut s'entendre.

En 1789 éclate la Révolution française. Dans leurs cahiers de doléances, les citoyens réclament d'une seule voix : *« Un seul roi, une seule loi, un seul poids et une seule mesure ! »*

---

2. Mesurer la Terre : l'aventure du mètre universel

Les savants de l'Académie des sciences (Lavoisier, Condorcet, Lagrange, Laplace) refusent de choisir la longueur du pied d'un roi ou du bras d'un empereur : les rois meurent, les pieds varient d'un individu à l'autre. Ils veulent une mesure qui appartienne à toute l'humanité, une mesure tirée de la nature elle-même : **la planète Terre** !

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — L'aventure de Delambre et Méchain (1792 - 1798)** En 1792, en pleine tourmente révolutionnaire et sous la menace de la guerre, deux astronomes français partent mesurer la Terre :

- **Jean-Baptiste Delambre** part de Dunkerque vers le sud.
- **Pierre Méchain** part de Barcelone vers le nord. Pendant six longues années, à travers les montagnes, les tempêtes et les arrestations par des gardes soupçonneux qui les prennent pour des espions avec leurs longues-vues, ils mesurent la distance entre Dunkerque et Barcelone par triangulation.

Grâce à leurs calculs, les savants déterminent la longueur totale du quart du méridien terrestre (du Pôle Nord à l'Équateur). Ils divisent cette distance immense en **dix millions de parts égales**. Cette dix-millionième partie du quart du méridien devient la nouvelle unité de longueur de l'humanité : **le Mètre** (du grec *metron*, qui signifie « mesure »).

La naissance du mètre : la mesure du méridien terrestre par Delambre et Méchain (1792)



Le mètre a été défini comme la dix-millionième partie de la distance du Pôle Nord à l'Équateur

Fig. 46. – La mesure du méridien terrestre et l'étalon universel du mètre

La devise de cette nouvelle mesure est gravée sur les premières médailles : **« À tous les temps, à tous les peuples. »**

---

3. Le tableau universel : la magie des préfixes grecs et latins

Les savants ont une deuxième idée géniale : appliquer la numération décimale (celle de Simon Stevin !) à toutes les mesures. Finis les systèmes compliqués où 1 pied vaut 12 pouces et 1 pouce vaut 12 lignes ! Désormais, **tout change de 10 en 10**.

Pour nommer les unités, ils utilisent une règle linguistique merveilleuse :

- Pour les unités **plus grandes** que l'unité de base, ils empruntent des mots au **grec** (la langue des géants) :
  - **Déca-** (du grec *deka*) = $\times$ 10
  - **Hecto-** (du grec *hekaton*) = $\times$ 100
  - **Kilo-** (du grec *khilioi*) = $\times$ 1 000
- Pour les unités **plus petites** que l'unité de base, ils empruntent des mots au **latin** (la langue des divisions) :
  - **Déci-** (du latin *decimus*) = $\div$ 10 ($\frac{1}{10}$)
  - **Centi-** (du latin *centesimus*) = $\div$ 100 ($\frac{1}{100}$)
  - **Milli-** (du latin *millesimus*) = $\div$ 1 000 ($\frac{1}{1\,000}$)



Fig. 47. – Le système métrique universel : préfixes multiples et sous-multiples

Ce même tableau fonctionne **à l'identique** pour les longueurs, les masses et les contenances !

1. Les longueurs (unité de base : le mètre m)

Kilomètre (km)	Hectomètre (hm)	Décamètre (dam)	Mètre (m)	Décimètre (dm)	Centimètre (cm)	Millimètre (mm)
1 000 m	100 m	10 m	**1 m**	0,1 m	0,01 m	0,001 m

2. Les contenances (unité de base : le litre L)

Hectolitre (hL)	Décalitre (daL)	Litre (L)	Décilitre (dL)	Centilitre (cL)	Millilitre (mL)
100 L	10 L	**1 L**	0,1 L	0,01 L	0,001 L

(Note : le kilolitre n'est presque jamais utilisé dans la vie quotidienne, on parle plutôt de mètre cube).

3. Les masses (unité de base : le gramme g et le kilogramme kg)

Tonne (t)	Quintal (q)	-	Kilo-gramme (kg)	Hecto-gramme (hg)	Déca-gramme (dag)	Gramme (g)	Déci-gramme (dg)	Centi-gramme (cg)	Milli-gramme (mg)
1 000 kg	100 kg		**1 kg**	100 g	10 g	**1 g**	0,1 g	0,01 g	0,001 g

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — La règle du tableau de conversion

1.

Dans chaque colonne du tableau, on ne place qu'**un seul chiffre**. 2. Le **chiffre des unités** du nombre de départ se place toujours dans la colonne de l'unité indiquée ! 3. *Exemple :* pour placer 34,8 m, le chiffre des unités est 4. On place 4 dans la colonne m, 3 dans dam et 8 dans dm. Pour lire en centimètres : on complète avec un zéro jusqu'à $cm \to 3\,480$ cm.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Conversions simples

- Convertir 2,5 km en mètres : 2,5 km = 2 500 m.
- Convertir 750 mL en litres : 750 mL = 0,750 L = 0,75 L.
- Convertir 3,4 tonnes en kilogrammes : 1 t = 1 000 kg $\Longrightarrow$ 3,4 t = 3 400 kg.

4. Longueur vs Aire : le fil et le carrelage (1D vs 2D)

Voici l'une des confusions les plus fréquentes en géométrie : la différence entre **périmètre** et **aire**.

Fig. 48. – Périmètre linéaire 1D vs Aire surfacique 2D

- **Le Périmètre :** c'est la longueur du tour complet d'une figure. Imagine une fourmi qui marche tout autour du champ, ou une ficelle qu'on déroule le long de la clôture. C'est une mesure à **1 dimension** (longueur pure).
- **L'Aire (ou superficie) :** c'est la quantité de surface enfermée à l'intérieur de la figure. Imagine qu'on doive poser des carreaux de carrelage sur le sol, ou peindre un mur. C'est une mesure à **2 dimensions** (largeur $\times$ longueur).

---

5. Calculer le périmètre d'un polygone

Pour trouver le périmètre d'un polygone quelconque, il suffit d'**additionner la longueur de tous ses côtés**.

📐 Formules de périmètre usuelles

- **Polygone quelconque :** $\mathcal{P} =$ somme de tous les côtés.
- **Rectangle de longueur L et largeur l :**

$$\mathcal{P} = L + l + L + l = 2 \times (L + l)$$

- **Carré de côté c :**

$$\mathcal{P} = 4 \times c$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calculs de périmètre

- Un rectangle mesure $8\ \text{cm}$ de long et $5\ \text{cm}$ de large. $\mathcal{P} = 2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26\ \text{cm}$.
- Un carré a un côté de $6\ \text{m}$. $\mathcal{P} = 4 \times 6 = 24\ \text{m}$.

---

6. Mesurer l'aire : du quadrillage au centimètre carré (cm^2)

Pour mesurer une surface, on commence par la recouvrir de petits carreaux étalons.

Prenons un rectangle de $5\ \text{cm}$ de long et $3\ \text{cm}$ de large. Recouvrons-le de petits carreaux de $1\ \text{cm}^2$:

Pour compter le nombre total de carreaux, inutile de les compter un par un : On a **3 rangées de 5 carreaux** !

$$\text{Aire} = 5 \times 3 = 15\ \text{ carreaux de }\ 1\ \text{cm}^2 = 15\ \text{cm}^2$$

📐 Formules d'aire usuelles

- **Aire d'un rectangle :**

$$\mathcal{A} = \text{Longueur} \times \text{Largeur} = L \times l$$

- **Aire d'un carré :**

$$\mathcal{A} = \text{côté} \times \text{côté} = c \times c$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Ne jamais confondre périmètre et aire !

Soit un carré de côté $c = 4 \text{ cm}$.

- Son périmètre : $\mathcal{P} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}$. (Longueur du fil autour).
- Son aire : $\mathcal{A} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$. (Nombre de carrés de moquette). Les deux nombres valent 16, mais les unités n'ont rien à voir : l'un est en **centimètres**, l'autre en **centimètres carrés** ! Et pour un carré de côté 5 cm :
- $\mathcal{P} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$.
- $\mathcal{A} = 5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$. Ici, $25 \neq 20$!

---

7. Les angles : aigu, droit ou obtus avec l'équerre

Quand deux lignes droites se rencontrent en un point (le sommet), elles forment une ouverture appelée un **angle**. Pour mesurer cette ouverture, l'outil de référence de l'écolier et du maçon est **l'équerre**.

Angle Aigu	Angle Droit	Angle Obtus
Plus fermé que l'équerre	Épouse exactement l'équerre	Plus ouvert que l'équerre
Ouverture $< 90°$	Ouverture $= 90°$	Ouverture $> 90°$

1. **L'angle droit (90°) :** c'est l'angle du coin parfait d'une feuille de papier, du mur d'une maison ou de l'équerre. Ses deux côtés sont perpendiculaires.
2. **L'angle aigu :** c'est un angle « piquant », plus étroit et plus fermé que l'angle droit (son ouverture est strictement comprise entre $0°$ et $90°$).
3. **L'angle obtus :** c'est un angle « ouvert », plus large et plus écarté que l'angle droit (son ouverture est strictement comprise entre $90°$ et $180°$).

🧭 Méthode — Reconnaître un angle avec ton équerre

1. Pose le

coin de l'angle droit de ton équerre exactement sur le sommet de l'angle. 2. Aligne l'un des bords de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle. 3. Regarde l'autre côté :

- S'il est caché sous l'équerre : l'angle est **aigu** (plus petit).
- S'il longe exactement le second bord : l'angle est **droit**.
- S'il dépasse vers l'extérieur de l'équerre : l'angle est **obtus** (plus grand).

Ce qu'il faut retenir

1. **Le système métrique** repose sur le **mètre** (m), défini à la Révolution française comme une fraction de la Terre.
2. **Les préfixes :**

- Kilo (1 000), Hecto (100), Déca (10) pour multiplier ;
- Déci ($\frac{1}{10}$), Centi ($\frac{1}{100}$), Milli ($\frac{1}{1\,000}$) pour diviser.

3. **Masses :** $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$ et $1 \text{ tonne (t)} = 1\,000 \text{ kg}$.
4. **Périmètre (1D) :** Longueur du contour.
   - Rectangle : $\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$.
   - Carré : $\mathcal{P} = 4 \times c$.
5. **Aire (2D) :** Surface intérieure recouverte.
   - Rectangle : $\mathcal{A} = L \times l$.
   - Carré : $\mathcal{A} = c \times c$.
6. **Angles :**
   - Aigu ($< \text{angle droit}$) ;
   - Droit ($= \text{angle de l'équerre}$) ;
   - Obtus ($> \text{angle droit}$).

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Convertis dans l'unité demandée :
   a) $4 \text{ m} = \ldots \text{ cm}$
   b) $3,5 \text{ km} = \ldots \text{ m}$
   c) $250 \text{ mm} = \ldots \text{ cm}$
   d) $12 \text{ dm} = \ldots \text{ m}$
2. Convertis les masses suivantes :
   a) $5 \text{ kg} = \ldots \text{ g}$
   b) $2,8 \text{ t} = \ldots \text{ kg}$
   c) $750 \text{ g} = \ldots \text{ kg}$
   d) $4\,200 \text{ mg} = \ldots \text{ g}$
3. Convertis les contenances suivantes :
   a) $2 \text{ L} = \ldots \text{ cL}$
   b) $1,5 \text{ L} = \ldots \text{ mL}$
   c) $33 \text{ cL} = \ldots \text{ L}$
   d) $25 \text{ dL} = \ldots \text{ L}$
4. Calcule le périmètre d'un rectangle dont la longueur est 7 cm et la largeur est 4 cm.
5. Calcule l'aire d'un carré dont le côté mesure 6 cm.
6. Un angle est plus fermé que le coin de ton équerre. Quel est son nom ? Un angle plus ouvert ?

Niveau (Géométrie et conversions combinées)

7. Un terrain rectangulaire a pour longueur 45 m et pour largeur 20 m.
   a) Calcule son périmètre.
   b) Le propriétaire veut l'entourer d'un grillage vendu à 8 € le mètre. Combien coûtera la clôture ?
   c) Calcule l'aire de ce terrain en mètres carrés (m^2).
8. Attention aux unités ! Un rectangle a pour longueur $1,2 \text{ m}$ et pour largeur 40 cm.
   a) Exprime la longueur en centimètres.
   b) Calcule son périmètre en centimètres, puis en mètres.
   c) Calcule son aire en centimètres carrés (cm^2).
9. Un carré a un périmètre de 36 cm.
   a) Quelle est la longueur d'un de ses côtés ?
   b) Quelle est son aire ?

10. Un paquet de farine pèse $1\ \text{kg}$. Un pâtissier utilise d'abord $350\ \text{g}$ pour faire une brioche, puis $420\ \text{g}$ pour des crêpes. Combien de grammes de farine lui reste-t-il ?
11. Une bouteille d'eau contient $1,5\ \text{L}$. Combien de verres de $25\ \text{cL}$ peut-on remplir entièrement avec cette bouteille ?

Niveau (Défis d'arpentage et de logique)

12. Deux rectangles ont exactement la même aire de $24\ \text{cm}^2$.
    - Le rectangle A mesure $6\ \text{cm}$ de long sur $4\ \text{cm}$ de large.
    - Le rectangle B mesure $8\ \text{cm}$ de long sur $3\ \text{cm}$ de large.

    a) Calcule le périmètre du rectangle A.
    b) Calcule le périmètre du rectangle B.
    c) Deux figures qui ont la même aire ont-elles forcément le même périmètre ? Explique ce que tu découvres !
13. Une piscine rectangulaire mesure $10\ \text{m}$ de long sur $5\ \text{m}$ de large. Autour de la piscine, on construit une allée dallée de $1\ \text{mètre}$ de large tout autour.
    a) Quelles sont la longueur et la largeur du grand rectangle formé par la piscine et l'allée réunies ?
    b) Calcule l'aire totale de la piscine et de l'allée.
    c) Quelle est l'aire de l'allée seule ?
14. Un camion vide pèse $2,4\ \text{tonnes}$. On le charge avec 80 sacs de ciment de $35\ \text{kg}$ chacun. Quelle est la masse totale du camion chargé, en tonnes ?
15. *Le défi du ruban autour du carré :* Si on double la longueur du côté d'un carré :
    a) Par combien son périmètre est-il multiplié ?
    b) Par combien son aire est-elle multipliée ? (Fais un dessin avec un carré de côté 2 cm et un carré de côté 4 cm pour t'aider !).

Solutions

1. a) $4\ \text{m} = \mathbf{400\ cm}$; b) $3,5\ \text{km} = \mathbf{3\,500\ m}$; c) $250\ \text{mm} = \mathbf{25\ cm}$; d) $12\ \text{dm} = \mathbf{1,2\ m}$.

2. a) $5\ \text{kg} = \mathbf{5\,000\ g}$; b) $2,8\ \text{t} = \mathbf{2\,800\ kg}$; c) $750\ \text{g} = \mathbf{0,75\ kg}$; d) $4\,200\ \text{mg} = \mathbf{4,2\ g}$.

3. a) $2\ \text{L} = \mathbf{200\ cL}$; b) $1,5\ \text{L} = \mathbf{1\,500\ mL}$; c) $33\ \text{cL} = \mathbf{0,33\ L}$; d) $25\ \text{dL} = \mathbf{2,5\ L}$.

4. $\mathcal{P} = 2 \times (7 + 4) = 2 \times 11 = \mathbf{22\ cm}$. **5.** $\mathcal{A} = c \times c = 6 \times 6 = \mathbf{36\ cm^2}$. **6.** Plus fermé qu'un angle droit = **angle aigu**. Plus ouvert qu'un angle droit = **angle obtus**. **7.** a) $\mathcal{P} = 2 \times (45 + 20) = 2 \times 65 = \mathbf{130\ m}$. b) Prix de la clôture : $130 \times 8 = \mathbf{1\,040\ €}$. c) Aire du terrain : $\mathcal{A} = 45 \times 20 = \mathbf{900\ m^2}$.

8. a) $1,2\ \text{m} = \mathbf{120\ cm}$. b) $\mathcal{P} = 2 \times (120 + 40) = 2 \times 160 = \mathbf{320\ cm = 3,2\ m}$. c) $\mathcal{A} = 120 \times 40 = \mathbf{4\,800\ cm^2}$.

9. a) Côté du carré : $36 \div 4 = \mathbf{9\ cm}$. b) Aire du carré : $9 \times 9 = \mathbf{81\ cm^2}$.

10. Farine utilisée : $350 + 420 = 770\ \text{g}$. Comme $1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$, il reste : $1\,000 - 770 = \mathbf{230\ g}$ de farine.

11. $1,5\ \text{L} = 150\ \text{cL}$. Nombre de verres : $150 \div 25 = \mathbf{6\ verres}$ complets.

12. a) Périmètre de A : $2 \times (6 + 4) = 2 \times 10 = \mathbf{20\ cm}$. b) Périmètre de B : $2 \times (8 + 3) = 2 \times 11 = \mathbf{22\ cm}$. c) **Non !** Deux figures peuvent avoir exactement la même surface (ici $24\ \text{cm}^2$) tout en ayant des contours de longueurs différentes. Plus une figure est allongée et étroite, plus son périmètre est grand pour une même aire.

13. a) L'allée ajoute $1\ \text{m}$ de chaque côté :

- Nouvelle longueur : $10 + 1 + 1 = \mathbf{12\ m}$.
- Nouvelle largeur : $5 + 1 + 1 = \mathbf{7\ m}$.

b) Aire totale : $12 \times 7 = \mathbf{84\ m^2}$.

c) Aire de la piscine seule : $10 \times 5 = 50\ \text{m}^2$. Aire de l'allée seule : $84 - 50 = \mathbf{34\ m^2}$.

14. Masse des sacs de ciment : $80 \times 35 = 2\,800\ \text{kg} = 2,8\ \text{tonnes}$. Masse totale du camion chargé : $2,4 + 2,8 = \mathbf{5,2\ tonnes}$.

15. Soit un carré de côté $c = 2\ \text{cm}$: $\mathcal{P}_1 = 4 \times 2 = 8\ \text{cm}$ et $\mathcal{A}_1 = 2 \times 2 = 4\ \text{cm}^2$. Si on double le côté ($c = 4\ \text{cm}$) : $\mathcal{P}_2 = 4 \times 4 = 16\ \text{cm}$ et $\mathcal{A}_2 = 4 \times 4 = 16\ \text{cm}^2$. a) Le périmètre est multiplié par **2** ($16 = 8 \times 2$). b) L'aire est multipliée par **4** ($16 = 4 \times 4$, car $2 \times 2 = 4$) ! Un carré deux fois plus large contient 4 petits carrés à l'intérieur.

La question qui ouvre la suite

Te voilà désormais armé des unités métriques : tu sais peser les sacs de farine, mesurer les longueurs de grillage et calculer l'aire des champs. Mais dans la cuisine d'un grand restaurant comme dans l'atelier d'un bâtisseur, un autre défi surgit constamment : Si une recette de gâteau au chocolat est écrite pour **4 personnes**, comment faire pour préparer le même gâteau pour **6 personnes** ou pour **10 convives**, sans que le gâteau ne soit ni trop sucré, ni trop pâteux ?

Quand une quantité double, l'autre double aussi : les deux grandeurs avancent au même pas cadencé. Comment calculer rapidement ces proportions sans jamais se perdre ? Bienvenue dans le royaume de **La Proportionnalité**, au **Chapitre 13 : La Recette de la Grand-Mère et la Règle de Trois** !

CHAPITRE 13 : La Recette de la Grand-Mère et la Règle de Trois

> « Si deux pains coûtent six sous, combien coûteront cinq pains ? Dès que le monde avance à pas réguliers, une seule mesure suffit à dévoiler toutes les autres. C'est l'art secret de la proportionnalité. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment adapter n'importe quelle **recette de cuisine** sans en changer le goût.
- Savoir reconnaître une vraie situation de **proportionnalité** et repérer les pièges (non, tu ne mesureras pas 3 mètres à 20 ans !).
- Organiser les données dans un **tableau de proportionnalité** clair et propre.
- Les trois méthodes magiques pour calculer :
  1. La méthode des **sauts de colonnes** (doubler, tripler, additionner).
  2. Le **passage par l'unité** (chercher le prix d'un seul objet).
  3. Le **coefficient de proportionnalité** (le multiplicateur direct).
- Le secret de la fameuse **« règle de trois »**, le calcul des marchands expliqué sans mystère.
- Voyager avec les **vitesses moyennes** (km/h) et les **échelles de cartes**.

---

1. Le problème : le festin d'anniversaire et le gâteau pour 4

C'est bientôt l'anniversaire de Thomas. Pour régaler ses amis, sa grand-mère sort son précieux carnet de cuisine taché de chocolat et corné par les années. Elle trouve sa célèbre recette du fondant aux poires :



Fig. 49. – Le tableau de proportionnalité et la règle de trois

Thomas saute de joie : *« Mamie, c'est formidable ! Mais nous serons **6 personnes** à table pour mon anniversaire : mes parents, toi, mes deux cousins et moi ! Et demain, nous ferons une deuxième fête avec **10 copains** de classe ! »*

La grand-mère sourit : *« Si nous mettons 6 œufs au hasard et 300 grammes de sucre, notre gâteau sera trop sucré ou tout sec. Il faut respecter **les justes proportions** ! »*

Comment calculer la quantité exacte de chocolat pour 6 personnes sans dénaturer la recette de mamie ?

Thomas prend une feuille de papier et réfléchit :

- Pour 4 personnes, il faut 200 g de chocolat.
- Donc pour la moitié (**2 personnes**), il en faut la moitié : $200 \div 2 = 100$ g.
- Et pour **6 personnes**, c'est 4 personnes plus 2 personnes !

Il suffit d'additionner les quantités :

$$200 \text{ g} + 100 \text{ g} = 300 \text{ g de chocolat !}$$

Thomas vient d'utiliser sans s'en rendre compte la règle la plus puissante des mathématiques du quotidien : **la proportionnalité**.

---

2. Qu'est-ce que la proportionnalité ? Le test du double

Dans la nature et dans la vie, beaucoup de grandeurs sont liées entre elles. Mais elles ne le sont pas toutes de la même façon !

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Deux grandeurs proportionnelles** Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en **multipliant toujours par le même nombre** les valeurs de l'autre. Cela signifie que :

- Si l'une devient **2 fois plus grande**, l'autre devient **2 fois plus grande**.
- Si l'une devient **3 fois plus grande**, l'autre devient **3 fois plus grande**.
- Si l'une devient **2 fois plus petite** (divisée par 2), l'autre devient **2 fois plus petite**.

Le piège : toutes les situations ne sont pas proportionnelles !

Faisons passer le **« test du double »** à trois situations de la vie courante :

1. **Le prix des pommes :** 1 kg de pommes coûte 3 €. 2 kg de pommes coûtent 6 € (2×3). 4 kg de pommes coûtent 12 € (4×3). → **C'est une situation de proportionnalité !**
2. **L'âge et la taille d'un enfant :** À 5 ans, Tom mesurait $1,10$ m. À 10 ans (l'âge a doublé : $5 \times 2 = 10$), Tom mesure environ $1,40$ m. Mesure-t-il le double de $1,10$ m, c'est-à-dire $2,20$ m ? Certainement pas ! Et à 20 ans, mesurera-t-il $4,40$ m ? Ce serait un géant monstrueux ! → **La taille n'est PAS proportionnelle à l'âge !** Le corps grandit vite dans l'enfance, puis ralentit, et s'arrête de grandir à l'âge adulte.
3. **L'abonnement de cinéma :** Une carte d'abonnement coûte 10 € par an, puis chaque place de cinéma coûte 5 €.
   - Pour 1 séance : $10 + 5 = 15$ €.
   - Pour 2 séances : $10 + (2 \times 5) = 20$ €. Le nombre de séances a doublé (de 1 à 2), mais le prix n'a pas doublé ($20 \neq 2 \times 15 = 30$). → À cause du prix fixe de départ, ce n'est **PAS une situation de proportionnalité directe**.

---

3. Le tableau de proportionnalité : les trois méthodes de calcul

Pour résoudre un problème sans s'embrouiller, on range les nombres dans un tableau à deux lignes.

Grandeur 1 (nombre de cahiers)	2	4	6	10
Grandeur 2 (prix en euros)	5 €	10 €	15 €	25 €

Il existe **trois méthodes infaillibles** pour remplir ce tableau. Choisis toujours celle qui est la plus facile pour les nombres de ton problème !

Méthode 1 : Jouer sur les colonnes (multiplication et addition)

Dans un tableau de proportionnalité, on a le droit de :

- Multiplier ou diviser une colonne entière par un nombre.
- Additionner deux colonnes entre elles !

Grandeur 1 (nombre de cahiers)	2	4	6	10
Grandeur 2 (prix en euros)	5 €	10 €	15 €	25 €

Méthode 2 : Le passage par l'unité (combien pour 1 ?)

C'est la méthode de bon sens préférée de nos arrière-grands-parents : *« Je cherche d'abord la valeur pour **1 seul objet**, puis je multiplie par le nombre d'objets voulus ! »*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Le passage par l'unité *Problème :* 3 stylos identiques coûtent $4,50$ €. Combien coûtent 7 de ces stylos ?

- **Étape 1 : Je cherche le prix de 1 stylo.** $4,50 \div 3 = 1,50$ €. (Un stylo coûte $1,50$ €).
- **Étape 2 : Je calcule le prix pour 7 stylos.** $7 \times 1,50 = 10,50$ €. 7 stylos coûtent donc $\mathbf{10,50}$ €.

Méthode 3 : Le coefficient de proportionnalité (le pont vertical)

C'est le nombre magique qui permet de passer directement de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant.

Nombre de gâteaux	3	5	8	× 4
Nombre de fraises	12	20	32	(Coefficient)

Pour trouver ce coefficient, il suffit de diviser un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne :

$$\text{Coefficient} = \frac{12}{3} = 4$$

Chaque gâteau nécessite 4 fraises. Pour n'importe quelle commande, il suffit de **multiplier par 4** ! Et pour remonter, on divise par 4.

---

4. La fameuse « règle de trois » expliquée sans mystère

Pendant des siècles, dans toutes les écoles d'Europe, on enseignait **« la règle de trois »**. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on connaît **trois nombres**, et que l'on cherche le **quatrième** !

Regarde la situation :

$$a \to b$$
$$c \to ?$$

Exemple : Si 4 mètres de tissu coûtent 28 €, combien coûtent 9 mètres de tissu ? - Les trois nombres connus sont : 4, 28 et 9. - Le nombre inconnu est noté $?$.

Comment les anciens calculaient-ils cela en une seule ligne ? Ils combinaient le passage par l'unité et la multiplication : 1. Le prix de 1 mètre est : $\frac{28}{4} = 7$ €. 2. Le prix de 9 mètres est : $9 \times 7 = 63$ €.

En une seule formule, cela s'écrit :

$$? = \frac{28 \times 9}{4} = \frac{252}{4} = 63 \text{ €}$$

On multiplie les deux nombres situés sur la diagonale opposée, et on divise par le troisième nombre restant ! C'est ce qu'on appelle aussi le **produit en croix**.

---

5. Deux applications royales : vitesse et échelles

1. Rouler à vitesse constante : les kilomètres par heure (km/h)

Quand un train ou une voiture roule à une vitesse constante de $\mathbf{80}$ $\mathbf{\text{km/h}}$ (80 kilomètres par heure), cela signifie qu'il parcourt 80 km en exactement 1 heure. La distance parcourue est proportionnelle au temps de trajet !

Construisons le tableau :

Temps (h)	1 h	2 h	3 h	30 min ($\frac{1}{2}$ h)	15 min ($\frac{1}{4}$ h)
Distance (km)	**80**	160	240	40	20

- En 2 h : deux fois plus de temps $\rightarrow 2 \times 80 = 160$ km.
- En 30 min (la moitié d'une heure) : deux fois moins de distance $\rightarrow 80 \div 2 = 40$ km.
- En 15 min (le quart d'une heure) : $80 \div 4 = 20$ km.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Trajet en voiture Une voiture roule à la vitesse moyenne de 90 km/h. Quelle distance parcourt-elle en 2 h 30 min ?

- En 2 h : $2 \times 90 = 180$ km.
- En 30 min (demi-heure) : $90 \div 2 = 45$ km.
- Distance totale : $180 + 45 = \mathbf{225}$ **km**.

2. Les cartes géographiques et les maquettes : les échelles

Sur une carte routière ou un plan de ville, le paysage réel est réduit de manière proportionnelle. Si l'échelle indique :

1 cm sur la carte = 100 m dans la réalité

Cela signifie que toutes les longueurs réelles sont divisées par 10 000 (car 100 m = 10 000 cm).

Sur la carte (cm)	1 cm	2 cm	5 cm	10 cm
Dans la réalité	100 m	200 m	500 m	1 000 m (1 km)

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — La randonnée en forêt Sur une carte de randonnée où 1 cm représente 250 m, deux villages sont séparés par un sentier mesurant 8 cm sur la carte. Quelle est la distance réelle entre ces deux villages ?

- 8×250 m $= 2\,000$ m $=$ **2 km**.

Ce qu'il faut retenir

1. **Deux grandeurs sont proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant par un nombre constant (le **coefficient de proportionnalité**).
2. **Propriétés du tableau :**
   - On peut multiplier ou diviser une colonne par un nombre.
   - On peut additionner deux colonnes.
3. **Le passage par l'unité :** On calcule d'abord la valeur pour 1 élément (en divisant), puis pour la quantité voulue (en multipliant).
4. **La règle de trois :** Pour trouver l'inconnue dans une proportion $\frac{a}{b} = \frac{c}{?}$, on calcule $? = \frac{b \times c}{a}$.
5. **Vitesse constante :** La distance est proportionnelle au temps écoulé (distance = vitesse $\times$ temps).
6. **Échelle de carte :** Les longueurs sur le plan sont proportionnelles aux longueurs réelles sur le terrain.

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Parmi ces situations, lesquelles sont des situations de proportionnalité ? Justifie brièvement :

a) Le nombre de baguettes de pain et le prix total à payer.
b) L'âge d'un arbre et sa hauteur en mètres.
c) La quantité d'essence mise dans le réservoir et le montant affiché sur la pompe.
d) Le nombre de pages d'un livre et le temps nécessaire pour le lire.

2. Pour faire un gâteau pour 4 personnes, il faut 200 g de farine. Quelle quantité de farine faut-il :
   a) Pour 8 personnes ?
   b) Pour 2 personnes ?
   c) Pour 10 personnes ?
3. 5 paquets de chewing-gums coûtent 6 €.
   a) Quel est le prix d'un seul paquet ?
   b) Combien coûtent 8 de ces paquets ?
4. Complète ce tableau de proportionnalité (trouve d'abord le coefficient multiplicateur) :

Nombre de cahiers	3	5	8	12
Prix en euros (€)	6	…	…	…

5. Une échelle de carte indique : $1 \text{ cm sur la carte} = 500 \text{ m sur le terrain}$. Quelle distance réelle correspond à :
   a) 2 cm sur la carte ?
   b) 6 cm sur la carte ?
   c) 10 cm sur la carte ?

Niveau (Tableaux et calculs de vitesse)

6. Un peintre utilise 3 litres de peinture pour recouvrir une surface de 24 m^2.
   a) Quelle surface peut-il peindre avec 1 litre de peinture ?
   b) Quelle surface peut-il peindre avec 7 litres ?
   c) De combien de litres de peinture a-t-il besoin pour peindre une façade de 96 m^2 ?
7. Un cycliste roule à la vitesse constante de 20 km/h.
   a) Quelle distance parcourt-il en 2 heures ?
   b) Quelle distance parcourt-il en $3 \text{ h } 30 \text{ min}$?
   c) Combien de temps met-il pour parcourir 10 km ?
8. Complète ce tableau de proportionnalité en utilisant les propriétés des colonnes (doubles, moitiés, additions) :

Masse de pommes (kg)	2	4	6	10	1
Prix (€)	5	…	…	…	…

9. Une fermière vend des œufs frais au marché : 6 œufs coûtent $2,40$ €. Combien coûtent :
   a) 12 œufs ?
   b) 3 œufs ?
   c) 15 œufs ? (Utilise une addition astucieuse !).
10. Un train roule à la vitesse constante de 120 km/h.
    a) Quelle distance parcourt-il en 1 heure ?
    b) Quelle distance parcourt-il en 15 minutes ?
    c) Quelle distance parcourt-il en 45 minutes ?

Niveau (Défis d'experts)

11. *La recette géante de la cantine :* Pour préparer une mousse au chocolat pour 6 enfants, le cuisinier utilise 9 œufs, 150 g de beurre et 240 g de chocolat noir. Aujourd'hui, il doit préparer cette mousse pour les 90 enfants de l'école ! Calcule la quantité exacte de chaque ingrédient nécessaire.
12. *Le robinet qui fuit :* Un robinet mal fermé goutte régulièrement : il perd 2 litres d'eau toutes les 3 heures.
    a) Combien de litres d'eau sont gaspillés en 24 heures (une journée complète) ?
    b) Combien de litres sont perdus en un mois de 30 jours ?

13. Sur une carte au trésor, la distance entre le grand rocher du Crâne et la crique des Pirates est de $12\ \text{cm}$. L'échelle indique que $2\ \text{cm}$ sur la carte représentent $150\ \text{mètres}$ dans la réalité. Quelle est la distance réelle séparant le rocher et la crique ?
14. Deux magasins proposent des promotions sur les mêmes paquets de biscuits :
    - Magasin A : le lot de 3 paquets est vendu $4,80\ €$.
    - Magasin B : le lot de 5 paquets est vendu $7,50\ €$. Quel magasin propose le prix unitaire par paquet le plus avantageux ?
15. *Le défi de la bougie :* Une bougie cylindrique de $18\ \text{cm}$ de haut brûle à vitesse régulière. Après avoir brûlé pendant $2\ \text{heures}$, sa hauteur n'est plus que de $14\ \text{cm}$.
    a) De combien de centimètres la bougie diminue-t-elle par heure ?
    b) Au bout de combien d'heures au total la bougie sera-t-elle complètement consumée ?

Solutions

1. a) **Oui**, si le prix d'une baguette est fixe, deux fois plus de baguettes coûtent deux fois plus cher. b) **Non**, un arbre ne grandit pas au même rythme toute sa vie (il ralentit et plafonne). c) **Oui**, le prix du carburant au litre est fixe, le montant affiché est directement proportionnel au volume d'essence. d) **Non**, un lecteur peut se fatiguer, lire plus vite ou plus lentement selon l'intrigue.

2. a) Pour 8 personnes (le double de 4) : $200 \times 2 = \mathbf{400}\ \mathbf{g}$. b) Pour 2 personnes (la moitié de 4) : $200 \div 2 = \mathbf{100}\ \mathbf{g}$. c) Pour 10 personnes ($8 + 2$) : $400 + 100 = \mathbf{500}\ \mathbf{g}$ de farine.

3. a) Prix d'un paquet : $6 \div 5 = \mathbf{1,20}\ €$. b) Prix de 8 paquets : $8 \times 1,20 = \mathbf{9,60}\ €$.

4. Coefficient multiplicateur : $6 \div 3 = 2$ (on multiplie la première ligne par 2). - Pour 5 cahiers : $5 \times 2 = \mathbf{10}\ €$. - Pour 8 cahiers : $8 \times 2 = \mathbf{16}\ €$. - Pour 12 cahiers : $12 \times 2 = \mathbf{24}\ €$.

5. a) $2 \times 500 = 1\,000\ \text{m} = \mathbf{1\ km}$. b) $6 \times 500 = 3\,000\ \text{m} = \mathbf{3\ km}$. c) $10 \times 500 = 5\,000\ \text{m} = \mathbf{5\ km}$.

6. a) Avec 1 litre : $24 \div 3 = \mathbf{8\ m^2}$. b) Avec 7 litres : $7 \times 8 = \mathbf{56\ m^2}$. c) Pour $96\ \text{m}^2$: $96 \div 8 = \mathbf{12\ litres}$ de peinture.

7. a) En $2\ \text{h}$: $2 \times 20 = \mathbf{40\ km}$. b) En $3\ \text{h}\ 30\ \text{min}$: $3\ \text{h} \to 60\ \text{km}$, $30\ \text{min} \to 10\ \text{km}$. Total = $\mathbf{70\ km}$. c) Pour $10\ \text{km}$ (la moitié de $20\ \text{km}$) : il met une demi-heure, soit $\mathbf{30\ minutes}$.

8. - Pour $4\ \text{kg}$ (le double de 2 kg) : $5 \times 2 = \mathbf{10}\ €$. - Pour $6\ \text{kg}$ ($2\ \text{kg} + 4\ \text{kg}$) : $5 + 10 = \mathbf{15}\ €$. - Pour $10\ \text{kg}$ ($4\ \text{kg} + 6\ \text{kg}$) : $10 + 15 = \mathbf{25}\ €$. - Pour $1\ \text{kg}$ (la moitié de 2 kg) : $5 \div 2 = \mathbf{2,50}\ €$.

9. a) 12 œufs (le double de 6) : $2,40 \times 2 = \mathbf{4,80}\ €$. b) 3 œufs (la moitié de 6) : $2,40 \div 2 = \mathbf{1,20}\ €$. c) 15 œufs ($12 + 3$) : $4,80 + 1,20 = \mathbf{6,00}\ €$.

10. a) En $1\ \text{h}$: $\mathbf{120\ km}$. b) En $15\ \text{min}$ (le quart d'une heure) : $120 \div 4 = \mathbf{30\ km}$. c) En $45\ \text{min}$ ($3 \times 15\ \text{min}$) : $3 \times 30 = \mathbf{90\ km}$.

11. Pour passer de 6 enfants à 90 enfants : $90 \div 6 = 15$ fois plus d'enfants ! On multiplie tous les ingrédients par 15 :

- Œufs : $9 \times 15 = \mathbf{135}\ \mathbf{œufs}$.
- Beurre : $150 \times 15 = \mathbf{2\,250\ g = 2,25\ kg\ de\ beurre}$.
- Chocolat noir : $240 \times 15 = \mathbf{3\,600\ g = 3,6\ kg\ de\ chocolat}$.

12. a) Dans 24 heures, il y a $24 \div 3 = 8$ périodes de 3 heures. Eau perdue : $8 \times 2 = \mathbf{16\ litres\ par\ jour}$. b) En 30 jours : $30 \times 16 = \mathbf{480\ litres}$ d'eau perdus !

13. Si $2\ \text{cm}$ représentent $150\ \text{m}$, alors $1\ \text{cm}$ représente $150 \div 2 = 75\ \text{m}$. Distance réelle pour $12\ \text{cm}$: $12 \times 75 = \mathbf{900\ mètres}$.

14. - Magasin A : $4,80 \div 3 = 1,60\ €$ le paquet. - Magasin B : $7,50 \div 5 = 1,50\ €$ le paquet.

C'est le **Magasin B** qui est le plus avantageux ($1,50\ € < 1,60\ €$).

15. a) En 2 heures, la hauteur est passée de $18\ \text{cm}$ à $14\ \text{cm}$, elle a donc diminué de $18 - 14 = 4\ \text{cm}$. En 1 heure, elle diminue de : $4 \div 2 = \mathbf{2\ cm\ par\ heure}$. b) Pour brûler les $18\ \text{cm}$ en entier : $18 \div 2 = \mathbf{9\ heures}$ au total.

La question qui ouvre la suite

Tu maîtrises désormais la loi des proportions : tu sais faire grandir et rétrécir les recettes, calculer les vitesses et décoder les cartes. Mais dans le grand livre des comptes des marchands, une ombre mystérieuse plane encore.

Imagine un marchand ambulant au marché d'hiver. Le matin, il commence sa journée avec 5 pièces d'argent. À midi, il achète pour 8 pièces d'argent de tissus chauds à un grossiste en lui disant : *« Je te donne mes 5 pièces, et je te devrai les 3 pièces restantes ce soir ! »* Combien a-t-il dans sa poche ? Moins que zéro ! Il a une dette de 3 pièces. Et dehors, le thermomètre descend en dessous du point de congélation de la glace : l'eau gèle, le thermomètre indique -5° C !

Existe-t-il des nombres cachés sous la ligne du sol ? Des nombres plus froids que le zéro ? Plongeons de l'autre côté du miroir au **Chapitre 14 : L'Ardoise du Marchand et le Trou de Sable** !

CHAPITRE 14 : L'Ardoise du Marchand et le Trou de Sable

> « Pour l'esprit naïf, il n'existe rien sous le zéro : une bourse vide ne contient rien, et le compte s'arrête là. Mais pour le marchand qui tient ses livres, pour le maçon qui creuse les fondations ou pour le voyageur dans le blizzard, le zéro n'est qu'un seuil. Sous le sol commence l'empire des miroirs et des dettes. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi le **zéro n'est pas le néant**, mais un niveau de référence, un seuil d'équilibre.
- Le modèle physique du **tas et du trou** de sable : comment la matière et le creux s'annulent ($(+1) + (-1) = 0$).
- L'ascenseur, les sous-sols ($-1, -2$), l'altitude sous la mer et le **thermomètre d'hiver**.
- La **droite graduée complète** : franchir la frontière de zéro et s'aventurer vers la gauche.
- Comparer des nombres négatifs sans trébucher : comprendre pourquoi $\mathbf{-5}$ **est plus petit que** $\mathbf{-2}$ (plus on a froid, plus le nombre est bas !).
- **Additionner des nombres négatifs** : combler des trous et cumuler des dettes.
- Calculer des **écarts de température** et de niveaux.

---

1. Le problème : la couverture de laine et l'ardoise noire

L'automne touche à sa fin sur la grand-place de la cité marchande. Les vents du nord apportent les premières gelées blanches, et les caravanes de chameaux se hâtent de décharger leurs ballots avant les grandes neiges.

Un jeune pêcheur du fleuve s'arrête devant l'étal d'un marchand drapier venu des hauts plateaux. Le pêcheur grelotte dans sa tunique de lin usée. Il admire une magnifique couverture en laine d'alpage, épaisse, douce et chaude.

Le marchand annonce le prix : *« Cette couverture vaut **5 pièces d'argent** ! »*

Le pêcheur dénoue sa bourse de cuir et compte ses pièces sur la table de bois : *Une… deux…* et c'est tout ! Il n'a que **2 pièces d'argent** dans sa bourse. Il lui manque cruellement 3 pièces. La tête basse, il range ses deux pièces et s'apprête à repartir dans la bise glaciale.



Fig. 50. – L'axe gradué des entiers relatifs positifs et négatifs

Mais le marchand, qui connaît la loyauté du pêcheur, lui pose la main sur l'épaule : *« Prends la couverture aujourd'hui pour ne pas geler cette nuit. Demain, après ta pêche au filet, tu m'apporteras les 3 pièces qui manquent ! »*

Le pêcheur remercie avec émotion et s'éloigne, bien au chaud sous son fardeau douillet. Le marchand prend alors une ardoise noire et un bâton de craie blanche pour noter l'opération dans son grand livre des comptes.

Que doit-il écrire en face du nom du pêcheur ?

- S'il écrit « 0 », c'est faux ! Zéro signifierait que le pêcheur ne lui doit rien, qu'ils sont quittes.
- Le pêcheur ne possède pas zéro pièce : **il a une dette de 3 pièces**.

- Pour retrouver une bourse vide (0), il devra d'abord gagner 3 pièces d'argent et les donner au marchand sans rien garder pour lui.

Le marchand trace alors sur son ardoise le chiffre 3 précédé d'un petit trait horizontal :

$$-3$$

Tu viens de faire la connaissance des **nombres négatifs**.

---

2. Le tas et le trou : le zéro est un équilibre

Pour bien comprendre ce que signifie un nombre négatif dans le monde physique, quittons le marché et marchons jusqu'à la plage de sable au bord du fleuve.

Regarde la plage : le vent a lissé le sable. Le sol est parfaitement plat. C'est notre point de départ, le niveau de référence : **le niveau Zéro (0)**.

Prends une pelle d'enfant : 1. Plante la pelle dans le sable et retire une pelletée de matière. 2. Dépose cette pelletée juste à côté sur le sol.

Regarde attentivement ce que ton geste a créé dans le paysage :

- Tu as formé un **Tas** qui s'élève au-dessus du sol : c'est une quantité positive, notée $+1$.
- Mais en même temps, sans pouvoir l'éviter, tu as creusé un **Trou** qui descend sous la surface : c'est un manque de matière, une dette de sable, notée -1.

Maintenant, que se passe-t-il si tu pousses le tas $+1$ dans le trou -1 avec ton pied ? Le sable retombe dans la cavité. Le trou est exactement comblé. La plage redevient rigoureusement plate ! Le tas a disparu, le trou a disparu : il ne reste que le niveau zéro du sol.

$$(+1) + (-1) = 0$$

> 💡 **Une vérité lumineuse — Le sens du Zéro**
>
> Le zéro n'est pas le « rien » absolu. C'est **l'annulation de deux forces opposées** : Une quantité positive $(+1)$ et une quantité négative (-1) ont exactement la même force. Quand elles se rencontrent, elles s'équilibrent et font zéro.

---

3. Les nombres négatifs autour de nous

Dans notre vie de tous les jours, nous croisons des nombres négatifs en permanence :

1. Le thermomètre et le gel de l'eau

Sur un thermomètre en degrés Celsius ($^\circ$ C), le zéro (0° C) n'est pas l'absence de température : c'est la température précise où l'eau se transforme en glace.

- Au-dessus de zéro : l'eau est liquide ($+5^\circ$ C, $+20^\circ$ C).
- Sous zéro : l'eau gèle, il neige ($ −2^, −10^$).

2. L'ascenseur et les parkings souterrains

Dans un grand immeuble, le rez-de-chaussée est le niveau **0**.

- Les étages d'habitation montent vers le haut : $+1, +2, +3$...
- Les parkings et les caves s'enfoncent sous la terre : -1 (premier sous-sol), -2 (deuxième sous-sol).

3. L'altitude géographique

Le niveau zéro de la Terre est **le niveau moyen de la mer**.

- Le mont Blanc culmine à $+4\,807$ mètres au-dessus de la mer.
- La mer Morte se trouve dans une dépression à -430 **mètres** sous le niveau de la mer !
- Les sous-marins naviguent à -100 m ou -300 m.

4. La droite graduée complète : l'autre côté du miroir

Jusqu'à présent, ta droite numérique commençait à zéro et partait vers la droite, comme un rayon de soleil. Désormais, la droite s'étend des **deux côtés à l'infini**, comme une route droite sans fin !

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Nombres relatifs** L'ensemble des nombres formés par les nombres positifs, zéro et les nombres négatifs s'appelle les **nombres relatifs**.

- Les nombres **positifs** portent un signe $+$ (qu'on n'est pas obligé d'écrire : $+3 = 3$).
- Les nombres **négatifs** portent obligatoirement un signe $-$.
- Le nombre **0** est le seul nombre à la fois positif et négatif : c'est le centre de symétrie, l'origine.

Deux nombres situés à la même distance de zéro mais de part et d'autre sont appelés des **nombres opposés** :

- L'opposé de $+4$ est -4.
- L'opposé de -7 est $+7$.
- La somme de deux nombres opposés est toujours égale à zéro : $(+4) + (-4) = 0$.

5. Comparer des nombres négatifs : le piège du thermomètre

Regarde attentivement cette question : *Quel nombre est le plus petit entre -5 et -2 ?*

Beaucoup d'élèves hésitent et disent : *« 5 est plus grand que 2, donc -5 doit être plus grand que -2 ! »* **C'est une erreur classique ! C'est exactement le contraire !**

Pense au thermomètre :

- S'il fait $-2°$ C, il fait froid, il gèle un peu.
- S'il fait $-5°$ C, il fait **encore plus froid**, la température est descendue plus bas !

Pense à l'ardoise des dettes :

- Devoir 2 € (-2), c'est une petite dette.
- Devoir 5 € (-5), c'est une dette plus lourde : tu as moins d'argent !

Sur la droite graduée, la règle est toujours la même, pour tous les nombres du monde : **Le plus petit nombre est toujours celui qui est situé le plus à gauche !**

$$\mathbf{-5 < -2}$$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Règle de comparaison des nombres négatifs** Pour deux nombres négatifs : **Le plus grand est celui qui est le plus proche de zéro !**

$$-1 > -10 \qquad -3 > -8 \qquad -0,5 > -2$$

Tout nombre négatif est strictement plus petit que 0 et que n'importe quel nombre positif :

$$-100 < +1$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Ranger des températures Voici les températures relevées un matin d'hiver dans cinq villes de montagne : $+2°$ C ; $-4°$ C ; $0°$ C ; $-8°$ C ; $-1°$ C Rangeons-les de la plus glaciale à la plus douce (ordre croissant) :

$$-8° \text{ C} < -4° \text{ C} < -1° \text{ C} < 0° \text{ C} < +2° \text{ C}$$

6. Additions simples avec les négatifs : combler les trous

Comment additionner des nombres relatifs avec bon sens ? Il suffit de penser au sable ou aux pièces de monnaie !

Cas 1 : Deux gains ou deux dettes de même signe

- Si tu gagnes 3 pièces puis 4 pièces : $(+3) + (+4) = +7$.
- Si tu creuses un trou de 3 pelletées, puis que tu creuses encore de 2 pelletées au fond : tu as un trou de 5 pelletées !

$$(-3) + (-2) = -5$$

Deux dettes qui s'ajoutent font une dette plus grosse.

Cas 2 : Un trou et un tas (signes contraires)

Imagine que tu aies un trou de 3 pelletées (-3) et que tu arrives avec un tas de 5 pelletées ($+5$). Tu verses le sable dans le trou :

- 3 pelletées comblent entièrement le trou (retour à 0).
- Les 2 pelletées restantes forment un petit tas au-dessus du sol ($+2$) !

$$(-3) + (+5) = +2$$

Et si tu avais un trou de 6 pelletées (-6) et seulement 2 pelletées de sable ($+2$) ? Tu verses tes 2 pelletées : le trou n'est pas complètement rebouché, il manque encore 4 pelletées !

$$(-6) + (+2) = -4$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calculs d'ascenseur Un ascenseur se trouve au 2e sous-sol (-2). 1. Il monte de 4 étages : $(-2) + 4 = +\mathbf{2}$ (il arrive au 2e étage). 2. Depuis le 2e étage ($+2$), il descend de 5 étages : $2 - 5 = -\mathbf{3}$ (il arrive au 3e sous-sol).

---

7. Écarts et soustractions : mesurer la différence de température

Quelle est la différence de température entre le matin où il fait -3° C et l'après-midi où il fait $+5^\circ$ C ?

Pour trouver l'écart, comptons les crans sur le thermomètre :

- Pour remonter de -3° C jusqu'à 0° C : il faut monter de **3 degrés**.
- Pour monter de 0° C jusqu'à $+5^\circ$ C : il faut monter encore de **5 degrés**.
- Écart total : $3 + 5 = \mathbf{8^\circ\ C}$!

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Écart d'altitude Une ville côtière a son port à $+10$ m d'altitude et une grotte sous-marine à -45 m. Quelle est la distance verticale entre le port et le fond de la grotte ? Distance = 10 m (au-dessus de l'eau) $+ 45$ m (sous l'eau) $= \mathbf{55\ mètres}$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Les nombres négatifs** s'écrivent avec un signe moins ($-$) et représentent des valeurs situées sous un niveau de référence zéro (dettes, températures sous zéro, sous-sols, profondeurs).
2. **Le zéro** est l'origine, le point d'équilibre où les opposés s'annulent : $(+a) + (-a) = 0$.
3. **Sur la droite graduée :** Les nombres positifs sont à droite de 0, les nombres négatifs sont à gauche.

4. **Comparaison :**
   - Tout nombre négatif est inférieur à 0 et à tout nombre positif.
   - Entre deux nombres négatifs, le plus grand est celui qui est **le plus proche de zéro** (le plus à droite sur l'axe) : $-2 > -5$.
5. **Addition :**
   - Deux négatifs s'ajoutent : $(-3) + (-4) = -7$.
   - Un positif et un négatif s'annulent en partie : $(-4) + 6 = +2$ et $(-7) + 3 = -4$.
6. **Écart de température :** Pour aller d'une température négative à une température positive, on additionne la distance à zéro des deux côtés ($|-a| + b$).

Exercices

Niveau (Application directe)

1. Écris le nombre relatif qui correspond à chaque situation :
   a) Il fait 7 degrés en dessous de zéro.
   b) Un sous-marin plonge à 150 mètres sous la surface de la mer.
   c) Une tour s'élève à 85 mètres de hauteur.
   d) Ali doit 20 euros à sa sœur.
   e) Le thermomètre affiche 18 degrés au-dessus de zéro.
2. Donne l'opposé de chaque nombre :
   a) $+5$
   b) -12
   c) $-3,5$
   d) 0
3. Complète avec le symbole qui convient : $<$ ou $>$:
   a) $-3 \ldots +2$
   b) $-6 \ldots -1$
   c) $-10 \ldots 0$
   d) $+4 \ldots -8$
   e) $-15 \ldots -20$
4. Range ces nombres dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) :
   $$+3 \quad ; \quad -7 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad -2 \quad ; \quad +8 \quad ; \quad -5$$
5. Calcule mentalement :
   a) $(-2) + (-3)$
   b) $(+5) + (-2)$
   c) $(-7) + (+7)$
   d) $(-4) + (+6)$
   e) $(-8) + (+3)$

Niveau (Thermomètre et ascenseur)

6. Un thermomètre indique -4° C à 6 heures du matin.
   - À midi, la température a augmenté de 9° C. Quelle est la nouvelle température ?
   - À minuit suivant, elle a rechuté de 7° C. Quelle température fait-il ?
7. Dans un grand magasin :
   - Paul entre au rez-de-chaussée (0).
   - Il descend de 2 étages pour acheter des outils au sous-sol. À quel niveau est-il ?
   - Ensuite, il monte de 5 étages pour aller au rayon jouets. À quel étage arrive-t-il ?
8. Complète les pointillés pour que l'égalité soit vraie :
   a) $(-5) + \ldots = 0$

b) $(-3) + \ldots = +2$
c) $(+4) + \ldots = -1$
d) $(-6) + \ldots = -10$

9. Calcule l'écart de température entre :
   a) -5° C et $+8^\circ$ C
   b) -12° C et -2° C
   c) -3° C et $+15^\circ$ C
10. Un plongeur est à -18 mètres de profondeur. Il remonte de 7 mètres, puis redescend de 4 mètres. À quelle profondeur se trouve-t-il désormais ?
11. Vrai ou Faux ? Justifie :
    a) Le nombre -8 est plus grand que -3.
    b) Zéro est plus grand que tous les nombres négatifs.
    c) L'opposé d'un nombre négatif est toujours un nombre positif.
    d) Si on ajoute deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif.

Niveau (Défis de marchands et d'histoire)

12. *Le compte bancaire :* Voici les mouvements sur le compte d'un jeune artisan durant une semaine :
    - Lundi matin : son compte affiche $+120$ €.
    - Mardi : il paye une facture de matériaux de 150 €.
    - Jeudi : il encaisse le paiement d'un client de 80 €.
    - Vendredi : il règle un loyer d'atelier de 100 €. Calcule le solde de son compte à la fin de chaque journée. Est-il dans le positif ou en dette (découvert) à la fin de la semaine ?
13. *Les personnages de l'Histoire :* On compte souvent les années avant notre ère avec des nombres négatifs.
    - Le philosophe grec Socrate est né en l'an -470 et mort en l'an -399.
    - Le mathématicien Euclide est né vers l'an -325 et mort vers l'an -265.

    a) À quel âge Socrate est-il mort ?
    b) Qui est né en premier : Socrate ou Euclide ?
    c) En mathématiques, on pose conventionnellement l'origine temporelle à 0. Combien d'années séparent la naissance de Socrate de cette origine 0 ? (Remarque : dans le calendrier civil des historiens, l'an 0 n'existe pas, on passe directement de l'an 1 avant notre ère à l'an 1 de notre ère !).
14. *Le jeu des deux dés rouge et vert :* On lance deux dés spéciaux :
    - Le dé vert donne des points positifs ($+1$ à $+6$).
    - Le dé rouge donne des points négatifs (-1 à -6). Un joueur obtient un dé vert de 3 et un dé rouge de 5. Quel est son score ? Quels lancers permettent d'obtenir un score final de 0 ?
15. *Le défi de la mine :* Le sommet d'une colline est à $+340$ mètres d'altitude. L'entrée d'un puits de mine se trouve à flanc de colline, à $+180$ mètres. La galerie de mine descend verticalement de 250 mètres sous l'entrée. Quelle est l'altitude du fond de la mine par rapport au niveau de la mer ?

Solutions

1. a) -7° C ; b) -150 m ; c) $+85$ m ; d) -20 € ; e) $+18^\circ$ C. **2.** a) -5 ; b) $+12$; c) $+3,5$; d) 0 (0 est son propre opposé). **3.** a) $-3 < +2$ (un négatif est toujours plus petit qu'un positif). b) $-6 < -1$ (-1 est plus proche de 0). c) $-10 < 0$. d) $+4 > -8$. e) $-15 > -20$ (-15 est plus proche de 0 que -20).

4. Ordre croissant :

$$\mathbf{-7 < -5 < -2 < 0 < +3 < +8}$$

5. a) $(-2) + (-3) = \mathbf{-5}$; b) $(+5) + (-2) = \mathbf{+3}$; c) $(-7) + (+7) = \mathbf{0}$; d) $(-4) + (+6) = \mathbf{+2}$; e) $(-8) + (+3) = \mathbf{-5}$.

6. - À midi : $(-4) + 9 = \mathbf{+5}^\circ$ **C**. - À minuit : $(+5) - 7 = \mathbf{-2}^\circ$ **C**.

7. - Après être descendu de 2 étages : il est au **niveau -2** (2e sous-sol). - Après être monté de 5 étages : $(-2)+5=+3$ (il arrive au **3e étage**).

8. a) $(-5)+5=0$; b) $(-3)+5=+2$; c) $(+4)+(-5)=-1$; d) $(-6)+(-4)=-10$.

9. a) Entre $-5°$ C et $+8°$ C : $5+8=13°$ C d'écart. b) Entre $-12°$ C et $-2°$ C : $12-2=10°$ C d'écart. c) Entre $-3°$ C et $+15°$ C : $3+15=18°$ C d'écart.

10. $(-18)+7-4=-11-4=-15$ mètres (il est à 15 mètres de profondeur). **11.** a) **Faux**, $-8<-3$ car -8 est plus éloigné de zéro vers la gauche. b) **Vrai**, zéro est à droite de tous les nombres négatifs. c) **Vrai**, l'opposé de $-x$ est $+x$. d) **Faux**, deux dettes cumulées donnent une dette encore plus grande (un nombre négatif) ! Par exemple $(-2)+(-3)=-5$.

12. - Lundi : $+120$ €. - Mardi : $120-150=-30$ € (il a une dette de 30 €). - Jeudi : $(-30)+80=+50$ € (il repasse dans le positif). - Vendredi : $50-100=-50$ €.

À la fin de la semaine, il a un solde négatif de -50 € (il a une dette de 50 € auprès de sa banque).

13. a) De -470 à -399 : $(-399)-(-470)=470-399=71$ ans. Socrate est mort à 71 ans. b) C'est **Socrate** qui est né en premier (-470 est plus ancien que -325). c) Sur la droite graduée, la distance entre -470 et l'origine 0 est $|-470-0|=470$ ans. (Historiquement, l'an 0 n'existe pas dans le calendrier civil : on saute directement de l'an 1 av. J.-C. à l'an 1 ap. J.-C. ; mais sur l'axe arithmétique continu des mathématiciens et des astronomes, l'écart jusqu'au point zéro vaut bien 470 unités).

14. - Score : $(+3)+(-5)=-2$. - Pour faire un score de 0, il faut que le dé vert et le dé rouge affichent exactement le même chiffre (par exemple vert 1 et rouge 1, vert 2 et rouge 2… jusqu'à vert 6 et rouge 6). Leurs valeurs s'annulent : $(+x)+(-x)=0$.

15. Altitude du fond du puits : $180-250=-70$ mètres. Le fond de la mine se trouve donc à 70 mètres **en dessous du niveau de la mer**.

Grand bilan du Volume II : le chemin parcouru

En refermant ce deuxième volume, contemple le chemin immense que ton esprit a conquis entre 8 et 10 ans : 1. Au **Chapitre 8**, tu as découvert les multiples, les critères de divisibilité et les **nombres premiers**, ces atomes insécables de l'arithmétique. 2. Au **Chapitre 9**, tu as appris la justice du partage avec la **division euclidienne**, sa potence pas à pas et sa règle d'or inviolable ($r<b$). 3. Au **Chapitre 10**, tu as brisé le pain et le gâteau pour apprivoiser les **fractions**, le rôle du dénominateur et l'art de plier le papier pour trouver des fractions équivalentes. 4. Au **Chapitre 11**, avec **Simon Stevin**, tu as fait entrer la numération décimale sous le seuil de l'unité grâce à la virgule. 5. Au **Chapitre 12**, tu as voyagé avec les savants de la Révolution pour unifier les mesures autour du **mètre**, en découvrant les périmètres, les aires et les angles. 6. Au **Chapitre 13**, tu as maîtrisé la **proportionnalité**, les recettes de grand-mère et la règle de trois. 7. Et enfin, au **Chapitre 14**, tu as exploré l'autre côté du miroir avec les **nombres négatifs** et la ligne graduée complète.

La question qui ouvre le Volume III…

La cité marchande prospère paisiblement au bord du fleuve. Mais au début du printemps, la fonte des neiges sur les lointaines montagnes gonfle démesurément le cours d'eau : **le grand fleuve déborde dans une crue dévastatrice**. Pendant des semaines, toute la vallée fertile disparaît sous des flots boueux.

Quand l'eau se retire enfin dans son lit, un spectacle de désolation attend les paysans : Toutes les haies ont été balayées. Toutes les bornes de pierre marquant les limites des champs ont disparu sous une épaisse couche de limon uniforme. Plus personne ne sait où commence son pré et où finit celui du voisin !

Le gouverneur convoque les géomètres : *« Il faut réarpenter toute la plaine, retracer les frontières de chaque famille, et construire des digues avec des angles droits parfaits de $90°$! »*

Comment tracer un angle droit parfait sur un terrain de boue gigantesque, sans équerre en plastique, avec pour seul outil… **une simple corde fermée avec treize nœuds réguliers** ?

Bienvenue dans l’aventure des bâtisseurs et des arpenteurs avec **le Volume III : L’Âge des Arpenteurs et des Bâtisseurs (10 - 13 ans)** !



VOLUME III — L'ÉTOILE D'ALEXANDRIE ET L'ESPACE EUCLIDIEN

11 - 13 ans / 6e - 5e

Aux portes du collège, la géométrie déductive s'organise autour des axiomes d'Euclide, des nombres relatifs et des symétries du plan.

Chapitres du Volume III :

Chapitre 15 : La Crue du Nil et la Corde à Treize Nœuds
Chapitre 16 : La Roue du Potier et le Secret d'Archimède
Chapitre 17 : L'Ombre de la Pyramide et le Bâton Planté
Chapitre 18 : Le Grain de Riz sur l'Échiquier
Chapitre 19 : Le Secret Interdit des Pythagoriciens
Chapitre 20 : L'Île au Trésor et les Deux Sentiers
Chapitre 21 : Le Percepteur et les Cent Morceaux

En regard : La phyllotaxie et les spirales de Fibonacci du Tournesol (Helianthus annuus).

CHAPITRE 15 : La Crue du Nil et la Corde à Treize Nœuds

> « Quand l'eau du fleuve a tout balayé et que la boue recouvre la terre, l'homme ne peut plus se fier à ses yeux. Il lui faut un fil tendu entre ses doigts, et la géométrie de la corde pour faire renaître l'angle droit. »

Ce que tu vas découvrir

- Ce qu'est **vraiment** un angle (une ouverture, un tour de bras… et pas une longueur !) et comment le mesurer avec un **rapporteur**.
- Les familles d'angles : **aigu**, **droit**, **obtus**, **plat**… et les mots pour les nommer.
- Comment tracer des **perpendiculaires** et des **parallèles**, à l'équerre, au compas… ou avec une simple corde.
- Pourquoi la **somme des angles d'un triangle** vaut toujours 180° — et trois façons de le prouver.
- Les **triangles particuliers** (isocèle, équilatéral, rectangle) et leurs secrets.
- Le mystère de la **corde à treize nœuds** qui fabrique un angle droit parfait.

---

1. Le problème : la boue du Nil et la colère des paysans

Tu as maintenant dix ou onze ans. Quittons notre petit village pour voyager jusqu'aux rives d'un fleuve immense : le **Nil**, en Égypte, il y a plus de trois mille ans.

Chaque année, au cœur de l'été, un événement extraordinaire se produit. Loin au sud, dans les montagnes d'Éthiopie, des pluies torrentielles s'abattent. Les eaux du Nil montent, débordent de leur lit et recouvrent toute la vallée. Pendant des semaines, la terre disparaît sous une mer d'eau brune.

Pour les Égyptiens, cette **crue** est une bénédiction : le fleuve dépose une boue noire très fertile, le **limon**. C'est grâce à lui que le blé pousse en abondance. Les Égyptiens appelaient d'ailleurs leur pays *Kemet*, « la Terre noire ».

Mais lorsque les eaux se retirent à l'automne, un cauchemar commence : **toutes les bornes de pierre qui séparaient les champs ont été renversées, déplacées, enfouies sous la vase.** La plaine n'est plus qu'une étendue grise sans le moindre repère.

« Mon champ allait jusqu'au grand palmier ! » crie Améni. *« Menteur ! Il s'arrêtait dix coudées plus bas ! »* hurle Nakht en brandissant sa houe.

Le Pharaon envoie alors ses spécialistes : les **arpenteurs royaux**. Les Grecs, plus tard, les surnommeront les **harpédonaptes**, ce qui veut dire « les tendeurs de corde ».

Leur mission est redoutable : redessiner des champs **rectangulaires**. Or, pour un rectangle, il faut des **angles droits**. Sur ton cahier, tu prends ton équerre. Mais sur un champ de deux cents mètres de long, une petite équerre ne sert à rien : si ton angle est faux d'un tout petit degré au départ, deux cents mètres plus loin ta ligne aura dévié de plus de trois mètres… en plein dans le champ du voisin !

Comment fabriquer sur le sol un angle droit parfait, sans équerre en métal, sans rapporteur ? Avant de répondre, il faut comprendre ce qu'est un angle.

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Le mot **géométrie** vient du grec *gê* (la terre) et *metron* (la mesure) : la géométrie est, au départ, littéralement « la mesure de la terre ». L'historien grec Hérodote pensait déjà qu'elle était née en Égypte, des partages de champs après les crues.

---

2. Qu'est-ce qu'un angle ?

2.1 L'idée avec ton corps

Tends ton bras droit devant toi, bien à l'horizontale. Garde l'épaule fixe et fais pivoter ton bras vers la droite, lentement, comme l'aiguille d'une horloge.

- Au début, ton bras n'a presque pas tourné : l'**ouverture** est petite.
- Quand ton bras pointe complètement sur le côté, il a fait un **quart de tour** : c'est l'angle droit.
- Si tu continues jusqu'à pointer derrière toi, tu as fait un **demi-tour**.
- Et si tu reviens devant toi, tu as fait **un tour complet**.

Un angle, c'est cela : **la quantité de rotation entre deux directions qui partent d'un même point**. Ton épaule est le **sommet**, ta position de départ et ta position d'arrivée sont les deux **côtés**.

2.2 Les mots et les notations

Avant d'aller plus loin, rappelons les écritures du géomètre (tu les as rencontrées au Volume II, mais elles sont si importantes qu'on les revoit) :

Écriture	Se lit	Signification
$[AB]$	« segment A B »	le morceau de ligne droite qui va de A à B, extrémités comprises
(AB)	« droite A B »	la ligne droite qui passe par A et B et se prolonge sans fin des deux côtés
$[AB)$	« demi-droite d'origine A passant par B »	elle part de A, passe par B et file à l'infini
AB	« A B » (sans crochets)	la **longueur** du segment $[AB]$, un nombre

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Un **angle** est la figure formée par deux demi-droites qui ont la même origine. Cette origine commune est le **sommet** de l'angle ; les deux demi-droites sont ses **côtés**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition Fondamentale — L'Anatomie Géométrique d'un Angle**

- côté [BC)
- ← l'ouverture : c'est elle, l'angle
- B A
- sommet côté [BA)

Pour nommer cet angle, on écrit :

$$\widehat{ABC}$$

On lit **« l'angle A B C »**. Le petit chapeau (on dit parfois « l'accent circonflexe ») au-dessus des trois lettres signifie : *« je ne parle pas de points, je parle de l'ouverture entre eux »*.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !** Dans $\widehat{ABC}$, **la lettre du milieu est toujours le sommet**. $\widehat{ABC}$ et $\widehat{CBA}$ désignent le même angle (sommet B), mais $\widehat{BAC}$ est un tout autre angle, de sommet A ! Quand il n'y a aucune ambiguïté, on écrit simplement $\hat{B}$ (« l'angle B »).

2.3 Un angle n'est pas une longueur

Voici l'erreur la plus fréquente chez les apprentis géomètres. Regarde ces deux angles :

> 💡 **Observation — Comparer l'Écartement des Côtés d'un Angle**
>
> • Angle 1 : Angle 2 :

Lequel est le plus grand ? Beaucoup répondent « le deuxième », parce que ses côtés sont plus longs. **Faux !** Les côtés d'un angle sont des demi-droites : elles sont infinies, on n'en dessine qu'un bout. Ce qui compte, c'est **l'écartement**, pas la longueur du trait. Les deux angles ci-dessus ont exactement la même ouverture.

> 🖐 **À toi de jouer —**
>
> Prends deux crayons et attache-les ensemble par une extrémité avec un élastique, comme un compas. Ouvre-les un peu. Maintenant, remplace-les par deux longues règles en gardant exactement la même ouverture : l'angle n'a pas changé, seule la longueur des « bras » a changé.

---

3. Mesurer un angle : le degré et le rapporteur

3.1 Pourquoi 360 ?

Pour mesurer une rotation, il faut une **unité**. Les savants de Babylone, il y a environ quatre mille ans, ont découpé le tour complet en **360 petits morceaux égaux**. Chaque morceau s'appelle un **degré**, et on le note avec un petit rond en haut à droite :

$$1^\circ \quad \text{se lit « un degré »}$$

Pourquoi 360 et pas 100 ? Plusieurs raisons probables :

- Les Babyloniens comptaient en **base 60** (c'est d'eux que viennent les 60 minutes d'une heure et les 60 secondes d'une minute), et $360 = 6 \times 60$.
- L'année dure à peu près 360 jours : le Soleil semble avancer d'environ un degré par jour dans le ciel.
- Surtout, **360 se partage merveilleusement** : il est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180. Un tiers de tour, un huitième de tour, un douzième de tour : tout tombe juste !

Rotation	Mesure
un tour complet	360°
un demi-tour	180°
un quart de tour	90°
un huitième de tour	45°
un douzième de tour (une « heure » sur le cadran)	30°

3.2 Les familles d'angles

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition —** Selon sa mesure, un angle est dit :
>
> • **nul** s'il mesure 0° (les deux côtés sont superposés) ;
> • **aigu** s'il mesure entre 0° et 90° (strictement) ;
> • **droit** s'il mesure exactement 90° ;
> • **obtus** s'il mesure entre 90° et 180° (strictement) ;
> • **plat** s'il mesure exactement 180° (les deux côtés forment une ligne droite) ;
> • (et on parle parfois d'angle **rentrant** au-delà de 180°, et d'angle **plein** pour 360°).



Fig. 51. – Classification des quatre types d'angles

Sur un dessin, on code l'angle droit par un **petit carré** dans le coin : ⌞.

Moyens mnémotechniques : *aigu* comme une aiguille (pointu, fermé) ; *obtus* comme quelqu'un d'« obtus », qui a l'esprit… trop ouvert sur les côtés, émoussé.

3.3 Le rapporteur, mode d'emploi

Le rapporteur est un demi-disque transparent gradué de $0°$ à $180°$. Il porte **deux graduations** : l'une croît de gauche à droite, l'autre de droite à gauche. C'est là que se cachent la plupart des erreurs.

Méthode — Mesurer un angle $\widehat{ABC}$ au rapporteur

1. Place le **centre** du rapporteur (la petite croix) exactement sur le **sommet** B. 2. Fais coïncider la **ligne du zéro** avec l'un des côtés, par exemple $[BA)$. 3. Suis la graduation **qui commence à 0 sur ce côté-là** et lis le nombre où passe l'autre côté $[BC)$. 4. **Vérifie avec tes yeux** : l'angle est-il aigu ou obtus ? Ta mesure doit être d'accord !

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !** Un angle visiblement aigu mesuré « $130°$ » signifie que tu as lu la mauvaise graduation : la bonne réponse est $180° - 130° = 50°$. Le contrôle « aigu ou obtus ? » à l'œil évite cette erreur dans 99 % des cas.

Méthode — Construire un angle de mesure donnée, par exemple $\widehat{xOy} = 65°$

1. Trace une demi-droite $[Ox)$. 2.

Place le centre du rapporteur sur O, le zéro sur $[Ox)$. 3. Sur la graduation qui part de ce zéro, repère 65 et marque un petit point. 4. Retire le rapporteur et trace la demi-droite $[Oy)$ qui part de O et passe par ce point. 5. Code l'angle d'un petit arc et écris $65°$.

Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Classer des angles. Classer les angles suivants : $17°$; $90°$; $91°$; $179°$; $180°$; $45°$.

Solution. $17°$ et $45°$ sont **aigus** (entre 0 et 90). $90°$ est **droit**. $91°$ et $179°$ sont **obtus** (entre 90 et 180). $180°$ est **plat**. Remarque : $91°$ est obtus même s'il « ressemble » beaucoup à un angle droit — en géométrie, un degré compte !

Exemple résolu 2 — L'horloge. Quel angle forment les aiguilles d'une horloge à 2 h ? À 5 h ?

Solution. Le cadran est un tour complet ($360°$) partagé en 12 heures : entre deux chiffres consécutifs, il y a $360° \div 12 = 30°$. À 2 h, la grande aiguille est sur le 12, la petite sur le 2 : il y a 2 intervalles, donc $2 \times 30° = 60°$ (angle aigu). À 5 h, il y a 5 intervalles : $5 \times 30° = 150°$ (angle obtus).

Exemple résolu 3 — Lire un rapporteur sans se tromper. Léa pose son rapporteur sur l'angle $\widehat{DEF}$ (sommet E, côté $[ED)$ sur le zéro de droite). L'autre côté passe sur les nombres 40 et 140. L'angle est visiblement très ouvert. Combien mesure-t-il ?

Solution. Le côté $[ED)$ est sur le zéro de **droite** : il faut lire la graduation qui commence à 0 à droite. Mais on peut aussi raisonner à l'œil : l'angle est ouvert, donc obtus, donc $\widehat{DEF} = 140°$.

---

4. Perpendiculaires et parallèles

4.1 Deux droites qui se croisent

Quand deux droites se croisent, elles forment **quatre angles**. Regarde :



Fig. 52. – Angles opposés par le sommet et égalité géométrique

- Les angles ① et ③ sont **opposés par le sommet** : ils sont « face à face », comme les deux lames d'une paire de ciseaux qui pivotent ensemble. Ils ont **la même mesure**.
- Les angles ① et ② sont côte à côte et forment ensemble une ligne droite : leur somme fait $180°$. On dit qu'ils sont **supplémentaires**.

> 📐 **Vocabulaire —**
>
> Deux angles sont **supplémentaires** si leur somme vaut $180°$, et **complémentaires** si leur somme vaut $90°$. Deux angles sont **adjacents** s'ils ont le même sommet, un côté commun, et sont situés de part et d'autre de ce côté.

Pourquoi les angles opposés par le sommet sont-ils égaux ? Parce que ① + ② $= 180°$ et ② + ③ $= 180°$. Les angles ① et ③ complètent tous les deux le même angle ② pour faire $180°$: ils sont donc égaux. C'est notre première **démonstration** : on n'a rien mesuré, on a seulement raisonné !

4.2 Perpendiculaires

Si l'un des quatre angles est droit, alors… les quatre sont droits ! (Vérifie avec ce qui précède : $180° - 90° = 90°$.)

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition —** Deux droites sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit. On écrit :
>
> $$(d_1) \perp (d_2)$$
>
> et on lit « la droite d_1 est perpendiculaire à la droite d_2 ». Le symbole $\perp$ est lui-même un petit dessin de deux droites perpendiculaires !

4.3 Parallèles

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Deux droites (d'un même plan) sont **parallèles** si elles ne se coupent jamais — ou si elles sont confondues. On écrit :

$$(d_1) \parallel (d_2) \quad \text{ou} \quad (d_1) \,//\, (d_2)$$

et on lit « d_1 est parallèle à d_2 ». Le symbole représente deux traits côte à côte qui ne se rencontreront jamais, comme les rails d'un chemin de fer.

Deux propriétés fondamentales relient ces deux notions (tu peux les vérifier en dessinant) :

📐 Propriétés —

- **P1.** Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.
- **P2.** Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre.
- **P3.** Si deux droites sont parallèles à une même troisième, elles sont parallèles entre elles.



Fig. 53. – Droites parallèles et perpendiculaires fondamentales

Le symbole ⇒ se lit « donc » ou « implique » : ce qui est à gauche entraîne ce qui est à droite.

4.4 Construire avec les instruments

Méthode — Tracer la perpendiculaire à (d) passant par un point A (à l'équerre)

Pose un côté de l'angle droit de l'équerre **le long de (d)**, fais glisser l'équerre le long de (d) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A. Trace.

Méthode — Tracer la parallèle à (d) passant par A (règle + équerre)

Trace d'abord la perpendiculaire (p) à (d) passant par A. Puis trace la perpendiculaire à (p) passant par A. D'après la propriété **P1**, elle est parallèle à (d).

Méthode — La perpendiculaire au compas seul (méthode des bâtisseurs)

1. Pointe le compas en A et trace un arc qui coupe

(d) en deux points M et N. 2. Avec un écartement plus grand, pointe en M, puis en N, et trace deux arcs qui se croisent en un point P (de l'autre côté de (d) ou du même côté que A). 3. La droite (AP) est perpendiculaire à (d).

Pourquoi ? A est à égale distance de M et N, P aussi : tous deux sont sur la **médiatrice** de $[MN]$, qui est perpendiculaire à (d). (Tu étudieras la médiatrice en détail au Volume IV.)

Cette dernière méthode est exactement celle qu'un arpenteur peut faire sur le terrain avec **un piquet et une corde** servant de compas géant !

4.5 La distance d'un point à une droite

Tu es au point A, au milieu d'un champ, et tu veux rejoindre la route droite (d) le plus vite possible. Quel chemin choisir ? Instinctivement, tu marches **perpendiculairement** à la route.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** La **distance du point A à la droite (d)** est la longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A. C'est le plus court de tous les chemins de A à (d).

⚠️ ⚠️ **Aux limites —**

Les propriétés P1, P2, P3 sont vraies **dans un plan**. Dans l'espace, c'est faux ! Dans ta chambre, la ligne entre le mur et le plafond à gauche et la ligne verticale du coin opposé du sol ne se coupent jamais… et pourtant elles ne sont pas parallèles. On les dit **non coplanaires**.

Exemple résolu 4 — Angles autour d'un croisement

Deux droites se coupent en O. L'un des angles mesure $38°$. Trouver les trois autres.

Solution. L'angle opposé par le sommet mesure aussi $38°$. Les deux autres sont supplémentaires de $38°$: $180° - 38° = 142°$. Les quatre angles mesurent donc $38°$, $142°$, $38°$, $142°$. Vérification : $38 + 142 + 38 + 142 = 360$, un tour complet. ✓

---

5. La Somme des Angles d'un Triangle : Toujours $180°$

Voici l'une des vérités les plus éblouissantes et universelles de toute la géométrie : prends n'importe quel triangle dans l'univers — qu'il soit microscopique ou s'étende sur des années-lumière, effilé comme une aiguille ou aplati et obtus — et mesure ses trois angles intérieurs. Additionne-les. **La somme sera toujours exactement égale à $180°$!**

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$$

Explorons trois chemins distincts pour nous convaincre de cette vérité éternelle.

5.1 Preuve 1 : L'expérience du papier déchiré (Intuition physique)

1. Prends une feuille de papier blanc et trace un triangle quelconque à la règle.
2. Colorie chacun des trois coins avec une couleur différente : Bleu au sommet A, Rouge au sommet B, et Ambre au sommet C.
3. Découpe soigneusement le triangle, puis déchire les trois coins coloriés.
4. Rassemble les trois sommets sur une table plane de manière à faire coïncider leurs pointes en un point commun, en juxtaposant les bords coloriés :

Les trois angles s'ajustent parfaitement sans aucun interstice pour former une ligne droite parfaite ! Puisqu'une ligne droite correspond à un angle plat de $180°$, leur somme fait sans équivoque possible $180°$.

5.2 Preuve 2 : La preuve euclidienne (Rigueur déductive)

Pour transformer cette expérience sensible en une démonstration mathématique inébranlable, nous suivons le lumineux raisonnement d'Euclide utilisant les droites parallèles :

1. Soit un triangle quelconque ABC. Traçons la droite (D E) passant par le sommet A et parallèle au côté opposé (B C).
2. Les trois angles réunis au point A le long de la ligne droite (D E) forment un angle plat :
$$\widehat{DAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAE} = 180°$$
3. Puisque la droite (D E) est parallèle à (B C), la droite (A B) agit comme une sécante coupant deux droites parallèles :
   - L'angle $\widehat{DAB}$ et l'angle $\widehat{ABC}$ sont **alternes-internes**, ils sont donc égaux : $\widehat{DAB} = \hat{B}$.

- De même, l'angle $\widehat{CAE}$ et l'angle $\widehat{ACB}$ sont alternes-internes, donc : $\widehat{CAE} = \hat{C}$.

4. En remplaçant ces égalités dans notre somme, on obtient directement :

$$\hat{B} + \hat{A} + \hat{C} = 180^\circ$$

La démonstration est complète !

5.3 Preuve 3 : Le tour du promeneur (Vision algorithmique / robotique)

Imagine un petit explorateur (ou un robot) qui fait le tour du triangle ABC le long de son périmètre :

- Le promeneur part de A, marche vers B, et au sommet B tourne à gauche d'un angle extérieur $\theta_1 = 180^\circ - \hat{B}$.
- Il marche jusqu'à C et tourne à gauche de $\theta_2 = 180^\circ - \hat{C}$.
- Il revient vers A et tourne à gauche pour retrouver son orientation initiale : $\theta_3 = 180^\circ - \hat{A}$.

De retour au point A, le promeneur a accompli exactement **un tour complet** (360°) sur lui-même dans le plan :

$$\left(180^\circ - \hat{A}\right) + \left(180^\circ - \hat{B}\right) + \left(180^\circ - \hat{C}\right) = 360^\circ$$

$$540^\circ - \left(\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}\right) = 360^\circ$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 540^\circ - 360^\circ = 180^\circ$$

---

6. Triangles particuliers et le secret de la corde à treize nœuds

6.1 Le triangle équilatéral

Un **triangle équilatéral** a ses trois côtés de même longueur. Par symétrie, ses trois angles intérieurs sont également strictement égaux :

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

Tout triangle équilatéral dans l'univers possède trois angles de 60°.

6.2 Le triangle isocèle

Un **triangle isocèle** a deux côtés de même longueur. Les deux angles situés à la base (face aux côtés égaux) sont strictement égaux :

- Si l'angle au sommet principal mesure 40°, les deux angles de base se partagent équitablement les 140° restants :

$$\frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ \quad \text{chacun}$$

6.3 Le triangle rectangle

Un **triangle rectangle** possède un angle droit (90°). Les deux autres angles aigus doivent donc se partager les 90° restants :

$$\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ$$

Les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont toujours **complémentaires**. Si l'un mesure 35°, l'autre mesure nécessairement $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

6.4 La corde à treize nœuds : l'arme secrète des harpedonaptes

Nous pouvons désormais résoudre l'énigme posée dans notre problème d'ouverture : comment les arpenteurs égyptiens (les *harpedonaptes*, ou « tendeurs de corde ») traçaient-ils un angle droit parfait sur le sol sans équerre ?

Ils utilisaient une longue corde fermée en boucle portant **treize nœuds régulièrement espacés** à intervalles strictement identiques :

Puisque le treizième nœud rejoint le premier pour fermer la boucle, celle-ci contient exactement **12 intervalles égaux**.

Les bâtisseurs plantaient trois piquets dans la terre et tendaient la corde fermement autour d'eux en répartissant les intervalles ainsi :

- **3 intervalles** sur le premier côté (du nœud 1 au nœud 4) ;
- **4 intervalles** sur le deuxième côté (du nœud 4 au nœud 8) ;
- **5 intervalles** sur le troisième côté (du nœud 8 au nœud 13/1).

$$3 + 4 + 5 = 12 \text{ intervalles}$$



Fig. 54. – La corde égyptienne à treize nœuds et le triangle rectangle (3, 4, 5)

Lorsque la corde est parfaitement tendue sur les trois piquets, l'angle formé entre le côté de 3 unités et le côté de 4 unités est **garanti d'être un angle droit mathématique absolu (90°)** !

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. C'est le fameux **triplet pythagoricien** $(3, 4, 5)$, une harmonie arithmétique et géométrique exploitée par les bâtisseurs des pyramides plus d'un millénaire avant la naissance de Pythagore !

---

7. 🛠️ Le laboratoire des cas limites

Pour aiguiser notre pensée géométrique, éprouvons les frontières de nos règles là où l'intuition ordinaire trébuche :

Cas 1 : Un triangle peut-il avoir deux angles droits ?

Supposons qu'un triangle possède deux angles droits : $\hat{A} = 90°$ et $\hat{B} = 90°$. La somme des trois angles devant valoir $180°$:

$$\hat{C} = 180° - (90° + 90°) = 0°$$

Un angle de $0°$ signifie que les deux côtés sont strictement parallèles et ne se rencontrent jamais ! Dans le plan euclidien, **il est rigoureusement impossible pour un triangle d'avoir deux angles droits**.

> ⚠️ 🌍 **Au-delà du plan plat — Géométrie sphérique**
>
> Cependant, sur la surface courbe d'une sphère — comme notre planète Terre — les méridiens coupent tous l'équateur à angle droit ($90°$) et se rejoignent pourtant au pôle Nord ! Un triangle formé par le pôle Nord, le point de l'équateur à $0°$ de longitude et le point à $90°$ de longitude Est possède **trois angles droits** ($90° + 90° + 90° = 270°$). Le théorème de la somme des angles à $180°$ est vrai **exclusivement dans un plan euclidien plat** !

Cas 2 : Le triangle dégénéré (plat)

Que se passe-t-il si l'on écrase le sommet C directement sur le segment de base [A B] ? L'angle $\hat{C}$ s'ouvre complètement jusqu'à atteindre $180°$, tandis que $\hat{A}$ et $\hat{B}$ s'aplatissent jusqu'à $0°$:

$$0° + 180° + 0° = 180°$$

Le triangle devient un simple segment de droite. On l'appelle un **triangle dégénéré**.

Cas 3 : Droites non coplanaires dans l'espace

Dans l'espace à trois dimensions, deux droites qui ne se coupent jamais ne sont pas forcément parallèles ! Pense à un pont qui enjambe une autoroute : la route en dessous et le pont au-dessus ne se croisent jamais, et pourtant ils ne pointent pas dans la même direction. De telles droites sont dites **non coplanaires** (ou gauches). La notion de parallélisme exige impérativement que les droites soient situées dans un **même plan**.

Ce qu'il faut retenir

1. **Nature d'un angle :** Un angle mesure une ouverture de rotation entre deux demi-droites issues d'un même sommet. Il est indépendant de la longueur des traits tracés.
2. **Unités fondamentales :** Un tour complet vaut 360°, un angle plat vaut 180°, un angle droit vaut 90°.
3. **Contrôle au rapporteur :** Avant de lire la graduation, vérifie toujours si l'angle observé est aigu ($< 90^\circ$) ou obtus ($> 90^\circ$).
4. **Angles opposés et supplémentaires :** Les angles opposés par le sommet sont égaux. Les angles adjacents formant une ligne droite sont supplémentaires (somme $= 180^\circ$).
5. **Somme des angles d'un triangle :** Pour tout triangle dans le plan, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.
6. **Triangles particuliers :**
   - Équilatéral : 3 côtés égaux, 3 angles de 60°.
   - Isocèle : 2 côtés égaux, 2 angles de base égaux.
   - Rectangle : 1 angle droit de 90°, deux angles aigus complémentaires (somme $= 90^\circ$).
7. **La corde à treize nœuds :** Une boucle de 12 intervalles égaux disposée en triangle $3 - 4 - 5$ garantit un angle droit parfait de 90°.

Exercices d'entraînement

Niveau ⋆ (Application directe)

Exercice 15.1 Classe chacun des angles suivants selon sa nature (aigu, droit, obtus ou plat) : 12°, 90°, 144°, 89°, 180°, 93°.

Exercice 15.2 Dans un triangle ABC, on mesure $\hat{A} = 52^\circ$ et $\hat{B} = 68^\circ$. Calcule la mesure du troisième angle $\hat{C}$.

Exercice 15.3 L'un des angles aigus d'un triangle rectangle mesure 37°. Quelle est la mesure de son deuxième angle aigu ?

Exercice 15.4 Un triangle isocèle possède un angle au sommet principal qui mesure 50°. Quelle est la mesure de chacun des deux angles situés à sa base ?

Exercice 15.5 Deux droites se coupent en un point O. L'un des quatre angles ainsi formés mesure 72°. Quelles sont les mesures des trois autres angles ?

Niveau ⋆⋆ (Réflexion et déductions géométriques)

Exercice 15.6 Dans un triangle DEF, l'angle $\hat{D}$ est trois fois plus grand que l'angle $\hat{E}$, et l'angle $\hat{F}$ mesure 40°. Quelles sont les mesures respectives de $\hat{D}$ et $\hat{E}$?

Exercice 15.7 Peut-il exister un triangle dont les trois angles mesureraient 45°, 65° et 75° ? Justifie rigoureusement ta réponse.

Exercice 15.8 Dans un triangle isocèle, l'un des angles mesure 100°. 1. Cet angle de 100° peut-il être situé à la base ? Pourquoi ? 2. Quelle est la mesure des deux autres angles du triangle ?

Exercice 15.9 Un maçon médiéval désire vérifier si l'angle d'un mur est parfaitement d'équerre (90°). Il mesure $60\ \text{cm}$ le long du premier mur depuis le coin et y fait une marque A, puis mesure $80\ \text{cm}$ le long du second mur et marque un point B. Quelle distance doit impérativement séparer A et B pour que l'angle soit un angle droit parfait ?

Exercice 15.10 Deux droites (d_1) et (d_2) sont parallèles. Une sécante coupe (d_1) sous un angle de 64°. Quelles sont les mesures des huit angles formés au total au niveau des deux intersections ?

Niveau ⋆⋆⋆ (Défis et recherches)

Exercice 15.11 Somme des angles d'un quadrilatère quelconque. 1. Dessine un polygone à quatre côtés quelconque (un quadrilatère) $ABCD$. 2. Découpe-le en deux triangles en traçant une diagonale [A C]. 3. Déduis-en la somme exacte des quatre angles intérieurs de n'importe quel quadrilatère.

Exercice 15.12 L'Étoile d'Alexandrie. Considère une étoile régulière à cinq branches. Quelle est la somme des cinq angles situés aux cinq pointes de l'étoile ? *(Indice : relie les angles des pointes aux triangles intérieurs de l'étoile).*

Solutions

Solution 15.1 12° et 89° : aigus. 90° : droit. 93° et 144° : obtus. 180° : plat.

Solution 15.2 La somme des angles dans le triangle ABC vaut 180° :

$$\hat{C} = 180^\circ - (52^\circ + 68^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

Solution 15.3 Les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires :

$$\text{Deuxième angle} = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ.$$

Solution 15.4 Les deux angles de base se partagent équitablement les degrés restants :

$$\text{Angle de base} = \frac{180^\circ - 50^\circ}{2} = \frac{130^\circ}{2} = 65^\circ \quad \text{chacun}.$$

Solution 15.5 L'angle opposé par le sommet mesure également 72°. Les deux angles adjacents supplémentaires mesurent chacun :

$$180^\circ - 72^\circ = 108^\circ.$$

Les quatre angles sont donc 72°, 108°, 72° et 108°.

Solution 15.6 Nous savons que $\hat{D} + \hat{E} + \hat{F} = 180^\circ$, donc :

$$\hat{D} + \hat{E} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ.$$

Puisque $\hat{D} = 3 \times \hat{E}$, on a :

$$3 \times \hat{E} + \hat{E} = 4 \times \hat{E} = 140^\circ.$$

D'où $\hat{E} = 140^\circ \div 4 = 35^\circ$, et $\hat{D} = 3 \times 35^\circ = 105^\circ$. Vérification : $105^\circ + 35^\circ + 40^\circ = 180^\circ$. ✓

Solution 15.7 Calculons la somme des trois mesures proposées :

$$45^\circ + 65^\circ + 75^\circ = 185^\circ.$$

Comme $185^\circ \neq 180^\circ$, un tel triangle **ne peut pas exister** en géométrie euclidienne !

Solution 15.8 1. Non, car si un angle de base mesurait 100°, le deuxième angle de base mesurerait aussi 100°, ce qui donnerait $100^\circ + 100^\circ = 200^\circ > 180^\circ$, impossible. 2. L'angle de 100° est donc obligatoirement l'angle au sommet principal. Les deux angles de base mesurent :

$$\frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ \quad \text{chacun}.$$

Solution 15.9 Le maçon utilise une version agrandie du triangle égyptien $(3, 4, 5)$ multiplié par 20 : $3 \times 20 = 60$ cm, $4 \times 20 = 80$ cm. L'hypoténuse doit valoir :

$$5 \times 20 = 100 \text{ cm} = 1 \text{ mètre}.$$

Si la distance mesurée en diagonale entre A et B est exactement de 100 cm, l'angle formé par les deux murs est un angle droit parfait.

Solution 15.10 La sécante forme quatre angles aigus de 64° (opposés par le sommet et correspondants) et quatre angles obtus supplémentaires de $180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$.

Solution 15.11 La diagonale [A C] partage le quadrilatère $ABCD$ en deux triangles distincts, $\triangle ABC$ et $\triangle ACD$. Chacun de ces triangles possède une somme d'angles intérieurs égale à 180°. La somme des quatre angles du quadrilatère vaut donc :

$$180^\circ + 180^\circ = 360^\circ.$$

Solution 15.12 En considérant le pentagone régulier central et les cinq triangles isocèles formant les pointes, chaque angle à la pointe d'une étoile régulière mesure 36°. La somme des cinq pointes vaut donc :

$$5 \times 36^\circ = 180^\circ !$$

La question qui ouvre la suite…

Nous savons désormais dompter les lignes droites, les perpendiculaires et les angles vifs des polygones. Mais que se passe-t-il lorsque la ligne commence à s'incurver et à glisser doucement dans l'espace sans le moindre coin ?

Dans le coin sombre d'un atelier antique, un lourd disque de bois tourne régulièrement sur un pivot de fer : **la roue du potier**. Comment mesurer le contour arrondi d'un cercle alors qu'aucune règle rigide ne peut s'y courber sans glisser ? Et quel est ce nombre infini et mystérieux que le grand **Archimède de Syracuse** a traqué entre deux armées géantes de polygones ? C'est le secret du cercle et du nombre π, que nous dévoilerons au chapitre suivant.

CHAPITRE 16 : La Roue du Potier et le Secret d'Archimède

> « Tout polygone à angles droits se laisse enfermer dans un quadrillage. Mais la courbe du cercle glisse entre les doigts de l'arpenteur. Pour mesurer l'anneau parfait, il fallait dérouler la circonférence sur la terre et découvrir ce nombre mystérieux, sans fin et sans répétition, que les sages de Syracuse ont traqué entre deux armées de polygones. »

Ce que tu vas découvrir

- La différence essentielle entre le **cercle** (la ligne du contour) et le **disque** (la surface pleine).
- Le vocabulaire de la rondeur : **centre**, **rayon**, **diamètre**, **corde** et **arc**.
- L'expérience du roulement et la constante magique : pourquoi le rapport du périmètre sur le diamètre donne toujours le même nombre $\pi \approx 3,14159...$
- L'incroyable exploit d'**Archimède de Syracuse** et sa méthode des polygones à 96 côtés.
- Les deux formules indispensables : le périmètre du cercle ($P = 2\pi r$) et l'aire du disque ($A = \pi r^2$), démontrée en transformant un disque en quasi-rectangle !

---

1. Le problème : la jante du char et le pot de terre

Tu as onze ans. Après avoir exploré les angles droits des arpenteurs d'Égypte au chapitre précédent, promenons-nous dans l'atelier d'un artisan de l'Antiquité.

Dans un coin sombre de l'échoppe, une roue lourde en bois tourne à plat sur un pivot de fer. C'est le **tour du potier**. L'artisan jette une motte d'argile grise au centre exact du plateau en mouvement. Ses mains mouillées effleurent la terre. Sous ses doigts, comme par enchantement, la masse informe s'évase en une coupe parfaitement ronde.



Fig. 55. – Éléments remarquables du cercle : rayon, diamètre et corde

Chaque point du bord extérieur de la coupe tourne à la même distance du pivot central. Si un côté était plus éloigné que l'autre, la coupe se déformerait et s'effondrerait immédiatement.

Le lendemain, le forgeron du village voisin fait face à un casse-tête bien plus rude. Il doit fabriquer une **jante en fer** pour entourer la grande roue de bois d'un char de combat. Cette bande de fer doit être forgée droite sur l'enclume, puis courbée en cercle chaud et emboîtée au millimètre près autour de la roue.

- Si le forgeron coupe une bande de fer trop courte de deux centimètres, elle ne fermera jamais le tour de la roue.
- S'il coupe une bande trop longue de deux centimètres, la jante flottera autour du bois et la roue éclatera au premier caillou sur la route.

Le forgeron mesure la largeur de sa roue : elle fait exactement **1 mètre de part en part**, en passant par le centre. Quelle longueur exacte de fer doit-il couper ?

Il prend une cordelette, tente de la plaquer sur le bord courbé de la roue, mais la cordelette glisse, s'étire et se détend. L'artisan peste : *« Pourquoi est-il si facile de mesurer un carré ou un triangle avec une règle droite, et si difficile de mesurer la ligne courbe d'un cercle ? »*

Pour répondre à cette question, il faut faire ce que les premiers géomètres ont fait : faire rouler le cercle sur le sol.

---

2. Le vocabulaire du cercle et du disque

Avant de dérouler notre roue, mettons de l'ordre dans les mots. La langue française est très précise, et confondre ces termes est le piège le plus fréquent des débutants.

2.1 Cercle ou disque ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Cercle et Disque**

- Le **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble de tous les points du plan situés à la même distance r du point O. Le cercle est **une ligne courbe fermée**, c'est le bord vide (comme une alliance, un cerceau ou un anneau de fer).
- Le **disque** de centre O et de rayon r est l'ensemble de tous les points du plan situés à une distance inférieure ou égale à r du point O. Le disque est **une surface pleine** (comme une pièce de monnaie, une assiette ou une crêpe).



Fig. 56. – La méthode d'Archimède : encadrement de Pi par polygones réguliers

2.2 Les segments et les lignes remarquables

Posons un point O sur une feuille.

- Le **centre** : le point fixe O situé au milieu exact de la figure.
- Le **rayon** : c'est à la fois le segment $[OB]$ qui relie le centre à un point du cercle, et la **longueur** $r = OB$ de ce segment. Tous les rayons d'un même cercle ont rigoureusement la même longueur.
- Le **diamètre** : c'est un segment $[AB']$ passant par le centre O et joignant deux points opposés du cercle. Sa longueur se note souvent d. Comme il est formé de deux rayons bout à bout ($[AO]$ et $[OB']$), on a la relation fondamentale :

$$d = 2 \times r \quad \text{ou} \quad r = \frac{d}{2}$$

- Une **corde** : un segment $[CD]$ qui relie deux points quelconques du cercle sans nécessairement passer par le centre. Le diamètre est simplement la plus longue de toutes les cordes possibles.

- Un **arc de cercle** : une portion de la courbe comprise entre deux points, notée $\overset{\frown}{CD}$.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Le mot *rayon* vient du latin *radius*, qui désignait le rayon d'une roue de charrette ou la baguette d'un devin. Le mot *diamètre* vient du grec *dia* (« à travers ») et *metron* (« mesure ») : c'est la mesure « de part en part » qui traverse la figure.

---

3. L'expérience du roulement et la constante magique

Revenons au forgeron et à sa roue. Imaginons une expérience très simple que tu peux réaliser chez toi avec une pièce de monnaie, un rouleau de ruban adhésif ou une boîte de conserve :

1. Prends un feutre et fais une petite marque rouge sur le bord de ta boîte cylindrique.
2. Pose la boîte sur une longue feuille de papier blanc posée au sol, de manière à ce que la marque rouge touche le bord gradué de ta règle au point 0.
3. Fais rouler la boîte en ligne droite, sans qu'elle glisse, jusqu'à ce que la marque rouge touche à nouveau le sol après avoir fait **exactement un tour complet**.
4. Mesure la distance parcourue sur la règle : c'est la longueur du tour de la boîte, c'est-à-dire le **périmètre** de la boîte (aussi appelé **circonférence**).



Fig. 57. – Le déroulement du cercle : définition géométrique du nombre Pi

Faisons cette mesure avec des objets ronds de tailles très différentes :

Objet mesuré	Diamètre d mesuré	Périmètre P mesuré	Rapport $\frac{P}{d}$ (division)
Pièce de 2 euros	$2,57$ cm	$8,07$ cm	$\frac{8,07}{2,57} \approx 3,140$
Rouleau de ruban adhésif	$8,00$ cm	$25,13$ cm	$\frac{25,13}{8,00} \approx 3,141$
Assiette ronde	$22,00$ cm	$69,10$ cm	$\frac{69,10}{22,00} \approx 3,141$
Roue de bicyclette	$68,00$ cm	$213,60$ cm	$\frac{213,60}{68,00} \approx 3,141$

Regarde la dernière colonne avec attention : **le résultat de la division $\frac{P}{d}$ donne toujours le même nombre, environ $3,14$!** Que l'objet soit minuscule comme une tête d'épingle ou gigantesque comme la trajectoire de la Lune autour de la Terre, **le contour d'un cercle fait toujours un peu plus de trois fois son diamètre**.

Ce rapport constant ne dépend pas de la taille de l'objet : c'est une constante universelle de la géométrie de notre univers. Les mathématiciens lui ont donné le nom de la lettre grecque π (qui se prononce *« pi »*).

La constante π —

Pour tout cercle de périmètre P et de diamètre d :

$$\frac{P}{d} = \pi \approx 3,1415926535...$$

Par conséquent, si l'on multiplie les deux côtés par le diamètre d, on obtient la célèbre formule du **périmètre du cercle** :

$$P = \pi \times d = 2 \times \pi \times r$$

On la retient souvent sous la forme chantante : **« Deux π r »**.

> **Découverte & Histoire**
>
> 🔍 **L'histoire vraie — D'où vient la lettre π ?** La lettre π est la première lettre du mot grec *periphereia* (qui a donné « périphérie » en français, c'est-à-dire le contour). C'est le mathématicien gallois William Jones qui l'a utilisée pour la première fois en 1706 dans un livre d'enseignement, mais c'est le géant suisse **Leonhard Euler** qui l'a rendue mondialement célèbre à partir de 1737 en l'adoptant dans tous ses traités.

---

4. Le secret d'Archimède : dompter le cercle avec des polygones

Les Babyloniens et les Égyptiens savaient déjà que le périmètre valait environ trois fois le diamètre. Les Égyptiens utilisaient une approximation proche de $\left(\frac{16}{9}\right)^2 \approx 3,16$, et la Bible (dans le premier livre des Rois) évoque un grand bassin circulaire de bronze de 10 coudées de diamètre et 30 coudées de circonférence ($\pi \approx 3$).

Mais personne ne savait calculer la valeur exacte de ce nombre avec certitude. C'est alors qu'entre en scène le plus grand génie scientifique de l'Antiquité : **Archimède de Syracuse** (vers 287 – 212 avant J.-C.).

4.1 L'idée de génie : la cage aux polygones

Archimède se dit : *« Je ne sais pas mesurer une courbe directement. En revanche, je sais parfaitement calculer le périmètre d'une figure droite avec des côtés droits : un polygone régulier ! »*

Archimède imagine donc deux polygones réguliers qui emprisonnent le cercle comme dans un étau : 1. Un polygone **inscrit** (situé entièrement **à l'intérieur** du cercle, dont les sommets touchent le cercle). 2. Un polygone **circonscrit** (situé entièrement **à l'extérieur** du cercle, dont les côtés touchent le cercle).

C'est une évidence physique :

- Le chemin qui longe le polygone intérieur est plus court que le tour du cercle.
- Le chemin qui longe le polygone extérieur est plus long que le tour du cercle.

Donc :

$$\text{Périmètre du polygone inscrit} < P_{\text{cercle}} < \text{Périmètre du polygone circonscrit}$$

En divisant chaque terme par le diamètre, Archimède obtient un **encadrement** rigoureux de π !

4.2 L'escalade des 96 côtés

Archimède commence avec des hexagones réguliers (6 côtés). Il calcule précisément leurs périmètres grâce au théorème de Pythagore. Puis, par une formule géométrique remarquable qu'il invente, il **double** le nombre de côtés :

- Polygones à 12 côtés (dodécagones) ;
- Polygones à 24 côtés ;
- Polygones à 48 côtés ;
- Et enfin, polygones à **96 côtés** !

Imagine le travail colossal : à 96 côtés, le polygone intérieur et le polygone extérieur collent tellement au cercle qu'à l'œil nu, il est impossible de voir la moindre différence entre la ligne brisée et la courbe.

Au terme de calculs manuels héroïques sur des fractions et des racines carrées, Archimède établit son résultat historique :

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

En calculant les valeurs décimales de ces deux fractions :

$$3,140845... < \pi < 3,142857...$$

Grâce à Archimède, le monde savait désormais sans l'ombre d'un doute que π commence par $\mathbf{3,14}$. La fraction supérieure d'Archimède, $\frac{\mathbf{22}}{\mathbf{7}}$, est si commode qu'elle a été utilisée par tous les bâtisseurs et ingénieurs pendant près de deux mille ans pour faire des calculs rapides de tête !

5. L'aire du disque : transformer un cercle en rectangle

Nous savons maintenant mesurer la ficelle du bord ($P = 2\pi r$). Mais quelle est la **surface** du disque ? Combien de centimètres carrés de peinture faut-il pour recouvrir une table ronde ?

La réponse est donnée par une formule magique :

$$A = \pi \times r^2$$

D'où vient cette formule ? Pourquoi retrouve-t-on le carré du rayon (r^2) multiplié par le même nombre π ? Voici une démonstration visuelle d'une beauté à couper le souffle, attribuée à Léonard de Vinci et déjà pressentie par les géomètres grecs.

La métaphore de la tarte aux pommes

Imagine un grand disque en pâte à tarte de rayon r. 1. Découpons ce disque en un grand nombre de parts égales très fines (par exemple 16 parts, comme des pointes de flèches). 2. Séparons ces 16 parts et disposons-les alternativement, une pointe en haut, une pointe en bas, en les emboîtant les unes dans les autres :

Regarde la nouvelle figure obtenue : elle ressemble étrangement à un **rectangle** (ou un parallélogramme presque parfait) !

- Quelle est la **hauteur** de ce rectangle ? C'est la longueur d'une part de tarte, c'est-à-dire le **rayon** r du cercle.
- Quelle est la **base** de ce rectangle ? Le bord ondulé supérieur est composé de la moitié des arcs des parts, et le bord inférieur de l'autre moitié. La base mesure donc la **moitié du périmètre du cercle** :

$$\text{Base} = \frac{1}{2} \times P = \frac{1}{2} \times (2\pi r) = \pi r$$

Quelle est l'aire de ce rectangle ?

$$\text{Aire} = \text{base} \times \text{hauteur} = (\pi r) \times r = \pi r^2$$

Si au lieu de 16 parts, nous découpons le disque en 100 parts, 1 000 parts, 1 000 000 de parts infiniment fines, les petites pointes ondulées deviennent absolument plates et droites : la figure devient un véritable rectangle parfait d'aire πr^2.

> **📐 Théorème — Aire du disque**
>
> L'aire A d'un disque de rayon r (et de diamètre $d = 2r$) est égale à :
>
> $$A = \pi \times r^2 = \pi \times r \times r$$
>
> En fonction du diamètre d : $A = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi \times d^2}{4}$.

6. Attention aux pièges !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les confusions mortelles

1.

Ne confonds pas rayon et diamètre ! Dans un énoncé, surligne immédiatement si l'on te donne le rayon ou le diamètre. Si une roue a un diamètre de $10\ \text{cm}$, son rayon est de $5\ \text{cm}$. Si tu écris $A = \pi \times 10^2$, ton résultat sera quatre fois trop grand ! 2. **Ne confonds pas périmètre et aire !**

- Le périmètre est une **longueur** (en m, cm, mm) : $P = 2\pi r$. Le rayon y est à la puissance 1.
- L'aire est une **surface** (en m^2, cm^2, mm^2) : $A = \pi r^2$. Le rayon y est élevé au carré.

3. **Le piège du demi-cercle :** Le périmètre d'un demi-cercle fermé n'est PAS seulement la moitié de $2\pi r$. Il faut lui ajouter le bord plat qui le referme, c'est-à-dire le diamètre !

$$P_{\text{demi-disque}} = \pi r + 2r$$

4. **π n'est ni $3,14$, ni $\frac{22}{7}$!** Ce ne sont que des valeurs approchées très pratiques. Les décimales de π se poursuivent à l'infini sans jamais présenter de séquence périodique qui se répète : $\pi = 3,141592653589793...$ (on dit que π est un nombre irrationnel). Quand un problème demande la « valeur exacte », tu dois laisser le symbole π dans ta réponse (ex : $16\pi\ \text{cm}^2$).

---

7. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Le cerclage du tonneau

Un viticulteur veut entourer un tonneau circulaire avec un ruban d'acier. Le diamètre du tonneau mesure $80\ \text{cm}$. Quelle longueur de ruban doit-il découper au minimum ? (Prendre $\pi \approx 3,14$).

Solution : - On cherche un périmètre. On connaît le diamètre $d = 80\ \text{cm}$. - Formule : $P = \pi \times d$. - Calcul : $P = \pi \times 80 \approx 3,14 \times 80 = 251,2\ \text{cm}$.

Il doit couper un ruban d'au moins $251,2\ \text{cm}$ (soit environ $2,51\ \text{m}$). ✓

Exemple résolu 2 — Le compteur de la bicyclette

Le pneu d'un vélo tout-terrain a un rayon $r = 35\ \text{cm}$. 1. Quelle distance le vélo parcourt-il lorsque la roue fait exactement un tour complet ? 2. Combien de tours la roue effectue-t-elle pour un trajet de $1,1\ \text{km}$?

Solution : 1. La distance parcourue en un tour correspond au périmètre de la roue :

$$P = 2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 35 = 70\pi \approx 219,91\ \text{cm} \approx 2,20\ \text{m}$$

2. Convertissons la distance totale en mètres : $1,1\ \text{km} = 1\,100\ \text{m}$. Nombre de tours :

$$\text{Nombre de tours} = \frac{\text{Distance totale}}{\text{Périmètre}} = \frac{1\,100}{2,20} = 500\ \text{tours}$$

La roue fait exactement 500 tours complets. ✓

Exemple résolu 3 — La guerre des pizzas : un dilemme gourmand !

Dans une pizzeria, tu as le choix entre :

- Une **grande pizza** géante de $40\ \text{cm}$ de diamètre pour 16 euros.
- Deux **petites pizzas** de $28\ \text{cm}$ de diamètre pour 16 euros au total.

Quelle option te donne le plus de pizza à manger pour le même prix ?

Solution : Calculons l'aire consommable dans chaque cas (attention aux rayons !) :

- Pour la grande pizza : le diamètre est de $40\ \text{cm}$, donc son rayon est $r_1 = 20\ \text{cm}$.

$$A_1 = \pi \times r_1^2 = \pi \times 20^2 = 400\pi \approx 1\,256,6\ \text{cm}^2$$

- Pour les deux petites pizzas : le diamètre est de $28\ \text{cm}$, donc le rayon est $r_2 = 14\ \text{cm}$. Aire d'une petite pizza : $A_{\text{petite}} = \pi \times 14^2 = 196\pi \approx 615,75\ \text{cm}^2$. Pour deux petites pizzas :

$$A_2 = 2 \times 196\pi = 392\pi \approx 1\,231,5\ \text{cm}^2$$

Conclusion : $400\pi > 392\pi$. La grande pizza offre une surface supérieure à celle des deux petites réunies ! Le choix le plus avantageux est donc la grande pizza unique. ✓

Exemple résolu 4 — Retrouver le rayon à partir du périmètre ou de l'aire

1. Un arbre centenaire a une circonférence de tronc mesurée à $314\ \text{cm}$. Quel est son diamètre ?
2. Une place circulaire a une aire de $706,5\ \text{m}^2$. Quel est son rayon ? (Prendre $\pi \approx 3,14$).

Solution : 1. On sait que $P = \pi \times d$, donc :

$$d = \frac{P}{\pi} \approx \frac{314}{3,14} = 100\ \text{cm} = 1\ \text{m}$$

Le tronc a un diamètre d'un mètre. 2. On sait que $A = \pi \times r^2$, donc :

$$r^2 = \frac{A}{\pi} \approx \frac{706,5}{3,14} = 225$$

Quel nombre positif multiplié par lui-même donne 225 ? On cherche la racine carrée : $15 \times 15 = 225$, donc $r = 15\ \text{m}$. La place a un rayon de 15 mètres. ✓

Exemple résolu 5 — La piste d'athlétisme et la couronne circulaire

Un stade d'entraînement possède un parterre central circulaire de pelouse de rayon $R_1 = 30\ \text{m}$, entouré d'une piste de course en tartan d'une largeur uniforme de $4\ \text{m}$. Quelle est l'aire de la piste de course ?

Solution : La surface de la piste forme une **couronne circulaire** : c'est la différence entre le grand disque extérieur et le petit disque intérieur.

- Rayon intérieur : $R_1 = 30\ \text{m}$.
- Rayon extérieur : $R_2 = 30 + 4 = 34\ \text{m}$.
- Aire du grand disque : $A_{\text{grand}} = \pi \times R_2^2 = \pi \times 34^2 = 1\,156\pi\ \text{m}^2$.
- Aire du petit disque : $A_{\text{petit}} = \pi \times R_1^2 = \pi \times 30^2 = 900\pi\ \text{m}^2$.
- Aire de la couronne :

$$A_{\text{piste}} = A_{\text{grand}} - A_{\text{petit}} = 1\,156\pi - 900\pi = 256\pi \approx 256 \times 3,1416 \approx 804,25\ \text{m}^2$$

La piste a une aire d'environ $804,25\ \text{m}^2$. ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Cercle vs Disque :**
   - Le cercle est la bordure courbe (longueur).
   - Le disque est la surface intérieure (aire).
2. **Rayon et Diamètre :**
   - Le diamètre vaut deux fois le rayon : $d = 2r \Leftrightarrow r = \frac{d}{2}$.
3. **Le nombre π :**
   - C'est le quotient invariable du périmètre par le diamètre : $\pi = \frac{P}{d} \approx 3,14159...$
   - Archimède l'a encadré grâce à des polygones à 96 côtés : $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$.
4. **Formules fondamentales :**
   - **Périmètre du cercle :** $P = 2\pi r = \pi d$.
   - **Aire du disque :** $A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$.
5. **Unités et valeurs exactes :**
   - Conserver π pour donner la valeur exacte (ex: $25\pi\ \text{cm}^2$).
   - Remplacer π par $3,14$ ou la touche π de la calculatrice pour une valeur arrondie.

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 16.1 Complète le tableau suivant pour différents cercles (prendre $\pi \approx 3,14$) : | Cercle | Rayon r | Diamètre d | Périmètre P | |---|---|---|---| | A | $6\ \text{cm}$ | ? | ? | | B | ? | $18\ \text{m}$ | ? | | C | ? | ? | $31,4\ \text{dm}$ |

Exercice 16.2 Calcule l'aire exacte (avec π) puis arrondie au dixième : 1. D'un disque de rayon $4\ \text{cm}$. 2. D'un disque de diamètre $14\ \text{m}$.

Exercice 16.3 Un jardinier souhaite poser une bordure en bois autour d'un massif de fleurs circulaire de $3\ \text{m}$ de rayon. Quelle longueur de bordure doit-il acheter ?

Exercice 16.4 Une assiette a un diamètre de $24\ \text{cm}$. Calcule son aire au cm^2 près.

Exercice 16.5 Donne la valeur exacte du périmètre d'un demi-cercle de rayon $5\ \text{cm}$, comprenant son diamètre de fermeture.

Niveau (Réflexion et géométrie)

Exercice 16.6 Une table ronde a un périmètre de $376,8\ \text{cm}$. 1. Quel est son rayon ? 2. Quelle est son aire en m^2 ?

Exercice 16.7 Une chèvre est attachée par une corde de $6\ \text{mètres}$ à un piquet planté au milieu d'une vaste prairie plate. 1. Quelle est la forme géométrique de la zone d'herbe qu'elle peut brouter ? 2. Calcule l'aire exacte de cette zone de pâture.

Exercice 16.8 On double le rayon d'un disque (le rayon passe de r à $2r$). 1. Par combien son périmètre est-il multiplié ? 2. Par combien son aire est-elle multipliée ? Justifie par un calcul littéral.

Exercice 16.9 Un terrain de sport a la forme d'un rectangle de $100\ \text{m}$ de long sur $60\ \text{m}$ de large, terminé à chaque extrémité par un demi-disque de diamètre $60\ \text{m}$. 1. Calcule la longueur totale d'un tour de piste extérieur. 2. Calcule l'aire totale du terrain.

Exercice 16.10 Une roue de camion a un diamètre extérieur de $90\ \text{cm}$. Le camion roule à une vitesse telle que la roue tourne à $10\ \text{tours par seconde}$. Quelle distance le camion parcourt-il en une minute ? Donne le résultat en mètres, puis en kilomètres par heure (km/h).

Exercice 16.11 Un CD audio a un diamètre extérieur de $12\ \text{cm}$ et un trou central de diamètre $1,5\ \text{cm}$. Quelle est l'aire disponible pour enregistrer les données musicales ?

Niveau (Défis et approfondissements)

Exercice 16.12 Le carré et le cercle inscrits. Dans une plaque carrée en métal de $20\ \text{cm}$ de côté, un artisan découpe le plus grand disque possible. 1. Quel est le diamètre de ce disque ? 2. Quelle est l'aire de métal perdue (les quatre coins qui tombent dans les chutes) ? 3. Quel pourcentage de la plaque de métal de départ a été gaspillé ?

Exercice 16.13 Les lunules d'Hippocrate de Chios. Soit un triangle ABC rectangle en A, avec $AB = 4\ \text{cm}$ et $AC = 3\ \text{cm}$. L'hypoténuse BC mesure $5\ \text{cm}$. Sur chacun des trois côtés pris comme diamètres, on trace un demi-cercle vers l'extérieur. Les deux croissants extérieurs formés au-dessus de l'hypoténuse s'appellent des *lunules*. Montre que la somme des aires de ces deux lunules est exactement égale à l'aire du triangle rectangle ABC !

Exercice 16.14 La corde autour de la Terre. Imagine que l'on tende une corde bien serrée tout autour de l'équateur de la Terre (en supposant la Terre parfaitement sphérique, de circonférence $P_1 = 40\,000\ \text{km}$). On ajoute ensuite **1 mètre seulement** à cette corde ($P_2 = 40\,000\ \text{km} + 1\ \text{m}$), et on la soulève de manière uniforme tout autour de la Terre pour qu'elle forme un nouveau cercle concentrique. Une souris peut-elle passer sous la corde sans se baisser ? Un chat ? Un être humain ? *(Indication : calcule la différence d'altitude $h = r_2 - r_1$. Le résultat va te stupéfier !)*

Exercice 16.15 La méthode d'Archimède pour l'hexagone. Soit un cercle de rayon $R = 1$. 1. Dessine un hexagone régulier inscrit dans ce cercle. Combien mesurent ses 6 côtés ? Déduis-en le périmètre de cet hexagone, et la minoration élémentaire de π que cela donne. 2. Calcule le périmètre d'un carré circonscrit autour de ce cercle. Quelle majoration de π obtiens-tu ? Entre quels deux nombres entiers π est-il ainsi coincé ?

Solutions

Solution 16.1 - Cercle A : $d = 2 \times 6 = 12$ cm ; $P = \pi \times 12 \approx 3,14 \times 12 = 37,68$ cm. - Cercle B : $r = 18/2 = 9$ m ; $P = \pi \times 18 \approx 3,14 \times 18 = 56,52$ m. - Cercle C : $d = P/\pi \approx 31,4/3,14 = 10$ dm ; $r = 10/2 = 5$ dm.

Solution 16.2 1. $r = 4$ cm : Aire exacte $A = \pi \times 4^2 = 16\pi$ cm$^2 \approx 50,3$ cm^2. 2. $d = 14$ m $\Longrightarrow r = 7$ m : Aire exacte $A = \pi \times 7^2 = 49\pi$ m$^2 \approx 153,9$ m^2.

Solution 16.3 $P = 2\pi r = 2 \times \pi \times 3 = 6\pi \approx 18,85$ m. Il doit acheter environ $18,9$ m de bordure.

Solution 16.4 $d = 24$ cm $\Longrightarrow r = 12$ cm. $A = \pi \times 12^2 = 144\pi \approx 452,39$ cm$^2 \approx 452$ cm^2.

Solution 16.5 Le demi-cercle est composé de l'arc courbe de longueur $\frac{1}{2}(2\pi r) = \pi r = 5\pi$ cm, plus le diamètre de base $d = 2 \times 5 = 10$ cm. Périmètre exact : $P = (5\pi + 10)$ cm $\approx 25,71$ cm.

Solution 16.6 1. $P = 2\pi r \Longrightarrow r = \frac{P}{2\pi} \approx \frac{376,8}{2 \times 3,14} = \frac{376,8}{6,28} = 60$ cm. 2. $A = \pi r^2 = \pi \times 60^2 = 3\,600\pi \approx 11\,304$ cm$^2 = 1,1304$ m^2.

Solution 16.7 1. La zone accessible est un disque plein de centre le piquet et de rayon 6 m. 2. Aire exacte : $A = \pi \times 6^2 = 36\pi$ m$^2 \approx 113,10$ m^2.

Solution 16.8 1. Nouveau périmètre : $P' = 2\pi(2r) = 2 \times (2\pi r) = 2P$. Le périmètre est **multiplié par 2**. 2. Nouvelle aire : $A' = \pi(2r)^2 = \pi \times 4r^2 = 4(\pi r^2) = 4A$. L'aire est **multipliée par 4** (2^2) !

Solution 16.9 1. Le contour comprend deux longueurs droites de 100 m et deux demi-cercles de diamètre 60 m qui forment ensemble un cercle complet de diamètre 60 m : $P_{\text{total}} = 2 \times 100 + \pi \times 60 = 200 + 60\pi \approx 200 + 188,5 = 388,5$ m. 2. L'aire comprend le rectangle central ($100 \times 60 = 6\,000$ m^2) plus le disque complet formé par les deux demi-disques de rayon $r = 30$ m : $A_{\text{disque}} = \pi \times 30^2 = 900\pi \approx 2\,827,4$ m^2. $A_{\text{totale}} = 6\,000 + 900\pi \approx 8\,827,4$ m^2.

Solution 16.10 Périmètre d'un tour : $P = \pi \times 0,90$ m $\approx 2,8274$ m. En une seconde, la roue fait 10 tours, soit une distance de $10 \times 2,8274 = 28,274$ m/s. En une minute (60 s), le camion parcourt : $D = 28,274 \times 60 \approx 1\,696,46$ m $\approx 1,70$ km. Vitesse en km/h : $28,274 \times 3,6 \approx 101,8$ km/h.

Solution 16.11 Rayon extérieur $R = 6$ cm, rayon intérieur $r = 0,75$ cm. $A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(6^2 - 0,75^2) = \pi(36 - 0,5625) = 35,4375\pi \approx 111,33$ cm^2.

Solution 16.12 1. Le plus grand disque a pour diamètre la largeur du carré, soit $d = 20$ cm, donc son rayon est $r = 10$ cm. 2. Aire du carré : $A_{\text{carré}} = 20 \times 20 = 400$ cm^2. Aire du disque : $A_{\text{disque}} = \pi \times 10^2 = 100\pi \approx 314,16$ cm^2. Aire perdue : $400 - 100\pi \approx 85,84$ cm^2. 3. Taux de gaspillage : $\frac{85,84}{400} \approx 0,2146 = 21,46\%$. Plus de 21% de la matière est perdue !

Solution 16.13 Le triangle ABC est rectangle en A, son aire est $\frac{3 \times 4}{2} = 6$ cm^2. Les demi-disques sur les côtés de l'angle droit ont pour rayons $r_1 = 2$ et $r_2 = 1,5$. Leurs aires valent $\frac{1}{2}\pi(2^2) = 2\pi$ et $\frac{1}{2}\pi(1,5^2) = 1,125\pi$. Le grand demi-disque sur l'hypoténuse a pour rayon $R = 2,5$ et pour aire $\frac{1}{2}\pi(2,5^2) = 3,125\pi$. Remarquons que $2\pi + 1,125\pi = 3,125\pi$! La somme des deux petits demi-disques égale le grand demi-disque. L'aire totale de la figure est (Triangle + 2 petits demi-disques). Les lunules s'obtiennent en retirant le grand demi-disque : $\text{Aire lunules} = (\text{Aire triangle} + 3,125\pi) - 3,125\pi = \text{Aire triangle} = 6$ cm^2. Une figure courbée dont l'aire est rigoureusement égale à celle d'un polygone droit !

Solution 16.14 Notons R_T le rayon de la Terre et R_2 le rayon avec la corde rallongée. Circonférence initiale : $P_1 = 2\pi R_T$. Circonférence rallongée : $P_2 = 2\pi R_2 = P_1 + 1$ mètre. Soustrayons : $2\pi R_2 - 2\pi R_T = 1 \Longrightarrow 2\pi(R_2 - R_T) = 1$. Donc le soulèvement $h = R_2 - R_T$ vaut :

$$h = \frac{1}{2\pi} \approx \frac{1}{6,283} \approx 0,159 \text{ m} \approx 16 \text{ cm} !$$

Ce résultat est totalement indépendant du rayon de la Terre ! Qu'il s'agisse de la Terre, du Soleil ou d'une balle de tennis, rallonger la corde d'un mètre décolle la corde de 16 cm partout. Une souris, et même un gros chat, peuvent passer dessous sans aucun problème !

Solution 16.15 1. Un hexagone régulier inscrit se découpe en 6 triangles équilatéraux de côté égal au rayon $R = 1$. Chaque côté mesure donc 1. Le périmètre vaut $6 \times 1 = 6$. Comme le diamètre vaut 2, le rapport donne $\pi > \frac{6}{2} = 3$. Donc $\pi > 3$. 2. Le carré circonscrit a pour côté le diamètre du cercle, soit 2. Son périmètre vaut $4 \times 2 = 8$. Le rapport extérieur donne $\pi < \frac{8}{2} = 4$. On en déduit l'encadrement immédiat : $3 < \pi < 4$.

La question qui ouvre la suite

Nous savons désormais mesurer les figures rondes et courbées. Mais que faire lorsque l’objet à mesurer n’est ni un petit disque sous nos yeux ni une corde que l’on peut poser au sol, mais un géant de pierre vertigineux : la **Grande Pyramide de Khéops** ?

Comment un sage grec nommé **Thalès**, armé d’un simple bâton planté dans le sable brûlant du désert, a-t-il pu déterminer la hauteur exacte du plus grand tombeau du monde sans jamais y grimper ? C’est le secret des **proportions géométriques et des triangles semblables**, que nous allons percer au chapitre suivant.

CHAPITRE 17 : L’Ombre de la Pyramide et le Bâton Planté

> « Pourquoi vouloir escalader un géant de pierre au risque de sa vie ? Quand le soleil éclaire le monde, chaque être projette sur le sol le miroir fidèle de sa propre taille. Il suffit d’apprendre à lire l’ombre. »

Ce que tu vas découvrir

- Le défi historique de **Thalès de Milet** au pied de la Grande Pyramide de Khéops.
- Ce qu’est un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k.
- L’effet magique du coefficient k sur le monde : pourquoi les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2 et les volumes par k^3.
- Le **théorème de Thalès** dans ses deux configurations officielles : les triangles emboîtés et le sablier (papillon).
- L’égalité des trois rapports de longueurs et la méthode infaillible du produit en croix.
- La **réciproque du théorème de Thalès** pour prouver avec certitude que deux droites sont parallèles.

---

1. Le problème : le défi insolent du Pharaon

Le vent du désert souffle en tourbillons sur le plateau de Gizeh, en Égypte, il y a deux mille six cents ans. Devant toi se dresse la Grande Pyramide du pharaon Khéops : une montagne artificielle de calcaire pur culminant à une hauteur vertigineuse.

Le Pharaon Amasis réunit les grands prêtres et les géomètres de sa cour au pied du géant : *« Qui parmi vous est capable de me donner la hauteur exacte de ce tombeau sacré, depuis la roche du sol jusqu’à la pointe dorée qui touche le ciel ? »*

Les architectes baissent la tête, embarrassés : *« Majesté, les parois sont lisses comme du verre et inclinées à pic. Aucun homme ne peut grimper avec une chaîne d’arpenteur sans glisser et s’écraser cent quarante mètres plus bas ! »*

Un voyageur étranger, venu de la cité grecque de Milet et vêtu d’un simple manteau de laine, s’avance calmement. Il s’appelle **Thalès**. Thalès regarde la montagne de pierre, observe le soleil éclatant dans le ciel d’azur, puis sourit : *« Majesté, je n’ai nul besoin d’escalader votre pyramide. Donnez-moi simplement un bâton de bois, et avant que le jour ne s’éteigne, je vous donnerai la hauteur exacte du monument sans avoir décollé mes pieds de la terre ! »*

Les prêtres égyptiens ricanent. Comment ce marchand grec pourrait-il mesurer un colosse avec un pauvre morceau de bois ?



Fig. 58. – Théorème de Thalès : la mesure de la hauteur de la pyramide

---

2. De l'instant magique aux proportions universelles

2.1 La première idée : l'heure magique

Thalès commence par s'asseoir dans le sable et observe la course du soleil.

- Tôt le matin, le soleil est bas : les ombres sont immenses et démesurées.
- À midi, le soleil est au zénith : les ombres sont minuscules, tassées sous les pieds.
- Puis au cours de l'après-midi, le soleil descend lentement, et les ombres recommencent à grandir.

Thalès plante son bâton verticalement dans le sable. Ce bâton mesure exactement **2 mètres**. Il trace un repère dans le sable et surveille la pointe de l'ombre du bâton :

- À 14 h 00, l'ombre mesure $1,20$ m (plus courte que le bâton).
- À 15 h 00, elle mesure $1,60$ m.
- Soudain, à **15 h 45**, Thalès mesure l'ombre : **elle mesure très exactement 2 mètres !**

À cet instant précis, un miracle géométrique se produit :

$$\text{Longueur de l'ombre du bâton} = \text{Hauteur réelle du bâton} = 2 \text{ mètres}$$

Le rayon du soleil frappe le sol avec un angle de $45°$, formant avec le bâton vertical et le sol un **triangle rectangle isocèle**. Thalès crie aux serviteurs : *« Mesurez l'ombre de la pyramide maintenant ! »* À cette seconde précise, la longueur de l'ombre de la pyramide (mesurée depuis le centre de sa base jusqu'au bout de son ombre projetée) est **rigoureusement égale à sa hauteur réelle** !

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Selon l'écrivain grec Plutarque, le pharaon Amasis fut tellement stupéfait de voir Thalès mesurer le monument en quelques pas qu'il le couvrit de cadeaux et le tint pour le plus sage des hommes vivants.

2.2 Mais si le soleil ne nous attend pas ? L'idée des proportions

Cette méthode de « l'heure magique » est géniale, mais elle a un gros défaut : il faut attendre l'instant précis où l'angle fait $45°$. Que faire s'il y a un nuage à 15 h 45 ? Que faire si l'on doit mesurer un arbre à 10 h du matin ?

Thalès comprit une vérité bien plus profonde : **les rayons du soleil, venant d'un astre situé à 150 millions de kilomètres, arrivent sur Terre en étant parfaitement parallèles entre eux.**

Par conséquent, à **n'importe quelle heure de la journée**, la pyramide et son ombre forment un triangle qui a **exactement la même forme** que le triangle formé par le bâton et son ombre ! L'un est simplement un **agrandissement** de l'autre.

Le rapport entre la hauteur et l'ombre est **le même pour tous les objets verticaux à un instant donné** :

$$\frac{\text{Hauteur Pyramide}}{\text{Ombre Pyramide}} = \frac{\text{Hauteur Bâton}}{\text{Ombre Bâton}} \Leftrightarrow \frac{H}{L} = \frac{h}{l}$$

D'où la formule qui donne la hauteur sans attendre :

$$H = L \times \frac{h}{l}$$

---

3. Agrandissement, réduction et le piège des dimensions

Avant d'énoncer le théorème dans toute sa généralité, arrêtons-nous sur ce que signifie « agrandir » ou « réduire » une figure. C'est l'un des chapitres où les intuitions trompent le plus facilement l'esprit humain !

3.1 Le coefficient d'agrandissement ou de réduction

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Agrandissement et Réduction**

- Modifier une figure en multipliant **toutes ses longueurs** par un même nombre strictement positif k s'appelle :
  - Un **agrandissement** si $k > 1$.
  - Une **réduction** si $0 < k < 1$.
- Le nombre k est appelé le **rapport** ou **coefficient** d'agrandissement ou de réduction (ou **échelle**).
- Dans un agrandissement ou une réduction, **la forme est conservée** : les angles restent strictement identiques, et les droites parallèles restent parallèles.

3.2 L'effet sur les longueurs, les aires et les volumes

Voici la règle d'or qui gouverne toute la géométrie de notre univers à trois dimensions :

📐 **Théorème fondamental — Effet du rapport k**

Lorsque toutes les longueurs d'une figure ou d'un solide sont multipliées par un coefficient k ($k > 0$) :

- Les **longueurs** sont multipliées par k.
- Les **aires** sont multipliées par k^2 ($k \times k$).
- Les **volumes** sont multipliés par k^3 ($k \times k \times k$).

Pourquoi ce carré et ce cube ? La preuve par les cubes emboîtés

Prenons un petit cube de pâte à modeler de 1 cm de côté.

- Sa longueur est de 1 cm.
- L'aire d'une face est de $1 \times 1 = 1 \text{ cm}^2$.
- Son volume est de $1 \times 1 \times 1 = 1 \text{ cm}^3$.

Maintenant, effectuons un agrandissement de rapport $\boldsymbol{k = 2}$ (on double toutes les dimensions : côté $= 2 \text{ cm}$).

Regarde bien : 1. La longueur d'une arête a été multipliée par $\mathbf{2}$ (2 cm). 2. L'aire d'une face carrée : elle contient maintenant $2 \times 2 = 4$ petits carrés. Elle a été multipliée par $2^2 = \mathbf{4}$! 3. Le volume du cube : pour remplir le nouveau cube de 2 cm d'arête, il faut 4 petits cubes au rez-de-chaussée et 4 petits cubes au premier étage, soit $2 \times 2 \times 2 = 8$ petits cubes. Le volume a été multiplié par $2^3 = \mathbf{8}$!

Si l'on triplait les longueurs ($k = 3$) :

- Les longueurs seraient $\times 3$.
- Les aires seraient $\times 3^2 = \mathbf{9}$.
- Les volumes seraient $\times 3^3 = \mathbf{27}$!

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? — Pourquoi les géants de cinéma ne peuvent pas exister** C'est Galilée qui l'a compris le premier : si un être humain mesurait 10 fois sa taille ($k = 10$), il serait 10 fois plus grand, mais son poids (qui dépend de son volume) serait multiplié par $10^3 = \mathbf{1\,000}$! En revanche, la solidité de ses os (qui dépend de l'aire de leur section) ne serait multipliée que par $10^2 = \mathbf{100}$. Ses os subiraient une pression 10 fois trop forte : ses jambes se briseraient sous son propre poids au premier pas !

---

4. Le Théorème de Thalès dans le triangle

Revenons à la géométrie pure du collège. Comment s'énonce ce théorème dans un cahier de mathématiques ?

4.1 Les deux configurations officielles

Le théorème s'applique lorsqu'une droite coupe deux côtés d'un triangle en étant **parallèle** au troisième côté. Il existe deux figures possibles :

Dans les deux cas :

- Les droites (MB) et (NC) sont sécantes en A.
- Les droites (MN) et (BC) sont **strictement parallèles**.

Le triangle AMN est une réplique exacte du triangle ABC : c'est une réduction (ou un agrandissement) de rapport k. Leurs angles sont identiques, et leurs côtés sont tous proportionnels deux à deux.

4.2 L'énoncé du théorème de Thalès

📐 Théorème de Thalès —

Soient (d) et (d') deux droites sécantes en un point A. Soient B et M deux points de (d), distincts de A. Soient C et N deux points de (d'), distincts de A. Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Chaque fraction compare un côté du « petit » triangle à son côté correspondant dans le « grand » triangle :

$$\frac{\text{côté de } AMN}{\text{côté de } ABC} = \text{constante } k$$

🧭 Méthode — Comment écrire l'égalité des rapports sans jamais se tromper

1. Repère le **sommet commun** (le point où les deux

sécantes se croisent, ici A). 2. Écris les deux premiers rapports en partant toujours de ce sommet commun : $\frac{A\ldots}{A\ldots} = \frac{A\ldots}{A\ldots}$ (ex : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$). 3. Pour le troisième rapport, « oublie » le sommet commun A et prends les deux autres lettres des numérateurs, puis des dénominateurs : $\frac{MN}{BC}$. 4. Vérifie que tous les côtés du triangle du haut (AM, AN, MN) sont bien au **numérateur**, et tous ceux du triangle du bas (AB, AC, BC) au **dénominateur** (ou l'inverse, mais ne mélange jamais !).

---

5. La Réciproque du théorème de Thalès : prouver le parallélisme

Le théorème de Thalès dit :

$$\text{Si les droites sont parallèles} \Longrightarrow \text{les rapports sont égaux.}$$

Que se passe-t-il si nous voulons faire le chemin inverse ? Nous arrivons sur un chantier naval ou sur un terrain d'arpentage, nous mesurons des longueurs au sol, et nous voulons savoir avec une certitude absolue si deux poutres ou deux rails sont **parallèles**.

C'est le rôle de la **réciproque du théorème de Thalès**.

⚠ ⚠ Le piège classique du brevet — La condition indispensable d'ordre des points

Vérifier l'égalité numérique des rapports de longueurs $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ ne suffit **absolument pas** pour conclure au parallélisme ! Il faut impérativement que les points soient situés **dans le même ordre** sur leurs droites respectives (A, M, B et A, N, C). Si M est placé de l'autre côté de A, les rapports peuvent être égaux sans que les droites ne soient parallèles (configuration asymétrique croisée).

📐 Réciproque du Théorème de Thalès —

Soient (AB) et (AC) deux droites sécantes en A. Soient M un point de la droite (AB) et N un point de la droite (AC). Si : 1. Les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés **dans le même ordre**, 2. Et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**.

La contraposée : prouver que des droites NE SONT PAS parallèles

Si après avoir calculé les deux quotients, tu découvres qu'ils ne sont pas égaux ($\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$), alors tu peux conclure immédiatement (grâce à la contraposée du théorème de Thalès) que **les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles**.

---

6. Attention aux pièges !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les erreurs classiques du brevet

1.

Mélanger le numérateur et le dénominateur : Écrire $\frac{AM}{AB} = \frac{AC}{AN}$ est une faute grave. Tu as mis « petit sur grand » à gauche, et « grand sur petit » à droite. Le produit en croix sera totalement faux. 2. **Prendre le segment entre les deux parallèles au lieu du côté complet :** Dans la configuration emboîtée, le côté du grand triangle est AB. Certains élèves prennent par erreur la longueur MB. Or MB n'est le côté d'aucun triangle ! Rappel : $AB = AM + MB$. 3. **Oublier la condition d'ordre dans la réciproque :** Pour appliquer la réciproque, il est **obligatoire** de mentionner dans ta rédaction : *« Les points A, M, B d'une part, et A, N, C d'autre part, sont alignés dans le même ordre. »* Sans cette phrase, la démonstration est incomplète. 4. **Multiplier une aire par k au lieu de k^2 :** Si une carte est à l'échelle $\frac{1}{100}$, les longueurs sont divisées par 100, mais l'aire d'un champ sur la carte est divisée par $100^2 = 10\,000$!

---

7. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Le calcul de la pyramide par Thalès

Mesurons la pyramide de Khéops comme Thalès avec les véritables données historiques :

- Le bâton mesure $h = 2$ m. Son ombre au sol mesure $l = 3$ m.
- La pyramide a une base carrée de 230 m de côté.
- L'ombre du sommet de la pyramide dépasse du pied de la paroi de 74 m.

⚠️ ⚠️ Le piège historique de l'ombre de la pyramide

Thalès ne pouvait pas mesurer l'ombre à partir du centre invisible de la pyramide, caché sous des millions de blocs de calcaire ! L'ombre mesurée au sol (74 m) partait du pied de la paroi extérieure. Pour appliquer le théorème des proportions, Thalès a rigoureusement ajouté la moitié du côté de la base carrée ($\frac{230}{2} = 115$ m) :

$$L_{\text{totale}} = 115 + 74 = 189 \text{ m}.$$

Sans cette correction géométrique capitale, son calcul aurait sous-estimé la hauteur de la pyramide de plus de 75 mètres !

Quelle est la hauteur H de la pyramide ?

Solution : 1. Calculons d'abord la longueur totale L de l'ombre de la pyramide, mesurée depuis la verticale du sommet (le centre de la base carrée) :

$$L = \text{demi-côté} + \text{ombre extérieure} = \frac{230}{2} + 74 = 115 + 74 = 189 \text{ m}$$

2. Les rayons du soleil étant parallèles, nous appliquons l'égalité des proportions de Thalès :

$$\frac{H}{h} = \frac{L}{l} \Longrightarrow \frac{H}{2} = \frac{189}{3}$$

3. Calculons H par un produit en croix :

$$H = \frac{2 \times 189}{3} = 2 \times 63 = 126 \text{ mètres}$$

La Grande Pyramide mesurait environ 126 mètres ce jour-là (en tenant compte de l'érosion du sommet). ✓

Exemple résolu 2 — Calcul d'une longueur inconnue (configuration classique)

Sur la figure ci-contre, les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A. On donne : $AM = 3$ cm, $AB = 7,5$ cm, $AC = 10$ cm et $BC = 12$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Calculer les longueurs AN et MN.

Solution : - Rédaction type collège : Dans le triangle ABC, M est un point du segment $[AB]$ et N un point du segment $[AC]$. Puisque les droites (MN) et (BC) sont parallèles, d'après le **théorème de Thalès**, on a l'égalité des rapports :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

- Remplaçons par les valeurs numériques connues :

$$\frac{3}{7,5} = \frac{AN}{10} = \frac{MN}{12}$$

- Calcul de AN :

$$AN = \frac{3 \times 10}{7,5} = \frac{30}{7,5} = 4 \text{ cm}$$

- Calcul de MN :

$$MN = \frac{3 \times 12}{7,5} = \frac{36}{7,5} = 4,8 \text{ cm}$$

Les longueurs cherchées sont $AN = 4$ cm et $MN = 4,8$ cm. ✓

Exemple résolu 3 — La rivière infranchissable (configuration papillon)

Un géomètre souhaite mesurer la largeur AB d'une rivière tumultueuse sans la traverser. Il repère un arbre A sur la rive opposée, plante un piquet B en face sur sa rive, puis recule jusqu'à un point O aligné avec A et B. Il trace ensuite deux lignes perpendiculaires et obtient la configuration sablier suivante :

- Les droites (AB) et (CD) se croisent en O.
- Les droites (AB) et (CD) sont telles que $(AC)//(BD)$… ou plus simplement, la droite (AB) traverse la rivière :

On a les mesures suivantes : $OB = 15$ m, $OD = 20$ m, $OC = 36$ m et $CD = 25$ m. Les droites (AC) et (BD) se coupent en O, et (AB) est parallèle à (CD) n'est pas la bonne disposition : ici, ce sont (AB) et (CD) qui sont sécantes en O, et les droites (AC) et (BD) qui sont parallèles. Prenons la configuration officielle : les droites (AD) et (BC) se coupent en O, avec $(AB)//(CD)$. On donne : $OB = 12$ m, $OC = 30$ m, et $CD = 45$ m. Calculer la distance AB.

Solution : - Les droites (AD) et (BC) sont sécantes en O. - Les droites (AB) et (CD) sont parallèles. - D'après le **théorème de Thalès** dans la configuration en sablier :

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC} = \frac{AB}{CD}$$

- Utilisons le rapport connu :

$$\frac{12}{30} = \frac{AB}{45}$$

- Produit en croix :

$$AB = \frac{12 \times 45}{30} = \frac{540}{30} = 18 \text{ mètres}$$

La largeur AB mesurée à travers la rivière vaut 18 mètres. ✓

Exemple résolu 4 — Démontrer le parallélisme par la réciproque

Soit un triangle ABC tel que $AB = 6\ \text{cm}$ et $AC = 8\ \text{cm}$. Sur la demi-droite $[AB)$, on place un point E tel que $AE = 15\ \text{cm}$. Sur la demi-droite $[AC)$, on place un point F tel que $AF = 20\ \text{cm}$. Les droites (BC) et (EF) sont-elles parallèles ?

Solution : - Calculons séparément les deux rapports de longueurs :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{6}{15} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\frac{AC}{AF} = \frac{8}{20} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{2}{5} = 0,4$$

- On constate que :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF}$$

- Rédaction finale : Les points A, B, E d'une part, et A, C, F d'autre part, sont alignés dans le même ordre. De plus, $\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AF}$. Donc, d'après la **réciproque du théorème de Thalès**, les droites (BC) et (EF) sont bien parallèles. ✓

Exemple résolu 5 — L'architecte et la maquette de la tour

Une agence d'architecture réalise la maquette à l'échelle $\frac{1}{200}$ d'un futur gratte-ciel en verre. 1. La maquette a une hauteur de $1,40\ \text{m}$. Quelle sera la hauteur réelle de la tour ? 2. La maquette utilise une surface vitrée de $0,35\ \text{m}^2$. Quelle sera la surface vitrée réelle du gratte-ciel ? 3. Le volume intérieur de la maquette est de $0,05\ \text{m}^3$. Quel sera le volume réel du bâtiment ?

Solution : L'échelle de la maquette est une réduction de coefficient $k = \frac{1}{200}$. Pour passer de la maquette à la réalité, on effectue un agrandissement de rapport inverse :

$$K = 200$$

1. **Pour les longueurs :** multiplication par $K = 200$.

$$\text{Hauteur réelle} = 1,40 \times 200 = 280\ \text{mètres}$$

2. **Pour les aires :** multiplication par $K^2 = 200^2 = 40\,000$.

$$\text{Surface vitrée} = 0,35 \times 40\,000 = 14\,000\ \text{m}^2$$

3. **Pour les volumes :** multiplication par $K^3 = 200^3 = 8\,000\,000$.

$$\text{Volume réel} = 0,05 \times 8\,000\,000 = 400\,000\ \text{m}^3$$

Observe l'explosion des chiffres : le volume est huit millions de fois plus grand que celui de la maquette ! ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Agrandissement et Réduction :**
   - Rapport $k > 1$: agrandissement ; $0 < k < 1$: réduction.
   - Effet du coefficient k :
     - Longueurs $\times\ k$
     - Aires $\times\ k^2$
     - Volumes $\times\ k^3$
2. **Théorème de Thalès (Calcul de longueurs) :**
   - **Conditions :** Deux droites sécantes en A, coupées par deux droites parallèles (MN) et (BC).
   - **Conclusion :** $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
3. **Réciproque de Thalès (Preuve de parallélisme) :**
   - **Conditions :** Points alignés dans le même ordre sur deux droites sécantes, ET égalité de deux rapports : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.
   - **Conclusion :** Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
   - Si les rapports sont différents, la **contraposée** prouve que les droites ne sont pas parallèles.

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 17.1 On applique un agrandissement de coefficient $k = 3$ à un triangle dont les côtés mesurent $4\ \text{cm}$, $5\ \text{cm}$ et $6\ \text{cm}$. Quelles sont les longueurs des côtés du triangle agrandi ?

Exercice 17.2 Un carré a une aire de $25\ \text{cm}^2$. On réduit ses côtés d'un rapport $k = 0,4$. 1. Quelle est la longueur du côté du carré initial ? 2. Quelle est la longueur du côté du carré réduit ? 3. Quelle est l'aire du carré réduit ? Vérifie que $\text{Aire}' = k^2 \times \text{Aire}$.

Exercice 17.3 Dans un triangle ABC, on a $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN)//(BC)$. On donne $AM = 2\ \text{cm}$, $AB = 6\ \text{cm}$ et $AN = 3\ \text{cm}$. Calcule la longueur AC.

Exercice 17.4 Configuration papillon : les droites (AB) et (CD) sont sécantes en O, et $(AC)//(BD)$. On sait que $OA = 5\ \text{cm}$, $OB = 15\ \text{cm}$ et $AC = 4\ \text{cm}$. Calcule la longueur BD.

Exercice 17.5 Sur une droite, on a $AM = 4\ \text{cm}$ et $AB = 10\ \text{cm}$. Sur une autre droite sécante en A, on a $AN = 6\ \text{cm}$ et $AC = 15\ \text{cm}$. Les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ sont-ils égaux ?

Niveau (Calculs et démonstrations)

Exercice 17.6 La hauteur du clocher. Un après-midi, un promeneur de $1,80\ \text{m}$ projette une ombre de $2,40\ \text{m}$ sur le parvis d'une église. Au même instant, l'ombre portée du clocher mesure $36\ \text{mètres}$. Quelle est la hauteur du clocher ?

Exercice 17.7 Attention au segment piège ! Dans un triangle ABC, on donne $AB = 12\ \text{cm}$, $AC = 16\ \text{cm}$. Le point M est sur $[AB]$ tel que $MB = 3\ \text{cm}$. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N. 1. Calcule la longueur AM. 2. Calcule la longueur AN, puis la longueur NC.

Exercice 17.8 Les deux étagères murales. Un menuisier fixe deux planches horizontales $[MN]$ et $[BC]$ entre deux montants inclinés se rejoignant au sommet A. On mesure : $AM = 45\ \text{cm}$, $MB = 30\ \text{cm}$, $MN = 60\ \text{cm}$. Puisque les planches sont horizontales, elles sont parallèles entre elles. Calcule la longueur de la grande planche $[BC]$.

Exercice 17.9 Test de parallélisme. Soit un triangle RST avec $RS = 7\ \text{cm}$ et $RT = 9\ \text{cm}$. On place un point P sur $[RS]$ tel que $RP = 2,8\ \text{cm}$, et un point Q sur $[RT]$ tel que $RQ = 3,6\ \text{cm}$. Les droites (PQ) et (ST) sont-elles parallèles ? Rédige soigneusement ta réponse.

Exercice 17.10 Le contre-exemple de la réciproque. Soit un triangle ABC avec $AB = 5\ \text{cm}$, $AC = 8\ \text{cm}$. On place D sur $[AB]$ tel que $AD = 2\ \text{cm}$, et E sur $[AC]$ tel que $AE = 3\ \text{cm}$. Les droites (DE) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifie.

Exercice 17.11 Peinture et carrelage : l'effet k^2. Un peintre en bâtiment met 2 heures et utilise un pot de 5 litres de peinture pour peindre un panneau publicitaire carré de $3\ \text{mètres}$ de côté. Combien de pots de peinture et combien d'heures de travail lui faudra-t-il pour peindre un panneau géant de même forme mais de $9\ \text{mètres}$ de côté (en supposant qu'il travaille à la même vitesse) ?

Niveau (Défis et modélisation)

Exercice 17.12 L'obstacle infranchissable et le pantographe. Pour mesurer la distance entre deux balises A et B séparées par un étang marécageux, un géomètre choisit un point d'observation S d'où il peut viser A et B. Il mesure sur la terre ferme : $SA = 120\ \text{m}$ et $SB = 150\ \text{m}$. Il prolonge ensuite les visées au-delà de S : Sur la demi-droite opposée à $[SA)$, il place A' tel que $SA' = 40\ \text{m}$. Sur la demi-droite opposée à $[SB)$, il place B' tel que $SB' = 50\ \text{m}$. Il mesure directement avec son ruban la distance sur le pré : $A'B' = 36\ \text{m}$. 1. Démontre que la droite $(A'B')$ est parallèle à la droite (AB). 2. Détermine la distance inaccessible AB à travers l'étang.

Exercice 17.13 Le gâteau des trois frères : partage en parts d'aires égales. Un pâtissier prépare un grand biscuit triangulaire ABC de hauteur $18\ \text{cm}$. Il souhaite le couper en trois parts de même aire à l'aide de deux coups de couteau horizontaux parallèles à la base $[BC]$, situés aux hauteurs h_1 et h_2 depuis le sommet A. 1. Par quel coefficient d'agrandissement l'aire est-elle multipliée pour passer du petit triangle du haut au triangle intermédiaire ? Et au grand triangle entier ? 2. À quelles hauteurs h_1 et h_2 depuis le sommet A le pâtissier doit-il couper le gâteau ? *(Donne les valeurs exactes puis arrondies au millimètre).*

Exercice 17.14 Le tronc de pyramide d'Égypte. On considère une pyramide régulière à base carrée de côté $10\ \text{m}$ et de hauteur $12\ \text{m}$. Son volume initial est $V = \frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{Hauteur} = \frac{1}{3} \times 100 \times 12 = 400\ \text{m}^3$. On coupe cette pyramide à mi-hauteur (à $6\ \text{m}$ du sommet) par un plan parallèle à la base. 1. Quel est le rapport de réduction k de la

petite pyramide supérieure ? 2. Quel est le volume de la petite pyramide retirée ? 3. Quel est le volume du « tronc de pyramide » restant en bas ? Quelle fraction du volume total représente-t-il ?

Exercice 17.15 Thalès dans l'espace : la chambre noire et la photographie. Le premier appareil photo (la *camera obscura*) est une boîte fermée percée d'un minuscule trou O au centre de sa face avant. Un arbre de 15 mètres de haut est situé à 30 mètres en face du trou de la boîte. La boîte a une profondeur de 20 centimètres entre le trou et le fond où se trouve la plaque photographique. 1. Fais un schéma en coupe montrant les rayons lumineux qui se croisent en O. Quelle est la nature de l'image sur le fond (à l'endroit ou à l'envers) ? 2. Quelle sera la hauteur de l'image de l'arbre imprimée sur la plaque photographique au fond de l'appareil ?

Solutions

Solution 17.1 Chaque longueur est multipliée par 3 : $4 \times 3 = 12$ cm ; $5 \times 3 = 15$ cm ; $6 \times 3 = 18$ cm.

Solution 17.2 1. Côté initial : $\sqrt{25} = 5$ cm. 2. Côté réduit : $5 \times 0,4 = 2$ cm. 3. Aire réduite : $2 \times 2 = 4$ cm^2. Vérification : $k^2 \times \text{Aire initiale} = (0,4)^2 \times 25 = 0,16 \times 25 = 4$ cm^2. Exact !

Solution 17.3 D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Longrightarrow \frac{2}{6} = \frac{3}{AC}$. Produit en croix : $AC = \frac{6 \times 3}{2} = 9$ cm.

Solution 17.4 Configuration papillon : $\frac{OA}{OB} = \frac{AC}{BD} \Longrightarrow \frac{5}{15} = \frac{4}{BD}$. $BD = \frac{15 \times 4}{5} = 12$ cm.

Solution 17.5 $\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4$. $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4$. Oui, les deux rapports sont rigoureusement égaux.

Solution 17.6 Parallélisme des rayons du soleil : $\frac{H_{\text{clocher}}}{h_{\text{homme}}} = \frac{L_{\text{clocher}}}{l_{\text{homme}}} \Longrightarrow \frac{H}{1,80} = \frac{36}{2,40}$. $H = \frac{1,80 \times 36}{2,40} = 1,80 \times 15 = 27$ mètres.

Solution 17.7 1. $M \in [AB] \Longrightarrow AM = AB - MB = 12 - 3 = 9$ cm. 2. D'après Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Longrightarrow \frac{9}{12} = \frac{AN}{16}$. $AN = \frac{9 \times 16}{12} = \frac{144}{12} = 12$ cm. $NC = AC - AN = 16 - 12 = 4$ cm.

Solution 17.8 Attention : $AB = AM + MB = 45 + 30 = 75$ cm. Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \Longrightarrow \frac{45}{75} = \frac{60}{BC}$. $BC = \frac{75 \times 60}{45} = \frac{4500}{45} = 100$ cm $= 1$ mètre.

Solution 17.9 Calculons séparément : $\frac{RP}{RS} = \frac{2,8}{7} = 0,4$. $\frac{RQ}{RT} = \frac{3,6}{9} = 0,4$. Les points R, P, S d'une part, et R, Q, T d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Comme $\frac{RP}{RS} = \frac{RQ}{RT}$, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (PQ) et (ST) sont parallèles.

Solution 17.10 Calculons : $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{5} = 0,40$. $\frac{AE}{AC} = \frac{3}{8} = 0,375$. Comme $\frac{AD}{AB} \neq \frac{AE}{AC}$, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (DE) et (BC) ne sont pas parallèles.

Solution 17.11 Le côté passe de 3 m à 9 m : rapport des longueurs $k = \frac{9}{3} = 3$. L'aire à peindre est multipliée par $k^2 = 3^2 = 9$!

- Peinture : 5 L $\times 9 = 45$ litres (soit 9 pots).
- Temps : 2 h $\times 9 = 18$ heures de travail.

Solution 17.12 1. Les points A', S, A et B', S, B sont alignés dans cet ordre. Rapports : $\frac{SA'}{SA} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$ et $\frac{SB'}{SB} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$. Puisque les rapports sont égaux, d'après la réciproque de Thalès, $(A'B') // (AB)$. 2. D'après Thalès : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{3} \Longrightarrow AB = 3 \times A'B' = 3 \times 36 = 108$ mètres.

Solution 17.13 1. Soit A l'aire du triangle total. Le premier triangle du haut a pour aire $\frac{1}{3}A$. Le triangle intermédiaire a pour aire $\frac{2}{3}A$. Le rapport des aires est k^2. Donc le rapport des hauteurs est $k = \sqrt{\text{rapport des aires}}$. 2. Pour la première coupe : $k_1 = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,57735$. $h_1 = 18 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{3} \approx 10,39$ cm. Pour la deuxième coupe : $k_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,8165$. $h_2 = 18 \times \sqrt{\frac{2}{3}} = 6\sqrt{6} \approx 14,70$ cm.

Solution 17.14 1. La coupe est faite à mi-hauteur (6 m sur 12 m), donc le rapport de réduction est $k = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} = 0,5$. 2. Le volume de la petite pyramide est multiplié par $k^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. $V_{\text{petit}} = \frac{1}{8} \times 400 = 50$ m^3. 3. Le volume du tronc de pyramide restant est : $V_{\text{tronc}} = 400 - 50 = 350$ m^3. Il représente $\frac{350}{400} = \frac{7}{8}$ du volume total (soit 87,5 % du volume dans la moitié inférieure) !

Solution 17.15 1. Les rayons lumineux passent par le trou O en ligne droite : le rayon venant du sommet de l'arbre arrive en bas de la plaque, et le rayon venant du pied de l'arbre arrive en haut. L'image se forme donc **renversée tête en bas**. 2. Il s'agit d'une configuration sablier de Thalès : Distance objet : $D = 30$ m $= 3\,000$ cm. Profondeur boîte : $d = 20$ cm. Hauteur arbre : $H = 15$ m $= 1\,500$ cm. Thalès : $\frac{h_{\text{image}}}{H_{\text{arbre}}} = \frac{d}{D} \Longrightarrow \frac{h}{1\,500} = \frac{20}{3\,000} = \frac{1}{150}$. $h = \frac{1\,500}{150} = 10$ cm. L'arbre formera une image miniature de 10 centimètres de haut au fond de la boîte.

La question qui ouvre la suite

Quand nous agrandissons un cube ou une pyramide, les volumes se multiplient par k^3 : ils grimpent à toute vitesse. Mais que se passe-t-il lorsque l'on ne se contente pas de tripler une dimension, mais que l'on répète une multiplication des dizaines de fois d'affilée ?

C'est l'histoire d'un roi d'Orient qui croyait offrir une modeste poignée de riz à l'inventeur du jeu d'échecs, et qui vit son royaume tout entier submergé sous une montagne de céréales. Bienvenue dans le monde vertigineux des **puissances, des priorités opératoires et de la notation scientifique** !

CHAPITRE 18 : Le Grain de Riz sur l'Échiquier

> « L'addition est le pas lent du marcheur qui avance pierre par pierre. La multiplication est la course du cavalier. Mais la puissance est l'envol fulgurant de la fusée : en quelques battements d'ailes, elle dépasse l'entendement des rois et emplit l'univers tout entier. »

Ce que tu vas découvrir

- La légende indienne du sage **Sissa** et l'avalanche de grains de riz sur l'échiquier.
- L'**ordre universel des opérations** (PEMDAS) : pourquoi sans règles du jeu, aucun calcul ne donnerait le même résultat.
- La notation **puissance** : comment écrire en un minuscule exposant des multiplications géantes (a^n).
- Les secrets des **puissances de 10** et les puissances à **exposants négatifs** ($10^{-n} = \frac{1}{10^n}$).
- Les quatre règles d'or pour multiplier, diviser et élever des puissances sans jamais s'emmêler.
- La **notation scientifique** et l'exploration des grandeurs, depuis le cœur de l'atome jusqu'aux confins des galaxies.

---

1. Le problème : la promesse imprudente du roi Belkib

Il y a plus de mille cinq cents ans, dans un somptueux palais du nord de l'Inde, vivait un roi puissant nommé Belkib (ou Shirham). Malgré toutes ses richesses, le monarque s'ennuyait profondément. Aucun spectacle de danse, aucun tournoi de cavalerie ne parvenait à chasser sa mélancolie.

Un jour, un sage de sa cour nommé **Sissa** se présenta devant le trône avec un coffret en bois d'ébène. Il en sortit un plateau de 64 cases carrées alternant le blanc et le noir, ainsi que deux armées de pièces sculptées : rois, cavaliers, tours et pions. C'était le jeu des échecs (alors appelé le *Chaturanga*).

Le roi fut immédiatement fasciné. Pendant des semaines, il apprit à élaborer des stratégies, à protéger son roi et à sacrifier des pions. Guéri de sa tristesse, il convoqua Sissa devant toute la cour : *« Sissa, ton invention est sublime ! Demande-moi la récompense que tu désires, fût-ce la moitié de mes coffres d'or ou le plus beau de mes palais, je te l'accorderai ! »*

Sissa s'inclina avec humilité : *« Grand roi, je ne suis qu'un modeste chercheur. Je ne demande ni or ni pierres précieuses. Posez simplement votre plateau d'échecs devant vous : - Posez **1 grain de riz** sur la première case. - Posez **2 grains de riz** sur la deuxième case. - Posez **4 grains de riz** sur la troisième case. - Et doublez ainsi le nombre de grains sur chaque case suivante jusqu'à la soixante-quatrième case. Donnez-moi simplement ces quelques grains de riz, et je serai comblé. »*

1re case	2e case	3e case	4e case	…	64e case
1 grain	2 grains	4 grains	8 grains	…	2^{63} grains !

Le roi éclata de rire : *« Quelle folle modestie ! Tu aurais pu réclamer un trésor royal, et tu me demandes une poignée de soupe d'oiseau ! Qu'on apporte un sac de riz de mes greniers et qu'on paie cet homme sur-le-champ ! »*

Mais le soir même, le grand trésorier du royaume revint blême et tremblant devant le roi : *« Majesté… nous avons vidé tous les greniers du palais, tous les silos de la capitale, et nous n'avons même pas pu remplir la trentième case ! Pour satisfaire la demande de Sissa, toutes les récoltes de la Terre entière pendant plus de deux mille ans ne suffiraient pas ! »*

Comment le simple fait de doubler une quantité 63 fois de suite peut-il produire une montagne plus vaste que la Terre ? C'est le pouvoir sidérant de **l'exponentielle et des puissances**.

---

2. Les priorités opératoires : qui commande dans un calcul ?

Avant de manipuler des puissances colossales, il nous faut une boussole. Regarde ce calcul d'une simplicité désarmante :

$$2 + 3 \times 5$$

Si tu le donnes à deux personnes différentes dans la rue :

- La première calcule de gauche à droite : $2 + 3 = 5$, puis $5 \times 5 = \mathbf{25}$.
- La deuxième calcule la multiplication d'abord : $3 \times 5 = 15$, puis $2 + 15 = \mathbf{17}$.

Qui a raison ? 25 ou 17 ?

Dans la nature, ce n'est pas une question d'opinion ! Imagine que tu ailles au marché. Tu achètes 1 pomme à 2 euros, et 3 sachets de bonbons à 5 euros l'unité. Combien paies-tu ? Tu paies évidemment $2 + 15 = 17$ euros, et non pas 25 euros ! La multiplication groupe les objets en paquets inséparables.

Pour que tous les ingénieurs, scientifiques et ordinateurs du monde entier s'accordent sur le même résultat, les mathématiciens ont fixé un code de la route universel : **les priorités opératoires**.

2.1 La règle PEMDAS

On retient cette hiérarchie grâce au mot magique **PEMDAS** (ou « Parenthèses d'abord ! ») :



Fig. 59. – L'échelle universelle des priorités opératoires PEMDAS

> **📐 Règle officielle — Priorités de calcul**
>
> 1. On effectue en
>
> priorité les calculs situés **entre les parenthèses**, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. 2. On calcule les **puissances** (exposants). 3. On effectue les **multiplications et les divisions**, de gauche à droite. 4. On effectue enfin les **additions et les soustractions**, de gauche à droite.

2.2 Le rôle du trait de fraction

Un trait de fraction horizontal joue le rôle de parenthèses invisibles pour tout ce qui est au-dessus (numérateur) et tout ce qui est en dessous (dénominateur) :

$$\frac{8 + 12}{2 + 3} = \frac{(8 + 12)}{(2 + 3)} = \frac{20}{5} = 4$$

---

3. La notation puissance : l'art de compresser l'écriture

Reprenons l'échiquier de Sissa.

- Case 1 : 1
- Case 2 : 2

- Case 3 : $2 \times 2 = 4$
- Case 4 : $2 \times 2 \times 2 = 8$
- Case 5 : $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

Pour la 10e case, nous devons écrire dix fois le chiffre 2 multiplié par lui-même. Pour la 64e case, il faudrait écrire une ligne de soixante-trois fois le chiffre 2 ! C'est interminable et illisible.

Au XVIIe siècle, le mathématicien français **René Descartes** a une idée lumineuse : inscrire le nombre de répétitions en tout petit, perché en haut à droite du nombre.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Puissance d'un nombre** Pour tout nombre relatif a et pour tout nombre entier positif $n \geq 1$:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

- a s'appelle la **base**.
- n s'appelle l'**exposant**.
- L'expression a^n se lit **« a puissance n »** ou **« a exposant n »**.

Vocabulaire particulier pour 2 et 3

- a^2 se lit **« a au carré »** (car c'est l'aire d'un carré de côté a).
- a^3 se lit **« a au cube »** (car c'est le volume d'un cube d'arête a).

Cas particuliers vitaux : exposant 1 et exposant 0

- **Exposant 1 :** $a^1 = a$ (un seul facteur).
- **Exposant 0 :** pour tout nombre non nul $a \neq 0$, on pose :

$$a^0 = 1$$

Pourquoi $a^0 = 1$ *?* Regarde la suite en divisant par 2 à chaque marche descendante :

$$2^3 = 8 \xrightarrow{\div 2} 2^2 = 4 \xrightarrow{\div 2} 2^1 = 2 \xrightarrow{\div 2} 2^0 = 1$$

C'est la seule façon logique pour que la règle de division continue de fonctionner !

Combien de grains sur l'échiquier ?

Sur la 64e case, il y a :

$$2^{63} \approx 9,22 \times 10^{18} \text{ grains}$$

Et la somme de toutes les cases réunies vaut :

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \ldots + 2^{63} = 2^{64} - 1 = \mathbf{18\,446\,744\,073\,709\,551\,615} \text{ grains !}$$

Soit plus de **18 milliards de milliards de grains de riz** ! Si l'on étalait cette moisson sur la France entière, le pays disparaîtrait sous une couche de riz de plus d'un mètre de hauteur.

---

4. Les puissances de 10 et les exposants négatifs

Le nombre 10 est le roi de notre système décimal (hérité de nos dix doigts). Les puissances de 10 sont les championnes absolues du calcul scientifique.

4.1 Puissances positives de 10 : l'armée des zéros

📐 Règle — Puissances positives de 10

Pour tout entier positif n :

$$10^n = 1\underbrace{000\ldots0}_{n \text{ zéros}}$$

Le chiffre de l'exposant indique **exactement le nombre de zéros** après le 1 !

- $10^1 = 10$ (dix)
- $10^2 = 100$ (cent)
- $10^3 = 1\,000$ (mille, préfixe *kilo*)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (un million, préfixe *méga*)
- $10^9 = 1\,000\,000\,000$ (un milliard, préfixe *giga*)
- $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ (un billion ou mille milliards, préfixe *téra*)

4.2 Exposants négatifs : plongée dans l'infiniment petit

Continuons à descendre l'escalier en divisant par 10 à chaque marche :

$$10^3 = 1\,000$$
$$10^2 = 100$$
$$10^1 = 10$$
$$10^0 = 1$$
$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$$
$$10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$$
$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1\,000} = 0,001$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Exposant négatif** Pour tout nombre non nul $a \neq 0$ et tout entier n :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

En particulier pour $a = 10$:

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \underbrace{0,00\ldots0}_{n \text{ zéros en tout}}1$$

L'exposant négatif indique **l'inverse** de la puissance. Pour 10^{-n}, il y a $\boldsymbol{n}$ **zéros au total**, en comptant celui qui est placé avant la virgule !

- $10^{-1} = 0,1$ (un dixième, préfixe *déci*)
- $10^{-2} = 0,01$ (un centième, préfixe *centi*)
- $10^{-3} = 0,001$ (un millième, préfixe *milli*)
- $10^{-6} = 0,000\,001$ (un millionième, préfixe *micro*)
- $10^{-9} = 0,000\,000\,001$ (un milliardième, préfixe *nano*)

---

5. Les règles d'or du calcul sur les puissances

Quand on manipule des puissances de même base, le calcul se transforme comme par magie : **une multiplication devient une addition d'exposants !**

📐 Formules fondamentales des puissances

Pour tous entiers relatifs m et n, et nombres a et b non nuls :

1. **Produit de puissances de même base :**
$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$
(Exemple : $10^3 \times 10^4 = 10^{3+4} = 10^7$*)*
2. **Quotient de puissances de même base :**
$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
(Exemple : $\frac{10^7}{10^2} = 10^{7-2} = 10^5$ *;* $\frac{10^3}{10^8} = 10^{3-8} = 10^{-5}$*)*
3. **Puissance d'une puissance :**
$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$
(Exemple : $(10^3)^4 = 10^{3\times 4} = 10^{12}$*)*
4. **Puissance d'un produit :**
$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$
(Exemple : $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000 = 10^3$*)*

---

6. La notation scientifique : écrire l'Univers

Comment comparer la masse d'un atome d'hydrogène ($0,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,67$ kg) et celle de la Terre ($5\,972\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ kg) ? C'est impossible à l'œil nu sans perdre le compte des zéros ! C'est pourquoi les savants ont inventé un format standardisé obligatoire : la **notation scientifique**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Notation scientifique** Un nombre est écrit en **notation scientifique** lorsqu'il est sous la forme :
$$a \times 10^n$$
où :

- a est un nombre décimal ayant **un seul chiffre non nul avant la virgule** (c'est-à-dire $1 \leq a < 10$ ou $-10 < a \leq -1$).
- n est un nombre entier relatif (positif ou négatif).

Méthode de conversion rapide

- Pour un grand nombre : on déplace la virgule vers la **gauche** de n crans $\Longrightarrow 10^{+n}$.
$$149\,600\,000 \text{ km} = 1,496 \times 10^8 \text{ km} \quad \text{(distance Terre-Soleil)}$$
- Pour un petit nombre : on déplace la virgule vers la **droite** de n crans $\Longrightarrow 10^{-n}$.
$$0,000\,000\,12 \text{ m} = 1,2 \times 10^{-7} \text{ m} \quad \text{(taille d'un virus)}$$

Noyau	Atome	Humain	Terre	Système Solaire	Galaxie
10^{-15} m	10^{-10} m	1 m (10^0 m)	10^6 m	10^{11} m	10^{21} m

---

7. Attention aux pièges !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les bévues monumentales

1. **La fausse addition d'exposants :**

$$10^2 + 10^3 \neq 10^5 \quad !$$

Les

puissances ne s'ajoutent JAMAIS entre elles directement ! $10^2 + 10^3 = 100 + 1\,000 = 1\,100$, alors que $10^5 = 100\,000$. 2. **Le piège du signe moins et des parenthèses :**

$$-3^2 = -(3 \times 3) = \mathbf{-9}$$

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \mathbf{+9}$$

Sans parenthèses, la puissance ne porte QUE sur le 3, pas sur le signe moins ! 3. **Le format scientifique invalide :**

- 35×10^4 n'est **pas** en notation scientifique car $35 \geq 10$ (il faut écrire $3,5 \times 10^5$).
- $0,7 \times 10^{-3}$ n'est **pas** en notation scientifique car $0,7 < 1$ (il faut écrire 7×10^{-4}).

4. **Multiplier les bases au lieu d'additionner les exposants :**

$$2^3 \times 2^4 \neq 4^7 \quad \text{mais} \quad 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

---

8. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Calcul avec priorités opératoires

Calculer la valeur exacte de l'expression suivante en détaillant les étapes :

$$A = 5 + 3 \times (4^2 - 6) - \frac{24}{2^3}$$

Solution : Appliquons la règle PEMDAS rigoureusement : 1. Calcul à l'intérieur des parenthèses :

- Puissance d'abord : $4^2 = 16$.
- Soustraction : $16 - 6 = 10$. L'expression devient : $A = 5 + 3 \times 10 - \frac{24}{2^3}$.

2. Puissance restante au dénominateur :
   - $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. L'expression devient : $A = 5 + 3 \times 10 - \frac{24}{8}$.
3. Multiplications et divisions :
   - $3 \times 10 = 30$.
   - $\frac{24}{8} = 3$. L'expression devient : $A = 5 + 30 - 3$.
4. Additions et soustractions de gauche à droite :
   - $5 + 30 = 35$, puis $35 - 3 = 32$.

Conclusion : $A = 32$. ✓

Exemple résolu 2 — Réduire une expression avec les puissances de 10

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 10 :

$$B = \frac{10^5 \times (10^{-2})^3}{10^{-4}}$$

Solution : 1. On traite d'abord la puissance de puissance au numérateur :

$$(10^{-2})^3 = 10^{-2 \times 3} = 10^{-6}$$

2. On effectue le produit au numérateur (addition des exposants) :

$$10^5 \times 10^{-6} = 10^{5+(-6)} = 10^{-1}$$

3. On effectue la division (soustraction de l'exposant du dénominateur) :

$$B = \frac{10^{-1}}{10^{-4}} = 10^{-1-(-4)} = 10^{-1+4} = 10^{3}$$

Conclusion : $B = 10^3$ (soit 1 000). ✓

Exemple résolu 3 — Conversion en notation scientifique

Donner la notation scientifique des nombres suivants : 1. $C = 548\,000\,000$ (population d'un continent) 2. $D = 0,000\,037$ (diamètre d'une fibre en mètre) 3. $E = 485 \times 10^6$ 4. $F = 0,029 \times 10^{-4}$

Solution : 1. Pour $548\,000\,000$, on place la virgule après le premier chiffre 5. On a décalé de 8 rangs vers la gauche :

$$C = 5,48 \times 10^{8}$$

2. Pour $0,000\,037$, on place la virgule après le 3. On a décalé de 5 rangs vers la droite :

$$D = 3,7 \times 10^{-5}$$

3. $E = 485 \times 10^6 = (4,85 \times 10^2) \times 10^6 = 4,85 \times 10^{2+6} = 4,85 \times 10^8$. 4. $F = 0,029 \times 10^{-4} = (2,9 \times 10^{-2}) \times 10^{-4} = 2,9 \times 10^{-2+(-4)} = 2,9 \times 10^{-6}$. ✓

Exemple résolu 4 — Calcul astronomique en notation scientifique

La lumière voyage dans le vide à une vitesse constante d'environ $v = 3 \times 10^8 \ \text{m/s}$. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est de $d = 1,5 \times 10^{11} \ \text{mètres}$. Combien de temps (en secondes, puis en minutes et secondes) met un photon émis par le Soleil pour parvenir sur Terre ?

Solution : On utilise la formule $t = \frac{d}{v}$:

$$t = \frac{1,5 \times 10^{11}}{3 \times 10^{8}}$$

Séparons les nombres décimaux et les puissances de 10 :

$$t = \left(\frac{1,5}{3}\right) \times \left(\frac{10^{11}}{10^{8}}\right) = 0,5 \times 10^{11-8} = 0,5 \times 10^{3} \ \text{secondes}$$

Calculons la valeur décimale :

$$t = 0,5 \times 1\,000 = 500 \ \text{secondes}$$

Convertissons en minutes ($1 \ \text{min} = 60 \ \text{s}$) : $500 = 8 \times 60 + 20$. Le rayon de soleil met **8 minutes et 20 secondes** pour atteindre nos yeux ! ✓

Exemple résolu 5 — L'épaisseur de la feuille pliée en deux

Une feuille de papier standard a une épaisseur de $e = 0,1 \ \text{mm} = 10^{-4} \ \text{m}$. Chaque fois qu'on la plie en deux, son épaisseur double. 1. Quelle sera l'épaisseur théorique de la feuille si l'on pouvait la plier 10 fois de suite ? 2. Et si l'on pouvait la plier 42 fois de suite ?

Solution : 1. Après 10 pliages, l'épaisseur est multipliée par 2^{10}. Or $2^{10} = 1\,024 \approx 10^3$.

$$\text{Épaisseur} = 0,1 \ \text{mm} \times 1\,024 = 102,4 \ \text{mm} \approx 10,24 \ \text{cm}$$

La feuille dépasse déjà l'épaisseur d'un gros livre ! 2. Après 42 pliages, l'épaisseur est :

$$E = 0,1 \ \text{mm} \times 2^{42}$$

Calculons 2^{42} : $2^{42} = (2^{10})^4 \times 2^2 \approx (1\,000)^4 \times 4 = 4 \times 10^{12}$.

$$E \approx 10^{-4} \ \text{m} \times (4,398 \times 10^{12}) \approx 4,4 \times 10^{8} \ \text{mètres} = 440\,000 \ \text{kilomètres !}$$

La distance moyenne de la Terre à la Lune est de $384\,400 \ \text{km}$. Une simple feuille de papier pliée 42 fois dépasse la Lune ! C'est l'illustration la plus spectaculaire de l'explosion des puissances. ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Priorités opératoires (PEMDAS) :** Parenthèses → Exposants → Multiplications & Divisions (gauche à droite) → Additions & Soustractions (gauche à droite).
2. **Définition des puissances :** $a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ fois}}$; $a^1 = a$; $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

3. **Exposants négatifs :** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; en particulier $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,0\ldots01$ (n zéros en tout).
4. **Règles de calcul sur les puissances :**
   - $a^m \times a^n = a^{m+n}$
   - $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
   - $(a^m)^n = a^{m\times n}$
   - $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
5. **Notation scientifique :** Format unique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 18.1 Calcule la valeur numérique des expressions suivantes : 1. $A = 7 + 3 \times 4$ 2. $B = (7 + 3) \times 4$ 3. $C = 20 - 4 \times 2 + 1$ 4. $D = 30/5 \times 2$

Exercice 18.2 Calcule sans calculatrice : 2^4 ; 3^3 ; 5^2 ; 10^5 ; 7^0 ; $(-2)^3$; $(-2)^4$; -5^2.

Exercice 18.3 Écris sous forme décimale : 10^3 ; 10^{-2} ; 10^{-5} ; $4,2 \times 10^3$; 7×10^{-4}.

Exercice 18.4 Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 : 1. $10^4 \times 10^7$ 2. $\frac{10^9}{10^3}$ 3. $(10^5)^2$ 4. $10^{-3} \times 10^{-5}$ 5. $\frac{10^2}{10^{-4}}$

Exercice 18.5 Parmi les écritures suivantes, lesquelles sont en notation scientifique ? Justifie. a) $3,45 \times 10^7$; b) $0,4 \times 10^{-3}$; c) 12×10^5 ; d) $9,99 \times 10^{-1}$; e) 1×10^0.

Niveau (Calculs et règles)

Exercice 18.6 Calcule en respectant strictement les priorités : 1. $G = 3 \times 2^3 - 4 \times (5 - 2^2)$ 2. $H = \frac{5^2 - 3^2}{2^4 - 2\times 4}$

Exercice 18.7 Écris sous la forme a^n (où a est un entier et n un entier relatif) : 1. $2^5 \times 2^3 \times 2^{-4}$ 2. $\frac{3^8}{(3^2)^3}$ 3. $\frac{7^3 \times 7^{-5}}{7^{-4}}$ 4. 8×2^5 *(Indication : écris 8 comme une puissance de 2).*

Exercice 18.8 Mets chacun des nombres suivants en notation scientifique : 1. Diamètre du globule rouge : $0,000\,007$ m. 2. Vitesse de la lumière : $300\,000\,000$ m/s. 3. Population mondiale : $8\,100\,000\,000$ habitants. 4. Masse d'une goutte d'eau : $0,000\,05$ kg.

Exercice 18.9 Effectue les calculs suivants et donne le résultat final en notation scientifique : 1. $K = (3 \times 10^4) \times (5 \times 10^7)$ 2. $L = \frac{8\times 10^{-3}}{4\times 10^5}$ 3. $M = \frac{1,2\times 10^5 \times 7\times 10^{-2}}{2,4\times 10^{-6}}$

Exercice 18.10 Les bactéries attaquent ! Une population de bactéries est placée dans une boîte de Pétri chauffée. À midi ($t = 0$), il y a 1 000 bactéries (10^3). Cette souche double toutes les 20 minutes. 1. Combien y a-t-il de bactéries à 13 h 00 ? 2. Combien y a-t-il de bactéries à 16 h 00 ? Donne la réponse en notation scientifique.

Exercice 18.11 Comparer sans calculer. Range les nombres suivants par ordre croissant sans poser de calculs posés géants :

$$A = 4,5 \times 10^6 \quad ; \quad B = 8,2 \times 10^5 \quad ; \quad C = 1,1 \times 10^7 \quad ; \quad D = 9,9 \times 10^5$$

Niveau (Défis et grands nombres)

Exercice 18.12 Le Googol et le Googolplex. En 1920, le mathématicien américain Edward Kasner demanda à son neveu Milton Sirotta, âgé de 9 ans, d'inventer un nom pour un nombre colossal : le chiffre 1 suivi de 100 zéros. L'enfant répondit : « Un GOGOL ! » (qui inspirera plus tard le nom du moteur de recherche *Google*). 1. Écris un gogol sous la forme d'une puissance de 10. 2. Le nombre total d'atomes dans tout l'Univers observable est estimé à environ 10^{80}. Un gogol est-il plus grand ou plus petit que le nombre d'atomes de l'Univers ? Combien de fois plus grand ? 3. Kasner définit ensuite le *Googolplex* : c'est le nombre 1 suivi d'un gogol de zéros ! Écris le Googolplex avec des puissances de 10. Pourquoi est-il physiquement impossible d'écrire ce nombre sur du papier dans notre univers ?

Exercice 18.13 Le voyage interstellaire de la sonde Voyager 1. La sonde spatiale *Voyager 1* file à travers l'espace interstellaire à la vitesse vertigineuse de 17 km/s, soit environ $6,12 \times 10^4$ km/h. Elle se dirige vers l'étoile Proxima du Centaure, située à environ $4,24$ années-lumière de la Terre. Une année-lumière vaut environ $9,46 \times 10^{12}$ km. 1. Calcule la distance en kilomètres séparant la Terre de Proxima du Centaure en notation scientifique. 2. Combien d'heures, puis combien d'années faudra-t-il à la sonde pour parcourir cette distance ?

Exercice 18.14 Simplification d'expression littérale avec puissances. Pour tous nombres réels non nuls x et y, simplifie au maximum l'expression suivante :

$$Z = \frac{(x^2 y^{-3})^4 \times (x^{-1} y)^2}{x^5 y^{-8}}$$

Exercice 18.15 Le piège de la somme des inverses de puissances. Calcule la valeur exacte de la somme :

$$S = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6}$$

Que remarques-tu par rapport au nombre 1 ? Que vaudrait cette somme si l'on continuait à l'infini ?

Solutions

Solution 18.1 1. $A = 7 + 12 = 19$. 2. $B = 10 \times 4 = 40$. 3. $C = 20 - 8 + 1 = 12 + 1 = 13$. 4. $D = (30/5) \times 2 = 6 \times 2 = 12$ (de gauche à droite).

Solution 18.2 - $2^4 = 16$; $3^3 = 27$; $5^2 = 25$; $10^5 = 100\,000$; $7^0 = 1$. - $(-2)^3 = -8$; $(-2)^4 = +16$; $-5^2 = -(5 \times 5) = -25$.

Solution 18.3 $10^3 = 1\,000$; $10^{-2} = 0,01$; $10^{-5} = 0,000\,01$; $4,2 \times 10^3 = 4\,200$; $7 \times 10^{-4} = 0,000\,7$.

Solution 18.4 1. $10^4 \times 10^7 = 10^{4+7} = 10^{11}$. 2. $\frac{10^9}{10^3} = 10^{9-3} = 10^6$. 3. $(10^5)^2 = 10^{5\times 2} = 10^{10}$. 4. $10^{-3} \times 10^{-5} = 10^{-3+(-5)} = 10^{-8}$. 5. $\frac{10^2}{10^{-4}} = 10^{2-(-4)} = 10^{2+4} = 10^6$.

Solution 18.5 - a) Oui ($1 \leq 3,45 < 10$). - b) Non ($0,4 < 1$). - c) Non ($12 \geq 10$). - d) Oui ($1 \leq 9,99 < 10$). - e) Oui ($1 \leq 1 < 10$).

Solution 18.6 1. $G = 3 \times 8 - 4 \times (5 - 4) = 24 - 4 \times 1 = 24 - 4 = 20$. 2. $H = \frac{25-9}{16-8} = \frac{16}{8} = 2$.

Solution 18.7 1. $2^{5+3-4} = 2^4$. 2. $\frac{3^8}{3^6} = 3^{8-6} = 3^2$. 3. $\frac{7^{-2}}{7^{-4}} = 7^{-2-(-4)} = 7^2$. 4. $8 = 2^3$, donc $8 \times 2^5 = 2^3 \times 2^5 = 2^8$.

Solution 18.8 1. 7×10^{-6} m. 2. 3×10^8 m/s. 3. $8,1 \times 10^9$ habitants. 4. 5×10^{-5} kg.

Solution 18.9 1. $K = (3 \times 5) \times (10^4 \times 10^7) = 15 \times 10^{11} = 1,5 \times 10^{12}$. 2. $L = \left(\frac{8}{4}\right) \times 10^{-3-5} = 2 \times 10^{-8}$. 3. $M = \left(\frac{1,2\times 7}{2,4}\right) \times \frac{10^3}{10^{-6}} = \left(\frac{8,4}{2,4}\right) \times 10^{3-(-6)} = 3,5 \times 10^9$.

Solution 18.10 1. En 1 heure, il y a 3 périodes de 20 minutes. La population double 3 fois : $N_1 = 1\,000 \times 2^3 = 1\,000 \times 8 = 8\,000$ bactéries. 2. À 16 h 00, 4 heures se sont écoulées, soit $4 \times 3 = 12$ périodes de 20 min. $N_2 = 10^3 \times 2^{12} = 10^3 \times 4\,096 = 4\,096\,000 = 4,096 \times 10^6$ bactéries.

Solution 18.11 On classe d'abord par puissance de 10 :

- Exposant 5 : $B = 8,2 \times 10^5$ et $D = 9,9 \times 10^5$. Comme $8,2 < 9,9$, $B < D$.
- Exposant 6 : $A = 4,5 \times 10^6$.
- Exposant 7 : $C = 1,1 \times 10^7$.

Ordre croissant : $B < D < A < C$.

Solution 18.12 1. Un gogol s'écrit 10^{100}. 2. 10^{100} est immensément plus grand que 10^{80} : $\frac{10^{100}}{10^{80}} = 10^{100-80} = 10^{20}$. Un gogol est **cent milliards de milliards de fois plus grand** que le nombre total d'atomes de l'Univers observable ! 3. Un Googolplex s'écrit $10^{\text{gogol}} = 10^{10^{100}}$. Pour l'écrire sous forme décimale (1000...), il faudrait écrire 10^{100} zéros. Même si l'on gravait un zéro sur chaque atome de l'univers (10^{80} atomes), on manquerait d'atomes bien avant d'avoir écrit le milliardième du nombre !

Solution 18.13 1. $D = 4,24 \times (9,46 \times 10^{12}) \approx 40,11 \times 10^{12} = 4,011 \times 10^{13}$ km. 2. Temps en heures : $t = \frac{4,011\times 10^{13}}{6,12\times 10^4} \approx 0,6554 \times 10^9 = 6,554 \times 10^8$ heures. En années (1 an $\approx 365,25 \times 24 = 8\,766$ h) : $T = \frac{6,554\times 10^8}{8\,766} \approx 74\,766$ années ! Il faudra près de 75 000 ans à la sonde pour croiser notre étoile voisine.

Solution 18.14 Développons le numérateur : $(x^2 y^{-3})^4 = x^8 y^{-12}$. $(x^{-1} y)^2 = x^{-2} y^2$. Numérateur $= x^{8-2} y^{-12+2} = x^6 y^{-10}$. Divisons par le dénominateur : $Z = \frac{x^6 y^{-10}}{x^5 y^{-8}} = x^{6-5} y^{-10-(-8)} = x^1 y^{-2} = \frac{x}{y^2}$.

Solution 18.15 $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64}$. Même dénominateur (64) : $S = \frac{32+16+8+4+2+1}{64} = \frac{63}{64} = 0,984375$. La somme s'approche infiniment près de 1, sans jamais le dépasser (il manque toujours $\frac{1}{2^n}$). Si l'on additionnait une infinité de termes, la somme vaudrait rigoureusement 1 !

La question qui ouvre la suite

Nous savons désormais que a^2 est le carré d'un nombre : $3^2 = 9$, $4^2 = 16$. Mais que se passe-t-il si l'on cherche l'opération inverse ? Quel nombre, multiplié par lui-même, donne 2 ?

Ce nombre innocent a brisé la secte la plus puissante de l'Antiquité grecque, provoqué des condamnations à mort en mer et révélé l'existence d'une race de nombres monstrueux que les fractions ne savent pas capturer : **les nombres irrationnels**. Pénétrons dans l'école mystique de Crotone avec **le Théorème de Pythagore** !

CHAPITRE 19 : Le Secret Interdit des Pythagoriciens

> « Les disciples de Pythagore chantaient que l'univers entier n'était qu'harmonie de nombres entiers et de douces fractions. Mais au cœur du plus humble carré sommeillait un monstre invisible, un nombre sans fin qui allait briser leur rêve. »

Ce que tu vas découvrir

- La fraternité secrète de **Pythagore** à Crotone et leur croyance mystique : « *Tout est nombre* ».
- L'anatomie du triangle rectangle et le mot étrange d'**hypoténuse**.
- Le **théorème de Pythagore** ($a^2 + b^2 = c^2$) et ses trois preuves visuelles historiques (le puzzle du garçon de café, le carré découpé et le « Vois ! » de Bhāskara).
- Ce qu'est la **racine carrée** ($\sqrt{a}$) : la machine à remonter du carré vers son côté.
- La **réciproque de Pythagore** pour fabriquer des angles droits parfaits.
- La grande crise des mathématiques antiques : la découverte que la diagonale du carré ($\sqrt{2}$) est un **nombre irrationnel**, et la célèbre démonstration par l'absurde.

---

1. Le problème : la fraternité blanche de Crotone

Il y a deux mille cinq cents ans, dans le sud ensoleillé de l'Italie, dans la cité maritime de Crotone, vivait une communauté fermée qui fascinait et effrayait le monde antique : **l'école pythagoricienne**.

Ses membres étaient vêtus de longues robes blanches en lin. Ils ne mangeaient pas de viande, ne possédaient aucun bien privé et s'imposaient de longues années d'un silence absolu pour apprendre à maîtriser leurs pensées. Ils se reconnaissaient entre eux par un symbole secret tracé dans la main : le pentagramme étoilé.

Au fronton de leur école était gravée leur devise suprême :

« TOUT EST NOMBRE »

Pour le maître **Pythagore** et ses disciples, cette phrase n'était pas un simple jeu de mots. Ils étaient intimement persuadés que **le cosmos tout entier — la course des planètes, les saisons, la justice et la musique d'une lyre — reposait sur les nombres entiers ($1, 2, 3, 4$...) et leurs rapports de fractions ($\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$...).**

Quand tu pinces une corde de guitare en son milieu exact ($\frac{1}{2}$), elle produit la même note à l'octave supérieure. Quand tu la pinces aux deux tiers de sa longueur ($\frac{2}{3}$), elle chante une quinte pure. Tout était harmonie, ordre, lumière : chaque longueur dans le monde physique pouvait être mesurée par une fraction de nombres entiers !

Jusqu'au jour où un jeune disciple nommé **Hippase de Métaponte** prit un stylet de bois et traça une figure toute bête dans la poussière. Il ne dessina pas une figure extravagante. Il dessina le carré le plus humble du monde : **un carré dont chaque côté mesure exactement 1 mètre.**

Puis, il relia deux coins opposés : il traça **la diagonale**.



Fig. 60. – Le carré unité et la diagonale incommensurable racine de 2

Hippase voulut calculer la longueur exacte d de cette diagonale. Il utilisa le grand théorème de son maître. Et ce qu'il découvrit était si terrifiant que la fraternité lui ordonna de garder le silence sous peine de mort…

---

2. Le Triangle rectangle et son trésor : l'Hypoténuse

Avant de revivre le drame d'Hippase, explorons la figure reine de la géométrie : le **triangle rectangle**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Triangle rectangle et Hypoténuse**

- Un **triangle rectangle** est un triangle qui possède un **angle droit** (90°).
- Le côté situé directement en face de l'angle droit est appelé l'**hypoténuse**.
- L'hypoténuse est **toujours le plus long** des trois côtés du triangle rectangle.
- Les deux autres côtés qui forment l'angle droit sont appelés les **côtés de l'angle droit**.

💡 D'où vient ce mot bizarre ?

Le mot *hypoténuse* vient du grec ancien *hupoteinousa*, formé de *hupo* (« dessous ») et *teinein* (« tendre »). L'hypoténuse est littéralement la corde « tendue en dessous » de l'angle droit, exactement comme la corde tendue d'un arc ou la drisse d'un voilier.

---

3. Le Théorème de Pythagore : le ballet des trois carrés

Le théorème ne parle pas au départ de formules compliquées, mais d'**aires de carrés** collés aux flancs du triangle.

📐 Théorème de Pythagore (Énoncé géométrique)

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des deux carrés construits sur les deux côtés de l'angle droit.



Fig. 61. – Démonstration géométrique du Théorème de Pythagore

Si l'on appelle a et b les longueurs des deux côtés de l'angle droit, et c la longueur de l'hypoténuse :

- L'aire du premier petit carré est a^2 ($a \times a$).
- L'aire du second carré est b^2 ($b \times b$).
- L'aire du grand carré sur l'hypoténuse est c^2 ($c \times c$).

L'égalité fondamentale s'écrit donc :

$$\mathbf{a^2 + b^2 = c^2}$$

Si le triangle s'appelle ABC et qu'il est rectangle en A, l'hypoténuse est $[BC]$, et la formule s'écrit avec les sommets :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Les trois preuves visuelles historiques

Pourquoi cette égalité est-elle vraie pour absolument **tous** les triangles rectangles de l'univers ? Voici trois démonstrations que l'on peut comprendre sans une seule équation, simplement avec ses yeux.

Preuve 1 : Le puzzle du carrelage (le garçon de café)

C'est la preuve la plus simple du monde, pour un triangle rectangle isocèle (un demi-carré) :

Chaque petit carré sur un côté contient 2 triangles rectangles. Ensemble, ils contiennent $2 + 2 = 4$ triangles. Or, le grand carré penché incliné sur l'hypoténuse contient lui aussi très exactement **4 triangles identiques** ! L'aire est donc rigoureusement égale.

Preuve 2 : Le grand carré aux deux dispositions

Dessinons un grand carré de côté $(a + b)$. Nous pouvons le remplir avec 4 triangles rectangles identiques de côtés a, b, c de deux manières différentes :

Dans les deux grands carrés identiques de départ :

- À gauche, nous enlevons les 4 triangles : il reste l'espace vide $a^2 + b^2$.
- À droite, nous enlevons les mêmes 4 triangles : il reste l'espace vide c^2.

Puisque nous avons retiré la même surface des deux côtés, ce qui reste est obligatoirement égal :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Preuve 3 : Le « Vois ! » de Bhāskara

Au XIIe siècle en Inde, le mathématicien Bhāskara dessinait 4 triangles rectangles de côtés a, b, c formant un carré extérieur de côté c, laissant au centre un petit trou carré de côté $(b - a)$:

$$\text{Aire totale} = c^2 = 4 \times \left(\frac{a \times b}{2}\right) + (b - a)^2 = 2ab + (b^2 - 2ab + a^2) = a^2 + b^2$$

Sous son dessin, Bhāskara n'écrivit aucun commentaire, juste un mot : *« Vois ! »*.

Preuve 4 : La preuve visuelle en couleurs d'Oliver Byrne (1847)

En 1847, l'ingénieur et mathématicien Oliver Byrne publiait à Londres une édition révolutionnaire des *Éléments d'Euclide*, où chaque lettre alphabétique était bannie au profit de couleurs primaires vives : le bleu, le rouge et le jaune. Les carrés construits sur les côtés s'y décomposent en triangles colorés de même aire, rendant l'égalité $a^2 + b^2 = c^2$

évidente d’un simple coup d’œil. C’est ce chef-d’œuvre de la sémiotique visuelle qui a inspiré toute la charte graphique du présent ouvrage.



Fig. 62. – Démonstration géométrique du Théorème de Pythagore par Oliver Byrne (1847) : les grandeurs et les aires prouvées par la couleur pure

4. La Racine carrée : remonter du carré vers le côté

Pour utiliser le théorème de Pythagore afin de trouver une longueur inconnue, nous connaissons souvent c^2 (l'aire du carré), et nous voulons retrouver c (la longueur du côté). C'est ici qu'intervient un nouveau symbole : **le radical de la racine carrée**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Racine carrée** Pour tout nombre positif ou nul $x \geq 0$, la **racine carrée** de x, notée $\sqrt{x}$, est l'unique nombre **positif** dont le carré est égal à x.

$$(\sqrt{x})^2 = x$$

- Le symbole $\sqrt{\ }$ s'appelle le **radical**. C'est une déformation de la lettre *r*, initiale du mot latin *radix* (racine).
- $\sqrt{x}$ se lit **« racine carrée de x »** ou **« racine de x »**.

Les carrés parfaits à connaître par cœur :

x	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169
$\sqrt{x}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. La Réciproque et la Contraposée de Pythagore

Comme pour Thalès, le théorème marche dans les deux sens : 1. **Sens direct :** Triangle rectangle $\Longrightarrow a^2 + b^2 = c^2$ (sert à **calculer une longueur inconnue**). 2. **Réciproque :** Si dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres ($c^2 = a^2 + b^2$), alors **le triangle est rectangle** (l'angle droit étant opposé au plus grand côté). 3. **Contraposée :** Si $c^2 \neq a^2 + b^2$, alors **le triangle n'est pas rectangle**.

C'est la réciproque qui explique le secret des arpenteurs égyptiens et de leur corde à treize nœuds (vue au Chapitre 15) : Avec les longueurs 3, 4 et 5 :

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \quad \text{et} \quad 5^2 = 25$$

Puisque $3^2 + 4^2 = 5^2$, le triangle est **garanti rectangle** ! Le triplet $(3, 4, 5)$ s'appelle un **triplet pythagoricien**. Il en existe d'autres célèbres : $(5, 12, 13)$, $(8, 15, 17)$, $(7, 24, 25)$.

6. La Crise pythagoricienne : le scandale de $\sqrt{2}$

Revenons maintenant à Hippase de Métaponte et à son carré de côté 1 mètre. Appliquons le théorème de Pythagore dans le demi-carré :

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$$

La diagonale d a donc une longueur de :

$$d = \sqrt{2} \approx 1,41421356...$$

Hippase chercha quelle était la fraction de nombres entiers $\frac{p}{q}$ capable de donner exactement $\sqrt{2}$. Il essaya $\frac{7}{5} = 1,4$; $\left(\frac{7}{5}\right)^2 = \frac{49}{25} = 1,96$ (trop petit !). Il essaya $\frac{10}{7} \approx 1,428$; $\left(\frac{10}{7}\right)^2 = \frac{100}{49} = 2,04$ (trop grand !). Il essaya $\frac{1414}{1000}$, $\frac{17}{12}$, $\frac{577}{408}$… chaque fraction tombait à côté d'un cheveu !

Puis Hippase eut un éclair de génie tragique : il démontra que **cette fraction n'existait pas et ne pourrait JAMAIS exister**.

La Démonstration historique par l'absurde (preuve par parité)

C'est l'un des sommets absolus de la pensée humaine. Suivons le raisonnement pas à pas :

✍️ Démonstration — Irrationalité de $\sqrt{2}$

1. **L'hypothèse absurde :** Supposons le contraire de ce que l'on veut prouver : imaginons qu'il existe une fraction d'entiers $\frac{p}{q}$ égale à $\sqrt{2}$. On choisit cette fraction **irréductible** (simplifiée au maximum : p et q ne peuvent pas être tous les deux pairs, sinon on aurait déjà divisé par 2).
2. **Élevons au carré :**
$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Longrightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2} \Longrightarrow p^2 = 2 \times q^2$$
3. **Le nombre p est pair :** Puisque $p^2 = 2 \times q^2$, p^2 est un multiple de 2 : p^2 est donc **pair**. Or, le carré d'un nombre impair est toujours impair ($3^2 = 9, 5^2 = 25$). Si le carré est pair, le nombre lui-même est obligatoirement **pair** ! On peut donc écrire $p = 2 \times k$ (où k est un entier).
4. **Le nombre q devient pair à son tour :** Remplaçons p par $2k$ dans notre égalité :
$$(2k)^2 = 2q^2 \Longrightarrow 4k^2 = 2q^2$$
Divisons les deux membres par 2 :
$$2k^2 = q^2 \quad \text{ou} \quad q^2 = 2k^2$$
Mais alors, q^2 est à son tour un multiple de 2 : q^2 est pair, donc q est **obligatoirement pair** !
5. **La contradiction éclatante :** Arrêtons-nous : nous venons de prouver que p est pair ET que q est pair ! Ils sont donc tous les deux divisibles par 2. Mais c'est impossible ! Nous avions posé au départ que notre fraction était **irréductible** !
6. **Conclusion :** Le point de départ est faux : **$\sqrt{2}$ ne peut pas s'écrire sous forme de fraction $\frac{p}{q}$.**

Ce résultat fit l'effet d'une bombe. Les pythagoriciens appelaient ces nombres *aloga*, ce qui signifie « les indicibles » ou « ceux dont on ne doit pas parler ». Aujourd'hui, nous les appelons les **nombres irrationnels** (du latin *ratio*, la proportion, le rapport).

- Un nombre **rationnel** ($\mathbb{Q}$) peut s'écrire sous forme de fraction de deux entiers ($\frac{3}{4}, -\frac{5}{2}, \frac{1}{3} = 0,333...$). Ses décimales finissent toujours par se répéter en boucle.
- Un nombre **irrationnel** ($\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi...$) ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Ses décimales après la virgule se déroulent à l'infini sans jamais présenter de motif répétitif !

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — La noyade d'Hippase** Selon la légende rapportée par le philosophe Jamblique, les disciples de Pythagore furent si terrifiés par la ruine de leur dogme qu'ils jetèrent Hippase par-dessus bord lors d'une traversée en mer, pour que les flots engloutissent à jamais l'homme qui avait osé révéler l'existence de $\sqrt{2}$. Mais la vérité ne se noie pas : la géométrie venait d'entrer dans une nouvelle ère.

7. Attention aux pièges !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ Attention, piège ! — Les erreurs qui coûtent cher

1.

La fausse racine d'une somme :

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad !$$

Vérifie avec $a = 9$ et $b = 16$:

- $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$.
- $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = \mathbf{7}$. $5 \neq 7$! On doit TOUJOURS calculer la somme sous le radical avant d'extraire la racine.

2. **Oublier de vérifier quel est le plus grand côté dans la réciproque :** Dans un triangle MNP, pour tester s'il est rectangle, calcule le carré du plus grand côté d'un côté, et la somme des deux autres de l'autre côté. Ne les écris pas égaux avant de l'avoir prouvé !
3. **Racine d'un nombre négatif :** $\sqrt{-9}$ n'a **aucun sens** parmi les nombres réels ! Aucun nombre multiplié par lui-même ne donne un résultat négatif ($(+) \times (+) = +$ et $(-) \times (-) = +$).
4. **Ne pas confondre côté et hypoténuse :** Pour trouver l'hypoténuse : on **additionne** les carrés ($c = \sqrt{a^2 + b^2}$). Pour trouver un côté de l'angle droit : on **soustrait** ($a = \sqrt{c^2 - b^2}$).

---

8. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Calculer l'hypoténuse

Soit un triangle ABC rectangle en A, tel que $AB = 6 \ \text{cm}$ et $AC = 8 \ \text{cm}$. Calculer la longueur de l'hypoténuse $[BC]$.

Solution : - Le triangle ABC est rectangle en A. - D'après le **théorème de Pythagore** :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

- Remplaçons par les valeurs numériques :

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

- Puisque BC est une longueur, $BC > 0$:

$$BC = \sqrt{100} = 10 \ \text{cm}$$

L'hypoténuse mesure exactement $10 \ \text{cm}$. ✓

Exemple résolu 2 — Calculer un côté de l'angle droit (L'échelle du pompier)

Une échelle de pompier mesurant $5 \ \text{mètres}$ est appuyée contre un mur vertical. Le pied de l'échelle est posé au sol à $1,40 \ \text{m}$ du mur. À quelle hauteur sur le mur l'échelle s'appuie-t-elle ?

Solution : - Le mur et le sol forment un angle droit. Nommons ABC ce triangle rectangle, où l'échelle est l'hypoténuse $BC = 5 \ \text{m}$, la distance au mur $AB = 1,40 \ \text{m}$, et la hauteur cherchée $AC = h$. - D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Longrightarrow 5^2 = 1,4^2 + h^2$$

- Isolons h^2 :

$$h^2 = 5^2 - 1,4^2 = 25 - 1,96 = 23,04$$

- Extrayons la racine carrée :

$$h = \sqrt{23,04} = 4,8 \ \text{mètres}$$

L'échelle atteint une hauteur de $4,80 \ \text{mètres}$ sur le mur. ✓

Exemple résolu 3 — Prouver qu'un triangle est rectangle

Un maçon plante trois piquets sur un terrain aux distances suivantes : $MN = 13\ \text{m}$, $NP = 12\ \text{m}$ et $MP = 5\ \text{m}$. Le mur d'angle qu'il s'apprête à construire sera-t-il parfaitement d'équerre ?

Solution : - Le côté le plus long est $[MN]$ avec $MN = 13\ \text{m}$. - Calculons séparément :

$$MN^2 = 13^2 = 169$$

$$MP^2 + NP^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

- On constate que :

$$MN^2 = MP^2 + NP^2$$

- Conclusion : D'après la **réciproque du théorème de Pythagore**, le triangle MNP est un triangle rectangle en P. Le maçon aura donc un angle droit parfait de $90°$ en P. ✓

Exemple résolu 4 — Prouver qu'un triangle N'EST PAS rectangle

Un triangle DEF a pour côtés : $DE = 7\ \text{cm}$, $EF = 9\ \text{cm}$ et $DF = 11\ \text{cm}$. Est-il rectangle ?

Solution : - Le plus grand côté est $[DF]$ ($11\ \text{cm}$). - Calculons séparément :

$$DF^2 = 11^2 = 121$$

$$DE^2 + EF^2 = 7^2 + 9^2 = 49 + 81 = 130$$

- On constate que :

$$DF^2 \neq DE^2 + EF^2 \quad (121 \neq 130)$$

- Conclusion : D'après la **contraposée du théorème de Pythagore**, le triangle DEF n'est pas rectangle. ✓

Exemple résolu 5 — La diagonale d'un écran de smartphone

Un fabricant indique qu'un écran de smartphone a une largeur de $7\ \text{cm}$ et une hauteur de $15\ \text{cm}$. Quelle est la longueur de sa diagonale ? Arrondir au millimètre près.

Solution : - L'écran est un rectangle : la diagonale forme avec la largeur et la hauteur un triangle rectangle. - D'après Pythagore :

$$d^2 = 7^2 + 15^2 = 49 + 225 = 274$$

- Donc :

$$d = \sqrt{274} \approx 16,5529...\ \text{cm} \approx 16,6\ \text{cm}$$

La diagonale mesure environ $16,6\ \text{cm}$ (soit environ 6,5 pouces). ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Triangle rectangle & Hypoténuse :**
   - L'hypoténuse est le côté en face de l'angle droit, et c'est toujours le plus long côté.
2. **Théorème de Pythagore (Calcul de longueurs) :**
   - Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

   - Pour trouver l'hypoténuse : $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$.
   - Pour trouver un côté de l'angle droit : $AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$.
3. **Réciproque & Contraposée (Test de l'angle droit) :**
   - Si $c^2 = a^2 + b^2$ (où c est le plus grand côté) $\Longrightarrow$ le triangle **est rectangle**.
   - Si $c^2 \neq a^2 + b^2 \Longrightarrow$ le triangle **n'est pas rectangle**.
4. **Racine carrée & Irrationnels :**
   - $\sqrt{x}$ est le nombre positif dont le carré vaut x.
   - $\sqrt{2}$ ne peut s'écrire sous forme de fraction $\frac{p}{q}$: c'est un **nombre irrationnel**.

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 19.1 Calcule la longueur de l'hypoténuse dans chaque triangle rectangle : 1. ABC rectangle en A avec $AB = 3\ \text{cm}$ et $AC = 4\ \text{cm}$. 2. RST rectangle en S avec $SR = 5\ \text{cm}$ et $ST = 12\ \text{cm}$. 3. KLM rectangle en M avec $MK = 8\ \text{dm}$ et $ML = 15\ \text{dm}$.

Exercice 19.2 Calcule la longueur manquante dans ces triangles rectangles : 1. DEF rectangle en D avec $EF = 10\ \text{cm}$ (hypoténuse) et $DE = 6\ \text{cm}$. Calcule DF. 2. GHI rectangle en H avec $GI = 25\ \text{m}$ et $HI = 24\ \text{m}$. Calcule GH.

Exercice 19.3 Sans calculatrice, donne la valeur exacte de : $\sqrt{49}$; $\sqrt{81}$; $\sqrt{144}$; $\sqrt{1}$; $\sqrt{0,25}$.

Exercice 19.4 Entre quels deux entiers consécutifs se situe chacun de ces nombres ? a) $\sqrt{10}$; b) $\sqrt{50}$; c) $\sqrt{85}$.

Exercice 19.5 Le triangle de côtés $6\ \text{cm}$, $8\ \text{cm}$ et $10\ \text{cm}$ est-il rectangle ? Justifie par un calcul.

Niveau (Problèmes et rédaction)

Exercice 19.6 La traversée de la piscine. Une piscine municipale a la forme d'un rectangle de $25\ \text{mètres}$ de long sur $10\ \text{mètres}$ de large. Un nageur décide de la traverser en diagonale d'un coin à l'autre. Quelle distance parcourt-il ? Donne la valeur arrondie au centimètre.

Exercice 19.7 Le mât du voilier. Le mât vertical d'un voilier mesure $12\ \text{mètres}$ de haut. Un câble d'acier (un hauban) relie le sommet du mât au pont du bateau, à une distance de $5\ \text{mètres}$ du pied du mât. Quelle doit être la longueur du câble d'acier ?

Exercice 19.8 La porte et le panneau de bois. Un menuisier doit faire passer un grand panneau circulaire en bois de $2,15\ \text{mètres}$ de diamètre à travers une porte rectangulaire de $2\ \text{mètres}$ de haut et $0,90\ \text{mètre}$ de large. Le panneau peut-il passer s'il le penche en diagonale ?

Exercice 19.9 Test d'orthogonalité pour un charpentier. Un charpentier assemble deux poutres en bois qui doivent être rigoureusement perpendiculaires. Il marque un point A à $60\ \text{cm}$ de l'angle sur la première poutre, et un point B à $80\ \text{cm}$ sur la seconde poutre. Il mesure ensuite la distance directe AB entre les deux marques et trouve $98\ \text{cm}$. Les poutres sont-elles perpendiculaires ? Que doit faire le charpentier ?

Exercice 19.10 Losange et diagonales. Un losange $ABCD$ possède des diagonales de longueurs $AC = 16\ \text{cm}$ et $BD = 12\ \text{cm}$. Rappelle une propriété géométrique des diagonales d'un losange, puis calcule la longueur de son côté et son périmètre.

Exercice 19.11 La hauteur d'un triangle équilatéral. Soit un triangle équilatéral ABC de côté $a = 6\ \text{cm}$. On trace la hauteur $[AH]$ issue de A. 1. Quelle est la longueur du segment $[BH]$? Justifie. 2. Calcule la valeur exacte de la hauteur AH sous la forme $k\sqrt{3}$. 3. Calcule l'aire exacte du triangle ABC.

Niveau (Défis et raisonnements)

Exercice 19.12 La spirale de Théodore de Cyrène. 1. Dessine un triangle rectangle isocèle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 1. Quelle est la longueur de son hypoténuse ? 2. Sur cette hypoténuse, construis un second triangle rectangle dont l'autre côté de l'angle droit mesure 1. Quelle est sa nouvelle hypoténuse ? 3. Continue cette construction pas à pas. Quelles sont les longueurs successives des hypoténuses ? 4. Quel nom donne-t-on à cette figure qui permet de tracer tous les $\sqrt{n}$ avec une règle et un compas ?

Exercice 19.13 La diagonale du cube. Soit un cube d'arête $c = 4\ \text{cm}$. 1. Calcule la longueur de la diagonale d'une face carrée. 2. En appliquant à nouveau le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle intérieur, calcule la grande diagonale de l'espace reliant deux sommets opposés du cube. 3. Donne la formule générale de la grande diagonale d'un cube de côté c.

Exercice 19.14 L'araignée et la mouche sur la boîte. Une boîte en carton a la forme d'un pavé droit de dimensions $30\ \text{cm} \times 12\ \text{cm} \times 12\ \text{cm}$. Une araignée se trouve sur une petite face, à $1\ \text{cm}$ du haut et au milieu de la largeur. Une mouche est endormie sur la face opposée, à $1\ \text{cm}$ du bas et au milieu de la largeur. Quelle est la longueur du plus court chemin que l'araignée peut parcourir en marchant sur les parois extérieures pour attraper la mouche ? *(Indication : déplie le carton à plat en fabriquant un patron !)*

Exercice 19.15 Démonstration de l'irrationalité de $\sqrt{3}$. En t'inspirant de la démonstration d'Hippase pour $\sqrt{2}$, démontre que $\sqrt{3}$ ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible $\frac{p}{q}$. *(Indication : utilise le fait que si p^2 est un multiple de 3, alors p est un multiple de 3).*

Solutions

Solution 19.1 1. $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ cm. 2. $RT = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm. 3. $KL = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ dm.

Solution 19.2 1. $DF = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ cm. 2. $GH = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7$ m.

Solution 19.3 $\sqrt{49} = 7$; $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{144} = 12$; $\sqrt{1} = 1$; $\sqrt{0,25} = 0,5$ (car $0,5^2 = 0,25$).

Solution 19.4 a) $3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2 \Longrightarrow 3 < \sqrt{10} < 4$. b) $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2 \Longrightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$. c) $9^2 = 81 < 85 < 100 = 10^2 \Longrightarrow 9 < \sqrt{85} < 10$.

Solution 19.5 Plus grand côté : 10 cm. $10^2 = 100$. $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Puisque $6^2 + 8^2 = 10^2$, d'après la réciproque de Pythagore, le triangle est bien rectangle.

Solution 19.6 $d = \sqrt{25^2 + 10^2} = \sqrt{625 + 100} = \sqrt{725} \approx 26,93$ mètres.

Solution 19.7 $L = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ mètres.

Solution 19.8 La diagonale de l'ouverture de la porte est : $D = \sqrt{2^2 + 0,9^2} = \sqrt{4 + 0,81} = \sqrt{4,81} \approx 2,193$ mètres. Comme $2,193 > 2,15$, le panneau circulaire a un diamètre inférieur à la diagonale de la porte : **oui, il peut passer** en le penchant !

Solution 19.9 Calculons : $60^2 + 80^2 = 3\,600 + 6\,400 = 10\,000$. Pour que l'angle soit droit, il faudrait que $AB^2 = 10\,000$, soit $AB = \sqrt{10\,000} = 100$ cm. Or le charpentier a mesuré 98 cm ($98^2 = 9\,604 \neq 10\,000$). Les poutres ne sont pas perpendiculaires (l'angle est légèrement trop aigu, $< 90°$). Il doit écarter les poutres jusqu'à ce que la distance mesure exactement 100 cm.

Solution 19.10 Les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement en leur milieu. Les demi-diagonales mesurent $\frac{16}{2} = 8$ cm et $\frac{12}{2} = 6$ cm. Elles forment un triangle rectangle de côté : $c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$ cm. Périmètre du losange : $4 \times 10 = 40$ cm.

Solution 19.11 1. Dans un triangle équilatéral, la hauteur issue d'un sommet est aussi la médiatrice du côté opposé : elle coupe $[BC]$ en son milieu H. Donc $BH = \frac{6}{2} = 3$ cm. 2. Le triangle ABH est rectangle en H. $AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27}$. Or $27 = 9 \times 3$, donc $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ cm $\approx 5,20$ cm. 3. Aire $= \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{6 \times 3\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$ cm^2 $\approx 15,59$ cm^2.

Solution 19.12 1. $h_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. 2. $h_2 = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$. 3. Par récurrence, les hypoténuses successives mesurent $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4} = 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \ldots, \sqrt{n}$. 4. C'est la **Spirale de Théodore de Cyrène** (ou escargot de Pythagore).

Solution 19.13 1. Diagonale de face : $d_1 = \sqrt{c^2 + c^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ cm. 2. Le triangle reliant une arête verticale, la diagonale de la face du bas et la grande diagonale est rectangle. $D = \sqrt{d_1^2 + c^2} = \sqrt{32 + 4^2} = \sqrt{32 + 16} = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$ cm $\approx 6,93$ cm. 3. Formule générale : $D = \sqrt{c^2 + c^2 + c^2} = \sqrt{3c^2} = c\sqrt{3}$.

Solution 19.14 Déplions la boîte à plat (patron). L'araignée et la mouche sont reliées par une ligne droite oblique sur le carton déplié.

- Déplacement horizontal le long des parois : 6 cm (demi-face) $+30$ cm (longueur) $+6$ cm (autre demi-face) $= 42$ cm.
- Déplacement vertical : de 1 cm du haut à 1 cm du bas sur une hauteur de 12 cm, soit une distance verticale de $(12 - 1) + 1 + \ldots$ mais déplié correctement, la distance verticale minimale entre les deux positions est de $(12 - 1) + 12 - 1 = 22$ cm ou avec le dépliage le plus court, la distance est $\sqrt{32^2 + 24^2} = 40$ cm !

Vérifions : en passant par le plafond : largeur $30 + 1 + 1 = 32$ cm, traversée $12 + 12 = 24$ cm. Distance : $\sqrt{32^2 + 24^2} = \sqrt{1024 + 576} = \sqrt{1600} = 40$ cm. Le chemin le plus court mesure exactement 40 cm !

Solution 19.15 Supposons $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible. Alors $3 = \frac{p^2}{q^2} \Longrightarrow p^2 = 3q^2$. Donc p^2 est multiple de 3, ce qui implique que p est multiple de 3 ($p = 3k$). Alors $(3k)^2 = 3q^2 \Longrightarrow 9k^2 = 3q^2 \Longrightarrow q^2 = 3k^2$. Donc q^2 est multiple

de 3, d'où q est multiple de 3. p et q auraient tous deux 3 comme diviseur commun, contredisant le fait que la fraction est irréductible. Donc $\sqrt{3}$ est irrationnel.

La question qui ouvre la suite

Le théorème de Pythagore permet de calculer la distance en diagonale entre deux points. Mais que faire lorsque nos points ne sont pas dessinés sur une simple feuille libre, mais dispersés sur une vaste carte de pirate, une grille de navigation en mer ou les pixels d'un écran d'ordinateur ?

Comment situer n'importe quel point du monde avec une précision infaillible grâce à deux nombres relatifs, positifs ou négatifs ? Et pourquoi « moins par moins donne plus » ? C'est le secret de **René Descartes et des deux sentiers de l'Île au Trésor** !

CHAPITRE 20 : L'Île au Trésor et les Deux Sentiers

> « Un nombre seul ne sait que mesurer la distance en ligne droite sur un sentier unique. Mais pour retrouver un coffre dans la plaine, guider un navire dans le brouillard ou cartographier chaque étoile du ciel, il faut ouvrir le monde en deux dimensions et marier l'algèbre à la géométrie. »

Ce que tu vas découvrir

- Le mystère de la carte au trésor et la mouche au plafond de **René Descartes**.
- Le **repère cartésien** : l'axe horizontal des **abscisses** (x), l'axe vertical des **ordonnées** (y) et les **quatre quadrants**.
- Comment lire et placer les **coordonnées** d'un point $(x\,;y)$ sans jamais les intervertir.
- La formule du **milieu d'un segment** : la simple moyenne des coordonnées.
- Le calcul de la **distance entre deux points** dans un repère grâce au théorème de Pythagore : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- La **multiplication et la division des nombres relatifs** : pourquoi « moins par moins donne plus », démontrée par la marche arrière dans le temps et par la distributivité !

---

1. Le problème : la carte au trésor et l'angoisse du cercle

Imagine que tu viennes de débarquer sur une île sauvage de l'océan Indien. Dans ta main crispée, tu tiens le vieux parchemin jauni d'un flibustier. L'encre est presque effacée par l'eau de mer, mais tu parviens à déchiffrer ces quelques mots tracés à la plume : *« Le coffre aux pièces d'or est enterré à très exactement 50 mètres du grand menhir de pierre noire qui domine la plage. »*

Ton cœur bondit dans ta poitrine. Tu cours vers le menhir de pierre noire. Tu plantes tes talons contre la roche, tu regardes devant toi et tu fais 50 mètres en direction de la forêt : tu sors ta pelle et tu commences à creuser frénétiquement dans le sable. Tu creuses pendant une heure sous un soleil de plomb. Rien ! Pas le moindre coffre.

Tu t'arrêtes, épuisé, et tu réalises ton erreur tragique : Le pirate a écrit : *« à 50 mètres du menhir »*. Mais dans quelle direction ?

- À 50 mètres vers le Nord ?
- À 50 mètres vers l'Est, dans les vagues de l'océan ?
- À 50 mètres vers l'Ouest, sous les racines d'un grand bananier ?



Fig. 63. – Le repère cartésien 2D : axe des abscisses et axe des ordonnées

Comme nous l'avons appris au Chapitre 16, tous les points situés à 50 mètres du menhir forment **un cercle immense tout autour de la pierre** ! Si tu dois creuser tout le long de ce cercle, il te faudra creuser une tranchée de plus de 314 mètres de long. Le jour où tu auras fini, tu seras devenu un vieillard à barbe blanche !

Un seul nombre ne suffit pas pour désigner une position dans un plan. Pour localiser un objet sans la moindre hésitation, il faut **deux informations indépendantes**.

---

2. La Mouche au Plafond de René Descartes

Pour résoudre cette énigme, quittons notre île aux flibustiers et faisons un bond dans le temps jusqu'au rude hiver de **1637**, en France.

Dans une chambre d'une vieille maison de briques, un homme de quarante ans est encore couché sous ses draps de plume au milieu de la matinée. Il s'appelle **René Descartes**. Descartes a une santé fragile depuis son enfance, et ses professeurs du collège royal lui ont toujours accordé le privilège de rester au lit le matin pour se reposer et méditer tranquillement.

Alors qu'il regarde en l'air, une petite mouche noire vient se poser sur le plafond de plâtre blanc. La mouche marche, s'arrête, redécolle et se pose un peu plus loin. Descartes se pose alors une question que personne avant lui n'avait formulée ainsi : *« Comment pourrais-je décrire la position exacte de cette mouche à un ami sans avoir besoin de monter sur un escabeau pour la pointer du doigt ? »*

Descartes regarde les deux murs perpendiculaires qui se croisent dans le coin de sa chambre : 1. Il mesure la distance entre la mouche et le **mur de gauche** : disons **3 mètres**. 2. Il mesure la distance entre la mouche et le **mur du fond** : disons **4 mètres**.

« C'est lumineux ! » s'écrie Descartes. Le couple de nombres $(3\,;4)$ suffit à fixer la position de la mouche sans aucune ambiguïté possible ! Deux nombres pour repérer un point dans un espace à deux dimensions : Descartes venait d'inventer le **repère cartésien**.

---

3. Le Repère cartésien et les Quatre Quadrants

3.1 Anatomie du repère

Sur une feuille à petits carreaux, nous traçons deux droites graduées perpendiculaires qui se coupent en leur zéro commun :

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définitions fondamentales — Le vocabulaire officiel**
>
> - Le point de croisement des deux axes est l'**origine**, notée O. Ses coordonnées sont $(0\,;0)$.
> - L'axe horizontal est l'**axe des abscisses** (noté souvent axe (Ox)). L'abscisse mesure le déplacement **gauche / droite**.
> - L'axe vertical est l'**axe des ordonnées** (noté souvent axe (Oy)). L'ordonnée mesure le déplacement **bas / haut**.
> - Un repère est dit **orthogonal** si les deux axes sont perpendiculaires. Il est dit **orthonormé** si les deux axes ont la même unité de longueur (par exemple 1 carreau = 1 cm sur les deux axes).

3.2 La notation des coordonnées

Pour tout point M, on note :

$$M(x_M\,;y_M)$$

- x_M est l'**abscisse** de M.
- y_M est l'**ordonnée** de M.

Méthode mnémotechnique — Pour ne jamais confondre x et y

1. **L'ordre alphabétique :** Dans l'alphabet,

Abscisse vient avant **O**rdonnée, tout comme x vient avant y. L'abscisse est TOUJOURS écrite en premier ! 2. **L'ascenseur de l'immeuble :** Pour rendre visite à un ami dans un grand bâtiment, tu dois d'abord marcher dans la rue jusqu'à l'entrée de son allée (**abscisse horizontale** x), puis prendre l'ascenseur pour monter à son étage (**ordonnée verticale** y). Tu ne peux pas monter dans les airs avant d'être entré dans le bâtiment !

3.3 Les quatre quadrants du plan

Les deux axes découpent le plan en quatre régions :

- **Quadrant I (en haut à droite) :** $x > 0$ et $y > 0$ (positif, positif).
- **Quadrant II (en haut à gauche) :** $x < 0$ et $y > 0$ (négatif, positif).
- **Quadrant III (en bas à gauche) :** $x < 0$ et $y < 0$ (négatif, négatif).
- **Quadrant IV (en bas à droite) :** $x > 0$ et $y < 0$ (positif, négatif).

---

4. Deux formules magiques du repère

Dès que des points possèdent des coordonnées numériques, nous n'avons plus besoin de tracer des figures pour faire de la géométrie : le calcul algébrique résout tout !

4.1 Les coordonnées du milieu d'un segment

Soient deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$. Où se trouve le milieu exact I du segment $[AB]$? Il se trouve exactement à mi-chemin horizontalement, et à mi-chemin verticalement. C'est simplement **la moyenne arithmétique** des coordonnées !

Propriété — Coordonnées du milieu

Les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$ sont :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

4.2 La distance entre deux points : Pythagore dans le repère

Comment calculer la longueur exacte du segment $[AB]$ reliant deux points quelconques du plan ? Regarde le dessin suivant :



Fig. 64. – Distance euclidienne dans le repère cartésien

Traçons depuis A une ligne horizontale, et depuis B une ligne verticale. Elles se coupent en un point C en formant un **triangle rectangle ABC** !

- La longueur de la base horizontale est : $AC = |x_B - x_A|$.
- La longueur de la hauteur verticale est : $BC = |y_B - y_A|$.
- L'hypoténuse est le segment $[AB]$!

Appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en C :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$

En extrayant la racine carrée, on obtient la formule universelle de la distance cartésienne :

> **Théorème — Distance entre deux points dans un repère orthonormé**
>
> Pour tous points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$:
>
> $$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

---

5. La multiplication des relatifs : pourquoi moins par moins donne plus ?

En travaillant dans les quatre quadrants avec des coordonnées positives et négatives, nous rencontrons un défi fondamental du calcul : comment **multiplier** des nombres relatifs ?

Si l'addition et la soustraction sont intuitives (gagner ou perdre de l'argent, monter ou descendre en température), la multiplication de deux nombres négatifs semble au premier abord un mystère impénétrable. Pourquoi $(-3) \times (-4) = +12$?

Voici deux démonstrations irréfutables : l'une cinématographique, l'autre purement logique.

5.1 La preuve par la vidéo : le marcheur et la marche arrière

Imagine un marcheur sur une longue route graduée en mètres, filmé par une caméra :

- Sa **vitesse** :
  - Marcher vers la droite (l'avenir, le positif) : vitesse **positive** $+2\ \ \mathrm{m/s}$.
  - Marcher à reculons vers la gauche : vitesse **négative** $-2\ \ \mathrm{m/s}$.
- Le **temps** sur la bande vidéo :
  - Regarder le film défiler normalement vers l'avant : temps **positif** $+3\ \ \text{secondes}$.
  - Faire passer le film en marche arrière : temps **négatif** $-3\ \ \text{secondes}$.

Où se trouve le marcheur sur l'écran ?

1. $\mathbf{(+2) \times (+3) = +6}$ **:** Il marche vers l'avant à $2\ \ \mathrm{m/s}$, on regarde 3 secondes dans le futur $\Longrightarrow$ il est à $\mathbf{+6\ \ mètres}$ à droite.
2. $\mathbf{(-2) \times (+3) = -6}$ **:** Il marche à reculons vers la gauche à $-2\ \ \mathrm{m/s}$, on regarde 3 secondes dans le futur $\Longrightarrow$ il est à $\mathbf{-6\ \ mètres}$ à gauche.
3. $\mathbf{(+2) \times (-3) = -6}$ **:** Il marche vers la droite, mais on passe le film en marche arrière 3 secondes dans le passé $\Longrightarrow$ il était à $\mathbf{-6\ \ mètres}$ à gauche !
4. $\mathbf{(-2) \times (-3) = +6}$ **:** Il marchait à reculons vers la gauche, et l'on passe la vidéo en marche arrière dans le passé ! Que voit-on sur l'écran ? **Quelqu'un qui avance vers la droite !** Il se trouvait à $\mathbf{+6\ \ mètres}$! *Passer en marche arrière un film où l'on recule, c'est voir quelqu'un avancer !*

5.2 La preuve par la distributivité (la preuve algébrique)

Les mathématiciens exigent une preuve sans métaphore. La voici : nous voulons que la règle fondamentale de la distributivité $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ reste vraie pour tous les nombres.

Calculons l'expression suivante de deux manières :

$$E = (-3) \times [4 + (-4)]$$

- **Méthode 1 :** Calculons d'abord l'intérieur du crochet : $4 + (-4) = 0$. Donc : $E = (-3) \times 0 = \mathbf{0}$.

- **Méthode 2 :** Développons par distributivité :

$$E = (-3) \times 4 + (-3) \times (-4)$$

Nous savons déjà que $(-3) \times 4 = -12$ (car 4 dettes de 3 euros font 12 euros de dette). L'égalité devient :

$$0 = -12 + [(-3) \times (-4)]$$

Pose-toi la question : quel nombre faut-il ajouter à -12 pour obtenir zéro ? La seule et unique réponse possible dans l'univers est $\mathbf{+12}$! Par conséquent :

$$(-3) \times (-4) = \mathbf{+12}$$

Si moins par moins ne donnait pas plus, toutes les règles du calcul algébrique s'écrouleraient !

La Règle des signes — Multiplication et Division

- Le produit (ou quotient) de deux nombres de **même signe** est **POSITIF** :

$$(+) \times (+) = (+) \quad \text{et} \quad (-) \times (-) = (+)$$

- Le produit (ou quotient) de deux nombres de **signes contraires** est **NÉGATIF** :

$$(+) \times (-) = (-) \quad \text{et} \quad (-) \times (+) = (-)$$

Pour un produit de plusieurs facteurs non nuls :

- Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, le produit est **positif**.
- Si le nombre de facteurs négatifs est **impair**, le produit est **négatif**.

---

6. Attention aux pièges !

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — Ne confonds pas addition et multiplication

1. **La confusion mortelle :**

$$-3 - 5 = \mathbf{-8} \quad (\text{on perd } \ 3 \ \text{ puis on perd } \ 5, \text{c'est une addition !})$$

$$(-3) \times (-5) = \mathbf{+15} \quad (\text{c'est une multiplication !})$$

Ne dis jamais « moins et moins ça fait plus » sans préciser que cela ne vaut QUE pour la multiplication et la division ! 2. **L'inversion abscisse / ordonnée :** Le point $A(2\,;5)$ est situé à 2 carreaux vers la droite et 5 carreaux vers le haut. Le point $B(5\,;2)$ est situé à 5 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Ce sont deux points totalement distincts ! 3. **Le signe moins dans la distance cartésienne :** Si $x_A = -3$ et $x_B = 4$, la distance horizontale est :

$$x_B - x_A = 4 - (-3) = 4 + 3 = \mathbf{7}$$

Attention au double signe moins qui se transforme en addition !

---

7. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Lire et placer des coordonnées

Dans un repère orthonormé d'unité 1 carreau : 1. Place les points suivants : $A(3\,;2)$, $B(-4\,;3)$, $C(-2\,;-3)$, $D(5\,;-1)$, $E(0\,;4)$, $F(-3\,;0)$. 2. Indique dans quel quadrant ou sur quel axe se trouve chacun de ces points.

Solution : - $A(3\,;2)$: 3 carreaux à droite, 2 en haut $\rightarrow$ **Quadrant I**. - $B(-4\,;3)$: 4 carreaux à gauche, 3 en haut $\rightarrow$ **Quadrant II**. - $C(-2\,;-3)$: 2 carreaux à gauche, 3 en bas $\rightarrow$ **Quadrant III**. - $D(5\,;-1)$: 5 carreaux à droite, 1 en bas $\rightarrow$ **Quadrant IV**. - $E(0\,;4)$: abscisse nulle $\rightarrow$ situé sur **l'axe des ordonnées**. - $F(-3\,;0)$: ordonnée nulle $\rightarrow$ situé sur **l'axe des abscisses**. ✓

Exemple résolu 2 — Calculer le milieu d'un segment

On donne les points $M(-5\,;7)$ et $N(3\,;-1)$. Calculer les coordonnées du milieu K du segment $[MN]$.

Solution : Appliquons la formule des coordonnées du milieu :

$$x_K = \frac{x_M + x_N}{2} = \frac{-5+3}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$y_K = \frac{y_M + y_N}{2} = \frac{7+(-1)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Le milieu est le point $K(-1\,;3)$. ✓

Exemple résolu 3 — Calculer la distance entre deux points

Soient les points $A(-2\,;1)$ et $B(4\,;9)$ dans un repère orthonormé en centimètres. Calculer la longueur exacte du segment $[AB]$.

Solution : Appliquons la formule de la distance cartésienne :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Calculons chaque écart :

$$x_B - x_A = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6$$

$$y_B - y_A = 9 - 1 = 8$$

Élevons au carré et additionnons :

$$AB^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

Extrayons la racine :

$$AB = \sqrt{100} = 10 \ \text{ cm}$$

Le segment $[AB]$ mesure exactement $10 \ \text{ cm}$. ✓

Exemple résolu 4 — Calculs de produits et quotients de relatifs

Calculer les expressions suivantes : 1. $P_1 = (-4) \times (+7)$ 2. $P_2 = (-6) \times (-8)$ 3. $Q_1 = \frac{-45}{9}$ 4. $Q_2 = \frac{-56}{-7}$ 5. $P_3 = (-2) \times (-3) \times (-1) \times (+4) \times (-5)$

Solution : 1. Signes contraires $\Longrightarrow$ résultat négatif : $P_1 = -28$. 2. Même signe (deux négatifs) $\Longrightarrow$ résultat positif : $P_2 = +48$. 3. Signes contraires $\Longrightarrow$ résultat négatif : $Q_1 = -5$. 4. Même signe $\Longrightarrow$ résultat positif : $Q_2 = +8$. 5. Comptons le nombre de facteurs négatifs dans P_3 : il y a 4 facteurs négatifs ($(-2), (-3), (-1), (-5)$). 4 est pair $\Longrightarrow$ le résultat final sera **positif**. Multiplions les valeurs : $2 \times 3 \times 1 \times 4 \times 5 = 120$. Donc $P_3 = +120$. ✓

Exemple résolu 5 — Déterminer la nature d'un triangle avec le repère

Dans un repère orthonormé, on donne les points : $A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$ et $C(-3\,;5)$. Démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle.

Solution : Calculons les carrés des trois longueurs grâce à la formule de distance :

- Pour AB :

$$AB^2 = (4-1)^2 + (6-2)^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Longrightarrow AB = 5$$

- Pour AC :

$$AC^2 = (-3-1)^2 + (5-2)^2 = (-4)^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \Longrightarrow AC = 5$$

- Pour BC :

$$BC^2 = (-3-4)^2 + (5-6)^2 = (-7)^2 + (-1)^2 = 49 + 1 = 50$$

Analyse des résultats : 1. On a $AB = AC = 5$: le triangle ABC possède deux côtés de même longueur, il est donc **isocèle en A**. 2. Comparons les carrés :

$$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50$$

$$BC^2 = 50$$

Puisque $AB^2 + AC^2 = BC^2$, d'après la **réciproque du théorème de Pythagore**, le triangle ABC est **rectangle en A**. Conclusion : ABC est un **triangle rectangle isocèle en A**. ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Repère cartésien :**
   - Axe horizontal (Ox) : **abscisses**.
   - Axe vertical (Oy) : **ordonnées**.
   - Coordonnées d'un point : $M(x\,;y)$ (ordre alphabétique : x puis y).
2. **Milieu d'un segment $[AB]$:**
$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$
3. **Distance entre deux points (repère orthonormé) :**
$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$
4. **Règle des signes :**
   - Même signe $\Longrightarrow$ résultat **positif** ($+\times+=+$ et $-\times-=+$).
   - Signes différents $\Longrightarrow$ résultat **négatif** ($+\times-=-$ et $-\times+=-$).
   - Pour un produit : compter les signes $-$ (nombre pair $\Longrightarrow +$; nombre impair $\Longrightarrow -$).

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 20.1 Donne les coordonnées des sommets du rectangle représenté ci-dessous : A est à 3 carreaux à gauche et 2 en haut ; B est à 4 carreaux à droite et 2 en haut ; C est à 4 carreaux à droite et 1 en bas ; D est à 3 carreaux à gauche et 1 en bas.

Exercice 20.2 Calcule sans calculatrice : 1. $(-7)\times(-6)$ 2. $(-8)\times(+9)$ 3. $(+12)\times(-5)$ 4. $\frac{-72}{-8}$ 5. $\frac{-42}{+7}$

Exercice 20.3 Quel est le signe de chacun des produits suivants ? (Justifie sans calculer la valeur numérique) : 1. $(-3)\times(-5)\times(+2)\times(-7)$ 2. $(-1)\times(-2)\times(-3)\times(-4)\times(-5)\times(-6)$ 3. Le produit de 15 nombres négatifs et de 28 nombres positifs.

Exercice 20.4 On donne $A(2\,;4)$ et $B(8\,;10)$. Calcule les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Exercice 20.5 Calcule la distance AB entre $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

Niveau (Calculs et repérage)

Exercice 20.6 Calculs de relatifs combinés. Calcule en respectant les priorités opératoires : 1. $E=(-3)\times(-4)+(-5)\times(+2)$ 2. $F=15-(-2)\times(-6)$ 3. $G=\frac{(-4)\times(-9)}{-3-3}$ 4. $H=(-2)^4-(-3)^3$

Exercice 20.7 Retrouver l'extrémité d'un segment. Soit $A(-3\,;5)$ et $I(1\,;2)$. On sait que I est le milieu du segment $[AB]$. Quelles sont les coordonnées du point B ?

Exercice 20.8 Le parallélogramme par les diagonales. On donne quatre points : $A(-2\,;1)$, $B(3\,;4)$, $C(5\,;1)$ et $D(0\,;-2)$. 1. Calcule les coordonnées du milieu du segment $[AC]$. 2. Calcule les coordonnées du milieu du segment $[BD]$. 3. Que peux-tu en déduire sur la nature du quadrilatère $ABCD$?

Exercice 20.9 Le cercle circonscrit. Dans un repère orthonormé, on considère les points $E(-4\,;0)$ et $F(2\,;8)$. 1. Calcule les coordonnées du centre O' du cercle de diamètre $[EF]$. 2. Calcule la longueur du diamètre EF, puis le rayon du cercle. 3. Le point $G(2\,;0)$ appartient-il à ce cercle ?

Exercice 20.10 Périmètre d'un triangle. Soient les points $K(-1\,;2)$, $L(3\,;5)$ et $M(3\,;-1)$. 1. Calcule les longueurs exactes KL, LM et KM. 2. Le triangle KLM est-il isocèle ? Est-il rectangle ?

Exercice 20.11 Carré d'un nombre négatif. Recopie et complète avec le signe $<$ ou $>$: 1. $(-5)^2 \ldots 0$ 2. $-5^2 \ldots 0$ 3. $(-2)^3 \ldots (-2)^2$ 4. $(-1)^{100} \ldots (-1)^{101}$

Niveau (Défis et géométrie analytique)

Exercice 20.12 La chasse au trésor du pirate. Sur une carte quadrillée dont l'origine $O(0\,;0)$ est le vieux phare de l'île, le coffre est enterré au point T. Le carnet de bord indique :

- Le point de départ est la crique $A(-6\,;-4)$.
- Le trésor T est aligné avec A et la caverne $B(6\,;4)$, et il se situe aux trois quarts du trajet en partant de A vers B.

1. Quelles sont les coordonnées du trésor T ?
2. Quelle distance en mètres sépare le vieux phare du trésor T (l'unité du repère vaut $10\ \text{mètres}$) ?

Exercice 20.13 Le symétrique d'un point. Soit $A(2\,;-3)$ et $S(-1\,;1)$. On appelle A' le symétrique du point A par rapport au centre de symétrie S. 1. Que représente le point S pour le segment $[AA']$? 2. Détermine par le calcul les coordonnées de A'.

Exercice 20.14 Démonstration de la règle des signes par une table. Construis un tableau à double entrée pour la multiplication avec les nombres $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ sur la première ligne et la première colonne. Remplis d'abord la partie positive, puis prolonge chaque ligne et chaque colonne en observant la régularité des suites arithmétiques (sauts constants). Explique pourquoi la case $(-3)\times(-3)$ ne peut valoir rien d'autre que $+9$.

Exercice 20.15 Triangle équilatéral dans un repère. On pose deux points $A(0\,;0)$ et $B(4\,;0)$ sur l'axe des abscisses. 1. Quelles doivent être les coordonnées d'un point C d'ordonnée positive pour que le triangle ABC soit équilatéral ? 2. Le point C a-t-il des coordonnées rationnelles ou irrationnelles ? Justifie.

Solutions

Solution 20.1 $A(-3\,;2)$; $B(4\,;2)$; $C(4\,;-1)$; $D(-3\,;-1)$.

Solution 20.2 1. $(-7)\times(-6)=+42$. 2. $(-8)\times(+9)=-72$. 3. $(+12)\times(-5)=-60$. 4. $\frac{-72}{-8}=+9$. 5. $\frac{-42}{+7}=-6$.

Solution 20.3 1. 3 facteurs négatifs (impair) $\Longrightarrow$ résultat **négatif**. 2. 6 facteurs négatifs (pair) $\Longrightarrow$ résultat **positif**. 3. 15 facteurs négatifs (impair) $\Longrightarrow$ résultat **négatif** (le nombre de facteurs positifs ne change jamais le signe).

Solution 20.4 $x_I=\frac{2+8}{2}=\frac{10}{2}=5$; $y_I=\frac{4+10}{2}=\frac{14}{2}=7$. Donc $I(5\,;7)$.

Solution 20.5 $AB=\sqrt{(4-1)^2+(6-2)^2}=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$.

Solution 20.6 1. $E=(+12)+(-10)=2$. 2. $F=15-(+12)=15-12=3$. 3. $G=\frac{+36}{-6}=-6$. 4. $H=(+16)-(-27)=16+27=43$.

Solution 20.7 $x_I=\frac{x_A+x_B}{2}\Longrightarrow 1=\frac{-3+x_B}{2}\Longrightarrow 2=-3+x_B\Longrightarrow x_B=5$. $y_I=\frac{y_A+y_B}{2}\Longrightarrow 2=\frac{5+y_B}{2}\Longrightarrow 4=5+y_B\Longrightarrow y_B=-1$. Le point cherché est $B(5\,;-1)$.

Solution 20.8 1. Milieu de $[AC]$: $x=\frac{-2+5}{2}=\frac{3}{2}=1,5$; $y=\frac{1+1}{2}=1\Longrightarrow(1,5\,;1)$. 2. Milieu de $[BD]$: $x=\frac{3+0}{2}=1,5$; $y=\frac{4+(-2)}{2}=\frac{2}{2}=1\Longrightarrow(1,5\,;1)$. 3. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu. Or, un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un **parallélogramme**. Donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Solution 20.9 1. Centre O' milieu de $[EF]$: $x_{O'}=\frac{-4+2}{2}=-1$; $y_{O'}=\frac{0+8}{2}=4\Longrightarrow O'(-1\,;4)$. 2. Diamètre : $EF=\sqrt{(2-(-4))^2+(8-0)^2}=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=10$. Rayon $R=\frac{10}{2}=5$. 3. Distance $O'G$: $O'G=\sqrt{(2-(-1))^2+(0-4)^2}=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$. Puisque $O'G=R=5$, le point G est situé à une distance égale au rayon : **il appartient bien au cercle**.

Solution 20.10 1. $KL=\sqrt{(3-(-1))^2+(5-2)^2}=\sqrt{4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$. $LM=\sqrt{(3-3)^2+(-1-5)^2}=\sqrt{0+(-6)^2}=\sqrt{36}=6$. $KM=\sqrt{(3-(-1))^2+(-1-2)^2}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=\sqrt{25}=5$. 2. $KL=KM=5\Longrightarrow$ le triangle KLM est **isocèle en K**. Test de Pythagore : $LM^2=6^2=36$; $KL^2+KM^2=25+25=50\neq 36$. Il n'est pas rectangle.

Solution 20.11 1. $(-5)^2=25>0$. 2. $-5^2=-25<0$. 3. $(-2)^3=-8<4=(-2)^2$. 4. $(-1)^{100}=+1>-1=(-1)^{101}$.

Solution 20.12 1. Déplacement total de A à B : Horizontal : $6-(-6)=12$; Vertical : $4-(-4)=8$. Les trois quarts du déplacement : Horizontal : $\frac{3}{4}\times 12=9\Longrightarrow x_T=-6+9=3$. Vertical : $\frac{3}{4}\times 8=6\Longrightarrow y_T=-4+6=2$. Le trésor est en $T(3\,;2)$. 2. Distance $OT=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}\approx 3,6055$ unités. En mètres : $3,6055\times 10\ \text{m}\approx 36,1\ \text{mètres}$.

Solution 20.13 1. S est le milieu du segment $[AA']$. 2. $x_S=\frac{x_A+x_{A'}}{2}\Longrightarrow -1=\frac{2+x_{A'}}{2}\Longrightarrow -2=2+x_{A'}\Longrightarrow x_{A'}=-4$. $y_S=\frac{y_A+y_{A'}}{2}\Longrightarrow 1=\frac{-3+y_{A'}}{2}\Longrightarrow 2=-3+y_{A'}\Longrightarrow y_{A'}=5$. Donc $A'(-4\,;5)$.

Solution 20.14 Sur la ligne de -3 : $(-3)\times 3=-9$, $(-3)\times 2=-6$, $(-3)\times 1=-3$, $(-3)\times 0=0$. À chaque case en allant vers la gauche, on **ajoute 3** ! Pour continuer la régularité arithmétique : $(-3)\times(-1)=0+3=3$ $(-3)\times(-2)=3+3=6$ $(-3)\times(-3)=6+3=9$. La case $(-3)\times(-3)$ vaut obligatoirement $+9$.
Solution 20.15 1. La base $[AB]$ a une longueur de 4. Le milieu est en $x=2$. Le sommet C a donc pour abscisse $x_C=2$. La hauteur d'un triangle équilatéral de côté 4 est $h=4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ (d'après Pythagore : $h=\sqrt{4^2-2^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$). Puisque l'ordonnée est positive, $y_C=2\sqrt{3}$. Donc $C(2\,;2\sqrt{3})$. 2. L'abscisse 2 est un nombre rationnel, mais l'ordonnée $2\sqrt{3}$ est un nombre **irrationnel** car $\sqrt{3}$ est irrationnel.

La question qui ouvre la suite

Grâce aux coordonnées cartésiennes, nous pouvons repérer chaque individu ou chaque trésor dans l'espace. Mais que se passe-t-il lorsque l'on doit prélever un impôt équitable sur des centaines de marchands de richesses différentes, ou résumer les notes d'une classe entière d'élèves en un seul chiffre ?

Comment comparer équitablement des parts quand les totaux ne sont jamais les mêmes ? C'est le pouvoir des **pourcentages**, et la naissance des **statistiques** avec les moyennes, médianes et diagrammes du chapitre suivant !

CHAPITRE 21 : Le Percepteur et les Cent Morceaux

> « Comment comparer la part d'un pauvre bûcheron qui donne trois pièces d'argent sur dix et celle d'un riche marchand qui en verse trente sur cent cinquante ? Pour rendre la justice aveugle et comparer l'incomparable, l'esprit humain a inventé le miroir magique où chaque foule est ramenée à une assemblée idéale de cent citoyens. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi le **pourcentage** est une simple fraction déguisée sur cent ($\% = \frac{\dots}{100}$).
- Les deux gestes essentiels : **appliquer** un pourcentage (prendre $p\%$ d'une quantité) et **calculer** un taux en pourcentage ($\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$).
- Le secret des **coefficients multiplicateurs** pour les hausses ($1 + \frac{t}{100}$) et les baisses ($1 - \frac{t}{100}$).
- Le vocabulaire des statistiques : **population**, **caractère**, **effectifs** et **fréquences**.
- Les représentations graphiques : **diagramme en bâtons**, **histogramme** et **diagramme circulaire**.
- Les trois indicateurs clés d'une série statistique : la **moyenne**, la **médiane** et l'**étendue**.

---

1. Le problème : la foire médiévale et la querelle des marchands

Nous sommes au XIIIe siècle, au cœur de la Champagne, lors de la grande foire de Troyes. Des marchands venus de Venise, de Flandre et de Castille ont dressé des centaines d'étals couverts d'épices, de soieries et de cuirs précieux.

À la fin de la semaine, le **percepteur d'impôts du comte** s'installe à une lourde table de chêne avec sa cassette de fer et son registre relié de cuir. Deux marchands de tissus se présentent devant lui pour acquitter la taxe sur leurs bénéfices.

- Le marchand **Geoffroy** a réalisé un bénéfice modeste de **150 écus d'argent**. Le percepteur lui réclame **30 écus**.
- Le marchand **Barthélemy**, un grand drapier flamand, a engrangé un bénéfice opulent de **400 écus d'argent**. Le percepteur lui réclame **72 écus**.

Barthélemy s'insurge et frappe la table du poing : *« C'est une injustice scandaleuse ! On me prend 72 écus alors qu'on n'en demande que 30 à Geoffroy ! Je paie plus du double de ce qu'il verse ! »*

Geoffroy réplique vivement : *« Mais enfin, Barthélemy, tu as gagné une fortune colossale comparé à moi ! Mes 30 écus représentent une boucherie sur mon modeste étal, alors que tes 72 écus ne sont qu'une goutte d'eau dans tes coffres dorés ! »*

> 💡 **Découverte & Histoire — La querelle des marchands médiévaux**
>
> - Geoffroy (Petit marchand) Barthélemy (Grand marchand)
> - 150 écus) (400 écus)
> - Taxe : 30 écus Taxe : 72 écus
> - Part = 30 / 150 Part = 72 / 400

Le prévôt de la foire est appelé pour trancher le différend. Qui est le marchand le plus lourdement taxé ? Pour répondre avec équité, on ne peut pas se contenter de regarder le nombre brut d'écus prélevés (72 contre 30). Il faut comparer la **proportion** prélevée par rapport au total gagné :

- Pour Geoffroy : $\frac{30}{150} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,20$.
- Pour Barthélemy : $\frac{72}{400} = \frac{18}{100} = 0,18$.

Imaginons que chaque marchand ait gagné une bourse de référence de **100 écus** :

- Geoffroy aurait versé **20 écus pour cent écus gagnés**.
- Barthélemy n'aurait versé que **18 écus pour cent écus gagnés** !

C'est Geoffroy qui subit l'impôt le plus lourd ! Pour comparer des quantités issues de groupes de tailles totalement différentes, l'humanité a inventé un dénominateur universel : **le nombre cent**. C'est la naissance du **pourcentage**.

---

2. Le Pourcentage : une fraction sur cent

2.1 La notation et la signification

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Pourcentage** Un **pourcentage** est une manière d'écrire une fraction dont le **dénominateur est égal à 100**.

$$t\% = \frac{t}{100}$$

Le symbole $\%$ se lit **« pour cent »**.

- $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0,5$ (la moitié).
- $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0,25$ (le quart).
- $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} = 0,75$ (les trois quarts).
- $10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,1$ (le dixième).
- $100\% = \frac{100}{100} = 1$ (la totalité, l'ensemble complet).

💡 D'où vient le symbole $\%$?

Au XVe siècle en Italie, les marchands écrivaient en abrégé *« per cento »* sous la forme *p. 100* ou *p. c.*. Avec la rapidité de la plume des scribes, le *p* s'est effacé, le trait de fraction s'est incliné, et les deux zéros de 100 sont venus se percher de part et d'autre de la barre pour former le signe moderne $\%$.

2.2 Les deux calculs fondamentaux

Question posée	Ce que l'on cherche	Formule de calcul
Appliquer un pourcentage :« Que vaut $p\%$ de la quantité Q ? »	Une **valeur concrète** (en €, en kg, en élèves…)	$\text{Résultat} = Q \times \frac{p}{100}$
Calculer un pourcentage :« Quelle proportion représente la partie A dans le total T ? »	Un **taux en $\%$**	$\text{Taux } \ t\% = \frac{A}{T} \times 100$

---

3. Évolutions en pourcentage et Coefficients Multiplicateurs

Dans la vie quotidienne (soldes de vêtements, hausses de tarifs d'électricité, inflation), les quantités ne restent pas immobiles : elles **augmentent** ou **diminuent** d'un certain pourcentage.

3.1 La méthode traditionnelle (en deux étapes)

Un blouson coûte $80\ \ €$. Le magasin affiche une remise de 30%. 1. On calcule le montant de la remise :

$$\text{Remise} = 80 \times \frac{30}{100} = 24\ \ €$$

2. On soustrait la remise du prix initial :

$$\text{Nouveau prix} = 80 - 24 = 56\ \ €$$

3.2 L'arme secrète du collège : le Coefficient Multiplicateur

Remarquons que l'on peut factoriser ce calcul en une seule multiplication fulgurante :

$$\text{Nouveau prix} = 80 - 80 \times \frac{30}{100} = 80 \times \left(1 - \frac{30}{100}\right) = 80 \times 0,70 = 56 \ \text{€}$$

Payer avec 30% de réduction, c'est payer **70% du prix de départ** !

📐 Théorème — Coefficients Multiplicateurs

- Pour **augmenter** une quantité de $t\%$, on la multiplie par :

$$C = 1 + \frac{t}{100}$$

(Exemple : une hausse de $20\% \Longrightarrow \times 1,20$; une hausse de $5\% \Longrightarrow \times 1,05$)

- Pour **diminuer** une quantité de $t\%$, on la multiplie par :

$$C = 1 - \frac{t}{100}$$

(Exemple : une baisse de $15\% \Longrightarrow \times 0,85$; une baisse de $40\% \Longrightarrow \times 0,60$)

---

4. Les Statistiques : faire parler les nombres

Lorsqu'une ville, un hôpital ou un collège recueille des milliers de données (les tailles des élèves, les salaires des employés, les notes d'un contrôle), le cerveau humain est incapable de tirer du sens d'une liste brute de chiffres en vrac. Les **statistiques** sont la science qui organise, résume et éclaire ces masses d'informations.

4.1 Le vocabulaire officiel

- La **population** : l'ensemble des personnes ou objets étudiés (ex : *tous les élèves de la classe de 5e A*).
- Un **individu** : un membre de cette population (ex : *l'élève Thomas*).
- Le **caractère** : la propriété que l'on observe chez chaque individu (ex : *la note obtenue au contrôle sur 20*).
- L'**effectif** d'une valeur : le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la liste.
- L'**effectif total** (noté N) : le nombre total d'individus dans la population.
- La **fréquence** d'une valeur : la proportion d'individus qui possèdent cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

La fréquence s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1, ou en pourcentage ($f \times 100$). **La somme de toutes les fréquences est toujours égale à 1 (soit 100%).**

4.2 Les trois représentations graphiques usuelles

1. Diagramme en bâtons	2. Histogramme (classes)	3. Diagramme circulaire
Valeurs discrètes isolées	Intervalles continus accolés	Parts proportionnelles à 360°
Hauteur proportionnelle à l'effectif	Aire du rectangle proportionnelle à l'effectif	Angle proportionnel à la fréquence (%)

Dans un **diagramme circulaire** (camembert), la surface et l'angle au centre de chaque secteur sont strictement proportionnels à l'effectif :

$$\text{Angle en degrés} = \text{Fréquence} \times 360^\circ$$

---

5. Les trois gardiens de la série : Moyenne, Médiane et Étendue

Pour résumer une série statistique en quelques chiffres représentatifs, on utilise trois indicateurs majeurs.

5.1 La Moyenne ($\bar{x}$)

La **moyenne** est la valeur que chacun recevrait si l'on mettait tout en commun équitablement.

- **Moyenne simple :**

$$\bar{x} = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre total de valeurs}}$$

- **Moyenne pondérée (avec des effectifs ou des coefficients) :**

$$\bar{x} = \frac{(n_1 \times x_1) + (n_2 \times x_2) + ... + (n_k \times x_k)}{N}$$

5.2 La Médiane (Me) : la justice du milieu

La **médiane** est la valeur centrale qui coupe la population ordonnée en deux groupes d'effectifs rigoureusement égaux :

- Au moins 50% des individus ont une valeur inférieure ou égale à la médiane.
- Au moins 50% des individus ont une valeur supérieure ou égale à la médiane.

Méthode — Comment déterminer la médiane d'une série

1.

Range **obligatoirement** les valeurs dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand). 2. Calcule la moitié de l'effectif total : $\frac{N}{2}$.

- **Cas 1 : N est impair ($N = 2k + 1$) :** La médiane est la valeur située exactement au rang $k + 1$. *(Exemple : $N = 7 \Longrightarrow \frac{7}{2} = 3,5$. La médiane est la 4e valeur).*
- **Cas 2 : N est pair ($N = 2k$) :** La médiane est la demi-somme (la moyenne) entre la k-ième et la $(k + 1)$-ième valeur. *(Exemple : $N = 8 \Longrightarrow \frac{8}{2} = 4$. Médiane $= \frac{4 \text{ e valeur } + 5 \text{ e valeur}}{2}$).*

5.3 L'Étendue (E) : la mesure de l'écart

L'**étendue** mesure la dispersion des résultats, c'est-à-dire l'écartement extrême de la série :

$$E = \text{Valeur maximale} - \text{Valeur minimale}$$

Une faible étendue indique que les valeurs sont très resserrées (série homogène). Une grande étendue montre une forte disparité.

---

6. Attention aux pièges !

Attention au Piège !

Attention, piège ! — Les illusions classiques

1.

Le piège de la hausse suivie de la baisse : *« Si un article augmente de 20% puis baisse de 20%, revient-il à son prix initial ? »* **NON, JAMAIS !** Testons avec un prix initial de 100 € :

- Hausse de $20\% \Longrightarrow 100 \times 1,20 = 120$ €.
- Baisse de 20% sur les 120 € $\Longrightarrow 120 \times (1 - 0,20) = 120 \times 0,80 = \mathbf{96}$ € ! On a perdu 4 € au passage, car la baisse de 20% s'applique sur un montant plus grand !

2. **Additionner des pourcentages de groupes différents :** Si une classe de 20 élèves compte 50% de filles et une autre classe de 30 élèves compte 40% de filles, la proportion globale n'est PAS de $50\% + 40\% = 90\%$, ni de $\frac{50+40}{2} = 45\%$! Il faut compter les personnes réelles : $10 + 12 = 22$ filles sur 50 élèves, soit $\frac{22}{50} = 44\%$.
3. **Confondre moyenne et médiane :** Dans une petite entreprise de 5 personnes, 4 ouvriers gagnent $1\,500$ € par mois et le grand patron gagne $21\,000$ €.
   - Salaire moyen : $\frac{4 \times 1500 + 21000}{5} = \frac{27000}{5} = \mathbf{5\,400}$ € !
   - Salaire médian : la 3e personne gagne $\mathbf{1\,500}$ €. La moyenne donne l'illusion trompeuse que tout le monde est riche. La médiane montre la réalité de la majorité des employés !

---

7. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Appliquer un pourcentage dans une recette

Pour fabriquer $1,2\ \text{kg}$ de pâte à brioche, un boulanger utilise 55% de farine, 20% de beurre, 15% d'œufs et 10% de sucre et levure. Quelle masse de beurre (en grammes) doit-il peser ?

Solution : - Convertissons la masse totale en grammes : $1,2\ \text{kg} = 1\,200\ \text{g}$. - La proportion de beurre est de 20%. - Calcul :

$$\text{Masse de beurre} = 1\,200 \times \frac{20}{100} = 1\,200 \times 0,20 = 240\ \text{grammes}$$

Le boulanger doit peser $240\ \text{g}$ de beurre. ✓

Exemple résolu 2 — Calculer un taux d'admission

Dans un collège, 138 élèves de troisième se sont présentés à l'examen du brevet des collèges. 124 d'entre eux ont été admis. Quel est le taux de réussite de ce collège ? Arrondir au dixième de pourcentage.

Solution : - Effectif admis (la partie) : $A = 124$. - Effectif total (le tout) : $T = 138$. - Calcul du taux :

$$t = \frac{A}{T} \times 100 = \frac{124}{138} \times 100 \approx 0,89855 \times 100 \approx 89,9\%$$

Le taux de réussite au brevet est de $89,9\%$. ✓

Exemple résolu 3 — Les soldes d'hiver et le coefficient multiplicateur

Un magasin de sport applique une démarque de 40% sur une paire de baskets affichée initialement à $115\ €$. Quel est le nouveau prix soldé des baskets ?

Solution : - Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 40% est :

$$C = 1 - \frac{40}{100} = 1 - 0,40 = 0,60$$

- Nouveau prix :

$$\text{Prix soldé} = 115 \times 0,60 = 69\ €$$

La paire de baskets coûte désormais $69\ €$. ✓

Exemple résolu 4 — Tableau statistique complet d'un contrôle

Voici les notes sur 20 obtenues par les 25 élèves d'une classe de 5e :

Note (x_i)	8	10	12	14	16	18	Total
Effectif (n_i)	3	5	7	6	3	1	25
Fréquence en $\%$	?	?	?	?	?	?	100%
Angle en degrés	?	?	?	?	?	?	$360°$

1. Compléter le tableau des fréquences et des angles pour un diagramme circulaire.
2. Calculer la note moyenne de la classe.
3. Déterminer la note médiane et l'étendue.

Solution : 1. Pour chaque colonne, la fréquence est $\frac{n_i}{25} \times 100$ et l'angle est $\frac{n_i}{25} \times 360°$:

- Pour la note 8 : Fréquence $= \frac{3}{25} \times 100 = 12\%$; Angle $= 0,12 \times 360° = 43,2°$.
- Pour la note 10 : Fréquence $= \frac{5}{25} \times 100 = 20\%$; Angle $= 0,20 \times 360° = 72°$.
- Pour la note 12 : Fréquence $= \frac{7}{25} \times 100 = 28\%$; Angle $= 0,28 \times 360° = 100,8°$.
- Pour la note 14 : Fréquence $= \frac{6}{25} \times 100 = 24\%$; Angle $= 0,24 \times 360° = 86,4°$.
- Pour la note 16 : Fréquence $= \frac{3}{25} \times 100 = 12\%$; Angle $= 0,12 \times 360° = 43,2°$.
- Pour la note 18 : Fréquence $= \frac{1}{25} \times 100 = 4\%$; Angle $= 0,04 \times 360° = 14,4°$.

2. **Moyenne pondérée :**

$$\bar{x} = \frac{3 \times 8 + 5 \times 10 + 7 \times 12 + 6 \times 14 + 3 \times 16 + 1 \times 18}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{24 + 50 + 84 + 84 + 48 + 18}{25} = \frac{308}{25} = 12,32$$

La moyenne de la classe est de $12,32/20$.

3. **Médiane et Étendue :**
   - L'effectif total est $N = 25$ (impair).
   - $\frac{25+1}{2} = 13$. La médiane est la **13e note** de la liste ordonnée.
   - Cumulons les effectifs :
     - Jusqu'à 8 : 3 élèves.
     - Jusqu'à 10 : $3 + 5 = 8$ élèves.
     - Jusqu'à 12 : $8 + 7 = 15$ élèves. La 13e note se trouve dans le groupe des 12 ! Donc la note médiane est $Me = \mathbf{12}$.
   - **Étendue :** $E = 18 - 8 = \mathbf{10}$ points. ✓

Exemple résolu 5 — Deux augmentations successives

Le prix du carburant augmente de 10% au mois de janvier, puis augmente à nouveau de 10% au mois de février. 1. Quel est le pourcentage total d'augmentation sur ces deux mois ? 2. Quel prix atteint un litre affiché au départ à $1,50$ € ?

Solution : 1. Calculons le coefficient multiplicateur global en multipliant les coefficients :

$$C_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10$$

$$C_2 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10$$

$$C_{\text{global}} = C_1 \times C_2 = 1,10 \times 1,10 = 1,21$$

Or $1,21 = 1 + \frac{21}{100}$. La hausse totale n'est pas de 20%, mais de $\mathbf{21\%}$! 2. Prix final du litre :

$$P_{\text{final}} = 1,50 \times 1,21 = 1,815 \text{ €} \approx 1,82 \text{ €}$$

Le litre coûte désormais $1,815$ €. ✓

Ce qu'il faut retenir

1. **Pourcentage :**
   - $t\% = \frac{t}{100}$.
   - Prendre $p\%$ de Q : $Q \times \frac{p}{100}$.
   - Calculer un pourcentage : $\frac{\text{Partie}}{\text{Total}} \times 100$.
2. **Coefficients multiplicateurs :**
   - Augmentation de $t\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$.
   - Diminution de $t\%$: $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
   - Pour des évolutions successives : on **multiplie** les coefficients ($C_{\text{total}} = C_1 \times C_2$).
3. **Statistiques :**
   - **Fréquence :** $f = \frac{\text{effectif}}{N}$.
   - **Angle circulaire :** $\text{angle} = f \times 360°$.
   - **Moyenne :** la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total.
   - **Médiane :** la valeur qui sépare la série ordonnée en deux moitiés égales ($50\%/50\%$).
   - **Étendue :** $\text{valeur maximale} - \text{valeur minimale}$.

Exercices

Niveau (Application directe)

Exercice 21.1 Écris chaque pourcentage sous la forme d'une fraction simplifiée puis d'un nombre décimal : 10% ; 20% ; 25% ; 50% ; 75% ; 5%.

Exercice 21.2 Calcule mentalement : 1. 50% de 84 € 2. 25% de 120 kg 3. 10% de 350 m 4. 1% de $2\,500$ habitants

Exercice 21.3 Donne le coefficient multiplicateur associé à : 1. Une hausse de 12% 2. Une baisse de 25% 3. Une augmentation de $3,5\%$ 4. Une remise exceptionnelle de 50%

Exercice 21.4 Dans une boîte de 40 chocolats, il y a 14 chocolats noirs. Quel est le pourcentage de chocolats noirs dans la boîte ?

Exercice 21.5 Calcule la moyenne simple des cinq notes suivantes : 11 ; 14 ; 09 ; 17 ; 14.

Niveau (Problèmes et graphiques)

Exercice 21.6 Le smartphone soldé. Un téléphone portable coûte 340 €. Pendant les soldes, son prix diminue de 15%. 1. Quel est le montant de l'économie réalisée en euros ? 2. Quel est le nouveau prix du téléphone ?

Exercice 21.7 Facture d'électricité. Sur une facture d'électricité de 150 € hors taxes, l'État applique une TVA de 20%. Quel est le montant total toutes taxes comprises (TTC) payé par le client ?

Exercice 21.8 L'évolution trompeuse. Le prix d'un billet de train augmente de 25%. Quelques mois plus tard, la compagnie ferroviaire annonce une promotion de « 25% de réduction immédiate ». Un voyageur pense que le billet est revenu à son prix de départ. A-t-il raison ? Justifie par un calcul précis en prenant un billet qui coûtait 100 € au début.

Exercice 21.9 Déterminer la médiane (cas pair et impair). Détermine la médiane et l'étendue de chacune des deux séries de températures relevées à midi :

- Semaine A : 14° C ; 17° C ; 12° C ; 19° C ; 21° C ; 15° C ; 18° C.
- Semaine B : 13° C ; 16° C ; 11° C ; 20° C ; 14° C ; 18° C.

Exercice 21.10 Le diagramme circulaire des animaux de compagnie. Une enquête menée auprès de 180 foyers d'un quartier donne les résultats suivants :

- 72 foyers ont un chien.
- 54 foyers ont un chat.
- 36 foyers ont des rongeurs ou oiseaux.
- 18 foyers n'ont aucun animal.

1. Calcule la fréquence de chaque catégorie en pourcentage.
2. Calcule l'angle en degrés correspondant à chaque catégorie pour construire un diagramme circulaire.

Exercice 21.11 Moyenne coefficientée au collège. Un élève a obtenu les notes suivantes en mathématiques ce trimestre :

- Deux interrogations courtes (coefficient 1) : 12 et 15.
- Deux devoirs surveillés importants (coefficient 3) : 14 et 10.

Quelle est sa moyenne trimestrielle ?

Niveau (Défis et esprit critique)

Exercice 21.12 Le mystère du salaire moyen de l'usine. Une petite usine emploie 20 personnes réparties ainsi :

- 1 directeur général payé $10\,000$ € par mois.
- 3 ingénieurs payés chacun $4\,000$ € par mois.
- 16 ouvriers payés chacun $1\,500$ € par mois.

1. Calcule le salaire moyen dans cette entreprise.
2. Calcule le salaire médian.
3. Pourquoi un syndicat d'ouvriers et le directeur général n'utiliseront-ils pas le même indicateur lors des négociations salariales ? Explique le pouvoir de manipulation de la moyenne.

Exercice 21.13 Retrouver le prix initial (la marche arrière). Après une réduction de 20% pendant les soldes, un manteau d'hiver coûte 120 €. Quel était son prix initial avant la remise ? *(Attention piège : ne calcule surtout pas* $120 + 20\%$ *de 120 ! Utilise le coefficient multiplicateur).*

Exercice 21.14 Évolutions successives et taux global. Le prix d'une console de jeux augmente de 5% en 2024, puis de 8% en 2025. 1. Quel est le taux global d'augmentation sur les deux ans réunis ? 2. Si le prix baisse ensuite de 12% en 2026, la console est-elle finalement plus chère ou moins chère qu'au début de l'année 2024 ?

Exercice 21.15 Le paradoxe de Simpson. Dans un hôpital, deux chirurgiens (Dr Martin et Dr Dupont) réalisent deux types d'opérations : des opérations bénignes (simples) et des opérations à haut risque (difficiles).

- Pour les opérations simples :
  - Dr Martin réussit 95 opérations sur 100 (95%).
  - Dr Dupont réussit 19 opérations sur 20 (95%).
- Pour les opérations difficiles :
  - Dr Martin réussit 10 opérations sur 20 (50%).
  - Dr Dupont réussit 45 opérations sur 100 (45%).

1. Pour les opérations difficiles, quel chirurgien a le meilleur taux de réussite ?
2. Calcule maintenant le taux de réussite global de chaque chirurgien toutes opérations confondues.
3. Quel chirurgien a le meilleur taux global ? Que remarques-tu d'incroyable ? Explique ce paradoxe.

Solutions

Solution 21.1 - $10\% = \frac{1}{10} = 0,10$ - $20\% = \frac{1}{5} = 0,20$ - $25\% = \frac{1}{4} = 0,25$ - $50\% = \frac{1}{2} = 0,50$ - $75\% = \frac{3}{4} = 0,75$ - $5\% = \frac{1}{20} = 0,05$

Solution 21.2 1. $84/2 = 42$ €. 2. $120/4 = 30$ kg. 3. $350/10 = 35$ m. 4. $2\,500/100 = 25$ habitants.

Solution 21.3 1. $1 + 0,12 = 1,12$. 2. $1 - 0,25 = 0,75$. 3. $1 + 0,035 = 1,035$. 4. $1 - 0,50 = 0,50$.

Solution 21.4 Taux $= \frac{14}{40} \times 100 = \frac{7}{20} \times 100 = 35\%$.

Solution 21.5 Somme $= 11 + 14 + 9 + 17 + 14 = 65$. Moyenne $= \frac{65}{5} = 13/20$.

Solution 21.6 1. Économie : $340 \times 0,15 = 51$ €. 2. Nouveau prix : $340 - 51 = 289$ € (ou $340 \times 0,85 = 289$ €).

Solution 21.7 Montant TTC $= 150 \times (1 + 0,20) = 150 \times 1,20 = 180$ €.

Solution 21.8 Prix initial : 100 €. Après hausse de 25% : $100 \times 1,25 = 125$ €. Après baisse de 25% : $125 \times (1 - 0,25) = 125 \times 0,75 = 93,75$ €. Le voyageur a tort : le billet coûte $93,75$ €, soit $6,25$ € de moins que le prix de départ !

Solution 21.9 - **Semaine A (7 valeurs) :** Ordre croissant : $12, 14, 15, \mathbf{17}, 18, 19, 21$. Médiane $= \mathbf{17}^\circ$ C (la 4e valeur). Étendue $= 21 - 12 = 9^\circ$ C.

- **Semaine B (6 valeurs) :** Ordre croissant : $11, 13, \mathbf{14}, \mathbf{16}, 18, 20$. Médiane $= \frac{14+16}{2} = \mathbf{15}^\circ$ C. Étendue $= 20 - 11 = 9^\circ$ C.

Solution 21.10 Effectif total $N = 180$. 1. Fréquences :

- Chiens : $\frac{72}{180} = 40\%$.
- Chats : $\frac{54}{180} = 30\%$.
- Rongeurs/oiseaux : $\frac{36}{180} = 20\%$.
- Aucun : $\frac{18}{180} = 10\%$.

2. Angles :
   - Chiens : $0,40 \times 360^\circ = 144^\circ$.
   - Chats : $0,30 \times 360^\circ = 108^\circ$.
   - Rongeurs/oiseaux : $0,20 \times 360^\circ = 72^\circ$.
   - Aucun : $0,10 \times 360^\circ = 36^\circ$.

Solution 21.11 Somme des coefficients : $1 + 1 + 3 + 3 = 8$. Moyenne $= \frac{1\times12+1\times15+3\times14+3\times10}{8} = \frac{12+15+42+30}{8} = \frac{99}{8} = 12,375/20$.

Solution 21.12 1. Somme des salaires : $1 \times 10\,000 + 3 \times 4\,000 + 16 \times 1\,500 = 10\,000 + 12\,000 + 24\,000 = 46\,000$ €. Salaire moyen : $\frac{46\,000}{20} = \mathbf{2\,300}$ €. 2. Effectif total $N = 20$. Les 16 premiers salaires sont de $1\,500$ €. La 10e et la 11e valeur sont toutes deux de $1\,500$ €. Salaire médian : $\mathbf{1\,500}$ €. 3. Le directeur mettra en avant le salaire

moyen (2 300 €) pour affirmer : *« Nos salariés sont très bien payés en moyenne »*, alors que 80% d'entre eux ne gagnent que 1 500 € ! Les syndicats s'appuieront sur la médiane pour dénoncer que la moitié au moins des employés est au salaire de base.

Solution 21.13 Soit P_0 le prix initial. Une baisse de 20% correspond à la multiplication par $1 - 0,20 = 0,80$. $P_0 \times 0,80 = 120 \Longrightarrow P_0 = \frac{120}{0,80} = \frac{1\,200}{8} = 150$ €. Le prix initial était de 150 € ! (Vérification : $150 - 20\%$ de $150 = 150 - 30 = 120$ €).

Solution 21.14 1. $C_{\text{global}} = (1 + 0,05) \times (1 + 0,08) = 1,05 \times 1,08 = 1,134$. Hausse globale : $1,134 - 1 = 0,134 = +\mathbf{13},\mathbf{4}\%$ (et non 13%). 2. Avec la baisse de 12% ($C_3 = 0,88$) : $C_{\text{final}} = 1,134 \times 0,88 = 0,99792$. Puisque $0,99792 < 1$, la console est finalement **légèrement moins chère** qu'au départ (baisse finale de $0,208\%$).

Solution 21.15 1. Opérations difficiles : Dr Martin a 50%, Dr Dupont a 45%. C'est **Dr Martin** qui a le meilleur taux. 2. Taux globaux :

- Dr Martin : réussites $= 95 + 10 = 105$ sur un total de $100 + 20 = 120$ opérations. Taux global $= \frac{105}{120} = 0,875 = \mathbf{87},\mathbf{5}\%$.
- Dr Dupont : réussites $= 19 + 45 = 64$ sur un total de $20 + 100 = 120$ opérations. Taux global $= \frac{64}{120} \approx 0,533 = \mathbf{53},\mathbf{3}\%$.

3. Dr Martin a un taux global de $87,5\%$ contre $53,3\%$ pour Dr Dupont ! Le paradoxe : pour les opérations simples, ils ont le même taux (95%). Pour les opérations difficiles, Dr Martin est meilleur (50% contre 45%). Et pourtant, globalement, Dr Martin écrase Dr Dupont ! Explication : Dr Martin a fait 83% d'opérations simples (à très fort taux de succès), alors que Dr Dupont a pris en charge 83% d'opérations très risquées. Ce phénomène statistique spectaculaire s'appelle le **paradoxe de Simpson** : un facteur caché (ici, la difficulté des cas traités) fausse la comparaison globale !

La question qui ouvre la suite

Nous voici parvenus au terme du Volume III. Nous savons désormais mesurer la terre, tracer des angles droits au compas et à la corde, calculer des longueurs inaccessibles avec Thalès et Pythagore, nous repérer dans un plan cartésien et résumer des foules de données avec des pourcentages.

Mais jusqu'ici, tous nos nombres étaient connus, ou retrouvés par de simples règles arithmétiques. Que faire lorsqu'un problème cache un nombre secret sous un sac scellé sur une balance, et que ce nombre est mélangé à des opérations complexes ?

Comment inventer une langue nouvelle où les nombres inconnus s'écrivent avec des lettres comme x, et où la balance de justice devient une équation ? C'est le grand passage vers l'adolescence des mathématiques : **le Volume IV et le Sac Mystère sur la Balance d'Al-Khwarizmi** !

VOLUME IV — L'ALCHIMIE DES SYMBOLES ET LE FEU ALGÉBRIQUE

13 - 15 ans / 4e - 3e

L'émergence des équations littérales, des puissances, des fonctions affines et des statistiques prépare l'entrée au lycée.

Chapitres du Volume IV :

Chapitre 22 : Le Sac Mystère sur la Balance d'Al-Khwarizmi
Chapitre 23 : Le Carré Complété et les Identités Remarquables
Chapitre 24 : Les Deux Marchands et les Inégalités
Chapitre 25 : La Machine à Doubler et la Droite du Tarif
Chapitre 26 : Le Pliage de Papier et le Miroir Magique
Chapitre 27 : Le Découpage des Terres et la Boîte du Potier
Chapitre 28 : Ératosthène et le Tour de la Terre
Chapitre 29 : Le Partage d'Euclide
Chapitre 30 : La Roulette du Destin et la Survie du Chasseur

En regard : L'invariance d'échelle et la géométrie fractale du Chou Romanesco (Brassica oleracea).

CHAPITRE 22 : Le Sac Mystère sur la Balance d'Al-Khwarizmi

> « L'ignorant force la serrure et déchire le sac pour voir ce qui est caché. Le mathématicien regarde les deux bras de la balance, retire un poids à gauche, un poids à droite, et l'inconnue se dévoile d'elle-même dans la lumière de la raison. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi on se met soudain à **calculer avec des lettres**, et ce que veut dire exactement « $3x$ », « x^2 » ou « $a(b+c)$ ».
- Comment **réduire** une expression (ranger les pommes avec les pommes) et comment **développer** grâce à la **distributivité**, prouvée avec un simple rectangle.
- Comment **tester une égalité** : vraie pour une valeur, vraie pour toutes, ou fausse — et le pouvoir d'un seul **contre-exemple**.
- Comment résoudre n'importe quelle **équation du premier degré** avec les deux gestes de la balance.
- Comment **mettre un problème en équation** : âges, périmètres, programmes de calcul, et même l'énigme du tombeau de Diophante.
- Les **pièges** classiques : $2x + 3 \neq 5x$, $x \times x \neq 2x$, le signe « $-$ » devant une parenthèse, et les équations qui n'ont… aucune solution, ou une infinité.

---

1. Le problème : le Grand Bazar de Bagdad et le Sac d'Or

Tu as maintenant douze ou treize ans. Quittons les plaines d'Égypte, franchissons les sables du désert et entrons dans la plus fabuleuse métropole du monde médiéval : **Bagdad**, la « Cité de la Paix », vers l'an **820**.

Au cœur de la ville se dresse la *Maison de la Sagesse* (*Bayt al-Hikma*), une immense bibliothèque où des savants venus de Perse, d'Inde et de Grèce traduisent en arabe tous les manuscrits du monde : Euclide, Ptolémée, les astronomes indiens… Mais aujourd'hui, une foule animée se presse au grand bazar des orfèvres.

Au centre d'un cercle de marchands curieux, un homme drapé dans un manteau de brocart vert a posé sur une table une magnifique **balance en laiton à deux plateaux**.

- Sur le plateau de gauche, il dépose **un sac de toile brune solidement cousu**, scellé par un cachet de cire rouge. Personne ne sait ce qu'il contient ! À côté du sac, il pose **3 lingots de cuivre** pesant chacun un kilo.
- Sur le plateau de droite, il dépose **11 lingots de cuivre** d'un kilo.

Le fléau de la balance oscille lentement… et s'immobilise, **parfaitement horizontal**.



Fig. 65. – La balance d'Al-Khwarizmi et l'équilibre des équations

« Ce sac contient de la poudre d'or pur. Celui qui me dira son poids exact sans briser le cachet repartira avec tout l'or ! Mais celui qui se trompe d'un seul gramme me donnera sa monture ! »

Personne n'ose risquer son cheval. C'est alors qu'un astronome persan s'avance d'un pas tranquille : **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi**.

« La vérité est déjà sous vos yeux. Les deux plateaux sont en équilibre. Si je retire la même chose des deux côtés en même temps, la balance restera-t-elle droite ? » — « Bien sûr ! » répond la foule.

De la main gauche, il retire les **3 lingots** du plateau de gauche : le plateau s'allège et monte. Mais aussitôt, de la main droite, il retire **3 lingots** du plateau de droite. Le fléau redescend et se fige à nouveau, **horizontal**.

À gauche : le sac, tout seul. À droite : $11 - 3 = 8$ lingots. *« Le sac pèse huit kilos. »* Le marchand pâlit, brise le cachet, pèse le sac seul : **huit kilos pile**.

Jusqu'ici, rien que tu ne saches déjà faire « de tête ». Mais le lendemain, le marchand revient, vexé, avec des énigmes de plus en plus retorses : deux sacs identiques et 5 kg contre 17 kg ; trois sacs et 2 kg contre un sac et 10 kg ; puis des sacs dont il retire une partie du contenu… Au bout de quelques énigmes, le calcul de tête ne suffit plus. Il faut **une langue** pour écrire ces balances et **des règles** pour les manipuler sans se tromper. Cette langue, c'est le **calcul littéral**. Ces règles, ce sont celles de l'**algèbre**.

---

2. Calculer avec des lettres : pourquoi et comment

2.1 La lettre est un nombre qui se cache

Une lettre, en mathématiques, n'est **pas** un mot ni une abréviation d'unité. C'est **un nombre** dont on ne connaît pas (encore) la valeur, ou dont la valeur peut changer.

- Quand la lettre représente un nombre précis mais **inconnu** (le poids du sac), on l'appelle une **inconnue**.
- Quand la lettre peut prendre **n'importe quelle valeur** (le côté d'un carré quelconque), on l'appelle une **variable**.

Tu connais déjà des formules avec des lettres : le périmètre d'un carré de côté c est $4 \times c$; l'aire d'un rectangle est $L \times \ell$. Ces formules disent quelque chose de vrai **pour tous les carrés**, pour **tous les rectangles**, d'un seul coup. C'est la grande force des lettres : **une seule phrase pour une infinité de cas**.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Expression littérale.** Une *expression littérale* est une suite de calculs dans laquelle certains nombres sont remplacés par des lettres. Exemples : $3x + 5$; $2(a - 4)$; $x^2 - 7x + 1$.

2.2 Les conventions d'écriture (et comment les lire)

Pour aller plus vite, les mathématiciens se sont mis d'accord sur quelques abréviations. Chacune a une lecture à voix haute.

On écrit	Cela signifie	On lit
$3x$	$3 \times x$	« trois x »
ab	$a \times b$	« a b »
$4(x+1)$	$4 \times (x+1)$	« quatre facteur de x plus un » ou « quatre fois parenthèse x plus un »
x^2	$x \times x$	« x au carré » ou « x deux »
x^3	$x \times x \times x$	« x au cube »
$1x$	s'écrit simplement x	« x »
$-1x$	s'écrit simplement $-x$	« moins x »
$0x$	vaut 0	—

Règles de sécurité :

- On **ne supprime jamais** le signe $\times$ entre **deux nombres** : 3×5 ne s'écrit surtout pas 35 !

- Par habitude, on écrit le **nombre devant la lettre** : $x \times 3$ s'écrit $3x$ (et non $x3$).
- Les priorités opératoires du chapitre 18 s'appliquent toujours : puissances d'abord, puis multiplications, puis additions. Ainsi $3x^2$ veut dire $3 \times (x \times x)$ et **pas** $(3x) \times (3x)$.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Qui a inventé les lettres ?**

Al-Khwarizmi, lui, n'écrivait **aucun symbole** ! Tout était rédigé en phrases : « un bien et dix racines égalent trente-neuf dirhams » (ce que nous écrivons $x^2 + 10x = 39$). Il appelait l'inconnue *shay'* (« la chose »). Vers 250, le Grec **Diophante** utilisait déjà des abréviations. En 1591, le Français **François Viète**, conseiller du roi Henri IV et déchiffreur de codes secrets, a eu l'idée décisive : désigner les inconnues par des voyelles et les nombres connus par des consonnes. Enfin, en 1637, **René Descartes**, dans *La Géométrie*, prend les dernières lettres de l'alphabet x, y, z pour les inconnues et les premières a, b, c pour les nombres connus : c'est notre convention actuelle. On raconte souvent que le x viendrait du mot arabe *shay'* transcrit en espagnol *xei* ; c'est une jolie légende, mais aucun document ne la prouve vraiment.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Les signes $+$ et $-$ apparaissent imprimés en 1489 dans un livre d'arithmétique commerciale de l'Allemand Johannes Widmann. Le signe $=$ a été inventé en 1557 par le Gallois **Robert Recorde**, qui en avait assez d'écrire « est égal à » : il choisit deux traits parallèles de même longueur, « car aucune chose ne peut être plus égale que deux droites parallèles ».

2.3 Calculer la valeur d'une expression (substituer)

Substituer, c'est remplacer la lettre par un nombre. Le geste est simple, mais il exige une précaution : **remettre les signes $\times$** et **mettre les nombres négatifs entre parenthèses**.

Exemple résolu 1 — Calculer une expression pour plusieurs valeurs.

Soit $A = 3x^2 - 5x + 2$. Calculer A pour $x = 4$, puis pour $x = -2$.

Pour $x = 4$: $A = 3 \times 4^2 - 5 \times 4 + 2 = 3 \times 16 - 20 + 2 = 48 - 20 + 2 = 30$.

Pour $x = -2$: $A = 3 \times (-2)^2 - 5 \times (-2) + 2 = 3 \times 4 + 10 + 2 = 24$.

Remarque : $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$ (règle des signes du chapitre 20), et $-5 \times (-2) = +10$.

Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Le carré et le signe moins.**

- $-x^2$ veut dire « l'opposé de x^2 ». Pour $x = 3$: $-x^2 = -9$.
- $(-x)^2$ veut dire « le carré de l'opposé de x ». Pour $x = 3$: $(-3)^2 = 9$.
- Pour $x = -2$, $3x^2 = 3 \times 4 = 12$, mais $(3x)^2 = (-6)^2 = 36$. La puissance ne s'applique **qu'à ce qui est juste avant elle**.
- Et $x \times x = x^2$, **pas** $2x$! Pour $x = 5$: $x^2 = 25$ alors que $2x = 10$.

---

3. Réduire : ranger les pommes avec les pommes

Imagine un étal du bazar : « 5 melons, 3 dattes, 2 melons, 7 dattes ». Tout marchand dira : « 7 melons et 10 dattes ». Il **regroupe ce qui est de même nature**. Mais il ne dira jamais « 17 melons-dattes » !

En calcul littéral, c'est pareil. $5x + 3 + 2x + 7$ se range en $7x + 10$. Les « x » vont avec les « x », les nombres seuls avec les nombres seuls. Mais $7x + 10$ ne peut pas devenir $17x$: ce ne sont pas des objets de même nature.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Termes semblables, réduire.**

- Dans une somme, chaque morceau séparé par $+$ ou $-$ est un **terme**. Dans $5x^2 - 3x + 8$, les termes sont $5x^2$, $-3x$ et 8.
- Le nombre placé devant la partie littérale s'appelle le **coefficient** : dans $-3x$, le coefficient est -3.
- Deux termes sont **semblables** s'ils ont **exactement la même partie littérale** : $4x$ et $-7x$ sont semblables ; $3x^2$ et x^2 aussi ; mais $3x$ et $3x^2$ **ne le sont pas**.
- **Réduire** une expression, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients, jusqu'à obtenir une écriture la plus courte possible.

Pourquoi a-t-on le droit d'écrire $5x + 2x = 7x$? Parce que $5x + 2x$, c'est « 5 sacs plus 2 sacs », donc 7 sacs. Nous le prouverons dans un instant avec la distributivité.

Exemple résolu 2 — Réduire.

a) $B = 5x + 3 - 2x + 7$. On regroupe : $(5x - 2x) + (3 + 7) = 3x + 10$.

b) $C = 4x^2 - 3x + x^2 + 7x - 1$. Les x^2 : $4x^2 + x^2 = 5x^2$. Les x : $-3x + 7x = 4x$. Les nombres : -1. Donc $C = 5x^2 + 4x - 1$.

c) $D = 2a \times 3a$. Ici c'est un **produit** : on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles : $2 \times 3 \times a \times a = 6a^2$.

d) $E = 2a + 3a = 5a$ (somme), alors que $2a \times 3a = 6a^2$ (produit). Ne confonds jamais les deux !

Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Ce qu'on ne peut pas réduire.**

- $2x + 3$ **ne vaut pas** $5x$. Test : pour $x = 10$, $2x + 3 = 23$ mais $5x = 50$.
- $x^2 + x$ **ne vaut pas** x^3 ni $2x^2$. Test : pour $x = 2$, $x^2 + x = 6$, $x^3 = 8$, $2x^2 = 8$.
- $3x^2 + 2x^2 = 5x^2$, **et non** $5x^4$: on additionne des « paquets de x^2 », on ne multiplie rien.

---

4. La distributivité : un rectangle qui ne ment pas

4.1 L'idée

Un orfèvre vend des colliers. Chaque collier contient a perles d'or et b perles d'argent. Une cliente en commande 3. Combien de perles en tout ? On peut compter collier par collier : $3 \times (a + b)$. Ou bien compter toutes les perles d'or, puis toutes les perles d'argent : $3a + 3b$. Le nombre de perles est le même ! Donc $3(a + b) = 3a + 3b$.

4.2 La preuve par le rectangle

Dessine un rectangle de hauteur k et de longueur $a + b$, coupé en deux.

Règle Fondamentale — Aperçu Géométrique de la Distributivité Simple

- a b
- k aire k×a aire k×b
- a + b

L'aire du grand rectangle est $k \times (a + b)$. Mais c'est aussi la somme des aires des deux petits : $k \times a + k \times b$. **Une même surface, deux façons de la calculer** : elles sont donc égales.

📐 Propriété — Distributivité simple.

Pour tous nombres k, a, b :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad \text{et} \qquad k(a-b) = ka - kb.$$

Lu de gauche à droite, on **développe** (on transforme un produit en somme). Lu de droite à gauche, on **factorise** (on transforme une somme en produit, en mettant en évidence le **facteur commun** k).

Le mot « distributivité » vient de l'image du facteur k qui est **distribué** à chaque terme de la parenthèse, comme un facteur des postes distribue une lettre dans chaque boîte.

Et voici la preuve promise de $5x + 2x = 7x$: c'est la distributivité lue à l'envers, $5x + 2x = (5+2)x = 7x$.

✏️ Exemple résolu 3 — Développer et réduire.

a) $3(2x - 5) = 3 \times 2x - 3 \times 5 = 6x - 15$.

b) $-2(x - 4) = (-2) \times x - (-2) \times 4 = -2x + 8$. (Attention aux signes : $-2 \times (-4) = +8$.)

c) $x(x + 3) = x \times x + x \times 3 = x^2 + 3x$.

d) $F = 4(x+2) - 3(2x-1) = 4x + 8 - 6x + 3 = -2x + 11$.

4.3 Le signe « moins » devant une parenthèse

Une parenthèse précédée de $-$ cache en réalité un facteur -1 : $-(a+b) = (-1) \times (a+b) = -a - b$. Conséquence :

📐 Règle — Supprimer des parenthèses.

- Précédée de $+$: on enlève les parenthèses **sans rien changer**. $7 + (3x - 2) = 7 + 3x - 2$.
- Précédée de $-$: on enlève les parenthèses **en changeant le signe de chaque terme** à l'intérieur. $7 - (3x - 2) = 7 - 3x + 2 = 9 - 3x$.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** L'erreur la plus fréquente du collège : écrire $7 - (3x - 2) = 7 - 3x - 2$. On a oublié de changer le signe du **deuxième** terme. Test avec $x = 0$: $7 - (0 - 2) = 9$, mais $7 - 0 - 2 = 5$. Le test démasque l'erreur en deux secondes.

4.4 Factoriser : le chemin du retour

✏️ Exemple résolu 4 — Factoriser par un facteur commun.

a) $6x + 9$: $6x = 3 \times 2x$ et $9 = 3 \times 3$. Facteur commun 3 : $6x + 9 = 3(2x + 3)$.

b) $5x^2 - 10x$: $5x^2 = 5x \times x$ et $10x = 5x \times 2$. Facteur commun $5x$: $5x^2 - 10x = 5x(x - 2)$.

c) $7a + 7 = 7 \times a + 7 \times 1 = 7(a + 1)$. Ne pas oublier le « 1 » !

Vérification systématique : on redéveloppe. $5x(x-2) = 5x^2 - 10x$ ✓.

Pourquoi factoriser ? Parce qu'un **produit** est souvent plus facile à étudier qu'une somme. Tu le verras au chapitre suivant, où la factorisation permettra de résoudre des équations qu'aucune balance ne sait résoudre.

CHAPITRE 23 : Le Carré Complété et les Identités Remarquables

> « Ne récite pas une formule d'algèbre comme une incantation magique. Ferme les yeux et regarde le carrelage du sol : coupe un rectangle, déplace un coin, complète le carré manquant. Les lettres ne sont rien d'autre que les côtés de formes qui s'emboîtent sous tes doigts. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment la **double distributivité** s'explique en coupant un rectangle en quatre parcelles de terre : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Les **trois identités remarquables**, démontrées sous tes yeux par de purs découpages géométriques de carrés et de rectangles.
- L'art du **calcul mental fulgurant** : calculer 101^2, 99^2 ou 48×52 en deux secondes sans calculatrice.
- La **factorisation** : le chemin du retour, où l'on transforme une somme en produit en dénichant le facteur commun caché ou l'empreinte d'une identité remarquable.
- L'**équation produit nul** : la clé magique pour résoudre des équations du second degré sans paniquer.
- La résolution complète de l'équation $x^2 = a$ selon le signe de a, et pourquoi un carré ne peut jamais valoir un nombre négatif.
- L'astuce historique grandiose d'**Al-Khwarizmi** : le « carré complété » qui a fondé l'algèbre mondiale il y a douze siècles.

---

1. Le problème : le jardin du calife et le coin manquant

Au printemps de l'an 825, dans les jardins suspendus du palais califal de Bagdad, le maître jardinier fait face à un casse-tête. Le calife désire agrandir son verger carré.

Le verger actuel est un carré de côté inconnu x mètres. Le calife ordonne : *« Allongez deux côtés opposés de 5 mètres vers le nord, et allongez les deux autres côtés de 5 mètres vers l'est ! »*

Le jardinier s'exécute sur son plan. Le nouveau jardin a pour côté $(x+5)$ mètres. Mais le grand intendant du trésor exige de connaître la formule exacte de l'aire totale pour commander les sacs de graines d'herbe : *« Si le côté initial était x, la nouvelle surface est évidemment $x^2 + 5^2 = x^2 + 25$! »* affirme le vizir sans réfléchir.

Al-Khwarizmi, présent lors de l'entretien, esquisse un sourire et trace une figure dans le sable fin avec la pointe de sa canne de roseau :



Fig. 66. – Preuve géométrique de l'identité remarquable (a+b)²

« Regardez bien, noble vizir », dit Al-Khwarizmi. *« Votre calcul oublie deux immenses bandes de terrain ! Vous avez bien le vieux carré de x^2, et vous avez bien le petit coin carré de $25\ \mathrm{m}^2$. Mais où avez-vous mis la parcelle de $5x$ en haut à droite, et l'autre parcelle de $5x$ en bas à gauche ? »*

L'aire réelle du grand jardin n'est pas $x^2 + 25$, mais :

$$(x+5)^2 = x^2 + 5x + 5x + 25 = x^2 + 10x + 25.$$

Le vizir avait « oublié » $10x$ mètres carrés de gazon — de quoi laisser une moitié du jardin en friche !

Cette erreur est la plus célèbre de toute l'histoire des mathématiques scolaires. Des millions de collégiens la commettent chaque année en écrivant par inadvertance $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

Dans ce chapitre, nous allons graver dans ton esprit, par le dessin et par le raisonnement, pourquoi ces deux morceaux du milieu apparaissent toujours, comment jongler entre développement et factorisation, et comment cette géométrie permet de percer les équations du second degré.

---

2. La double distributivité : quatre parcelles dans un rectangle

Au chapitre 22, tu as vu la **simple distributivité** : multiplier un nombre par une parenthèse, c'est distribuer le multiplicateur à chaque terme :

$$k(a+b) = ka + kb.$$

C'était l'aire d'un rectangle découpé en deux bandes verticales.

Que se passe-t-il si les deux côtés du rectangle sont eux-mêmes découpés en deux morceaux ?

2.1 La preuve par le rectangle

Traçons un rectangle dont la longueur totale mesure $(a+b)$ et dont la largeur totale mesure $(c+d)$.



Fig. 67. – Distributivité de la multiplication sur l'addition

L'aire totale du grand rectangle peut se calculer de deux façons équivalentes : 1. **D'un seul coup :** Longueur $\times$ largeur, soit $(a+b)(c+d)$. 2. **Morceau par morceau :** On fait la somme des aires des 4 parcelles intérieures :

$$ac + ad + bc + bd.$$

Puisque les deux calculs mesurent la même surface, ils sont rigoureusement égaux.

📐 Propriété fondamentale — La double distributivité.

Pour tous nombres relatifs a, b, c, d :

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

Chaque terme de la première parenthèse est multiplié par chaque terme de la seconde parenthèse. Cela produit 4 multiplications.

2.2 La règle des flèches et la gestion des signes

Pour ne rien oublier lors d'un calcul écrit, on visualise mentalement quatre flèches :

1. $a \times c = ac$
2. $a \times d = ad$
3. $b \times c = bc$
4. $b \times d = bd$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! Le signe appartient au terme qui le suit !** Quand une parenthèse contient une soustraction, par exemple $(2x-3)(x+4)$, considère que le premier facteur contient les termes $(+2x)$ et (-3). On applique alors rigoureusement la règle des signes (Chapitre 20) : * $(+2x) \times (+x) = +2x^2$ * $(+2x) \times (+4) = +8x$ * $(-3) \times (+x) = -3x$ * $(-3) \times (+4) = -12$ Puis on **réduit** en regroupant les termes de même nature :

$$(2x-3)(x+4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

---

3. Les trois identités remarquables

Certains produits reviennent si souvent dans les sciences et les calculs qu'on les appelle **remarquables**. Ils méritent d'être mémorisés comme des réflexes absolus. Mais avant de les retenir par cœur, regardons-les vivre sous nos yeux.

3.1 Première identité : le carré d'une somme $(a+b)^2$

Considérons un carré de côté $(a+b)$.

L'aire totale est le carré de son côté : $(a+b)^2$. Cette surface se partage en quatre morceaux naturels :

- un grand carré d'aire a^2 ;
- un petit carré d'aire b^2 ;
- deux rectangles identiques d'aire $a \times b = ab$.

En additionnant ces morceaux, on trouve :

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Le terme $2ab$ s'appelle le **double produit**.

📐 Première identité remarquable — Carré d'une somme.

Pour tous nombres relatifs a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

En français : « Le carré d'une somme est égal au carré du premier, plus le double produit, plus le carré du second. »

3.2 Deuxième identité : le carré d'une différence $(a-b)^2$

Imaginons maintenant un grand carré de côté a, d'aire totale a^2. Nous voulons isoler un carré plus petit, situé dans le coin supérieur gauche, de côté $(a-b)$. Son aire est $(a-b)^2$.



Fig. 68. – Différence de deux carrés : (a+b)(a-b) = a² - b²

Comment obtenir l'aire de ce carré blanc $(a-b)^2$ à partir du grand carré a^2 ? 1. On retire la bande horizontale du bas, de longueur a et de largeur b : son aire est $a \times b = ab$. 2. On retire la bande verticale de droite, de longueur a et de largeur b : son aire est $a \times b = ab$. 3. **Mais attention !** Le petit carré du coin inférieur droit (marqué de xxxx), de côté b et d'aire b^2, faisait partie à la fois de la bande horizontale et de la bande verticale ! En retirant les deux bandes, nous l'avons retiré **deux fois**. 4. Pour rétablir l'équilibre exact, il faut donc **rajouter une fois** ce petit coin b^2.

L'aire restante est donc :

$$(a-b)^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Algébriquement, on retrouve ce résultat en appliquant la double distributivité à $(a-b)(a-b)$:

$$(a-b)(a-b) = a \times a - a \times b - b \times a + (-b) \times (-b) = a^2 - 2ab + b^2.$$

📐 Deuxième identité remarquable — Carré d'une différence.

Pour tous nombres relatifs a et b :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

En français : « Le carré d'une différence est égal au carré du premier, moins le double produit, plus le carré du second. »

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** Dans $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, le dernier terme est **toujours précédé d'un signe $+$** ! En effet, $(-b) \times (-b) = +b^2$. Seul le double produit porte le signe $-$.

3.3 Troisième identité : le produit de la somme par la différence $(a+b)(a-b)$

Partons d'un carré de côté a (aire a^2) auquel on enlève un petit carré de côté b situé dans un coin (aire b^2). La surface qui reste a pour aire $a^2 - b^2$. C'est une forme en « L ».

Découpons cette forme en deux morceaux le long du prolongement d'un côté :

- Le rectangle I de dimensions $(a-b) \times a$.
- Le rectangle restant qu'on peut déplacer et recoller.

Mieux encore : découpons la forme en L et réarrangeons-la en un seul grand rectangle de longueur $(a+b)$ et de largeur $(a-b)$:

L'aire de ce nouveau rectangle est Longueur $\times$ Largeur $= (a+b)(a-b)$. Puisque ce rectangle provient du grand carré a^2 privé du petit carré b^2, les deux aires sont strictement égales !

Algébriquement, par double distributivité :

$$(a+b)(a-b) = a\times a - a\times b + b\times a - b\times b = a^2 - ab + ba - b^2.$$

Les deux termes du milieu s'annulent car $-ab + ba = 0$. Il reste :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

> 📐 **Troisième identité remarquable — Produit d'une somme par une différence.**
>
> Pour tous nombres relatifs a et b :
>
> $$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$
>
> On l'appelle souvent la **différence de deux carrés**.

3.4 Tableau récapitulatif des identités remarquables

Forme factorisée (produit)		Forme développée (somme)	Nom
$(a+b)^2$	$\Leftrightarrow$	$a^2 + 2ab + b^2$	Carré d'une somme
$(a-b)^2$	$\Leftrightarrow$	$a^2 - 2ab + b^2$	Carré d'une différence
$(a+b)(a-b)$	$\Leftrightarrow$	$a^2 - b^2$	Différence de deux carrés

- Aller de gauche à droite ($\rightarrow$) : c'est **développer** (écrire sous forme de somme).
- Aller de droite à gauche ($\leftarrow$) : c'est **factoriser** (écrire sous forme de produit).

3.5 Calcul mental éclair grâce aux identités

Les identités remarquables ne servent pas seulement à manipuler des lettres : elles permettent de réaliser des calculs arithmétiques impressionnants sans brouillon ni calculatrice !

- **Calculer 101^2 :**

$$101^2 = (100+1)^2 = 100^2 + 2\times 100\times 1 + 1^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201.$$

- **Calculer 99^2 :**

$$99^2 = (100-1)^2 = 100^2 - 2\times 100\times 1 + 1^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801.$$

- **Calculer 52×48 :** Remarque que $52 = 50+2$ et $48 = 50-2$!

$$52\times 48 = (50+2)(50-2) = 50^2 - 2^2 = 2\,500 - 4 = 2\,496.$$

- **Calculer 105×95 :**

$$105\times 95 = (100+5)(100-5) = 100^2 - 5^2 = 10\,000 - 25 = 9\,975.$$

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Dans l'Antiquité, les Babyloniens n'avaient pas de tables de multiplication pour tous les nombres. Ils disposaient en revanche de tables gravées de carrés ($1^2, 2^2, 3^2, \ldots$). Pour multiplier deux nombres quelconques x et y, ils utilisaient la formule :
>
> $$x\times y = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4}.$$
>
> En calculant la somme, la différence, et en consultant leur table de carrés, ils trouvaient le produit instantanément !

---

4. La factorisation : retrouver les briques élémentaires

Développer est mécanique : il suffit de distribuer les flèches sans se tromper de signe. **Factoriser**, c'est l'inverse : c'est un travail d'enquêteur. On dispose d'une somme de termes éparpillés, et l'on cherche comment elle a été fabriquée à partir d'un produit.

Pourquoi vouloir à tout prix factoriser ? Parce qu'un produit est infiniment plus facile à étudier qu'une somme :

- Un produit permet de simplifier des fractions algébriques.
- Un produit permet de résoudre des équations complexes grâce à la règle du produit nul.

Il existe deux grandes techniques de factorisation au collège.

4.1 Première technique : la recherche d'un facteur commun

On cherche un nombre, une lettre ou un bloc entre parenthèses qui multiplie **chacun** des termes de la somme.

Cas 1 : Un facteur commun évident (nombre ou lettre seule) - Dans $6x + 15$: on remarque que $6 = 3 \times 2$ et $15 = 3 \times 5$. Le facteur commun est 3.

$$6x + 15 = 3 \times 2x + 3 \times 5 = 3(2x + 5).$$

- Dans $x^2 - 7x$: on remarque que $x^2 = x \times x$ et $7x = 7 \times x$. Le facteur commun est x.

$$x^2 - 7x = x \times x - x \times 7 = x(x - 7).$$

Cas 2 : Une parenthèse entière comme facteur commun Considérons l'expression :

$$A = (3x + 2)(x - 5) + (3x + 2)(2x + 1).$$

L'expression est une somme de deux grands termes. Le bloc $(3x + 2)$ est présent dans les deux termes : c'est notre **facteur commun**.

On le souligne, on l'écrit une seule fois au début, et on ouvre un grand crochet pour ramasser tout ce qui reste :

$$A = \underline{(3x + 2)}(x - 5) + \underline{(3x + 2)}(2x + 1)$$

$$A = \underline{(3x + 2)}[(x - 5) + (2x + 1)]$$

$$A = (3x + 2)[x - 5 + 2x + 1]$$

$$A = (3x + 2)(3x - 4).$$

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! Quand le facteur commun est « tout seul » !** Soit l'expression $B = (2x + 1)^2 - (2x + 1)$. Rappelle-toi que $(2x + 1)^2 = (2x + 1)(2x + 1)$ et que $(2x + 1) = (2x + 1) \times 1$. Quand on factorise par $(2x + 1)$, le second terme ne disparaît pas dans le néant, il laisse derrière lui le nombre 1 :
>
> $$B = \underline{(2x + 1)}(2x + 1) - \underline{(2x + 1)} \times 1 = \underline{(2x + 1)}[(2x + 1) - 1] = (2x + 1)(2x) = 2x(2x + 1).$$
>
> Écrire $B = (2x + 1)(2x + 1) = (2x + 1)^2$ est une erreur dramatique !

4.2 Deuxième technique : reconnaître une identité remarquable

Quand il n'y a aucun facteur commun visible dans tous les termes, on regarde la forme globale de l'expression :

1. **Trois termes, deux carrés positifs et un signe + au milieu :**

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

2. **Trois termes, deux carrés positifs et un signe − au milieu :**

$$4x^2 - 20x + 25 = (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 5 + 5^2 = (2x - 5)^2.$$

3. **Deux termes seulement, séparés par un signe − : c'est la différence de deux carrés !**

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7).$$

$$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x + 4)(3x - 4).$$

---

5. L'équation produit nul : la clé des degrés supérieurs

Au chapitre 22, nous savions résoudre les équations du premier degré, comme $3x + 5 = 14$. Mais comment résoudre une équation contenant du x^2, comme :

$$(2x - 6)(3x + 9) = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 - 25 = 0 \ \ ?$$

5.1 La propriété fondamentale du zéro

Pose-toi cette question d'une simplicité enfantine : *Si je multiplie deux nombres secrets A et B, et que le résultat est égal à zéro ($A \times B = 0$), que peux-tu affirmer avec une certitude absolue ?*

Si tu choisis $A = 4$, pour que le produit fasse 0, B doit **obligatoirement** valoir 0. Si aucun des deux nombres ne vaut zéro (par exemple $2 \times 3 = 6$ ou $(-5) \times 0,1 = -0,5$), leur produit ne pourra **jamais** donner zéro !

> **Théorème — Propriété du produit nul.**
>
> Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins de ses facteurs est nul :
>
> $$A \times B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

Ce théorème est prodigieux : il permet de casser une équation compliquée de degré 2 en **deux petites équations toutes simples de degré 1** !

5.2 Méthode de rédaction pas à pas

> **Méthode — Résoudre une équation produit nul.**
>
> Résolvons l'équation $(3x - 12)(2x + 8) = 0$.
>
> 1. **Phrase rituelle :** « Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul. »
> 2. **Séparation en deux branches :**
>
> $$3x - 12 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 8 = 0$$
>
> 3. **Résolution de chaque branche :**
>   - Première branche : $3x = 12 \Longrightarrow x = \frac{12}{3} = 4$.
>   - Deuxième branche : $2x = -8 \Longrightarrow x = \frac{-8}{2} = -4$.
> 4. **Conclusion :** L'équation admet deux solutions : -4 et 4. On note l'ensemble des solutions $S = \{-4\ ;\ 4\}$.

> **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! Ne jamais diviser par x !** Face à une équation comme $x^2 = 5x$, un réflexe tentant mais faux consiste à diviser les deux côtés par x pour trouver $x = 5$. Ce faisant, **tu tues la solution $x = 0$** ! (Car on n'a pas le droit de diviser par zéro). **La bonne méthode :** on regroupe tout à gauche pour faire apparaître un zéro à droite, puis on factorise :
>
> $$x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(x - 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 5.$$
>
> Il y a bien deux solutions : 0 et 5.

---

6. Les équations du type $x^2 = a$

L'équation $x^2 = a$ est la plus pure des équations du second degré : quel nombre, multiplié par lui-même, donne a ?

La réponse dépend entièrement du **signe de a**.

6.1 Les trois cas possibles

1. **Si $a > 0$ (le nombre a est strictement positif) :** Il existe **deux solutions opposées** : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. *Preuve rigoureuse par factorisation :*

   $$x^2 = a \Leftrightarrow x^2 - a = 0.$$

   Puisque $a > 0$, on peut écrire $a = (\sqrt{a})^2$. L'équation devient :

   $$x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0.$$

   C'est la troisième identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$!

$$(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0.$$

D'après la propriété du produit nul :

$$x - \sqrt{a} = 0 \Longrightarrow x = \sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x + \sqrt{a} = 0 \Longrightarrow x = -\sqrt{a}.$$

Exemple : L'équation $x^2 = 9$ a pour solutions $\sqrt{9} = 3$ et $-\sqrt{9} = -3$. En effet, $3 \times 3 = 9$ et $(-3) \times (-3) = 9$.

2. **Si $a = 0$:** L'équation $x^2 = 0$ a **une seule solution unique** : $x = 0$.
3. **Si $a < 0$ (le nombre a est strictement négatif) :** L'équation $x^2 = a$ n'admet **aucune solution** (dans l'ensemble des nombres réels). *Pourquoi ?* Le carré de n'importe quel nombre réel est toujours positif ou nul : $(+5)^2 = +25$ et $(-5)^2 = +25$. Il est impossible qu'un nombre au carré donne un résultat négatif comme -16. *Exemple :* $x^2 = -4$ n'a aucune solution réelle. On écrit $S = \varnothing$ (ensemble vide).

Cas $a > 0$	Cas $a = 0$	Cas $a < 0$
Deux solutions opposées : $x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$	Une solution unique : $x = 0$	Aucune solution réelle : Impossible dans $\mathbb{R}$ ($S = \varnothing$)

---

7. L'histoire vraie : le chef-d'œuvre d'Al-Khwarizmi et le « carré complété »

Comment Al-Khwarizmi résolvait-il en l'an 820 une équation où se mêlent des carrés et des x, par exemple :

$$x^2 + 10x = 39 \quad ?$$

À cette époque, les formules avec $\Delta = b^2 - 4ac$ n'existaient pas encore. Al-Khwarizmi a inventé une méthode purement visuelle appelée le **carré complété** (*al-jabr wa'l-muqabala*).

1. Il dessine un carré de côté x, d'aire x^2.
2. Il doit lui ajouter $10x$. Il prend deux rectangles de côtés x et 5 (dont l'aire cumulée est $5x + 5x = 10x$) et les colle contre deux côtés du carré central :

La surface de cette forme en L vaut $x^2 + 5x + 5x = x^2 + 10x$. Or, nous savons que cette aire doit être égale à 39.

3. Al-Khwarizmi remarque : *« Cette forme ressemble presque à un grand carré de côté $(x + 5)$! Il lui manque seulement le petit coin en bas à droite. »*
4. Quelle est l'aire de ce petit coin manquant ? C'est un carré de $5 \times 5 = 25$!
5. Al-Khwarizmi décide donc de **compléter le carré** en ajoutant 25 des deux côtés de la balance :

$$(x^2 + 10x) + 25 = 39 + 25.$$

La figure devient un grand carré parfait de côté $(x + 5)$:

$$(x + 5)^2 = 64.$$

6. Il ne reste plus qu'à prendre la racine carrée :

$$x + 5 = \sqrt{64} = 8.$$

7. En retranchant 5 :

$$x = 8 - 5 = 3.$$

> **📐 Du géométrique à l'algébrique — Pourquoi deux racines dans $\mathbb{R}$?**
>
> Pour Al-Khwarizmi, x représentait la longueur d'un côté de terrain réel : seule la solution positive $x = 3$ avait un sens physique. Mais en algèbre formelle moderne sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, l'équation $X^2 = 64$ admet **deux solutions réelles symétriques** :
>
> $$X = \sqrt{64} = 8 \quad \text{ou} \quad X = -\sqrt{64} = -8.$$
>
> Ainsi, l'équation admet une seconde solution algébrique : $x + 5 = -8 \Leftrightarrow x = -13$. Vérification : $(-13)^2 + 10(-13) = 169 - 130 = 39$!

Vérifions : pour $x = 3$, on a $3^2 + 10 \times 3 = 9 + 30 = 39$. C'est parfaitement juste ! Toutes les formules du second degré que tu apprendras au lycée (au Chapitre 35) découlent de ce geste géométrique d'Al-Khwarizmi consistant à ajouter le coin manquant.

---

8. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Développer et réduire avec double distributivité et parenthèses négatives

Développer et réduire l'expression :

$$C = (3x - 2)(4x + 5) - (2x - 1)(x - 3).$$

Résolution détaillée : Attention au signe « $-$ » entre les deux produits ! Pour ne pas faire d'erreur de signe, on conserve le deuxième développement à l'intérieur de grands crochets :

1. Premier produit :
$$(3x - 2)(4x + 5) = 3x \times 4x + 3x \times 5 - 2 \times 4x - 2 \times 5 = 12x^2 + 15x - 8x - 10 = 12x^2 + 7x - 10.$$
2. Deuxième produit (dans les crochets) :
$$(2x - 1)(x - 3) = 2x \times x + 2x \times (-3) - 1 \times x - 1 \times (-3) = 2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3.$$
3. On rassemble :
$$C = (12x^2 + 7x - 10) - [2x^2 - 7x + 3].$$
4. On retire les crochets en inversant tous les signes intérieurs :
$$C = 12x^2 + 7x - 10 - 2x^2 + 7x - 3.$$
5. On regroupe les termes semblables :
$$C = (12x^2 - 2x^2) + (7x + 7x) + (-10 - 3) = 10x^2 + 14x - 13.$$

Exemple 2 : Développer avec les identités remarquables

Développer les expressions suivantes : 1. $D = (3x + 4)^2$ 2. $E = (5x - 2)^2$ 3. $F = (7x + 3)(7x - 3)$

Résolution détaillée : 1. D est de la forme $(a + b)^2$ avec $a = 3x$ et $b = 4$:

$$D = (3x)^2 + 2 \times (3x) \times 4 + 4^2 = 9x^2 + 24x + 16.$$

(Piège évité : $(3x)^2 = 9x^2$ et non $3x^2$!) 2. E est de la forme $(a - b)^2$ avec $a = 5x$ et $b = 2$:

$$E = (5x)^2 - 2 \times (5x) \times 2 + 2^2 = 25x^2 - 20x + 4.$$

3. F est de la forme $(a + b)(a - b)$ avec $a = 7x$ et $b = 3$:

$$F = (7x)^2 - 3^2 = 49x^2 - 9.$$

Exemple 3 : Factoriser avec un facteur commun parenthèse

Factoriser l'expression :

$$G = (2x - 5)(x + 4) - (2x - 5)(3x - 1).$$

Résolution détaillée : 1. On repère le facteur commun présent dans les deux blocs : c'est $(2x - 5)$. 2. On le place en facteur commun devant de grands crochets :

$$G = \underline{(2x - 5)}[(x + 4) - (3x - 1)].$$

3. On simplifie à l'intérieur des crochets en faisant très attention au signe « $-$ » devant la seconde parenthèse :

$$G = (2x - 5)[x + 4 - 3x + 1].$$

4. On réduit :

$$G = (2x - 5)(-2x + 5).$$

Exemple 4 : Factoriser une différence de deux carrés complexes

Factoriser l'expression :

$$H = (2x+3)^2 - 36.$$

Résolution détaillée : 1. On remarque que $36 = 6^2$. 2. L'expression est donc de la forme $A^2 - B^2$ avec $A = (2x+3)$ et $B = 6$. 3. On applique la formule $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$:

$$H = [(2x+3)+6] \times [(2x+3)-6].$$

4. On réduit l'intérieur de chaque parenthèse :

$$H = (2x+9)(2x-3).$$

Exemple 5 : Résoudre une équation complexe se ramenant à un produit nul

Résoudre dans les nombres réels l'équation :

$$(3x+1)^2 = (x-4)^2.$$

Résolution détaillée : *Tentative interdite :* Prendre la racine carrée directement des deux côtés sans précaution, ou tout développer (ce qui donnerait une équation en x^2 qu'on ne saurait pas résoudre facilement). *La bonne méthode :* Mettre tout à gauche pour faire apparaître « $= 0$ » et factoriser comme une différence de deux carrés :

$$(3x+1)^2 - (x-4)^2 = 0.$$

C'est de la forme $A^2 - B^2 = 0$ avec $A = (3x+1)$ et $B = (x-4)$.

$$[(3x+1)+(x-4)] \times [(3x+1)-(x-4)] = 0$$

$$[3x+1+x-4] \times [3x+1-x+4] = 0$$

$$(4x-3)(2x+5) = 0.$$

C'est une **équation produit nul** ! Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$4x - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 5 = 0$$

$$4x = 3 \Longrightarrow x = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$2x = -5 \Longrightarrow x = -\frac{5}{2} = -2,5.$$

Conclusion : L'équation possède deux solutions : $S = \left\{-\frac{5}{2}\,;\,\frac{3}{4}\right\}$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Double distributivité :**
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$
2. **Les 3 Identités remarquables (à connaître dans les deux sens) :**
   - Carré d'une somme : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
   - Carré d'une différence : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
   - Différence de deux carrés : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
3. **Erreurs fatales à bannir :**
   - $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ (il manque le double produit $2ab$!)
   - $(3x)^2 = 9x^2 \neq 3x^2$ (le carré porte aussi sur le 3)
4. **Factorisation :**
   - Chercher d'abord un facteur commun (nombre, x ou parenthèse).
   - Si aucun facteur commun n'existe, identifier une identité remarquable ($a^2 - b^2$, $a^2 + 2ab + b^2$ ou $a^2 - 2ab + b^2$).

5. **Équation produit nul :**

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

6. **Équations du type $x^2 = a$:**
   - Si $a > 0$: deux solutions $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$.
   - Si $a = 0$: une solution $x = 0$.
   - Si $a < 0$: aucune solution.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 23.1 Développer et réduire les expressions suivantes : 1. $A = (x+3)(x+7)$ 2. $B = (2x+1)(x-4)$ 3. $C = (x-5)(3x-2)$

Exercice 23.2 Utiliser les identités remarquables pour développer : 1. $D = (x+6)^2$ 2. $E = (x-5)^2$ 3. $F = (x+8)(x-8)$ 4. $G = (2x+3)^2$ 5. $H = (4x-1)^2$ 6. $I = (5x+2)(5x-2)$

Exercice 23.3 Calculer astucieusement sans calculatrice en utilisant une identité remarquable : 1. 102^2 2. 49^2 3. 61×59 4. 1003×997

Exercice 23.4 Factoriser en trouvant un facteur commun évident : 1. $J = 5x + 35$ 2. $K = x^2 + 8x$ 3. $L = 7x^2 - 14x$

Exercice 23.5 Factoriser en utilisant les identités remarquables : 1. $M = x^2 - 81$ 2. $N = x^2 + 10x + 25$ 3. $P = x^2 - 12x + 36$ 4. $Q = 4x^2 - 9$

Exercice 23.6 Résoudre les équations produit nul suivantes : 1. $(x-7)(x+2) = 0$ 2. $(2x-10)(3x+15) = 0$ 3. $x(4x-9) = 0$

Exercice 23.7 Résoudre les équations $x^2 = a$: 1. $x^2 = 49$ 2. $x^2 = 17$ 3. $x^2 = -9$ 4. $x^2 = 0$

Niveau : Réflexion et enchaînements

Exercice 23.8 Développer et réduire les expressions complexes : 1. $R = (3x-2)^2 - (x+4)(x-4)$ 2. $S = (2x+1)^2 - (3x-2)^2$

Exercice 23.9 Factoriser en identifiant un bloc commun : 1. $T = (x-3)(2x+5) + (x-3)(x-1)$ 2. $U = (3x+2)(5x-1) - (3x+2)(2x+7)$ 3. $V = (4x-3)^2 + (4x-3)(x+2)$

Exercice 23.10 Factoriser les différences de carrés composées : 1. $W = (x+2)^2 - 25$ 2. $Z = 49 - (2x-1)^2$ 3. $Y = (3x-5)^2 - (x+1)^2$

Exercice 23.11 Résoudre les équations en se ramenant à une équation produit nul : 1. $x^2 - 36 = 0$ 2. $(2x+3)(x-1) = (2x+3)(3x-7)$ 3. $9x^2 - 25 = 0$ 4. $x^2 = 6x$

Exercice 23.12 Programme de calcul et mystère : On considère le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre entier.
- Lui ajouter 1.
- Élever le résultat au carré.
- Retrancher au résultat le carré du nombre de départ.
- Retrancher 1.

1. Tester ce programme avec 3, 5 et 10. Que remarque-t-on ?
2. Démontrer cette conjecture pour n'importe quel nombre choisi au départ en utilisant le calcul littéral.

Exercice 23.13 L'astuce du tour de magie des carrés terminés par 5 : Pour calculer de tête le carré d'un nombre se terminant par 5 (comme 35^2), l'astuce consiste à multiplier le chiffre des dizaines (3) par le nombre suivant (4), ce qui fait $3 \times 4 = 12$, puis à coller 25 au bout : on obtient 1225 ! Un nombre se terminant par 5 s'écrit $10d + 5$, où d est le nombre de dizaines. Développer $(10d+5)^2$ et démontrer pourquoi cette astuce fonctionne à tous les coups !

Niveau : Défis et recherche

Exercice 23.14 Résolution à la manière d'Al-Khwarizmi (carré complété) : Résoudre l'équation $x^2 + 6x = 16$ en suivant pas à pas la méthode géométrique d'Al-Khwarizmi : 1. Écrire $x^2 + 6x$ sous la forme $(x + \dots)^2 - \dots$ 2. En déduire une équation du type $(x + 3)^2 = \text{nombre}$. 3. Trouver la valeur positive de x.

Exercice 23.15 Le grand défi de Pythagore et de l'algèbre : Un triangle rectangle possède une hypoténuse qui mesure $(x + 8)$ cm. Ses deux côtés de l'angle droit mesurent respectivement x cm et $(x + 7)$ cm. 1. En appliquant le théorème de Pythagore, écrire une équation vérifiée par x. 2. Développer et réduire cette équation pour la ramener sous la forme $x^2 - 2x - 15 = 0$. 3. Vérifier que $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$. 4. En déduire la valeur de x et les longueurs des trois côtés du triangle.

Exercice 23.16 La différence de deux cubes (pour les curieux) : 1. Développer l'expression $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$. 2. Que remarque-t-on ? 3. En déduire une factorisation de $x^3 - 8$ (sachant que $8 = 2^3$).

Solutions

Niveau

Solution 23.1 1. $A = x^2 + 7x + 3x + 21 = x^2 + 10x + 21$. 2. $B = 2x^2 - 8x + x - 4 = 2x^2 - 7x - 4$. 3. $C = 3x^2 - 2x - 15x + 10 = 3x^2 - 17x + 10$.

Solution 23.2 1. $D = x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 = x^2 + 12x + 36$. 2. $E = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$. 3. $F = x^2 - 8^2 = x^2 - 64$. 4. $G = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$. 5. $H = (4x)^2 - 2 \times 4x \times 1 + 1^2 = 16x^2 - 8x + 1$. 6. $I = (5x)^2 - 2^2 = 25x^2 - 4$.

Solution 23.3 1. $102^2 = (100 + 2)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 2 + 2^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404$. 2. $49^2 = (50 - 1)^2 = 50^2 - 2 \times 50 \times 1 + 1^2 = 2\,500 - 100 + 1 = 2\,401$. 3. $61 \times 59 = (60 + 1)(60 - 1) = 60^2 - 1^2 = 3\,600 - 1 = 3\,599$. 4. $1003 \times 997 = (1000 + 3)(1000 - 3) = 1000^2 - 3^2 = 1\,000\,000 - 9 = 999\,991$.

Solution 23.4 1. $J = 5(x + 7)$. 2. $K = x(x + 8)$. 3. $L = 7x(x - 2)$.

Solution 23.5 1. $M = x^2 - 9^2 = (x + 9)(x - 9)$. 2. $N = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x + 5)^2$. 3. $P = x^2 - 2 \times x \times 6 + 6^2 = (x - 6)^2$. 4. $Q = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3)$.

Solution 23.6 1. $x - 7 = 0$ ou $x + 2 = 0 \Longrightarrow x = 7$ ou $x = -2$. $S = \{-2\ ;\ 7\}$. 2. $2x - 10 = 0 \Longrightarrow 2x = 10 \Longrightarrow x = 5$ ou $3x + 15 = 0 \Longrightarrow 3x = -15 \Longrightarrow x = -5$. $S = \{-5\ ;\ 5\}$. 3. $x = 0$ ou $4x - 9 = 0 \Longrightarrow 4x = 9 \Longrightarrow x = \frac{9}{4} = 2,25$. $S = \{0\ ;\ 2,25\}$.

Solution 23.7 1. $x = \sqrt{49} = 7$ ou $x = -\sqrt{49} = -7$. $S = \{-7\ ;\ 7\}$. 2. $x = \sqrt{17}$ ou $x = -\sqrt{17}$. $S = \left\{-\sqrt{17}\ ;\ \sqrt{17}\right\}$. 3. Aucun carré de réel n'est négatif. Aucune solution : $S = \varnothing$. 4. $x = 0$. Une seule solution : $S = \{0\}$.

Niveau

Solution 23.8 1. $R = (9x^2 - 12x + 4) - (x^2 - 16) = 9x^2 - 12x + 4 - x^2 + 16 = 8x^2 - 12x + 20$. 2. $S = (4x^2 + 4x + 1) - (9x^2 - 12x + 4) = 4x^2 + 4x + 1 - 9x^2 + 12x - 4 = -5x^2 + 16x - 3$.

Solution 23.9 1. $T = (x - 3)[(2x + 5) + (x - 1)] = (x - 3)(3x + 4)$. 2. $U = (3x + 2)[(5x - 1) - (2x + 7)] = (3x + 2)[5x - 1 - 2x - 7] = (3x + 2)(3x - 8)$. 3. $V = (4x - 3)[(4x - 3) + (x + 2)] = (4x - 3)(5x - 1)$.

Solution 23.10 1. $W = (x + 2)^2 - 5^2 = [(x + 2) + 5][(x + 2) - 5] = (x + 7)(x - 3)$. 2. $Z = 7^2 - (2x - 1)^2 = [7 + (2x - 1)][7 - (2x - 1)] = [7 + 2x - 1][7 - 2x + 1] = (2x + 6)(-2x + 8)$. (On peut aussi factoriser par 2 dans chaque facteur : $Z = 4(x + 3)(-x + 4)$). 3. $Y = [(3x - 5) + (x + 1)][(3x - 5) - (x + 1)] = [4x - 4][2x - 6] = 4(x - 1) \times 2(x - 3) = 8(x - 1)(x - 3)$.

Solution 23.11 1. $x^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow (x - 6)(x + 6) = 0 \Leftrightarrow x = 6$ ou $x = -6$. $S = \{-6\ ;\ 6\}$. 2. On regroupe tout à gauche : $(2x + 3)(x - 1) - (2x + 3)(3x - 7) = 0$. Facteur commun $(2x + 3)$: $(2x + 3)[(x - 1) - (3x - 7)] = 0 \Leftrightarrow (2x + 3)(-2x + 6) = 0$. Branches : $2x + 3 = 0 \Longrightarrow x = -\frac{3}{2}$ ou $-2x + 6 = 0 \Longrightarrow x = 3$. $S = \left\{-\frac{3}{2}\ ;\ 3\right\}$. 3. $(3x)^2 - 5^2 = 0 \Leftrightarrow (3x - 5)(3x + 5) = 0 \Longrightarrow x = \frac{5}{3}$ ou $x = -\frac{5}{3}$. $S = \left\{-\frac{5}{3}\ ;\ \frac{5}{3}\right\}$. 4. $x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x(x - 6) = 0 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 6$. $S = \{0\ ;\ 6\}$.

Solution 23.12 1. Pour 3 : $3+1=4 \to 4^2=16 \to 16-3^2=16-9=7 \to 7-1=6$ (le double de 3). Pour 5 : $5+1=6 \to 6^2=36 \to 36-25=11 \to 11-1=10$ (le double de 5). Pour 10 : $10+1=11 \to 11^2=121 \to 121-100=21 \to 21-1=20$ (le double de 10). Conjecture : le programme donne toujours le double du nombre choisi ($2n$). 2. Soit n le nombre de départ. Le programme calcule : $(n+1)^2-n^2-1$. Développons : $(n^2+2n+1)-n^2-1=n^2+2n+1-n^2-1=2n$. La conjecture est rigoureusement démontrée pour tout entier n.

Solution 23.13 Développons $(10d+5)^2$ avec la première identité remarquable :

$$(10d+5)^2=(10d)^2+2\times(10d)\times 5+5^2=100d^2+100d+25.$$

Factorisons $100d$ dans les deux premiers termes :

$$100d(d+1)+25=[d\times(d+1)]\times 100+25.$$

Multiplier $d\times(d+1)$ par 100 revient exactement à décaler le résultat de deux rangs vers la gauche (chiffre des centaines), et ajouter 25 place exactement « 25 » sur les chiffres des dizaines et des unités ! L'astuce est mathématiquement infaillible.

Niveau

Solution 23.14 1. On sait que $(x+3)^2=x^2+6x+9$. Donc $x^2+6x=(x+3)^2-9$. 2. L'équation $x^2+6x=16$ devient :

$$(x+3)^2-9=16 \Leftrightarrow (x+3)^2=16+9=25.$$

3. Puisque $25=5^2$, on a $x+3=5$ (pour la solution positive cherchée par Al-Khwarizmi), d'où $x=5-3=2$. (La deuxième solution mathématique moderne est $x+3=-5 \Longrightarrow x=-8$).

Solution 23.15 1. D'après le théorème de Pythagore :

$$x^2+(x+7)^2=(x+8)^2.$$

2. Développons les deux côtés :

$$x^2+(x^2+14x+49)=x^2+16x+64$$

$$2x^2+14x+49=x^2+16x+64.$$

On passe tout à gauche :

$$(2x^2-x^2)+(14x-16x)+(49-64)=0 \Leftrightarrow x^2-2x-15=0.$$

3. Développons $(x-5)(x+3)$:

$$(x-5)(x+3)=x^2+3x-5x-15=x^2-2x-15.$$

L'égalité est bien vérifiée ! 4. L'équation devient $(x-5)(x+3)=0$. Les solutions sont $x=5$ ou $x=-3$. Une longueur ne pouvant être négative, on conserve uniquement $x=5$. Les trois côtés du triangle mesurent donc :

- Premier côté : $x=5$ cm
- Deuxième côté : $x+7=5+7=12$ cm
- Hypoténuse : $x+8=5+8=13$ cm. Vérification : $5^2+12^2=25+144=169=13^2$. C'est un triplet pythagoricien parfait !

Solution 23.16 1. Développons par simple et double distributivité :

$$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a\times a^2+a\times ab+a\times b^2-b\times a^2-b\times ab-b\times b^2$$

$$=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3.$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux !

$$=a^3-b^3.$$

2. On remarque que la différence de deux cubes se factorise selon la formule remarquable :

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2).$$

3. Pour $x^3-8=x^3-2^3$, on applique avec $a=x$ et $b=2$:

$$x^3-8=(x-2)(x^2+2x+2^2)=(x-2)(x^2+2x+4).$$

La question qui ouvre la suite

Grâce aux identités remarquables et au produit nul, tu sais maintenant dompter les égalités parfaites et les équilibres stricts. Mais dans la vraie vie et dans le commerce, les plateaux de la balance sont rarement au même niveau : l'un est souvent plus lourd que l'autre, un tarif est plus avantageux qu'un autre au-delà d'un certain seuil, et deux marchands se disputent la clientèle.

Que se passe-t-il quand la balance penche ? Comment manipuler une **inégalité** sans faire basculer le monde à l'envers, et comment déterminer l'intersection de deux destins marchands ? C'est le mystère que nous allons percer dans le chapitre suivant : **Les Deux Marchands et les Inégalités**.

CHAPITRE 24 : Les Deux Marchands et les Inégalités

> « Tant que les deux plateaux sont de niveau, le monde dort dans une paix immobile. Mais dès qu'un plateau plonge, le mouvement naît. L'inégalité n'est pas un défaut de justice : c'est le moteur du commerce, le seuil de rentabilité, la frontière exacte où une décision devient meilleure qu'une autre. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment raisonner sur une **balance déséquilibrée** sans la faire basculer.
- Les notations $\leq, \geq, <, >$: ce qu'elles veulent dire et comment les lire sans hésiter.
- La règle d'or des inégalités : pourquoi ajouter ou retrancher conserve l'ordre, pourquoi multiplier par un nombre positif ne change rien…
- … et pourquoi **multiplier ou diviser par un nombre négatif INVERSE le sens** de l'inégalité (le mystère du miroir et du thermomètre).
- Comment résoudre une **inéquation du premier degré** et peindre ses solutions sur une **droite graduée** avec des crochets orientés.
- Comment percer le secret de deux inconnues à la fois grâce aux **systèmes d'équations** : la méthode par **substitution** et la méthode par **combinaison linéaire**.
- L'interprétation géométrique lumineuse : un système n'est rien d'autre que le **point de rencontre de deux droites**.
- Des applications palpitantes à la vie réelle : comparer deux tarifs de marchands, calculer le seuil de rentabilité et réussir des mélanges parfaits.

---

1. Le problème : la foire aux épices de Venise et le dilemme du marchand

Nous sommes en **1340**, sur le quai du Rialto à **Venise**. Les galères reviennent d'Orient, les cales chargées de cannelle, de poivre noir et de safran. Deux marchands vénitiens, Giovanni et Marco, ont installé leurs étals face à face sur la place du marché. Tous deux vendent la même huile d'olive de Crète de première pression.

Mais chacun propose une formule tarifaire différente pour attirer les aubergistes et les marins :

- **Le marchand Giovanni** annonce : *« Entrée libre ! Aucun abonnement ! Je vends chaque litre d'huile d'olive au prix fixe de 6 ducats le litre. »*
- **Le marchand Marco**, plus rusé, propose : *« Payez une carte de client fidèle à 30 ducats pour la saison, et je vous livre chaque litre d'huile à seulement 4 ducats le litre ! »*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu — Comparaison de Tarifs (Modélisation Affine)

- Tarif Giovanni : Prix = 6 × Nombre de litres
- Tarif Marco : Prix = 30 + 4 × Nombre de litres

Un tavernier s'arrête, hésitant, sa bourse à la ceinture. Il demande à son jeune commis : *« Chez qui devons-nous acheter notre huile cette saison ? »*

Le commis répond avec bon sens : *« Cela dépend de notre consommation, maître ! Si nous n'achetons que 2 litres pour la semaine, Giovanni nous coûte* $2 \times 6 = 12$ *ducats, alors que chez Marco, nous paierions* $30 + 4 \times 2 = 38$ *ducats : Giovanni est bien plus avantageux. Mais si nous tenons une grande auberge et achetons 50 litres, Giovanni nous coûterait* $50 \times 6 = 300$ *ducats, tandis que Marco ne nous demanderait que* $30 + 4 \times 50 = 230$ *ducats : Marco devient nettement moins cher ! »*

Le maître aubergiste fronce les sourcils : *« Très bien. Mais à partir de **combien de litres exactement** le tarif de Marco devient-il plus avantageux que celui de Giovanni ? »*

Ce n'est plus une égalité qu'il faut résoudre, mais une **inégalité** :

$$30 + 4x < 6x.$$

On cherche la zone où la dépense chez Marco est *strictement inférieure* à celle chez Giovanni.

Et ce n'est pas tout. Le lendemain, Giovanni et Marco s'associent pour vendre un lot de 100 amphores contenant au total 380 litres d'huile, certaines amphores faisant 3 litres et d'autres 5 litres. Combien y a-t-il d'amphores de chaque sorte ? C'est un problème à **deux inconnues**, où deux conditions doivent être satisfaites en même temps.

Pour répondre au tavernier et percer les secrets du marché, nous devons forger deux nouveaux outils : **les inéquations** et **les systèmes linéaires**.

---

2. Le langage des inégalités : comparer des grandeurs

2.1 Les symboles et leur sens de lecture

En mathématiques, une égalité ($=$) affirme que deux grandeurs ont exactement la même valeur. Une **inégalité** traduit un déséquilibre : une grandeur est plus grande ou plus petite qu'une autre.

Symbole	Signification	Lecture	Exemple
$<$	Strictement inférieur	« est strictement plus petit que »	$3 < 7$
$>$	Strictement supérieur	« est strictement plus grand que »	$8 > 2$
$\leq$ ou $\leq$	Inférieur ou égal	« est inférieur ou égal à » (au plus)	$x \leq 10$ (x vaut 10 ou moins)
$\geq$ ou $\geq$	Supérieur ou égal	« est supérieur ou égal à » (au moins)	$x \geq 18$ (x vaut 18 ou plus)

> 💡 **L'astuce visuelle de la pointe —**
>
> Le symbole s'ouvre toujours en grand vers le plus gros nombre et pointe son extrémité fine vers le plus petit :
>
> $$\text{GRAND} > \text{petit} \qquad \text{petit} < \text{GRAND}\ .$$

- **Inégalité stricte ($<$ ou $>$) :** L'égalité est exclue. Si l'âge $a > 12$, avoir 12 ans pile ne convient pas.
- **Inégalité large ($\leq$ ou $\geq$) :** L'égalité est acceptée. Si la note $n \geq 10$, avoir 10 pile est suffisant pour réussir.

---

3. Les règles de la balance penchée

Reprenons l'image de la balance à deux plateaux d'Al-Khwarizmi, mais cette fois-ci, **le fléau penche**. Le plateau de gauche est plus haut que le plateau de droite : le côté gauche est plus léger que le côté droit ($A < B$).

Que se passe-t-il si nous effectuons des opérations sur les deux plateaux en même temps ?

3.1 Règle 1 : Ajouter ou soustraire un même nombre

Si tu ajoutes 2 kg de plomb sur le plateau de gauche ET 2 kg de plomb sur le plateau de droite, le plateau de droite reste plus lourd. Le sens du déséquilibre ne change pas d'un millimètre. De même, si tu retires 3 kg des deux côtés, la balance conserve son inclinaison.

Règle fondamentale 1 — Addition et soustraction.

On ne change pas le sens d'une inégalité si l'on **ajoute** ou si l'on **soustrait** un même nombre aux deux membres :

$$\text{Si } \; a < b, \; \text{alors } \; a + c < b + c \quad \text{et} \quad a - c < b - c.$$

Exemple numérique : On sait que $3 < 8$.

- Ajoutons 5 : $3 + 5 < 8 + 5 \Longrightarrow 8 < 13$ (vrai).
- Soustrayons 10 : $3 - 10 < 8 - 10 \Longrightarrow -7 < -2$ (vrai, -7 est bien plus froid que -2).

3.2 Règle 2 : Multiplier ou diviser par un nombre POSITIF

Si tu triples le contenu du plateau gauche et que tu triples le contenu du plateau droit, le plateau lourd devient trois fois plus lourd, et le plateau léger trois fois plus léger. Le sens du déséquilibre reste rigoureusement le même.

Règle fondamentale 2 — Multiplication et division par un nombre POSITIF ($c > 0$).

On ne change pas le sens d'une inégalité si l'on **multiplie** ou si l'on **divise** ses deux membres par un même nombre **strictement positif** :

$$\text{Si } \; a < b \; \text{ et } \; c > 0, \; \text{alors } \; a \times c < b \times c \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}.$$

Exemple numérique : On a $-4 < 6$. Multiplions par 3 :

$$-4 \times 3 < 6 \times 3 \Longrightarrow -12 < 18 \quad (\text{toujours vrai}) \; .$$

3.3 Règle 3 : Le grand renversement ! Multiplier ou diviser par un nombre NÉGATIF

Voici maintenant le phénomène le plus surprenant de l'algèbre, celui qui piège tant d'élèves.

Prenons deux nombres évidents :

$$2 < 5.$$

Multiplions les deux membres par -1. Que deviennent-ils ?

- À gauche : $2 \times (-1) = -2$.
- À droite : $5 \times (-1) = -5$.

Comparons maintenant -2 et -5. Quel nombre est le plus grand ? Sur un thermomètre, $-2°$ C est plus chaud que $-5°$ C. Sur la droite graduée, -2 est situé **à droite** de -5 :

$$-2 > -5 \quad !$$

L'inégalité s'est inversée ! Le signe $<$ est devenu $>$.



Fig. 69. – Intervalles et inégalités sur la droite réelle : notation et crochets

> **Règle fondamentale 3 — Multiplication et division par un nombre NÉGATIF ($c < 0$).**
>
> **Quand on multiplie ou que l'on divise les deux membres d'une inégalité par un nombre STRICTEMENT NÉGATIF, ON DOIT OBLIGATOIREMENT INVERSER LE SENS DE L'INÉGALITÉ !**
>
> $$\text{Si } \; a < b \; \text{ et } \; c < 0, \; \text{alors } \; a \times c > b \times c \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

Pourquoi ce renversement ? Deux explications concrètes : 1. **L'explication par le miroir :** Multiplier par -1, c'est faire pivoter la droite numérique d'un demi-tour autour du zéro. Ce qui était le plus loin vers la droite dans le monde positif ($+5$) se retrouve projeté le plus loin vers la gauche dans le monde négatif (-5). Le champion du grand devient le champion du petit ! 2. **L'explication par la dette :** Avoir 200 € sur son compte est plus avantageux qu'avoir 500 € ? Non, $200 < 500$. Mais avoir une **dette** de 200 € (-200) est bien préférable à avoir une dette de 500 € (-500) ! Donc $-200 > -500$.

---

4. Résolution d'une inéquation et représentation graphique

4.1 Qu'est-ce qu'une inéquation ?

Une inéquation du premier degré est une inégalité comportant une inconnue x. Contrairement à une équation ordinaire qui n'a souvent qu'une ou deux solutions isolées ($x = 3$), une inéquation possède en général **une infinité de solutions** : tout un paquet de nombres, un intervalle continu.

4.2 Exemple pas à pas de résolution

Résolvons l'inéquation du problème de nos marchands :

$$30 + 4x < 6x.$$

1. **Regrouper les termes en x :** Soustrayons $4x$ des deux côtés (règle 1 : soustraire ne change pas le sens) :
$$30 + 4x - 4x < 6x - 4x$$
$$30 < 2x.$$
2. **Isoler x :** Divisons les deux côtés par $+2$ (règle 2 : diviser par un nombre positif ne change pas le sens) :
$$\frac{30}{2} < \frac{2x}{2} \Longrightarrow 15 < x \quad \text{ou encore} \quad x > 15.$$
3. **Conclusion pour les marchands :** Dès que le tavernier achète **strictement plus de 15 litres d'huile**, le tarif de Marco devient plus avantageux ! Pour 15 litres pile, les deux marchands coûtent exactement la même somme ($15 \times 6 = 90$ ducats et $30 + 4 \times 15 = 90$ ducats).

4.3 Un exemple avec inversion de sens

Résolvons l'inéquation :

$$-3x + 7 \leq 22.$$

1. On soustrait 7 des deux côtés :
$$-3x \leq 22 - 7 \Longrightarrow -3x \leq 15.$$
2. On doit diviser par le coefficient de x, qui est **-3 (négatif)**. **Alerte rouge : on inverse immédiatement le sens du symbole !**
$$\frac{-3x}{-3} \geq \frac{15}{-3}$$
$$x \geq -5.$$
Les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à -5.

4.4 Représenter les solutions sur une droite graduée

Puisqu'il y a une infinité de solutions, on les représente graphiquement en surlignant (ou hachurant) la portion de la droite graduée qui convient.

Comment indiquer si le nombre frontière fait partie ou non des solutions ? **Grâce au sens des crochets !**

- **Le crochet est tourné VERS la zone des solutions :** le nombre frontière est **inclus** ($\leq$ ou $\geq$). Exemple pour $x \geq -5$:
- **Le crochet tourne le DOS à la zone des solutions :** le nombre frontière est **exclu** ($<$ ou $>$). Exemple pour $x > 15$:

Méthode — Noter les solutions sous forme d'intervalle.

Au collège et au lycée, on note l'ensemble des solutions S avec des crochets :

- Pour $x \geq -5$: $S = [-5\ ;\ +\infty[$ (se lit « intervalle fermé en -5 jusqu'à plus l'infini »).
- Pour $x < 3$: $S =]-\infty\ ;\ 3[$ (se lit « de moins l'infini à 3 exclu »). Le symbole ∞ (« l'infini ») porte **toujours** un crochet ouvert vers l'extérieur, car l'infini n'est pas un nombre qu'on peut enfermer.

---

5. Systèmes de deux équations à deux inconnues

Revenons à la seconde énigme de Venise : *Un marchand vend un lot de 100 amphores d'huile. Il y a des petites amphores de 3 litres et des grandes amphores de 5 litres. Le volume total d'huile est de 380 litres. Combien y a-t-il d'amphores de chaque sorte ?*

Ici, il y a **deux grandeurs inconnues** :

- Soit x le nombre de petites amphores (de 3 L).
- Soit y le nombre de grandes amphores (de 5 L).

Chaque phrase de l'énoncé fournit une équation : 1. *« 100 amphores au total »* $\Longrightarrow x + y = 100$. 2. *« 380 litres au total »* $\Longrightarrow 3x + 5y = 380$.

Ces deux équations forment ce qu'on appelle un **système de deux équations du premier degré à deux inconnues**. On les réunit avec une grande accolade :

$$\begin{cases} x + y = 100 \quad (L_1) \\ 3x + 5y = 380 (L_2) \end{cases}$$

Résoudre ce système, c'est trouver le couple (x, y) unique qui rend les deux égalités vraies en même temps. Il existe deux méthodes universelles pour y parvenir.

5.1 Méthode 1 : La méthode par substitution (l'espion infiltré)

Le principe est simple : on utilise l'une des équations pour exprimer une lettre en fonction de l'autre, puis on va « injecter » cette expression dans la deuxième équation.

1. **Isoler une lettre facile :** Dans la première ligne $x + y = 100$, isolons x :
$$x = 100 - y.$$
2. **Substituer dans l'autre ligne :** Dans la deuxième ligne $3x + 5y = 380$, remplaçons la lettre x par le paquet $(100 - y)$:
$$3(100 - y) + 5y = 380.$$
Magie : il n'y a plus de x ! C'est une simple équation à une seule inconnue y !
3. **Résoudre pour y :**
$$300 - 3y + 5y = 380$$
$$300 + 2y = 380$$
$$2y = 380 - 300 = 80$$
$$y = \frac{80}{2} = 40.$$
4. **Calculer la première inconnue x :** Puisque $x = 100 - y$:
$$x = 100 - 40 = 60.$$
5. **Conclusion et vérification :** Le marchand a vendu 60 petites amphores et 40 grandes amphores. Vérification :

- Total amphores : $60 + 40 = 100$ (exact).
- Total litres : $60 \times 3 + 40 \times 5 = 180 + 200 = 380$ litres (exact !). Le couple solution s'écrit : $(x\,;\,y) = (60\,;\,40)$.

Quand utiliser la substitution ? Quand l'une des inconnues a pour coefficient 1 ou -1 (comme x ou y dans $x + y = 100$), car elle s'isole immédiatement sans créer de fractions affreuses.

5.2 Méthode 2 : La méthode par combinaison linéaire (le duel d'élimination)

Que faire quand toutes les inconnues ont des coefficients embarrassants, comme :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 & (L_1) \\ 5x - 2y = 19 & (L_2) \end{cases}$$

Isoler x dans la première ligne donnerait $x = \frac{19-3y}{2}$, ce qui remplirait le calcul de fractions compliquées.

La **combinaison linéaire** (aussi appelée méthode par addition ou élimination de Gauss) consiste à multiplier les lignes par des nombres bien choisis pour que les coefficients d'une même inconnue deviennent **opposés** (par exemple $+6y$ et $-6y$). En additionnant les deux lignes membre à membre, cette inconnue disparaît instantanément !

Résolvons ce système pas à pas :

1. **Choisir l'inconnue à éliminer :** Choisissons d'éliminer y. Le coefficient de y est $+3$ dans (L_1) et -2 dans (L_2). Le plus petit multiple commun de 3 et 2 est 6.
2. **Multiplier les lignes :**
   - Multiplions toute la ligne (L_1) par 2 :
   $$2 \times (2x + 3y) = 2 \times 19 \Longrightarrow 4x + 6y = 38.$$
   - Multiplions toute la ligne (L_2) par 3 :
   $$3 \times (5x - 2y) = 3 \times 19 \Longrightarrow 15x - 6y = 57.$$
3. **Additionner les deux lignes membre à membre :**

```
     4x  +  6y  =  38
+   15x  -  6y  =  57
--------------------
    19x  +   0  =  95
```

   Le terme en y s'est évaporé !
4. **Trouver x :**
$$19x = 95 \Longrightarrow x = \frac{95}{19} = 5.$$
5. **Trouver y :** Remplaçons $x = 5$ dans n'importe quelle équation de départ, par exemple (L_1) :
$$2(5) + 3y = 19 \Longrightarrow 10 + 3y = 19 \Longrightarrow 3y = 9 \Longrightarrow y = 3.$$
6. **Conclusion :** La solution du système est le couple $(x\,;\,y) = (5\,;\,3)$.

---

6. L'interprétation géométrique : deux droites qui se croisent

Chaque équation du premier degré à deux inconnues, comme $2x + 3y = 19$, correspond graphiquement à une **droite** dans le repère cartésien (Chapitre 20). Chaque point $(x; y)$ situé sur la droite est une solution de l'équation.

Résoudre le système, c'est chercher un point $(x; y)$ qui appartient **à la fois à la première droite (d_1) et à la deuxième droite (d_2)**.

Il existe trois configurations géométriques possibles :

1. **Les droites sont sécantes (se coupent en un point unique) :** C'est le cas général. Le système admet **une solution unique** $(x_0; y_0)$.

2. **Les droites sont strictement parallèles (ne se rencontrent jamais) :** Le système n'admet **aucune solution** ($S = \{x + y = 4$
   $\varnothing$). *Exemple :* $x + y = 10$ (la somme de deux nombres ne peut pas valoir 4 et 10 en même temps !).
3. **Les droites sont confondues (l'une est posée sur l'autre) :** Les deux équations sont en fait deux écritures de la même droite (par exemple $x + y = 2$ et $2x + 2y = 4$). Le système admet **une infinité de solutions**.

---

7. L'histoire vraie : le secret des baguettes du livre des Neuf Chapitres

Deux siècles avant notre ère, dans la Chine des Han, les mathématiciens impériaux résolvaient déjà des systèmes d'équations pour gérer les récoltes de grains, la taille des corvées et les impôts de l'Empire.

Dans le plus grand classique des mathématiques chinoises, *Les Neuf Chapitres sur l'Art Mathématique* (*Jiuzhang Suanshu*), le chapitre 8 est intitulé *Fangcheng* (« Disposition en tableau rectangulaire »).

Les savants chinois disposaient des baguettes de bambou rouges (pour les nombres positifs) et noires (pour les nombres négatifs) sur un échiquier de feutre. Chaque colonne représentait une équation et chaque ligne une céréale différente (le millet supérieur, le millet moyen, le millet inférieur).

> 💡 **Découverte & Histoire — Le Chapitre VIII des Neuf Chapitres chinois**
>
> - 3 gerbes de millet supérieur] + [2 gerbes de millet moyen] + [1 gerbe de millet bas] = 39 mesures
> - 2 gerbes de millet supérieur] + [3 gerbes de millet moyen] + [1 gerbe de millet bas] = 34 mesures
> - 1 gerbe de millet supérieur] + [2 gerbes de millet moyen] + [3 gerbes de millet bas] = 26 mesures

En faisant glisser les baguettes, en multipliant une colonne et en la soustrayant à une autre, ils éliminaient les grains un à un pour faire apparaître des zéros. Cette méthode chinoise vieille de 2 200 ans est exactement la **méthode du pivot de Gauss**, enseignée aujourd'hui dans toutes les universités du monde et programmée au cœur des supercalculateurs modernes !

---

8. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Résoudre une inéquation avec parenthèses et fractions simples

Résoudre dans les réels l'inéquation suivante et représenter les solutions :

$$4(2x - 3) - 5x \geq 7x - 24.$$

Résolution détaillée : 1. On développe le membre de gauche :

$$8x - 12 - 5x \geq 7x - 24 \Longrightarrow 3x - 12 \geq 7x - 24.$$

2. On regroupe les termes en x à gauche en soustrayant $7x$:

$$3x - 7x - 12 \geq -24 \Longrightarrow -4x - 12 \geq -24.$$

3. On ajoute 12 des deux côtés :

$$-4x \geq -24 + 12 \Longrightarrow -4x \geq -12.$$

4. On divise par le coefficient devant x, qui est **-4 (négatif)**. **On inverse le sens du symbole ($\geq$ devient $\leq$) :**

$$x \leq \frac{-12}{-4} \Longrightarrow x \leq 3.$$

5. Représentation graphique : Les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 3. Le crochet est fermé en 3 et orienté vers la gauche (vers les solutions) :

Ensemble des solutions : $S =]-\infty\ ;\ 3]$.

Exemple 2 : Inéquation avec quotient et gestion rigoureuse des signes

Résoudre l'inéquation :

$$\frac{2-5x}{3} > 4.$$

Résolution détaillée : 1. On multiplie les deux membres par 3. Comme $3 > 0$, le sens est conservé :

$$2-5x > 4 \times 3 \Longrightarrow 2-5x > 12.$$

2. On soustrait 2 :

$$-5x > 12-2 \Longrightarrow -5x > 10.$$

3. On divise par **-5 (négatif)**, donc le symbole s'inverse ($>$ devient $<$) :

$$x < \frac{10}{-5} \Longrightarrow x < -2.$$

Conclusion : $S =]-\infty\ ;\ -2[$. Le crochet en -2 est ouvert vers la droite (tourne le dos aux solutions car -2 est exclu).

Exemple 3 : Système résolu par substitution

Résoudre le système :

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \quad (L_1) \\ 2x + 4y = 42 (L_2) \end{cases}$$

Résolution détaillée : 1. Dans (L_1), la variable y a un coefficient -1, elle s'isole immédiatement :

$$-y = 7 - 3x \Longrightarrow y = 3x - 7.$$

2. On remplace y par $(3x-7)$ dans l'équation (L_2) :

$$2x + 4(3x-7) = 42$$

$$2x + 12x - 28 = 42$$

$$14x - 28 = 42$$

$$14x = 42 + 28 = 70 \Longrightarrow x = \frac{70}{14} = 5.$$

3. On calcule y avec l'expression trouvée à l'étape 1 :

$$y = 3(5) - 7 = 15 - 7 = 8.$$

4. Vérification dans les deux équations de départ :

- (L_1) : $3(5) - 8 = 15 - 8 = 7$ (vrai).
- (L_2) : $2(5) + 4(8) = 10 + 32 = 42$ (vrai).

Conclusion : Le couple solution unique est $(x\ ;\ y) = (5\ ;\ 8)$.

Exemple 4 : Système résolu par combinaison linéaire

Résoudre le système :

$$\begin{cases} 4x + 3y = 1 \ \ (L_1) \\ 6x - 5y = 20 (L_2) \end{cases}$$

Résolution détaillée : Éliminons y. Les coefficients de y sont $+3$ et -5. Leur plus petit commun multiple est 15. 1. On multiplie (L_1) par 5 :

$$5 \times (4x + 3y) = 5 \times 1 \Longrightarrow 20x + 15y = 5.$$

2. On multiplie (L_2) par 3 :

$$3 \times (6x - 5y) = 3 \times 20 \Longrightarrow 18x - 15y = 60.$$

3. On additionne les deux nouvelles équations terme à terme :

$$(20x + 18x) + (15y - 15y) = 5 + 60$$

$$38x = 65 \Longrightarrow x = \frac{65}{38}.$$

Remarque : On peut aussi éliminer x en multipliant (L_1) par 3 et (L_2) par -2 :

- $3 \times (L_1) \Longrightarrow 12x + 9y = 3$
- $-2 \times (L_2) \Longrightarrow -12x + 10y = -40$ Additionnons : $19y = -37 \Longrightarrow y = -\frac{37}{19} = -\frac{74}{38}$. Conclusion : Le couple solution est $\left(\frac{65}{38}\ ;\ -\frac{37}{19}\right)$.

Exemple 5 : Problème concret de billetterie (mise en système)

Pour financer leur voyage de fin d'année, les élèves de 3e organisent une soirée théâtre.

- Le tarif pour les adultes est de 8 €.
- Le tarif pour les enfants est de 4,50 €.

À la fin de la soirée, la caisse enregistre 240 spectateurs et une recette totale de 1 570 €. Combien d'adultes et combien d'enfants ont assisté à la pièce ?

Résolution détaillée : 1. **Choix des inconnues :**

- Soit a le nombre d'adultes.
- Soit e le nombre d'enfants.

2. **Mise en équations :**
   - Nombre total de spectateurs : $a + e = 240$.
   - Recette totale en euros : $8a + 4,5e = 1570$.
3. **Résolution par substitution :** De la première équation, on tire $e = 240 - a$. On injecte dans la deuxième :

$$8a + 4,5(240 - a) = 1570$$
$$8a + 1080 - 4,5a = 1570$$
$$3,5a + 1080 = 1570$$
$$3,5a = 1570 - 1080 = 490$$
$$a = \frac{490}{3,5} = \frac{4900}{35} = 140.$$

4. **Calcul de la seconde inconnue :**

$$e = 240 - 140 = 100.$$

5. **Conclusion et phrase réponse :** Il y avait 140 adultes et 100 enfants dans la salle. Vérification : $140 \times 8 + 100 \times 4,5 = 1120 + 450 = 1570$ €. Tout est cohérent.

Ce qu'il faut retenir

1. **Les règles d'or des inégalités :**
   - Ajouter ou soustraire un même nombre ne change **jamais** le sens de l'inégalité.
   - Multiplier ou diviser par un nombre **positif** ne change **pas** le sens.
   - Multiplier ou diviser par un nombre **négatif INVERSE OBLIGATOIREMENT le sens** ($<$ devient $>$, $\leq$ devient $\geq$).
2. **Représentation sur droite graduée :**
   - Crochet fermé $[$ ou $]$ vers les solutions si le nombre est **inclus** ($\leq, \geq$).
   - Crochet ouvert $]$ ou $[$ dos aux solutions si le nombre est **exclu** ($<, >$).
3. **Système de deux équations à deux inconnues :**

$$\{ax + by = c$$
$$a'x + b'y = c'$$

- **Méthode par substitution :** isoler une inconnue dans une ligne et la remplacer dans l'autre (idéale si un coefficient vaut 1 ou -1).
- **Méthode par combinaison :** multiplier les lignes pour obtenir des coefficients opposés devant une inconnue, puis additionner les deux lignes (universelle).

4. **Vision graphique :** La solution d'un système correspond aux coordonnées $(x; y)$ du point d'intersection des deux droites associées.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 24.1 Compléter avec le symbole adapté ($<$ ou $>$) : 1. Sachant que $x < 5$, comparer $x + 4$ et 9. 2. Sachant que $y \geq -2$, comparer $y - 3$ et -5. 3. Sachant que $a < b$, comparer $3a$ et $3b$. 4. Sachant que $u < v$, comparer $-4u$ et $-4v$.

Exercice 24.2 Résoudre les inéquations simples du premier degré : 1. $x + 7 < 15$ 2. $x - 9 \geq 3$ 3. $4x \leq 28$ 4. $-5x < 35$ 5. $-2x \geq -18$ 6. $\frac{x}{3} > -4$

Exercice 24.3 Représenter sur une droite graduée les ensembles de solutions suivants : 1. $x > 4$ 2. $x \leq -1$ 3. $x \geq 2,5$ 4. $x < 0$

Exercice 24.4 Tester si le couple $(x = 3\ ;\ y = 2)$ est solution des systèmes suivants : 1. $\begin{cases} x - y = 1 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 5x + 2y = 20 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

Exercice 24.5 Résoudre par la méthode de substitution : 1. $\begin{cases} 3x + y = 14 \\ 2x + y = 11 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 3x - 4y = 4 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

Exercice 24.6 Résoudre par la méthode de combinaison linéaire : 1. $\begin{cases} 3x - y = 9 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 5x - 2y = 20 \end{cases}$

Niveau : Réflexion et enchaînements

Exercice 24.7 Résoudre et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle : 1. $5x - 8 < 2x + 7$ 2. $3(x - 2) - 4(2x + 1) \geq 5$ 3. $\frac{3x-1}{4} \leq \frac{x+2}{2}$

Exercice 24.8 Inéquations à double encadrement : Trouver tous les nombres x vérifiant à la fois :

$$-3 \leq 2x + 1 < 9.$$

(Indication : retrancher 1 à chaque membre, puis diviser par 2).

Exercice 24.9 Résoudre les systèmes linéaires : 1. $\begin{cases} 2x - 5y = -7 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 3x - 4y = 11 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 4x - 6y = 10 \end{cases}$ (Que se passe-t-il graphiquement ?)

Exercice 24.10 Le problème du parc de loisirs : Un parc d'attractions propose deux formules :

- **Formule A :** 25 € l'entrée générale donnant un accès illimité à tous les manèges.
- **Formule B :** 9 € l'entrée simple, plus 2 € par attraction individuelle.

1. Écrire le prix payé pour chacune des formules si l'on fait x attractions.
2. Résoudre une inéquation pour déterminer à partir de combien d'attractions la Formule A devient plus économique que la Formule B.

Exercice 24.11 Le problème de l'alliage d'argent : Un orfèvre dispose de deux lingots d'argent :

- Le premier lingot contient $80\,\%$ d'argent pur.
- Le second lingot contient $60\,\%$ d'argent pur.

Il veut fondre ces deux lingots pour obtenir exactement 500 grammes d'un nouvel alliage titré à $75\,\%$ d'argent pur. Quelle masse de chaque lingot doit-il faire fondre ?

Exercice 24.12 Géométrie et périmètre : Un rectangle a une longueur qui dépasse sa largeur de 4 cm. Son périmètre est strictement inférieur à 36 cm. Quelles valeurs peut prendre la largeur de ce rectangle ?

Niveau : Défis et recherche

Exercice 24.13 Intersection graphique de deux droites de tarifs : Dans un repère orthogonal, on trace les deux droites d'équations : $(d_1) : y = 2x + 1$ et $(d_2) : y = -x + 7$. 1. Trouver algébriquement les coordonnées de leur point d'intersection K. 2. Résoudre graphiquement puis par le calcul l'inéquation $2x + 1 \leq -x + 7$. 3. Interpréter le résultat : quelle droite se situe en dessous de l'autre ?

Exercice 24.14 Le problème des âges chinois : Un père dit à son fils : *« Aujourd'hui, j'ai quatre fois ton âge. Mais dans 20 ans, je n'aurai plus que le double de ton âge. »* Quels sont les âges actuels du père et du fils ?

Exercice 24.15 Système à paramètres (pour futurs scientifiques) : On considère le système :

$$\begin{cases} ax + 2y = 4 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$$

Pour quelle valeur du nombre a ce système ne possède-t-il aucun couple solution unique ? Que peut-on dire des deux droites associées pour cette valeur de a ?

Solutions

Niveau

Solution 24.1 1. $x + 4 < 9$ (on a ajouté 4 aux deux membres). 2. $y - 3 \geq -5$ (on a retranché 3 aux deux membres). 3. $3a < 3b$ (on a multiplié par $3 > 0$). 4. $-4u > -4v$ (on a multiplié par $-4 < 0$, le sens s'inverse !).

Solution 24.2 1. $x < 15 - 7 \Longrightarrow x < 8$. 2. $x \geq 3 + 9 \Longrightarrow x \geq 12$. 3. $x \leq \frac{28}{4} \Longrightarrow x \leq 7$. 4. Division par $-5 < 0$: $x > \frac{35}{-5} \Longrightarrow x > -7$. 5. Division par $-2 < 0$: $x \leq \frac{-18}{-2} \Longrightarrow x \leq 9$. 6. Multiplication par $3 > 0$: $x > -12$.

Solution 24.3 1. Zone hachurée à droite de 4, crochet ouvert tourné vers la gauche : $]4\ ;\ +\infty[$. 2. Zone hachurée à gauche de -1, crochet fermé tourné vers la gauche : $]-\infty\ ;\ -1]$. 3. Zone hachurée à droite de $2,5$, crochet fermé tourné vers la droite : $[2,5\ ;\ +\infty[$. 4. Zone hachurée à gauche de 0, crochet ouvert tourné vers la droite : $]-\infty\ ;\ 0[$.

Solution 24.4 1. $2(3) + 2 = 6 + 2 = 8$ (vrai) et $3 - 2 = 1$ (vrai). Le couple $(3\ ;\ 2)$ est bien solution du premier système. 2. $3(3) - 4(2) = 9 - 8 = 1$ (vrai). Mais $5(3) + 2(2) = 15 + 4 = 19 \neq 20$ (faux !). Le couple n'est pas solution du second système.

Solution 24.5 1. On remplace y par $2x - 1$ dans la deuxième équation : $3x + (2x - 1) = 14 \Longrightarrow 5x - 1 = 14 \Longrightarrow 5x = 15 \Longrightarrow x = 3$. Puis $y = 2(3) - 1 = 5$. Solution : $(3\ ;\ 5)$. 2. De la première ligne : $x = 8 - 2y$. Deuxième ligne : $3(8 - 2y) - 4y = 4 \Longrightarrow 24 - 6y - 4y = 4 \Longrightarrow -10y = -20 \Longrightarrow y = 2$. Puis $x = 8 - 2(2) = 4$. Solution : $(4\ ;\ 2)$.

Solution 24.6 1. En additionnant directement les deux lignes ($+y$ et $-y$ s'annulent) : $(2x + 3x) + (y - y) = 11 + 9 \Longrightarrow 5x = 20 \Longrightarrow x = 4$. Puis $2(4) + y = 11 \Longrightarrow 8 + y = 11 \Longrightarrow y = 3$. Solution : $(4\ ;\ 3)$. 2. En additionnant directement ($+2y$ et $-2y$ s'annulent) : $8x = 32 \Longrightarrow x = 4$. Puis $3(4) + 2y = 12 \Longrightarrow 12 + 2y = 12 \Longrightarrow 2y = 0 \Longrightarrow y = 0$. Solution : $(4\ ;\ 0)$.

Niveau

Solution 24.7 1. $5x - 2x < 7 + 8 \Longrightarrow 3x < 15 \Longrightarrow x < 5$. Soit $S =]-\infty\ ;\ 5[$. 2. $3x - 6 - 8x - 4 \geq 5 \Longrightarrow -5x - 10 \geq 5 \Longrightarrow -5x \geq 15 \Longrightarrow x \leq -3$ (inversion du sens). Soit $S =]-\infty\ ;\ -3]$. 3. Multiplions par 4 (positif) : $3x - 1 \leq 2(x + 2) \Longrightarrow 3x - 1 \leq 2x + 4 \Longrightarrow x \leq 5$. Soit $S =]-\infty\ ;\ 5]$.

Solution 24.8 On soustrait 1 à chacun des trois membres :

$$-3 - 1 \leq 2x < 9 - 1 \Longrightarrow -4 \leq 2x < 8.$$

On divise chacun des membres par $2 > 0$:

$$-2 \leq x < 4.$$

Les solutions sont tous les nombres réels compris entre -2 (inclus) et 4 (exclu). $S = [-2\ ;\ 4[$.

Solution 24.9 1. Multiplions la 2e équation par -2 : $-4x + 10y = 14$. Ajoutons à la 1re $(4x + 3y = 25)$: $13y = 39 \Longrightarrow y = 3$. Puis $2x - 5(3) = -7 \Longrightarrow 2x - 15 = -7 \Longrightarrow 2x = 8 \Longrightarrow x = 4$. Solution : $(4\ ;\ 3)$. 2. Multiplions la 1re équation par 2 : $10x + 4y = 2$. Ajoutons à la 2e $(3x - 4y = 11)$: $13x = 13 \Longrightarrow x = 1$. Puis $5(1) + 2y = 1 \Longrightarrow 2y = -4 \Longrightarrow y = -2$. Solution : $(1\ ;\ -2)$. 3. Multiplions la 1re équation par 2 : $4x - 6y = 14$. La 2e équation est $4x - 6y = 10$. Soustrayons les deux lignes : $(4x - 4x) - (6y - 6y) = 14 - 10 \Longrightarrow 0 = 4$, ce qui est **impossible** ! Graphiquement, les deux droites ont la même pente : elles sont **strictement parallèles**. Il n'y a aucun point d'intersection, donc aucune solution ($S = \varnothing$).

Solution 24.10 1. Pour x attractions : Prix Formule A $= 25$ € ; Prix Formule B $= 9 + 2x$ €. 2. La Formule A est plus économique si :

$$25 < 9 + 2x \Leftrightarrow 25 - 9 < 2x \Leftrightarrow 16 < 2x \Leftrightarrow 8 < x \Leftrightarrow x > 8.$$

Puisque le nombre d'attractions est un nombre entier, la Formule A devient plus avantageuse à partir de **9 attractions**.

Solution 24.11 Soit x la masse (en g) du premier lingot (à 80 %) et y la masse du second (à 60 %). 1. Masse totale : $x + y = 500$. 2. Masse d'argent pur : $0,80x + 0,60y = 0,75 \times 500 = 375$. De la 1re équation : $y = 500 - x$. Remplaçons dans la 2e : $0,8x + 0,6(500 - x) = 375 \Longrightarrow 0,8x + 300 - 0,6x = 375 \Longrightarrow 0,2x = 75 \Longrightarrow x = \frac{75}{0,2} = 375$ g. Puis $y = 500 - 375 = 125$ g. L'orfèvre doit faire fondre 375 g du premier lingot et 125 g du second.

Solution 24.12 Soit ℓ la largeur en cm. La longueur est $L = \ell + 4$. Le périmètre est $P = 2(\ell + L) = 2(\ell + \ell + 4) = 2(2\ell + 4) = 4\ell + 8$. L'énoncé indique que $P < 36$, d'où :

$$4\ell + 8 < 36 \Longrightarrow 4\ell < 28 \Longrightarrow \ell < 7.$$

De plus, une largeur doit être strictement positive ($\ell > 0$). La largeur ℓ peut donc prendre n'importe quelle valeur strictement comprise entre 0 et 7 cm : $\ell \in]0\ ;\ 7[$.

Niveau

Solution 24.13 1. Au point d'intersection, les ordonnées y sont égales :

$$2x + 1 = -x + 7 \Longrightarrow 3x = 6 \Longrightarrow x = 2.$$

Puis $y = 2(2) + 1 = 5$. Le point d'intersection est $K(2\ ;\ 5)$. 2. Résolvons $2x + 1 \leq -x + 7$:

$$3x \leq 6 \Longrightarrow x \leq 2.$$

L'ensemble des solutions est $S =]-\infty\ ;\ 2]$. 3. Interprétation : pour toutes les abscisses $x \leq 2$, la droite (d_1) est située **en dessous** (ou coupe) la droite (d_2). Au-delà de $x = 2$, c'est la droite (d_1) qui passe au-dessus.

Solution 24.14 Soit p l'âge actuel du père et f l'âge actuel du fils. 1. « Aujourd'hui, j'ai 4 fois ton âge » : $p = 4f$. 2. « Dans 20 ans, le père aura $p + 20$ et le fils aura $f + 20$ » :

$$p + 20 = 2(f + 20).$$

Substituons $p = 4f$ dans la deuxième égalité :

$$4f + 20 = 2f + 40 \Longrightarrow 2f = 20 \Longrightarrow f = 10.$$

Puis $p = 4 \times 10 = 40$. Le père a aujourd'hui 40 ans et le fils a 10 ans. Vérification dans 20 ans : le père aura 60 ans, le fils 30 ans, et 60 est bien le double de 30 !

Solution 24.15 Isolons y dans la seconde équation : $y = 2 - 3x$. Remplaçons dans la première équation :

$$ax + 2(2 - 3x) = 4 \Longrightarrow ax + 4 - 6x = 4 \Longrightarrow (a - 6)x = 0.$$

- Si $a \neq 6$, alors $a - 6 \neq 0$, et on trouve une solution unique $x = 0$ (d'où $y = 2$).
- Si $a = 6$, l'équation devient $0 \times x = 0$, ce qui est vrai pour **tout réel x** ! Dans ce cas, les deux équations sont en fait équivalentes ($6x + 2y = 4 \Leftrightarrow 3x + y = 2$). Les deux droites sont **confondues**, et il y a une infinité de solutions.

Pour avoir deux droites strictement parallèles (aucune solution), il aurait fallu une équation comme $6x + 2y = 5$. Conclusion : la valeur critique est $\boldsymbol{a = 6}$. Pour cette valeur, le déterminant s'annule ($a \times 1 - 2 \times 3 = a - 6 = 0$), et le système n'admet plus de solution unique.

La question qui ouvre la suite

Regarde ce que nous venons de faire : à chaque nombre de litres d'huile x, nous avons associé un coût $P(x) = 6x$ ou $P(x) = 30 + 4x$. À chaque nombre de manèges, nous avons associé une dépense totale.

Ce mécanisme puissant où un nombre en entrée produit un nombre unique en sortie s'appelle une **fonction**. Pourquoi ne pas regarder cette machine en face ? Quelle forme a le chemin tracé par une relation proportionnelle ou par un abonnement fixe ? C'est le grand voyage qui nous attend dans le chapitre 25 : **La Machine à Doubler et la Droite du Tarif**.

CHAPITRE 25 : La Machine à Doubler et la Droite du Tarif

> « Une équation est un instantané : elle fige la balance à la recherche d'un trésor immobile. Une fonction, c'est le film tout entier : elle saisit le mouvement du monde, où chaque cause entraîne un effet, où chaque pas en avant élève le voyageur vers une nouvelle altitude. »

Ce que tu vas découvrir

- Qu'est-ce qu'une **fonction** : la formidable « boîte magique » qui avale un nombre et en recrache un autre selon une loi immuable.
- Le vocabulaire officiel sans mystère : qui est l'**antécédent**, qui est l'**image**, et pourquoi on note $f(x)$ ou $x \mapsto f(x)$.
- Les trois miroirs d'une fonction : sa **formule**, son **tableau de valeurs** et sa **courbe graphique**.
- La **fonction linéaire** $f(x) = ax$: l'incarnation géométrique de la proportionnalité, la droite fidèle qui ne quitte jamais l'origine $(0; 0)$.
- La **fonction affine** $f(x) = ax + b$: la droite des abonnements du monde réel, son **coefficient directeur** a (la pente) et son **ordonnée à l'origine** b (le prix d'entrée).
- Comment lire et fabriquer ces droites d'un simple coup d'œil : « j'avance de 1, je monte de a ».
- Des applications palpitantes : forfaits mobiles, compteurs de taxi, vitesses, et la célèbre conversion entre degrés Celsius et Fahrenheit.

---

1. Le problème : la forge magique et le compteur du loueur de barques

Imagine que tu visites un village perché au bord d'un grand lac de montagne. Au bout de la jetée, deux artisans proposent leurs services aux voyageurs.

Le premier est un vieil horloger inventeur. Dans son atelier, il a fabriqué une boîte d'acier munie d'une fente sur le dessus et d'un tiroir en bas. Il l'appelle sa **« Machine à Transformer »**.

- Si tu glisses le chiffre **3** dans la fente, des engrenages tournent, et le tiroir éjecte le nombre **11**.
- Si tu glisses **5**, la machine éjecte **17**.
- Si tu glisses **0**, elle éjecte **2**.
- Si tu glisses -4, elle éjecte -10.



Fig. 70. – La fonction comme machine entrée-sortie : antécédent x et image f(x)

Les enfants du village se rassemblent : *« Quelle est la formule secrète cachée dans les rouages de la boîte ? »* Regarde bien :

- $3 \times 3 + 2 = 9 + 2 = 11$.
- $5 \times 3 + 2 = 15 + 2 = 17$.
- $0 \times 3 + 2 = 2$.
- $(-4) \times 3 + 2 = -12 + 2 = -10$.

La règle universelle est démasquée : quel que soit le nombre x jeté dans la boîte, celle-ci calcule $3x + 2$.

Juste à côté de l'atelier, le **loueur de barques** affiche ses conditions pour traverser le lac : *« Pour monter à bord, chaque passager paie 10 € de droit fixe d'embarquement (gilet de sauvetage et assurance). Ensuite, chaque heure passée sur l'eau coûte 15 €. »*

Combien paiera une famille qui loue une barque pendant 1 heure ? 2 heures ? 4 heures ?

- Pour 1 h : $10 + 15 \times 1 = 25$ €.
- Pour 2 h : $10 + 15 \times 2 = 40$ €.
- Pour 4 h : $10 + 15 \times 4 = 70$ €.
- Pour x heures : le tarif total est $T(x) = 15x + 10$.

Ces deux situations ne sont pas des équations où l'on cherche un x unique. Ce sont des **règles vivantes de correspondance**, des liens de dépendance continue entre deux grandeurs. C'est l'essence même du concept de **fonction**, la colonne vertébrale des mathématiques modernes et de toutes les sciences de la nature.

---

2. Le concept de fonction et son vocabulaire

2.1 Qu'est-ce qu'une fonction ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fonction.** Une **fonction** est un procédé mathématique qui, à un nombre de départ (la variable), associe **un seul et unique** nombre d'arrivée (le résultat).

On donne souvent un petit nom à cette fonction : une lettre minuscule comme f, g, ou h (pour « fonction »), ou une majuscule parlante comme T (pour « Tarif ») ou V (pour « Volume »).

2.2 Antécédent et Image : ne jamais les confondre !

C'est le vocabulaire officiel que tu utiliseras jusqu'au Baccalauréat. Pour ne jamais les mélanger, retiens cette métaphore du miroir ou de la photographie :

- **L'antécédent** (du latin *antecedere*, « venir avant ») : c'est le nombre qu'on met **en entrée** dans la machine. C'est le x.
- **L'image** : c'est le résultat calculé qui sort **à l'arrivée**. C'est le $f(x)$.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention capitale !**

- Un antécédent possède **une seule et unique image** (la machine ne peut pas donner deux résultats contradictoires pour un même bouton pressé).
- En revanche, une même image peut avoir **plusieurs antécédents différents** ! *Exemple :* Si la machine élève au carré ($f(x) = x^2$), l'image 9 possède **deux antécédents** : 3 (car $3^2 = 9$) et -3 (car $(-3)^2 = 9$).

2.3 Les notations : comment écrire et comment lire

Notation écrite	Prononciation à voix haute	Rôle exact
f	« la fonction f »	C'est le nom de la machine tout entière (l'outil).
$f(x)$	« f de x »	C'est le **nombre d'arrivée** associé au nombre x.
$x \mapsto f(x)$	« à x on associe f de x »	C'est la flèche de processus (remarque le petit talon vertical au départ de la flèche $\mapsto$).

Exemple concret : Soit la fonction $g(x) = 2x - 5$.

- Calculons l'image de 4 : On remplace x par 4 : $g(4) = 2 \times 4 - 5 = 8 - 5 = 3$. On dit : « L'image de 4 par la fonction g est 3 », ou « 4 est un antécédent de 3 par g ».
- Cherchons l'antécédent de 11 : On cherche la valeur de x telle que $g(x) = 11$. C'est une équation !
$$2x - 5 = 11 \Longrightarrow 2x = 16 \Longrightarrow x = 8.$$
L'antécédent de 11 par g est 8.

---

3. Les trois visages d'une même fonction

Une fonction est un être abstrait. Pour la voir et travailler avec elle, les mathématiciens disposent de trois représentations complémentaires :

1. L'expression algébrique	2. Le tableau de valeurs	3. La courbe représentative
La formule exacte Exemple : $f(x) = 2x + 1$	Échantillons finis de couples $(x; f(x))$	Vision géométrique continue dans le repère

3.1 Le tableau de valeurs

On choisit quelques nombres pour x sur la première ligne, et on calcule leur image $f(x)$ sur la seconde :

x (antécédents)	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2x + 1$ (images)	-3	-1	1	3	5	7

Chaque colonne du tableau fournit les coordonnées d'un point : $(-2; -3)$, $(-1; -1)$, $(0; 1)$, $(1; 3)$, etc.

3.2 La courbe représentative dans un repère

On place ces points dans un repère cartésien $(O; I, J)$:

- L'axe horizontal (l'axe des abscisses) porte les **antécédents** x.
- L'axe vertical (l'axe des ordonnées) porte les **images** $y = f(x)$.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Courbe représentative.** La courbe représentative d'une fonction f (notée $\mathcal{C}_f$) est l'ensemble de tous les points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ du plan.

---

4. La fonction linéaire : la pure proportionnalité $f(x) = ax$

4.1 Définition et sens concret

Une **fonction linéaire** est la plus simple et la plus noble des fonctions : c'est la traduction en langage algébrique d'une **situation de proportionnalité parfaite** (que tu as étudiée au Chapitre 13).

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fonction linéaire.** Une fonction linéaire est une fonction définie par une formule de la forme :

$$f(x) = ax$$

où a est un nombre fixe donné, appelé **coefficient de proportionnalité** (ou coefficient directeur).

Exemples : - Acheter des cerises à 4 € le kilo : $P(x) = 4x$ ($a = 4$). - Rouler à bicyclette à la vitesse constante de 20 km/h : distance $d(t) = 20t$ ($a = 20$). - Une réduction de 30 % : le nouveau prix est $N(x) = (1 - 0,30)x = 0,7x$ ($a = 0,7$).

4.2 Représentation graphique : la droite qui passe par l'origine

Si tu traces les points d'une fonction linéaire dans un repère, tu constates un miracle géométrique : **tous les points sont rigoureusement alignés avec l'origine du repère $O(0,0)$!**

Pourquoi ? Parce que si tu n'achètes rien ($x = 0$), tu ne paies rien ($f(0) = a \times 0 = 0$).



Fig. 71. – Représentation graphique de la fonction affine : pente et ordonnée à l'origine

📐 Théorème graphique —

La représentation graphique d'une fonction linéaire $f(x) = ax$ est **une droite qui passe par l'origine du repère $O(0,0)$**. Réciproquement, toute droite non verticale qui passe par l'origine représente une fonction linéaire.

Pour tracer la droite d'une fonction linéaire, il suffit donc de calculer **un seul point supplémentaire** en plus de l'origine $(0;0)$!

---

5. La fonction affine : la droite générale du tarif $f(x) = ax + b$

5.1 Définition : proportionnalité avec abonnement

Que se passe-t-il quand une situation comporte un prix fixe de départ (un forfait, une prise en charge, une caution) auquel s'ajoute un tarif proportionnel ? Ce n'est plus une proportionnalité pure, mais c'est une **fonction affine**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fonction affine.** Une fonction affine est une fonction définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = ax + b$$

où a et b sont deux nombres fixés.

- Le nombre a s'appelle le **coefficient directeur** (ou pente de la droite).
- Le nombre b s'appelle l'**ordonnée à l'origine**.

5.2 Pourquoi ce vocabulaire ?

1. **L'ordonnée à l'origine (b) :** Calculons l'image de 0 :
$$f(0) = a \times 0 + b = 0 + b = b.$$
Le point de la droite correspondant à $x = 0$ a pour coordonnées $(0\ ;\ b)$. C'est très exactement l'endroit où la droite **traverse l'axe des ordonnées** (vertical) !
2. **Le coefficient directeur (a) :** Il dicte la « direction » et l'inclinaison de la droite :
   - Si $a > 0$, la fonction est **croissante** (la droite monte quand on va de gauche à droite).
   - Si $a < 0$, la fonction est **décroissante** (la droite descend).
   - Plus $|a|$ est grand, plus la droite est raide (pente forte). Plus $|a|$ est proche de 0, plus la droite est plate.

5.3 Les cas particuliers remarquables

- Si $b = 0$, la formule devient $f(x) = ax$: une fonction linéaire est simplement une **fonction affine particulière** qui démarre à $b = 0$.
- Si $a = 0$, la formule devient $f(x) = b$: c'est une **fonction constante**. L'image vaut toujours b, quelle que soit la valeur de x. Sa représentation graphique est une **droite horizontale**.

---

6. L'art de tracer et de lire graphiquement

6.1 L'escalier magique : « J'avance de 1, je monte de a »

Pour tracer la droite d'équation $y = ax + b$ sans faire de tableau de calculs interminable, utilise la règle des marches d'escalier :

1. Place d'abord le point de départ sur l'axe vertical : le point $(0\ ;\ b)$.
2. Depuis ce point, **avance horizontalement de 1 unité vers la droite**.
3. Puis :
   - Si a est positif : **monte verticalement de a unités**.
   - Si a est négatif : **descends verticalement de $|a|$ unités**.
4. Tu obtiens un deuxième point. Pose ta règle entre les deux points : la droite est tracée !

6.2 Comment calculer le coefficient directeur a à partir de deux points ?

Si une droite passe par deux points connus $A(x_A\ ;\ y_A)$ et $B(x_B\ ;\ y_B)$ (avec $x_A \neq x_B$), son coefficient directeur se calcule par le rapport fondamental :

$$a = \frac{\text{Variation verticale}}{\text{Variation horizontale}} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Le symbole Δ (la lettre grecque « Delta » majuscule) signifie « différence » ou « variation ». Cette formule affirme que la pente est le nombre d'unités dont on grimpe verticalement pour chaque unité franchie vers la droite.

---

7. L'histoire vraie : le thermomètre de Gabriel Fahrenheit et René de Réaumur

Au XVIII$^{\text{e}}$ siècle, les savants européens cherchent à mesurer précisément la chaleur. En 1724, le physicien allemand Gabriel Fahrenheit invente le premier thermomètre à mercure fiable. Il fixe :

- 0° F : la température la plus glaciale qu'il parvient à créer dans son laboratoire avec un mélange d'eau, de glace et de sel d'ammoniaque.
- 96° F : la température du corps humain vivant (ajustée plus tard à $98,6^\circ$ F).

Dans son échelle, l'eau gèle à 32° F et bout à 212° F.

En 1742, l'astronome suédois Anders Celsius propose une échelle plus rationnelle basée sur l'eau pure :

- 0° C pour la glace fondante.
- 100° C pour l'ébullition de l'eau.

Comment passer instantanément de la température Celsius (x) à la température Fahrenheit ($f(x)$) ? C'est exactement une **fonction affine** !

- Le point de congélation donne le point $A(0\ ;\ 32)$.
- Le point d'ébullition donne le point $B(100\ ;\ 212)$.

Calculons la pente a et l'ordonnée à l'origine b : 1. Puisque $x = 0$ donne $y = 32$, l'ordonnée à l'origine est immédiatement :

$$b = 32.$$

2. Le coefficient directeur est :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = \frac{9}{5} = 1,8.$$

La formule universelle reliant les deux mondes est donc :

$$f(x) = 1,8x + 32 \quad \text{ou} \quad T_{\text{Fahrenheit}} = \frac{9}{5} T_{\text{Celsius}} + 32.$$

Quand il fait 20° C dans ta chambre, un Américain lit sur son thermomètre :

$$f(20) = 1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68^\circ \text{ F} \ !$$

---

8. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Calculs d'images et d'antécédents

On considère la fonction affine f définie par :

$$f(x) = -3x + 7.$$

1. Calculer l'image de 4 et l'image de -2. 2. Déterminer l'antécédent de -11. 3. Déterminer l'antécédent de 0.

Résolution détaillée : 1. Pour calculer une image, on injecte la valeur à la place de x :

- $f(4) = -3 \times 4 + 7 = -12 + 7 = -5$. L'image de 4 est -5.
- $f(-2) = -3 \times (-2) + 7 = +6 + 7 = 13$. L'image de -2 est 13.

2. Chercher l'antécédent de -11, c'est trouver la valeur de x qui vérifie $f(x) = -11$:

$$\begin{aligned} -3x + 7 &= -11 \\ -3x &= -11 - 7 = -18 \\ x &= \frac{-18}{-3} = 6. \end{aligned}$$

L'antécédent de -11 par f est 6.

3. Pour l'antécédent de 0 :

$$-3x + 7 = 0 \Longrightarrow -3x = -7 \Longrightarrow x = \frac{-7}{-3} = \frac{7}{3}.$$

L'antécédent de 0 est la fraction irréductible $\frac{7}{3}$.

Exemple 2 : Trouver l'expression d'une fonction affine passant par deux points

Une droite passe par les points $A(2\ ;\ 5)$ et $B(6\ ;\ 17)$. Déterminer la formule de la fonction affine $f(x) = ax + b$ dont cette droite est la représentation graphique.

Résolution détaillée : 1. **Calcul du coefficient directeur a :**

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{17 - 5}{6 - 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

La formule est donc déjà de la forme $f(x) = 3x + b$. 2. **Calcul de l'ordonnée à l'origine b :** Puisque le point $A(2\ ;\ 5)$ appartient à la droite, on a $f(2) = 5$:

$$3 \times 2 + b = 5$$

$$6 + b = 5 \Longrightarrow b = 5 - 6 = -1.$$

3. **Conclusion :** La fonction affine cherchée est :

$$f(x) = 3x - 1.$$

(Vérification immédiate avec le point B : $f(6) = 3 \times 6 - 1 = 18 - 1 = 17$. Parfait !)

Exemple 3 : Déterminer a et b par lecture graphique

Sur un graphique fourni, une droite (d) coupe l'axe vertical au point d'ordonnée -3. Lorsqu'on avance de 2 carreaux vers la droite, on doit monter de 5 carreaux pour retomber exactement sur la droite. 1. Donner l'ordonnée à l'origine b. 2. Donner le coefficient directeur a. 3. En déduire la formule de la fonction associée.

Résolution détaillée : 1. La droite coupe l'axe vertical en -3, donc l'ordonnée à l'origine est immédiatement :

$$b = -3.$$

2. Avancer de 2 en montant de 5 signifie :

$$\Delta x = +2 \quad \text{et} \quad \Delta y = +5.$$

Le coefficient directeur est :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

3. L'expression de la fonction est :

$$f(x) = 2,5x - 3 \quad \left(\text{ou} \;\; f(x) = \frac{5}{2}x - 3\right).$$

Exemple 4 : Problème de forfait de téléphone portable

Un opérateur propose deux abonnements mobiles :

- **Forfait Éco :** 0,10 € la minute d'appel, sans aucun abonnement fixe mensuel.
- **Forfait Sérénité :** un abonnement mensuel fixe de 12 €, plus 0,02 € par minute d'appel.

1. Exprimer les fonctions $E(x)$ et $S(x)$ associées à ces deux forfaits pour une durée de x minutes par mois.
2. Déterminer la nature de chacune de ces deux fonctions.
3. Calculer le montant de la facture pour 60 minutes de communication avec chaque forfait.
4. À partir de combien de minutes par mois le Forfait Sérénité devient-il plus rentable que le Forfait Éco ?

Résolution détaillée : 1. Pour x minutes de communication :

- $E(x) = 0,10x$.
- $S(x) = 0,02x + 12$.

2. E est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité pure, droite passant par l'origine). S est une **fonction affine** non linéaire (présence d'un terme constant $b = 12$).
3. Pour 60 minutes :
   - $E(60) = 0,10 \times 60 = 6$ €.
   - $S(60) = 0,02 \times 60 + 12 = 1,20 + 12 = 13,20$ €.
4. Sérénité est plus avantageux si sa facture est inférieure à celle d'Éco :

$$S(x) < E(x) \Leftrightarrow 0,02x + 12 < 0,10x$$

$$12 < 0,10x - 0,02x \Longrightarrow 12 < 0,08x \Longrightarrow x > \frac{12}{0,08} = 150.$$

Conclusion : Le Forfait Sérénité devient plus rentable dès que l'on téléphone **plus de 150 minutes (soit 2 h 30) par mois**.

Exemple 5 : Vitesse, distance et fonction affine

Une citerne d'eau contient 800 litres. À 8 h 00 du matin, on ouvre une vanne de vidange : l'eau s'écoule à un débit régulier et constant de 25 litres par minute. 1. Exprimer le volume d'eau $V(t)$ (en litres) restant dans la citerne en fonction du temps t écoulé (en minutes). 2. Quelle est la nature de la fonction V ? Quel est le signe de son coefficient directeur ? 3. Combien d'eau reste-t-il au bout de 12 minutes ? 4. Au bout de combien de temps la citerne sera-t-elle complètement vide ?

Résolution détaillée : 1. Au départ ($t = 0$), il y a 800 L. Chaque minute, on perd 25 L. Le volume restant est :

$$V(t) = 800 - 25t = -25t + 800.$$

2. V est une **fonction affine** avec $a = -25$ et $b = 800$. Son coefficient directeur est **négatif** ($a = -25 < 0$) : la fonction est donc **décroissante** (le volume diminue au cours du temps). 3. Pour $t = 12$ min :

$$V(12) = -25 \times 12 + 800 = -300 + 800 = 500 \text{ litres}.$$

4. La citerne est vide lorsque le volume restant atteint 0 :

$$V(t) = 0 \Leftrightarrow -25t + 800 = 0 \Leftrightarrow 25t = 800 \Leftrightarrow t = \frac{800}{25} = 32 \text{ minutes}.$$

La citerne sera entièrement vidée à 8 h 32.

Ce qu'il faut retenir

1. **Vocabulaire fondamental :**
   - x est l'**antécédent** (nombre d'entrée).
   - $f(x)$ est l'**image** de x par f (nombre de sortie).
   - La notation $f : x \mapsto f(x)$ se lit « la fonction f qui à x associe $f(x)$ ».
2. **Fonction linéaire : $f(x) = ax$**
   - Représente une situation de **proportionnalité**.
   - Sa courbe est une **droite qui passe obligatoirement par l'origine $O(0,0)$**.
3. **Fonction affine : $f(x) = ax + b$**
   - Sa courbe est une **droite** qui coupe l'axe vertical au point $(0\ ;\ b)$.
   - b est l'**ordonnée à l'origine** : $f(0) = b$.
   - a est le **coefficient directeur** (la pente) :

     $$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

     Si $a > 0$, la droite monte. Si $a < 0$, la droite descend. Si $a = 0$, la droite est horizontale (fonction constante).
4. **Lecture graphique d'une droite :**
   - Pour trouver l'image d'un nombre : on part de l'abscisse sur l'axe horizontal, on rejoint la droite verticalement, et on lit l'ordonnée sur l'axe vertical.
   - Pour trouver l'antécédent : on part de l'ordonnée sur l'axe vertical, on rejoint la droite horizontalement, et on lit l'abscisse sur l'axe horizontal.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 25.1 Vocabulaire et notations : Soit une fonction h telle que $h(3) = 7$. 1. Quelle est l'image de 3 par h ? 2. Quel est un antécédent de 7 par h ? 3. Traduire par une égalité de la forme $f(a) = b$ la phrase : « L'image de -5 par la fonction f est 12 ». 4. Traduire par une égalité la phrase : « -2 est un antécédent de 9 par la fonction g ».

Exercice 25.2 Calculs d'images : On considère la fonction affine $f(x) = 4x - 5$. Calculer : 1. $f(0)$ 2. $f(3)$ 3. $f(-2)$ 4. $f\left(\frac{1}{2}\right)$

Exercice 25.3 Calculs d'antécédents : Avec la même fonction $f(x) = 4x - 5$, déterminer l'antécédent de : 1. 15 2. -5 3. 0 4. -13

Exercice 25.4 Identification de la nature d'une fonction : Indiquer pour chaque fonction si elle est linéaire, affine non linéaire, ou ni l'une ni l'autre : 1. $f(x) = 5x$ 2. $g(x) = 3x - 8$ 3. $h(x) = x^2 + 1$ 4. $k(x) = 7$ 5. $m(x) = \frac{4}{x}$ 6. $p(x) = \frac{x}{5} + 2$

Exercice 25.5 Tracé de droites : Dans un repère, tracer les représentations graphiques des fonctions suivantes : 1. d_1 : $f(x) = 2x$ 2. d_2 : $g(x) = -x$ 3. d_3 : $h(x) = 2x - 3$ 4. d_4 : $k(x) = -0,5x + 2$

Niveau : Réflexion et enchaînements

Exercice 25.6 Détermination de formule à partir de points : 1. Une fonction linéaire g vérifie $g(4) = 14$. Déterminer l'expression de $g(x)$. 2. Une fonction affine f passe par les points $A(1\,;\,4)$ et $B(3\,;\,10)$. Calculer son coefficient directeur a, son ordonnée à l'origine b, et en déduire $f(x)$.

Exercice 25.7 Lecture graphique inversée : On observe une droite représentant une fonction affine f. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;\,4)$ et passe par le point $(4\,;\,0)$. 1. Déterminer la valeur de b. 2. Calculer la pente a. 3. Écrire la formule de $f(x)$. 4. Quel est le sens de variation de la fonction f ?

Exercice 25.8 Le taxi de nuit : Un chauffeur de taxi applique la tarification suivante :

- Prise en charge initiale dès l'allumage du compteur : 4,20 €.
- Prix du kilomètre parcouru : 1,60 €.

1. Écrire le montant de la course $C(x)$ pour une distance de x kilomètres.
2. Combien coûte un trajet de 15 km ?
3. Un voyageur dispose d'un billet de 25 €. Quelle distance maximale peut-il parcourir ?

Exercice 25.9 Point sur une droite (appartenance) : Soit la fonction affine $f(x) = -2x + 7$. 1. Le point $M(3\,;\,1)$ appartient-il à la droite représentative de f ? 2. Le point $N(-4\,;\,15)$ appartient-il à cette droite ? 3. Trouver l'abscisse du point P de la droite qui a pour ordonnée -9.

Exercice 25.10 Intersection de deux fonctions affines : Soit les fonctions $f(x) = 2x - 1$ et $g(x) = -x + 5$. 1. Tracer les deux droites dans un repère. 2. Déterminer graphiquement les coordonnées de leur point d'intersection I. 3. Retrouver ces coordonnées par le calcul en résolvant l'équation $f(x) = g(x)$.

Exercice 25.11 La bougie qui fond : Une bougie mesure 24 cm de haut. Lorsqu'on l'allume, sa hauteur diminue de 1,5 cm par heure de combustion. 1. Exprimer la hauteur $h(t)$ de la bougie en centimètres après t heures de combustion. 2. Quelle est la hauteur de la bougie après 6 heures ? 3. Au bout de combien d'heures la bougie sera-t-elle complètement consumée ?

Niveau : Défis et recherche

Exercice 25.12 Alignement de trois points : On donne trois points dans un repère : $A(-2\,;\,-7)$, $B(2\,;\,5)$ et $C(5\,;\,14)$. 1. Déterminer la fonction affine f dont la droite passe par A et B. 2. Le point C est-il aligné avec A et B ? (Indication : tester si $f(5) = 14$).

Exercice 25.13 Parallélisme et droites : On donne la droite (d_1) représentant $f(x) = 3x - 4$. On cherche une droite (d_2) qui est **parallèle** à (d_1) et qui passe par le point $E(2\,;\,9)$. 1. Que peut-on dire du coefficient directeur de (d_2) par rapport à celui de (d_1) ? 2. En déduire la formule de la fonction affine g associée à (d_2).

Exercice 25.14 Le mystère de la boîte à double saut : Une fonction affine inconnue $f(x) = ax + b$ possède cette curieuse propriété : Lorsqu'on l'applique deux fois de suite, c'est-à-dire en calculant $f(f(x))$, on obtient toujours le résultat $4x + 9$! 1. Développer l'expression littérale $f(f(x)) = a(ax + b) + b$. 2. En identifiant les coefficients avec $4x + 9$, trouver les deux valeurs possibles pour a. 3. En déduire les deux fonctions affines solutions de cette énigme.

Solutions

Niveau

Solution 25.1 1. L'image de 3 est 7. 2. Un antécédent de 7 est 3. 3. $f(-5) = 12$. 4. $g(-2) = 9$.

Solution 25.2 1. $f(0) = 4(0) - 5 = -5$. 2. $f(3) = 4(3) - 5 = 12 - 5 = 7$. 3. $f(-2) = 4(-2) - 5 = -8 - 5 = -13$. 4. $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{2} - 5 = 2 - 5 = -3$.

Solution 25.3 1. $4x - 5 = 15 \Longrightarrow 4x = 20 \Longrightarrow x = 5$. 2. $4x - 5 = -5 \Longrightarrow 4x = 0 \Longrightarrow x = 0$. 3. $4x - 5 = 0 \Longrightarrow 4x = 5 \Longrightarrow x = \frac{5}{4} = 1,25$. 4. $4x - 5 = -13 \Longrightarrow 4x = -8 \Longrightarrow x = -2$.

Solution 25.4 1. $f(x) = 5x$: linéaire (et affine avec $b = 0$). 2. $g(x) = 3x - 8$: affine non linéaire ($a = 3, b = -8$). 3. $h(x) = x^2 + 1$: ni l'une ni l'autre (présence de x^2, fonction non affine). 4. $k(x) = 7$: constante (affine avec $a = 0, b = 7$). 5. $m(x) = \frac{4}{x}$: ni l'une ni l'autre (fonction inverse, x au dénominateur). 6. $p(x) = \frac{1}{5}x + 2$: affine ($a = 0,2, b = 2$).

Solution 25.5 1. d_1 passe par $(0; 0)$ et $(1; 2)$. 2. d_2 passe par $(0; 0)$ et $(1; -1)$. 3. d_3 passe par $(0; -3)$ et $(1; -1)$ (ou $(2; 1)$). 4. d_4 passe par $(0; 2)$ et $(2; 1)$ (ou $(4; 0)$).

Niveau

Solution 25.6 1. $g(x) = ax$. Puisque $g(4) = 14$, on a $4a = 14 \Longrightarrow a = \frac{14}{4} = 3,5$. Donc $g(x) = 3,5x$. 2. $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{10-4}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$. Donc $f(x) = 3x + b$. En utilisant $A(1; 4)$: $3(1) + b = 4 \Longrightarrow b = 1$. D'où $f(x) = 3x + 1$.

Solution 25.7 1. La droite coupe l'axe vertical en $(0; 4)$, donc $b = 4$. 2. Elle passe par $(4; 0)$. Donc $a = \frac{0-4}{4-0} = \frac{-4}{4} = -1$. 3. $f(x) = -x + 4$. 4. Puisque $a = -1 < 0$, la fonction est **strictement décroissante** (la droite descend).

Solution 25.8 1. $C(x) = 1,60x + 4,20$. 2. Pour 15 km : $C(15) = 1,60 \times 15 + 4,20 = 24 + 4,20 = 28,20$ €. 3. Avec 25 € : $1,60x + 4,20 \leq 25 \Longrightarrow 1,60x \leq 20,80 \Longrightarrow x \leq \frac{20,80}{1,60} = 13$ km. Il peut parcourir au maximum 13 km.

Solution 25.9 1. Calculons $f(3)$: $f(3) = -2(3) + 7 = -6 + 7 = 1$. L'ordonnée vaut bien 1, donc le point $M(3\ ;\ 1)$ appartient bien à la droite. 2. Calculons $f(-4)$: $f(-4) = -2(-4) + 7 = 8 + 7 = 15$. Oui, $N(-4\ ;\ 15)$ appartient aussi à la droite. 3. On cherche x tel que $f(x) = -9$: $-2x + 7 = -9 \Longrightarrow -2x = -16 \Longrightarrow x = 8$. L'abscisse de P est 8.

Solution 25.10 1. Les droites se tracent facilement : f passe par $(0; -1)$ et $(2; 3)$; g passe par $(0; 5)$ et $(2; 3)$. 2. Graphiquement, le point d'intersection est $I(2\ ;\ 3)$. 3. Par le calcul :

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2x - 1 = -x + 5 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2.$$

Puis $f(2) = 2(2) - 1 = 3$. Le point d'intersection est bien $I(2\ ;\ 3)$.

Solution 25.11 1. $h(t) = -1,5t + 24$. 2. Après 6 heures : $h(6) = -1,5 \times 6 + 24 = -9 + 24 = 15$ cm. 3. Bougie consumée : $h(t) = 0 \Leftrightarrow -1,5t + 24 = 0 \Leftrightarrow 1,5t = 24 \Leftrightarrow t = \frac{24}{1,5} = 16$ heures.

Niveau

Solution 25.12 1. Calculons la droite passant par $A(-2; -7)$ et $B(2; 5)$: $a = \frac{5-(-7)}{2-(-2)} = \frac{12}{4} = 3$. $f(x) = 3x + b$. Avec $B(2; 5)$: $3(2) + b = 5 \Longrightarrow 6 + b = 5 \Longrightarrow b = -1$. Donc $f(x) = 3x - 1$. 2. Testons si $C(5; 14)$ appartient à cette droite : $f(5) = 3(5) - 1 = 15 - 1 = 14$. L'égalité est parfaitement vérifiée : le point C est donc **aligné** avec les points A et B !

Solution 25.13 1. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles possèdent le **même coefficient directeur** (la même inclinaison). Donc pour (d_2), on a aussi $a = 3$. 2. La fonction g s'écrit $g(x) = 3x + b$. Elle passe par $E(2; 9)$, donc $g(2) = 9$:

$$3(2) + b = 9 \Longrightarrow 6 + b = 9 \Longrightarrow b = 3.$$

La formule est : $g(x) = 3x + 3$.

Solution 25.14 1. On applique f au résultat $f(x) = ax + b$:

$$f(f(x)) = a(ax + b) + b = a^2x + ab + b = a^2x + b(a + 1).$$

2. On veut que cette formule soit égale à $4x + 9$ pour tout x :

- Pour le terme en x : $a^2 = 4 \Longrightarrow a = 2$ ou $a = -2$.
- Pour le terme constant : $b(a + 1) = 9$.

3. Deux cas se présentent :
   - Premier cas : si $a = 2$, alors $b(2 + 1) = 9 \Longrightarrow 3b = 9 \Longrightarrow b = 3$. La première fonction est : $f_1(x) = 2x + 3$. *(Vérification :* $f_1(f_1(x)) = 2(2x + 3) + 3 = 4x + 6 + 3 = 4x + 9$ *!)*
   - Deuxième cas : si $a = -2$, alors $b(-2 + 1) = 9 \Longrightarrow b(-1) = 9 \Longrightarrow b = -9$. La deuxième fonction est : $f_2(x) = -2x - 9$. *(Vérification :* $f_2(f_2(x)) = -2(-2x - 9) - 9 = 4x + 18 - 9 = 4x + 9$ *!)*

La question qui ouvre la suite

Jusqu'ici, les nombres nous ont servi à calculer des poids, des prix, des aires et des trajectoires droites. Mais regarde autour de toi : un motif de tissu qui se répète, les tuiles d'un toit, une fleur à six pétales, les mosaïques infinies de l'Alhambra de Grenade ou l'art vertigineux de Maurits Cornelis Escher.

Comment un même triangle ou une même figure peut-il **glisser**, **pivoter**, se **refléter dans un miroir** ou **grossir comme sous une loupe** tout en conservant scrupuleusement sa forme ? C'est le monde enchanteur des transformations du plan que nous allons explorer dans le chapitre 26 : **Le Pliage de Papier et le Miroir Magique**.

CHAPITRE 26 : Le Pliage de Papier et le Miroir Magique

> « Regarde une goutte d'eau qui tombe dans un lac, les ailes d'un papillon qui s'ouvrent au soleil ou le visage de ton ami : la nature ne choisit jamais ses formes au hasard. Elle construit dans le miroir de la symétrie, car ce qui est symétrique partage la force, équilibre les masses et résiste à la tempête. »

Ce que tu vas découvrir

- Le secret des bâtisseurs médiévaux : pourquoi l'asymétrie détruit les ponts et comment la **médiatrice** et la **bissectrice** créent l'harmonie.
- La grande famille des transformations géométriques :
  - La **symétrie axiale** : le pliage de la feuille et le reflet du miroir.
  - La **symétrie centrale** : le demi-tour parfait autour d'un pivot.
  - La **translation** : le glissement rectiligne sans la moindre rotation.
  - La **rotation** : le tourbillon d'un angle donné autour d'un centre.
  - L'**homothétie** : la caméra zoom qui rétrécit ou agrandit le monde d'un rapport k.
- Les trésors que ces transformations **conservent** : longueurs, angles, parallélisme et aires.
- La distinction cruciale entre **triangles égaux** (superposables) et **triangles semblables** (de même silhouette).
- L'art fascinant des **frises et des pavages** : des arabesques de l'Alhambra de Grenade aux métamorphoses impossibles de Maurits Cornelis Escher.

---

1. Le problème : le pont qui s'écroule et la dispute du puits

Au XII^{e} siècle, dans une vallée encaissée d'Auvergne, les habitants décident de construire un grand pont de pierre au-dessus d'une gorge tumultueuse. Le maître maçon est pressé : il taille des claveaux inégaux et monte une arche légèrement penchée vers la droite, plus pesante d'un côté que de l'autre. L'arche est pittoresque, mais bancale.

Quelques mois plus tard survient la première crue d'automne. Le torrent rugit, le vent s'engouffre dans la faille. Le côté le plus massif tire sur le flanc le plus mince. Une fissure serpentine apparaît dans la voûte… et dans un vacarme assourdissant de roches broyées, **le pont s'effondre dans le gouffre** !

La symétrie axiale : la droite (d) est la médiatrice du segment [MM']



Un pliage le long de la droite (d) amène exactement le point M en coïncidence avec le point M'

Fig. 72. – La symétrie axiale bilatérale : pliage orthogonal et miroir

Le vieux maître bâtisseur réunit ses apprentis autour de sa table à dessin : *« Gravez ceci dans votre mémoire : la pierre pardonne les aspérités de surface, mais elle ne pardonne jamais l'asymétrie. Quand une arche ne possède pas son axe miroir, le poids du ciel s'abat sur un seul pied, et la ruine est certaine. »*

Quelques lieues plus loin, une autre querelle agite deux villages voisins, Arras et Béthune, séparés par six kilomètres de lande herbeuse. Le comte décide de creuser un grand puits en pierre dans la plaine pour abreuver bêtes et gens.

Aussitôt, la discorde éclate : *« Creusez le puits tout près de notre clocher ! »* exigent les gens d'Arras. *« Hors de question ! »* répliquent ceux de Béthune. *« Ce serait du favoritisme ! Nous voulons que la marche soit rigoureusement égale pour chaque village ! »*

Un enfant propose : *« Creusons le puits pile au milieu du sentier qui relie les deux villages ! »* C'est une bonne idée : à 3 kilomètres d'Arras et 3 kilomètres de Béthune, l'endroit est juste. Mais le géomètre de la commanderie s'avance et trace un grand sillon dans la terre avec une pique : *« Il n'y a pas un seul emplacement possible : il y a une infinité de places pour le puits ! »*

Cette ligne droite perpendiculaire qui coupe le chemin en son milieu possède une propriété magique : **chaque point de cette droite est situé à une distance strictement égale du village A et du village B**. Cette ligne d'équité parfaite s'appelle **la médiatrice**.

Pour maîtriser l'architecture, l'art et les machines, nous devons comprendre les lois qui régissent les mouvements du plan : les **transformations géométriques**.

---

2. Les deux miroirs : Symétrie axiale et Symétrie centrale

Une **transformation géométrique** est une opération qui déplace chaque point du plan vers une nouvelle position selon une consigne précise. Le point de départ s'appelle le point initial M, et le point d'arrivée s'appelle son **image** M'.

2.1 La symétrie axiale : le pliage le long d'une droite

Prends une feuille de papier, dépose une goutte d'encre fraîche sur la gauche, plie la feuille en deux le long d'un trait droit (d) et appuie fermement. En rouvrant, la tache s'est imprimée de l'autre côté.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Symétrie axiale (par rapport à une droite (d)).**

- L'image d'un point M situé en dehors de (d) est le point M' tel que la droite (d) soit la **médiatrice** du segment $[MM']$. Cela signifie que (d) est perpendiculaire à $[MM']$ et le coupe en son milieu.
- Si un point M est situé directement sur la droite (d), son image est lui-même : $M' = M$ (on dit que M est un **point invariant**).

Effet miroir : La symétrie axiale inverse l'orientation ! Ta main droite devient une main gauche dans le miroir. Si un triangle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ($A \to B \to C$), son image par symétrie axiale tournera dans le sens inverse.

2.2 La symétrie centrale : le demi-tour autour d'un pivot

Imagine maintenant que tu plantes une punaise sur ta feuille au point O, et que tu fasses tourner ton calque d'un **demi-tour exact ($180°$)**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Symétrie centrale (par rapport à un centre O).** L'image d'un point M par la symétrie centrale de centre O est le point M' tel que **le point O soit le milieu du segment $[MM']$**.



Fig. 73. – La symétrie centrale : demi-tour parfait de 180° autour du centre O

Propriété essentielle : Une symétrie centrale transforme n'importe quelle droite (d) en une droite (d') qui lui est **strictement parallèle** ! Elle n'inverse pas le sens d'orientation (une boucle horaire reste horaire après un demi-tour).

---

3. Les deux mouvements rigides : Translation et Rotation

3.1 La translation : le glissement parfait

Imagine un tiroir que l'on tire, ou un train qui file sur des rails parfaitement droits. Chaque point de l'objet avance de la même distance, dans la même direction, et dans le même sens.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Translation.** Une **translation** fait glisser une figure d'un point A vers un point B. L'image de n'importe quel point M est le point M' tel que : 1. Les droites (AB) et (MM') sont **parallèles** (même direction). 2. On va de M vers M' dans le **même sens** que de A vers B. 3. La longueur $MM' = AB$ (même distance).

En un mot : Le quadrilatère $ABM'M$ est un **parallélogramme** (éventuellement aplati).



Fig. 74. – L'homothétie : zoom vectoriel depuis le centre d'alignement

Dans une translation, la figure glisse sans tourner d'un quart de poil. C'est le mouvement typique des pas d'un promeneur dans le sable.

3.2 La rotation : le tourbillon contrôlé

Pense à l'aiguille d'une horloge, à une pale d'éolienne, ou aux nacelles d'une grande roue de fête foraine.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Rotation.** Une **rotation** est définie par trois éléments inséparables : 1. Un point fixe appelé le **centre de rotation** O. 2. Un **angle** de rotation α (en degrés). 3. Un **sens de rotation** :

- soit le **sens horaire** (sens des aiguilles d'une montre) ;
- soit le **sens antihoraire** (sens trigonométrique, inverse des aiguilles).

L'image d'un point M par la rotation de centre O et d'angle α est le point M' tel que :

- $OM = OM'$ (le point reste sur le même cercle de rayon OM) ;
- L'angle $\widehat{MOM'} = \alpha$.

Remarque éclatante : Une rotation d'angle 180° n'est rien d'autre qu'une **symétrie centrale** !

---

4. L'effet de zoom : l'Homothétie

Toutes les transformations précédentes (symétries, translation, rotation) déplaçaient les figures sans jamais modifier leur gabarit. On les appelle des **isométries** (du grec *isos*, égal, et *metron*, mesure).

L'**homothétie** (du grec *homoios*, semblable, et *thesis*, disposition) est d'une nature différente : c'est un **effet de zoom optique**. Elle agrandit ou rétrécit la figure à partir d'un centre projecteur.

4.1 Définition et rapport k

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Homothétie.** Une homothétie est définie par : 1. Un point fixe appelé le **centre** O. 2. Un nombre non nul appelé le **rapport** k.

L'image d'un point M est le point M' situé sur la droite (OM) tel que :

- La distance $OM' = |k| \times OM$.
- **Si $k > 0$:** le point M' se trouve sur la demi-droite $[OM)$ (du même côté de O que M).
- **Si $k < 0$:** le point M' se trouve de l'autre côté de O (sur la demi-droite opposée). Cela produit un zoom combiné à un demi-tour !

4.2 Les effets d'échelle du rapport k

- Si $|k| > 1$: c'est un **agrandissement**.
- Si $0 < |k| < 1$: c'est une **réduction**.
- Si $k = 1$: la figure ne bouge pas (homothétie identité).
- Si $k = -1$: l'homothétie est identique à la **symétrie centrale de centre O** !

4.3 L'effet ravageur sur les aires et les volumes

C'est l'un des pièges les plus récurrents du brevet et du lycée :

- Quand on applique une homothétie de rapport k, **toutes les longueurs sont multipliées par $|k|$**.
- **Mais l'aire d'une surface est multipliée par k^2 !**
- **Et le volume d'un solide est multiplié par $|k|^3$!**

Exemple frappant : Si tu agrandis une maquette d'un rapport $k = 3$: - Sa hauteur est multipliée par 3. - La peinture pour peindre sa façade est multipliée par $3^2 = 9$. - Son poids de métal est multiplié par $3^3 = 27$!

---

5. Ce que les transformations conservent : le code génétique des formes

Transformation	Longueurs	Angles	Parallélisme	Alignement	Aires	Orientation
Symétrie axiale	Conservées	Conservés	Conservé	Conservé	Conservée	**Inversée** (miroir)
Symétrie centrale	Conservées	Conservés	Conservé	Conservé	Conservée	Conservée
Translation	Conservées	Conservés	Conservé	Conservé	Conservée	Conservée
Rotation	Conservées	Conservés	Conservé	Conservé	Conservée	Conservée
Homothétie (rapport k)	$\times \lvert k \rvert$	**Conservés**	Conservé	Conservé	$\times k^2$	Conservée si $k > 0$

Retiens ce principe fondamental : **toutes les transformations du collège conservent scrupuleusement la mesure des angles, le parallélisme et l'alignement des points**.

---

6. Triangles égaux et Triangles semblables

6.1 Les triangles égaux (isométriques) : des clones parfaits

Deux triangles sont dits **égaux** (ou isométriques) lorsqu'ils sont parfaitement **superposables**, par glissement, rotation ou retournement miroir. Leurs côtés homologues ont rigoureusement la même longueur et leurs angles correspondants ont la même mesure.

Pour prouver que deux triangles sont égaux, pas besoin de mesurer les 6 éléments (3 côtés et 3 angles) ! Trois suffisent, selon **les trois cas d'égalité** :

1. **Cas C-C-C (Côté-Côté-Côté) :** Les trois côtés de l'un sont respectivement égaux aux trois côtés de l'autre.
2. **Cas C-A-C (Côté-Angle-Côté) :** Deux côtés de l'un sont égaux à deux côtés de l'autre, et **l'angle compris entre ces deux côtés** a la même mesure.
3. **Cas A-C-A (Angle-Côté-Angle) :** Un côté de l'un est égal à un côté de l'autre, et **les deux angles adjacents à ce côté** ont les mêmes mesures.

6.2 Les triangles semblables : la même silhouette à une échelle différente

Deux triangles sont dits **semblables** lorsqu'ils ont exactement **la même forme**, mais pas nécessairement la même taille. L'un est un agrandissement ou une réduction de l'autre.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Triangles semblables.** Deux triangles sont semblables si :

- Leurs **angles sont deux à deux de même mesure** ;
- **OU** les longueurs de leurs côtés sont **deux à deux proportionnelles** :

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC} = k.$$

Théorème d'économie : Puisque la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180° (Chapitre 15), dès que **deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre triangle**, le troisième est obligatoirement égal, et **les deux triangles sont immédiatement semblables** !

---

7. Les droites de justice : Médiatrice et Bissectrice

Ces deux droites remarquables sont fondées sur la symétrie axiale :

7.1 La médiatrice d'un segment

- **Définition :** C'est la droite perpendiculaire au segment en son milieu.
- **Propriété caractéristique :** Un point appartient à la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si il est à égale distance des deux extrémités :

$$M \in \text{Médiatrice de } [AB] \Leftrightarrow MA = MB.$$

- **Le cercle circonscrit :** Les médiatrices des trois côtés d'un triangle se coupent en un point unique, le **centre du cercle circonscrit**, qui passe par les trois sommets du triangle.

7.2 La bissectrice d'un angle

- **Définition :** C'est la demi-droite qui partage un angle en deux angles adjacents de même mesure. C'est l'**axe de symétrie** de l'angle.
- **Propriété caractéristique :** Tout point de la bissectrice est situé à égale distance des deux côtés de l'angle.
- **Le cercle inscrit :** Les bissectrices des trois angles d'un triangle se coupent au **centre du cercle inscrit**, qui touche tangentiellement les trois côtés du triangle à l'intérieur.

---

8. L'art des frises, des pavages et le génie d'Escher

Quand la géométrie des transformations rencontre l'art, le résultat touche au sublime.

8.1 Qu'est-ce qu'un pavage ?

Un **pavage** est un recouvrement complet du plan par des formes géométriques jointives, sans laisser le moindre interstice vide et sans qu'aucune forme ne chevauche sa voisine.

- Une **frise** est un pavage dans une seule direction (une bande linéaire décorative le long d'un mur). Elle utilise principalement des translations répétées d'un même pas horizontal, parfois combinées à des symétries axiales ou des demi-tours.
- Un **pavage du plan** s'étend dans les deux dimensions à l'infini.

8.2 Les mosaïques de l'Alhambra de Grenade

Au XIV^{e} siècle, les artistes mauvaises de l'Alhambra, soumis à l'interdiction religieuse de représenter des figures vivantes, ont exploré les mathématiques des symétries avec une virtuosité stupéfiante. Les mathématiciens ont démontré des siècles plus tard qu'il n'existe rigoureusement que **17 types de pavages périodiques possibles dans tout le plan** (les 17 groupes de papier peint). Les artisans de Grenade les avaient **tous découverts empiriquement** sur les faïences (*azulejos*) de leur palais !

8.3 Les métamorphoses de Maurits Cornelis Escher

En 1936, l'artiste néerlandais M. C. Escher visite l'Alhambra et est bouleversé par ces mosaïques. Il consacre ensuite sa vie à remplacer les polygones abstraits par des créatures vivantes : oiseaux, poissons, salamandres, anges et démons.

Comment fabrique-t-il un lézard qui s'emboîte parfaitement avec ses frères ? 1. Il part d'un carré ou d'un parallélogramme qui pave naturellement le plan. 2. Il découpe un morceau sur le bord gauche et le **translate** sur le bord droit. 3. Il découpe un morceau sur le bord inférieur et lui fait subir une **rotation** de 90° pour former la patte supérieure. Puisque la matière retirée d'un côté est exactement restituée de l'autre, la surface de la figure reste inchangée et les motifs s'imbriquent à l'infini avec une perfection absolue !

---

9. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Image par rotation

Soit un triangle équilatéral ABC de sens direct (sens antihoraire). On désigne par O le centre du cercle circonscrit à ce triangle. 1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 120° dans le sens antihoraire ? 2. Quelle est l'image du segment $[AB]$ par cette rotation ?

Résolution détaillée : 1. Dans un triangle équilatéral, le centre O partage le tour complet de 360° en trois angles au centre égaux :

$$\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COA} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ.$$

De plus, par définition du cercle circonscrit, $OA = OB = OC$. La rotation de centre O et d'angle 120° antihoraire envoie donc le point A sur le point B, et le point B sur le point C. L'image de A est donc B. 2. Une rotation conserve les segments. L'image de A étant B, et l'image de B étant C, l'image du segment $[AB]$ est le segment $[BC]$.

Exemple 2 : Calcul avec une homothétie et ses effets d'aire

Un trapèze d'aire $12\ \text{cm}^2$ subit une homothétie de rapport $k = -2,5$. 1. Quelle est la nature de la figure obtenue ? 2. L'orientation est-elle inversée ? 3. Quelle est l'aire du trapèze agrandi ?

Résolution détaillée : 1. L'homothétie conserve la nature des figures et le parallélisme : l'image d'un trapèze est un **trapèze**. 2. Le rapport $k = -2,5$ est négatif : la figure subit donc un demi-tour (180°) par rapport au centre de l'homothétie, mais elle conserve son orientation globale (contrairement à une symétrie axiale). 3. L'aire est multipliée par k^2 :

$$\text{Aire}' = k^2 \times \text{Aire} = (-2,5)^2 \times 12 = 6,25 \times 12 = 75\ \text{cm}^2.$$

L'aire du nouveau trapèze est de $75\ \text{cm}^2$.

Exemple 3 : Démontrer que deux triangles sont semblables

Dans un cercle de centre O, on trace deux diamètres distincts $[AB]$ et $[CD]$. Démontrer que les triangles AOC et BOD sont égaux, puis qu'ils sont semblables.

Résolution détaillée : 1. Les points A, B et C, D étant les extrémités de deux diamètres passant par O, le point O est le milieu commun de $[AB]$ et de $[CD]$. 2. Par conséquent :

- La symétrie centrale de centre O transforme le point A en B (car O milieu de $[AB]$).
- Elle transforme le point C en D (car O milieu de $[CD]$).

3. L'image du triangle AOC par la symétrie centrale de centre O est donc le triangle BOD.
4. Puisque la symétrie centrale est une isométrie (elle conserve scrupuleusement les longueurs des côtés et les angles), **les triangles AOC et BOD sont égaux**.
5. Deux triangles égaux ayant leurs côtés de même longueur ($k = 1$), ils sont en particulier **semblables** de rapport 1.

Exemple 4 : Utiliser les triangles semblables pour calculer une longueur inaccessible

Deux mâts verticaux $[AB]$ et $[DE]$ sont plantés sur un sol plat horizontal. Le mât $[AB]$ mesure 2 mètres de haut. À une certaine heure, son ombre au sol mesure 3,5 mètres. Au même instant, l'ombre du grand mât $[DE]$ mesure 14 mètres. Calculer la hauteur du grand mât $[DE]$.

Résolution détaillée : 1. Les rayons du soleil étant considérés comme parallèles entre eux au même instant, les angles formés par les rayons avec le sol horizontal sont identiques. 2. Les deux mâts étant verticaux, ils forment tous deux un angle droit avec le sol (90°). 3. Les triangles rectangles formés par les mâts et leurs ombres possèdent donc deux angles de même mesure : ils sont **semblables**. 4. Leurs côtés homologues sont donc proportionnels :

$$\frac{\text{Hauteur grand mât } DE}{\text{Hauteur petit mât } AB} = \frac{\text{Ombre grande}}{\text{Ombre petite}}.$$

$$\frac{DE}{2} = \frac{14}{3,5}.$$

5. On calcule le coefficient d'agrandissement :

$$k = \frac{14}{3,5} = 4.$$

6. La hauteur du mât est donc :

$$DE = 2 \times 4 = 8 \text{ mètres}.$$

Exemple 5 : Construction de la médiatrice au compas seul

Expliquer et justifier la méthode classique pour tracer la médiatrice d'un segment $[AB]$ à l'aide d'une règle non graduée et d'un compas.

Résolution détaillée : 1. On écarte le compas d'un rayon R strictement supérieur à la moitié de AB ($R > \frac{AB}{2}$). 2. En piquant en A, on trace deux arcs de cercle, l'un au-dessus, l'autre en dessous de $[AB]$. 3. Sans changer l'écartement du compas, on pique en B et on coupe les arcs précédents en deux points P et Q. 4. On trace la droite (PQ) à la règle. 5.
Justification rigoureuse :

- Par construction, $PA = PB = R$: le point P est équidistant de A et de B, donc P appartient à la médiatrice de $[AB]$.
- De même, $QA = QB = R$: le point Q est équidistant de A et de B, donc Q appartient aussi à la médiatrice de $[AB]$.
- Deux points distincts définissant une unique droite, la droite (PQ) est très exactement la médiatrice du segment $[AB]$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Les 5 transformations géométriques :**
   - **Symétrie axiale :** pliage par rapport à une droite (d) (médiatrice). Inverse l'orientation.
   - **Symétrie centrale :** demi-tour de $180°$ autour d'un centre O (milieu).
   - **Translation :** glissement sans tourner selon une direction, un sens et une longueur (parallélogramme).
   - **Rotation :** pivotement d'un angle α autour d'un centre O dans un sens donné.
   - **Homothétie :** zoom d'un rapport k à partir d'un centre O ($OM' = |k| \times OM$).
2. **Conservations :**
   - Toutes les transformations conservent les angles, l'alignement et le parallélisme.
   - Les quatre premières (isométries) conservent les distances et les aires.
   - L'homothétie multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2.
3. **Triangles égaux :** Triangles superposables. Côtés de même longueur deux à deux et angles de même mesure deux à deux (cas CCC, CAC, ACA).
4. **Triangles semblables :** Triangles de même forme : angles deux à deux égaux et côtés deux à deux proportionnels. Deux angles égaux suffisent à garantir qu'ils sont semblables.
5. **Médiatrice et Bissectrice :**
   - Médiatrice : perpendiculaire au milieu d'un segment, équidistante des extrémités, centre du cercle circonscrit.
   - Bissectrice : partage un angle en deux parts égales, équidistante des côtés, centre du cercle inscrit.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 26.1 Identifier les transformations : Associer chaque situation de la vie courante à la transformation géométrique correspondante : 1. Une cabine de grande roue en mouvement. 2. Le reflet d'un arbre dans l'eau calme d'un lac. 3. Un train sur une voie rectiligne. 4. L'image projetée sur l'écran d'un cinéma par rapport à la pellicule du projecteur. 5. Une carte à jouer (la reine de cœur) posée sur la table avec son double tête-bêche.

Exercice 26.2 Propriétés d'une symétrie axiale : Soit un segment $[AB]$ de longueur 6 cm et un angle $\widehat{BAC} = 45°$. On applique une symétrie axiale d'axe (d). On note A', B', C' les images respectives de A, B, C. 1. Quelle est la longueur du segment $[A'B']$? Justifier. 2. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{B'A'C'}$? Justifier.

Exercice 26.3 Translation et parallélogramme : Soit M' l'image de M par la translation qui transforme A en B. 1. Quelle est la nature exacte du quadrilatère $ABM'M$? 2. Si $AB = 7\ \text{cm}$, que vaut la distance MM' ?

Exercice 26.4 Calculs avec l'homothétie : Un triangle ABC a un périmètre de 18 cm et une aire de $14\ \text{cm}^2$. On applique une homothétie de rapport $k = 3$. 1. Quel est le périmètre du triangle agrandi ? 2. Quelle est l'aire du triangle agrandi ?

Exercice 26.5 Reconnaître des triangles égaux : Dans un triangle ABC, on a $AB = 5\ \text{cm}$, $AC = 7\ \text{cm}$ et $\widehat{BAC} = 40°$. Dans un triangle DEF, on a $DE = 5\ \text{cm}$, $DF = 7\ \text{cm}$ et $\widehat{EDF} = 40°$. Les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ? Quel critère permet de l'affirmer ?

Niveau : Réflexion et enchaînements

Exercice 26.6 Composition de symétries : Soit deux droites sécantes (d_1) et (d_2) perpendiculaires en un point O. On applique à une figure la symétrie axiale d'axe (d_1), puis à la figure obtenue la symétrie axiale d'axe (d_2). Démontrer que l'enchaînement de ces deux symétries axiales équivaut à une seule transformation géométrique simple que l'on précisera.

Exercice 26.7 Triangles semblables et calcul d'angle : Soit un triangle ABC tel que $\hat{A} = 65°$ et $\hat{B} = 45°$. Soit un triangle RST tel que $\hat{R} = 65°$ et $\hat{T} = 70°$. Les triangles ABC et RST sont-ils semblables ? Justifier avec soin.

Exercice 26.8 Le problème de l'arbre et du miroir : Pour mesurer la hauteur d'un arbre inaccessible, Arthur dépose un petit miroir plat sur le sol horizontal au point M, à 12 mètres du pied de l'arbre P. Il recule ensuite de 2 mètres jusqu'au point A, où il aperçoit dans le miroir le sommet S de l'arbre. Les yeux d'Arthur sont situés à 1,60 mètre du sol. La loi de l'optique stipule que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion : $\widehat{SMA} = \widehat{PMS}$. 1. Justifier que les triangles formés par Arthur et par l'arbre sont semblables. 2. Calculer la hauteur de l'arbre.

Exercice 26.9 Homothétie négative : Sur une droite graduée, le centre de l'homothétie O a pour abscisse 0. Le point A a pour abscisse 3. Le rapport de l'homothétie est $k = -2$. 1. Quelle est l'abscisse de l'image A' ? 2. Où se situe le point O par rapport au segment $[AA']$?

Exercice 26.10 Le secret de la médiatrice : Soit un cercle de centre O et une corde $[AB]$ qui ne passe pas par O. 1. Démontrer que le point O appartient à la médiatrice du segment $[AB]$. 2. En déduire que la droite qui passe par le centre d'un cercle et qui coupe une corde perpendiculairement passe obligatoirement par le milieu de cette corde.

Exercice 26.11 Frise par translation : Une frise est construite à partir d'un motif de base de largeur 4 cm. On applique successivement une translation de vecteur horizontal de 4 cm vers la droite. 1. Combien de motifs complets composent une frise de 1,20 m de long ? 2. Si le motif de base a une aire de $15\ \text{cm}^2$, quelle est l'aire totale de la frise peinte ?

Niveau : Défis et recherche

Exercice 26.12 Le billard mathématique : Sur une table de billard rectangulaire sans poches, une bille blanche est située au point A et une bille rouge au point B. Le joueur doit frapper la bille A pour qu'elle rebondisse sur la bande supérieure (d) avant d'aller heurter la bille B. 1. En utilisant le symétrique B' du point B par rapport à la droite (d), déterminer géométriquement l'endroit exact P de la bande que la bille A doit viser. 2. Démontrer que ce point P est celui qui minimise la longueur totale du trajet $AP + PB$ (trajet le plus court possible).

Exercice 26.13 Triangles semblables imbriqués dans un triangle rectangle : Soit un triangle ABC rectangle en A. Soit H le pied de la hauteur issue de A sur l'hypoténuse $[BC]$. 1. Démontrer que les trois triangles ABC, HBA et HAC sont tous semblables entre eux. 2. En écrivant les rapports de proportionnalité des côtés entre HBA et HAC, démontrer la célèbre relation :

$$AH^2 = HB \times HC.$$

3. Application numérique : si $HB = 4 \text{ cm}$ et $HC = 9 \text{ cm}$, calculer la hauteur AH.

Exercice 26.14 Le paradoxe de l'échiquier d'Ozanam (perte d'aire) : On découpe un carré de $8 \times 8 = 64$ carreaux en quatre pièces polygonales (deux triangles rectangles de côtés de l'angle droit 3 et 8, et deux trapèzes de bases 5 et 3 et de hauteur 5). En réassemblant ces quatre pièces, on semble former un rectangle de dimensions $5 \times 13 = 65$ carreaux ! D'où vient ce carreau magique apparu de nulle part ($65 - 64 = 1$) ? *Indication : calculer les pentes des hypoténuses des pièces avec les triangles semblables.*

Solutions

Niveau

Solution 26.1 1. Cabine de grande roue : **Translation circulaire** (la cabine reste toujours verticale sans tourner sur elle-même). 2. Reflet d'arbre dans l'eau : **Symétrie axiale** (d'axe la surface de l'eau). 3. Train sur voie rectiligne : **Translation**. 4. Projecteur de cinéma : **Homothétie** (agrandissement de centre l'objectif). 5. Reine de cœur tête-bêche : **Symétrie centrale** (demi-tour autour du centre de la carte).

Solution 26.2 1. $A'B' = 6 \text{ cm}$. En effet, la symétrie axiale est une isométrie : elle conserve scrupuleusement les longueurs. 2. $\widehat{B'A'C'} = 45^\circ$. La symétrie axiale conserve également la mesure des angles.

Solution 26.3 1. Par définition de la translation transformant A en B, le quadrilatère $ABM'M$ est un **parallélogramme**. 2. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc $MM' = AB = 7 \text{ cm}$.

Solution 26.4 1. Les longueurs sont multipliées par $k = 3$. Le nouveau périmètre est :

$$\text{Périmètre}' = 3 \times 18 = 54 \text{ cm}.$$

2. Les aires sont multipliées par $k^2 = 3^2 = 9$. La nouvelle aire est :

$$\text{Aire}' = 9 \times 14 = 126 \text{ cm}^2.$$

Solution 26.5 Oui, les triangles ABC et DEF sont égaux. Le critère appliqué est le cas **C-A-C (Côté-Angle-Côté)** : ils possèdent deux côtés de même longueur (5 cm et 7 cm) et l'angle compris entre ces deux côtés a la même mesure (40°).

Niveau

Solution 26.6 Soit M un point du plan. La symétrie axiale par rapport à (d_1) envoie M sur M_1, et la symétrie d'axe (d_2) envoie M_1 sur M'. Puisque $(d_1) \perp (d_2)$, le triangle formé par les projections montre que O est le milieu du segment $[MM']$ et que l'angle $\widehat{MOM'} = 180^\circ$. L'enchaînement de deux symétries d'axes perpendiculaires équivaut à **la symétrie centrale de centre O** (ou rotation d'angle 180° de centre O).

Solution 26.7 Dans le triangle ABC, la somme des angles vaut 180° :

$$\hat{C} = 180^\circ - (65^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

Les trois angles du triangle ABC mesurent donc $65^\circ, 45^\circ$ et 70°. Dans le triangle RST : $\hat{R} = 65^\circ$, $\hat{T} = 70^\circ$, donc le troisième angle mesure :

$$\hat{S} = 180^\circ - (65^\circ + 70^\circ) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ.$$

Les deux triangles ont leurs trois angles de même mesure deux à deux : **ils sont donc rigoureusement semblables**.

Solution 26.8 1. Le triangle Arthur-sol-miroir et le triangle arbre-sol-miroir possèdent chacun un angle droit (90°, verticalité) et un angle aigu égal au point de réflexion M ($\widehat{SMA} = \widehat{PMS}$). Ayant deux angles égaux, ils sont **semblables**. 2. Rapport de proportionnalité :

$$\frac{\text{Hauteur arbre}}{\text{Hauteur yeux Arthur}} = \frac{\text{Distance miroir-arbre}}{\text{Distance miroir-Arthur}}.$$

$$\frac{h}{1,60} = \frac{12}{2} = 6.$$

$$h = 1,60 \times 6 = 9,60 \text{ mètres}.$$

L'arbre mesure 9,60 mètres de haut.

Solution 26.9 1. Par définition de l'homothétie de rapport $k = -2$, l'abscisse de A' est :

$$x_{A'} = k \times x_A = (-2) \times 3 = -6.$$

2. La distance $OA = 3$ et la distance $OA' = |-6| = 6$. Le point O est situé entre A' et A, à un tiers de la distance en partant de A (puisque $OA' = 2 \times OA$).

Solution 26.10 1. Les points A et B appartiennent au cercle de centre O, donc les rayons sont égaux : $OA = OB$. Le point O est équidistant de A et de B. Par propriété caractéristique de la médiatrice, le point O appartient donc obligatoirement à la médiatrice du segment $[AB]$. 2. La médiatrice d'un segment est la droite unique perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu. Puisque le centre O appartient à la médiatrice, toute droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par O est la médiatrice elle-même : elle coupe donc nécessairement $[AB]$ en son milieu.

Solution 26.11 1. La longueur totale est $1,20 \text{ m} = 120 \text{ cm}$. Chaque motif mesure 4 cm. Nombre de motifs : $\frac{120}{4} = 30$ motifs complets. 2. Aire totale : $30 \times 15 \text{ cm}^2 = 450 \text{ cm}^2$.

Niveau

Solution 26.12 1. Traçons le point B', symétrique de la bille rouge B par rapport à la droite de la bande (d). Pour tout point M de la bande (d), la symétrie axiale garantit que $MB = MB'$. La longueur du trajet avec rebond s'écrit donc : $AM + MB = AM + MB'$. Or, la ligne la plus courte reliant deux points A et B' est le segment de droite $[AB']$! Le point d'impact optimal P est donc très exactement **l'intersection entre le segment $[AB']$ et la droite de la bande (d)**. 2. Par l'inégalité triangulaire, pour tout autre point M de la bande, on a $AM + MB' > AB'$. Le trajet $AP + PB = AP + PB' = AB'$ est donc strictement le plus court possible. C'est le principe de Fermat appliqué à la réflexion !

Solution 26.13 1. Dans le triangle ABC rectangle en A, l'angle $\hat{B}$ a pour complémentaire $\hat{C}$ ($\hat{B} + \hat{C} = 90°$). Dans le triangle HBA rectangle en H, l'angle $\widehat{HAB}$ est le complémentaire de $\hat{B}$, donc $\widehat{HAB} = \hat{C}$. Les triangles ABC, HBA et HAC ont tous les mêmes angles ($90°$, $\hat{B}$, $\hat{C}$) : ils sont tous **semblables**. 2. Puisque HBA et HAC sont semblables, les côtés opposés aux angles homologues sont proportionnels :

- Opposé à $\hat{B}$: dans HBA, c'est AH ; dans HAC, c'est HC.
- Opposé à $\hat{C}$: dans HBA, c'est HB ; dans HAC, c'est AH. On a donc :

$$\frac{AH}{HC} = \frac{HB}{AH} \Longrightarrow AH \times AH = HB \times HC \Longrightarrow AH^2 = HB \times HC.$$

3. Avec $HB = 4$ et $HC = 9$:

$$AH^2 = 4 \times 9 = 36 \Longrightarrow AH = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}.$$

Solution 26.14 Ce prétendu paradoxe repose sur une illusion d'optique ! Pour que le rectangle 5×13 soit parfaitement plein, la grande diagonale du rectangle devrait être un segment de droite unique. Calculons les pentes des deux pièces qui la bordent :

- Pour le triangle rectangle : pente $= \frac{3}{8} = 0,375$.
- Pour le trapèze : pente $= \frac{2}{5} = 0,400$.

Les pentes ne sont pas égales ($\frac{3}{8} \neq \frac{2}{5}$) ! Les pièces ne s'emboîtent pas le long d'une ligne droite parfaite : elles laissent au centre un minuscule parallélogramme vide très étiré, invisible à l'œil nu. L'aire de cette fente cachée vaut exactement 1 carreau ($65 - 64 = 1$) !

La question qui ouvre la suite

Regarde l'incroyable voyage que nous venons d'accomplir : nous savons désormais découper des formes, calculer des aires, manipuler des équations, des inégalités et des fonctions. Mais que se passe-t-il lorsque l'on quitte le monde plat de la feuille de papier pour pénétrer dans le relief en trois dimensions de notre univers ? Comment calculer la contenance d'une jarre conique, d'une pyramide de pierre ou de la planète Terre tout entière ?

C'est l'aventure de l'espace, des solides et des sections géométriques qui t'attend dans le chapitre suivant : **Le Découpage des Terres et la Boîte du Potier**.

CHAPITRE 27 : Le Découpage des Terres et la Boîte du Potier

> « Une formule apprise par cœur sans être vue est comme une graine stérile. Mais prends une paire de ciseaux, coupe un triangle, recolle les morceaux de l'autre côté : le rectangle apparaît, et la formule devient une évidence. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi **tout triangle est la moitié d'un rectangle**, et comment les ciseaux suffisent à retrouver les aires du parallélogramme, du trapèze et même du disque.
- Comment passer du **plat** (les aires, en m²) au **plein** (les volumes, en m³), et pourquoi on multiplie par 100 dans un cas et par 1 000 dans l'autre.
- Le mystère du **« divisé par 3 »** des pyramides et des cônes, et le trésor dont Archimède était le plus fier : le volume de la **boule**.
- Ce qu'on voit quand on **tranche** un solide avec un couteau bien droit : les **sections**.
- Les pièges qui font perdre des points au brevet : rayon ou diamètre ? hauteur ou côté penché ? cm³ ou litres ?

---

1. Le problème : la querelle des deux fermiers et la commande du potier

Dans la vallée de la Meuse, au XIII^{e} siècle, le grand intendant du comte dresse le registre des terres pour prélever la juste part de blé. Deux fermiers voisins se présentent devant lui.

- Le fermier **Martin** possède un champ **rectangulaire** de 20 mètres de large sur 30 mètres de long. L'intendant calcule sans hésiter :

  $$20 \times 30 = 600 \ \text{ mètres carrés.}$$

  C'est un quadrillage de 600 petits carrés de terre d'un mètre sur un mètre (tu te souviens du mur de briques du Chapitre 5 ?).
- Mais le fermier **Thomas** possède un champ en forme de **triangle étiré et pointu**. Le côté qui longe le ruisseau mesure 40 mètres, et la distance entre ce ruisseau et la pointe du pré, mesurée bien perpendiculairement, est de 30 mètres.

Les arpenteurs se disputent : *« Comment compter des carrés entiers dans un champ en pointe ? Les bords en biais coupent les carreaux en morceaux impossibles à mesurer ! »*

Un jeune compagnon bâtisseur s'approche avec une feuille de parchemin et une paire de ciseaux : *« Rangez vos cordes, messieurs. Il n'y a pas besoin de couper les brins d'herbe en miettes : il suffit d'inviter un frère jumeau à la table. »*

Le même jour, à l'autre bout du village, le **potier** reçoit une commande étrange : le meunier veut trois récipients qui contiennent **exactement autant de grain** l'un que l'autre — une jarre cylindrique, un entonnoir en forme de cône et un bol en demi-boule. Le potier sait mesurer la longueur avec une corde, la surface avec des carreaux… mais comment mesurer **ce qu'il y a dedans** ?

Ces deux problèmes — mesurer une surface tordue, mesurer un intérieur — vont nous occuper tout le chapitre. Tu verras qu'ils reposent sur la même idée : **découper, déplacer, recoller**, sans rien perdre ni rien ajouter.

---

2. Qu'est-ce qu'une aire ? Unités et conversions

2.1 L'idée intuitive

L'**aire** d'une figure, c'est la quantité de « peinture » qu'il faut pour la recouvrir, ou le nombre de carreaux-unités qu'on peut y poser. Deux figures de formes très différentes peuvent avoir la même aire : il suffit qu'on puisse découper l'une et réassembler ses morceaux pour obtenir l'autre.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** On choisit une unité d'aire : par exemple le **carré de 1 cm de côté**. L'**aire** d'une figure est le nombre de ces carrés-unités (et de morceaux de carrés) qu'il faut pour la recouvrir exactement, sans trou ni chevauchement.

La notation cm². On écrit $1\ \text{cm}^2$ et on lit « un **centimètre carré** ». Le petit 2 en haut n'est pas décoratif : il rappelle qu'on a multiplié **deux** longueurs (une largeur en cm et une longueur en cm). C'est la même petite puissance que dans $5^2 = 5 \times 5$ (Chapitre 18). D'ailleurs, l'aire d'un carré de côté c s'écrit c^2 : voilà pourquoi on dit « c **au carré** » !

Périmètre ou aire ? Le **périmètre** est la longueur de la clôture (on fait le tour, en cm) ; l'**aire** est la surface de la pelouse (on remplit, en cm²). Un rectangle de 1×9 et un carré de 3×3 ont la même aire (9 cm²) mais pas le même périmètre (20 cm et 12 cm).

2.2 Les conversions d'aires : le piège du « fois 100 »

Un mètre, c'est 10 décimètres. Mais un **mètre carré**, combien de décimètres carrés ? Dessine-le : un carré de 1 m de côté, c'est un carré de 10 dm de côté, donc il contient $10 \times 10 = 100$ petits carrés de 1 dm de côté.

$$1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2 = 1\,000\,000\ \text{mm}^2.$$

Dans le tableau de conversion des aires, **chaque unité occupe deux colonnes** :

km²		hm² (ha)		dam² (a)		m²		dm²		cm²		mm²	
							3	5	0	0	0		

Ici on lit : $3,5\ \text{m}^2 = 350\ \text{dm}^2 = 35\,000\ \text{cm}^2$.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Les agriculteurs utilisent l'**are** (a), qui vaut $1\ \text{dam}^2 = 100\ \text{m}^2$ (un carré de 10 m de côté), et l'**hectare** (ha), qui vaut $1\ \text{hm}^2 = 10\,000\ \text{m}^2$ (un carré de 100 m de côté, à peu près un terrain et demi de football). Le mot « are » vient du latin *area*, « surface libre », qui a aussi donné le mot « aire » !

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !**
$1\ \text{m}^2 \neq 100\ \text{cm}^2$. Puisque $1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$, on a $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm} \times 100\ \text{cm} = 10\,000\ \text{cm}^2$. Quand on convertit des aires, on multiplie (ou divise) par 100 **à chaque changement d'unité**, pas par 10.

---

3. Le coup de ciseaux : tout triangle est un demi-rectangle

3.1 Base et hauteur : bien nommer les choses

Avant de couper, il faut apprendre deux mots précis.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Dans un triangle, on choisit un côté qu'on appelle la **base**. La **hauteur relative à cette base** est le segment issu du sommet opposé et **perpendiculaire** à la droite qui porte la base. Sa longueur est aussi appelée « hauteur ».

Le symbole $\perp$ se lit « est perpendiculaire à ». Le petit carré qu'on dessine au pied H de la hauteur rappelle qu'il y a un angle droit.

Un triangle a **trois** côtés, donc **trois** hauteurs, une pour chaque base possible. On peut choisir celle qu'on veut, à condition de toujours associer une base **avec sa propre hauteur**.

3.2 La preuve du frère jumeau

Reprenons le champ de Thomas : base $b = 40$ m, hauteur $h = 30$ m.

1. On découpe un **deuxième triangle identique**, de couleur différente.
2. On fait faire à ce jumeau un **demi-tour** (une symétrie centrale de centre le milieu d'un côté, comme au Chapitre 26).
3. On le colle contre le premier : ensemble, ils forment un **parallélogramme** de base b et de hauteur h.
4. Et un parallélogramme, on va le voir juste après, a la même aire qu'un **rectangle** $b \times h$.

Plus simple encore, quand le pied H de la hauteur tombe à l'intérieur de la base : la hauteur coupe le triangle en deux triangles rectangles. Chacun est la moitié d'un petit rectangle (coupé par sa diagonale). Les deux petits rectangles réunis forment le grand rectangle $b \times h$, et le triangle en occupe exactement la moitié.



Fig. 75. – La corde égyptienne à treize nœuds et le triangle rectangle 3-4-5

📐 Formule — Aire du triangle

$$\mathcal{A}_{\text{triangle}} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{b \times h}{2}$$

La lettre $\mathcal{A}$ (un A « calligraphié ») est souvent utilisée pour désigner une aire, pour ne pas la confondre avec le point A. Pour le champ de Thomas : $\mathcal{A} = \frac{40 \times 30}{2} = \frac{1200}{2} = 600$ m^2. Les deux fermiers, aux champs si différents, ont **exactement la même surface** de terre : ils paieront le même impôt, au grain de blé près.

3.3 Aux limites : quand la hauteur tombe dehors

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** Dans un triangle **obtus** (avec un angle de plus de 90°), la hauteur relative à certaines bases tombe **à l'extérieur** du triangle, sur le **prolongement** de la base. La formule reste vraie, mais la preuve change !

✍️ Démonstration —

Le pied H est sur le prolongement de $[AB]$, au-delà de B. Le grand triangle rectangle AHC contient notre triangle ABC **plus** le petit triangle rectangle BHC. Donc :

$$\mathcal{A}_{ABC} = \mathcal{A}_{AHC} - \mathcal{A}_{BHC} = \frac{AH \times h}{2} - \frac{BH \times h}{2} = \frac{(AH - BH) \times h}{2} = \frac{AB \times h}{2}.$$

La formule « base × hauteur ÷ 2 » est donc vraie pour **tous** les triangles.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Tous les triangles qui ont la même base $[AB]$ et dont le sommet C glisse sur une droite parallèle à (AB) ont **la même aire**, puisque la hauteur ne change pas ! Même un triangle très aplati et très penché. C'est le « triangle qui glisse » d'Euclide (Livre I des *Éléments*, proposition 37).

---

4. Le parallélogramme et le trapèze déshabillés

4.1 Le parallélogramme : le champ penché

Prends un rectangle de carton et pousse son côté du haut : il se penche et devient un parallélogramme. Perd-il de la matière ? Coupe le petit triangle qui dépasse d'un côté et recolle-le dans le creux de l'autre côté : **le rectangle réapparaît**, avec la même base et la même hauteur.

📐 Formule — Aire du parallélogramme

$$\mathcal{A}_{\text{parallélogramme}} = b \times h$$

où h est la distance entre les deux côtés parallèles de longueur b (mesurée **perpendiculairement**).

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** Ne multiplie **jamais** la base par le côté penché ! Un parallélogramme de côtés 10 cm et 6 cm peut avoir une aire de 60 cm² (s'il est droit, c'est un rectangle), de 30 cm² (s'il est très penché), et même presque 0 si on l'écrase. Le côté penché ne change pas, mais la hauteur, si.

4.2 Le trapèze : la jupe évasée

Un **trapèze** est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, appelés **bases** : la grande base B et la petite base b. La **hauteur** h est la distance entre ces deux bases.

Prends deux trapèzes jumeaux. Retourne l'un la tête en bas et colle-le contre l'autre : tu obtiens un **parallélogramme** dont la base vaut $B + b$ et la hauteur h.

📐 Formule — Aire du trapèze

$$\mathcal{A}_{\text{trapèze}} = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

On peut aussi le voir comme $\frac{B+b}{2} \times h$: c'est un rectangle dont la largeur est la **moyenne** des deux bases.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Les cas limites sont rassurants. Si $b = B$, le trapèze est un parallélogramme et on retrouve $\frac{2B \times h}{2} = B \times h$. Si $b = 0$, la petite base s'écrase en un point, le trapèze devient un triangle, et on retrouve $\frac{B \times h}{2}$. Une bonne formule se vérifie toujours sur ses cas extrêmes !

📐 Le Secret du 1/3 — Pourquoi le volume d'une pyramide vaut $\frac{1}{3} \times \text{Base} \times \text{Hauteur}$

Pourquoi ce coefficient $\frac{1}{3}$ surgit-il pour les solides pointus, alors qu'un triangle vaut $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$? La preuve la plus lumineuse réside dans la **dissection d'un cube** : Prenons un cube de côté c. Choisissons l'un de ses huit sommets S. À partir de ce sommet commun, traçons les pyramides obliques ayant pour base chacune des faces opposées du cube. Le cube se décompose exactement en **3 pyramides obliques identiques** (isométriques) de même base carrée $B = c^2$ et de même hauteur $h = c$! Puisque les 3 pyramides remplissent parfaitement le volume du cube sans interstice ni chevauchement :

$$3 \times V_{\text{pyramide}} = V_{\text{cube}} = B \times h \Longrightarrow V_{\text{pyramide}} = \frac{1}{3} \times B \times h.$$

Par décomposition infinitésimale d'Archimède (méthode des indivisibles), ce tiers s'applique à toute pyramide polygonale et à tout cône de révolution circulaire ($V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$) !

5. La pizza d'Archimède : l'aire du disque

Tu as rencontré le nombre π au Chapitre 16 : c'est le nombre de fois que le diamètre « rentre » dans le tour du cercle, $\pi \approx 3,14159$. Le périmètre d'un cercle de rayon R vaut donc $2\pi R$. Mais la **surface** du disque ?

Au III^e^ siècle avant notre ère, **Archimède de Syracuse** imagine de découper le disque comme une pizza, en un grand nombre de parts fines qui partent du centre. Chaque part a pour longueur le rayon R. Il range ces parts **tête-bêche**, une pointe en haut, une pointe en bas :

La forme obtenue ressemble à un **rectangle qui ondule** : * sa hauteur est le rayon R ; * sa longueur est **la moitié du tour** de la pizza (l'autre moitié du croûton est en bas), soit $\frac{2\pi R}{2} = \pi R$.

Plus les parts sont fines, plus les ondulations s'aplatissent : à la limite, c'est un vrai rectangle.

📐 Formule — Aire du disque de rayon R

$$\mathcal{A}_{\text{disque}} = \pi R \times R = \pi R^2$$

On lit « pi R deux » ou « pi R au carré ». Attention : c'est $\pi \times (R \times R)$, le carré ne porte que sur R.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** Deux erreurs classiques : 1. Utiliser le **diamètre** au lieu du rayon. Pour un disque de diamètre 10 cm, $R = 5$ cm et $\mathcal{A} = 25\pi \approx 78,5$ cm², et non 100π ! 2. Confondre $2\pi R$ (le **périmètre**, une longueur en cm) et πR^2 (l'**aire**, en cm²). Astuce : l'aire contient un « carré », comme son unité cm².

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie —** Archimède ne connaissait pas la valeur exacte de π (personne ne la connaît : ses décimales ne s'arrêtent jamais !). Il a prouvé que l'aire du disque est égale à celle d'un triangle rectangle dont un côté de l'angle droit est le rayon et l'autre le périmètre du cercle : $\frac{2\pi R \times R}{2} = \pi R^2$. Et il a encadré π entre $3 + \frac{10}{71}$ et $3 + \frac{1}{7}$ en utilisant des polygones à 96 côtés.

---

6. Exemples résolus sur les aires

Exemple résolu 1 — Le jardin en trapèze. Un jardin a la forme d'un trapèze : la clôture du fond mesure 16 m, celle de devant 10 m, et les deux clôtures parallèles sont distantes de 8 m. Quelle est son aire ? Combien de sachets de gazon faut-il si un sachet couvre 25 m² ?

Solution. $\mathcal{A} = \frac{(16+10)\times 8}{2} = \frac{26\times 8}{2} = \frac{208}{2} = 104$ m^2. $104 \div 25 = 4,16$: 4 sachets ne suffisent pas, il en faut **5**. (On arrondit toujours **au-dessus** quand il s'agit de couvrir !)

Exemple résolu 2 — La hauteur cachée du triangle rectangle. Un triangle ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, $BC = 10$ cm. Calcule la longueur de la hauteur issue de A.

Solution. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont **chacun la hauteur de l'autre**. Donc avec la base $[AB]$ et la hauteur $[AC]$:

$$\mathcal{A} = \frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ cm}^2.$$

Mais on peut aussi prendre la base $[BC]$ et la hauteur inconnue h issue de A : $\mathcal{A} = \frac{10\times h}{2} = 5h$. Les deux calculs donnent la même aire, donc $5h = 24$ et $h = 4,8$ cm. On a calculé une longueur grâce à une aire, sans aucune mesure !

Exemple résolu 3 — La figure composée. Une fenêtre a la forme d'un rectangle de 120 cm de large et 150 cm de haut, surmonté d'un demi-disque de diamètre 120 cm. Quelle est l'aire de la vitre, arrondie au cm² ?

Solution. On **découpe** la figure en morceaux simples. * Rectangle : $120 \times 150 = 18\,000$ cm². * Demi-disque : rayon $R = 60$ cm, aire $\frac{\pi\times 60^2}{2} = \frac{3600\pi}{2} = 1800\pi \approx 5654,87$ cm². * Total : $18\,000 + 1800\pi \approx 23\,655$ cm², soit environ $2,37$ m².

Exemple résolu 4 — La couronne et la piste. Un bassin circulaire de rayon 6 m est entouré d'une allée de 2 m de large. Quelle est l'aire de l'allée ?

Solution. L'allée est une **couronne** : le grand disque (rayon $6 + 2 = 8$ m) moins le petit disque (rayon 6 m).

$$\mathcal{A} = \pi \times 8^2 - \pi \times 6^2 = 64\pi - 36\pi = 28\pi \approx 87,96 \text{ m}^2.$$

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège !** On ne peut pas soustraire les rayons d'abord : $\pi \times (8-6)^2 = 4\pi$ est faux ! On soustrait les **aires**, pas les longueurs.

Exemple résolu 5 — Une conversion pour le notaire. Un terrain rectangulaire mesure 85 m sur 64 m. Exprime son aire en m², en ares et en hectares.

Solution. $85 \times 64 = 5440$ m². Comme $1\ \text{a} = 100\ \text{m}^2$: $5440\ \text{m}^2 = 54,4$ a. Comme $1\ \text{ha} = 100$ a : $54,4\ \text{a} = 0,544$ ha.

CHAPITRE 28 : Ératosthène et le Tour de la Terre

> « Ne dis pas que la Terre est trop grande pour être mesurée par un homme. Donne-moi un simple bâton planté droit dans le sol, un rayon de soleil et un triangle rectangle : je te dirai le tour du monde avant que le jour ne s'éteigne. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment **Ératosthène**, il y a plus de 2 200 ans, a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton, un puits et un chameau.
- Comment un triangle rectangle permet de fabriquer trois « ponts » indestructibles entre les **angles** et les **longueurs** : le **cosinus**, le **sinus** et la **tangente**.
- Le moyen mnémotechnique universel **CAH-SOH-TOA** (ou **SOH-CAH-TOA**) pour ne plus jamais hésiter.
- Pourquoi le cosinus et le sinus sont **toujours compris entre 0 et 1** dans un triangle rectangle.
- Comment calculer la **hauteur inaccessible d'une falaise**, la **largeur d'un fleuve** ou la trajectoire d'un navire sans bouger d'un pas.
- La formule magique de Pythagore déguisée : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

---

1. Le problème : le midi du solstice d'été à Alexandrie

Nous sommes le **21 juin**, vers l'an **240 avant notre ère**, sous le ciel bleu d'Égypte. Dans la cité d'Alexandrie, le savant **Ératosthène** dirige la plus prestigieuse institution du monde antique : la Grande Bibliothèque. Des centaines de milliers de rouleaux de papyrus s'y alignent sur des étagères de cèdre.

Ératosthène a lu un rapport stupéfiant venu de la ville de **Syène** (l'actuelle ville d'Assouan), située à environ 800 kilomètres plus au sud, le long du Nil : > *« Le jour du solstice d'été, à midi pile, le soleil illumine directement l'eau au fond des puits les plus profonds sans laisser la moindre ombre sur les parois. Les colonnes des temples ne projettent aucune ombre au sol. Les rayons tombent rigoureusement à la verticale. »*

Ératosthène attend le même jour, à la même heure, à **Alexandrie**. Il plante dans le sol un **gnomon** — une tige verticale bien droite — et observe attentivement le sol. Surprise : à Alexandrie, au même instant, **le bâton projette une ombre** !



Fig. 76. – La mesure du rayon de la Terre par Ératosthène d'Alexandrie

Comment est-ce possible ? Si la Terre était un disque plat, comme beaucoup d'anciens le croyaient encore, le Soleil — situé à une distance immense et envoyant des rayons parallèles — éclairerait Alexandrie exactement avec le même angle qu'à Syène. Il n'y aurait d'ombre nulle part, ou la même ombre partout !

Si le bâton d'Alexandrie a une ombre alors que celui de Syène n'en a pas, c'est que **la surface de la Terre est courbée** !

Ératosthène mesure la hauteur du bâton et la longueur de l'ombre au sol. Ces deux côtés forment un **triangle rectangle**. En comparant ces deux longueurs, il trouve que les rayons du soleil font avec la verticale un angle d'environ $\mathbf{7,2}^\circ$.

Or, grâce au théorème des angles alternes-internes (que tu as vu au Chapitre 15), cet angle de $7,2^\circ$ au sommet du bâton est **exactement égal à l'angle au centre de la Terre** qui sépare Alexandrie de Syène !

Ératosthène fait alors une proportion lumineuse : * Un tour complet de cercle mesure 360°. * Or $7,2^\circ$, c'est exactement $\frac{7,2}{360} = \frac{1}{50}$ de tour ! * Donc la distance entre Alexandrie et Syène représente **le cinquantième de la circonférence de la Terre**.

Les chameliers et les arpenteurs royaux estiment cette distance à environ **5 000 stades** (environ 800 km). Ératosthène multiplie :

$$\text{Tour de la Terre} = 50 \times 5\,000 = \mathbf{250\,000 \ \ stades} \approx \mathbf{40\,000 \ \ kilomètres} \ !$$

Un résultat d'une précision époustouflante pour l'époque : la mesure moderne réelle est de 40 075 km à l'équateur !

Mais admire le cœur de l'exploit : pour trouver l'angle de $7,2^\circ$, Ératosthène n'a pas pu monter dans le ciel avec un immense rapporteur. Il a mesuré **deux longueurs au sol** (la hauteur du bâton et son ombre) et il en a déduit **un angle**.

Cette science qui relie les longueurs des côtés et les angles d'un triangle s'appelle la **trigonométrie** (du grec *trigōnon*, triangle, et *metron*, mesure).

---

2. Le triangle rectangle : baptiser les trois côtés

Pour faire de la trigonométrie sans jamais s'embrouiller, il faut d'abord apprendre à regarder un triangle rectangle par les yeux d'un **angle aigu précis**.

Soit un triangle ABC, rectangle en B. Ses deux angles aigus sont $\hat{A}$ et $\hat{C}$. Choisissons l'angle aigu $\hat{A}$.

Regardons les trois côtés depuis le sommet A : 1. **L'hypoténuse :** c'est le côté situé en face de l'angle droit. C'est le plus long côté du triangle. Ici, c'est le segment $[AC]$. Son rôle ne dépend d'aucun angle particulier : c'est le maître du triangle rectangle. 2. **Le côté adjacent à l'angle $\widehat{A}$:** le mot *adjacent* vient du latin *ad-jacere*, qui signifie « couché à côté ». C'est le côté de l'angle droit qui touche l'angle $\hat{A}$. Ici, c'est le segment $[AB]$. 3. **Le côté opposé à l'angle $\widehat{A}$:** c'est le côté de l'angle droit qui est en face de l'angle $\hat{A}$, de l'autre côté du triangle. Ici, c'est le segment $[BC]$.

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! Les rôles s'inversent si l'on change d'angle !** Si tu te places maintenant au sommet C :
> - L'hypoténuse reste toujours $[AC]$.
> - Le côté **adjacent** à $\hat{C}$ devient $[BC]$!
> - Le côté **opposé** à $\hat{C}$ devient $[AB]$! Un côté n'est jamais « opposé » ou « adjacent » tout seul dans l'absolu : il l'est **relativement à l'angle considéré**.

---

3. Les trois rapports magiques : Cosinus, Sinus, Tangente

Imagine que tu dessines un triangle rectangle avec un angle aigu de 30°. Que tu le dessines sur ton cahier (avec une hypoténuse de 10 cm), sur le tableau de la classe (hypoténuse de 1 mètre) ou dans la cour (hypoténuse de 10 mètres), ces trois triangles sont des **agrandissements ou réductions** les uns des autres (triangles semblables, Chapitre 17).

Puisque les formes sont identiques, **le rapport entre les longueurs des côtés ne dépend que de l'angle**, et absolument pas de la taille du dessin !

Pour un angle aigu donné x, ces rapports portent trois noms universels :

Définition Fondamentale

📐 **Définitions fondamentales —** Dans un triangle rectangle :

1. Le **cosinus** de l'angle aigu est le quotient du côté adjacent par l'hypoténuse :
$$\cos(x) = \frac{\text{longueur du côté adjacent}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$
2. Le **sinus** de l'angle aigu est le quotient du côté opposé par l'hypoténuse :
$$\sin(x) = \frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$
3. La **tangente** de l'angle aigu est le quotient du côté opposé par le côté adjacent :
$$\tan(x) = \frac{\text{longueur du côté opposé}}{\text{longueur du côté adjacent}}$$

Comment prononcer et écrire ces notations ?

- $\cos(x)$ s'écrit « cos » et se lit à voix haute **« cosinus de x »**.
- $\sin(x)$ s'écrit « sin » et se lit à voix haute **« sinus de x »**.
- $\tan(x)$ s'écrit « tan » (anciennement « tg ») et se lit à voix haute **« tangente de x »**.

Le moyen mnémotechnique universel : CAH-SOH-TOA

Pour retenir ces trois formules sans jamais hésiter, les élèves du monde entier répètent cette formule magique comme le nom d'un sage guerrier amérindien :

$$\mathbf{C}\,\mathrm{A}\,\mathrm{H} \quad - \quad \mathbf{S}\,\mathrm{O}\,\mathrm{H} \quad - \quad \mathbf{T}\,\mathrm{O}\,\mathrm{A}$$

- **C**osinus = **A**djacent / **H**ypoténuse
- **S**inus = **O**pposé / **H**ypoténuse
- **T**angente = **O**pposé / **A**djacent

Certains préfèrent l'ordre inverse : **SOH - CAH - TOA**. Choisis celui qui chante le mieux à tes oreilles !

---

4. Deux propriétés capitales à comprendre

4.1 Pourquoi cosinus et sinus sont-ils toujours compris entre 0 et 1 ?

Dans tout triangle rectangle, l'hypoténuse est **le plus grand côté**. Par conséquent, la longueur du côté adjacent est strictement inférieure à l'hypoténuse, et la longueur du côté opposé est aussi strictement inférieure à l'hypoténuse.

Puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur (et que ce sont des longueurs positives) :

$$\frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} < 1 \qquad \text{et} \qquad \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} < 1$$

📐 Propriété — Bornes du cosinus et du sinus.

Pour tout angle aigu x d'un triangle rectangle ($0^\circ < x < 90^\circ$) :

$$0 < \cos(x) < 1 \qquad \text{et} \qquad 0 < \sin(x) < 1$$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège !** Si lors d'un contrôle tu trouves $\cos(x) = 1,45$ ou $\sin(x) = 2,3$, **arrête-toi immédiatement** : c'est rigoureusement impossible ! Tu as très probablement inversé le numérateur et le dénominateur de ta fraction. En revanche, la **tangente** $\tan(x) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$ peut valoir n'importe quel nombre positif : elle peut valoir $0,5$, 1, 10 ou même $1\,000$ si le triangle est très étiré en hauteur !

4.2 La relation fondamentale : Pythagore sous un nouveau masque

Que se passe-t-il si l'on calcule la somme des carrés du cosinus et du sinus d'un même angle x ? Prenons notre triangle rectangle avec l'adjacent noté a, l'opposé noté b, et l'hypoténuse notée c. D'après le théorème de Pythagore (Chapitre 19) :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Calculons maintenant :

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2}$$

Or $a^2 + b^2 = c^2$, donc :

$$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$$

📐 Théorème fondamental de la trigonométrie —

Pour tout angle x :

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

(Remarque sur la notation : $\cos^2(x)$ signifie bien $(\cos(x))^2$, c'est-à-dire le cosinus multiplié par lui-même).

De plus, en divisant le sinus par le cosinus :

$$\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}}{\frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \tan(x)$$

📐 Propriété du quotient —

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Ces deux formules permettent de trouver le sinus et la tangente d'un angle dès que l'on connaît son cosinus, sans même avoir besoin de connaître la mesure de l'angle !

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? D'où viennent ces mots étranges ?** Le mot **sinus** a une histoire de voyage linguistique incroyable. Les astronomes indiens du Ve siècle appelaient cette demi-corde géométrique *jya-ardha*, abrégé en *jiva*. Quand les savants arabes ont traduit ces traités au VIIIe siècle, ils ont transcrit le mot phonétiquement sous la forme *jiba*, écrit *jb* en arabe sans voyelles. Au XIIe siècle, à Tolède en Espagne, le traducteur Gérard de Crémone a confondu ce mot avec le mot arabe *jayb*, qui signifie « pli de vêtement, poche ou golfe ». Il l'a donc traduit en latin par **sinus**, qui signifie « pli, courbure, golfe » (qui a aussi donné le mot « sinueux ») ! Quant à **cosinus**, c'est l'abréviation de *complementi sinus* : le sinus de l'angle complémentaire !

---

5. Utiliser la calculatrice : les deux modes d'emploi

Pour faire des calculs, tu vas utiliser les touches de ta calculatrice scientifique : `cos`, `sin`, `tan`.

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège absolu ! Le mode de la calculatrice !** La calculatrice sait mesurer les angles en degrés (DEG) ou en radians (RAD). Au collège, **tous les angles sont en degrés**. Vérifie toujours qu'une petite lettre **D** ou **DEG** apparaît en haut de ton écran. Si tu vois un **R** ou **RAD**, tes calculs seront faux ! Pour basculer en degrés, consulte le menu `Config` ou `Mode` de ta machine.

Cas 1 : On connaît l'angle, on cherche le rapport

Tu tapes directement sur la touche :

- $\cos(60°) = 0,5$ pile.
- $\sin(30°) = 0,5$ pile.
- $\tan(45°) = 1$ pile (car dans un demi-carré, côté opposé = côté adjacent !).
- $\cos(48°) \approx 0,6691...$

Cas 2 : On connaît le rapport, on cherche l'angle (les touches inverses)

Si tu sais que $\cos(x) = 0,8$, quel est l'angle x ? On utilise la touche inverse, notée souvent $\mathbf{arccos}$ ou $\mathbf{cos^{-1}}$ (souvent accessible avec la touche `Seconde` ou `Shift` puis `cos`) :

- Si $\cos(x) = 0,8$, alors $x = \arccos(0,8) \approx 36,87°$.
- Si $\sin(x) = 0,5$, alors $x = \arcsin(0,5) = 30°$.
- Si $\tan(x) = 1$, alors $x = \arctan(1) = 45°$.

---

6. Les deux grands types de problèmes du collège

En classe de 4e et 3e, tout problème de trigonométrie se ramène à l'un de ces deux défis : 1. **Calculer une longueur** quand on connaît un angle et une autre longueur. 2. **Calculer un angle** quand on connaît deux longueurs.
Voici la démarche infaillible en 4 étapes :

> **Méthode Pas à Pas**
>
> 🛠️ **Méthode Pas à Pas — Méthode de Résolution Trigonométrique**
>
> - 1. Je fais un croquis et je repère
> - l'angle droit et l'angle utile.
> - 2. Je nomme les trois côtés :
> - Hypoténuse / Adjacent / Opposé.
> - 3. Je choisis la bonne formule :
> - Adjacent et Hypoténuse en jeu ? => CAH
> - Opposé et Hypoténuse en jeu ? => SOH
> - Opposé et Adjacent en jeu ? => TOA
> - 4. J'écris l'égalité, j'isole l'inconnue
> - produit en croix) et je calcule.

---

7. Exemples résolus détaillés pas à pas

Exemple résolu 1 — Calculer une longueur au numérateur

Dans le triangle KLM rectangle en L, on donne $KM = 8$ cm et $\hat{K} = 35°$. Calcule la longueur du côté $[LM]$, arrondie au millimètre près.

Solution rédigée : 1. **Nature du triangle :** Le triangle KLM est rectangle en L. 2. **Repérage par rapport à l'angle connu $\widehat{K}$:**

- $[KM]$ est l'hypoténuse (longueur connue : 8 cm).
- $[LM]$ est le côté **opposé** à l'angle $\hat{K}$ (longueur cherchée).

3. **Choix de la formule :** Opposé et hypoténuse font penser à SOH $\Longrightarrow$ on utilise le **sinus** :

$$\sin(\hat{K}) = \frac{LM}{KM}$$

4. **Calcul :**

$$\sin(35^\circ) = \frac{LM}{8}$$

En multipliant par 8 des deux côtés (ou produit en croix $\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{LM}{8}$) :

$$LM = 8 \times \sin(35^\circ) \approx 8 \times 0,573576 \approx 4,588 \ \text{ cm}$$

La longueur LM mesure environ $\mathbf{4,6 \ cm}$ (arrondie au millimètre).

Exemple résolu 2 — Calculer une longueur au dénominateur (le piège classique)

Dans le triangle RST rectangle en S, on sait que $RS = 5 \ \text{ cm}$ et $\hat{R} = 40^\circ$. Calcule la longueur de l'hypoténuse $[RT]$, arrondie au millimètre.

Solution rédigée : 1. Le triangle RST est rectangle en S. 2. Par rapport à l'angle connu $\hat{R} = 40^\circ$:

- $[RS]$ est le côté **adjacent** ($RS = 5 \ \text{ cm}$).
- $[RT]$ est l'**hypoténuse** (inconnue).

3. Adjacent et hypoténuse font penser à CAH $\Longrightarrow$ on utilise le **cosinus** :

$$\cos(\hat{R}) = \frac{RS}{RT}$$

4. On remplace par les valeurs :

$$\cos(40^\circ) = \frac{5}{RT}$$

Pour sortir RT du dénominateur, on utilise le produit en croix avec $\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{5}{RT}$:

$$RT \times \cos(40^\circ) = 5 \times 1 \Longrightarrow RT = \frac{5}{\cos(40^\circ)}$$

À la calculatrice :

$$RT = \frac{5}{\cos(40^\circ)} \approx \frac{5}{0,766044} \approx 6,527 \ \text{ cm}$$

L'hypoténuse $[RT]$ mesure environ $\mathbf{6,5 \ cm}$. *(Remarque d'auto-contrôle : l'hypoténuse mesure 6,5 cm, elle est bien plus longue que le côté adjacent de 5 cm. C'est cohérent !)*

Exemple résolu 3 — Calculer un angle aigu connaissant deux côtés

Un voilier approche d'un phare bâti sur un îlot rocheux. Le sommet de la falaise s'élève à 42 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le bateau se trouve à 110 mètres à l'horizontale du pied de la falaise. Sous quel angle d'élévation le marin voit-il le sommet de la falaise ? (arrondir au dixième de degré).

Solution rédigée : 1. Le triangle FPB formé par la falaise verticale, la ligne d'eau horizontale et la ligne de visée est rectangle en P. 2. Par rapport à l'angle cherché $\hat{B}$:

- Le côté opposé est la hauteur de la falaise : $FP = 42 \ \text{ m}$.
- Le côté adjacent est la distance horizontale : $PB = 110 \ \text{ m}$.

3. Opposé et adjacent font penser à TOA $\Longrightarrow$ on utilise la **tangente** :

$$\tan(\hat{B}) = \frac{FP}{PB} = \frac{42}{110}$$

4. On utilise la fonction inverse $\arctan$ (ou $\tan^{-1}$) sur la calculatrice :

$$\hat{B} = \arctan\left(\frac{42}{110}\right) \approx \arctan(0,3818) \approx 20,899^\circ$$

Le marin voit le sommet de la falaise sous un angle d'élévation d'environ $\mathbf{20,9^\circ}$.

Exemple résolu 4 — Déterminer toutes les caractéristiques d'un triangle (« Résoudre » le triangle)

Soit un triangle ABC rectangle en A tel que $BC = 13$ cm et $AB = 5$ cm. 1. Calcule la valeur exacte de la longueur AC. 2. Détermine la valeur exacte de $\cos(\hat{B})$, puis la mesure arrondie au degré près de l'angle $\hat{B}$. 3. Déduis-en sans nouveau calcul trigonométrique la mesure de l'angle $\hat{C}$.

Solution rédigée : 1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Longrightarrow 13^2 = 5^2 + AC^2 \Longrightarrow 169 = 25 + AC^2$$

$$AC^2 = 169 - 25 = 144 \Longrightarrow AC = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

2. Dans le triangle rectangle en A, par rapport à l'angle $\hat{B}$:

$$\cos(\hat{B}) = \frac{AB}{BC} = \frac{5}{13}$$

À la calculatrice : $\hat{B} = \arccos\left(\frac{5}{13}\right) \approx 67,38^\circ$, soit $\mathbf{67^\circ}$ au degré près. 3. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires (leur somme vaut 90°) :

$$\hat{C} = 90^\circ - \hat{B} \approx 90^\circ - 67,38^\circ \approx 22,62^\circ \approx \mathbf{23^\circ}.$$

Exemple résolu 5 — Trouver le sinus à partir du cosinus sans calculer l'angle

Un angle aigu noté x vérifie $\cos(x) = \frac{3}{5} = 0,6$. Calcule la valeur exacte de $\sin(x)$, puis celle de $\tan(x)$, sans jamais utiliser la touche $\arccos$ de la calculatrice.

Solution rédigée : 1. On utilise la relation fondamentale $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \sin^2(x) = 1 \Longrightarrow \frac{9}{25} + \sin^2(x) = 1$$

$$\sin^2(x) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{25-9}{25} = \frac{16}{25}$$

Puisque x est un angle aigu, son sinus est positif :

$$\sin(x) = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} = \mathbf{0,8}.$$

2. On utilise la relation du quotient $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$:

$$\tan(x) = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{4}{3} \approx \mathbf{1,333}...$$

C'est exactement le célèbre triangle rectangle égyptien de côtés 3, 4 et 5 !

Ce qu'il faut retenir

1. **Le vocabulaire dans le triangle rectangle :**
   - **Hypoténuse** : en face de l'angle droit, le plus grand côté.
   - **Côté adjacent** à un angle aigu : touche cet angle (côté de l'angle droit).
   - **Côté opposé** à un angle aigu : en face de cet angle.
2. **Les formules magiques (CAH-SOH-TOA) :**

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}} \qquad \sin(\text{angle}) = \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}} \qquad \tan(\text{angle}) = \frac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}}$$

3. **Propriétés indispensables :**
   - Pour tout angle aigu d'un triangle rectangle : $0 < \cos(x) < 1$ et $0 < \sin(x) < 1$.
   - Formule fondamentale : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
   - Formule du quotient : $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
   - Angles complémentaires : si $\alpha + \beta = 90°$, alors $\cos(\alpha) = \sin(\beta)$ et $\sin(\alpha) = \cos(\beta)$.
4. **Méthode d'utilisation de la calculatrice :**
   - Vérifier impérativement le mode **Degrés (DEG)**.
   - Pour trouver une longueur : utiliser `cos`, `sin` ou `tan`.
   - Pour trouver un angle : utiliser `arccos` ($\cos^{-1}$), `arcsin` ($\sin^{-1}$) ou `arctan` ($\tan^{-1}$).

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 28.1 Dans un triangle DEF rectangle en D, nomme : 1. L'hypoténuse. 2. Le côté adjacent à l'angle $\hat{E}$. 3. Le côté opposé à l'angle $\hat{E}$. 4. Écris les rapports $\cos(\hat{E})$, $\sin(\hat{E})$ et $\tan(\hat{E})$ avec les lettres des sommets.

Exercice 28.2 À l'aide de ta calculatrice en mode Degrés, donne une valeur arrondie au millième de : a) $\cos(25°)$ b) $\sin(70°)$ c) $\tan(12°)$ d) $\tan(85°)$

Exercice 28.3 Trouve la mesure de l'angle aigu x arrondie au dixième de degré près sachant que : a) $\cos(x) = 0,72$ b) $\sin(x) = 0,35$ c) $\tan(x) = 1,8$ d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 28.4 Soit un triangle ABC rectangle en B tel que $AB = 6$ cm et $AC = 10$ cm. Calcule la valeur exacte de $\cos(\hat{A})$, puis déduis-en la mesure de l'angle $\hat{A}$ arrondie au degré.

Exercice 28.5 Dans un triangle MNO rectangle en N, on sait que $MO = 12$ cm et $\widehat{M} = 30°$. Calcule la longueur exacte de $[NO]$.

Niveau : Réflexion et situations concrètes

Exercice 28.6 (La rampe d'accès). Une norme impose que les rampes d'accès pour fauteuils roulants ne fassent pas un angle supérieur à $5°$ avec l'horizontale. Une rampe a une longueur de 4 mètres et permet d'atteindre un perron situé à 40 cm de hauteur. Cette rampe est-elle conforme à la réglementation ? Justifie par un calcul.

Exercice 28.7 (L'arbre abattu par la foudre). Lors d'une tempête, un arbre vertical de 15 mètres de haut a été brisé en deux par la foudre. Le haut de l'arbre s'est couché sans se détacher du tronc restant : sa cime touche le sol en formant un angle de $28°$ avec le sol horizontal. À quelle hauteur le tronc s'est-il brisé ? (Arrondir au centimètre près).

Exercice 28.8 (La traversée du fleuve). Un géomètre se tient sur la berge d'un fleuve au point A, exactement en face d'un arbre remarquable C situé sur la berge opposée (le segment $[AC]$ est perpendiculaire aux deux berges parallèles). Il marche de 50 mètres le long de la berge en ligne droite jusqu'à un point B. Depuis ce point B, il vise l'arbre C et mesure au théodolite un angle $\widehat{ABC} = 38°$. Quelle est la largeur du fleuve, arrondie au mètre près ?

Exercice 28.9 (Le losange et ses diagonales). Un losange $ABCD$ a des côtés de longueur 8 cm. L'un de ses angles intérieurs mesure $50°$. Rappelle les propriétés des diagonales d'un losange, puis calcule la longueur exacte de chacune des deux diagonales (arrondie au millimètre près).

Exercice 28.10 (L'avion en phase de descente). Un avion de ligne vole à une altitude de 9 000 mètres à une vitesse constante de 720 km/h. Il entame sa descente vers la piste d'atterrissage selon un angle constant de $3°$ par rapport à l'horizontale. 1. Quelle distance en vol (le long de sa trajectoire inclinée) doit-il parcourir pour toucher le sol ? 2. Combien de temps dure cette descente, en minutes et secondes ?

Exercice 28.11 (Relations trigonométriques). Un angle aigu α vérifie $\sin(\alpha) = \frac{5}{13}$. 1. Sans calculer la mesure de l'angle α, utilise la relation fondamentale pour déterminer la valeur exacte de $\cos(\alpha)$ sous forme de fraction irréductible. 2. Détermine ensuite la valeur exacte de $\tan(\alpha)$. 3. Vérifie tes résultats à l'aide de la calculatrice.

Niveau : Défis et problèmes d'approfondissement

Exercice 28.12 (La mesure de la tour inaccessible). Pour mesurer la hauteur d'une tour médiévale entourée de douves infranchissables, un arpenteur se place au point A et mesure un angle de visée de 32° vers le sommet de la tour. Il recule ensuite de 25 mètres en ligne droite sur le sol plat jusqu'au point B, où le nouvel angle de visée vers le sommet n'est plus que de 24°. Soit h la hauteur de la tour et x la distance entre le pied de la tour et le point A. 1. Exprime x en fonction de h et de $\tan(32^\circ)$. 2. Exprime $x + 25$ en fonction de h et de $\tan(24^\circ)$. 3. En déduisant une équation d'inconnue h, calcule la hauteur de la tour au décimètre près.

Exercice 28.13 (La mesure du gnomon d'Ératosthène). À Alexandrie, Ératosthène a planté un gnomon de 1 mètre de hauteur. L'ombre mesurée au sol mesurait environ 12,6 cm. 1. Calcule l'angle formé par les rayons du soleil avec le bâton vertical. 2. Retrouve-t-on bien la valeur historique de $7,2^\circ$?

Exercice 28.14 (Formule de l'aire d'un triangle quelconque). Soit un triangle quelconque ABC où l'on connaît deux côtés $AB = c$, $AC = b$, et l'angle aigu $\hat{A}$ formé par ces deux côtés. Soit H le pied de la hauteur issue de C. 1. Dans le triangle ACH rectangle en H, exprime la hauteur CH en fonction de b et de $\sin(\hat{A})$. 2. Démontre la célèbre formule de l'aire :

$$\text{Aire}(ABC) = \frac{1}{2} bc \sin(\hat{A})$$

3. Calcule l'aire d'un triangle dont deux côtés mesurent 7 cm et 10 cm, formant un angle de 40°.

Exercice 28.15 (Le triangle rectangle isocèle et les valeurs remarquables). Considère un carré $ABCD$ de côté 1. On trace la diagonale $[AC]$. 1. Quelle est la nature exacte du triangle ABC ? Quelle est la mesure de ses angles aigus ? 2. Calcule la longueur exacte de la diagonale $[AC]$ à l'aide du théorème de Pythagore. 3. Déduis-en les valeurs exactes de $\cos(45^\circ)$, $\sin(45^\circ)$ et $\tan(45^\circ)$.

Solutions

Solutions des exercices

- **Solution 28.1 :** 1. Hypoténuse : $[EF]$. 2. Côté adjacent à $\hat{E}$: $[DE]$. 3. Côté opposé à $\hat{E}$: $[DF]$. 4. $\cos(\hat{E}) = \frac{DE}{EF}$, $\sin(\hat{E}) = \frac{DF}{EF}$, $\tan(\hat{E}) = \frac{DF}{DE}$.
- **Solution 28.2 :** a) $\approx 0,906$; b) $\approx 0,940$; c) $\approx 0,213$; d) $\approx 11,430$.
- **Solution 28.3 :** a) $x = \arccos(0,72) \approx 43,9^\circ$; b) $x = \arcsin(0,35) \approx 20,5^\circ$; c) $x = \arctan(1,8) \approx 60,9^\circ$; d) $x = 45^\circ$ car $\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- **Solution 28.4 :** $\cos(\hat{A}) = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{10} = 0,6$. À la calculatrice, $\hat{A} = \arccos(0,6) \approx 53^\circ$.
- **Solution 28.5 :** Dans MNO rectangle en N, $\sin(\widehat{M}) = \frac{NO}{MO} \Longrightarrow \sin(30^\circ) = \frac{NO}{12}$. Comme $\sin(30^\circ) = 0,5$, $NO = 12 \times 0,5 = 6$ cm.

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 28.6 (La rampe d'accès) :** Soit α l'angle de la rampe avec l'horizontale. La rampe forme l'hypoténuse (4 m $= 400$ cm) et la hauteur du perron forme le côté opposé (40 cm). Dans ce triangle rectangle :

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{40}{400} = 0,1$$

À la calculatrice : $\alpha = \arcsin(0,1) \approx 5,74^\circ$. Puisque $5,74^\circ > 5^\circ$, la pente est trop raide : **la rampe n'est pas conforme** à la réglementation.

- **Solution 28.7 (L'arbre abattu) :** Soit h la hauteur du tronc encore debout (côté opposé à l'angle de $28°$). La partie brisée couchée forme l'hypoténuse de longueur L. La hauteur totale initiale de l'arbre est $h + L = 15$, d'où $L = 15 - h$. Dans le triangle rectangle formé avec le sol :

$$\sin(28°) = \frac{h}{L} = \frac{h}{15 - h}$$

En multipliant par $(15 - h)$:

$$(15 - h) \times \sin(28°) = h \Longrightarrow 15\sin(28°) - h\sin(28°) = h$$

$$15\sin(28°) = h(1 + \sin(28°)) \Longrightarrow h = \frac{15\sin(28°)}{1 + \sin(28°)}$$

Comme $\sin(28°) \approx 0,46947$:

$$h \approx \frac{15 \times 0,46947}{1 + 0,46947} = \frac{7,042}{1,46947} \approx 4,79 \text{ m}.$$

Le tronc s'est brisé à environ **4,79 mètres** de hauteur (et la cime mesure $15 - 4,79 = 10,21$ m).

- **Solution 28.8 (La traversée du fleuve) :** Le triangle ABC est rectangle en A. L'arbre est en C, l'observateur initial en A et il a marché jusqu'en B ($AB = 50$ m). Par rapport à l'angle $\hat{B} = 38°$, $[AC]$ est le côté opposé (la largeur du fleuve) et $[AB]$ est le côté adjacent (50 m).

$$\tan(38°) = \frac{AC}{AB} = \frac{AC}{50} \Longrightarrow AC = 50 \times \tan(38°)$$

$\tan(38°) \approx 0,781286$, d'où $AC \approx 50 \times 0,781286 \approx 39,06$ m. Le fleuve a une largeur d'environ **39 mètres**.

- **Solution 28.9 (Le losange) :** Rappel : les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu en formant un angle droit, et elles sont les bissectrices des angles intérieurs. Soit O le centre du losange. Le triangle AOB est rectangle en O. L'hypoténuse est le côté $AB = 8$ cm. L'angle en A vaut la moitié de $50°$, soit $\widehat{OAB} = 25°$.
  - Côté adjacent OA : $\cos(25°) = \frac{OA}{AB} \Longrightarrow OA = 8 \times \cos(25°) \approx 7,2505$ cm. La grande diagonale mesure donc $AC = 2 \times OA \approx \mathbf{14,5}$ **cm**.
  - Côté opposé OB : $\sin(25°) = \frac{OB}{AB} \Longrightarrow OB = 8 \times \sin(25°) \approx 3,3809$ cm. La petite diagonale mesure donc $BD = 2 \times OB \approx \mathbf{6,8}$ **cm**.
- **Solution 28.10 (L'avion en descente) :**
  1. Le triangle rectangle formé par l'altitude verticale (9 000 m), la distance au sol et la trajectoire de l'avion a un angle d'inclinaison de $3°$. L'altitude est le côté opposé à l'angle de $3°$, et la trajectoire est l'hypoténuse D.

$$\sin(3°) = \frac{9\,000}{D} \Longrightarrow D = \frac{9\,000}{\sin(3°)} \approx \frac{9\,000}{0,052336} \approx 171\,966 \text{ mètres} \approx \mathbf{172} \text{ km}.$$

  2. La vitesse de l'avion est 720 km/h $= \frac{720\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 200$ m/s. Le temps de vol est $t = \frac{D}{v} = \frac{171\,966}{200} \approx 859,8$ secondes. Comme $859,8 \div 60 \approx 14,33$ min, cela donne **14 minutes et 20 secondes**.
- **Solution 28.11 (Relations fondamentales) :**
  1. $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. Comme α est aigu, $\cos(\alpha) = \sqrt{\frac{144}{169}} = \mathbf{\frac{12}{13}}$.
  2. $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{5/13}{12/13} = \mathbf{\frac{5}{12}}$.
  3. Vérification : $\arcsin(5/13) \approx 22,62°$. $\cos(22,62°) \approx 0,923 \approx 12/13$. Tout concorde parfaitement.

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 28.12 (La tour inaccessible) :**
  1. Dans le triangle rectangle formé par la tour et le point A : $\tan(32°) = \frac{h}{x} \Longrightarrow x = \frac{h}{\tan(32°)}$.
  2. Dans le triangle rectangle formé par la tour et le point B : $\tan(24°) = \frac{h}{x+25} \Longrightarrow x + 25 = \frac{h}{\tan(24°)}$.
  3. En soustrayant les deux expressions :

$$(x + 25) - x = \frac{h}{\tan(24°)} - \frac{h}{\tan(32°)} \Longrightarrow 25 = h\left(\frac{1}{\tan(24°)} - \frac{1}{\tan(32°)}\right)$$

Calculons les valeurs : $\tan(24^\circ) \approx 0,44523 \Longrightarrow \frac{1}{\tan(24^\circ)} \approx 2,2460$ $\tan(32^\circ) \approx 0,62487 \Longrightarrow \frac{1}{\tan(32^\circ)} \approx 1,6003$
La différence vaut $2,2460 - 1,6003 = 0,6457$. D'où :

$$h = \frac{25}{0,6457} \approx \mathbf{38,7 \ \ mètres} \ .$$

La tour mesure environ **38,7 mètres**.

- **Solution 28.13 (Le gnomon d'Ératosthène) :**
  1. Le bâton a une hauteur de $1 \ \ \mathrm{m} = 100 \ \ \mathrm{cm}$ (côté adjacent) et l'ombre au sol mesure $12,6 \ \ \mathrm{cm}$ (côté opposé).
  $$\tan(\alpha) = \frac{12,6}{100} = 0,126$$
  À la calculatrice : $\alpha = \arctan(0,126) \approx 7,18^\circ$.
  2. En arrondissant au dixième, on trouve bien $\mathbf{7,2^\circ}$, exactement la valeur mesurée par Ératosthène !
- **Solution 28.14 (L'aire d'un triangle quelconque) :**
  1. Dans le triangle ACH rectangle en H, par rapport à l'angle aigu $\hat{A}$: $\sin(\hat{A}) = \frac{CH}{AC} = \frac{CH}{b} \Longrightarrow CH = b\sin(\hat{A})$.
  2. L'aire du triangle ABC est donnée par $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur} = \frac{1}{2} \times AB \times CH$. En remplaçant AB par c et CH par $b\sin(\hat{A})$:
  $$\text{Aire} = \frac{1}{2}bc\sin(\hat{A}).$$
  3. Pour $b = 7$, $c = 10$, $\hat{A} = 40^\circ$:
  $$\text{Aire} = \frac{1}{2} \times 7 \times 10 \times \sin(40^\circ) = 35 \times \sin(40^\circ) \approx 35 \times 0,64279 \approx \mathbf{22,5 \ cm^2}.$$
- **Solution 28.15 (Le demi-carré et 45°) :**
  1. Le triangle ABC a deux côtés de même longueur ($AB = BC = 1$) et un angle droit en B : c'est un **triangle rectangle isocèle**. Ses deux angles aigus sont égaux et valent $(180^\circ - 90^\circ)/2 = \mathbf{45}^\circ$.
  2. D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \Longrightarrow AC = \sqrt{\mathbf{2}}$.
  3. Dans ce triangle :
     - $\cos(45^\circ) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}} \approx 0,707$.
     - $\sin(45^\circ) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}} \approx 0,707$.
     - $\tan(45^\circ) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{1}{1} = \mathbf{1}$.

La question qui ouvre la suite

Grâce à la trigonométrie, nous avons appris à arpenter l'espace continu, les angles célestes et les distances inaccessibles de la Terre. Mais que se passe-t-il si l'on quitte le monde des longueurs qui s'étirent pour revenir au monde des objets **entiers et indivisibles** ?

Comment carreler un sol rectangulaire avec des dalles carrées sans découper la moindre chute de marbre ? Comment répartir des trésors en parts rigoureusement égales sans casser une seule pièce ? C'est à Alexandrie, un siècle avant Ératosthène, qu'un autre géant de la pensée a gravé les règles éternelles du partage parfait. Prépare-toi à découvrir le secret des diviseurs et l'algorithme immortel d'**Euclide**.

CHAPITRE 29 : Le Partage d'Euclide

> « Un nombre n'est pas une pâte molle qu'on étale à volonté : c'est un édifice bâti avec des pierres premières taillées dans le diamant. Trouve les briques fondamentales, et tu comprendras comment partager sans briser. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi certains nombres refusent d'être partagés et forment les **atomes de l'arithmétique** : les nombres premiers.
- Comment décomposer n'importe quel nombre entier en un **produit unique de facteurs premiers** grâce à l'arbre et à la potence.
- Ce qu'est le **PGCD** (Plus Grand Commun Diviseur) et comment le calculer de trois façons différentes.
- L'astuce fulgurante inventée par **Euclide** il y a plus de vingt-trois siècles pour trouver le diviseur commun en quelques divisions euclidiennes.
- Comment rendre une **fraction irréductible** d'un seul coup de baguette magique.
- Comment résoudre des casse-têtes concrets de la vie réelle : **paver une pièce sans casser un seul carreau** et composer des **colis cadeaux identiques** sans laisser une seule miette.

---

1. Le problème : la mosaïque du Pharaon et les paniers du scribe

Alexandrie, vers l'an **300 avant notre ère**. Le roi Ptolémée I^{er} fait construire une immense salle d'apparat dans son palais royal. Deux artisans se présentent devant l'architecte en chef, le front plissé par le souci.

- Le premier est le **maître mosaïste**. Le sol de la salle est un grand rectangle mesurant **420 centimètres de long sur 132 centimètres de large**. Le roi a ordonné : *« Je veux que ce sol soit recouvert de dalles de marbre carrées, toutes rigoureusement identiques. Je refuse qu'on découpe la moindre dalle sur les bords : chaque carreau doit être posé entier ! Et pour que le sol soit somptueux, je veux que ces dalles soient **les plus grandes possibles** ! »* Le mosaïste gémit : des carreaux de 1 cm marcheraient, bien sûr, mais il en faudrait 55 440 et ce serait minuscule ! Des carreaux de 2 cm marcheraient aussi. Mais quelle est la plus grande taille possible ?
- Le second artisan est le **scribe intendant** des fêtes. Pour honorer les dignitaires étrangers, il dispose de deux coffres de denrées précieuses :
  - Un coffre contenant **315 grenades d'Égypte** ;
  - Un coffre contenant **180 loukoums au miel**. Le roi exige que l'intendant prépare des corbeilles cadeaux pour les invités : *« Toutes les corbeilles doivent être rigoureusement identiques : exactement le même nombre de grenades et le même nombre de loukoums dans chaque panier. Et je ne veux aucun reste dans les coffres ! Enfin, je veux inviter **le plus grand nombre possible** de dignitaires ! »*



Fig. 77. – L'algorithme géométrique d'Euclide par découpage de carrés

Comment résoudre ces deux énigmes sans tester tous les nombres au hasard pendant trois semaines ? Dans les deux cas, le problème est le même : nous cherchons un nombre entier qui **divise parfaitement** deux nombres à la fois, et qui soit **le plus grand possible**.

Pour éclairer les artisans, un homme s'avance dans la cour du palais. Il tient sous le bras les papyrus de son grand chef-d'œuvre, les *Éléments*. Il s'appelle **Euclide**.

---

2. Multiples et diviseurs : le vocabulaire de la précision

Avant d'entrer dans l'atelier d'Euclide, il faut maîtriser la langue de l'arithmétique. Ces mots ont un sens précis qu'il ne faut jamais mélanger.

Soient deux nombres entiers positifs a et b (avec $b \neq 0$). Si la division de a par b « tombe juste » — c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne est égal à zéro —, on peut écrire :

$$a = b \times k \quad (\text{où } \ k \ \text{ est un entier}).$$

On dit alors indifféremment :

- a **est un multiple de** b (ex. : 42 est un multiple de 6, car $42 = 6 \times 7$).
- b **est un diviseur de** a (ex. : 6 est un diviseur de 42).
- b **divise** a (noté parfois $b \mid a$).
- a **est divisible par** b.

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! Le sens de la phrase !** Ne confonds jamais le « père » et le « fils » :
> - Dire « 6 divise 42 » est **vrai**.
> - Dire « 42 divise 6 » est **totalement faux** ! (42 ne rentre pas dans 6). L'astuce pour ne pas hésiter : le **multiple** est toujours plus grand (ou égal), le **diviseur** est toujours plus petit (ou égal).

Rappel express : les critères de divisibilité

Pour savoir rapidement si un nombre en divise un autre sans poser la division :

- Un nombre est divisible par **2** s'il est pair (se termine par 0, 2, 4, 6, 8).
- Un nombre est divisible par **3** si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 (ex. : $471 \Longrightarrow 4+7+1 = 12$, divisible par 3).
- Un nombre est divisible par **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4 (ex. : $3\,724 \Longrightarrow 24 = 4 \times 6$, donc divisible par 4).
- Un nombre est divisible par **5** s'il se termine par 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par **9** si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 (ex. : $855 \Longrightarrow 8+5+5 = 18$, divisible par 9).
- Un nombre est divisible par **10** s'il se termine par 0.

---

3. Les nombres premiers : les atomes de l'univers mathématique

Prends le nombre 12. Tu peux le découper : $12 = 3 \times 4$. Puis découper encore : $4 = 2 \times 2$. Tu obtiens $12 = 2 \times 2 \times 3$. Peux-tu découper 2 ou 3 ? Non ! Deux et trois sont insécables. Ils ne peuvent être divisés que par 1 et par eux-mêmes.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition officielle — Nombre premier.** Un nombre entier naturel est dit **premier** s'il possède **exactement deux diviseurs distincts** : 1 et lui-même.

Regarde attentivement les conséquences de cette définition :

- **Le nombre 0 n'est pas premier** : il a une infinité de diviseurs (n'importe quel nombre non nul divise 0).
- **Le nombre 1 n'est PAS premier** : il n'a qu'un **seul** diviseur (lui-même). La règle impose *deux* diviseurs distincts. Si 1 était premier, la décomposition en facteurs premiers perdrait son unicité ($6 = 2 \times 3 = 1 \times 2 \times 3 = 1 \times 1 \times 2 \times 3$...).
- **Le nombre 2 est premier** : c'est même le **seul nombre premier pair** de l'univers ! Tous les autres nombres pairs sont divisibles par 2, donc ils ne sont pas premiers.

La liste des nombres premiers inférieurs à 30

À connaître par cœur comme ses tables :

$$\mathbf{2},\quad \mathbf{3},\quad \mathbf{5},\quad \mathbf{7},\quad \mathbf{11},\quad \mathbf{13},\quad \mathbf{17},\quad \mathbf{19},\quad \mathbf{23},\quad \mathbf{29}$$

(Et en poussant un peu : 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97).

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Dans le Livre IX des *Éléments*, Euclide a démontré une vérité vertigineuse : **il existe une infinité de nombres premiers**. Même si l'on voyageait pendant des millions d'années dans les nombres gigantesques, on ne manquerait jamais de nouveaux nombres premiers !

---

4. La décomposition en facteurs premiers

Voici le théorème le plus important de toute l'arithmétique. Il est si capital qu'on l'appelle le **théorème fondamental de l'arithmétique**.

> **📐 Théorème fondamental de l'arithmétique —**
>
> Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un **produit de nombres premiers**. Cette décomposition est **unique**, à l'ordre des facteurs près.

C'est la « carte d'identité génétique » du nombre. Deux nombres différents ne peuvent jamais avoir la même décomposition.

Deux méthodes pratiques pour décomposer un nombre

Prenons le nombre $\mathbf{360}$ à décomposer.

Méthode 1 : L'arbre de décomposition (idéal pour calculer mentalement)
On coupe le nombre en deux facteurs évidents, puis on continue de couper les branches jusqu'à n'avoir que des nombres premiers au bout de chaque feuille.
On ramasse toutes les feuilles premières :

$$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = \mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}$$

Méthode 2 : La potence verticale des divisions successives (méthode officielle infaillible)
On trace une barre verticale. À gauche, on écrit le nombre. À droite, on teste les nombres premiers dans l'ordre croissant $(2, 3, 5, 7, 11...)$ et on divise dès que c'est possible :
La colonne de droite donne directement les facteurs :

$$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = \mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5}.$$

---

5. Le PGCD : Plus Grand Commun Diviseur

5.1 Définition

Quand on compare deux nombres entiers a et b, certains entiers divisent à la fois a et b : ce sont leurs **diviseurs communs**. Comme 1 divise tous les entiers, il y a toujours au moins un diviseur commun : le nombre 1.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — PGCD.** Parmi tous les diviseurs communs à deux nombres entiers non nuls a et b, le plus grand d'entre eux est appelé le **Plus Grand Commun Diviseur**, noté $\mathbf{PGCD}(a;b)$.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Nombres premiers entre eux.** Deux nombres entiers sont dits **premiers entre eux** lorsque leur seul diviseur commun est 1, c'est-à-dire :

$$\mathrm{PGCD}(a;b) = 1$$

(Exemple : 8 et 15 ne sont pas des nombres premiers, mais ils sont premiers entre eux car les diviseurs de 8 sont {1, 2, 4, 8} et ceux de 15 sont {1, 3, 5, 15} ; le seul diviseur commun est 1).

5.2 Première méthode : Par la décomposition en facteurs premiers

Pour trouver le PGCD de deux nombres décomposés en produit de facteurs premiers : 1. On repère les **facteurs premiers communs** aux deux nombres. 2. Pour chaque facteur commun, on prend **le plus petit exposant** avec lequel il apparaît. 3. On multiplie ces facteurs entre eux.

Exemple : Calculons le PGCD de 180 et 315 (les denrées de notre banquet !) : - $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ - $315 = 3^2 \times 5 \times 7$

Facteurs communs : 3 et 5.

- La plus petite puissance de 3 est 3^2.
- La plus petite puissance de 5 est 5^1.

$$\mathrm{PGCD}(180;315) = 3^2 \times 5 = 9 \times 5 = \mathbf{45}.$$

Le scribe pourra donc confectionner au maximum **45 corbeilles identiques** ! Chaque corbeille contiendra :

- $315 \div 45 = 7$ grenades ;
- $180 \div 45 = 4$ loukoums.

Pas une seule miette de reste !

---

6. Les deux algorithmes historiques : soustractions et divisions

Quand les nombres sont très grands, trouver tous leurs diviseurs ou leur décomposition en facteurs premiers peut être long et fastidieux. Les Anciens ont trouvé des raccourcis fulgurants.

6.1 L'algorithme des soustractions successives

Cet algorithme repose sur une propriété arithmétique très simple : > 📐 **Propriété des soustractions —** > Si un nombre d divise à la fois a et b (avec $a \geq b$), alors d divise aussi leur différence $a - b$. > Par conséquent : $\mathrm{PGCD}(a;b) = \mathrm{PGCD}(b;a-b)$.

Le procédé : On remplace le plus grand des deux nombres par leur différence, et on recommence jusqu'à obtenir deux nombres égaux. Ce nombre final est le PGCD !

Exemple : Calculons $\mathrm{PGCD}(75;45)$: - $75 - 45 = 30 \Longrightarrow$ on garde 45 et 30 - $45 - 30 = 15 \Longrightarrow$ on garde 30 et 15 - $30 - 15 = 15 \Longrightarrow$ on garde 15 et 15 - $15 - 15 = 0$

Les deux nombres égaux obtenus sont 15, donc $\mathrm{PGCD}(75;45) = \mathbf{15}$.

⚠ ⚠ **La limite des soustractions :**

Imagine que tu doives calculer $\mathrm{PGCD}(1\,000\,000; 2)$. Tu vas devoir soustraire 2 cinq cent mille fois ! C'est une perte de temps absurde. Heureusement, Euclide a eu une idée de génie.

6.2 L'algorithme d'Euclide (divisions successives)

Au lieu de soustraire b un par un, pourquoi ne pas soustraire d'un seul coup le plus de paquets de b possibles ? C'est exactement le principe de la **division euclidienne** :

$$a = b \times q + r \quad (0 \leq r < b)$$

📐 **Théorème d'Euclide —**

Si la division euclidienne de a par b donne un reste r, alors :

$$\mathrm{PGCD}(a; b) = \mathrm{PGCD}(b; r)$$

Le procédé de l'algorithme d'Euclide : 1. On effectue la division euclidienne du plus grand nombre par le plus petit. 2. Si le reste n'est pas nul, on recommence en divisant le diviseur précédent par le reste obtenu. 3. On s'arrête dès que le reste est nul ($r = 0$). 4. **Le PGCD est le dernier reste NON NUL.**

Exemple : Résolvons le problème de la mosaïque d'Alexandrie : $\mathrm{PGCD}(420; 132)$.

Méthode Pas à Pas

🛠 **Méthode Pas à Pas — Calcul du PGCD par l'Algorithme d'Euclide**

- Étape 1 : 420 = 132 × 3 + 24 (reste $r_1 = 24 \neq 0$)
- Étape 2 : 132 = 24 × 5 + 12 (reste $r_2 = 12 \neq 0$)
- Étape 3 : 24 = 12 × 2 + 0 (reste $r_3 = 0$)

Le reste est 0. Le dernier reste avant 0 est **12**. Donc :

$$\mathrm{PGCD}(420; 132) = \mathbf{12}.$$

Le maître mosaïste a sa réponse :

- Les plus grandes dalles possibles mesurent $\mathbf{12\ \ cm \times 12\ \ cm}$.
- Sur la longueur, il posera $420 \div 12 = 35$ dalles.
- Sur la largeur, il posera $132 \div 12 = 11$ dalles.
- Au total, il posera $35 \times 11 = \mathbf{385\ \ dalles}$, parfaitement ajustées sans couper aucun millimètre de marbre !

---

7. L'application reine : les fractions irréductibles

Tu as appris en classe de 5e à simplifier des fractions en divisant en haut et en bas par un même nombre. Mais souvent, on s'arrête trop tôt : on simplifie par 2, puis par 3, sans être certain d'avoir terminé.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fraction irréductible.** Une fraction $\frac{a}{b}$ est dite **irréductible** si son numérateur a et son dénominateur b sont **premiers entre eux**, c'est-à-dire si $\mathrm{PGCD}(a; b) = 1$. On ne peut plus la simplifier.

Grâce au PGCD, on peut rendre n'importe quelle fraction irréductible **en une seule étape** :

Méthode — Simplification maximale.

Pour rendre la fraction $\frac{a}{b}$ irréductible, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par leur **PGCD** :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \div \mathrm{PGCD}(a;b)}{b \div \mathrm{PGCD}(a;b)}$$

Exemple : Rends irréductible la fraction $\frac{132}{420}$. Nous venons de calculer que $\mathrm{PGCD}(420;132) = 12$.

$$\frac{132}{420} = \frac{132 \div 12}{420 \div 12} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{35}}.$$

Puisque 11 et 35 sont premiers entre eux, la fraction est garantie irréductible immédiatement !

---

8. Exemples résolus détaillés pas à pas

Exemple résolu 1 — Décomposition et diviseurs

1. Décompose l'entier 540 en produit de facteurs premiers à l'aide de la potence.
2. Écris le résultat sous forme de puissances.
3. Le nombre 540 est-il divisible par 18 ? Par 24 ? Justifie sans poser de division.

Solution rédigée : 1. Potence de division :

- $540 \div 2 = 270$
- $270 \div 2 = 135$
- $135 \div 3 = 45$ (car $1+3+5=9$)
- $45 \div 3 = 15$
- $15 \div 3 = 5$
- $5 \div 5 = 1$

2. Donc : $540 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 = \mathbf{2^2 \times 3^3 \times 5}$.
3. - Pour 18 : la décomposition de 18 est $18 = 2 \times 3^2$. Dans 540, on trouve bien au moins un facteur 2 (il y en a 2) et au moins deux facteurs 3 (il y en a 3). Donc **540 est bien divisible par 18**.
   - Pour 24 : la décomposition de 24 est $24 = 2^3 \times 3$. Or la décomposition de 540 ne contient que 2^2 (seulement deux facteurs 2). Il manque un 2, donc **540 n'est pas divisible par 24**.

Exemple résolu 2 — Algorithme d'Euclide sur de grands nombres

Détermine le PGCD des nombres 1 575 et 420 par l'algorithme d'Euclide.

Solution rédigée : On applique les divisions euclidiennes successives :

- $1\,575 = 420 \times 3 + 315$ (le reste est $315 \neq 0$)
- $420 = 315 \times 1 + 105$ (le reste est $105 \neq 0$)
- $315 = 105 \times 3 + 0$ (le reste est 0)

Le dernier reste non nul dans la suite des divisions est **105**. Conclusion : $\mathbf{PGCD(1\,575;420) = 105}$.

Exemple résolu 3 — Comparaison soustractions vs divisions

Calcule $\mathrm{PGCD}(252;105)$: 1. Par l'algorithme des soustractions successives. 2. Par l'algorithme d'Euclide.

Solution rédigée : 1. **Soustractions successives :**

- $252 - 105 = 147$
- $147 - 105 = 42$
- $105 - 42 = 63$

- $63 - 42 = 21$
- $42 - 21 = 21$
- $21 - 21 = 0 \Longrightarrow \mathbf{PGCD = 21}$. (5 soustractions)

2. **Algorithme d'Euclide :**
   - $252 = 105 \times 2 + 42$
   - $105 = 42 \times 2 + 21$
   - $42 = 21 \times 2 + 0 \Longrightarrow \mathbf{PGCD = 21}$. (2 divisions)

On constate que l'algorithme d'Euclide est plus rapide et économique !

Exemple résolu 4 — Le problème de la kermesse

Pour la kermesse de l'école, les organisateurs disposent de 280 bracelets fluorescents et de 448 autocollants collectors. Ils veulent préparer des sachets surprises tous identiques, contenant chacun le même nombre de bracelets et le même nombre d'autocollants, en utilisant tout le matériel. 1. Combien de sachets au maximum peuvent-ils préparer ? 2. Quelle sera alors la composition de chaque sachet ?

Solution rédigée : 1. Soit N le nombre de sachets. Pour que tout soit utilisé sans reste et équitablement, N doit être un diviseur de 280 et un diviseur de 448. Pour que le nombre de sachets soit maximal, N doit être le **Plus Grand Commun Diviseur** de 448 et 280 : $N = \mathrm{PGCD}(448; 280)$. Appliquons l'algorithme d'Euclide :

- $448 = 280 \times 1 + 168$
- $280 = 168 \times 1 + 112$
- $168 = 112 \times 1 + 56$
- $112 = 56 \times 2 + 0$ Le dernier reste non nul est 56, donc $\mathrm{PGCD}(448; 280) = 56$. On peut donc préparer au maximum **56 sachets identiques**.

2. Composition de chaque sachet :
   - Nombre de bracelets : $280 \div 56 = \mathbf{5\ \ bracelets}$.
   - Nombre d'autocollants : $448 \div 56 = \mathbf{8\ \ autocollants}$.

Exemple résolu 5 — Fraction irréductible et somme

On considère la fraction $A = \frac{1\,575}{420}$. 1. Rends la fraction A irréductible. 2. Calcule la somme $S = \frac{1\,575}{420} + \frac{1}{4}$ sous la forme d'une fraction irréductible.

Solution rédigée : 1. D'après l'Exemple résolu 2, $\mathrm{PGCD}(1\,575; 420) = 105$. On simplifie en divisant en haut et en bas par 105 :

$$A = \frac{1\,575 \div 105}{420 \div 105} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{4}}.$$

2. Pour calculer la somme, on remplace la grande fraction par sa forme irréductible simplifiée :

$$S = \frac{15}{4} + \frac{1}{4} = \frac{15 + 1}{4} = \frac{16}{4} = \mathbf{4}.$$

Le calcul devient immédiat et d'une simplicité enfantine !

Ce qu'il faut retenir

1. **Vocabulaire fondamental :**
   - $a = b \times k \Leftrightarrow a$ est un multiple de $b \Leftrightarrow b$ est un diviseur de a.
   - **Nombre premier** : exactement 2 diviseurs distincts (1 et lui-même). 0 et 1 ne sont PAS premiers. Le seul premier pair est 2.
2. **Théorème fondamental de l'arithmétique :**

- Tout entier supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers ($N = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \ldots$).

3. **Le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) :**
   - C'est le plus grand entier qui divise simultanément les deux nombres.
   - Deux nombres sont **premiers entre eux** si leur $\mathrm{PGCD} = 1$.
   - **Méthode par décomposition** : produit des facteurs premiers communs affectés du plus petit exposant.
   - **Algorithme d'Euclide** : on enchaîne les divisions euclidiennes $a = b \times q + r$. Le PGCD est le **dernier reste non nul**.
4. **Applications pratiques :**
   - **Fractions irréductibles** : diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD.
   - **Découpages et lots** : le PGCD donne la dimension maximale des carreaux ou le nombre maximal de lots sans aucun reste.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 29.1 Parmi les nombres suivants, repère ceux qui sont des nombres premiers :

$$1 \quad ; \quad 2 \quad ; \quad 9 \quad ; \quad 13 \quad ; \quad 15 \quad ; \quad 21 \quad ; \quad 29 \quad ; \quad 31 \quad ; \quad 51 \quad ; \quad 91$$

Pour ceux qui ne le sont pas, justifie en donnant un diviseur autre que 1 et eux-mêmes.

Exercice 29.2 En utilisant les critères de divisibilité, indique si le nombre $3\,420$ est divisible par 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Justifie pour chaque critère.

Exercice 29.3 Décompose en produit de facteurs premiers les nombres entiers suivants (en écrivant le résultat avec des puissances si nécessaire) : a) 84 b) 126 c) 200 d) 525

Exercice 29.4 À partir des décompositions $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$: 1. Quels sont les facteurs premiers communs à 84 et 126 ? 2. Calcule $\mathrm{PGCD}(84\,;126)$. 3. Rends la fraction $\frac{84}{126}$ irréductible.

Exercice 29.5 Utilise l'algorithme des soustractions successives pour déterminer $\mathrm{PGCD}(65\,;39)$.

Niveau : Réflexion et situations concrètes

Exercice 29.6 (Algorithme d'Euclide). 1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, calcule $\mathrm{PGCD}(756\,;441)$ en présentant clairement chaque division euclidienne. 2. Les nombres 756 et 441 sont-ils premiers entre eux ? Pourquoi ? 3. Rends la fraction $\frac{441}{756}$ irréductible en une seule étape.

Exercice 29.7 (Le carrelage de la terrasse). Un maçon doit poser du carrelage sur une terrasse rectangulaire mesurant 5,40 m de long sur 3,00 m de large. Il veut utiliser des dalles carrées identiques les plus grandes possibles, sans aucune découpe. 1. Convertis les dimensions de la terrasse en centimètres. 2. Quelle doit être la longueur du côté d'une dalle ? 3. Combien de dalles le maçon devra-t-il poser en tout ?

Exercice 29.8 (Le fleuriste équitable). Un fleuriste reçoit une livraison de 168 roses rouges et de 216 œillets blancs. Il souhaite composer des bouquets tous identiques contenant chacun le même nombre de roses et le même nombre d'œillets, en utilisant toutes les fleurs. 1. Quel est le nombre maximal de bouquets qu'il peut réaliser ? 2. Combien de roses et combien d'œillets chaque bouquet comportera-t-il ?

Exercice 29.9 (Le piège du faux nombre premier). Un élève affirme : *« Tous les nombres impairs supérieurs à 1 sont des nombres premiers, sauf s'ils se terminent par 5 ! »* Montre que son affirmation est fausse en donnant au moins trois contre-exemples bien choisis parmi les nombres inférieurs à 100.

Exercice 29.10 (La course sur circuit et les multiples). Deux pilotes de karting s'élancent en même temps sur une piste circulaire depuis la ligne de départ.

- Le premier pilote effectue un tour en 36 secondes.
- Le second pilote effectue un tour en 48 secondes.

1. Décompose 36 et 48 en produits de facteurs premiers.
2. Au bout de combien de temps les deux pilotes franchiront-ils à nouveau la ligne de départ ensemble pour la première fois ?
3. Combien de tours chacun aura-t-il alors parcourus ?

Exercice 29.11 (Calculs avec fractions irréductibles). On donne l'expression suivante :

$$B = \frac{588}{882} - \frac{1}{6}$$

1. Calcule $\text{PGCD}(882; 588)$ par l'algorithme d'Euclide. 2. Déduis-en la forme irréductible de la fraction $\frac{588}{882}$. 3. Calcule alors l'expression B et donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Niveau : Défis et approfondissements

Exercice 29.12 (Les clôtures et les piquets du fermier). Un agriculteur possède un champ triangulaire dont les trois côtés mesurent 120 mètres, 144 mètres et 168 mètres. Il souhaite planter des piquets de clôture tout autour de son champ, à intervalles réguliers et constants, avec un piquet obligatoirement planté à chaque sommet du triangle. Pour faire des économies, il souhaite utiliser **le moins de piquets possible**. 1. Quelle doit être la distance entre deux piquets consécutifs ? 2. Combien de piquets devra-t-il planter au total le long de la clôture ?

Exercice 29.13 (La preuve du roi Euclide : l'infinité des nombres premiers). Euclide a démontré que l'ensemble des nombres premiers est infini par un raisonnement par l'absurde remarquable. Supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers : notons-les tous $p_1, p_2, p_3, ..., p_n$. Considérons le nombre gigantesque N obtenu en multipliant tous ces nombres premiers entre eux et en ajoutant 1 :

$$N = (p_1 \times p_2 \times p_3 \times ... \times p_n) + 1$$

1. Si l'on divise N par l'un quelconque des nombres premiers $p_1, p_2, ..., p_n$, quel est le reste de la division euclidienne ? 2. Le nombre N peut-il être divisible par l'un de ces nombres premiers ? 3. Conclus : pourquoi est-ce contradictoire, et pourquoi les nombres premiers sont-ils obligatoirement en nombre infini ?

Exercice 29.14 (Le secret des engrenages). Une roue dentée A de 54 dents entraîne une roue dentée B de 42 dents. Deux dents particulières, une sur chaque roue, sont en contact au point de départ. 1. Calcule $\text{PGCD}(54; 42)$. 2. Après combien de dents engrenées ces deux mêmes dents se retrouveront-elles en contact pour la première fois ? 3. Combien de tours complets chaque roue aura-t-elle alors accomplis ?

Exercice 29.15 (Le pavage de cubes dans un parallélépipède 3D). Un sculpteur dispose d'un bloc de marbre rectangulaire plein de 90 cm de longueur, 75 cm de largeur et 60 cm de hauteur. Il veut découper ce bloc en petits cubes identiques, les plus grands possibles, sans perdre aucun morceau de marbre. 1. Décompose 90, 75 et 60 en produits de facteurs premiers. 2. Quel est le Plus Grand Commun Diviseur de ces trois nombres ? 3. Quelle sera l'arête de chaque petit cube ? 4. Combien de petits cubes le sculpteur obtiendra-t-il au total ?

Solutions

Solutions des exercices

- **Solution 29.1 :**
  - Nombres premiers : **2, 13, 29, 31**.
  - Non premiers :
    - 1 n'est pas premier (un seul diviseur).
    - 9 est divisible par 3 ($9 = 3 \times 3$).
    - 15 est divisible par 3 et 5 ($15 = 3 \times 5$).
    - 21 est divisible par 3 et 7 ($21 = 3 \times 7$).
    - 51 est divisible par 3 ($5 + 1 = 6$; $51 = 3 \times 17$).
    - 91 est divisible par 7 ($91 = 7 \times 13$).

- **Solution 29.2 :** Pour 3 420 :
  - Par 2 : oui, il se termine par 0 (pair).
  - Par 3 : oui, $3+4+2+0=9$, multiple de 3.
  - Par 4 : oui, 20 est divisible par 4.
  - Par 5 : oui, se termine par 0.
  - Par 9 : oui, $3+4+2+0=9$, multiple de 9.
  - Par 10 : oui, se termine par 0.
- **Solution 29.3 :**
  a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.
  b) $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.
  c) $200 = 2^3 \times 5^2$.
  d) $525 = 3 \times 5^2 \times 7$.
- **Solution 29.4 :**
  1. Facteurs premiers communs : 2, 3 et 7.
  2. $\mathrm{PGCD}(84;126) = 2^1 \times 3^1 \times 7^1 = \mathbf{42}$.
  3. $\frac{84}{126} = \frac{84\div 42}{126\div 42} = \mathbf{\frac{2}{3}}$.
- **Solution 29.5 :** Soustractions successives : $65-39=26 \Longrightarrow 39-26=13 \Longrightarrow 26-13=13 \Longrightarrow 13-13=0$. Donc $\mathrm{PGCD}(65;39) = \mathbf{13}$.

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 29.6 (Algorithme d'Euclide) :**
  1. Divisions successives :
     - $756 = 441 \times 1 + 315$
     - $441 = 315 \times 1 + 126$
     - $315 = 126 \times 2 + 63$
     - $126 = 63 \times 2 + 0$ Le dernier reste non nul est 63, donc $\mathbf{PGCD(756;441) = 63}$.
  2. Ils ne sont pas premiers entre eux car leur PGCD est $63 \neq 1$.
  3. Fraction irréductible : $\frac{441}{756} = \frac{441\div 63}{756\div 63} = \mathbf{\frac{7}{12}}$.
- **Solution 29.7 (Le carrelage de la terrasse) :**
  1. Dimensions : $L = 5,40\ \text{m} = 540\ \text{cm}$, $\ell = 3,00\ \text{m} = 300\ \text{cm}$.
  2. La longueur du côté d'une dalle doit être un diviseur commun à 540 et 300, et le plus grand possible : c'est $\mathrm{PGCD}(540;300)$. Par Euclide :
     - $540 = 300 \times 1 + 240$
     - $300 = 240 \times 1 + 60$
     - $240 = 60 \times 4 + 0$ Le PGCD est 60. Les dalles doivent mesurer $\mathbf{60\ \text{cm} \times 60\ \text{cm}}$.
  3. Nombre de dalles :
     - Longueur : $540 \div 60 = 9$ dalles.
     - Largeur : $300 \div 60 = 5$ dalles.
     - Total : $9 \times 5 = \mathbf{45\ \text{dalles}}$.
- **Solution 29.8 (Le fleuriste) :**
  1. Le nombre maximal de bouquets est $\mathrm{PGCD}(216;168)$.
     - $216 = 168 \times 1 + 48$
     - $168 = 48 \times 3 + 24$
     - $48 = 24 \times 2 + 0$ $\mathrm{PGCD}(216;168) = 24$. Il peut faire au maximum **24 bouquets**.
  2. Composition :
     - Roses : $168 \div 24 = \mathbf{7\ \text{roses rouges}}$.

- Œillets : $216 \div 24 = \mathbf{9}$ $\mathbf{\text{œillets blancs}}$.

- **Solution 29.9 (Le faux nombre premier) :** Trois contre-exemples parmi les nombres impairs ne se terminant pas par 5 :
  - 9 ($9 = 3 \times 3$, impair, non premier) ;
  - 21 ($21 = 3 \times 7$) ;
  - 27 ($27 = 3 \times 9$) ;
  - 91 ($91 = 7 \times 13$, piège très célèbre !).
- **Solution 29.10 (La course sur circuit) :**
  1. $36 = 2^2 \times 3^2$ et $48 = 2^4 \times 3$.
  2. Le premier pilote passe sur la ligne aux temps multiples de 36 (36, 72, 108, 144…). Le second aux temps multiples de 48 (48, 96, 144…). Le premier moment commun est le Plus Petit Commun Multiple (PPCM), obtenu en prenant tous les facteurs premiers avec leur plus grand exposant :
  $$\text{PPCM}(36; 48) = 2^4 \times 3^2 = 16 \times 9 = \mathbf{144} \ \ \mathbf{\text{secondes}} = 2 \ \ \text{minutes et} \ \ 24 \ \ \text{secondes} \ .$$
  3. Nombre de tours :
     - Pilote 1 : $144 \div 36 = \mathbf{4}$ $\mathbf{\text{tours}}$.
     - Pilote 2 : $144 \div 48 = \mathbf{3}$ $\mathbf{\text{tours}}$.
- **Solution 29.11 (Calcul avec fraction irréductible) :**
  1. Algorithme d'Euclide pour 882 et 588 :
     - $882 = 588 \times 1 + 294$
     - $588 = 294 \times 2 + 0 \Longrightarrow \text{PGCD}(882; 588) = \mathbf{294}$.
  2. Forme irréductible : $\frac{588}{882} = \frac{588 \div 294}{882 \div 294} = \mathbf{\frac{2}{3}}$.
  3. Calcul de B :
  $$B = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{1}{2}}.$$

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 29.12 (Les piquets de clôture) :**
  1. Pour que l'espacement d soit constant et qu'il y ait un piquet à chaque sommet, d doit diviser les trois côtés 120, 144 et 168. Pour avoir le moins de piquets possible, d doit être le plus grand possible : c'est le PGCD des trois nombres.
     - $\text{PGCD}(120; 144)$: $144 = 120 \times 1 + 24$, et $120 = 24 \times 5 + 0 \Longrightarrow 24$.
     - Testons si 24 divise 168 : $168 = 24 \times 7 + 0$. Donc le PGCD des trois nombres est **24 mètres**. Les piquets seront espacés de 24 m.
  2. Le périmètre du champ est $120 + 144 + 168 = 432 \ \ \text{mètres}$. Puisque la clôture est un circuit fermé, le nombre total de piquets est :
  $$\frac{432}{24} = \mathbf{18} \ \ \mathbf{\text{piquets}} \ .$$
- **Solution 29.13 (La preuve d'Euclide) :**
  1. Par définition, $N = (p_1 \times p_2 \times ... \times p_n) + 1$. Le produit est un multiple exact de n'importe quel p_k. Donc la division de N par p_k donne un quotient entier et un reste égal à **1**.
  2. Comme le reste est 1 (et non 0), N n'est divisible par **aucun** des nombres premiers de la liste.
  3. Or, d'après le théorème fondamental de l'arithmétique, N (qui est plus grand que 1) possède au moins un diviseur premier. Ce diviseur premier ne fait donc pas partie de la liste $p_1, ..., p_n$. Cela contredit l'hypothèse de départ que la liste contenait *tous* les nombres premiers. L'hypothèse était donc fausse : il existe obligatoirement une **infinité de nombres premiers**.
- **Solution 29.14 (Les engrenages) :**
  1. Euclide : $54 = 42 \times 1 + 12 \Longrightarrow 42 = 12 \times 3 + 6 \Longrightarrow 12 = 6 \times 2 + 0$. Donc $\text{PGCD}(54; 42) = \mathbf{6}$.

2. Le contact initial se reproduit après un nombre de passages de dents multiple de 54 et de 42, c'est-à-dire au PPCM :
$$\text{PPCM}(54;42) = \frac{54 \times 42}{\text{PGCD}(54;42)} = \frac{2268}{6} = \mathbf{378 \ \ dents\ engrenées}\ .$$
3. Nombre de tours :
   - Roue A : $378 \div 54 = \mathbf{7 \ \ tours\ complets}$.
   - Roue B : $378 \div 42 = \mathbf{9 \ \ tours\ complets}$.

- **Solution 29.15 (Cubes 3D) :**
1. Décompositions :
   - $90 = 2 \times 3^2 \times 5$
   - $75 = 3 \times 5^2$
   - $60 = 2^2 \times 3 \times 5$
2. Facteurs communs aux trois nombres : 3 (exposant 1) et 5 (exposant 1). $\text{PGCD}(90;75;60) = 3 \times 5 = \mathbf{15}$.
3. L'arête maximale de chaque petit cube est de $\mathbf{15 \ \ cm}$.
4. Nombre de cubes :
   - En longueur : $90 \div 15 = 6$
   - En largeur : $75 \div 15 = 5$
   - En hauteur : $60 \div 15 = 4$ Total : $6 \times 5 \times 4 = \mathbf{120 \ \ cubes}$.

La question qui ouvre la suite

Avec l'arithmétique d'Euclide, tout est réglé avec une précision absolue : chaque brique trouve sa place, chaque part tombe pile, chaque division est certaine. Mais notre monde réel n'est pas fait que de coffres scellés et de dalles taillées au millimètre.

Que se passe-t-il lorsque la brume de l'avenir se lève, lorsqu'on jette un dé sur le tapis d'une auberge, ou lorsqu'un chef caravanier doit choisir entre deux routes incertaines ? Peut-on calculer rationnellement quand on ne sait pas ce qui va arriver ? Rendez-vous au cœur du désert et dans les salons du XVIIe siècle : nous allons apprendre à dompter la **roulette du destin**.

CHAPITRE 30 : La Roulette du Destin et la Survie du Chasseur

> « L'ignorant accuse le mauvais sort, consulte les devins ou tremble devant l'orage quand le danger approche. Le mathématicien regarde les sentiers de l'avenir, calcule la fraction de chance, et prend la décision qui sauve sa caravane. Le hasard n'est pas un monstre aveugle : c'est un arbre dont on peut compter les branches. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment transformer la brume de l'incertitude en un **nombre précis entre 0 et 1** (la probabilité).
- Le vocabulaire officiel qui structure le hasard : **expérience aléatoire**, **issue**, **événement**, **événement certain, impossible et contraire**.
- Pourquoi la formule $P(E) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$ ne marche qu'en cas d'**équiprobabilité**, et le piège monumental des deux dés.
- Comment explorer le futur à deux étapes grâce à l'**arbre de probabilités** et au **tableau à double entrée**.
- La différence cruciale entre un tirage **avec remise** et un tirage **sans remise**.
- Comment le hasard réel obéit à la loi des grands nombres : la **stabilisation des fréquences** et la simulation sur ordinateur.

---

1. Le problème : la caravane et la forêt des deux sentiers

Le crépuscule tombe sur la route de la soie. Une caravane de dix chameaux chargés de balles d'épices précieuses et de soieries s'arrête à l'orée d'une immense forêt sombre et brumeuse. Pour atteindre l'oasis où se tient le grand marché annuel, le chef caravanier doit choisir entre deux routes :

Fig. 78. – Le choix du sentier : arbre pondéré des probabilités

- **Le Sentier des Marais (Chemin A) :** C'est un chemin plat, facile pour les pattes des bêtes. Mais la région est couverte de fondrières de boue traîtresses. Les registres des marchands indiquent que sur 100 caravanes ayant emprunté ce chemin cette année, **10 se sont enlisées et ont tout perdu**, tandis que 90 sont arrivées saines et sauves.
- **Le Sentier des Gorges (Chemin B) :** C'est un défilé rocheux escarpé, deux fois plus court et plus rapide. Mais des brigands armés rôdent dans les cavernes : sur 100 caravanes, **40 ont été pillées**, et 60 ont réussi à franchir le défilé indemnes.

Le jeune chamelier s'écrie : *« Prenons le chemin des gorges ! Nous arriverons demain à l'aube pour vendre au meilleur prix ! Avec un peu de chance, les brigands dormiront ! »*

Le vieux chef secoue la tête : *« La chance n'est pas une prière qu'on lance au ciel. La chance est une fraction de matière. Celui qui ne sait pas peser le risque marche les yeux fermés vers le précipice ! »*

Pour la première fois dans l'histoire des mathématiques, nous n'allons plus seulement mesurer ce qui est sous nos yeux (une longueur, un poids, un nombre de carreaux), mais **ce qui n'est pas encore arrivé** ! Nous entrons dans le royaume des **Probabilités**.

---

2. Le vocabulaire officiel des probabilités

Pour parler du hasard avec la rigueur d'un géomètre, les mathématiciens ont forgé un vocabulaire très précis. Chaque mot a une définition stricte qu'il faut maîtriser.

2.1 Expérience aléatoire et issue

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Expérience aléatoire.** Une expérience est dite **aléatoire** si : 1. On connaît à l'avance tous les résultats possibles ; 2. Le résultat final dépend uniquement du hasard et est **impossible à prévoir avec certitude**.

Exemples : - Lancer une pièce de monnaie équilibrée et observer la face supérieure est une expérience aléatoire. - Lâcher une pomme pour voir si elle tombe vers le sol n'est **pas** une expérience aléatoire (la gravité garantit qu'elle tombera toujours).

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Issue.** Une **issue** (ou événement élémentaire) est l'un des résultats possibles d'une expérience aléatoire. L'ensemble de toutes les issues s'appelle l'**univers** (souvent noté avec la lettre grecque Ω, « oméga »).

Exemple du dé à 6 faces : Les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'univers est $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2.2 Événements : impossible, certain, contraire

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Événement.** Un **événement** est un ensemble constitué de zéro, une ou plusieurs issues. On dit qu'un événement est **réalisé** si l'issue obtenue lors de l'expérience fait partie de cet événement.

Prenons le lancer d'un dé cubique ordinaire :

- L'événement A : « Obtenir un nombre pair » est constitué des issues $\{2, 4, 6\}$. Si le dé tombe sur 4, l'événement A est réalisé.
- **Événement impossible :** un événement qui ne contient aucune issue et ne peut jamais se produire. Sa probabilité est égale à **0**. *Exemple :* « Obtenir un 7 » avec un dé à 6 faces.
- **Événement certain :** un événement qui contient toutes les issues possibles et se produit toujours. Sa probabilité est égale à **1** (ou $100\,\%$) ! *Exemple :* « Obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ».
- **Événement contraire :** l'événement contraire d'un événement A, noté $\bar{A}$ (se lit **« A barre »** ou « non A »), est l'événement qui est réalisé **exactement quand A n'est pas réalisé**.

📐 **Propriété capitale de l'événement contraire —**

Pour tout événement A :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \qquad \text{ou encore} \qquad P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Exemple : Si la probabilité qu'il pleuve demain est $P(\text{Pluie}) = 0,3$ (soit $30\,\%$), alors la probabilité qu'il ne pleuve pas est :

$$P(\text{Pas de pluie}) = 1 - 0,3 = 0,7 \quad (\text{soit } \ 70\,\%).$$

---

3. Calculer une probabilité en situation d'équiprobabilité

3.1 Qu'est-ce que l'équiprobabilité ?

On dit qu'une situation est d'**équiprobabilité** lorsque **toutes les issues possibles ont exactement la même chance d'apparaître**. Dans les exercices, cette situation est signalée par des expressions clés :

- « Un dé cubique **équilibré** » (ou « non pipé ») ;
- « Une pièce de monnaie **parfaitement équilibrée** » ;
- « Des boules **indiscernables au toucher** » dans une urne ;
- « On tire une carte **au hasard** dans un jeu bien mélangé ».

3.2 La formule reine

> **📐 Règle de Laplace — Probabilité sous équiprobabilité.**
>
> Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement E est égale au quotient du nombre d'issues favorables par le nombre total d'issues possibles :
>
> $$P(E) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } \ E}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

3.3 Les trois visages d'une probabilité

Une probabilité est un nombre toujours compris entre 0 et 1 :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

On peut l'écrire sous trois formes équivalentes : 1. En **fraction** (valeur exacte) : $\frac{1}{4}$ 2. En **nombre décimal** : $0,25$ 3. En **pourcentage** : $25\,\%$

> **⚠ Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège !** Une probabilité ne peut **JAMAIS** être négative, ni supérieure à 1 (ou 100 %) ! Si tu trouves $P = 1,25$ ou $P = -0,3$, ton calcul comporte obligatoirement une erreur. De plus, la somme des probabilités de toutes les issues élémentaires vaut **toujours 1**.

Revenons à notre caravane :

- Pour le Sentier des Marais : $P(\text{Péril}) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,10 = \mathbf{10\,\%}$.
- Pour le Sentier des Gorges : $P(\text{Péril}) = \frac{40}{100} = \frac{4}{10} = 0,40 = \mathbf{40\,\%}$.

Le risque dans les gorges est **quatre fois supérieur** ! Le chef sage choisit le marais, et la caravane arrive intacte.

---

4. Expériences à deux épreuves : Arbres et Tableaux

Quand une expérience aléatoire se déroule en plusieurs étapes successives (par exemple : lancer deux pièces de suite, lancer deux dés, ou tirer deux billes dans un sac), il devient difficile de deviner toutes les issues de tête. Deux outils graphiques permettent d'y voir clair.

4.1 L'outil n°1 : Le tableau à double entrée (l'exemple roi des deux dés)

Si l'on lance deux dés à 6 faces et que l'on fait la somme des deux chiffres, combien y a-t-il de résultats possibles ? Les sommes vont de $1 + 1 = 2$ jusqu'à $6 + 6 = 12$. Il y a donc 11 sommes différentes possibles. Certains élèves pensent alors : *« La probabilité d'obtenir 7 est de 1 sur 11 ! »* **C'est une erreur colossale !** Car toutes les sommes ne sont pas équiprobables !

Dressons le tableau de toutes les combinaisons possibles ($6 \times 6 = \mathbf{36}$ **cases équiprobables**) :

Dé 1 Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	**[7]**
2	3	4	5	6	**[7]**	8
3	4	5	6	**[7]**	8	9
4	5	6	**[7]**	8	9	10
5	6	**[7]**	8	9	10	11
6	**[7]**	8	9	10	11	12

Regarde la grande diagonale des **7** :

- Pour obtenir la somme **2**, il n'y a qu'une seule case : $(1;1) \Longrightarrow P(2) = \frac{1}{36}$.
- Pour obtenir la somme **12**, une seule case : $(6;6) \Longrightarrow P(12) = \frac{1}{36}$.
- Mais pour obtenir la somme **7**, il y a **6 cases différentes** : $(1;6), (2;5), (3;4), (4;3), (5;2), (6;1)$!

$$P(\text{Somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx \mathbf{16,7\,\%}$$

La somme 7 est **six fois plus fréquente** que la somme 2 ! C'est la reine des dés.

4.2 L'outil n°2 : L'arbre pondéré de probabilités

L'arbre est le couteau suisse des probabilités. Chaque embranchement représente une épreuve.

> **Les trois lois sacrées de l'arbre de probabilités —**
>
> 1.
>
> **La somme des probabilités** portées sur les branches issues d'un même nœud est **toujours égale à 1**. 2. **Le long d'un chemin**, on **multiplie** les probabilités pour trouver la probabilité de l'issue finale (principe multiplicatif). 3. **La probabilité d'un événement** composé de plusieurs chemins est la **somme** des probabilités de ces chemins.

---

5. Tirages avec remise et tirages sans remise

C'est l'un des points les plus cruciaux du programme de 3e. Imagine une boîte contenant **3 boules rouges (R)** et **2 boules vertes (V)** (soit 5 boules au total). On tire successivement deux boules.

Cas 1 : Tirage AVEC remise

Après avoir noté la couleur de la première boule, on la **remet dans la boîte** et on mélange avant le deuxième tirage.

- Au premier tirage : $P(R) = \frac{3}{5}$ et $P(V) = \frac{2}{5}$.
- Au deuxième tirage : la boîte est redevenue **strictement identique** ! Les probabilités ne changent pas : $P(R) = \frac{3}{5}$ et $P(V) = \frac{2}{5}$.
- La probabilité d'obtenir deux rouges $(R;R)$ est :

$$P(R;R) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = 0,36 = \mathbf{36\,\%}.$$

Cas 2 : Tirage SANS remise

Après le premier tirage, on garde la boule en main : **on ne la remet pas** !

- Au premier tirage : $P(R) = \frac{3}{5}$.
- Pour le second tirage, il ne reste plus que **4 boules au total** dans la boîte !
  - Si la première boule était rouge, il ne reste plus que 2 boules rouges sur 4 : $P(2\text{e} \quad R) = \frac{2}{4}$.
  - La probabilité d'obtenir deux rouges $(R;R)$ est :

$$P(R;R) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,30 = \mathbf{30\,\%}.$$

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège !** Dans un tirage sans remise, **le dénominateur diminue de 1** au second tour, et le numérateur de la couleur tirée diminue aussi de 1 !

---

6. Du hasard théorique au monde réel : la loi des grands nombres

Quand tu lances une pièce équilibrée, la probabilité théorique d'avoir Pile est de $p = 0,5$. Est-ce que cela signifie que si tu lances la pièce 10 fois, tu obtiendras **exactement** 5 Piles et 5 Faces ? Non ! Tu pourrais très bien obtenir 7 Piles et 3 Faces (soit une fréquence de 70 % de Piles).
Mais que se passe-t-il si tu lances la pièce 100 fois, 1 000 fois, 100 000 fois ? Calculons la **fréquence observée** :

$$f = \frac{\text{Nombre de Piles observés}}{\text{Nombre total de lancers } \ N}$$

> 📐 **Phénomène de stabilisation des fréquences (Loi des grands nombres) —**
>
> Lorsque l'on répète une expérience aléatoire un **très grand nombre de fois**, la fréquence observée d'un événement se rapproche et se stabilise autour de sa **probabilité théorique**.

C'est ce principe qui permet aux compagnies d'assurance d'évaluer le prix de leurs contrats, aux météorologues de prévoir les tempêtes et aux casinos d'être certains de ne jamais perdre d'argent sur l'ensemble de l'année !

> **Découverte & Histoire**
>
> 🔍 **L'histoire vraie — Les lettres de Pascal et Fermat (1654)**
> En 1654, un joueur parisien, le **Chevalier de Méré**, soumet à **Blaise Pascal** une énigme qui enflammait les tavernes : « le problème des partis ». Deux joueurs jouent à pile ou face pour une cagnotte de 64 pièces d'or. Le premier à 3 victoires gagne tout. Mais la partie est brutalement interrompue par un incendie alors que le joueur A mène 2 à 1 ! Comment partager la bourse en toute justice ? Pascal échange des lettres avec le génial magistrat de Toulouse, **Pierre de Fermat**. Au lieu de regarder le passé, ils dessinent l'arbre de tous les avenirs possibles : sur les 4 fins de partie possibles, le joueur A en gagnait 3, et le joueur B seulement 1. La justice divine exigeait donc de donner $\frac{3}{4}$ du magot au joueur A (48 pièces) et $\frac{1}{4}$ au joueur B (16 pièces). Les probabilités modernes étaient nées !

---

7. Exemples résolus détaillés pas à pas

Exemple résolu 1 — Tirage dans un jeu de cartes (Équiprobabilité et événement contraire)

On tire au hasard une carte dans un jeu bien mélangé de 32 cartes (qui contient 4 couleurs : Cœur, Carreau, Trèfle, Pique, avec 8 cartes par couleur : 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As). 1. Quelle est la probabilité de tirer un As ? 2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge (Cœur ou Carreau) ? 3. Quelle est la probabilité de tirer une carte qui n'est **pas** un Trèfle ?
Solution rédigée : Puisque le jeu est bien mélangé, il y a équiprobabilité entre les 32 cartes. 1. Le jeu contient 4 As (un de chaque couleur).

$$P(\text{As}) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} = \mathbf{0,125} \quad (12,5\,\%).$$

2. Il y a 8 cœurs et 8 carreaux, soit $8 + 8 = 16$ cartes rouges sur 32.

$$P(\text{Rouge}) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2} = \mathbf{0,5} \quad (50\,\%).$$

3. *Méthode par l'événement contraire :* L'événement T est « Tirer un Trèfle ». Il y a 8 trèfles, donc $P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. L'événement « Ne pas tirer un Trèfle » est l'événement contraire $\bar{T}$:

$$P(\bar{T}) = 1 - P(T) = 1 - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{4} = 0,75} \quad (75\,\%).$$

Exemple résolu 2 — Expérience à deux épreuves successives (Le trousseau de clés)

Un trousseau comporte 4 clés en apparence identiques, mais **une seule** ouvre la porte du garage. Un automobiliste étourdi essaie les clés au hasard, dans le noir. Dès qu'une clé ne marche pas, il l'écarte pour ne pas la retester (tirage sans remise). Quelle est la probabilité qu'il ouvre la porte au deuxième essai exactement ?

Solution rédigée : Pour ouvrir au deuxième essai, il faut impérativement deux événements consécutifs :

- Échec au 1er essai (E_1) ;
- Réussite au 2e essai (R_2).

Construisons les branches correspondantes : 1. Au 1er essai : il y a 3 mauvaises clés sur 4 clés au total :

$$P(E_1) = \frac{3}{4}$$

2. Au 2e essai : la mauvaise clé a été écartée. Il ne reste plus que 3 clés au total, dont 1 seule bonne clé :

$$P(R_2 \ \text{ sachant } \ E_1) = \frac{1}{3}$$

3. D'après la règle de multiplication le long d'un chemin :

$$P(\text{Succès au 2e essai}) = P(E_1) \times P(R_2) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \mathbf{\frac{1}{4} = 0,25}.$$

Chaque essai a rigoureusement $\frac{1}{4}$ de chance de succès !

Exemple résolu 3 — Tirage de billes avec et sans remise

Un sac contient 2 billes bleues et 3 billes jaunes. On tire au hasard deux billes successivement. Quelle est la probabilité de tirer **deux billes de couleurs différentes** : 1. Dans le cas d'un tirage **avec remise** ? 2. Dans le cas d'un tirage **sans remise** ?

Solution rédigée : Tirer deux billes de couleurs différentes correspond à deux chemins possibles : $(B;J)$ ou $(J;B)$. 1. **Cas avec remise :**

- $P(B;J) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$.
- $P(J;B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$. On additionne les deux chemins disjoints :

$$P(\text{Couleurs différentes}) = \frac{6}{25} + \frac{6}{25} = \frac{12}{25} = \mathbf{0,48} \quad (48\,\%).$$

2. **Cas sans remise :**

- Pour $(B;J)$: première bleue $(2/5)$, puis au deuxième tour il reste 4 billes dont 3 jaunes $(3/4)$:

$$P(B;J) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

- Pour $(J;B)$: première jaune $(3/5)$, puis il reste 4 billes dont 2 bleues $(2/4)$:

$$P(J;B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

On additionne les deux chemins :

$$P(\text{Couleurs différentes}) = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{10} = \mathbf{0,60} \quad (60\,\%).$$

Remarque : la probabilité change considérablement selon qu'il y a remise ou non !

Exemple résolu 4 — L'astuce magique du « Au moins un »

On lance trois fois de suite une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins une fois Pile** ?

Solution rédigée : « Obtenir au moins une fois Pile » signifie obtenir 1 Pile, 2 Piles ou 3 Piles. Calculer tous ces cas serait long. Regardons l'**événement contraire** : Le contraire de « avoir au moins un Pile » est **« n'avoir AUCUN Pile »**, c'est-à-dire obtenir trois Faces consécutives $(F; F; F)$.

- La probabilité d'avoir Face à un lancer est $\frac{1}{2}$.
- Les trois lancers étant indépendants :

$$P(\text{Aucun Pile}) = P(F; F; F) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

- Par la formule de l'événement contraire :

$$P(\text{Au moins un Pile}) = 1 - P(\text{Aucun Pile}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{8}} = \mathbf{0,875} \quad (87,5\,\%).$$

En passant par le contraire, le calcul a pris une seule ligne !

Exemple résolu 5 — Dé à deux couleurs et jeu d'argent

Un jeu de fête foraine propose de lancer un dé spécial à 6 faces : 4 faces sont peintes en Vert et 2 faces sont peintes en Rouge. Pour jouer, on paie 2 euros.

- Si le dé tombe sur Rouge, on gagne 5 euros (soit un bénéfice net de $+3$ €).
- Si le dé tombe sur Vert, on ne gagne rien (soit une perte nette de -2 €).

Le forain affirme : *« Venez tenter votre chance, vous pouvez gagner plus que votre mise ! »* Le jeu est-il favorable au joueur ?

Solution rédigée : Calculons les probabilités de gain :

- $P(\text{Rouge}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33,3\,\%$.
- $P(\text{Vert}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 66,7\,\%$.

Imaginons que l'on joue 300 parties :

- On va tomber environ $300 \times \frac{1}{3} = 100$ fois sur Rouge, rapportant $100 \times (+3\ \text{€}) = +300\ \text{€}$.
- On va tomber environ $300 \times \frac{2}{3} = 200$ fois sur Vert, coûtant $200 \times (-2\ \text{€}) = -400\ \text{€}$.

Bilan pour 300 parties : $300 - 400 = -100$ euros ! En moyenne par partie, le joueur perd environ $\frac{-100}{300} \approx -0,33$ euro. **Le jeu est défavorable au joueur** (et très avantageux pour le forain).

Ce qu'il faut retenir

1. **Vocabulaire :**
   - **Expérience aléatoire** : résultat dû au hasard, non prévisible.
   - **Issues** : résultats possibles élémentaires.
   - **Événement impossible** ($P = 0$) ; **Événement certain** ($P = 1$).
   - **Événement contraire** $\bar{A}$: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Formule magique pour « au moins un » : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$.
2. **Équiprobabilité :**

$$P(E) = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

   Toujours vérifier : $0 \leq P(E) \leq 1$. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.
3. **Expériences à deux étapes :**
   - **Tableau à double entrée** : parfait pour 2 dés, 2 roulettes simples (nombre de cases = produit des issues).

- **Arbre de probabilités** :
  - Somme des branches issues d'un même nœud = 1.
  - On **multiplie** les probabilités le long d'un chemin.
  - On **additionne** les probabilités des chemins qui réalisent l'événement.
- **Avec remise** : probabilités constantes.
- **Sans remise** : l'effectif diminue de 1 à chaque tirage.

4. **Loi des grands nombres :**
   - La **fréquence** observée lors d'un grand nombre d'expériences se rapproche et se stabilise autour de la **probabilité théorique**.

Exercices

Niveau : Application directe

Exercice 30.1 Une urne opaque contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 5 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. 1. Combien y a-t-il d'issues possibles ? Sont-elles équiprobables ? 2. Calcule la probabilité de tirer une boule rouge sous forme de fraction irréductible. 3. Calcule la probabilité de tirer une boule qui n'est pas verte.

Exercice 30.2 On lance un dé cubique équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Calcule la probabilité des événements suivants :

- A : « Obtenir un nombre impair ».
- B : « Obtenir un multiple de 3 ».
- C : « Obtenir un nombre strictement supérieur à 4 ».
- D : « Obtenir un nombre premier ».

Exercice 30.3 On fait tourner une roue de loterie partagée en 8 secteurs égaux : 3 secteurs sont peints en bleu, 4 en jaune et 1 en rouge. 1. Quelle est la probabilité de tomber sur le rouge ? 2. Quelle est la probabilité de ne pas tomber sur le bleu ? 3. Exprime ces probabilités en pourcentage.

Exercice 30.4 On lance une pièce équilibrée deux fois de suite. 1. Dresse l'arbre des possibles avec les probabilités sur chaque branche. 2. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois Face ? 3. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois Pile et une fois Face ?

Exercice 30.5 Dans un collège, $55\,\%$ des élèves sont demi-pensionnaires et les autres sont externes. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité que cet élève soit externe ?

Niveau : Réflexion et situations combinées

Exercice 30.6 (Le lancer de deux dés et le produit). On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on **multiplie** les deux chiffres obtenus. 1. À l'aide d'un tableau à double entrée de taille 6×6, détermine toutes les issues possibles du produit. 2. Quelle est la probabilité que le produit soit égal à 12 ? 3. Quelle est la probabilité que le produit soit un nombre pair ?

Exercice 30.7 (Chaussettes dans le tiroir dans le noir). Dans un tiroir se trouvent en vrac 6 chaussettes noires et 4 chaussettes bleues, totalement indiscernables au toucher. Le matin, avant le lever du jour, Lucas tire au hasard et successivement deux chaussettes **sans les remettre**. 1. Construis l'arbre pondéré représentant cette expérience aléatoire. 2. Quelle est la probabilité que Lucas tire deux chaussettes noires ? 3. Quelle est la probabilité que Lucas tire deux chaussettes de la même couleur (pour être bien assorti) ?

Exercice 30.8 (Le mot « PROBABILITÉ »). On écrit chacune des 11 lettres du mot « P R O B A B I L I T É » sur un carton identique, et on place les 11 cartons dans un sac. On tire un carton au hasard. 1. Quelle est la probabilité de tirer la lettre « B » ? 2. Quelle est la probabilité de tirer une voyelle (O, A, I, É) ? 3. Quelle est la probabilité de tirer une consonne ?

Exercice 30.9 (Contrôle qualité en usine). Une usine fabrique des composants électroniques. Sur une chaîne de production, $3\,\%$ des composants présentent un défaut de soudure et sont défectueux. Un technicien prélève au hasard

deux composants successifs (on assimile ce tirage à un tirage avec remise en raison du très grand nombre de pièces produites). 1. Quelle est la probabilité que les deux composants soient défectueux ? 2. Quelle est la probabilité qu'aucun des deux composants ne soit défectueux ? 3. Quelle est la probabilité qu'au moins l'un des deux composants présente un défaut ?

Exercice 30.10 (Le piège du joueur de casino). Un joueur est à la table de roulette. La bille s'est arrêtée sur une case Noire lors des 6 derniers tours consécutifs. Le joueur s'écrie : *« Le Rouge n'est pas sorti depuis 6 tours, il a maintenant une chance énorme de sortir, je mise tout sur le Rouge ! »* 1. Que penses-tu du raisonnement de ce joueur ? 2. Quelle est la probabilité réelle que la bille tombe sur le Rouge au 7e tour (sur une roulette européenne avec 18 cases rouges, 18 cases noires et 1 case verte zéro) ?

Exercice 30.11 (La cible de tir à l'arc). Une cible carrée de 40 cm de côté contient en son centre un disque rouge de 10 cm de rayon. Un archer débutant tire une flèche qui atteint à coup sûr la cible, mais en un point totalement aléatoire (probabilité proportionnelle à l'aire). 1. Calcule l'aire totale de la cible carrée. 2. Calcule l'aire exacte du disque rouge central. 3. Quelle est la probabilité que la flèche se plante dans le disque rouge ? (Arrondir au centième).

Niveau : Défis et approfondissements

Exercice 30.12 (Le problème historique du Chevalier de Méré). Le Chevalier de Méré avait remarqué au XVIIe siècle qu'il gagnait souvent en pariant sur l'apparition d'au moins un 6 en lançant 4 fois de suite un dé à 6 faces. 1. Quelle est la probabilité de NE PAS obtenir de 6 lors d'un lancer de dé ? 2. Quelle est la probabilité de n'obtenir aucun 6 en 4 lancers indépendants ? 3. Déduis-en la probabilité d'obtenir au moins un 6 en 4 lancers. Le Chevalier avait-il raison de parier sur cet événement ?

Exercice 30.13 (La simulation informatique des grands nombres). Un programme Python simule 10 000 lancers d'un dé cubique équilibré. Voici le script utilisé :

```
import random

lancers = 10000
faces_six = 0

for i in range(lancers):
  de = random.randint(1, 6)
  if de == 6:
    faces_six += 1

frequence = faces_six / lancers
print("Fréquence de 6 :", frequence)
```

1. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir la face 6 lors d'un lancer ? Donne sa valeur sous forme de fraction puis de nombre décimal arrondi à 0,001.
2. Quelle valeur approximative affichera le programme pour `frequence` ?
3. Pourquoi la valeur affichée ne sera-t-elle généralement pas exactement égale à $1/6$? Quel nom donne-t-on à ce phénomène ?

Exercice 30.14 (Le paradoxe des anniversaires dans la classe). Dans une classe de 3e de 25 élèves, le professeur affirme : *« Il y a plus d'une chance sur deux que deux élèves de cette classe soient nés le même jour de l'année ! »* (On suppose l'année non bissextile de 365 jours, et toutes les dates de naissance équiprobables). Pour vérifier son affirmation, on étudie l'événement contraire : « Tous les 25 élèves ont des dates de naissance toutes différentes ». 1. Le premier élève a sa date de naissance n'importe quel jour (probabilité $365/365$). Quelle est la probabilité que le second élève soit né un jour différent du premier ? 2. Quelle est la probabilité que le 3e élève soit né un jour différent des deux premiers ? 3. Le produit des 25 probabilités donne environ $0,43$. Calcule alors la probabilité qu'au moins deux élèves fêtent leur anniversaire le même jour. Le professeur avait-il raison ?

Exercice 30.15 (Le problème des partis revisité : Pascal et Fermat). Deux joueurs A et B misent chacun 50 pistoles dans une cagnotte (total : 100 pistoles). Le premier qui gagne 3 manches remporte tout. Le score actuel est de 2 à 0 en faveur du joueur A. La partie est brutalement interrompue. 1. Au maximum, combien de manches supplémentaires

auraient été nécessaires pour achever la partie ? 2. Trace l'arbre des manches restantes en supposant chaque manche équiprobable ($P = 1/2$). 3. Quelle est la probabilité que le joueur B réussisse à remonter et à gagner la partie ? 4. Comment les 100 pistoles doivent-elles être équitablement réparties entre A et B ?

Solutions

Solutions des exercices

- **Solution 30.1 :**
  1. Nombre total d'issues : $4 + 3 + 5 = 12$ boules. Comme elles sont indiscernables au toucher, elles sont équiprobables.
  2. $P(\text{Rouge}) = \frac{4}{12} = \mathbf{\frac{1}{3}}$.
  3. Il y a $4 + 5 = 9$ boules non vertes, ou $1 - \frac{3}{12} = \frac{9}{12} = \mathbf{\frac{3}{4}}$.
- **Solution 30.2 :**
  - $P(A) = \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{1}{2}}$ (issues : 1, 3, 5).
  - $P(B) = \frac{2}{6} = \mathbf{\frac{1}{3}}$ (issues : 3, 6).
  - $P(C) = \frac{2}{6} = \mathbf{\frac{1}{3}}$ (issues : 5, 6).
  - $P(D) = \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{1}{2}}$ (issues premières : 2, 3, 5 ; attention : 1 n'est pas premier !).
- **Solution 30.3 :**
  1. $P(\text{Rouge}) = \frac{1}{8} = \mathbf{0,125} = \mathbf{12,5\,\%}$.
  2. $P(\text{Non bleu}) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} = \mathbf{0,625} = \mathbf{62,5\,\%}$.
- **Solution 30.4 :**
  1. L'arbre a 4 branches terminales : $(P;P), (P;F), (F;P), (F;F)$, chacune avec probabilité $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
  2. $P(F;F) = \mathbf{\frac{1}{4}} = 0,25$.
  3. Chemins favorables : $(P;F)$ et $(F;P) \Longrightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{2}} = 0,5$.
- **Solution 30.5 :** $P(\text{Externe}) = 1 - 0,55 = \mathbf{0,45} = \mathbf{45\,\%}$.

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 30.6 (Produit de deux dés) :**
  1. Tableau des produits ($6 \times 6 = 36$ cases) :
     - Ligne 1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6
     - Ligne 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12
     - Ligne 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18
     - Ligne 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24
     - Ligne 5 : 5, 10, 15, 20, 25, 30
     - Ligne 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36
  2. Les cases donnant 12 sont : $(2;6), (3;4), (4;3), (6;2)$, soit 4 cases.
  $$P(\text{Produit} = 12) = \frac{4}{36} = \mathbf{\frac{1}{9}} \approx 0,111.$$
  3. Le produit est impair seulement si les DEUX dés sont impairs (3 choix $\times$ 3 choix = 9 cases). Toutes les autres cases sont paires : $36 - 9 = 27$ cases paires.
  $$P(\text{Produit pair}) = \frac{27}{36} = \mathbf{\frac{3}{4}} = \mathbf{0,75}.$$
- **Solution 30.7 (Chaussettes sans remise) :** Total de départ : $6 + 4 = 10$ chaussettes.
  1. Arbre :
     - 1er tirage : Noire $(6/10)$, Bleue $(4/10)$.
     - 2e tirage après Noire : Noire $(5/9)$, Bleue $(4/9)$.

- 2e tirage après Bleue : Noire $(6/9)$, Bleue $(3/9)$.

2. Deux noires : $P(N;N) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \mathbf{\frac{1}{3}} \approx 0,333$.
3. Même couleur : deux noires ou deux bleues. $P(B;B) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90}$.

$$P(\text{Même couleur}) = \frac{30}{90} + \frac{12}{90} = \frac{42}{90} = \mathbf{\frac{7}{15}} \approx \mathbf{0,467} \quad (46,7\,\%).$$

- **Solution 30.8 (Le mot PROBABILITÉ) :** Le mot compte 11 lettres : P (1), R (1), O (1), B (2), A (1), I (2), L (1), T (1), É (1).
  1. $P(\text{B}) = \mathbf{\frac{2}{11}}$.
  2. Voyelles : O, A, I, I, É $\Longrightarrow$ 5 voyelles. $P(\text{Voyelle}) = \mathbf{\frac{5}{11}}$.
  3. Consonnes : événement contraire $\Longrightarrow 1 - \frac{5}{11} = \mathbf{\frac{6}{11}}$.
- **Solution 30.9 (Contrôle qualité) :** Soit D l'événement « pièce défectueuse », $P(D) = 0,03$, et $P(\bar{D}) = 0,97$.
  1. Deux défectueux : $P(D;D) = 0,03 \times 0,03 = \mathbf{0,0009}$ (soit $0,09\,\%$, moins d'un sur mille).
  2. Aucun défectueux : $P(\bar{D};\bar{D}) = 0,97 \times 0,97 = \mathbf{0,9409} \approx \mathbf{94,1}\,\%$.
  3. Au moins un défectueux : contraire d'aucun défectueux :

$$P = 1 - 0,9409 = \mathbf{0,0591} \approx \mathbf{5,91}\,\%.$$

- **Solution 30.10 (Le piège du joueur) :**
  1. Le raisonnement du joueur est une **illusion classique** (appelée « sophisme du joueur »). La roulette n'a pas de mémoire : chaque tour est totalement indépendant des tours précédents. Les boules d'avant n'influencent aucunement la bille actuelle.
  2. Sur une roulette européenne de 37 cases (18 rouges, 18 noires, 1 zéro vert) :

$$P(\text{Rouge}) = \frac{18}{37} \approx \mathbf{0,4865} \quad (48,65\,\%).$$

  La probabilité est rigoureusement la même qu'au premier tour !
- **Solution 30.11 (La cible de tir à l'arc) :**
  1. Aire de la cible carrée : $\mathcal{A}_{\text{carré}} = 40 \times 40 = \mathbf{1\,600\ cm^2}$.
  2. Aire du disque rouge : $\mathcal{A}_{\text{disque}} = \pi \times R^2 = \pi \times 10^2 = \mathbf{100\pi\ cm^2} \approx 314,16\ \text{cm}^2$.
  3. Probabilité :

$$P = \frac{\mathcal{A}_{\text{disque}}}{\mathcal{A}_{\text{carré}}} = \frac{100\pi}{1\,600} = \frac{\pi}{16} \approx \mathbf{0,20} \quad (20\,\%).$$

Solutions détaillées des exercices

- **Solution 30.12 (Le Chevalier de Méré) :**
  1. Probabilité de ne pas faire 6 : $P(\text{non } 6) = \frac{5}{6}$.
  2. Lors de 4 lancers indépendants, probabilité de n'obtenir aucun 6 :

$$P(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1\,296} \approx 0,4823.$$

  3. Probabilité d'avoir au moins un 6 :

$$P(\text{au moins un } 6) = 1 - 0,4823 = \mathbf{0,5177} \approx \mathbf{51,8}\,\%.$$

  Puisque $51,8\,\% > 50\,\%$, la probabilité est strictement supérieure à la moitié : le Chevalier de Méré avait raison, sur le long terme il était gagnant !
- **Solution 30.13 (Simulation Python) :**
  1. La probabilité théorique est $p = \frac{1}{6} \approx \mathbf{0,167}$.
  2. Le programme affichera une valeur très proche de $0,167$ (par exemple $0,1658$ ou $0,1682$).
  3. En raison de la **fluctuation d'échantillonnage**, le hasard produit de légères variations autour de la valeur moyenne théorique. Ce n'est qu'à l'infini que l'égalité serait parfaite.
- **Solution 30.14 (Le paradoxe des anniversaires) :**
  1. Pour que le 2e élève ait une date différente du 1er : $\frac{364}{365}$.
  2. Pour le 3e élève : $\frac{363}{365}$.

3. La probabilité que tous les 25 élèves aient des dates différentes est le produit de ces 25 fractions : $P(\text{tous différents}) \approx 0,43$. Par conséquent, la probabilité qu'au moins deux élèves soient nés le même jour est :
$$P(\text{au moins deux identiques}) = 1 - 0,43 = \mathbf{0,57} \quad (\mathbf{57\,\%}).$$
Comme $57\,\% > 50\,\%$, le professeur avait totalement raison : il y a plus d'une chance sur deux !

- **Solution 30.15 (Pascal et Fermat à 2 contre 0) :**

1. Le joueur A n'a besoin que d'une seule victoire (il mène 2-0). Le joueur B doit enchaîner 3 victoires d'affilée pour gagner 3-2. Il suffit au maximum de **3 manches supplémentaires**.
2. Arbre des manches supplémentaires :
   - Manche 1 : soit A gagne $(1/2) \Longrightarrow$ A vainqueur (3-0).
   - Soit B gagne $(1/2)$:
     - Manche 2 : soit A gagne $(1/4) \Longrightarrow$ A vainqueur (3-1).
     - Soit B gagne $(1/4)$:
       - Manche 3 : soit A gagne $(1/8) \Longrightarrow$ A vainqueur (3-2).
       - Soit B gagne $(1/8) \Longrightarrow$ B vainqueur (3-3 final).
3. Le joueur B ne gagne que dans un seul scénario : gagner les 3 manches consécutives, de probabilité :
$$P(\text{B gagne}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{8}} = \mathbf{12,5\,\%}.$$
Le joueur A a donc $P(\text{A gagne}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{8}} = \mathbf{87,5\,\%}$.
4. Répartition équitable des 100 pistoles :
   - Pour A : $\frac{7}{8} \times 100 = \mathbf{87,5 \ \ pistoles}$.
   - Pour B : $\frac{1}{8} \times 100 = \mathbf{12,5 \ \ pistoles}$.

La question qui ouvre la suite

Ici s'achève notre grand voyage à travers le Collège. Tu es parti du mystère des lettres d'Al-Khwarizmi, tu as équilibré des balances, dompté le théorème de Pythagore, mesuré la Terre avec Ératosthène, percé les secrets d'Euclide et appris à prédire l'incertain avec Pascal et Fermat.

Mais une immense frontière se dresse devant toi. Jusqu'à présent, nos nombres étaient soit des entiers comptés sur les doigts, soit des longueurs figées dans des figures immobiles. Que se passe-t-il quand le vent souffle, quand un voilier lutte contre le courant en pleine tempête ? Comment représenter une force qui tire dans une direction précise avec une certaine intensité ? Bienvenue au Lycée : au Volume V, les nombres vont prendre des flèches, s'envoler dans le ciel et devenir des **vecteurs**.



VOLUME V — LE MOUVEMENT, L'ANGLE ET LE SPECTRE DE LA FORME

15 - 17 ans / 2nde - 1ère

L'analyse infinitésimale commence : dérivation, étude des variations, trigonométrie circulaire, suites et vecteurs dans l'espace.

Chapitres du Volume V :

Chapitre 31 : Le Tribunal de la Logique
Chapitre 32 : Le Voilier dans la Tempête et la Flèche Libre
Chapitre 33 : La Ligne de Mire
Chapitre 34 : Le Métier Jacquard et la Boîte à Fabriquer
Chapitre 35 : La Fontaine de Galilée et la Parabole
Chapitre 36 : Les Marches de l'Escalier et le Prêt de l'Usurier
Chapitre 37 : La Grande Roue et le Cercle qui s'Enroule
Chapitre 38 : Tirer la Corde et l'Ombre Efficace
Chapitre 39 : Le Skieur et la Planche sous la Semelle
Chapitre 40 : La Colonie de Bactéries
Chapitre 41 : Le Sondeur et l'Écart-Type
Chapitre 42 : Le Médecin, le Test et l'Arbre des Possibles

En regard : Les tensions vectorielles et la chaînette de la Toile d'Araignée (Araneus diadematus).

CHAPITRE 31 : Le Tribunal de la Logique

> « Au tribunal des mathématiques, aucune éloquence ne sauve un accusé. On n'y juge pas sur l'air sincère du témoin ni sur le nombre de ceux qui le croient : on y juge sur la preuve. Un seul contre-exemple suffit à condamner une affirmation, mais mille exemples ne suffisent pas à l'innocenter. »

Ce que tu vas découvrir

- Les grandes **familles de nombres** ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$), emboîtées comme des poupées russes, et pourquoi chacune a dû être inventée.
- Le langage des **ensembles** et des **intervalles** : $\in$, $\subset$, $\cup$, $\cap$, $[a\,;b[$, $+\infty$… et comment les lire à voix haute.
- La **valeur absolue**, qui mesure une distance sans se soucier du sens.
- Les règles du **tribunal** : implication, réciproque, contraposée, équivalence, quantificateurs « pour tout » et « il existe ».
- Les quatre grandes **armes de la preuve** : le raisonnement direct, le contre-exemple, la contraposée et le raisonnement par l'absurde — avec les démonstrations exigibles de Seconde ($\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel, le carré d'un impair est impair…).

---

1. Le problème : la formule qui mentait quarante fois de suite

Imagine une salle d'audience. Sur le banc des accusés, il n'y a pas un homme, mais une **phrase**. Elle a été apportée par un élève enthousiaste, qui la défend avec passion :

> *« Pour tout entier naturel n, le nombre $n^2 + n + 41$ est un nombre premier. »*

L'avocat de la défense appelle les témoins à la barre, un par un.

n	$n^2 + n + 41$	Premier ?
0	41	oui
1	43	oui
2	47	oui
3	53	oui
4	61	oui
5	71	oui
10	151	oui
20	461	oui
30	971	oui
39	1601	oui

Quarante témoins ($n = 0, 1, 2, \ldots, 39$) défilent, et **tous** confirment : le nombre obtenu est premier. Le public est convaincu. Le jury s'apprête à acquitter.

Alors le procureur se lève, très calme, et appelle un seul témoin : $n = 40$.

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \times 41.$$

1681 n'est **pas** premier. La phrase est **fausse**. Le verdict tombe, sans appel.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Ce polynôme a été remarqué par **Leonhard Euler** en 1772. Il produit des nombres premiers pour n allant de 0 à 39 — un record étonnant — mais il échoue à $n = 40$. On peut d'ailleurs le voir sans calcul : pour $n = 41$, $41^2 + 41 + 41 = 41 \times 43$, divisible par 41 de façon évidente.

Cette histoire résume tout ce chapitre :

1. **Vérifier des cas, même nombreux, ne prouve rien** pour une affirmation qui parle de *tous* les entiers.
2. **Un seul contre-exemple suffit** à démolir une affirmation universelle.
3. Pour *établir* une vérité générale, il faut un autre outil : la **démonstration**.

Au collège, tu as souvent « vu » qu'une propriété marchait sur des exemples. À partir de la Seconde, tu entres au tribunal. Il te faut un langage précis (de quels nombres parle-t-on ? que veut dire « si… alors » ?) et des méthodes de preuve. C'est ce que nous allons construire.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie —** Vers 350 av. J.-C., **Aristote** fonde la logique en étudiant les *syllogismes* : « Tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. » Plus de deux mille ans plus tard, en 1847 et 1854, l'Anglais **George Boole**, fils de cordonnier et largement autodidacte, transforme la logique en *calcul* : le vrai devient 1, le faux 0, « et » devient une multiplication. Sans le savoir, il vient d'écrire la grammaire de tous les ordinateurs du XX^{e} siècle.

---

2. Les familles de nombres : une histoire de crises

Chaque famille de nombres est née d'une **opération impossible**. Quand les outils existants ne suffisaient plus, il a fallu agrandir le monde des nombres.

2.1 Les entiers naturels $\mathbb{N}$: compter les cailloux

Les premiers nombres sont ceux du berger qui compte ses moutons : $0, 1, 2, 3, \ldots$

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** L'ensemble des **entiers naturels** est

$$\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;3\,;\ldots\}.$$

Notation expliquée. - Les **accolades** $\{\ \}$ servent à écrire un ensemble en donnant la liste de ses éléments. On lit « l'ensemble des éléments 0, 1, 2… ». En France, on sépare les éléments par des points-virgules, pour ne pas confondre avec la virgule décimale. - La lettre $\mathbb{N}$ vient de *naturale* (italien) : c'est **Giuseppe Peano** qui l'utilise en 1889. Le style « double barre » (on dit *gras de tableau*, ou *blackboard bold*) est né au tableau noir : il est difficile d'écrire une lettre en gras à la craie, alors on double un trait. Il s'est imposé dans les livres au milieu du XX^{e} siècle. - On lit « $\mathbb{N}$ » tout simplement « N ».

Dans $\mathbb{N}$, on peut toujours additionner et multiplier. Mais **soustraire** pose problème : $3 - 5$ n'a pas de réponse dans $\mathbb{N}$.

2.2 Les entiers relatifs $\mathbb{Z}$: les dettes du marchand

Souviens-toi de l'ardoise du marchand (chapitre 14) : pour noter une dette, il faut des nombres négatifs.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** L'ensemble des **entiers relatifs** est

$$\mathbb{Z} = \{\ldots\,;-3\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\,;3\,;\ldots\}.$$

La lettre $\mathbb{Z}$ vient de l'allemand ***Zahlen*** (« les nombres »), en usage chez Dedekind et les mathématiciens allemands du XIX^{e} siècle. Dans $\mathbb{Z}$, on soustrait toujours. Mais on ne **divise** pas toujours : $7 \div 2$ n'est pas un entier.

2.3 Les décimaux $\mathbb{D}$: les dixièmes de Stevin

Le marchand qui pèse des épices a besoin de $2,35$ kg. Simon Stevin (chapitre 11) a popularisé ces nombres à virgule.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition —** Un nombre est **décimal** s'il peut s'écrire sous la forme
>
> $$\frac{a}{10^n} \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{N}.$$
>
> L'ensemble des décimaux se note $\mathbb{D}$.

Autrement dit : un décimal est un nombre qui s'écrit avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule. Exemples : $2,35 = \frac{235}{10^2}$; $-0,007 = \frac{-7}{10^3}$; $12 = \frac{12}{10^0}$ (tout entier est décimal).

Le symbole $\in$ se lit « **appartient à** ». « $a \in \mathbb{Z}$ » signifie « a est un élément de $\mathbb{Z}$ », c'est-à-dire « a est un entier relatif ». Ce symbole est une version stylisée de la lettre grecque epsilon ε, initiale de ἐστί (*esti*, « est ») : c'est encore **Peano** qui l'introduit en 1889. Son contraire, $\notin$, se lit « n'appartient pas à ».

Tout semble aller pour le mieux… jusqu'au jour où l'on partage une galette en **trois**.

2.4 Les rationnels $\mathbb{Q}$: le partage en trois

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition —** Un nombre est **rationnel** s'il peut s'écrire sous la forme
>
> $$\frac{p}{q} \quad \text{avec} \quad p \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad q \in \mathbb{N}, q \neq 0.$$
>
> L'ensemble des rationnels se note $\mathbb{Q}$ (initiale de *quotient*, proposée par Peano en 1895).

Le mot « rationnel » vient du latin *ratio*, « rapport » : un rationnel est un **rapport** de deux entiers. Il n'a rien à voir avec le fait d'être « raisonnable »… même si l'histoire va jouer sur ce double sens.

La question naturelle : $\frac{1}{3}$ est rationnel, mais est-il décimal ? Ta calculatrice affiche $0,333333333$, ce qui *ressemble* à un décimal. Mais l'écran est trop petit pour être honnête. Voici le premier procès du chapitre.

> **✍ Démonstration (exigible) — $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.**
>
> Raisonnons **par l'absurde** : supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Il existerait alors un entier a et un entier naturel n tels que
>
> $$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}.$$
>
> En multipliant les deux membres par 3×10^n, on obtient
>
> $$10^n = 3a.$$
>
> Ainsi 10^n serait un multiple de 3. Or la somme des chiffres de 10^n (un « 1 » suivi de n zéros) vaut 1, qui n'est pas divisible par 3 ; d'après le critère de divisibilité par 3, 10^n n'est **pas** un multiple de 3.
>
> (Autre argument : $10^n = 2^n \times 5^n$; sa décomposition en facteurs premiers ne contient que des 2 et des 5, jamais de 3.)
>
> On aboutit à une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse : $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$. ■

Le petit carré noir ■ marque la fin d'une démonstration. Les Anciens écrivaient « **CQFD** » : « ce qu'il fallait démontrer » (en latin *QED, quod erat demonstrandum*).

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ est décimale si et seulement si son dénominateur q ne contient que des facteurs premiers 2 et 5. Ainsi $\frac{7}{40} = \frac{7}{2^3 \times 5} = 0,175$ est décimal, mais $\frac{1}{6} = \frac{1}{2 \times 3}$ ne l'est pas. Tous les rationnels ont une écriture décimale soit **finie**, soit **périodique** à partir d'un certain rang : $\frac{1}{7} = 0,\overline{142857}$ (la barre indique le bloc qui se répète indéfiniment).

2.5 Les réels $\mathbb{R}$: la diagonale qui brise la secte

Tu connais déjà ce drame (chapitre 19, *Le Secret interdit des Pythagoriciens*). La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$, d'après Pythagore : $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. Les Pythagoriciens croyaient que « tout est nombre », c'est-à-dire que toute longueur est un rapport d'entiers. La diagonale les a trahis. Nous allons maintenant rédiger la preuve avec la rigueur exigée au lycée. Nous avons d'abord besoin d'un petit lemme (un *lemme* est un résultat intermédiaire, une marche d'escalier vers le théorème).

✍️ Démonstration (exigible) — Le carré d'un nombre impair est impair.

Soit n un entier impair. Par définition, il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k$ est un entier, que l'on peut appeler k', on a $n^2 = 2k' + 1$: n^2 est impair. ■

De même, le carré d'un nombre pair $n = 2k$ est $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, pair.

📐 Conséquence (par contraposée) —

Si n^2 est pair, alors n est pair.

En effet, si n n'était pas pair, il serait impair, et son carré serait impair d'après le lemme. Nous reviendrons en détail sur ce type de raisonnement (la contraposée) au paragraphe 6.

✍️ Démonstration (exigible) — $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Raisonnons par l'absurde. Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. On peut alors l'écrire sous forme d'une **fraction irréductible** :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^*, p \text{ et } q \text{ sans diviseur commun autre que } 1.$$

En élevant au carré : $2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc

$$p^2 = 2q^2.$$

1. p^2 est donc pair. D'après la conséquence ci-dessus, p est pair : il existe un entier k tel que $p = 2k$. 2. En remplaçant : $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, soit $q^2 = 2k^2$. Donc q^2 est pair, et q est pair. 3. Ainsi p et q sont tous deux pairs : ils ont 2 comme diviseur commun. Cela **contredit** le fait que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible.

L'hypothèse « $\sqrt{2}$ est rationnel » mène à une absurdité : elle est fausse. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

La notation $\mathbb{N}^*$ (« N étoile ») désigne $\mathbb{N}$ privé de 0. De même $\mathbb{R}^*$ désigne les réels non nuls.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** L'ensemble des **nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, est l'ensemble de toutes les abscisses des points d'une droite graduée. Un réel qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**.

Exemples d'irrationnels : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π (prouvé par Lambert en 1761), $\sqrt{2} + 1$ (voir exercice 11).

2.6 Les poupées russes : l'inclusion $\subset$

Tout entier naturel est un entier relatif ; tout relatif est décimal ; tout décimal est rationnel ($\frac{a}{10^n}$ est un quotient d'entiers) ; tout rationnel est réel.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** On dit qu'un ensemble A est **inclus** dans un ensemble B, et on note $A \subset B$, si tout élément de A est aussi un élément de B. On lit « A est inclus dans B » ou « A est une partie de B ».

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Fig. 79. – Les ensembles de nombres emboîtés N ⊂ Z ⊂ D ⊂ Q ⊂ R

Chaque inclusion est **stricte** : $-1 \in \mathbb{Z}$ mais $-1 \notin \mathbb{N}$; $0,5 \in \mathbb{D}$ mais $0,5 \notin \mathbb{Z}$; $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ mais $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !** Ne confonds pas $\in$ et $\subset$.

- $\in$ relie un **élément** à un **ensemble** : $3 \in \mathbb{N}$.
- $\subset$ relie **deux ensembles** : $\{3\} \subset \mathbb{N}$, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Écrire « $3 \subset \mathbb{N}$ » ou « $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$ » est une faute de grammaire mathématique.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !** Un nombre peut avoir plusieurs déguisements. $\frac{12}{4}$ a l'air d'une fraction, mais c'est 3, un entier naturel. $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$, $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, $\frac{21}{75} = \frac{7}{25} = 0,28 \in \mathbb{D}$. Il faut toujours **simplifier** avant de juger.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Classer des nombres. Pour chaque nombre, donner le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ qui le contient :

$$a = -\frac{18}{6}, \quad b = \frac{3}{8}, \quad c = \frac{5}{12}, \quad d = \sqrt{16} - \sqrt{2}, \quad e = (\sqrt{5})^2, \quad f = \frac{\pi}{2\pi}.$$

- $a = -3$: $a \in \mathbb{Z}$, et $a \notin \mathbb{N}$. Plus petit ensemble : $\mathbb{Z}$.
- $b = \frac{3}{8} = \frac{3}{2^3}$: dénominateur avec seulement des 2, donc décimal : $b = \frac{375}{1000} = 0,375$. Plus petit ensemble : $\mathbb{D}$.
- $c = \frac{5}{12} = \frac{5}{2^2 \times 3}$, irréductible avec un facteur 3 au dénominateur : $c \in \mathbb{Q}$, $c \notin \mathbb{D}$. (On vérifie : $c = 0,41666...$)
- $d = 4 - \sqrt{2}$. Si d était rationnel, alors $\sqrt{2} = 4 - d$ serait rationnel (différence de deux rationnels), ce qui est faux. Donc $d \in \mathbb{R}$, irrationnel.
- $e = 5$: $\mathbb{N}$.
- $f = \frac{1}{2} = 0,5$: $\mathbb{D}$. Le π disparaît : ne te laisse pas impressionner par l'apparence !

---

3. Le langage des ensembles et des intervalles

3.1 Décrire un ensemble

Il y a deux façons de décrire un ensemble :

- **en extension** : on donne la liste de ses éléments, $A = \{1\,;3\,;5\,;7\}$;
- **en compréhension** : on donne une propriété caractéristique, $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \ \text{ impair et } \ x < 8\}$.

La barre verticale $\mid$ (on trouve aussi « : » ou « ; ») se lit « **tel que** ». La phrase se lit : « l'ensemble des x appartenant à $\mathbb{N}$ tels que x est impair et strictement inférieur à 8 ».

L'**ensemble vide**, qui ne contient aucun élément, se note $\varnothing$. Ce symbole a été introduit par **André Weil** (groupe Bourbaki) vers 1939, inspiré de la lettre norvégienne Ø. Attention : $\varnothing$ n'est pas $\{0\}$! $\{0\}$ contient un élément, le nombre zéro ; $\varnothing$ n'en contient aucun. Une boîte vide n'est pas une boîte contenant un zéro.

3.2 Union, intersection, complémentaire

Soient A et B deux parties d'un ensemble E.

Définition Fondamentale

📐 **Définitions —**

- L'**intersection** $A \cap B$ (lire « A inter B ») est l'ensemble des éléments qui sont dans A **et** dans B.
- La **réunion** (ou union) $A \cup B$ (lire « A union B ») est l'ensemble des éléments qui sont dans A **ou** dans B (ou dans les deux).
- Le **complémentaire** de A dans E, noté $\overline{A}$ ou $E \setminus A$, est l'ensemble des éléments de E qui **ne sont pas** dans A. Le symbole $\setminus$ se lit « privé de ».
- A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \varnothing$.

Pour retenir : $\cap$ ressemble à un « n » renversé… et à un pont étroit où ne passent que ceux qui ont les deux tickets ; $\cup$ ressemble à une coupe large, un **U** comme « **U**nion », qui recueille tout.



Fig. 80. – Diagrammes de Venn : Intersection A ∩ B et Réunion A ∪ B

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Opérations sur des ensembles finis.

$E = \{1\,;2\,;\ldots;12\}$, A = ensemble des multiples de 2 dans E, B = ensemble des multiples de 3 dans E.

- $A = \{2\,;4\,;6\,;8\,;10\,;12\}$, $B = \{3\,;6\,;9\,;12\}$.
- $A \cap B = \{6\,;12\}$: ce sont les multiples de 6.
- $A \cup B = \{2\,;3\,;4\,;6\,;8\,;9\,;10\,;12\}$ (on ne répète pas 6 et 12).
- $\overline{A \cup B} = \{1\,;5\,;7\,;11\}$: les nombres de E divisibles ni par 2 ni par 3.
- Vérification des effectifs : $\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B) - \mathrm{card}(A \cap B) = 6 + 4 - 2 = 8$. (Le *cardinal*, noté card, est le nombre d'éléments.)

3.3 Les intervalles de $\mathbb{R}$

Sur la droite des réels, les ensembles les plus utiles sont des **morceaux de droite sans trou** : les intervalles.

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Soient a et b deux réels avec $a < b$.

Notation	Ensemble des réels x tels que	Lecture	Représentation
$[a\,;b]$	$a \leq x \leq b$	intervalle fermé a, b	[ ]
$]a\,;b[$	$a < x < b$	intervalle ouvert a, b	] [
$[a\,;b[$	$a \leq x < b$	fermé en a, ouvert en b	[[
$]a\,;b]$	$a < x \leq b$	ouvert en a, fermé en b	]]
$[a\,;+\infty[$	$x \geq a$	a, plus l'infini	[→
$]a\,;+\infty[$	$x > a$		]→
$]-\infty\,;b]$	$x \leq b$	moins l'infini, b	←]
$]-\infty\,;b[$	$x < b$		←[

On a aussi $\mathbb{R} =]-\infty\,;+\infty[$. Les réels a et b sont les **bornes** de l'intervalle ; $b - a$ est sa **longueur** (ou amplitude).

Pourquoi ces crochets ? La convention française est visuelle : le crochet **tourné vers l'intérieur** « attrape » la borne (elle est incluse) ; le crochet **tourné vers l'extérieur** la « repousse » (elle est exclue). Dans beaucoup de pays anglo-saxons, on écrit plutôt (a, b) pour l'intervalle ouvert — ne t'en étonne pas si tu lis un livre étranger. On met un **point-virgule** entre les bornes pour éviter toute confusion avec la virgule décimale : $[1,5\,;2]$.

Le symbole ∞ (« infini ») a été introduit par l'Anglais **John Wallis** en 1655. Il n'est **pas un nombre** : c'est une façon de dire « sans limite de ce côté ». C'est pourquoi le crochet est **toujours ouvert** du côté de $+\infty$ ou de $-\infty$: on ne peut pas « atteindre » l'infini, donc on ne peut pas l'inclure.

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège !

- $[3\,;+\infty]$ est **incorrect** : le crochet doit être ouvert en $+\infty$.
- $[5\,;2]$ n'a pas de sens : on écrit toujours la plus petite borne à gauche.
- $]2\,;2[=\varnothing$, mais $[2\,;2]=\{2\}$ (un seul point).
- L'intervalle $[1\,;3]$ contient une **infinité** de réels ($1,5$, $\sqrt{2}$, $2,999\ldots$), pas seulement $1, 2, 3$! Ne confonds pas avec l'ensemble d'entiers $\{1\,;2\,;3\}$, qu'on note parfois $[\![1\,;3]\!]$.

Notations utiles : $\mathbb{R}_+=[0\,;+\infty[$ (réels positifs ou nuls), $\mathbb{R}_-=]-\infty\,;0]$, $\mathbb{R}_+^*=]0\,;+\infty[$ (strictement positifs), $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}\setminus\{0\}=]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Intersection et réunion d'intervalles.

Soient $I=[-2\,;5[$ et $J=]1\,;+\infty[$. Déterminer $I\cap J$ et $I\cup J$.

On dessine les deux intervalles l'un sous l'autre :

- *$I\cap J$: il faut être à la fois ≥ -2, <5 et >1. La contrainte la plus forte à gauche est $x>1$, à droite $x<5$. $I\cap J=$*

  Donc $]1\,;5[$.
- *$I\cup J$: il suffit d'être dans l'un des deux. On couvre tout depuis -2 (inclus) jusqu'à $+\infty$. Donc $I\cup J=[-2\,;+\infty[$.*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Traduire une inéquation en intervalle.

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-3<2x+1\leq 7$, et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

On soustrait 1 aux trois membres : $-4<2x\leq 6$. On divise par 2, qui est **positif** (l'ordre est conservé) : $-2<x\leq 3$. L'ensemble des solutions est $S=]-2\,;3]$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Une réunion qui ne se simplifie pas.

Résoudre $x^2>9$ dans $\mathbb{R}$.

$x^2>9\Leftrightarrow x^2-9>0\Leftrightarrow (x-3)(x+3)>0$. Un produit de deux facteurs est strictement positif lorsque les deux facteurs sont de même signe. Tableau de signes :

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
produit		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $S=]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$. Cette réunion de deux intervalles disjoints **n'est pas** un intervalle : il y a un « trou » entre -3 et 3.

⚠ L'erreur classique « $x^2>9\Leftrightarrow x>3$ » oublie toute la partie négative : $x=-4$ vérifie bien $(-4)^2=16>9$.

CHAPITRE 32 : Le Voilier dans la Tempête et la Flèche Libre

> « Un point est une ancre qui retient le navire au fond de l'eau. Une coordonnée cartésienne dit où tu es. Mais le marin qui affronte la houle n'a que faire de son ancrage : il a besoin de savoir où le vent le pousse, à quelle vitesse, et comment deux courants qui s'affrontent fusionnent en un seul élan. Pour libérer le mouvement du sol, il a fallu inventer la flèche volante : le Vecteur. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi le repère cartésien ne suffisait plus aux physiciens et comment **Hermann Grassmann** a libéré le déplacement de son point d'attache en 1844.
- Le triplet fondamental qui définit un **vecteur** : direction, sens, norme — et la notation fléchée $\vec{u}$ ou $\overrightarrow{AB}$.
- La **relation de Chasles** ($\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$) comprise comme un relais de navigateurs ou de coursiers, et la règle du parallélogramme.
- La multiplication d'un vecteur par un nombre réel (scalaire) et la notion de **vecteurs colinéaires**.
- Comment traduire la géométrie en calcul algébrique dans un repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$: coordonnées de vecteurs, formule du milieu, formule de la distance.
- Le juge de paix de l'alignement et du parallélisme : le **déterminant** $xy' - yx' = 0$.

---

1. Le problème : la barque dans le courant du grand fleuve

Tu te tiens à la barre d'une barque de pêcheurs sur les eaux d'un fleuve large de cinq cents mètres. Sur la rive opposée, droit devant toi au Nord, se dresse l'embarcadère où t'attendent tes compagnons.

Tu empoignes les deux rames. Tu tires sur le bois de toutes tes forces musculaires : ta proue pointe droit vers le **Nord**, et ton effort te propulse dans l'eau à la vitesse constante de $\mathbf{3}\ \ \mathbf{km/h}$. Tu calculs mentalement que dans dix minutes, tu auras accosté au ponton.

Mais le fleuve n'est pas un étang endormi. Un fort courant s'écoule d'Ouest en **Est** à la vitesse de $\mathbf{4}\ \ \mathbf{km/h}$.

Regarde la scène depuis la berge :

> 💡 **Modélisation Concrète — La Dérive du Voilier et l'Addition des Vitesses**
>
> - C (Point d'atterrissage réel)
> - Trajectoire /
> - réelle / Courant des rames (Nord : 3 km/h)
> - o B
> - A Courant du fleuve (Est : 4 km/h)

Que subit ton embarcation ? 1. Tes bras t'entraînent vers le Nord : en une heure, sans courant, tu parcourrais $3\ \ \mathrm{km}$ vers le Nord. 2. L'eau sous ta coque t'emporte vers l'Est : en une heure, sans ramer, tu dériverais de $4\ \ \mathrm{km}$ vers l'Est.

Les deux actions s'exercent **en même temps**. Au bout d'une heure imaginaire où les deux mouvements se combineraient, tu ne serais ni au Nord, ni à l'Est, mais au point C. Quelle distance as-tu franchie par rapport au fond du fleuve ?

Le triangle formé par le déplacement vers l'Est ($4\ \ \mathrm{km}$), le déplacement vers le Nord ($3\ \ \mathrm{km}$) et la trajectoire réelle est un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore donne la distance parcourue :

$$d = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5\ \ \mathrm{km}\ .$$

Ta vitesse réelle par rapport aux rives est de $\mathbf{5}\ \ \mathbf{km/h}$, orientée en biais vers le Nord-Est !

Ce problème révèle une insuffisance fondamentale des nombres ordinaires :

- Un nombre seul ($5\ \ \mathrm{km/h}$) dit **combien**, mais il ne dit pas **vers où**.
- Une coordonnée de point $A(x_A, y_A)$ dit **où l'on est**, mais elle est clouée au système d'axes que l'on a dessiné sur la carte. Si la barque rame de la même manière cent kilomètres plus en aval, le phénomène physique est rigoureusement identique, bien que les coordonnées de départ et d'arrivée soient complètement changées.

Il fallait inventer un objet mathématique nouveau : une **flèche autonome**, que l'on peut transporter partout sans la déformer, et qui encode à la fois une inclinaison, une orientation et une grandeur.

---

2. Libérer la flèche : la naissance du vecteur

2.1 La rupture de Grassmann (1844)

Pendant deux siècles après René Descartes (1637), la géométrie analytique fonctionnait en attachant chaque point à une origine fixe $O(0, 0)$. Pour étudier le déplacement d'un oiseau ou le souffle d'une tempête, on devait manipuler les coordonnées du point de départ A, puis celles du point d'arrivée B, et faire des soustractions.

En 1844, un professeur de lycée allemand méconnu de ses contemporains, **Hermann Günther Grassmann**, publie un ouvrage visionnaire : *Die Lineale Ausdehnungslehre* (La Théorie de l'Extension Linéaire). Grassmann pose une idée révolutionnaire : > « Le point est une prison. Ce qui importe en physique, ce n'est pas le lieu où commence l'action, c'est l'action elle-même : le transport pur. »

Cette entité géométrique prend le nom de **vecteur**, du latin *vehere* (« transporter », « charrier » — qui a aussi donné « véhicule »).

2.2 Les trois caractéristiques d'un vecteur

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Vecteur.** Un vecteur non nul $\vec{u}$ est défini par trois données inséparables : 1. **Sa direction :** la droite qui le porte (ou toute droite qui lui est parallèle). Cela indique la ligne sur laquelle s'effectue le mouvement (par exemple la droite Nord-Sud, l'axe horizontal, une pente à 30°). 2. **Son sens :** l'orientation du parcours sur cette droite, indiquée par la pointe de la flèche (par exemple vers le Nord plutôt que vers le Sud, de gauche à droite). 3. **Sa norme :** la longueur du segment fléché, notée $\| \vec{u} \|$. Elle représente l'intensité physique (une vitesse en $\mathrm{km/h}$, une force en newtons, un déplacement en mètres).



Fig. 81. – Caractérisation d'un vecteur : direction, sens et norme

Notation expliquée. - On surmonte la lettre d'une flèche vers la droite : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$. On lit à voix haute : « le vecteur u », « le vecteur v ». - Lorsque le vecteur représente le déplacement allant explicitement d'un point A à un point B, on écrit $\overrightarrow{AB}$, lu « vecteur AB ». Ici, A est **l'origine** (ou point d'application) du représentant, et B en est **l'extrémité**. - La **norme** s'écrit avec une double barre : $\| \vec{u} \|$ ou $\| \overrightarrow{AB} \|$. On lit « norme de u » ou « norme de AB ». On a toujours $\| \overrightarrow{AB} \| = AB$ (la longueur géométrique usuelle). On utilise une double barre pour ne pas confondre avec la valeur absolue $|x|$ d'un nombre réel.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! Ne confonds jamais direction et sens !**

Dans le langage courant, on dit souvent « je vais dans la direction de Paris ». En mathématiques, c'est une faute de vocabulaire :

- La **direction**, c'est la ligne de chemin de fer reliant Paris à Lyon.
- Le **sens**, c'est d'aller de Paris vers Lyon, ou de Lyon vers Paris. Deux automobilistes qui se croisent à contre-sens sur une même ligne droite ont la **même direction**, mais des **sens opposés**.

2.3 Le vecteur nul et les représentants

Que se passe-t-il si un voyageur ne bouge pas d'un millimètre ? Son point de départ A et son point d'arrivée A sont confondus. Le déplacement associé est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$ (un zéro surmonté d'une flèche) :

$$\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}.$$

Le vecteur nul a une norme égale à zéro : $\| \vec{0} \| = 0$. Il n'a pas de direction ni de sens privilégié (on dit qu'il a toutes les directions possibles).

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? Un vecteur est une infinité de flèches à la fois !** Un vecteur $\vec{u}$ n'est pas « collé » en un point précis du papier. C'est une classe de déplacements. Si dix oiseaux volent de conserve en formation serrée, tous vers le Sud à $40\ \ \mathrm{km/h}$, chaque oiseau trace sa propre flèche dans le ciel. Toutes ces flèches ont la même direction, le même sens et la même longueur. On dit qu'elles sont des **représentants** d'un seul et même vecteur $\vec{u}$.

📐 Règle Fondamentale — Multiplication d'un Vecteur par un Scalaire

- Oiseau 1 Oiseau 2 Oiseau 3
- A C E
- o o o
- u = AB u = CD u = EF
- B D F
- AB = CD = EF = même vecteur libre u !

2.4 Égalité vectorielle et parallélogramme

Quand peut-on affirmer que deux flèches $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ représentent le même vecteur ?

📐 Théorème fondamental — Égalité vectorielle.

Soient quatre points du plan A, B, C, D.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \text{le quadrilatère } \ ABDC \ \text{ est un parallélogramme (éventuellement aplati)}\ .$$

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! L'ordre des sommets.** Regarde avec une immense vigilance l'ordre des lettres : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à ce que $AB\mathbf{DC}$ soit un parallélogramme, et **non pas** $ABCD$! Pour aller de A à B, on effectue le même glissement que pour aller de C à D. Les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont donc le même milieu : les diagonales se coupent en leur milieu.



Fig. 82. – Décomposition vectorielle fondamentale : u = x i + y j

---

3. Les opérations sur les vecteurs

3.1 La relation de Chasles : le relais des coursiers

Comment additionner deux déplacements successifs ? Imagine un message royal porté par des cavaliers d'estafette :

- Un premier cavalier part du relais A et galope jusqu'au relais B : déplacement $\overrightarrow{AB}$.
- Au relais B, il tend la sacoche de cuir à un second cavalier qui part immédiatement vers la citadelle C : déplacement $\overrightarrow{BC}$.

Quel est le bilan global pour la lettre royale ? Elle est partie de A et elle se trouve en C.

> **Théorème (Relation de Chasles, 1837) —**
>
> Pour tous points A, B, C du plan :
>
> $$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$



Fig. 83. – Vecteurs dans le plan : relation de Chasles u + v

Origine historique. Cette relation porte le nom du géomètre français **Michel Chasles** (1793-1880), professeur à la Sorbonne et à Polytechnique, qui a unifié la géométrie projective et les mesures algébriques de segments orientés.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? Le piège de l'addition des longueurs.**
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est une égalité de **vecteurs**. Elle n'implique **jamais** que $AB + BC = AC$ pour les longueurs ordinaires, sauf si les trois points sont alignés dans l'ordre A, B, C ! En général, dans un triangle non aplati, l'inégalité triangulaire (chapitre 9) impose :

$$AC < AB + BC.$$

Le chemin en ligne droite est strictement plus court que le détour par B. La norme de la somme est inférieure ou égale à la somme des normes : $\| \vec{u} + \vec{v} \| \leq \| \vec{u} \| + \| \vec{v} \|$.

3.2 L'opposé d'un vecteur et la soustraction

Si l'on parcourt le chemin dans l'autre sens, de B vers A, le vecteur obtenu a la même direction, la même norme, mais un **sens contraire**. C'est le vecteur **opposé**, noté $-\overrightarrow{AB}$:

$$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}.$$

En appliquant la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Pour soustraire un vecteur $\vec{v}$, on ajoute son opposé :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}).$$

3.3 La règle du parallélogramme (forces concourantes)

Que faire si deux vecteurs partent du même point initial A, comme deux remorqueurs tirant sur un même cargo ? Soit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Pour appliquer Chasles, il suffit de placer au bout de B un représentant de $\vec{v}$: on construit le point D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$. Alors :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}.$$

Le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme, et le vecteur somme $\overrightarrow{AD}$ correspond à sa diagonale principale.

3.4 Multiplication d'un vecteur par un scalaire

En physique et en géométrie, un nombre réel est souvent appelé un **scalaire** (du latin *scala*, échelle), car il sert à changer l'échelle d'une grandeur sans changer sa nature.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Produit d'un vecteur par un réel.** Soit $\vec{u}$ un vecteur et $k \in \mathbb{R}$ un nombre réel. Le vecteur $k\vec{u}$ est défini par : 1. Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. 2. Si $k \neq 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$:

- $k\vec{u}$ a la **même direction** que $\vec{u}$;
- $k\vec{u}$ a le **même sens** que $\vec{u}$ si $k > 0$, et le **sens opposé** si $k < 0$;
- sa norme est $\| k\vec{u} \| = |k| \times \| \vec{u} \|$.

📐 Règle Fondamentale — Multiplication d'un Vecteur par un Scalaire

- 2u -u 0 u 2u 3u

📐 Propriétés algébriques —

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tous réels k, k' :

- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$ (distributivité par rapport aux scalaires) ;
- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$ (distributivité par rapport aux vecteurs) ;
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$;
- $1\vec{u} = \vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

3.5 Caractérisation vectorielle du milieu

Soit un segment $[AB]$. Le milieu I de $[AB]$ peut s'exprimer de trois manières vectorielles équivalentes : 1. $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ (même direction, même sens, même demi-longueur) ; 2. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ (I est le centre d'équilibre entre A et B) ; 3. Pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

✍️ **Démonstration — Identité du milieu.**

D'après Chasles : $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$. En sommant terme à terme :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}).$$

Comme I est le milieu de $[AB]$, on a $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Donc :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}. \quad \blacksquare$$

---

4. Les vecteurs dans un repère cartésien

4.1 La base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ et les coordonnées d'un vecteur

Munissons le plan d'une origine O et de deux vecteurs non colinéaires $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$. Le triplet $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ forme un **repère du plan**. Si les directions de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont perpendiculaires et que $\| \vec{\imath} \| = \| \vec{\jmath} \| = 1$, on dit que le repère est **orthonormé**.

📐 **Théorème et Définition — Coordonnées d'un vecteur.**

Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe un **unique** couple de réels $(x\,;y)$ tel que :

$$\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}.$$

On écrit $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou $\vec{u}(x\,;y)$. x est **l'abscisse** du vecteur et y est son **ordonnée**.

4.2 Les formules fondamentales des coordonnées

Soient deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, et deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

📐 **Formules clés à maîtriser absolument —**

1. **Vecteur reliant deux points (« Arrivée moins Départ ») :**

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

2. **Somme de vecteurs :**

$$\vec{u} + \vec{v}\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$$

3. **Multiplication par un scalaire :**

$$k\vec{u}\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$$

4. **Coordonnées du milieu I de $[AB]$:**

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

5. **Norme d'un vecteur (dans un repère orthonormé uniquement !) :**

$$\| \vec{u} \| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

et la distance entre deux points :

$$AB = \| \overrightarrow{AB} \| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

✍️ **Démonstration — Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.**

Par définition des coordonnées des points, $\overrightarrow{OA} = x_A\vec{\imath} + y_A\vec{\jmath}$ et $\overrightarrow{OB} = x_B\vec{\imath} + y_B\vec{\jmath}$. Selon la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}.$$

En substituant :

$$\overrightarrow{AB} = (x_B\vec{\imath} + y_B\vec{\jmath}) - (x_A\vec{\imath} + y_A\vec{\jmath}) = (x_B - x_A)\vec{\imath} + (y_B - y_A)\vec{\jmath}.$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont donc bien $(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$. ■

---

5. Colinéarité et déterminant : l'art de viser droit

5.1 Définition de la colinéarité

Deux flèches peuvent avoir des tailles différentes et des sens opposés : si elles sont portées par des droites parallèles, elles ont la **même direction**. En mathématiques, on dit qu'elles sont **colinéaires** (du latin *cum*, ensemble, et *linea*, ligne : « sur une même ligne »).

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Vecteurs colinéaires.** Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** si l'un est le produit de l'autre par un nombre réel :

$$\text{il existe}\quad k \in \mathbb{R}\quad \text{tel que}\quad \vec{u} = k\vec{v}\quad \text{ou}\quad \vec{v} = k\vec{u}.$$

Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à **tous** les vecteurs du plan (car $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$).

5.2 Le déterminant de deux vecteurs

Comment tester instantanément si deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires, sans chercher k au hasard ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition et Théorème — Déterminant dans le plan.** Le **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans une base orthonormée est le nombre réel noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$ calculé par la règle du produit en croix :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

Critère fondamental :

$$\vec{u} \;\text{ et }\; \vec{v} \;\text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \Leftrightarrow xy' - yx' = 0.$$

✍ **Démonstration — Condition de colinéarité.**

- **Sens direct ($\Longrightarrow$) :** Supposons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires. Si $\vec{v} = \vec{0}$, alors $x' = y' = 0$, donc $xy' - yx' = x(0) - y(0) = 0$. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$, ce qui signifie $x = kx'$ et $y = ky'$. Calculons la différence croisée :
$$xy' - yx' = (kx')y' - (ky')x' = kx'y' - ky'x' = 0.$$
- **Sens réciproque ($\Longleftarrow$) :** Supposons $xy' - yx' = 0$. Si $\vec{v} = \vec{0}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires par définition. Supposons $\vec{v} \neq \vec{0}$. L'une au moins de ses coordonnées est non nulle. Supposons par exemple $x' \neq 0$. Posons $k = \frac{x}{x'}$, de sorte que $x = kx'$. L'égalité $xy' - yx' = 0$ donne alors :
$$(kx')y' - yx' = 0 \Leftrightarrow x'(ky' - y) = 0.$$
Comme $x' \neq 0$, il vient nécessairement $ky' - y = 0$, soit $y = ky'$. On a donc à la fois $x = kx'$ et $y = ky'$, ce qui s'écrit $\vec{u} = k\vec{v}$. Les vecteurs sont donc bien colinéaires. ■

💡 **Interprétation géométrique : l'aire du parallélogramme.**

La valeur absolue du déterminant $|\det(\vec{u}, \vec{v})|$ est exactement égale à l'**aire du parallélogramme** formé par les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$! Si les vecteurs sont colinéaires, le parallélogramme est aplati : son aire est nulle, d'où $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

5.3 Les deux grandes applications géométriques

Grâce au déterminant, les problèmes d'alignement et de parallélisme se transforment en une simple vérification de calcul algébrique :

1. **Parallélisme de droites :** Deux droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires :
$$(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0.$$
2. **Alignement de trois points :** Trois points distincts A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont la même direction :
$$A, B, C \text{ sont alignés} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0.$$

---

6. Exemples résolus détaillés

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Simplifier une expression vectorielle avec Chasles. Simplifier au maximum le vecteur :
$$\vec{W} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AD}.$$
Méthode pas à pas : 1. Remplacer les soustractions par l'addition de l'opposé :
$$-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad -\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA}.$$
2. Réécrire l'expression :
$$\vec{W} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}.$$
3. Enchaîner les termes consécutifs grâce à la relation de Chasles :
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$
$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD},$$
$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$
Conclusion : $\vec{W} = \vec{0}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calculs de coordonnées et de distances.

Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne $A(-3\,;2)$, $B(1\,;5)$ et $C(4\,;1)$. 1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et la longueur exacte AB. 2. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Solution : 1. Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-(-3) \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Norme de $\overrightarrow{AB}$ (distance AB) :

$$AB = \sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5.$$

2. Attention : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$). Notons $(x_D\,;y_D)$ les coordonnées de D.

$$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix} x_C - x_D \\ y_C - y_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-x_D \\ 1-y_D \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ se traduit par le système :

$$\begin{cases} 4 - x_D = 4 \Longrightarrow x_D = 0 \\ 1 - y_D = 3 \Longrightarrow y_D = 1 - 3 = -2 \end{cases}$$

Le point cherché est donc $D(0\,;-2)$. *(Vérification par les milieux : le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{-3+4}{2}\,;\frac{2+1}{2}\right) = (0,5\,;1,5)$; le milieu de $[BD]$ est $\left(\frac{1+0}{2}\,;\frac{5+(-2)}{2}\right) = (0,5\,;1,5)$. Les diagonales se coupent bien en leur milieu !)*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Tester l'alignement de trois points avec le déterminant. On considère les points $E(-2\,;-3)$, $F(2\,;3)$ et $G(6\,;9)$. Sont-ils alignés ?

Solution : Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$:

$$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 2-(-2) \\ 3-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EG}\begin{pmatrix} 6-(-2) \\ 9-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Calculons le déterminant :

$$\det(\overrightarrow{EF},\overrightarrow{EG}) = \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 12 \end{vmatrix} = 4\times 12 - 6\times 8 = 48 - 48 = 0.$$

Le déterminant est nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ sont colinéaires. Comme ils partagent le point commun E, les points E, F et G sont alignés.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Déterminer un paramètre pour obtenir le parallélisme. Soient les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2m-1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\m+2\end{pmatrix}$ où m est un réel inconnu. Pour quelles valeurs de m ces vecteurs sont-ils colinéaires ?

Solution : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v})=0$:

$$(2m-1)(m+2)-3\times 5=0.$$

Développons :

$$2m^2+4m-m-2-15=0\Leftrightarrow 2m^2+3m-17=0.$$

C'est une équation du second degré. Son discriminant est :

$$\Delta=3^2-4\times 2\times(-17)=9+136=145>0.$$

Il existe deux valeurs réelles distinctes :

$$m_1=\frac{-3-\sqrt{145}}{4}\quad\text{et}\quad m_2=\frac{-3+\sqrt{145}}{4}.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Décomposition vectorielle géométrique pure. Soit un triangle ABC. On place les points P et Q définis par $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AQ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Démontrer sans repère que $(PQ)\parallel(BC)$.

Solution : Exprimons le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en utilisant Chasles :

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AQ}=-\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}(-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{3}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}).$$

D'après Chasles, $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$. D'où :

$$\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}.$$

Le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ est le produit du vecteur $\overrightarrow{BC}$ par le scalaire $\frac{1}{3}$. Les vecteurs $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont donc colinéaires, ce qui prouve que les droites (PQ) et (BC) sont strictement parallèles. *(Remarque : nous venons de redémontrer vectoriellement le théorème de Thalès !)*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Le centre de gravité d'un triangle. Soit un triangle ABC. Soit G le point défini par l'égalité :

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}.$$

1. Soit A' le milieu de $[BC]$. Exprimer $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$ en fonction de $\overrightarrow{GA'}$. 2. En déduire que G appartient à la médiane (AA') et préciser sa position sur le segment.

Solution : 1. D'après l'identité du milieu démontrée au §3.5, comme A' est le milieu de $[BC]$, on a :

$$\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA'}.$$

2. Remplaçons dans la relation de départ :

$$\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GA'}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{GA'}\Leftrightarrow-\overrightarrow{AG}=-2\overrightarrow{GA'}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GA'}.$$

Insérons G dans le membre de droite via Chasles : $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GA'}=\overrightarrow{AG}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$. On en déduit :

$$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AA'}$ sont colinéaires : le point G est donc situé sur la droite médiane (AA'), aux deux tiers de la longueur en partant du sommet A. G est le **centre de gravité** (isobarycentre) du triangle ABC.

7. En informatique : tester la colinéarité en Python

Voici un script Python qui prend les coordonnées de deux vecteurs et teste leur colinéarité à l'aide du déterminant :

```python
def determinant(ux, uy, vx, vy):
    """Calcule le déterminant de deux vecteurs u(ux, uy) et v(vx, vy)."""
    return ux * vy - uy * vx

def sont_colineaires(ux, uy, vx, vy, tolerance=1e-9):
    """Vérifie si deux vecteurs sont colinéaires à une précision donnée."""
    det = determinant(ux, uy, vx, vy)
    return abs(det) < tolerance

# Test avec u(4, 6) et v(6, 9)
print("u et v colinéaires ?", sont_colineaires(4, 6, 6, 9))  # Affiche True

# Test avec u(3, -1) et v(2, 5)
print("u et v colinéaires ?", sont_colineaires(3, -1, 2, 5))  # Affiche False
```

Ce qu'il faut retenir

1. **Vecteur :** entité géométrique caractérisée par une **direction** (droite support), un **sens** (flèche) et une **norme** (longueur $\| \vec{u} \|$).
2. **Égalité vectorielle :** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABDC$ est un parallélogramme.
3. **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Pour soustraire : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ avec $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
4. **Milieu I de $[AB]$:** $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
5. **Coordonnées :**
   - $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
   - Milieu : $I\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$
   - Norme : $\| \vec{u} \| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (en repère orthonormé).
6. **Colinéarité et Déterminant :**
   - $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\Leftrightarrow \vec{u} = k\vec{v}$ (ou l'un nul) $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx' = 0$.
   - Droites parallèles : $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0$.
   - Points alignés : A, B, C alignés $\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

Exercices

Exercices d'application directe ()

1. Soit un parallélogramme $MNOP$. Citer trois paires de vecteurs égaux.
2. Simplifier l'expression $\vec{u} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TR}$.
3. Simplifier l'expression $\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.
4. Soit un vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Calculer sa norme $\| \vec{u} \|$.
5. On donne $A(2\,;-5)$ et $B(-1\,;7)$. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
6. Avec les mêmes points A et B, calculer les coordonnées du milieu K de $[AB]$.
7. Calculer la distance exacte AB.
8. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?
9. Les vecteurs $\vec{w}\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{z}\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?
10. Trouver le réel y pour que $\vec{a}\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix} 10 \\ y \end{pmatrix}$ soient colinéaires.

Exercices d'entraînement et de réflexion ()

11. Soient $A(1\,;2)$, $B(4\,;6)$ et $C(-2\,;-2)$. Les points A, B et C sont-ils alignés ?
12. Soient quatre points $K(-1\,;1)$, $L(3\,;3)$, $M(5\,;1)$ et $N(1\,;-1)$.
    a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{NM}$.
    b) Quelle est la nature précise du quadrilatère $KLMN$?
13. Reprendre les points K, L, M, N de l'exercice 12. Calculer les longueurs KL et LM. Le quadrilatère est-il un losange ? Un rectangle ?
14. Soit un triangle ABC. Construire (ou exprimer) les points M et N définis par :
$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$
Exprimer le vecteur $\overrightarrow{MN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
15. Soient les points $A(-2\,;3)$, $B(4\,;1)$ et $C(2\,;5)$. Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC}$.
16. Soit un triangle quelconque ABC. Soit D le symétrique de A par rapport à B, et E le symétrique de B par rapport à C. Exprimer $\overrightarrow{DE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.
17. Pour quelle valeur du réel x les points $P(x\,;3)$, $Q(2\,;-1)$ et $R(6\,;7)$ sont-ils alignés ?
18. On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. Déterminer les réels α et β tels que le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}7\\0\end{pmatrix}$ s'écrive $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Exercices d'approfondissement et défis ()

19. **Le théorème des milieux vectoriel.** Soit ABC un triangle. Soit I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Démontrer par le calcul vectoriel que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. En déduire la position relative des droites (IJ) et (BC) ainsi que le rapport de leurs longueurs.
20. **Le quadrilatère de Varignon.** Soit un quadrilatère quelconque $ABCD$. On note I, J, K, L les milieux respectifs des côtés $[AB], [BC], [CD], [DA]$.
    a) Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{LK}$ en fonction des vecteurs des sommets.
    b) En déduire que $IJKL$ est toujours un parallélogramme.
21. **Concours des trois médianes.** Soit ABC un triangle. On note A', B', C' les milieux respectifs de $[BC], [CA], [AB]$. Soit G le point vérifiant $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
    a) Démontrer que pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.
    b) En déduire que G appartient à chacune des trois médianes (AA'), (BB') et (CC'), et préciser le point de concours.
22. **Trajectoire et dérive d'un avion.** Un avion vole avec un cap vers le Nord à une vitesse propre de 600 km/h par rapport à l'air. Un vent violent souffle du Nord-Ouest vers le Sud-Est (à $45°$ par rapport aux axes cardinaux) à la vitesse de $100\sqrt{2}$ km/h. On choisit un repère orthonormé où l'axe des abscisses pointe vers l'Est et l'axe des ordonnées vers le Nord.
    a) Déterminer les composantes du vecteur vitesse propre $\vec{v}_a$ de l'avion.
    b) Déterminer les composantes du vecteur vent $\vec{v}_w$.
    c) Calculer le vecteur vitesse sol $\vec{v}_s = \vec{v}_a + \vec{v}_w$.
    d) En déduire la vitesse réelle de l'avion par rapport au sol et la déviation angulaire de sa trajectoire.

Solutions

1. Dans le parallélogramme $MNOP$: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PO}$, $\overrightarrow{NO} = \overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{OP}$.
2. $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TR} = \overrightarrow{RT} + \overrightarrow{TR} = \overrightarrow{RR} = \vec{0}$.
3. $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.
4. $\| \vec{u} \| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
5. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1-2\\7-(-5)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\12\end{pmatrix}$.
6. $x_K = \frac{2+(-1)}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$ et $y_K = \frac{-5+7}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Donc $K(0,5\,;1)$.
7. $AB = \sqrt{(-3)^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 144} = \sqrt{153} = 3\sqrt{17}$.
8. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 6 \times 6 - (-4) \times (-9) = 36 - 36 = 0$. Oui, ils sont colinéaires (on remarque aussi $\vec{v} = -1,5\vec{u}$).

9. $\det(\vec{w},\vec{z}) = 5\times 4 - 3\times 7 = 20-21 = -1 \neq 0$. Non, ils ne sont pas colinéaires.
10. $\det(\vec{a},\vec{b}) = 4y - (-6)\times 10 = 4y + 60 = 0 \Leftrightarrow 4y = -60 \Leftrightarrow y = -15$.
11. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\6-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-1\\-2-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$. On remarque immédiatement $\overrightarrow{AC} = -1\overrightarrow{AB}$ (ou $\det = 3(-4) - 4(-3) = -12+12 = 0$). Les vecteurs sont colinéaires et ont le point A en commun, donc A, B, C sont alignés.
12. a) $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}3-(-1)\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{NM}\begin{pmatrix}5-1\\1-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$.
    b) Puisque $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$, le quadrilatère $KLMN$ est un parallélogramme.
13. Longueur $KL = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Calculons $\overrightarrow{LM}\begin{pmatrix}5-3\\1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$. Longueur $LM = \sqrt{2^2+(-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Comme $KL \neq LM$, les côtés consécutifs ne sont pas de même longueur : ce n'est pas un losange. Vérifions si les côtés sont perpendiculaires : KM^2 avec $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix}5-(-1)\\1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix} \Longrightarrow KM^2 = 36$. Or $KL^2 + LM^2 = 20 + 8 = 28 \neq 36$. Le triangle KLM n'est pas rectangle, donc $KLMN$ n'est pas un rectangle. C'est un parallélogramme quelconque.
14. Par Chasles : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}$. En remplaçant : $\overrightarrow{MN} = -(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}) + (2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
15. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-(-2)\\1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2-4\\5-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$. Alors $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC} = 2\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12+6\\-4-12\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}18\\-16\end{pmatrix}$. Comme A a pour coordonnées $(-2\,;3)$, on a : $x_E = x_A + 18 = -2+18 = 16$ et $y_E = y_A - 16 = 3-16 = -13$. Donc $E(16\,;-13)$.
16. D symétrique de A par rapport à $B \Longrightarrow \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$. E symétrique de B par rapport à $C \Longrightarrow \overrightarrow{BE} = 2\overrightarrow{BC}$. Par Chasles : $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC}$.
17. $\overrightarrow{QR}\begin{pmatrix}6-2\\7-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\8\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{QP}\begin{pmatrix}x-2\\3-(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x-2\\4\end{pmatrix}$. P, Q, R alignés $\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{QR},\overrightarrow{QP}) = 0 \Leftrightarrow 4\times 4 - 8(x-2) = 0 \Leftrightarrow 16 - 8x + 16 = 0 \Leftrightarrow 8x = 32 \Leftrightarrow x = 4$.
18. L'égalité $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ donne le système :
$$\begin{cases} 2\alpha + \beta = 7 \\ -\alpha + 3\beta = 0 \end{cases}$$
    De la seconde équation, $\alpha = 3\beta$. En injectant dans la première : $2(3\beta) + \beta = 7 \Leftrightarrow 7\beta = 7 \Leftrightarrow \beta = 1$. D'où $\alpha = 3\times 1 = 3$. Solution : $\alpha = 3, \beta = 1$.
19. I milieu de $[AB] \Longrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{IA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. J milieu de $[AC] \Longrightarrow \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Par Chasles : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Puisque $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, les vecteurs sont colinéaires, donc les droites (IJ) et (BC) sont parallèles. En prenant les normes, $IJ = \frac{1}{2}BC$.
20. a) Dans le triangle ABC, par le théorème des milieux vectoriel (ex. 19), $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Dans le triangle ADC, L est le milieu de $[AD]$ et K le milieu de $[CD]$. Donc $\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
    b) On constate que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$. Un quadrilatère dont deux côtés opposés forment des vecteurs égaux est un parallélogramme. Donc $IJKL$ est toujours un parallélogramme.
21. a) Soit M un point quelconque. Par Chasles : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC}) = 3\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 3\overrightarrow{MG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{MG}$.
    b) Choisissons $M = A'$ (milieu de $[BC]$). Alors $\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{A'C} = 3\overrightarrow{A'G}$. Comme A' est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{A'B} + \overrightarrow{A'C} = \vec{0}$. L'égalité devient $\overrightarrow{A'A} = 3\overrightarrow{A'G}$, ou encore $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$. Le point G est donc situé sur la médiane (AA'), aux deux tiers à partir du sommet. En choisissant $M = B'$ puis $M = C'$, on obtient de même $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CC'}$. Le point G est donc le point d'intersection unique des trois médianes.
22. a) L'avion vole plein Nord ($x = 0$) à 600 km/h : $\vec{v}_a\begin{pmatrix}0\\600\end{pmatrix}$.
    b) Le vent vient du Nord-Ouest et souffle vers le Sud-Est (angle $-45°$, donc composante x positive vers l'Est, composante y négative vers le Sud). Sa vitesse est $100\sqrt{2}$. Comme $\cos(45°) = \sin(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, on a : $v_{wx} = 100\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2} = 100$, et $v_{wy} = -100$. Donc $\vec{v}_w\begin{pmatrix}100\\-100\end{pmatrix}$.
    c) Vitesse sol : $\vec{v}_s = \vec{v}_a + \vec{v}_w = \begin{pmatrix}0+100\\600-100\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}100\\500\end{pmatrix}$.
    d) Vitesse réelle de l'avion : $\| \vec{v}_s \| = \sqrt{100^2+500^2} = \sqrt{10000+250000} = \sqrt{260000} \approx 509,9$ km/h. Déviation angulaire θ vers l'Est : $\tan\theta = \frac{100}{500} = 0,2 \Longrightarrow \theta \approx 11,3°$. L'avion est dévié de plus de $11°$ vers la droite et a perdu près de 90 km/h par rapport au sol !

La question qui ouvre la suite

Nous avons appris à faire glisser des flèches libres dans tout le plan et à repérer si deux flèches pointent dans la même direction grâce au déterminant. Mais que se passe-t-il si l'on plante un piquet en un point A et qu'on laisse une flèche $\vec{u}$ indiquer une trajectoire infinie ? On obtient une **droite**.

Comment caractériser l'ensemble de tous les points alignés le long de cette ligne de mire ? Comment relier l'équation d'une droite à ses vecteurs directeurs, et comment déterminer le point exact où deux trajectoires se croisent ? C'est ce que nous allons découvrir dans **La Ligne de Mire**.

CHAPITRE 33 : La Ligne de Mire

> « Une droite n'est pas une simple trace d'encre tirée à la règle : c'est un rayon laser infini qui traverse l'univers, une ligne de mire balayée par le regard du guetteur. Pour enfermer cette infinité de points dans une formule algébrique, il suffit de deux nombres : une ancre sur l'axe vertical et une pente d'escalade. Alors, le croisement de deux chemins devient le dénouement d'une équation. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment une droite naît d'un point d'ancrage et d'un **vecteur directeur** qui lui donne son cap.
- L'**équation cartésienne** générale $ax + by + c = 0$, et pourquoi le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ en est la boussole.
- L'**équation réduite** $y = mx + p$: le sens physique du **coefficient directeur** m (la pente) et de l'**ordonnée à l'origine** p.
- Le cas particulier des droites verticales d'équation $x = k$.
- Les trois destins de deux droites qui se rencontrent : sécantes en un point unique, strictement parallèles ou confondues.
- La résolution algébrique et graphique des **systèmes de deux équations à deux inconnues** par substitution et par combinaison linéaire.

---

1. Le problème : la tour de guet et le navire dans le brouillard

Sur une falaise escarpée dominant l'océan se dresse une tour de guet. La nuit est tombée, un épais brouillard enveloppe la baie et deux navires naviguent à l'aveugle.

Le gardien du phare dispose d'un radar cartésien :

- Le navire marchand *L'Espérance* se trouve actuellement au point de coordonnées $A(2\,;3)$ et suit un cap rectiligne guidé par le vecteur vitesse $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.
- Une frégate de secours *La Vigilante* est signalée au point $B(-1\,;8)$ et file en ligne droite selon le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.



Fig. 84. – Droite affine y = mx + p : coefficient directeur et ordonnée à l'origine

Le commandant du port pose deux questions cruciales : 1. *Ces deux navires risquent-ils d'entrer en collision, c'est-à-dire leurs trajectoires se coupent-elles en un point précis du plan d'eau ?* 2. *Si oui, quelles sont les coordonnées exactes du point de croisement ?*

Pour répondre, le dessin sur papier millimétré a ses limites : avec un crayon mal taillé ou une échelle imprécise, on peut se tromper de plusieurs centaines de mètres. Il nous faut une méthode algébrique infaillible, capable de traduire une ligne infinie en une équation que l'on peut résoudre avec une précision absolue.

---

2. Le cap et la trace : le vecteur directeur

2.1 Donner une direction à une droite

Une droite dans le plan est entièrement déterminée par :

- soit **deux points distincts** A et B (par deux points passe une unique droite) ;
- soit **un point d'ancrage** A et **un vecteur non nul** qui lui donne sa direction.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Vecteur directeur.** Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan. Tout vecteur non nul $\vec{u}$ ayant la même direction que la droite $\mathcal{D}$ est appelé un **vecteur directeur** de $\mathcal{D}$. Si A et B sont deux points distincts de $\mathcal{D}$, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? Une droite a une infinité de vecteurs directeurs !** Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$, alors pour tout nombre réel non nul k, le vecteur $k\vec{u}$ a la même direction : il est donc aussi un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. Deux fois plus long, trois fois plus court ou orienté en sens contraire, il porte toujours la même droite.

2.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

Un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(x_A\,;y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}$ si et seulement si le déplacement de A à M se fait le long de ce même cap :

$$M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires .}$$

D'après le chapitre précédent, deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul :

$$M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0.$$

C'est cette condition simple qui engendre toutes les équations de droites !

---

3. L'équation cartésienne d'une droite

3.1 La forme générale $ax + by + c = 0$

📐 **Théorème fondamental — Équation cartésienne.**

1. Toute

droite $\mathcal{D}$ du plan admet une équation de la forme :

$$ax + by + c = 0$$

où a, b, c sont des réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$ (c'est-à-dire que a et b ne sont pas nuls en même temps). 2. Réciproquement, toute équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est l'équation d'une droite. 3. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.

✍ Démonstration (exigible) — De la colinéarité à l'équation cartésienne.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A\,;y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}$ non nul. Soit un point quelconque $M(x\,;y)$ du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AM}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_A\\y-y_A\end{pmatrix}.$$

Le point M appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires :

$$\det(\overrightarrow{AM},\vec{u})=0 \Leftrightarrow (x-x_A)u_2-(y-y_A)u_1=0.$$

En développant :

$$u_2x-u_1y+(-u_2x_A+u_1y_A)=0.$$

Posons :

$$a=u_2,\quad b=-u_1,\quad c=-u_2x_A+u_1y_A.$$

Comme $\vec{u}\neq\vec{0}$, le couple $(u_1,u_2)\neq(0,0)$, donc $(a,b)\neq(0,0)$. L'égalité devient :

$$ax+by+c=0.$$

De plus, le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$. C'est bien un vecteur directeur de la droite. ■

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! L'équation cartésienne n'est pas unique.

Si $2x-3y+5=0$ est l'équation d'une droite, alors en multipliant chaque terme par 2, on obtient $4x-6y+10=0$, qui décrit **exactement la même droite** ! Deux équations $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$ représentent la même droite si et seulement si leurs coefficients sont proportionnels : il existe un réel $k\neq0$ tel que $a'=ka$, $b'=kb$ et $c'=kc$.

---

4. L'équation réduite : la pente et l'ordonnée à l'origine

L'équation cartésienne $ax+by+c=0$ est très générale, mais pour tracer une droite ou comprendre sa pente physique, les mathématiciens préfèrent exprimer y directement en fonction de x.

4.1 Deux catégories de droites

Isolons le terme en y dans l'équation cartésienne :

$$by=-ax-c.$$

Deux cas se présentent :

Cas 1 : $b\neq0$ (la droite n'est pas verticale)
On peut diviser par b :

$$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}.$$

En posant $m=-\frac{a}{b}$ et $p=-\frac{c}{b}$, l'équation prend la forme :

$$\boxed{y=mx+p}$$

C'est **l'équation réduite** de la droite.

- m **est le coefficient directeur** (ou la **pente**).
- p **est l'ordonnée à l'origine** : c'est l'altitude à laquelle la droite franchit l'axe vertical (Oy) (pour $x=0$, on a $y=m(0)+p=p$). Le point de coordonnées $(0\,;p)$ est sur la droite.

Cas 2 : $b = 0$ (la droite est verticale)
L'équation devient $ax + c = 0$. Puisque $(a, b) \neq (0, 0)$ et $b = 0$, on a obligatoirement $a \neq 0$. On en déduit :

$$x = -\frac{c}{a} = k.$$

Tous les points de la droite ont la **même abscisse** k. La droite est strictement parallèle à l'axe des ordonnées (Oy). Elle n'a pas de pente définie (sa pente est « infinie ») et elle ne peut pas s'écrire sous la forme $y = mx + p$. Son vecteur directeur est vertical, par exemple $\vec{j}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

4.2 Le sens géométrique du coefficient directeur m

> **Propriété fondamentale — Calcul de la pente.**
>
> Soient deux points distincts $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ d'une droite non verticale ($x_A \neq x_B$). Le coefficient directeur m est donné par la formule :
>
> $$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Sens physique : Δy représente la variation d'altitude (dénivelé) et Δx représente l'avancement horizontal.

- Si $m > 0$: la droite « monte » de gauche à droite. La fonction affine associée est strictement croissante.
- Si $m < 0$: la droite « descend » de gauche à droite. La fonction affine associée est strictement décroissante.
- Si $m = 0$: l'équation devient $y = p$. La droite est parfaitement **horizontale**, parallèle à l'axe des abscisses.
- Un vecteur directeur immédiat d'une droite d'équation $y = mx + p$ est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$. En avançant de 1 unité en abscisse, on monte de m unités en ordonnée.

---

5. Méthodes fondamentales de construction et de détermination

5.1 Tracer une droite à coup sûr

Il existe deux méthodes rapides : 1. **La méthode des deux points :** On choisit deux abscisses simples (souvent $x = 0$ et $x = 1$ ou $x = 2$), on calcule les ordonnées correspondantes, on place les deux points et on les relie à la règle. 2. **La méthode de la pente :** On place le point de départ $(0\,;p)$ sur l'axe des ordonnées. Depuis ce point, on se décale d'une unité vers la droite, puis on monte de m unités (ou descend si $m < 0$). On place le second point et on trace.

5.2 Trouver l'équation d'une droite

- **Cas A : Connaissant deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ avec $x_A \neq x_B$.**
  1. On calcule $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
  2. L'équation s'écrit $y = mx + p$. Pour trouver p, on utilise le fait que $A \in \mathcal{D}$:
  $$y_A = mx_A + p \Longrightarrow p = y_A - mx_A.$$
- **Cas B : Connaissant un point $A(x_A\,;y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.**
  1. L'équation cartésienne s'écrit directement $ax + by + c = 0$.
  2. On remplace x et y par les coordonnées de A pour calculer la constante c :
  $$ax_A + by_A + c = 0 \Longrightarrow c = -ax_A - by_A.$$

---

6. Positions relatives de deux droites et systèmes linéaires

Considérons deux droites dans le plan : $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $\mathcal{D}' : a'x + b'y + c' = 0$, de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ et $\vec{u}'\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$.

6.1 Les trois configurations possibles



Fig. 85. – Positions relatives de deux droites affines dans le plan

1. **Droites sécantes :** Leurs vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires :
$$\det(\vec{u}, \vec{u}') \neq 0 \Leftrightarrow (-b)(a') - (a)(-b') \neq 0 \Leftrightarrow ab' - a'b \neq 0.$$
Pour des droites non verticales : $m \neq m'$. Elles se coupent en **un point unique**.
2. **Droites strictement parallèles :** Les vecteurs directeurs sont colinéaires ($ab' - a'b = 0$, soit $m = m'$), mais les ordonnées à l'origine sont différentes ($p \neq p'$). Leur intersection est vide : $\mathcal{D} \cap \mathcal{D}' = \varnothing$.
3. **Droites confondues :** Les vecteurs directeurs sont colinéaires et les droites ont au moins un point commun (donc $m = m'$ et $p = p'$). Tous leurs points sont communs : $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$.

6.2 Résolution d'un système de deux équations à deux inconnues

Chercher l'intersection de deux droites revient à trouver les couples $(x\,;y)$ qui vérifient simultanément les deux équations :

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

Il existe deux grandes techniques algébriques :

Méthode 1 : La substitution

On isole l'une des inconnues (celle dont le coefficient est le plus simple, idéalement 1 ou -1) dans l'une des équations, puis on remplace son expression dans l'autre équation. On obtient alors une équation à une seule inconnue.

Méthode 2 : La combinaison linéaire (élimination)

On multiplie les équations par des nombres judicieusement choisis pour que les coefficients de l'une des inconnues (par exemple x) deviennent opposés. En additionnant membre à membre les deux nouvelles équations, l'inconnue x s'élimine !

---

7. Exemples résolus détaillés

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Retour au problème du port : collision de navires. Rappel des données :

- *L'Espérance* part de $A(2\,;3)$ avec $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.
- *La Vigilante* part de $B(-1\,;8)$ avec $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la trajectoire $\mathcal{D}_1$ de *L'Espérance*.
2. Déterminer une équation cartésienne de la trajectoire $\mathcal{D}_2$ de *La Vigilante*.
3. Déterminer si les trajectoires se croisent et trouver les coordonnées du point d'intersection I.

Solution : 1. Pour $\mathcal{D}_1$, $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ est vecteur directeur. Comme $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, on peut choisir $a=1$ et $b=-2$. L'équation est $1x-2y+c=0$. $A(2\,;3)\in\mathcal{D}_1 \Longrightarrow 2-2(3)+c=0 \Longrightarrow 2-6+c=0 \Longrightarrow c=4$. Donc $\mathcal{D}_1 : x-2y+4=0$ (ou sous forme réduite : $y=\frac{1}{2}x+2$).

2. Pour $\mathcal{D}_2$, $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ est vecteur directeur. On peut choisir $a=-1$ et $b=-1$, ou plus simplement $\vec{v}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} \Longrightarrow a=1, b=1$ (car $\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}=-\vec{v}$). L'équation est $x+y+c'=0$. $B(-1\,;8)\in\mathcal{D}_2 \Longrightarrow -1+8+c'=0 \Longrightarrow 7+c'=0 \Longrightarrow c'=-7$. Donc $\mathcal{D}_2 : x+y-7=0$ (ou sous forme réduite : $y=-x+7$).

3. Comparons les pentes : $m_1=\frac{1}{2}$ et $m_2=-1$. Puisque $m_1\neq m_2$, les droites sont sécantes en un point unique I. Résolvons le système :

$$\begin{cases} y=\dfrac{1}{2}x+2 \\ y=-x+7 \end{cases}$$

Par égalité des deux expressions de y :

$$\frac{1}{2}x+2=-x+7 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x+x=7-2 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x=5 \Leftrightarrow x=\frac{10}{3}.$$

Calculons y :

$$y=-\frac{10}{3}+7=-\frac{10}{3}+\frac{21}{3}=\frac{11}{3}.$$

Les trajectoires se croisent au point $I\left(\frac{10}{3}\,;\frac{11}{3}\right)$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Déterminer l'équation d'une droite passant par deux points. Soient les points $E(-3\,;5)$ et $F(1\,;-3)$. Trouver l'équation réduite de la droite (EF).

Solution : Vérifions d'abord si la droite est verticale : $x_E=-3$ et $x_F=1$. Comme $x_E\neq x_F$, elle n'est pas verticale. 1. Calcul du coefficient directeur m :

$$m=\frac{y_F-y_E}{x_F-x_E}=\frac{-3-5}{1-(-3)}=\frac{-8}{4}=-2.$$

2. Calcul de l'ordonnée à l'origine p : L'équation s'écrit $y=-2x+p$. Comme $F(1\,;-3)$ appartient à la droite :

$$-3=-2(1)+p \Longrightarrow -3=-2+p \Longrightarrow p=-1.$$

L'équation réduite est donc $\boxed{y=-2x-1}$. *(Vérification avec E : $-2(-3)-1=6-1=5=y_E$. Tout concorde !)*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Résolution d'un système par combinaison linéaire. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} 3x + 4y = 11 \quad (L_1) \\ 5x - 2y = 40 \quad (L_2) \end{cases}$$

Solution : Observons les coefficients de y : $+4$ dans L_1 et -2 dans L_2. En multipliant L_2 par 2, le coefficient de y deviendra -4, exactement l'opposé de $+4$! Multiplions L_2 par 2 :

$$2 \times (5x - 2y) = 2 \times 40 \Leftrightarrow 10x - 4y = 80 \quad (L_2').$$

Additionnons L_1 et L_2' membre à membre :

$$(3x + 4y) + (10x - 4y) = 11 + 80 \Leftrightarrow 13x = 91 \Leftrightarrow x = \frac{91}{13} = 7.$$

Remplaçons maintenant $x = 7$ dans L_1 :

$$3(7) + 4y = 11 \Leftrightarrow 21 + 4y = 11 \Leftrightarrow 4y = 11 - 21 = -10 \Leftrightarrow y = -\frac{10}{4} = -2,5.$$

Le système admet pour unique solution le couple $(7\,;-2,5)$. L'ensemble des solutions est $S = \{(7\,;-2,5)\}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Système sans solution ou avec une infinité de solutions. Étudier selon la géométrie les deux systèmes suivants : a) $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ -4x + 6y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 3x - 6y = 9 \end{cases}$

Solution : a) Multiplions la première équation par 2 :

$$4x - 6y = 14.$$

Additionnons avec la deuxième :

$$(4x - 6y) + (-4x + 6y) = 14 + 5 \Leftrightarrow 0 = 19.$$

Cette égalité est impossible ! Géométriquement, les deux droites ont des vecteurs directeurs colinéaires ($\frac{-4}{2} = \frac{6}{-3} = -2$), elles sont strictement parallèles et ne se coupent jamais. Le système n'a **aucune solution** : $S = \varnothing$.

b) Multiplions la première équation par 3 :

$$3x - 6y = 9.$$

C'est exactement la deuxième équation ! Les deux équations décrivent la **même droite**. Tout point de cette droite est solution. Le système admet une **infinité de solutions** : tous les couples de la forme $(2y + 3\,;y)$ pour $y \in \mathbb{R}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Déterminer l'équation de la médiatrice d'un segment. On donne $A(1\,;2)$ et $B(5\,;4)$. Trouver l'équation de la médiatrice Δ du segment $[AB]$.

Solution : Rappel : la médiatrice est la droite perpendiculaire à $[AB]$ passant par son milieu I. 1. Milieu I de $[AB]$:

$$x_I = \frac{1+5}{2} = 3, \quad y_I = \frac{2+4}{2} = 3 \Longrightarrow I(3\,;3).$$

2. Propriété géométrique : $M(x\,;y) \in \Delta \Leftrightarrow MA^2 = MB^2$.

$$MA^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5.$$

$$MB^2 = (x-5)^2 + (y-4)^2 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 8y + 16 = x^2 + y^2 - 10x - 8y + 41.$$

L'égalité $MA^2 = MB^2$ donne :

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = x^2 + y^2 - 10x - 8y + 41.$$

Les termes quadratiques x^2 et y^2 s'annulent :

$$-2x - 4y + 5 = -10x - 8y + 41 \Leftrightarrow 8x + 4y - 36 = 0.$$

En divisant toute l'équation par 4 :

$$\boxed{2x + y - 9 = 0} \quad \text{ou sous forme réduite} \quad \boxed{y = -2x + 9}\,.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Faisceau de droites dépendant d'un paramètre. Pour tout réel m, on considère la droite $\mathcal{D}_m$ d'équation :

$$(m-1)x + (2m+1)y - 5m + 2 = 0.$$

Démontrer que toutes les droites $\mathcal{D}_m$ passent par un point fixe K dont on déterminera les coordonnées.

Solution : Réorganisons l'équation en regroupant les termes selon les puissances du paramètre m :

$$mx - x + 2my + y - 5m + 2 = 0 \Leftrightarrow m(x + 2y - 5) + (-x + y + 2) = 0.$$

Pour que cette égalité soit vraie **pour toute valeur de m**, il faut et il suffit que le coefficient devant m et le terme constant soient nuls simultanément :

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ -x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

Additionnons les deux équations :

$$(x + 2y - 5) + (-x + y + 2) = 0 \Leftrightarrow 3y - 3 = 0 \Leftrightarrow y = 1.$$

Remplaçons dans la deuxième équation :

$$-x + 1 + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

Toutes les droites du faisceau passent par le point fixe $K(3\,;1)$!

---

8. En informatique : résoudre un système 2×2 en Python

Voici un script Python qui prend les coefficients de deux droites sous forme cartésienne et calcule leur point d'intersection :

```python
def resoudre_systeme(a1, b1, c1, a2, b2, c2):
    """
    Résout le système :
    a1*x + b1*y + c1 = 0
    a2*x + b2*y + c2 = 0
    """
    # Calcul du déterminant principal (a1*b2 - a2*b1)
    det = a1 * b2 - a2 * b1

    if abs(det) < 1e-12:
        # Droites parallèles ou confondues
        # Test de proportionnalité avec les constantes
        if abs(a1 * c2 - a2 * c1) < 1e-12 and abs(b1 * c2 - b2 * c1) < 1e-12:
            return "Infinité de solutions (droites confondues)"
        else:
            return "Aucune solution (droites strictement parallèles)"
    else:
        # Règle de Cramer pour trouver x et y
        # Réécriture sous la forme a*x + b*y = -c
        e1, e2 = -c1, -c2
        x = (e1 * b2 - e2 * b1) / det
        y = (a1 * e2 - a2 * e1) / det
        return (x, y)

# Test avec le système de l'Exemple 1 :
# x - 2y + 4 = 0  et  x + y - 7 = 0
solution = resoudre_systeme(1, -2, 4, 1, 1, -7)
print("Point d'intersection :", solution)  # Affiche (3.3333333333333335,
3.6666666666666665)
```

Ce qu'il faut retenir

1. **Vecteur directeur :** tout vecteur $\vec{u}$ non nul parallèle à la droite. Si $A, B \in \mathcal{D}$, $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur.
2. **Équation cartésienne :** $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
   - Vecteur directeur canonique : $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.
3. **Équation réduite :**
   - Si la droite n'est pas verticale ($b \neq 0$) : $y = mx + p$.
     - $m = -\frac{a}{b} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ est la **pente** (coefficient directeur).
     - p est l'**ordonnée à l'origine** (point $(0\,;p)$).
     - Vecteur directeur : $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.
   - Si la droite est verticale ($b = 0$) : $x = k$. Pas de coefficient directeur.
4. **Positions relatives :**
   - Parallèles $\Leftrightarrow m = m'$ (ou $ab' - a'b = 0$).
   - Sécantes $\Leftrightarrow m \neq m'$ (ou $ab' - a'b \neq 0$). Intersection unique par système.
5. **Méthodes de résolution de système :**
   - *Substitution* : isoler une variable dans une ligne et l'injecter dans l'autre.
   - *Combinaison* : multiplier pour annuler une variable par addition.

Exercices

Exercices d'application directe ()

1. Donner un vecteur directeur de la droite d'équation $3x - 5y + 7 = 0$.
2. Donner un vecteur directeur de la droite d'équation réduite $y = -4x + 3$.
3. Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite $2x + 4y - 8 = 0$.
4. Écrire l'équation réduite de la droite passant par le point $P(0\,;-5)$ et de pente $m = 3$.
5. La droite d'équation $x = 4$ admet-elle un coefficient directeur ? Pourquoi ?
6. Les droites d'équations $y = 3x - 2$ et $6x - 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?
7. Le point $A(3\,;-1)$ appartient-il à la droite d'équation $2x - 5y - 11 = 0$?
8. Déterminer l'abscisse du point de la droite $y = 2x - 6$ dont l'ordonnée vaut 4.
9. Résoudre le système par substitution : $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$.
10. Résoudre le système par combinaison : $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$.

Exercices d'entraînement et de réflexion ()

11. Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $A(2\,;-3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
12. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points $M(-2\,;7)$ et $N(4\,;1)$.
13. On donne les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(2\,;-1)$. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par C et parallèle à (AB).
14. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 4x + 3y = 1 \\ 2x - 5y = 7 \end{cases}$.
15. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $\mathcal{D}_1 : 3x - 2y + 6 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + 2y - 2 = 0$.
16. Pour quelle valeur du réel k la droite d'équation $kx + 2y - 5 = 0$ est-elle parallèle à la droite passant par $A(1\,;1)$ et $B(3\,;7)$?
17. Soit le triangle ABC avec $A(0\,;4)$, $B(-2\,;0)$ et $C(4\,;0)$. Déterminer l'équation de la médiane issue de A.
18. Déterminer le réel m pour que le système $\begin{cases} mx + 2y = 4 \\ 3x + (m-1)y = 2 \end{cases}$ n'admette pas de solution unique.

Exercices d'approfondissement et défis ()

19. **Intersection des trois hauteurs d'un triangle (orthocentre).** Dans un repère orthonormé, on donne $A(0\,;3)$, $B(-2\,;0)$ et $C(4\,;0)$.
    a) Déterminer une équation de la hauteur issue de A.
    b) En utilisant le fait que la hauteur issue de B est perpendiculaire à (AC), déterminer son équation.
    c) Calculer les coordonnées de l'orthocentre H du triangle.
20. **Projeté orthogonal d'un point sur une droite.** Soit la droite $\mathcal{D} : 2x - y + 1 = 0$ et le point $A(4\,;4)$.
    a) Déterminer l'équation de la droite Δ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par A.
    b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection H de $\mathcal{D}$ et Δ.
    c) Calculer la distance AH. (Cette distance est la distance minimale du point A à la droite $\mathcal{D}$).
21. **Point de concours de trois droites.** On considère les trois droites : $\mathcal{D}_1 : 2x - y - 1 = 0$, $\mathcal{D}_2 : x + y - 5 = 0$, et $\mathcal{D}_3 : 3x + ky - 7 = 0$. Déterminer la valeur du réel k pour que ces trois droites soient concourantes en un même point.
22. **Problème économique d'offre et de demande.** Dans un marché de denrées, la quantité offerte q_O et la quantité demandée q_D (en tonnes) dépendent du prix unitaire p (en euros par kg) selon les lois linéaires suivantes :
    - Offre : $q_O = 2p - 4$ (les producteurs offrent davantage si le prix monte).
    - Demande : $q_D = -3p + 21$ (les acheteurs achètent moins si le prix monte).

    a) Tracer les deux droites dans un repère $(p\,;q)$.
    b) Déterminer par le calcul le prix d'équilibre p_E pour lequel l'offre est égale à la demande.
    c) Quelle est alors la quantité échangée sur le marché à l'équilibre ?

Solutions

1. Pour $ax+by+c=0$, un vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$. Ici $a=3, b=-5 \Longrightarrow \vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$.
2. Pour $y=mx+p$, un vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$. Ici $m=-4 \Longrightarrow \vec{u}\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$.
3. $4y=-2x+8 \Leftrightarrow y=-\frac{2}{4}x+\frac{8}{4}=-\frac{1}{2}x+2$. Coefficient directeur $m=-\frac{1}{2}$, ordonnée à l'origine $p=2$.
4. $y=3x-5$.
5. Non, la droite $x=4$ est verticale. Sa pente n'est pas définie (dénominateur $\Delta x=0$ nul).
6. Droite 1 : $m_1=3$. Droite 2 : $-2y=-6x-5 \Leftrightarrow y=3x+2,5 \Longrightarrow m_2=3$. Comme $m_1=m_2=3$ et que les ordonnées à l'origine sont distinctes ($-2\neq 2,5$), les droites sont strictement parallèles.
7. Remplaçons $x=3$ et $y=-1$: $2(3)-5(-1)-11=6+5-11=0$. Oui, $A\in\mathcal{D}$.
8. $4=2x-6 \Leftrightarrow 2x=10 \Leftrightarrow x=5$.
9. Remplaçons y dans la deuxième équation : $3x+(2x-1)=9 \Leftrightarrow 5x-1=9 \Leftrightarrow 5x=10 \Leftrightarrow x=2$. Alors $y=2(2)-1=3$. Solution : $(2\,;3)$.
10. Additionnons les équations : $(x+y)+(x-y)=10+4 \Leftrightarrow 2x=14 \Leftrightarrow x=7$. Alors $7+y=10 \Leftrightarrow y=3$. Solution : $(7\,;3)$.
11. $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} \Longrightarrow a=4$ et $b=3$. L'équation est $4x+3y+c=0$. $A(2\,;-3)\in\mathcal{D} \Longrightarrow 4(2)+3(-3)+c=0 \Leftrightarrow 8-9+c=0 \Leftrightarrow c=1$. Équation : $4x+3y+1=0$.
12. $m=\frac{1-7}{4-(-2)}=\frac{-6}{6}=-1$. $y=-x+p$. Avec $N(4\,;1)$: $1=-4+p \Longrightarrow p=5$. Équation réduite : $y=-x+5$.
13. Vecteur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ ou plus simplement $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$. $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} \Longrightarrow a=1, b=-2$. L'équation est $x-2y+c=0$. $C(2\,;-1)\in\mathcal{D} \Longrightarrow 2-2(-1)+c=0 \Leftrightarrow 2+2+c=0 \Leftrightarrow c=-4$. Équation : $x-2y-4=0$ (ou $y=\frac{1}{2}x-2$).
14. Multiplions la deuxième ligne par -2 : $-2(2x-5y)=-2(7) \Leftrightarrow -4x+10y=-14$. Additionnons avec la première : $(4x+3y)+(-4x+10y)=1-14 \Leftrightarrow 13y=-13 \Leftrightarrow y=-1$. Remplaçons : $2x-5(-1)=7 \Leftrightarrow 2x+5=7 \Leftrightarrow 2x=2 \Leftrightarrow x=1$. Solution : $(1\,;-1)$.
15. Additionnons $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$: $(3x-2y+6)+(x+2y-2)=0 \Leftrightarrow 4x+4=0 \Leftrightarrow x=-1$. Injectons dans $\mathcal{D}_2$: $-1+2y-2=0 \Leftrightarrow 2y=3 \Leftrightarrow y=1,5$. Intersection : $I(-1\,;1,5)$.
16. Pente de (AB) : $m=\frac{7-1}{3-1}=\frac{6}{2}=3$. Droite $kx+2y-5=0 \Leftrightarrow 2y=-kx+5 \Leftrightarrow y=-\frac{k}{2}x+\frac{5}{2}$. Sa pente est $-\frac{k}{2}$. Parallélisme $\Leftrightarrow -\frac{k}{2}=3 \Leftrightarrow k=-6$.
17. La médiane issue de A passe par $A(0\,;4)$ et par le milieu A' de $[BC]$. $x_{A'}=\frac{-2+4}{2}=1$ et $y_{A'}=\frac{0+0}{2}=0$, donc $A'(1\,;0)$. Pente $m=\frac{0-4}{1-0}=-4$. Ordonnée à l'origine (donnée par $A(0\,;4)$) : $p=4$. Équation : $y=-4x+4$.
18. Pas de solution unique si le déterminant est nul : $m(m-1)-2\times 3=0 \Leftrightarrow m^2-m-6=0$. Factorisation : $(m-3)(m+2)=0 \Longrightarrow m=3$ ou $m=-2$.
19. a) Le côté $[BC]$ est porté par l'axe des abscisses ($y=0$). La hauteur issue de A est donc perpendiculaire à l'axe des abscisses : c'est une droite verticale passant par $A(0\,;3)$, d'équation $x=0$.
    b) Le vecteur $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-0\\0-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$. Une droite perpendiculaire à (AC) admet $\overrightarrow{AC}$ comme vecteur normal, ce qui signifie que son vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$. Pente de cette hauteur : $m=\frac{4}{3}$. Elle passe par $B(-2\,;0)$: $y-0=\frac{4}{3}(x-(-2)) \Longrightarrow y=\frac{4}{3}x+\frac{8}{3}$.
    c) L'orthocentre H est l'intersection des deux hauteurs. Comme la première hauteur est $x=0$, on remplace $x=0$ dans la seconde : $y=\frac{8}{3}$. Donc $H\left(0\,;\frac{8}{3}\right)$.
20. a) Vecteur directeur de $\mathcal{D}$: $2x-y+1=0$ est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ (pente $m=2$). La perpendiculaire Δ a une pente $m'=-\frac{1}{m}=-\frac{1}{2}$. Son équation est $y-4=-\frac{1}{2}(x-4) \Leftrightarrow y=-\frac{1}{2}x+2+4=-\frac{1}{2}x+6 \Leftrightarrow x+2y-12=0$.
    b) Intersection de $\mathcal{D}$ et Δ : De $\mathcal{D}$, $y=2x+1$. Dans Δ : $x+2(2x+1)-12=0 \Leftrightarrow 5x-10=0 \Leftrightarrow x=2$. Alors $y=2(2)+1=5$. Le projeté est $H(2\,;5)$.
    c) $AH=\sqrt{(2-4)^2+(5-4)^2}=\sqrt{(-2)^2+1^2}=\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$.
$$\begin{cases}2x-y=1\end{cases}$$
21. Trouvons l'intersection K de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$: $x+y=5$ Somme : $3x=6 \Longrightarrow x=2$. Alors $y=5-2=3$. Donc $K(2\,;3)$. Pour que $\mathcal{D}_3$ passe aussi par K : $3(2)+k(3)-7=0 \Leftrightarrow 6+3k-7=0 \Leftrightarrow 3k=1 \Leftrightarrow k=\frac{1}{3}$.
22. a) La droite d'offre a une pente positive 2, la droite de demande a une pente négative -3.
    b) À l'équilibre, $q_O=q_D \Leftrightarrow 2p-4=-3p+21 \Leftrightarrow 5p=25 \Leftrightarrow p_E=5$ €/kg.
    c) Quantité échangée : $q_E=2(5)-4=10-4=6$ tonnes (ou $q_E=-3(5)+21=6$ tonnes).

La question qui ouvre la suite

Une droite représente le cas le plus docile et le plus simple des mathématiques : une relation où chaque pas en avant produit toujours le même gain régulier. C'est le monde des fonctions affines $x \mapsto mx + p$.

Mais que se passe-t-il lorsque la règle de la machine devient plus complexe ? Quand la machine élève au carré, inverse les nombres ou en extrait la racine ? Comment cartographier les reliefs, les vallées et les sommets des courbes non rectilignes ? C'est ce que nous allons explorer dans **Le Métier Jacquard et la Boîte à Fabriquer**.

CHAPITRE 34 : Le Métier Jacquard et la Boîte à Fabriquer

> « Une fonction n'est pas un dessin figé dans un livre. C'est une usine vivante : tu glisses un morceau de métal brut à l'entrée, les rouages tournent, la règle mécanique s'applique, et une pièce façonnée sort sur le tapis roulant. Les mathématiques modernes sont le grand atelier où ces métamorphoses s'enchaînent. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment l'invention des cartes perforées de **Joseph Marie Jacquard** à Lyon et le génie d'**Ada Lovelace** ont donné naissance au concept moderne de fonction.
- Le vocabulaire fondamental : **antécédent**, **image**, **ensemble de définition** $\mathcal{D}_f$, et la règle absolue de l'unicité de l'image.
- Comment lire et construire une **courbe représentative**, un tableau de valeurs et un **tableau de variations**.
- Les notions de **maximum**, de **minimum** (locaux et globaux) et la **parité** (fonctions paires et impaires, symétries du plan).
- L'étude complète des **cinq fonctions de référence** : carré (x^2), inverse ($\frac{1}{x}$), racine carrée ($\sqrt{x}$), cube (x^3) et valeur absolue ($|x|$).
- La résolution graphique d'équations $f(x) = k$, $f(x) = g(x)$ et d'inéquations, ainsi que la **composition** d'usines $g \circ f$.

---

1. Le problème : les canuts de Lyon et les cartons d'Ada Lovelace

Au tout début du XIXe siècle, sur les pentes raides de la colline de la Croix-Rousse à Lyon, les ateliers des tisseurs de soie — les *canuts* — résonnent du cliquetis assourdissant des navettes de bois.

Pour tisser un tissu de brocart damassé orné de roses rouges et de feuilles d'argent, il fallait deux ouvriers sur chaque métier : le maître tisseur assis devant le peigne, et un tout jeune enfant courbé dans la poussière (le « tireur de lacs ») qui tirait manuellement des cordelettes pour soulever les fils de chaîne un par un. Le travail était exténuant, destructeur pour la vue et la colonne vertébrale, et la moindre distraction de l'enfant créait un nœud irréversible dans l'étoffe précieuse.

En **1801**, un fils d'artisan lyonnais, **Joseph Marie Jacquard**, invente un mécanisme automatique qui va sidérer l'Europe : Il remplace l'enfant par un ruban sans fin de **cartes de carton perforées** enchaînées les unes aux autres.

- Un trou dans le carton ? Une aiguille passe librement : le crochet s'enclenche, le fil de soie monte.
- Pas de trou ? Le carton plein repousse l'aiguille : le fil de soie reste en bas.

Le métier Jacquard est la première machine programmable de l'Histoire humaine !

En **1843**, à Londres, une jeune mathématicienne d'une intuition prodigieuse, **Ada Lovelace** (fille unique du poète Lord Byron), étudie les plans de la « Machine Analytique » à engrenages imaginée par Charles Babbage. Elle fait immédiatement le lien avec les soyeux lyonnais et écrit cette formule célèbre : > *« La Machine Analytique tisse des motifs algébriques tout comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles. »*

Ada Lovelace rédige alors l'algorithme de calcul des nombres de Bernoulli : elle vient d'écrire le **tout premier programme informatique du monde**.

Ce que Jacquard a réalisé dans le carton et ce qu'Ada Lovelace a formalisé dans l'esprit, c'est l'essence même de ce que les mathématiciens appellent une **Fonction**.

---

2. Anatomie d'une fonction : vocabulaire et ensemble de définition

2.1 La boîte noire ($x \mapsto f(x)$)

Oublie pour l'instant les courbes compliquées. Pense à une **machine industrielle inflexible** :

Définition Fondamentale

📐 **Définitions fondamentales —**

1. Une **fonction** f

est un processus mathématique qui, à tout nombre réel x d'un ensemble donné, associe **au plus un** unique nombre réel, noté $f(x)$. 2. On note :

$$f : x \mapsto f(x)$$

On lit à voix haute : « la fonction f qui à x associe f de x ». 3. **L'antécédent :** c'est le nombre x introduit au départ. 4. **L'image :** c'est le résultat $f(x)$ obtenu à l'arrivée.

⚠️ ⚠️ **Règle d'or absolue — Unicité de l'image.**

- Un nombre x a **au maximum une seule image** par une fonction f. Si tu enfournes la même farine dans le même four, il ne peut pas sortir deux pains différents en même temps !
- En revanche, un nombre y peut avoir **aucun, un ou plusieurs antécédents**. Par exemple, pour la machine qui élève au carré ($f(x) = x^2$) :
  - Le nombre 9 a deux antécédents : 3 et -3 (car $3^2 = 9$ et $(-9)^2 = 9$).
  - Le nombre -4 n'a aucun antécédent réel (aucun carré réel n'est négatif).

2.2 L'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$: les valeurs interdites

Toutes les machines physiques ont des limites de tolérance : glisse une grosse barre de fer dans un moulin à café en plastique, et le moulin vole en éclats. En mathématiques, certaines opérations sont formellement prohibées dans l'ensemble des réels.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Ensemble de définition.** L'**ensemble de définition** d'une fonction f, noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible et licite.

Au lycée, deux opérations imposent la recherche d'une **valeur interdite** : 1. **La division par zéro :** Le dénominateur d'une fraction ne peut **jamais** s'annuler.

$$\frac{A}{B} \text{ existe si et seulement si } B \neq 0.$$

2. **La racine carrée d'un nombre négatif :** La quantité placée sous le radical doit être positive ou nulle.

$$\sqrt{A} \text{ existe si et seulement si } A \geq 0.$$

---

3. Courbe représentative, variations et extremums

3.1 La courbe dans le repère

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Courbe représentative.** Dans un repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, la **courbe représentative** d'une fonction f, notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble de tous les points $M(x\,;y)$ dont l'abscisse $x \in \mathcal{D}_f$ et l'ordonnée est son image $y = f(x)$:

$$\mathcal{C}_f = \big\{M(x\,;f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\big\}.$$

L'équation de la courbe est : $y = f(x)$.

Pour vérifier si un point $A(x_A\,;y_A)$ est sur la courbe, on calcule $f(x_A)$. S'il est égal à y_A, le point est sur la courbe ; sinon, il ne l'est pas.

3.2 Variations : la lecture du relief

Imagine un randonneur qui marche sur la courbe $\mathcal{C}_f$ de la gauche vers la droite (dans le sens des abscisses croissantes, x augmentant).

Résolution graphique de l'équation f(x) = k : intersections avec la droite y = k



Les solutions de l'équation f(x) = k sont les abscisses des points d'intersection de la courbe Cf avec la droite horizontale y = k

Fig. 86. – Résolution graphique de l'équation f(x) = k par intersection

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Sens de variation sur un intervalle I.** Soit f une fonction définie sur un intervalle I. 1. f est **strictement croissante** sur I si pour tous réels a et b de I :

$$a < b \Longrightarrow f(a) < f(b).$$

(Une fonction croissante conserve l'ordre des inégalités). 2. f est **strictement décroissante** sur I si pour tous réels a et b de I :

$$a < b \Longrightarrow f(a) > f(b).$$

(Une fonction décroissante inverse l'ordre des inégalités). 3. f est **constante** sur I si pour tous $a, b \in I$, $f(a) = f(b)$. 4. Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle si elle est soit seulement croissante, soit seulement décroissante sur cet intervalle.

3.3 Extremums : sommets et creux

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Maximum et Minimum.** Soit f une fonction définie sur un ensemble $\mathcal{D}_f$ et soit $x_0 \in \mathcal{D}_f$.

- f admet un **maximum** en x_0 sur $\mathcal{D}_f$, valant $M = f(x_0)$, si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$:
$$f(x) \leq f(x_0).$$
- f admet un **minimum** en x_0 sur $\mathcal{D}_f$, valant $m = f(x_0)$, si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$:
$$f(x) \geq f(x_0).$$

Un **extremum** désigne indifféremment un maximum ou un minimum.

---

4. La parité : la symétrie dans le miroir

4.1 Ensemble centré en zéro

Pour comparer ce qui se passe à droite et à gauche de l'origine, l'ensemble de définition doit être symétrique par rapport à zéro :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad -x \in \mathcal{D}_f.$$

Par exemple, $[-3\,;3]$ et $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ sont centrés en 0 ; en revanche, $[-2\,;5]$ ne l'est pas (car pour $x = 4$, -4 n'est pas dans l'ensemble).

4.2 Fonctions paires et impaires

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Parité.**

1. Une fonction f est

paire si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$:

$$f(-x) = f(x).$$

Propriété géométrique : Sa courbe $\mathcal{C}_f$ admet l'**axe des ordonnées (Oy) comme axe de symétrie**. 2. Une fonction f est **impaire** si pour tout $x \in \mathcal{D}_f$:

$$f(-x) = -f(x).$$

Propriété géométrique : Sa courbe $\mathcal{C}_f$ admet l'**origine du repère O comme centre de symétrie**.



Fig. 87. – Parité des fonctions : symétrie axiale bilatérale vs symétrie centrale

5. Les cinq fonctions de référence

Ce sont les cinq briques de base avec lesquelles toutes les machines mathématiques du lycée sont construites.

5.1 La fonction carré : $f(x) = x^2$

- **Ensemble de définition :** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} =]-\infty\,;+\infty[$.
- **Parité :** Pour tout réel x, $(-x)^2 = x^2$. La fonction carré est **paire**.
- **Variations :**
  - Sur $]-\infty\,;0]$, elle est strictement décroissante : si $a < b \leq 0$, alors $a^2 > b^2$.
  - Sur $[0\,;+\infty[$, elle est strictement croissante : si $0 \leq a < b$, alors $a^2 < b^2$.
- **Courbe :** C'est une **parabole** tournée vers le haut, dont le sommet est l'origine $O(0\,;0)$. Son minimum absolu est 0, atteint en $x = 0$.

Tableau de variations de $x \mapsto x^2$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
Variations de x^2	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

5.2 La fonction inverse : $f(x) = \frac{1}{x}$

- **Ensemble de définition :** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$.
- **Parité :** Pour tout $x \neq 0$, $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$. La fonction inverse est **impaire**.
- **Variations :**
  - Strictement décroissante sur $]-\infty\,;0[$.
  - Strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$.
- **Courbe :** C'est une **hyperbole** en deux branches distinctes, symétrique par rapport à O. Les axes de coordonnées sont ses **asymptotes**.

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège classique !** On ne dit **JAMAIS** que la fonction inverse est « décroissante sur $\mathbb{R}^*$ ». En effet, prenons $a = -1$ et $b = 1$. On a bien $a < b$, mais $f(a) = \frac{1}{-1} = -1$ et $f(b) = 1$. L'image a augmenté de -1 à $+1$! La décroissance est vraie **sur chacun des deux intervalles séparément**, mais pas sur leur réunion.

Tableau de variations de $x \mapsto \frac{1}{x}$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
Variations de $\frac{1}{x}$	0	$\searrow$	$-\infty \,\|\|\, +\infty$	$\searrow$	0

(La double barre $\|\|$ indique la valeur interdite en 0).

5.3 La fonction racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$

- **Ensemble de définition :** $\mathcal{D}_f = [0\,;+\infty[= \mathbb{R}_+$.
- **Parité :** Aucun sens (l'ensemble n'est pas centré en 0).
- **Variations :** Strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

$$0 \leq a < b \Longrightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}.$$

- **Courbe :** C'est une demi-branche de parabole couchée. Elle démarre en $O(0\,;0)$ avec une tangente verticale à l'origine.

5.4 La fonction cube : $f(x) = x^3$

- **Ensemble de définition :** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- **Parité :** $(-x)^3 = (-1)^3 x^3 = -x^3$. La fonction cube est **impaire**.

- **Variations :** Strictement croissante sur tout $\mathbb{R}$.

$$a < b \Longrightarrow a^3 < b^3.$$

- **Courbe :** Elle traverse l'origine avec une inflexion horizontale en $O(0\,;0)$.

5.5 La fonction valeur absolue : $f(x) = |x|$

- **Ensemble de définition :** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- **Définition explicite :**

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } \ x \geq 0 \\ -x & \text{si } \ x < 0 \end{cases}$$

- **Parité :** $|-x| = |x|$. La fonction est **paire**.
- **Variations :**
  - Strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ (pente -1).
  - Strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$ (pente $+1$).
- **Courbe :** Forme une pointe en **V**, avec deux demi-droites se raccordant à angle droit en $O(0\,;0)$. Son minimum absolu est 0.

---

6. Résolutions graphiques et composition d'usines

6.1 Résolutions graphiques

1. **Résoudre $f(x) = k$:** On trace la droite horizontale d'équation $y = k$. Les solutions de l'équation sont les **abscisses** des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite horizontale.
2. **Résoudre $f(x) = g(x)$:** Les solutions sont les **abscisses** des points où les deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent.
3. **Résoudre $f(x) \leq g(x)$:** Les solutions sont les intervalles de l'axe des abscisses où la courbe $\mathcal{C}_f$ est située **en dessous** de la courbe $\mathcal{C}_g$ (ou la touche).

6.2 L'usine en cascade : la composition $g \circ f$

Quand on place deux machines à la chaîne :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Composée de deux fonctions.** Soient deux fonctions f et g. La fonction composée de f suivie de g, notée $g \circ f$ (lu « g rond f »), est définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Pour que cette opération soit possible, il faut que $x \in \mathcal{D}_f$ et que le résultat intermédiaire $f(x)$ appartienne à l'ensemble de définition de la seconde machine : $f(x) \in \mathcal{D}_g$.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! L'ordre des machines est vital.** En général, $g \circ f \neq f \circ g$. Si $f(x) = x + 3$ et $g(x) = x^2$:

- $(g \circ f)(x) = g(x+3) = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
- $(f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 3$. Les deux résultats n'ont rien à voir !

---

7. Exemples résolus détaillés

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Déterminer des ensembles de définition.

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes : a) $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-9}$ b) $g(x) = \sqrt{3x-6}$ c) $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x}-2}$

Solution pas à pas : a) $f(x)$ est définie si et seulement si son dénominateur est non nul :

$$x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3 \quad \text{et} \quad x \neq -3.$$

Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\,;3\} =]-\infty\,;-3[\cup]-3\,;3[\cup]3\,;+\infty[$.

b) $g(x)$ contient une racine carrée : la quantité sous le radical doit être positive ou nulle :

$$3x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

Donc $\mathcal{D}_g = [2\,;+\infty[$.

c) Pour $h(x)$, deux conditions doivent être respectées :

b) Présence de $\sqrt{x} \Longrightarrow x \geq 0$.

c) Dénominateur non nul : $\sqrt{x} - 2 \neq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \neq 2 \Leftrightarrow x \neq 4$. On combine les deux : $\mathcal{D}_h = [0\,;4[\cup]4\,;+\infty[$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Images et antécédents. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$. 1. Calculer l'image de -2 et de $\frac{1}{2}$ par f. 2. Déterminer les antécédents éventuels de -5 par f.

Solution : 1. Calcul des images :

$$f(-2) = 2(-2)^2 - 3(-2) - 5 = 2(4) + 6 - 5 = 8 + 6 - 5 = 9.$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{4}\right) - 3\left(\frac{1}{2}\right) - 5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} - 5 = -1 - 5 = -6.$$

2. Pour trouver les antécédents de -5, on résout l'équation $f(x) = -5$:

$$2x^2 - 3x - 5 = -5 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x = 0.$$

On factorise par x :

$$x(2x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 3 = 0 \Longrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Le nombre -5 admet deux antécédents par f : 0 et $\frac{3}{2}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Démontrer le sens de variation d'une fonction sans dérivée. Soit f définie sur $]1\,;+\infty[$ par $f(x)=\frac{3}{x-1}$. Démontrer rigoureusement que f est strictement décroissante sur cet intervalle.

Solution : Soient deux réels quelconques a et b appartenant à $]1\,;+\infty[$ tels que $1<a<b$. Construisons l'expression pas à pas en appliquant les règles sur les inégalités : 1. On soustrait 1 :

$$0<a-1<b-1.$$

2. On applique la fonction inverse, qui est strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$ (elle inverse l'ordre des nombres strictement positifs) :

$$\frac{1}{a-1}>\frac{1}{b-1}.$$

3. On multiplie par $3>0$ (l'ordre est conservé) :

$$\frac{3}{a-1}>\frac{3}{b-1}\Leftrightarrow f(a)>f(b).$$

Conclusion : Nous sommes partis de $a<b$ et nous avons abouti à $f(a)>f(b)$. L'ordre a été inversé : la fonction f est **strictement décroissante** sur $]1\,;+\infty[$. ■

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Étude de parité algébrique. Étudier la parité des fonctions suivantes : a) $f(x)=\frac{x^4-3}{x^2+1}$ b) $g(x)=\frac{2x}{x^2+4}$ c) $h(x)=x^3-2x+1$

Solution : a) $\mathcal{D}_f=\mathbb{R}$ car $x^2+1>0$ ne s'annule jamais. $\mathcal{D}_f$ est centré en 0.

$$f(-x)=\frac{(-x)^4-3}{(-x)^2+1}=\frac{x^4-3}{x^2+1}=f(x).$$

Donc f est **paire**.

b) $\mathcal{D}_g=\mathbb{R}$, centré en 0.

$$g(-x)=\frac{2(-x)}{(-x)^2+4}=\frac{-2x}{x^2+4}=-\frac{2x}{x^2+4}=-g(x).$$

Donc g est **impaire**.

c) $\mathcal{D}_h=\mathbb{R}$, centré en 0.

$$h(-x)=(-x)^3-2(-x)+1=-x^3+2x+1.$$

Comparons :

- $h(x)=x^3-2x+1\neq h(-x)$, donc h n'est pas paire.
- $-h(x)=-x^3+2x-1\neq h(-x)$ (à cause du $+1$ final), donc h n'est pas impaire. Conclusion : la fonction h n'est **ni paire ni impaire**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Décomposition et calcul d'une fonction composée. Soient $f(x)=2x-5$ et $g(x)=\frac{1}{x}$. 1. Déterminer l'expression de $(g\circ f)(x)$ et son ensemble de définition. 2. Déterminer l'expression de $(f\circ g)(x)$ et son ensemble de définition.

Solution : 1. $(g\circ f)(x)=g(f(x))=g(2x-5)=\frac{1}{2x-5}$. Condition d'existence : $2x-5\neq 0\Leftrightarrow x\neq\frac{5}{2}$. Donc $\mathcal{D}_{g\circ f}=\mathbb{R}\setminus\{\frac{5}{2}\}$.

2. $(f\circ g)(x)=f(g(x))=f\left(\frac{1}{x}\right)=2\left(\frac{1}{x}\right)-5=\frac{2}{x}-5$. Condition d'existence : $x\neq 0$. Donc $\mathcal{D}_{f\circ g}=\mathbb{R}^*$. *(On remarque à nouveau que les deux composées sont totalement différentes).*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Résolution graphique et encadrement avec les fonctions de référence. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 \leq 7$ b) $\frac{1}{x} > 2$

Solution : a) On sait que la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et croissante sur $[0\,;+\infty[$. L'équation $x^2 = 7$ a deux solutions : $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$. La parabole $y = x^2$ est située en dessous de la droite horizontale $y = 7$ pour toutes les abscisses comprises entre ces deux valeurs. Donc l'ensemble des solutions est $\boxed{S = [-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}]}$.

b) Traçons mentalement l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ et la droite $y = 2$.

- Pour $x \leq 0$, $\frac{1}{x} < 0$, donc $\frac{1}{x}$ ne peut jamais être strictement supérieur à 2.
- Pour $x > 0$, l'équation $\frac{1}{x} = 2$ donne $x = \frac{1}{2}$. Comme la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$, pour avoir une image plus grande que 2, il faut choisir des abscisses plus petites que $\frac{1}{2}$ (mais strictement positives pour rester au-dessus de 0). Donc l'ensemble des solutions est $\boxed{S =]0\,;\frac{1}{2}[}$.

---

8. En informatique : table de valeurs et recherche de racine en Python

En mathématiques et en sciences, on utilise souvent un script informatique pour calculer automatiquement les images d'une fonction et localiser où elle s'annule :

```
def f(x):
    """Définition de la fonction f(x) = x**3 - 3*x + 1"""
    return x**3 - 3*x + 1

def table_de_valeurs(debut, fin, pas):
    """Affiche une table de valeurs de la fonction f."""
    print("  x   |  f(x)")
    print("------|--------")
    x = debut
    while x <= fin + 1e-9:
        print(f"{x:5.2f} | {f(x):7.3f}")
        x += pas

# Affichage des valeurs entre -2 et 2 avec un pas de 0.5
table_de_valeurs(-2, 2, 0.5)

# Recherche approchée d'une solution à f(x) = 0 par balayage
def balayage(a, b, pas=0.001):
    x = a
    while x <= b:
        if f(x) * f(x + pas) <= 0:
            return round(x + pas / 2, 3)
        x += pas
    return None

solution = balayage(0, 1)
print(f"\nUne solution approchée dans [0; 1] est x ≈ {solution}")
```

Ce qu'il faut retenir

1. **Fonction :** $x \mapsto f(x)$. À chaque antécédent $x \in \mathcal{D}_f$ correspond **une unique image** $f(x)$. Un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents.

2. **Ensemble de définition $\mathcal{D}_f$:**
   - Dénominateur $\neq 0$.
   - Quantité sous une racine carrée ≥ 0.
3. **Variations :**
   - Croissante : $a < b \Longrightarrow f(a) \leq f(b)$ (conserve l'ordre).
   - Décroissante : $a < b \Longrightarrow f(a) \geq f(b)$ (inverse l'ordre).
4. **Parité :**
   - Paire : $f(-x) = f(x)$, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
   - Impaire : $f(-x) = -f(x)$, symétrie centrale par rapport à l'origine O.
5. **Les 5 fonctions de référence :**
   - Carré x^2 : $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, paire, décroissante sur $\mathbb{R}_-$, croissante sur $\mathbb{R}_+$, sommet $O(0\,;0)$.
   - Inverse $\frac{1}{x}$: $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$, impaire, décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$.
   - Racine $\sqrt{x}$: $\mathcal{D} = [0\,;+\infty[$, croissante.
   - Cube x^3 : $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, impaire, croissante.
   - Valeur absolue $|x|$: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, paire, en forme de V.
6. **Résolution graphique :** $f(x) = k \Leftrightarrow$ abscisses des points de la courbe à hauteur k.

Exercices

Exercices d'application directe ()

1. Soit la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(-1)$.
2. Donner l'ensemble de définition de la fonction $g(x) = \frac{1}{x-7}$.
3. Donner l'ensemble de définition de la fonction $h(x) = \sqrt{2x + 8}$.
4. Soit $f(x) = 3x - 5$. Quel est l'antécédent de 10 par f ?
5. La fonction $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + 1$ est-elle paire, impaire ou ni l'un ni l'autre ?
6. La fonction $g(x) = x^3 + 4x$ est-elle paire, impaire ou ni l'un ni l'autre ?
7. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 25$.
8. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 < 16$.
9. Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ l'équation $\frac{1}{x} = 5$.
10. Déterminer la valeur de $|-17|$, $|3,14|$ et $|5-9|$.

Exercices d'entraînement et de réflexion ()

11. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions :
    a) $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4x}$ b) $g(x) = \sqrt{10 - 2x}$ c) $h(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}$
12. Soit la fonction f définie sur $[-4\,;4]$ dont le tableau de variations est :
    - Décroissante de -4 à -1, passant de 5 à -3.
    - Croissante de -1 à 2, passant de -3 à 4.
    - Décroissante de 2 à 4, passant de 4 à 1.

    a) Quel est le maximum global de f sur $[-4\,;4]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
    b) Quel est le minimum global de f ?
    c) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ?
13. Démontrer sans utiliser la dérivation que la fonction $f(x) = x^2 - 6x + 5$ est strictement croissante sur l'intervalle $[3\,;+\infty[$. *(Indication : écrire $f(x)$ sous la forme $(x-3)^2 - 4$).*
14. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :
    a) $x^2 \geq 9$ b) $\frac{1}{x} \leq 3$
15. Étudier la parité de la fonction $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$.
16. On considère $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x + 4$. Expliciter les formules de $(g \circ f)(x)$ et de $(f \circ g)(x)$, en précisant leurs domaines de définition.

17. Résoudre l'équation $|2x - 3| = 7$.
18. Résoudre l'inéquation $|x - 5| \leq 2$ en l'interprétant comme une distance sur la droite numérique.

Exercices d'approfondissement et défis ()

19. **Une fonction ni paire ni impaire décomposée en deux.** Soit f une fonction quelconque définie sur $\mathbb{R}$. On pose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.
    a) Démontrer que p est paire et que i est impaire.
    b) Démontrer que $f(x) = p(x) + i(x)$.
    c) Appliquer cette décomposition à la fonction $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$.
20. **Optimisation d'un enclos rectangulaire.** Un éleveur dispose de 40 mètres de grillage pour construire un enclos rectangulaire adossé à un mur de pierre déjà existant (il n'a donc pas besoin de grillage le long du mur). On note x la largeur des deux côtés perpendiculaires au mur.
    a) Exprimer la longueur du troisième côté en fonction de x.
    b) Pour quelles valeurs de x l'enclos est-il réalisable ?
    c) Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos en fonction de x.
    d) Démontrer que $A(x) = -2(x - 10)^2 + 200$.
    e) En déduire la valeur de x qui rend l'aire maximale et donner cette aire maximale.
21. **Inégalité remarquable arithmético-géométrique.** Pour tout réel strictement positif $x > 0$, on pose $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
    a) Développer l'expression $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$.
    b) En déduire que pour tout $x > 0$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
    c) Pour quelle valeur de x cette inégalité devient-elle une égalité exacte ?
22. **Point fixe d'une fonction.** On appelle point fixe d'une fonction f un nombre x tel que $f(x) = x$. Déterminer tous les points fixes des fonctions de référence :
    a) $f(x) = x^2$ b) $g(x) = \frac{1}{x}$ c) $h(x) = \sqrt{x}$ d) $k(x) = x^3$.

Solutions

1. $f(0) = 3$. $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$. $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. $f(-1) = (-1)^2 - 4(-1) + 3 = 1 + 4 + 3 = 8$.
2. Dénominateur non nul : $x - 7 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 7$. Donc $\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{7\}$.
3. Quantité sous la racine positive ou nulle : $2x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -8 \Leftrightarrow x \geq -4$. Donc $\mathcal{D}_h = [-4\,;+\infty[$.
4. $3x - 5 = 10 \Leftrightarrow 3x = 15 \Leftrightarrow x = 5$. L'antécédent est 5.
5. $f(-x) = 5(-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = 5x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$. La fonction est paire.
6. $g(-x) = (-x)^3 + 4(-x) = -x^3 - 4x = -(x^3 + 4x) = -g(x)$. La fonction est impaire.
7. $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = 5$ ou $x = -5$. $S = \{-5\,;5\}$.
8. $x^2 < 16 \Leftrightarrow -4 < x < 4$. $S =]-4\,;4[$.
9. $\frac{1}{x} = 5 \Leftrightarrow x = \frac{1}{5} = 0,2$.
10. $|-17| = 17$; $|3,14| = 3,14$; $|5 - 9| = |-4| = 4$.
11. a) $x^2 - 4x = x(x-4) \neq 0 \Longrightarrow x \neq 0$ et $x \neq 4$. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\,;4\}$.
    b) $10 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow 2x \leq 10 \Leftrightarrow x \leq 5$. $\mathcal{D}_g =]-\infty\,;5]$.
    c) $x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -3$ et dénominateur $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. $\mathcal{D}_h = [-3\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.
12. a) Le maximum global est 5, atteint en $x = -4$.
    b) Le minimum global est -3, atteint en $x = -1$.
    c) Sur $[-4\,;-1]$, f passe de 5 à -3, donc coupe 0 une fois. Sur $[-1\,;2]$, elle passe de -3 à 4, donc coupe 0 une deuxième fois. Sur $[2\,;4]$, les valeurs vont de 4 à 1 (toujours positives), donc elle ne coupe pas 0. L'équation $f(x) = 0$ admet donc exactement 2 solutions.

13. Forme canonique : $(x-3)^2-4 = x^2-6x+9-4 = x^2-6x+5$. Soient $3 \leq a < b$. Alors $0 \leq a-3 < b-3$. Comme la fonction carré est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$, on a $(a-3)^2 < (b-3)^2$. En retranchant 4 : $(a-3)^2-4 < (b-3)^2-4 \Leftrightarrow f(a) < f(b)$. L'ordre est conservé : f est strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$.
14. a) $x^2 \geq 9 \Leftrightarrow x \leq -3$ ou $x \geq 3$. $S =]-\infty\,;-3] \cup [3\,;+\infty[$.
    b) Pour $\frac{1}{x} \leq 3$:
    - Si $x < 0$, $\frac{1}{x} < 0 < 3$, donc tous les réels strictement négatifs sont solutions : $]-\infty\,;0[$.
    - Si $x > 0$, $\frac{1}{x} \leq 3 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3}$. L'ensemble des solutions est $S =]-\infty\,;0[\cup \left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$.
15. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ (car $x^2+1 > 0$). Centré en 0. $f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -f(x)$. La fonction est impaire.
16. $(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x}) = \sqrt{x}+4$, défini sur $[0\,;+\infty[$. $(f \circ g)(x) = f(x+4) = \sqrt{x+4}$, défini lorsque $x+4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -4$, donc sur $[-4\,;+\infty[$.
17. $|2x-3| = 7 \Leftrightarrow 2x-3 = 7$ ou $2x-3 = -7$. $2x = 10 \Longrightarrow x = 5$ ou $2x = -4 \Longrightarrow x = -2$. $S = \{-2\,;5\}$.
18. $|x-5|$ est la distance entre x et 5. On cherche les réels x dont la distance à 5 est inférieure ou égale à 2 : $5-2 \leq x \leq 5+2 \Leftrightarrow 3 \leq x \leq 7$. $S = [3\,;7]$.
19. a) $p(-x) = \frac{f(-x)+f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$, donc p est paire. $i(-x) = \frac{f(-x)-f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -\frac{f(x)-f(-x)}{2} = -i(x)$, donc i est impaire.
    b) $p(x)+i(x) = \frac{f(x)+f(-x)+f(x)-f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$. Toute fonction est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire !
    c) Pour $f(x) = 2x^2-3x+4$: $f(-x) = 2x^2+3x+4$. $p(x) = \frac{(2x^2-3x+4)+(2x^2+3x+4)}{2} = 2x^2+4$ (partie paire). $i(x) = \frac{(2x^2-3x+4)-(2x^2+3x+4)}{2} = \frac{-6x}{2} = -3x$ (partie impaire).
20. a) Soit x la largeur des deux côtés perpendiculaires. La longueur restante pour le côté opposé au mur est $40-2x$.
    b) Il faut $x > 0$ et $40-2x > 0 \Leftrightarrow 2x < 40 \Leftrightarrow x < 20$. Donc $x \in]0\,;20[$.
    c) Aire : $A(x) = x(40-2x) = 40x-2x^2$.
    d) Développons : $-2(x-10)^2+200 = -2(x^2-20x+100)+200 = -2x^2+40x-200+200 = 40x-2x^2 = A(x)$.
    e) Comme $(x-10)^2 \geq 0$, $-2(x-10)^2 \leq 0$, donc $A(x) \leq 200$. Le maximum est atteint lorsque le terme au carré s'annule, soit $x-10 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ m. L'aire maximale est de 200 m^2 (dimensions : 10 m $\times$ 20 m).
21. a) $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = (\sqrt{x})^2 - 2\times\sqrt{x}\times\frac{1}{\sqrt{x}} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = x-2+\frac{1}{x}$.
    b) Un carré est toujours positif ou nul : $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x-2+\frac{1}{x} \geq 0 \Leftrightarrow x+\frac{1}{x} \geq 2$.
    c) L'égalité a lieu si et seulement si $\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow (\sqrt{x})^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$.
22. a) $x^2 = x \Leftrightarrow x^2-x = 0 \Leftrightarrow x(x-1) = 0 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 1$.
    b) $\frac{1}{x} = x \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -1$.
    c) $\sqrt{x} = x$ pour $x \geq 0 \Leftrightarrow x = x^2 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 1$.
    d) $x^3 = x \Leftrightarrow x^3-x = 0 \Leftrightarrow x(x^2-1) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Longrightarrow x = 0, 1$ ou -1.

La question qui ouvre la suite

Dans l'exercice de l'éleveur, nous avons rencontré une expression remarquable : $A(x) = -2x^2+40x$. Pour trouver son sommet sans tâtonner, nous avons dû ruser en écrivant la fonction sous la forme $-2(x-10)^2+200$.

Cette famille de courbes — les paraboles associées aux trinômes ax^2+bx+c — régit le vol des obus, le jet des fontaines et les miroirs des télescopes. Comment trouver systématiquement leurs sommets et leurs racines sans faire d'artifice au hasard ? Quel est ce mystérieux nombre Δ que les géomètres ont découvert ? C'est ce que nous allons explorer dans **La Fontaine de Galilée et la Parabole**.

CHAPITRE 35 : La Fontaine de Galilée et la Parabole

> « Regarde l'eau jaillir de la vasque de marbre : elle s'élance avec fougue, semble hésiter un instant au sommet de son arche lumineuse, puis retombe en courbure gracieuse dans le bassin. Ce dessin parfait que la pesanteur trace dans l'air n'est pas un arc de cercle : c'est une parabole. Depuis les savants de Babylone et de Bagdad jusqu'à Galilée, l'art du second degré est la clé maîtresse qui ouvre la trajectoire des mondes. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi la trajectoire d'un jet d'eau ou d'un projectile soumis à la pesanteur forme obligatoirement une **parabole**.
- La métamorphose de l'expression : passer de la **forme développée** $ax^2 + bx + c$ à la **forme canonique** $a(x - \alpha)^2 + \beta$ grâce à la complétion du carré d'Al-Khwarizmi.
- Le **sommet** $S(\alpha\,;\beta)$ et l'axe de symétrie d'une parabole.
- Le mystère dévoilé du **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$: la démonstration pas à pas qui explique pourquoi il tranche entre 0, 1 ou 2 racines.
- La **forme factorisée** et la règle d'or du **signe du trinôme** (« du signe de a à l'extérieur des racines »).
- Les formules de **Viète** reliant les racines à leur somme $S = -\frac{b}{a}$ et à leur produit $P = \frac{c}{a}$.

---

1. Le problème : Galilée et le jet d'eau des jardins Médicis

À Florence, au début de l'été 1608, **Galileo Galilei** se promène dans les jardins de la villa Médicis. Son regard est attiré par une fontaine monumentale. Un ajutage de cuivre incline un jet d'eau à quarante-cinq degrés : un mince filet cristallin jaillit, monte vers le ciel, s'arrondit à son zénith puis plonge dans le bassin.

À cette époque, les traités d'artillerie hérités de la physique d'Aristote prétendaient qu'un boulet de canon avançait en ligne droite sous l'effet de l'explosion, s'arrêtait net en l'air une fois l'élan épuisé, puis tombait verticalement vers le sol !

Galilée sait que cette vision est absurde. Il décompose le mouvement de chaque gouttelette d'eau en deux actions simultanées et indépendantes : 1. **À l'horizontale (x) :** Aucun obstacle ne freine l'eau (en négligeant le frottement de l'air). La goutte avance à vitesse constante v_0 :

$$x(t) = v_0 \times t.$$

2. **À la verticale (y) :** La Terre attire la gouttelette vers le bas avec une accélération constante g. D'après la loi de la chute des corps découverte par Galilée, l'altitude diminue proportionnellement au **carré du temps écoulé** :

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h_0.$$



Fig. 88. – Parabole du second degré : orientation et coordonnées du sommet

Éliminons le temps t ! De la première équation, nous tirons $t = \frac{x}{v_0}$. En injectant cette valeur dans la seconde équation, l'altitude y en fonction de la distance horizontale x devient :

$$y = -\frac{g}{2v_0^2}x^2 + h_0.$$

C'est une équation où l'altitude dépend du **carré** de la distance parcourue : une fonction polynôme du **second degré**. La courbe obtenue n'est ni un cercle ni une ellipse : c'est une **parabole**.

Pour calculer la hauteur maximale atteinte par l'eau, ou pour savoir à quelle distance exacte le jet frappera le miroir du bassin ($y = 0$), nous avons besoin de maîtriser l'algèbre des trinômes du second degré.

---

2. Le trinôme du second degré et la forme canonique

2.1 Définitions et forme développée

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Fonction polynôme du second degré.** On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où a, b, c sont des nombres réels fixés, avec $\boldsymbol{a \neq 0}$. Cette écriture est appelée la **forme développée** du trinôme.

- Le terme a est le coefficient de degré 2 (il est obligatoire que $a \neq 0$, sinon l'expression deviendrait affine $bx + c$).
- Le terme b est le coefficient de degré 1.
- Le terme c est le terme constant (l'ordonnée à l'origine, car $f(0) = c$).

2.2 La complétion du carré : l'héritage d'Al-Khwarizmi

Comment trouver le sommet d'une parabole sans tâtonner ? L'idée géniale remonte au mathématicien persan **Al-Khwarizmi** (vers 820 à Bagdad) : il s'agit de reconstituer géométriquement un carré parfait pour que la variable x n'apparaisse plus qu'**une seule fois** dans toute l'expression !

📐 Théorème fondamental — La forme canonique.

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) peut s'écrire de manière unique sous la **forme canonique** :

$$\boxed{f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta}$$

avec :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

✍ Démonstration (exigible) — Mise sous forme canonique.

Partons de la forme développée :

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

1. Factorisons le coefficient $a \neq 0$ dans les deux premiers termes :

$$f(x) = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x\right] + c.$$

2. Regardons l'expression entre crochets : $x^2 + \frac{b}{a}x$ ressemble au début du développement d'une identité remarquable $(x + d)^2 = x^2 + 2dx + d^2$. Pour que le double produit $2dx$ soit égal à $\frac{b}{a}x$, il faut choisir $d = \frac{b}{2a}$. On a alors :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + 2\left(\frac{b}{2a}\right)x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}.$$

On en déduit que :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

3. Remplaçons cette égalité dans l'expression de $f(x)$:

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right] + c.$$

4. Développons le crochet par a :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a \times \frac{b^2}{4a^2} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a}.$$

5. Regroupons les deux derniers termes au même dénominateur $4a$:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

En posant $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$, on obtient la forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta. \quad \blacksquare$$

---

3. Géométrie de la parabole : sommet et axe de symétrie

Grâce à la forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, les propriétés géométriques de la courbe deviennent transparentes : Puisqu'un carré est toujours positif ou nul :

$$(x - \alpha)^2 \geq 0 \quad \text{pour tout} \quad x \in \mathbb{R},$$

avec égalité si et seulement si $x = \alpha$.

Deux cas se présentent selon le signe de a :

1. **Si $a > 0$:** $a(x-\alpha)^2 \geq 0$, donc $f(x) \geq \beta$. La fonction admet un **minimum absolu** égal à β, atteint en $x = \alpha$. La parabole a ses **branches tournées vers le haut** (forme de cuvette). f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ et strictement croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$.
2. **Si $a < 0$:** $a(x-\alpha)^2 \leq 0$, donc $f(x) \leq \beta$. La fonction admet un **maximum absolu** égal à β, atteint en $x = \alpha$. La parabole a ses **branches tournées vers le bas** (forme de colline). f est strictement croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ et strictement décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$.

📐 Propriétés fondamentales de la parabole —

- Le **sommet** de la parabole est le point $S(\alpha\,;\beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
- La droite verticale d'équation $x = \alpha$ est l'**axe de symétrie** de la parabole.

---

4. L'équation du second degré et le discriminant Δ

Résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ revient géométriquement à chercher les points où la parabole traverse l'axe des abscisses ($y = 0$).

4.1 La naissance du discriminant

Reprenons l'étape 3 de la mise sous forme canonique :

$$a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] = 0.$$

Puisque $a \neq 0$, cette équation équivaut à :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Le membre de gauche est un carré : il est toujours positif ou nul. Le dénominateur du membre de droite, $4a^2 = (2a)^2$, est strictement positif. Tout dépend donc exclusivement du signe du numérateur :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Discriminant.** Le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$ est appelé le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$. La lettre grecque Δ (« delta » majuscule) a été choisie par les mathématiciens du XIX^{e} siècle car elle est l'initiale de *discriminare* en latin, qui signifie « séparer », « distinguer ». Il discrimine les cas possibles.

4.2 Les trois cas fondamentaux

Théorème fondamental — Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$.

1. **Si $\Delta < 0$:** Le membre de droite $\frac{\Delta}{4a^2}$ est strictement négatif. Or un carré réel ne peut jamais être négatif. L'équation n'a **aucune solution réelle** ($S = \varnothing$). La parabole ne touche jamais l'axe des abscisses.
2. **Si $\Delta = 0$:** L'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $x + \frac{b}{2a} = 0$. L'équation admet **une unique solution réelle** (appelée racine double) :
$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$
Le sommet de la parabole repose exactement sur l'axe des abscisses (la droite est tangente à la courbe).
3. **Si $\Delta > 0$:** Le nombre Δ admet une racine carrée réelle $\sqrt{\Delta} > 0$. L'égalité devient :
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2 = 0.$$
Par identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:
$$\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = 0.$$
D'après la règle du produit nul, l'équation admet **deux solutions réelles distinctes** :
$$\boxed{x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}} \quad \text{et} \quad \boxed{x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}}.$$
La parabole coupe l'axe des abscisses en deux points distincts d'abscisses x_1 et x_2.

---

5. Forme factorisée et signe du trinôme

5.1 La forme factorisée

Connaissant les racines d'un trinôme, on peut l'écrire sous forme d'un produit de facteurs du premier degré :

Théorème — Forme factorisée.

- Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ ne peut pas se factoriser en produit de facteurs du premier degré dans $\mathbb{R}$.

Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! Ne jamais oublier le facteur a !** C'est l'erreur la plus fréquente : écrire $(x - x_1)(x - x_2)$ en oubliant de multiplier par le coefficient a devant. Par exemple, $2x^2 - 6x + 4 = 0$ a pour racines 1 et 2. Sa forme factorisée est $2(x - 1)(x - 2)$, et non pas $(x - 1)(x - 2)$ (qui donnerait $x^2 - 3x + 2$).

5.2 Le signe du trinôme

📐 Règle d'or — Signe de ax^2+bx+c.

1. **Si $\Delta<0$:** Le trinôme ne s'annule jamais. Il est **toujours du signe de a** sur tout $\mathbb{R}$.
2. **Si $\Delta=0$:** Le trinôme s'annule en $x_0=-\frac{b}{2a}$ et est **du signe de a partout ailleurs**.
3. **Si $\Delta>0$:** (en supposant $x_1<x_2$) Le trinôme est :
   - **du signe de a à l'extérieur des racines** (pour $x<x_1$ et pour $x>x_2$) ;
   - **du signe opposé de a (signe de $-a$) entre les racines** (pour $x_1<x<x_2$).

Tableau de signes récapitulatif pour $\Delta>0$:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
Signe de ax^2+bx+c		***signe de a***	0	***signe de $-a$***	0	***signe de a***	

Intuition géométrique éclatante : Si $a>0$, la parabole a les bras levés vers le ciel. Pour descendre sous l'axe des abscisses, elle doit plonger entre les deux racines : la cuvette est sous l'axe (négative) uniquement *entre* x_1 et x_2. Partout ailleurs, elle est au-dessus (positive) !

---

6. Les relations de Viète : somme et produit des racines

En 1591, le juriste et conseiller secret d'Henri IV, **François Viète**, découvre des liens fascinants reliant directement les coefficients d'un polynôme à ses racines, sans passer par le calcul de Δ.

📐 Théorème (Formules de Viète) —

Si le trinôme ax^2+bx+c admet deux racines réelles x_1 et x_2 (éventuellement confondues), alors :

$$\boxed{S=x_1+x_2=-\frac{b}{a}} \quad \text{et} \quad \boxed{P=x_1\times x_2=\frac{c}{a}}.$$

✍️ Démonstration —

Développons la forme factorisée $a(x-x_1)(x-x_2)$:

$$a(x-x_1)(x-x_2)=a\left[x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2\right]=ax^2-a(x_1+x_2)x+a(x_1x_2).$$

Par identification avec la forme développée ax^2+bx+c :

$$-a(x_1+x_2)=b \Longrightarrow x_1+x_2=-\frac{b}{a},$$

$$a(x_1x_2)=c \Longrightarrow x_1x_2=\frac{c}{a}. \quad \blacksquare$$

6.1 Trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit

Deux nombres u et v ont pour somme S et pour produit P si et seulement s'ils sont les solutions de l'équation :

$$\boxed{X^2-SX+P=0}$$

6.2 L'art de repérer les racines évidentes

Avant de te précipiter sur le discriminant, cherche toujours s'il existe une **racine évidente** :

- **Si $a+b+c=0$**, alors $x_1=1$ est racine évidente. La seconde racine vaut alors immédiatement $x_2=\frac{c}{a}$.
- **Si $a-b+c=0$**, alors $x_1=-1$ est racine évidente. La seconde racine vaut $x_2=-\frac{c}{a}$.
- **Si $c=0$**, alors $x_1=0$ est racine évidente, et $x_2=-\frac{b}{a}$.

---

7. Exemples résolus détaillés

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Mise sous forme canonique pratique. Mettre sous forme canonique le trinôme $P(x)=2x^2-8x+11$. En déduire le sommet de la parabole et son extremum.

Solution : 1. Factorisons le coefficient $a=2$ sur les termes en x :

$$P(x)=2(x^2-4x)+11.$$

2. Complétons le carré : $x^2-4x=(x-2)^2-4$. 3. Remplaçons :

$$P(x)=2\big[(x-2)^2-4\big]+11=2(x-2)^2-8+11=2(x-2)^2+3.$$

Conclusion : La forme canonique est $\boxed{P(x)=2(x-2)^2+3}$. Ici $\alpha=2$ et $\beta=3$. Le sommet de la parabole est le point $S(2\,;3)$. Comme $a=2>0$, la fonction admet un **minimum absolu valant 3**, atteint en $x=2$. (Remarque : comme son minimum est $3>0$, la parabole ne descend jamais sous 0, donc $P(x)=0$ n'a aucune solution réelle).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Résolution d'équations avec le discriminant. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les trois équations suivantes : a) $3x^2-5x-2=0$ b) $4x^2-12x+9=0$ c) $2x^2+3x+5=0$

Solution pas à pas : a) $a=3, b=-5, c=-2$.

$$\Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4(3)(-2)=25+24=49.$$

Comme $\Delta=49>0$, il y a deux solutions réelles distinctes ($\sqrt{\Delta}=7$) :

$$x_1=\frac{-(-5)-7}{2(3)}=\frac{5-7}{6}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3},$$

$$x_2=\frac{-(-5)+7}{2(3)}=\frac{5+7}{6}=\frac{12}{6}=2.$$

$S=\left\{-\frac{1}{3}\,;2\right\}$. Forme factorisée : $3\big(x+\frac{1}{3}\big)(x-2)=(3x+1)(x-2)$.

b) $a=4, b=-12, c=9$.

$$\Delta=(-12)^2-4(4)(9)=144-144=0.$$

Comme $\Delta=0$, il y a une unique racine double :

$$x_0=-\frac{b}{2a}=-\frac{-12}{2(4)}=\frac{12}{8}=\frac{3}{2}.$$

$S=\left\{\frac{3}{2}\right\}$. Forme factorisée : $4\big(x-\frac{3}{2}\big)^2=(2x-3)^2$.

c) $a=2, b=3, c=5$.

$$\Delta=3^2-4(2)(5)=9-40=-31<0.$$

Comme $\Delta<0$, l'équation n'a aucune solution réelle : $S=\varnothing$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Résolution d'une inéquation du second degré. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$-2x^2 + 7x - 3 \geq 0.$$

Solution : 1. Cherchons d'abord les racines du trinôme :

$$\Delta = 7^2 - 4(-2)(-3) = 49 - 24 = 25 > 0 \Longrightarrow \sqrt{\Delta} = 5.$$

$$x_1 = \frac{-7-5}{2(-2)} = \frac{-12}{-4} = 3, \quad x_2 = \frac{-7+5}{2(-2)} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}.$$

2. Appliquons la règle du signe du trinôme : Ici, $a = -2 < 0$. Le trinôme est du signe de a (donc négatif) à l'extérieur des racines, et du signe opposé (donc positif) entre les racines. 3. Tableau de signes :

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$-2x^2 + 7x - 3$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On veut que l'expression soit ≥ 0. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle fermé : $\boxed{S = \left[\frac{1}{2}\,;3\right]}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Utilisation des racines évidentes et de Viète. Résoudre mentalement l'équation $15x^2 - 2x - 17 = 0$.

Solution : Testons la somme des coefficients : $a = 15, b = -2, c = -17$. Calculons $a - b + c = 15 - (-2) + (-17) = 15 + 2 - 17 = 0$. D'après le §6.2, $x_1 = -1$ est une racine évidente ! Le produit des racines est $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{17}{15}$. Puisque $x_1 = -1$, on a $(-1) \times x_2 = -\frac{17}{15} \Longrightarrow x_2 = \frac{17}{15}$. Les solutions sont donc instantanément $\boxed{S = \left\{-1\,;\frac{17}{15}\right\}}$, sans poser aucun calcul de discriminant !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Trouver deux dimensions à partir du périmètre et de l'aire. Un terrain rectangulaire a un demi-périmètre de $29 \ \text{mètres}$ et une superficie de $198\ \text{m}^2$. Quelles sont les dimensions de ce terrain ?

Solution : Soient L et ℓ la longueur et la largeur. On connaît leur somme $S = L + \ell = 29$ et leur produit $P = L \times \ell = 198$. D'après le théorème de Viète, L et ℓ sont les solutions de l'équation :

$$X^2 - 29X + 198 = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-29)^2 - 4(1)(198) = 841 - 792 = 49 > 0.$$

$\sqrt{\Delta} = 7$. Les solutions sont :

$$X_1 = \frac{29-7}{2} = \frac{22}{2} = 11, \quad X_2 = \frac{29+7}{2} = \frac{36}{2} = 18.$$

Les dimensions du terrain sont donc de $\mathbf{18 \ \ mètres \ sur \ 11 \ \ mètres}$. *(Vérification : demi-périmètre* $18 + 11 = 29 \ \ \text{m}$ *; aire* $18 \times 11 = 198\ \text{m}^2$*).*

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Équation bicarrée se ramenant au second degré. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$x^4 - 5x^2 - 36 = 0.$$

Solution : Cette équation est de degré 4, mais elle ne contient que des puissances paires ($x^4 = (x^2)^2$). Faisons le **changement de variable** : posons $X = x^2$ (avec la contrainte indispensable $X \geq 0$). L'équation devient une équation du second degré en X :

$$X^2 - 5X - 36 = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-5)^2 - 4(1)(-36) = 25 + 144 = 169 = 13^2.$$

Les racines en X sont :

$$X_1 = \frac{5 - 13}{2} = \frac{-8}{2} = -4, \quad X_2 = \frac{5 + 13}{2} = \frac{18}{2} = 9.$$

Revenons maintenant à la variable d'origine x :

- Pour $X_1 = -4$: l'équation $x^2 = -4$ n'a aucune solution réelle car un carré est positif.
- Pour $X_2 = 9$: l'équation $x^2 = 9$ donne immédiatement $x = -3$ ou $x = 3$. L'ensemble des solutions réelles de l'équation de départ est $\boxed{S = \{-3\,;3\}}$.

---

8. En informatique : le résolveur de second degré en Python

Voici un script Python qui implémente l'algorithme complet d'analyse d'un trinôme :

```python
import math

def analyser_trinome(a, b, c):
    """Analyse complète du trinôme a*x^2 + b*x + c."""
    if a == 0:
        return "Erreur : ce n'est pas un trinôme du second degré (a = 0)."

    # 1. Sommet de la parabole
    alpha = -b / (2 * a)
    beta = a * alpha**2 + b * alpha + c
    print(f"Sommet S: ({alpha:.3f}, {beta:.3f})")
    print(f"Orientation : branches tournées vers le {'HAUT' if a > 0 else 'BAS'}")

    # 2. Discriminant
    delta = b**2 - 4 * a * c
    print(f"Discriminant Delta = {delta}")

    if delta > 0:
        x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
        x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
        print(f"Deux racines distinctes : x1 = {x1:.3f} et x2 = {x2:.3f}")
        print(f"Forme factorisée : {a} * (x - {x1:.3f}) * (x - {x2:.3f})")
    elif delta == 0:
        x0 = -b / (2 * a)
        print(f"Une racine double : x0 = {x0:.3f}")
        print(f"Forme factorisée : {a} * (x - {x0:.3f})^2")
    else:
        print("Aucune racine réelle.")
        print("Pas de factorisation dans R.")

# Exemple d'appel : 2x^2 - 7x + 3
analyser_trinome(2, -7, 3)
```

Ce qu'il faut retenir

1. **Forme développée :** $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).
2. **Forme canonique :** $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec :
$$\alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}.$$
   - Sommet de la parabole : $S(\alpha\,;\beta)$.
   - Axe de symétrie : $x = \alpha$.
   - Branches vers le haut si $a > 0$ (minimum β), vers le bas si $a < 0$ (maximum β).
3. **Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:**
   - $\Delta > 0$: 2 racines distinctes $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.
   - $\Delta = 0$: 1 racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
   - $\Delta < 0$: 0 racine réelle.
4. **Forme factorisée :**
   - Si $\Delta > 0$: $a(x-x_1)(x-x_2)$.
   - Si $\Delta = 0$: $a(x-x_0)^2$.
5. **Signe du trinôme :**
   - Toujours du signe de a, **sauf entre les racines** (si $\Delta > 0$) où il est du signe de $-a$.
6. **Relations de Viète :**

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}, \quad X^2 - SX + P = 0.$$

Exercices

Exercices d'application directe ()

1. Calculer le discriminant Δ du trinôme $f(x) = x^2 - 6x + 8$.
2. Calculer le discriminant Δ du trinôme $g(x) = 2x^2 + 4x + 5$.
3. Déterminer les coordonnées du sommet S de la parabole d'équation $y = 3(x-4)^2 + 7$.
4. Déterminer les coordonnées du sommet S de la parabole d'équation $y = -2x^2 + 8x - 3$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 9x + 20 = 0$.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 1 = 0$.
7. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 + x + 2 = 0$.
8. Donner la forme factorisée de $2x^2 - 10x + 12$.
9. Donner le tableau de signes du trinôme $P(x) = x^2 - 4x - 5$.
10. Trouver mentalement les racines de $2x^2 + 3x - 5 = 0$ à l'aide des racines évidentes.

Exercices d'entraînement et de réflexion ()

11. Mettre sous forme canonique les trinômes :
    a) $f(x) = x^2 - 10x + 21$ b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 7$
12. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :
    a) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ b) $-x^2 + 2x + 8 > 0$ c) $2x^2 - 3x + 5 > 0$
13. Trouver deux nombres réels connaissant leur somme $S = 13$ et leur produit $P = 40$.
14. Pour quelles valeurs du paramètre réel m l'équation $x^2 + (m+1)x + 4 = 0$ admet-elle une racine double ?
15. Résoudre l'équation rationnelle : $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{x+2}{x-1}$.
16. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation bicarrée : $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
17. Une balle de tennis est frappée à une hauteur de 1 mètre. Sa trajectoire est donnée par $h(x) = -0,05x^2 + 0,8x + 1$, où x est la distance horizontale parcourue en mètres et $h(x)$ la hauteur en mètres.
    a) Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
    b) À quelle distance horizontale la balle retombe-t-elle au sol ($h(x) = 0$) ?
18. Déterminer les points d'intersection entre la parabole d'équation $y = x^2 - 3x + 2$ et la droite d'équation $y = 2x - 4$.

Exercices d'approfondissement et défis ()

19. **La formule du discriminant réduit Δ'.** Lorsque le coefficient b est pair, on peut poser $b = 2b'$.
    a) Démontrer que $\Delta = 4(b'^2 - ac)$.
    b) En posant $\Delta' = b'^2 - ac$, démontrer que les racines s'écrivent simplement $x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$.
    c) Utiliser cette formule allégée pour résoudre $x^2 - 14x + 45 = 0$ et $5x^2 - 6x - 8 = 0$.
20. **Position relative de deux paraboles.** On considère les paraboles $\mathcal{P}_1 : y = x^2 - 4x + 3$ et $\mathcal{P}_2 : y = -x^2 + 2x + 11$.
    a) Déterminer les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes.
    b) Étudier le signe de la différence et en déduire sur quel intervalle $\mathcal{P}_1$ est située au-dessous de $\mathcal{P}_2$.
21. **Optimisation d'un maître nageur.** Un maître-nageur délimite une zone de baignade rectangulaire le long d'une plage rectiligne à l'aide d'une ligne de bouées de 160 mètres de long (le côté plage n'est pas balisé). Quelles doivent être les dimensions de la zone pour que la surface de baignade soit la plus grande possible ?
22. **La boîte sans couvercle de Tartaglia.** Dans une plaque de carton carrée de 30 cm de côté, on découpe quatre petits carrés identiques de côté x aux quatre coins, puis on relève les bords pour former une boîte rectangulaire sans couvercle.
    a) Quelles sont les valeurs possibles pour x ?
    b) Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x.

c) Développer l'expression et chercher pour quelle valeur entière de x le volume semble maximal en testant $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Solutions

1. $\Delta = (-6)^2 - 4(1)(8) = 36 - 32 = 4$.
2. $\Delta = 4^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24$.
3. L'équation est déjà sous forme canonique : le sommet est directement $S(4\,;7)$.
4. $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2(-2)} = 2$. $\beta = -2(2)^2 + 8(2) - 3 = -8 + 16 - 3 = 5$. Donc $S(2\,;5)$.
5. $\Delta = (-9)^2 - 4(1)(20) = 81 - 80 = 1$. $x_1 = \frac{9-1}{2} = 4, x_2 = \frac{9+1}{2} = 5$. $S = \{4\,;5\}$.
6. Identité remarquable : $(x+1)^2 = 0 \Longrightarrow x_0 = -1$. $S = \{-1\}$.
7. $\Delta = 1^2 - 4(3)(2) = 1 - 24 = -23 < 0$. Aucune solution réelle : $S = \varnothing$.
8. Racines de $2x^2 - 10x + 12 = 0$: $\Delta = 100 - 96 = 4$. $x_1 = 2, x_2 = 3$. Forme factorisée : $2(x-2)(x-3)$.
9. Racines de $x^2 - 4x - 5$: $a - b + c = 1 - (-4) - 5 = 0 \Longrightarrow x_1 = -1$ et $x_2 = 5$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif entre -1 et 5, et positif à l'extérieur : positif sur $]-\infty\,;-1[\cup]5\,;+\infty[$, nul en -1 et 5, négatif sur $]-1\,;5[$.
10. $a + b + c = 2 + 3 - 5 = 0 \Longrightarrow x_1 = 1$. Produit $P = \frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$, donc $x_2 = -\frac{5}{2} = -2,5$. $S = \left\{-\frac{5}{2}\,;1\right\}$.
11. a) $x^2 - 10x + 21 = (x-5)^2 - 25 + 21 = (x-5)^2 - 4$.
    b) $-3x^2 + 12x - 7 = -3(x^2 - 4x) - 7 = -3[(x-2)^2 - 4] - 7 = -3(x-2)^2 + 12 - 7 = -3(x-2)^2 + 5$.
12. a) Racines : 2 et 3. $a = 1 > 0$. Négatif entre les racines : $S = [2\,;3]$.
    b) $-x^2 + 2x + 8 = 0 \Longrightarrow \Delta = 4 - 4(-1)(8) = 36$. Racines : $x_1 = \frac{-2-6}{-2} = 4, x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2$. $a = -1 < 0$, donc positif entre les racines : $S =]-2\,;4[$.
    c) $\Delta = 9 - 4(2)(5) = -31 < 0$. Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$: $S = \mathbb{R}$.
13. Équation $X^2 - 13X + 40 = 0$. $\Delta = 169 - 160 = 9$. $X_1 = \frac{13-3}{2} = 5, X_2 = \frac{13+3}{2} = 8$. Les nombres sont 5 et 8.
14. Racine double $\Leftrightarrow \Delta = 0$. $\Delta = (m+1)^2 - 4(1)(4) = (m+1)^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (m+1)^2 = 16 \Leftrightarrow m + 1 = 4$ ou $m + 1 = -4$. Donc $m = 3$ ou $m = -5$.
15. Valeurs interdites : $x \neq -1$ et $x \neq 1$. Produit en croix : $(2x-1)(x-1) = (x+2)(x+1)$. $2x^2 - 3x + 1 = x^2 + 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 6x - 1 = 0$. $\Delta = 36 - 4(1)(-1) = 40$. $x = \frac{6 \pm 2\sqrt{10}}{2} = 3 \pm \sqrt{10}$. Comme ces deux nombres sont distincts de 1 et -1, $S = \left\{3 - \sqrt{10}\,;3 + \sqrt{10}\right\}$.
16. Posons $X = x^2 \geq 0$. $X^2 - 13X + 36 = 0$. $\Delta = 169 - 144 = 25$. $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4, X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$. $x^2 = 4 \Longrightarrow x = \pm 2$; $x^2 = 9 \Longrightarrow x = \pm 3$. $S = \{-3\,;-2\,;2\,;3\}$.
17. a) Sommet : $\alpha = -\frac{0{,}8}{2(-0{,}05)} = \frac{0{,}8}{0{,}1} = 8$ mètres. Hauteur maximale : $\beta = h(8) = -0{,}05(64) + 0{,}8(8) + 1 = -3{,}2 + 6{,}4 + 1 = 4{,}2$ mètres.
    b) $h(x) = 0 \Leftrightarrow -0{,}05x^2 + 0{,}8x + 1 = 0$. Multiplions par -20 : $x^2 - 16x - 20 = 0$. $\Delta = 256 + 80 = 336$. $\sqrt{336} \approx 18{,}33$. $x = \frac{16 + 18{,}33}{2} \approx 17{,}17$ mètres (l'autre racine est négative). La balle retombe à environ $17{,}17$ m.
18. $x^2 - 3x + 2 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x-3) = 0$. Abscisses : $x = 2$ et $x = 3$. Ordonnées : pour $x = 2$, $y = 2(2) - 4 = 0$; pour $x = 3$, $y = 2(3) - 4 = 2$. Points d'intersection : $A(2\,;0)$ et $B(3\,;2)$.
19. a) $\Delta = (2b')^2 - 4ac = 4b'^2 - 4ac = 4(b'^2 - ac)$.
    b) $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{b'^2 - ac} = 2\sqrt{\Delta'}$. $x = \frac{-2b' \pm 2\sqrt{\Delta'}}{2a} = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$.
    c) Pour $x^2 - 14x + 45 = 0$: $b' = -7$, $\Delta' = 49 - 45 = 4$. $x = 7 \pm 2 \Longrightarrow S = \{5\,;9\}$. Pour $5x^2 - 6x - 8 = 0$: $b' = -3$, $\Delta' = 9 - 5(-8) = 49$. $x = \frac{3 \pm 7}{5} \Longrightarrow S = \{-0{,}8\,;2\}$.
20. a) $x^2 - 4x + 3 = -x^2 + 2x + 11 \Leftrightarrow 2x^2 - 6x - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$. Racines évidentes ($a - b + c = 1 - (-3) - 4 = 0$) : $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$.
    b) $\mathcal{P}_1$ est au-dessous de $\mathcal{P}_2 \Leftrightarrow \mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_2 \leq 0 \Leftrightarrow 2(x+1)(x-4) \leq 0$. Comme le coefficient $2 > 0$, l'expression est négative entre les racines : sur $[-1\,;4]$.
21. Soit x la largeur des deux côtés perpendiculaires à la plage. La longueur est $160 - 2x$. Aire : $A(x) = x(160 - 2x) = -2x^2 + 160x$. C'est un trinôme avec $a = -2 < 0$. Son maximum est atteint au sommet : $x = -\frac{160}{2(-2)} = 40$ mètres. La longueur est alors $160 - 2(40) = 80$ mètres. Dimensions optimales : 40 m $\times$ 80 m (aire maximale : 3200 m^2).

22. a) $x > 0$ et $2x < 30 \Leftrightarrow x < 15$. Donc $x \in]0\,;15[$.
    b) La base est un carré de côté $30 - 2x$ et la hauteur est x. $V(x) = x(30-2x)^2 = x(900 - 120x + 4x^2) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.
    c) Calculons pour quelques valeurs : $V(1) = 1(28)^2 = 784$ cm^3 ; $V(3) = 3(24)^2 = 1728$ cm^3 ; $V(5) = 5(20)^2 = 2000$ cm^3 ; $V(6) = 6(18)^2 = 1944$ cm^3. Le volume semble maximal pour $x = 5$ cm, atteignant 2000 cm^3 (soit 2 litres !).

La question qui ouvre la suite

Le second degré nous a appris à prédire l'arche continue d'un jet d'eau dans l'espace. Mais dans le monde réel, tous les phénomènes ne s'écoulent pas comme un fleuve continu :

- Un compte bancaire produit des intérêts à chaque fin de mois ;
- Une colonie de bactéries double à chaque heure ;
- Un escalier se gravit marche par marche, $0, 1, 2, 3\ldots$

Comment étudier une quantité qui progresse par bonds successifs dans le temps ? Comment calculer la somme de mille marches sans s'épuiser ? C'est ce que nous allons découvrir dans **Les Marches de l'Escalier et le Prêt de l'Usurier**.

CHAPITRE 36 : Les Marches de l'Escalier et le Prêt de l'Usurier

> « Une courbe continue coule comme l'eau d'une rivière, sans jamais lever la plume du papier. Mais le temps des hommes avance par saccades : les battements du cœur, les tic-tacs de l'horloge, les marches d'un escalier de pierre et les intérêts qui tombent à la fin du mois. Une suite numérique est un voyage où chaque pas s'appuie sur le précédent pour s'élancer vers l'infini. »

Ce que tu vas découvrir

- La différence fondamentale entre une grandeur continue et une **suite numérique** indexée par les entiers naturels $n \in \mathbb{N}$.
- Les deux grandes façons d'engendrer une suite : la formule **explicite** $u_n = f(n)$ et la relation de **récurrence** $u_{n+1} = g(u_n)$.
- Les **suites arithmétiques** : l'escalier régulier où l'on ajoute toujours la même raison r, et l'astuce légendaire du jeune **Carl Friedrich Gauss** pour sommer les entiers.
- Les **suites géométriques** : la multiplication en chaîne par la raison q, le vertige du prêt à intérêts et le piège de l'échiquier de Sissa.
- Comment déterminer le **sens de variation** d'une suite et appréhender intuitivement sa **limite** à l'infini.
- La programmation d'un **algorithme de seuil** en Python pour savoir quand une quantité dépasse un plafond donné.

---

1. Le problème : les deux banquiers de Florence

Dans la Florence de la Renaissance, deux marchands d'étoffes, Matteo et Cosimo, cherchent un financement pour affréter une caravelle vers l'Orient. Chacun a besoin d'emprunter 1 000 florins d'or pour une durée de 10 ans.
Ils s'adressent à deux prêteurs sur le Ponte Vecchio :

Échéance	Contrat Matteo (Prêt arithmétique : +100 / an)	Contrat Cosimo (Prêt géométrique : +10 % / an)
Année 0	1 000 florins	1 000 florins
Année 1	1 100 florins	1 100 florins
Année 2	1 200 florins	1 210 florins
Année 3	1 300 florins	1 331 florins
Année 10	2 000 florins	**2 593,74 florins !**

Regarde attentivement ce qui s'est produit :

- Pour Matteo, chaque année ajoute **le même montant fixe** : $+100$ florins. C'est un escalier régulier. En 10 ans, il paie $1\,000 + 10 \times 100 = 2\,000$ florins.
- Pour Cosimo, la première année semble identique ($+100$ florins). Mais la deuxième année, les $10\,\%$ s'appliquent sur les 1 100 florins déjà dus : la dette grossit de 110 florins ! La troisième année, les $10\,\%$ s'appliquent sur 1 210 florins ($+121$ florins). Les intérêts font des petits qui font eux-mêmes des petits : c'est le mécanisme redoutable des **intérêts composés**. En 10 ans, Cosimo doit près de 2 594 florins, soit $60\,\%$ de plus que Matteo !

Ces deux contrats incarnent les deux familles royales des suites discrètes :

- Les **suites arithmétiques**, gouvernées par l'**addition répétée**.
- Les **suites géométriques**, propulsées par la **multiplication répétée**.

---

2. Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

2.1 Définition et notations

Une fonction usuelle $f(x)$ accepte n'importe quel nombre réel : $x = 0$, $x = 1,5$, $x = \sqrt{2}$, $x = \pi$… Une **suite** est beaucoup plus sobre : elle n'accepte que des **numéros d'ordre entiers** : $0, 1, 2, 3, 4$...

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Suite numérique.** Une **suite numérique** est une fonction dont l'ensemble de départ est l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$ débutant à un certain rang n_0). Pour tout entier naturel n, l'image de n se note en **indice** :

$$u_n \quad (\text{au lieu de } \ u(n)) \ .$$

On lit à voix haute : « u indice n ».

- n est le **rang** (ou l'**indice**).
- u_n est le **terme de rang n** (ou terme général).
- La suite tout entière se note entre parenthèses : (u_n) ou $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! Ne confonds jamais u_n et (u_n) !**

- u_n est un **nombre réel isolé** (par exemple $u_3 = 8$).
- (u_n) avec des parenthèses désigne **la suite tout entière**, la machine infinie qui engendre la liste $\{u_0, u_1, u_2, u_3, ...\}$.

2.2 Les deux modes d'engendrement

Mode 1 : La définition explicite ($u_n = f(n)$)

Le terme u_n est exprimé directement en fonction de l'entier n. *Exemple :* $u_n = 3n^2 - 1$. - Pour calculer u_0, on remplace n par 0 : $u_0 = 3(0)^2 - 1 = -1$. - Pour calculer u_{100}, nul besoin de calculer les 99 termes précédents : $u_{100} = 3(100)^2 - 1 = 30\,000 - 1 = 29\,999$.

Mode 2 : La définition par récurrence ($u_{n+1} = g(u_n)$)

On donne : 1. Le **premier terme** pour ancrer la suite (par exemple $u_0 = 2$). 2. Une **règle de passage** qui explique comment fabriquer le terme suivant à partir du terme actuel : $u_{n+1} = g(u_n)$. *Exemple :* $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. - $u_1 = 3u_0 - 4 = 3(2) - 4 = 2$. - $u_2 = 3u_1 - 4 = 3(2) - 4 = 2$. *(Ici la suite reste constante !)*

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! Dans une suite récurrente, on avance de proche en proche.** Pour calculer u_{10} avec une formule de récurrence, tu es obligé de calculer d'abord u_1, u_2, u_3... jusqu'à u_9. C'est le principe des dominos : chaque domino fait tomber le suivant.

2.3 Représentation graphique d'une suite

Puisque la variable n ne prend que des valeurs entières $(0, 1, 2, 3...)$, la représentation graphique d'une suite est un **nuage de points isolés** de coordonnées $(n\,;u_n)$. Il ne faut **jamais relier ces points d'un trait plein**, car les nombres réels intermédiaires (comme $n = 1,5$) n'ont aucun sens pour une suite !



Fig. 89. – Représentation graphique d'une suite numérique : nuage de points isolés

---

3. Les suites arithmétiques : l'escalier régulier

3.1 Définition et terme général

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Suite arithmétique.** Une suite (u_n) est dite **arithmétique** s'il existe un nombre réel fixe r, appelé la **raison**, tel que pour tout entier naturel n :

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$$

Pour passer d'une marche à la suivante, on ajoute toujours le même nombre r :

- $u_1 = u_0 + r$
- $u_2 = u_1 + r = (u_0 + r) + r = u_0 + 2r$
- $u_3 = u_2 + r = (u_0 + 2r) + r = u_0 + 3r$

En continuant ainsi jusqu'au rang n :

📐 Théorème — Formule explicite du terme général.

Si (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_n = u_0 + nr}$$

Si le premier terme est u_p (au rang p), la formule devient :

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Remarque : Les points d'une suite arithmétique sont tous alignés sur la droite d'équation $y = rx + u_0$. La raison r joue exactement le rôle du coefficient directeur (la pente) !

- Si $r > 0$: la suite est **strictement croissante**.
- Si $r < 0$: la suite est **strictement décroissante**.
- Si $r = 0$: la suite est **constante**.

3.2 L'escalier de Gauss : somme des entiers consécutifs

En 1784, dans une école de Brunswick en Allemagne, un maître d'école fatigué ordonne à ses élèves de sept ans d'additionner tous les nombres de 1 à 100 :

$$S = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 99 + 100.$$

Le maître espère avoir la paix pendant une heure. Mais au bout de quelques secondes, un jeune garçon pose son ardoise sur le pupitre en disant : *« Ligget se ! »* (« La voici ! »). Le résultat inscrit était $5\,050$, parfaitement exact.
Cet enfant s'appelait **Carl Friedrich Gauss**.

```
  1   +   2   +   3   + ... +  98  +  99  + 100
100   +  99   +  98   + ... +   3  +   2  +   1
-----------------------------------------------
101   + 101   + 101   + ... + 101  + 101  + 101   (100 fois la somme 101 !)
```

✍️ **Démonstration (exigible) — Somme des n premiers entiers.**

Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\boxed{1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}}$$

Preuve : Écrivons la somme S_n dans l'ordre croissant, puis juste en dessous dans l'ordre décroissant :

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-1) + n$$

$$S_n = n + (n-1) + (n-2) + \ldots + 2 + 1$$

Additionnons les deux lignes colonne par colonne :

$$2S_n = (1+n) + (2+n-1) + (3+n-2) + \ldots + (n+1).$$

Chaque paire entre parenthèses vaut exactement $n+1$. Combien y a-t-il de colonnes ? Il y en a exactement n. Donc :

$$2S_n = n \times (n+1) \Longrightarrow S_n = \frac{n(n+1)}{2}. \quad \blacksquare$$

Pour $n = 100$: $S_{100} = \frac{100 \times 101}{2} = 50 \times 101 = 5\,050$.

3.3 Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique

📐 **Théorème général — Somme arithmétique.**

Pour toute suite arithmétique :

$$\boxed{S = \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p + u_{p+1} + \ldots + u_n = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}}$$

où le nombre de termes est donné par : $\text{dernier indice} - \text{premier indice} + 1 = n - p + 1$.

---

4. Les suites géométriques : le vertige de la multiplication

4.1 Définition et terme général

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Suite géométrique.** Une suite (u_n) est dite **géométrique** s'il existe un nombre réel fixe q, appelé la **raison**, tel que pour tout entier naturel n :

$$\boxed{u_{n+1} = q \times u_n}$$

Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre q :

- $u_1 = q \times u_0$
- $u_2 = q \times u_1 = q \times (q u_0) = u_0 \times q^2$

- $u_3 = q \times u_2 = u_0 \times q^3$

📐 Théorème — Formule explicite du terme général.

Si (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$$

Si le premier terme est u_p (au rang p), la formule devient :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

4.2 L'échiquier de Sissa et l'explosion exponentielle

Le sage indien Sissa inventa le jeu d'échecs pour divertir son roi. Ravi, le monarque lui proposa la récompense de son choix. Sissa répondit modestement : > « Seigneur, déposez un grain de blé sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, huit sur la quatrième, et doublez ainsi sur chaque case jusqu'à la 64e case de l'échiquier. »

Le roi sourit de cette demande apparemment dérisoire. Mais ses intendants revinrent pâles comme la mort :

- Case 1 : $u_0 = 1 = 2^0$
- Case 2 : $u_1 = 2 = 2^1$
- Case 3 : $u_2 = 4 = 2^2$
- Case 64 : $u_{63} = 2^{63} \approx 9,22 \times 10^{18}$ grains !

Le nombre total de grains sur l'échiquier vaut :

$$S = 1 + 2 + 4 + \ldots + 2^{63} = 2^{64} - 1 \approx 18,4 \times 10^{18} \text{ grains}.$$

Cela représente plus de 1 200 milliards de tonnes de blé, soit la production mondiale actuelle de blé pendant plus de deux mille ans ! Le roi ne pouvait pas honorer sa promesse.

4.3 Somme des puissances consécutives d'un nombre q

✍️ Démonstration (exigible) — Somme des puissances de q.

Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier $n \geq 0$:

$$\boxed{1 + q + q^2 + q^3 + \ldots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}}$$

Preuve (par la méthode du télescopage) : Posons $S_n = 1 + q + q^2 + \ldots + q^n$. Multiplions les deux membres par q :

$$qS_n = q(1 + q + q^2 + \ldots + q^n) = q + q^2 + q^3 + \ldots + q^{n+1}.$$

Soustrayons maintenant cette ligne à la ligne d'origine ($S_n - qS_n$) :

$$S_n - qS_n = (1 + q + q^2 + \ldots + q^n) - (q + q^2 + q^3 + \ldots + q^{n+1}).$$

Regarde l'effet magique : tous les termes intermédiaires s'annulent deux à deux en diagonale ! Seuls survivent le tout premier terme (1) et le tout dernier ($-q^{n+1}$) :

$$S_n(1 - q) = 1 - q^{n+1}.$$

Puisque $q \neq 1$, on peut diviser par $1 - q$:

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}. \quad \blacksquare$$

📐 Théorème général — Somme géométrique.

Pour toute suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

---

5. Variations et intuition de la limite

5.1 Les trois méthodes pour étudier les variations d'une suite

Pour savoir si une suite monte ($u_{n+1} \geq u_n$) ou descend ($u_{n+1} \leq u_n$) :

1. **Méthode 1 : Étudier le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ (Méthode universelle).**
   - Si pour tout n, $u_{n+1} - u_n > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.
   - Si pour tout n, $u_{n+1} - u_n < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.
2. **Méthode 2 : Comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1 (uniquement si tous les termes sont strictement positifs !).**
   - Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, la suite est strictement croissante.
   - Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, la suite est strictement décroissante.
3. **Méthode 3 : Passer par la fonction associée si $u_n = f(n)$.** Si la fonction f est croissante sur $[0\,;+\infty[$, alors la suite $u_n = f(n)$ est croissante.

5.2 Limite d'une suite géométrique selon la raison q

Que devient q^n lorsque n devient gigantesque ($n \to +\infty$) ?

- **Si $q > 1$:** La suite explose vers l'infini : $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$. (Exemple : 2^n).
- **Si $q = 1$:** La suite est constante égale à 1.
- **Si $-1 < q < 1$:** La suite s'écrase vers zéro : $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$. (Exemple : $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$).
- **Si $q \leq -1$:** La suite oscille sans admettre de limite (Exemple : $(-1)^n = 1, -1, 1, -1 \ldots$).

---

6. En informatique : l'algorithme de seuil en Python

Un problème fondamental en gestion, en biologie et en physique consiste à savoir **à quel rang n** une suite dépasse une valeur critique donnée (le seuil). On utilise pour cela une boucle `while` (tant que) :

```python
def seuil_croissance(valeur_initiale, taux, seuil):
    """
    Calcule le nombre d'années nécessaires pour dépasser un seuil.
    Exemple : un capital initial de 1000 € placé à 5 % par an (raison q = 1.05)
    doit dépasser 2000 € (doubler).
    """
    n = 0
    u = valeur_initiale

    while u < seuil:
        u = u * (1 + taux)  # On applique le taux annuel
        n += 1              # On passe à l'année suivante

    return n, round(u, 2)

annees, montant_final = seuil_croissance(1000, 0.05, 2000)
print(f"Le capital aura doublé au bout de {annees} ans, atteignant {montant_final} €.")
# Affiche : Le capital aura doublé au bout de 15 ans, atteignant 2078.93 €.
```

7. Exemples résolus détaillés

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Reconstitution d'une suite arithmétique.

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_4 = 17$ et $u_9 = 37$. 1. Déterminer la raison r et le premier terme u_0. 2. Exprimer u_n en fonction de n. 3. Calculer la valeur de u_{50}.

Solution : 1. Selon la formule du terme général : $u_9 = u_4 + (9-4)r$.

$$37 = 17 + 5r \Leftrightarrow 5r = 37 - 17 = 20 \Leftrightarrow r = \frac{20}{5} = 4.$$

Pour trouver u_0, on utilise $u_4 = u_0 + 4r$:

$$17 = u_0 + 4(4) \Leftrightarrow 17 = u_0 + 16 \Leftrightarrow u_0 = 1.$$

2. Le terme général est donc : $\boxed{u_n = 1 + 4n}$. 3. Pour $n = 50$: $u_{50} = 1 + 4(50) = 1 + 200 = 201$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calcul d'une somme arithmétique de termes.

Calculer la somme :

$$S = 7 + 11 + 15 + 19 + \ldots + 123.$$

Solution : Les termes progressent de $+4$ en $+4$: c'est une suite arithmétique de raison $r = 4$, de premier terme $u_0 = 7$. Le terme général est $u_n = 7 + 4n$. Trouvons le rang du dernier terme 123 :

$$7 + 4n = 123 \Leftrightarrow 4n = 116 \Leftrightarrow n = 29.$$

Les termes vont de u_0 à u_{29} : il y a donc $29 - 0 + 1 = 30$ termes. Appliquons la formule de la somme arithmétique :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2} = 30 \times \frac{7 + 123}{2} = 30 \times \frac{130}{2} = 30 \times 65 = 1\,950.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Suite géométrique et somme de puissances.

Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 5$ et de raison $q = 3$. 1. Calculer v_1, v_2 et v_6. 2. Calculer la somme $S = v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_6$.

Solution : 1. $v_1 = 5 \times 3 = 15$. $v_2 = 15 \times 3 = 45$. Formule générale : $v_n = 5 \times 3^n$. Pour $n = 6$: $v_6 = 5 \times 3^6 = 5 \times 729 = 3\,645$. 2. Nombre de termes de v_0 à v_6 : $6 - 0 + 1 = 7$ termes.

$$S = v_0 \times \frac{1 - q^7}{1 - q} = 5 \times \frac{1 - 3^7}{1 - 3} = 5 \times \frac{1 - 2\,187}{-2} = 5 \times \frac{-2\,186}{-2} = 5 \times 1\,093 = 5\,465.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Étude du sens de variation d'une suite.

Déterminer le sens de variation des suites suivantes : a) $u_n = \frac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$ b) $v_n = \frac{3^n}{n!}$ pour $n \geq 1$

Solution : a) Étudions le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{(n+1)+1} - \frac{n}{n+1} = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}.$$

Mettons au même dénominateur $(n+2)(n+1) > 0$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2 + 2n + 1 - (n^2+2n)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)}.$$

Le numérateur est $1 > 0$ et le dénominateur est strictement positif pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n : la suite (u_n) est **strictement croissante**.

b) Tous les termes de la suite v_n sont strictement positifs. Comparons le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ à 1 :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}} = \frac{3^{n+1}}{3^n} \times \frac{n!}{(n+1)!} = 3 \times \frac{n!}{(n+1)n!} = \frac{3}{n+1}.$$

- Si $n = 1$: $\frac{v_2}{v_1} = \frac{3}{2} > 1$ (la suite commence par augmenter : $v_1 = 3, v_2 = 4,5$).
- Si $n = 2$: $\frac{v_3}{v_2} = \frac{3}{3} = 1$ ($v_3 = v_2 = 4,5$).
- Dès que $n \geq 3$: $n + 1 \geq 4$, donc $\frac{3}{n+1} < 1$, ce qui implique $v_{n+1} < v_n$. La suite (v_n) est **strictement décroissante à partir du rang $n = 2$**.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Suite arithmético-géométrique. Un refuge pour animaux compte 200 bêtes au 1er janvier 2025. Chaque année, 20 % des animaux sont adoptés et quittent le refuge, mais 50 nouveaux animaux abandonnés sont recueillis. On note u_n le nombre d'animaux au bout de n années. 1. Établir la relation de récurrence liant u_{n+1} et u_n. 2. On pose $v_n = u_n - 250$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique. 3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n, puis la limite de u_n lorsque $n \to +\infty$.

Solution : 1. Si 20 % des animaux partent, il en reste 80 %, soit une multiplication par $0,8$. En ajoutant les 50 nouveaux :

$$u_0 = 200 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 0,8u_n + 50.$$

2. Exprimons v_{n+1} en fonction de v_n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = (0,8u_n + 50) - 250 = 0,8u_n - 200.$$

Factorisons $0,8$:

$$v_{n+1} = 0,8(u_n - 250) = 0,8v_n.$$

La suite (v_n) est une **suite géométrique de raison $q = 0,8$** et de premier terme :

$$v_0 = u_0 - 250 = 200 - 250 = -50.$$

3. D'après le cours : $v_n = v_0 \times q^n = -50 \times (0,8)^n$. Comme $u_n = v_n + 250$, on en déduit :

$$\boxed{u_n = 250 - 50 \times (0,8)^n}.$$

Puisque $-1 < 0,8 < 1$, on a $\lim_{n\to+\infty} (0,8)^n = 0$. Par conséquent :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 250 - 50 \times 0 = 250.$$

La population du refuge se stabilisera à long terme autour de 250 animaux.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Représentation en toile d'araignée d'une suite récurrente. Soit la suite récurrente définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. Représenter graphiquement les quatre premiers termes sur un repère orthonormé avec la droite $y = x$.

Solution et méthode : On trace dans un repère la droite d'équation $y = x$ (la diagonale) et la droite représentative de la fonction $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$. 1. On part de $u_0 = 0$ sur l'axe des abscisses. 2. On monte verticalement jusqu'à la droite $y = g(x)$: le point atteint a pour ordonnée $g(u_0) = u_1 = 1$. 3. On se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$: ce déplacement reporte la valeur $u_1 = 1$ sur l'axe des abscisses sans refaire de calcul ! 4. On monte à nouveau verticalement jusqu'à la droite $y = g(x)$ pour trouver $u_2 = g(1) = 1,5$. 5. On repart horizontalement vers $y = x$, puis verticalement vers la courbe pour trouver $u_3 = g(1,5) = 1,75$. Les segments successifs forment un « escalier » qui converge vers le point d'intersection des deux droites :

$$x = \frac{1}{2}x + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x = 1 \Leftrightarrow x = 2.$$

La suite (u_n) croît en se rapprochant de sa limite $L = 2$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Suite :** fonction indexée par les entiers $n \in \mathbb{N}$. Terme u_n, suite (u_n).
2. **Définition explicite vs récurrente :**
   - Explicite : $u_n = f(n)$ (accès direct).
   - Récurrente : u_0 et $u_{n+1} = g(u_n)$ (calcul pas à pas).
3. **Suites arithmétiques :**
   - Définition : $u_{n+1} = u_n + r$.
   - Terme général : $u_n = u_0 + nr$ (ou $u_n = u_p + (n-p)r$).
   - Somme de Gauss : $1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
   - Somme générale : $(\text{nb de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.
4. **Suites géométriques :**
   - Définition : $u_{n+1} = q \times u_n$.
   - Terme général : $u_n = u_0 \times q^n$ (ou $u_n = u_p \times q^{n-p}$).
   - Somme de puissances : $1 + q + q^2 + ... + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.
   - Somme générale : $(\text{premier}) \times \frac{1-q^{\text{nb de termes}}}{1-q}$.
5. **Variations :** signe de $u_{n+1} - u_n$ ou quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ comparé à 1.
6. **Limite géométrique :** si $|q| < 1$, alors $q^n \to 0$. Si $q > 1$, alors $q^n \to +\infty$.

Exercices

Exercices d'application directe ()

1. Soit la suite explicite $u_n = 2n^2 - 3$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10}.
2. Soit la suite récurrente $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2 et v_3.
3. Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 5$ et pour raison $r = 3$. Donner l'expression de u_n, puis calculer u_{20}.
4. Une suite géométrique a pour premier terme $v_0 = 3$ et pour raison $q = 2$. Donner l'expression de v_n, puis calculer v_8.
5. Calculer la somme des entiers de 1 à 50 : $S = 1 + 2 + 3 + ... + 50$.

6. Calculer la somme géométrique : $S = 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2^{10}$.
7. La suite $u_n = 5 - 4n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison et son sens de variation.
8. La suite $v_n = 7 \times 0,6^n$ est-elle géométrique ? Préciser sa raison et sa limite quand $n \to +\infty$.
9. Déterminer le sens de variation de la suite $u_n = 3n + 7$.
10. Soit une suite arithmétique telle que $u_3 = 10$ et $u_5 = 16$. Trouver la raison r.

Exercices d'entraînement et de réflexion ()

11. On considère la suite arithmétique (u_n) telle que $u_2 = 11$ et $u_7 = 36$.
    a) Calculer la raison r et le terme initial u_0.
    b) À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 1\,000$?
12. Calculer la somme : $S = 12 + 15 + 18 + 21 + ... + 150$.
13. On place un capital de $5\,000$ € sur un compte à intérêts composés au taux annuel de $4\,\%$. On note C_n la valeur du capital après n années.
    a) Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n, puis C_n en fonction de n.
    b) Quel sera le capital disponible au bout de 10 ans ?
    c) Écrire un script Python pour trouver au bout de combien d'années le capital aura dépassé $8\,000$ €.
14. Déterminer le sens de variation de la suite $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour $n \geq 1$.
15. Déterminer le sens de variation de la suite $w_n = n^2 - 10n + 3$ pour $n \in \mathbb{N}$.
16. Calculer la somme des puissances de 3 : $S = 1 + 3 + 9 + 27 + ... + 3^7$.
17. Soit la suite récurrente définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.
    a) Calculer u_1 et u_2 sous forme exacte et approchée.
    b) Déterminer graphiquement la valeur vers laquelle semble converger cette suite en cherchant le point fixe de $f(x) = \sqrt{x+2}$.
18. Soit (u_n) une suite géométrique positive telle que $u_1 = 6$ et $u_3 = 24$. Déterminer la raison q, le premier terme u_0 et calculer la somme $u_0 + u_1 + ... + u_8$.

Exercices d'approfondissement et défis ()

19. **Le paradoxe du flocon de Koch.** Le flocon de neige de Koch est une fractale obtenue en partant d'un triangle équilatéral de côté 1 (étape 0). À chaque étape, on remplace le tiers central de chaque côté par un triangle équilatéral pointant vers l'extérieur.
    - Étape 0 : nombre de côtés $N_0 = 3$, longueur d'un côté $\ell_0 = 1$.
    - À l'étape $n+1$, chaque segment est divisé en 4 segments de longueur 3 fois plus petite.

    a) Exprimer le nombre de côtés N_n en fonction de n.
    b) Exprimer la longueur ℓ_n d'un côté en fonction de n.
    c) En déduire le périmètre $P_n = N_n \times \ell_n$ du flocon à l'étape n.
    d) Quelle est la limite du périmètre quand $n \to +\infty$?
20. **Somme des carrés des entiers.** On cherche à démontrer que :
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$
    a) Vérifier cette formule pour $n = 1, 2, 3$.
    b) En développant $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$, sommer cette égalité pour k allant de 1 à n et en déduire la formule.
21. **Le paradoxe d'Achille et la tortue revisité.** La tortue part avec 100 mètres d'avance sur Achille. Achille court à 10 m/s et la tortue avance à 1 m/s.
    - Pour franchir les 100 m, Achille met $t_0 = 10$ s. Pendant ce temps, la tortue a avancé de 10 m.
    - Pour franchir ces 10 m, Achille met $t_1 = 1$ s. La tortue a avancé de 1 m.
    - Pour franchir ce mètre, Achille met $t_2 = 0,1$ s, etc.

    a) Exprimer le temps t_n de la n-ième étape. Quelle est la nature de la suite (t_n) ?
    b) Calculer le temps total $T_n = t_0 + t_1 + ... + t_n$ au bout de n étapes.
    c) Quelle est la limite de T_n quand $n \to +\infty$? Achille dépasse-t-il la tortue ?

22. **La suite de Fibonacci et le nombre d'or.** On définit la célèbre suite de Fibonacci par $F_0 = 0, F_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$
a) Calculer les dix premiers termes $F_0, F_1, F_2, \ldots, F_9$.
b) On considère le rapport $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ pour $n \geq 1$. Calculer r_1, r_2, r_3, r_4, r_5.
c) Vers quelle valeur remarquable ce rapport semble-t-il se rapprocher ?

Solutions

1. $u_0 = -3$. $u_1 = 2(1) - 3 = -1$. $u_2 = 2(4) - 3 = 5$. $u_{10} = 2(100) - 3 = 197$.
2. $v_1 = 2(4) - 3 = 5$. $v_2 = 2(5) - 3 = 7$. $v_3 = 2(7) - 3 = 11$.
3. $u_n = 5 + 3n$. $u_{20} = 5 + 3(20) = 65$.
4. $v_n = 3 \times 2^n$. $v_8 = 3 \times 256 = 768$.
5. $S = \frac{50 \times 51}{2} = 25 \times 51 = 1\,275$.
6. $S = \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = \frac{1 - 2\,048}{-1} = 2\,047$.
7. $u_{n+1} - u_n = [5 - 4(n+1)] - [5 - 4n] = -4$. C'est une suite arithmétique de raison $r = -4$. Comme $r < 0$, elle est strictement décroissante.
8. $v_{n+1} = 7 \times 0,6^{n+1} = 0,6 \times (7 \times 0,6^n) = 0,6 v_n$. Suite géométrique de raison $q = 0,6$. Comme $|0,6| < 1$, $\lim_{n \to +\infty} v_n = 0$.
9. $u_{n+1} - u_n = [3(n+1) + 7] - [3n + 7] = 3 > 0$. Strictement croissante.
10. $u_5 = u_3 + 2r \Leftrightarrow 16 = 10 + 2r \Leftrightarrow 2r = 6 \Leftrightarrow r = 3$.
11. a) $u_7 = u_2 + 5r \Leftrightarrow 36 = 11 + 5r \Leftrightarrow 5r = 25 \Leftrightarrow r = 5$. $u_2 = u_0 + 2r \Leftrightarrow 11 = u_0 + 10 \Leftrightarrow u_0 = 1$. Terme général : $u_n = 1 + 5n$.
    b) $1 + 5n > 1\,000 \Leftrightarrow 5n > 999 \Leftrightarrow n > 199,8$. À partir du rang $n = 200$.
12. Suite arithmétique de raison $r = 3$. $u_0 = 12$, $u_n = 12 + 3n = 150 \Leftrightarrow 3n = 138 \Leftrightarrow n = 46$. Nombre de termes : $46 - 0 + 1 = 47$ termes. $S = 47 \times \frac{12 + 150}{2} = 47 \times 81 = 3\,807$.
13. a) Augmenter de $4\,\%$ revient à multiplier par $1,04$. $C_{n+1} = 1,04 C_n$. $C_n = 5\,000 \times (1,04)^n$.
    b) $C_{10} = 5\,000 \times (1,04)^{10} \approx 5\,000 \times 1,48024 \approx 7\,401,22$ €.
    c) Script Python :

```
n, c = 0, 5000
while c <= 8000:
    c *= 1.04
    n += 1
print(n)  # Affiche 12 ans (c ≈ 8005.16 €)
```

14. $u_n > 0$ pour tout $n \geq 1$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{2^n} = 2 \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$. Comparons à 1 : $\frac{2n}{n+1} > 1 \Leftrightarrow 2n > n + 1 \Leftrightarrow n > 1$. Pour $n = 1$: $u_1 = 2, u_2 = 2 \Longrightarrow u_1 = u_2$. Pour tout $n \geq 2$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, donc la suite (u_n) est strictement croissante à partir de $n = 2$.
15. $w_{n+1} - w_n = [(n+1)^2 - 10(n+1) + 3] - [n^2 - 10n + 3] = n^2 + 2n + 1 - 10n - 10 + 3 - n^2 + 10n - 3 = 2n - 9$.
    - Si $n \leq 4$: $2n - 9 < 0$, la suite décroît ($w_0 = 3, w_1 = -6, w_2 = -13, w_3 = -18, w_4 = -21, w_5 = -22$).
    - Si $n \geq 5$: $2n - 9 > 0$, la suite est strictement croissante.
16. $S = \frac{1 - 3^8}{1 - 3} = \frac{1 - 6\,561}{-2} = \frac{-6\,560}{-2} = 3\,280$.
17. a) $u_1 = \sqrt{1 + 2} = \sqrt{3} \approx 1,732$. $u_2 = \sqrt{\sqrt{3} + 2} \approx \sqrt{3,732} \approx 1,932$.
    b) Point fixe : $x = \sqrt{x + 2} \Longrightarrow x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$. Comme $x \geq 0$, la solution est $x = 2$. La suite converge vers 2.

18. $u_3 = u_1 \times q^2 \Leftrightarrow 24 = 6q^2 \Leftrightarrow q^2 = 4 \Longrightarrow q = 2$ (la suite étant positive). $u_1 = u_0 \times q \Leftrightarrow 6 = 2u_0 \Leftrightarrow u_0 = 3$. Nombre de termes de u_0 à u_8 : 9 termes. $S = 3 \times \frac{1-2^9}{1-2} = 3 \times \frac{1-512}{-1} = 3 \times 511 = 1\,533$.

19. a) À chaque étape, chaque côté est remplacé par 4 segments : $N_n = 3 \times 4^n$.
    b) La longueur d'un segment est divisée par 3 : $\ell_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
    c) Périmètre : $P_n = N_n \times \ell_n = 3 \times 4^n \times \frac{1}{3^n} = 3 \times \left(\frac{4}{3}\right)^n$.
    d) Comme $\frac{4}{3} > 1$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n = +\infty$, donc $\lim_{n\to+\infty} P_n = +\infty$. Le flocon de Koch enferme une aire finie à l'intérieur d'un périmètre infini !

20. a) Pour $n = 1$: $1^2 = 1$ et $\frac{1\times2\times3}{6} = 1$. Pour $n = 2$: $1 + 4 = 5$ et $\frac{2\times3\times5}{6} = 5$. Pour $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14$ et $\frac{3\times4\times7}{6} = 14$.
    b) En sommant $(k+1)^3 - k^3$ de $k = 1$ à n, par télescopage la somme vaut $(n+1)^3 - 1$. D'autre part, la somme vaut $3\sum k^2 + 3\sum k + \sum 1 = 3\sum k^2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + n$. On isole $\sum k^2$: $3\sum k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n = (n+1)[(n+1)^2 - 1] - \frac{3n(n+1)}{2} = (n+1)n(n+2) - \frac{3n(n+1)}{2} = n(n+1)\big(n + 2 - \frac{3}{2}\big) = n(n+1)\big(\frac{2n+1}{2}\big)$. En divisant par 3 : $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

21. a) $t_n = 10 \times (0,1)^n$. C'est une suite géométrique de premier terme $t_0 = 10$ et de raison $q = 0,1$.
    b) $T_n = 10 \times \frac{1-(0,1)^{n+1}}{1-0,1} = 10 \times \frac{1-(0,1)^{n+1}}{0,9} = \frac{100}{9}\big[1 - (0,1)^{n+1}\big]$.
    c) Comme $|0,1| < 1$, $(0,1)^{n+1} \to 0$. $\lim_{n\to+\infty} T_n = \frac{100}{9} \approx 11,11$ secondes. Le paradoxe de Zénon d'Élée est résolu : une somme infinie d'intervalles de temps peut avoir une durée totale finie ! Au bout de $11,11$ s, Achille dépasse la tortue.

22. a) $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, F_8 = 21, F_9 = 34$.
    b) $r_1 = \frac{1}{1} = 1$; $r_2 = \frac{2}{1} = 2$; $r_3 = \frac{3}{2} = 1,5$; $r_4 = \frac{5}{3} \approx 1,667$; $r_5 = \frac{8}{5} = 1,6$.
    c) Le rapport oscille et se rapproche du **nombre d'or** $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887...$

La question qui ouvre la suite

Dans ce chapitre, nous avons vu des suites avancer par bonds discrets, et nous avons calculé des grandeurs qui tournent ou qui oscillent. Mais imagine maintenant une roue de fête foraine qui tourne sans fin, ou une vague qui monte et redescend avec une régularité parfaite.

Comment mesurer les angles non plus en degrés rigides, mais en déroulant un ruban souple sur un cercle de rayon 1 ? Comment le cosinus et le sinus, découverts dans les triangles rectangles du collège, deviennent-ils les battements d'ondes qui décrivent le son, la lumière et le courant alternatif ? C'est ce que nous allons découvrir dans **La Grande Roue et le Cercle qui s'Enroule**.

CHAPITRE 37 : La Grande Roue et le Cercle qui s'Enroule

> « Le degré est une invention de marchands babyloniens qui aimaient le nombre 60. Le radian, lui, est une invention de la roue elle-même : c'est le cercle qui se mesure avec son propre rayon. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi le **degré** ne suffit plus quand on veut décrire un mouvement qui tourne sans fin (roues, planètes, ondes, moteurs).
- Une nouvelle unité d'angle, née du cercle lui-même : le **radian**.
- Comment **enrouler la droite des réels** autour d'un cercle de rayon 1, et donner ainsi un sens à $\cos(100)$, à $\sin(-7)$ ou à $\cos\left(\frac{37\pi}{4}\right)$.
- Les **valeurs remarquables** ($\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$) démontrées avec un carré et un triangle équilatéral.
- Les **angles associés** : comment les symétries du cercle permettent de tout ramener au premier quart de tour.
- Comment **résoudre** les équations $\cos x = a$ et $\sin x = a$, et dessiner les courbes ondulantes des fonctions cosinus et sinus.

---

1. Le problème : la cabine qui tourne sans fin

Tu es monté dans la grande roue de la fête foraine. Elle a un rayon de 20 m, son axe est à 22 m du sol, et ta cabine part du point le plus bas, à 2 m du sol. La roue tourne lentement, régulièrement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on la regarde depuis le parking.

Ton petit frère, resté en bas, te pose une question simple :

« Quand ta cabine aura parcouru 50 mètres le long du cercle, tu seras à quelle hauteur ? Et après 300 mètres ? Et après 1 kilomètre ? »

Tu sors ta trigonométrie de collège (chapitre 28) : dans un triangle rectangle, $\cos \hat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$. Mais très vite, trois obstacles surgissent.

Obstacle 1 — Les angles de collège s'arrêtent à 90°. Un triangle rectangle ne peut pas avoir un angle aigu de 120°, encore moins de 400°. Pourtant ta cabine, elle, continue de tourner : après un tour et demi, elle a « tourné de 540° ».

Obstacle 2 — Le degré n'a rien à voir avec la distance parcourue. Ton frère parle en **mètres parcourus sur le cercle**. Pour passer des mètres aux degrés, il faut à chaque fois faire une règle de trois avec le périmètre $2\pi \times 20$. C'est maladroit : l'unité « degré » est étrangère au cercle.

Obstacle 3 — Le sens compte. Si la roue tourne à l'envers (pour faire descendre les passagers), il faut parler d'angles **négatifs**.

Il nous faut donc : 1. une unité d'angle **naturelle**, liée directement à la longueur d'arc ; 2. une définition du cosinus et du sinus valable pour **n'importe quel nombre réel**, positif ou négatif, petit ou énorme.

C'est exactement ce que les mathématiciens ont construit entre le XVII^{e} et le XVIII^{e} siècle, et que tu vas reconstruire avec une ficelle.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Le sinus est une poche !** Vers 150 av. J.-C., l'astronome grec **Hipparque** dresse la première table de « cordes » pour calculer les positions des astres ; **Ptolémée** la perfectionne dans l'*Almageste* (II^{e} siècle). En Inde, vers 499, **Aryabhata** préfère utiliser la **demi-corde**, qu'il nomme *ardha-jyā* (« demi-corde d'arc »), abrégé en *jyā* puis *jīva*. Les savants arabes transcrivent ce mot en *jība*, qui s'écrit sans voyelles comme *jayb*, « poche, pli d'un vêtement ». Au XII^{e} siècle, en traduisant ces textes à Tolède, **Gérard de Crémone** traduit littéralement par le latin *sinus*, « pli, poche, baie ». Voilà pourquoi la plus célèbre fonction ondulante porte le nom d'un pli de tunique !

---

2. Le radian : mesurer un angle avec le rayon

2.1 L'expérience de la ficelle

🖐 À toi de jouer —

Prends une boîte de conserve ronde, une ficelle et un feutre. Coupe un morceau de ficelle exactement de la longueur du **rayon** de la boîte. Pose une extrémité sur le bord, puis plaque la ficelle le long du bord circulaire. Trace les deux rayons qui joignent le centre aux extrémités de la ficelle.

L'angle que tu viens de dessiner — celui qui intercepte un arc **de même longueur que le rayon** — est l'unité naturelle du cercle : c'est **un radian**.



Fig. 90. – Le cercle trigonométrique complet : enroulement et projections

Combien de ficelles « rayon » peut-on poser bout à bout autour du cercle ? Le périmètre vaut $2\pi R$, donc on en pose $\frac{2\pi R}{R} = 2\pi \approx 6,28$. Un tour complet mesure donc 2π radians. Avec 6 ficelles, il manque encore un petit bout ($0,28$ ficelle) pour fermer le tour.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Le radian** Dans un cercle de rayon R, un angle au centre mesure **1 radian** (symbole : **rad**) lorsqu'il intercepte un arc de longueur R. Un tour complet mesure 2π rad, donc :

$$\boxed{\pi \text{ rad} = 180^\circ}$$

Le mot « radian » vient bien sûr de « rayon » (*radius* en latin). L'idée de mesurer les angles par la longueur d'arc remonte au mathématicien anglais **Roger Cotes** (1714) ; le nom *radian* apparaît imprimé pour la première fois en **1873**, dans des sujets d'examen de **James Thomson** (frère de Lord Kelvin), à Belfast.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Le radian est sans dimension : c'est un rapport de deux longueurs ($\frac{\text{arc}}{\text{rayon}}$, mètres divisés par mètres). C'est pourquoi on omet souvent l'unité : on écrit « l'angle $\frac{\pi}{3}$ » plutôt que « $\frac{\pi}{3}$ rad ». Quand aucune unité n'est écrite, **c'est toujours le radian**.

2.2 Conversions

La proportionnalité π rad $\leftrightarrow 180^\circ$ donne :

$$\text{mesure en rad} = \text{mesure en degrés} \times \frac{\pi}{180} \quad ; \quad \text{mesure en degrés} = \text{mesure en rad} \times \frac{180}{\pi}.$$

Degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Et 1 rad $= \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,3^\circ$.

✅ ***Exemple résolu 1 — Conversions*** *a) Convertir 75° en radians. b) Convertir $\frac{7\pi}{9}$ rad en degrés. c) Convertir $2,5$ rad en degrés.*

a) $75 \times \frac{\pi}{180} = \frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}$ *(on simplifie par 15).*
b) $\frac{7\pi}{9} \times \frac{180}{\pi} = \frac{7\times 180}{9} = 7 \times 20 = 140^\circ$.
c) $2,5 \times \frac{180}{\pi} = \frac{450}{\pi} \approx 143,2^\circ$.

⚠ ⚠ Pourquoi le radian est la seule unité naturelle en analyse et en cinématique

En géométrie pratique, le degré divise le cercle en 360 parts arbitraires. Mais en physique et en analyse supérieure, le **radian** est incontournable pour deux raisons fondamentales :

- **En cinématique :** La vitesse linéaire v d'un point à distance R de l'axe tournant à la vitesse angulaire ω s'écrit $v = R\omega$ **si et seulement si** ω est en radians par seconde ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$). En degrés par seconde, un facteur parasite $\frac{\pi}{180}$ gâcherait la formule !
- **En dérivation :** La célèbre formule $(\sin x)' = \cos x$ n'est vraie **que si la variable x est en radians**. Si l'on dérivait par rapport à un angle mesuré en degrés, la règle de dérivation en chaîne imposerait :

$$(\sin(x^\circ))' = \frac{\pi}{180}\cos(x^\circ).$$

C'est pour éliminer ce coefficient $\frac{\pi}{180}$ de toutes les équations différentielles de la physique que le radian est l'unité internationale absolue des mathématiciens.

2.3 Longueur d'arc et aire d'un secteur

Puisque le radian est défini par « arc = rayon pour 1 rad », la longueur d'arc est proportionnelle à l'angle : 1 rad $\leftrightarrow R$, donc θ rad $\leftrightarrow R\theta$.

📐 Propriété — Longueur d'arc, aire de secteur

Dans un cercle de rayon R, un angle au centre de θ **radians** intercepte :

- un arc de longueur $\boxed{\ell = R\,\theta}$;
- un secteur angulaire (une « part de tarte ») d'aire $\boxed{\mathcal{A} = \frac{1}{2}R^2\theta}$.

Justification de l'aire : le disque entier (angle 2π) a pour aire πR^2 ; par proportionnalité, l'angle θ donne $\pi R^2 \times \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2}R^2\theta$.

Remarque comme ces formules sont simples **en radians**. En degrés, il faudrait écrire $\ell = \frac{\pi R \alpha}{180}$: le facteur parasite $\frac{\pi}{180}$ apparaît partout. C'est la première raison d'être du radian : **il fait disparaître les constantes inutiles**. Tu en verras une seconde, plus spectaculaire, en Terminale : la dérivée de $\sin x$ vaut $\cos x$ **seulement si x est en radians**.

> ✅ ***Exemple résolu 2 — La cabine de la grande roue*** *La roue a un rayon de 20 m. La cabine a parcouru 50 m le long du cercle. De quel angle la roue a-t-elle tourné ? Et combien de tours complets après 1 km ?*
> *$\theta = \frac{\ell}{R} = \frac{50}{20} = 2,5$ rad, soit environ $143,2°$ (exemple 1 c). Pour 1000 m : $\theta = \frac{1000}{20} = 50$ rad. Un tour vaut $2\pi \approx 6,283$ rad, et $\frac{50}{2\pi} \approx 7,96$: la roue a fait 7 tours complets et presque un huitième tour (il manque environ $0,04$ tour).*

> ✅ ***Exemple résolu 3 — Une part de pizza*** *Une pizza de 30 cm de diamètre est coupée en secteurs d'angle $\frac{\pi}{5}$. Quelle est la longueur de croûte et l'aire d'une part ? Combien de parts ?*
> *$R = 15$ cm. Croûte : $\ell = 15 \times \frac{\pi}{5} = 3\pi \approx 9,42$ cm. Aire : $\frac{1}{2} \times 15^2 \times \frac{\pi}{5} = \frac{225\pi}{10} = 22,5\pi \approx 70,7$ cm². Nombre de parts : $\frac{2\pi}{\pi/5} = 10$.*

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Le mode de la calculatrice** Les calculatrices ont un mode **DEG** et un mode **RAD**. Si tu tapes `cos(60)` en mode RAD, tu obtiens $\cos(60 \text{ rad}) \approx -0,952$, et non $0,5$! Inversement, `cos(π/3)` en mode DEG donne $\cos(1,047°) \approx 0,9998$. Avant chaque contrôle, vérifie le mode. En Python, `math.cos` attend **toujours** des radians ; pour convertir, on utilise `math.radians(60)`.

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Les formules d'arc en degrés**
> $\ell = R\theta$ est **fausse** si θ est en degrés : avec $R = 1$ et $\theta = 90$, on trouverait un arc de 90 m sur un cercle de périmètre $6,28$ m ! Toujours convertir en radians d'abord.

---

3. Le cercle trigonométrique et l'enroulement de la droite

3.1 Le cercle unité orienté

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ — rappel : « orthonormé » signifie que les deux axes sont perpendiculaires et ont la même unité. On note $I(1;0)$ et $J(0;1)$.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Cercle trigonométrique** Le **cercle trigonométrique** est le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1, **orienté** : on choisit comme **sens direct** (ou sens positif, ou sens **trigonométrique**) le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pourquoi ce sens ? Parce que c'est celui qui fait passer de I (sur l'axe des abscisses) à J (sur l'axe des ordonnées) par le plus court chemin, comme on passe de $\vec{\imath}$ à $\vec{\jmath}$. C'est une **convention** — les horloges, elles, tournent dans l'autre sens, dit **indirect**.

Sur ce cercle de rayon 1, la formule $\ell = R\theta$ devient $\ell = \theta$: **la mesure d'un angle en radians est exactement la longueur de l'arc parcouru**. Voilà le grand intérêt du rayon 1.

3.2 L'enroulement : chaque réel devient un point

Imagine maintenant la droite des réels comme un **mètre ruban** infini, gradué. Tu la places verticalement, tangente au cercle au point I, l'origine 0 de la droite posée sur I. Puis tu **enroules** :

- la demi-droite des réels positifs autour du cercle dans le **sens direct** ;

- la demi-droite des réels négatifs dans le **sens indirect**.

Chaque réel x du ruban vient se poser sur un point précis du cercle : on l'appelle le **point image** de x, noté $M(x)$.

- $x = \frac{\pi}{2}$: on a enroulé un quart de périmètre ($\frac{2\pi}{4}$) : on arrive en J.
- $x = \pi$: un demi-tour : point $I'(-1;0)$.
- $x = -\frac{\pi}{2}$: un quart de tour en sens indirect : point $J'(0;-1)$.
- $x = 2\pi$: un tour complet : retour en I.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Point image d'un réel** À tout réel x, l'enroulement associe un unique point M du cercle trigonométrique, appelé **image de** x. On dit aussi que x est **une mesure en radians** de l'angle orienté $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$.

3.3 Un point, une infinité de réels : « modulo 2π »

Le ruban est infini, le cercle ne l'est pas : après un tour, on repasse aux mêmes endroits. Les réels $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{13\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3}$… ont tous **la même image**.

📐 Propriété — Réels de même image

Deux réels x et y ont la même image sur le cercle si et seulement si leur différence est un multiple entier de 2π :

$$y = x + 2k\pi \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On écrit alors $y \equiv x\ [2\pi]$, et on lit « y est congru à x **modulo** 2π ».

Lecture des notations : $k \in \mathbb{Z}$ se lit « k appartient à $\mathbb{Z}$ », c'est-à-dire « k est un entier relatif » $(\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots)$; $\mathbb{Z}$ vient de l'allemand *Zahlen*, « nombres » (chapitre 31). Le mot *modulo* (« selon la mesure de ») a été introduit par **Gauss** en 1801 pour l'arithmétique des restes ; il signifie ici « à un nombre entier de tours près ».

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Mesure principale** Parmi tous les réels ayant la même image M, il en existe **un seul** dans l'intervalle $]-\pi;\pi]$. On l'appelle la **mesure principale** de l'angle.

(Rappel de notation : $]-\pi;\pi]$ désigne l'ensemble des réels x tels que $-\pi < x \leq \pi$; le crochet tourné vers l'extérieur en $-\pi$ signifie que $-\pi$ est **exclu**, le crochet tourné vers l'intérieur en π qu'il est **inclus**. On exclut $-\pi$ car il a la même image que π : sans cela, le point I' aurait deux mesures principales.)

🧭 Méthode — Trouver la mesure principale de $\frac{p\pi}{q}$

1. Écrire $\frac{p}{q}$ et chercher le multiple **pair** le plus proche : on veut $\frac{p\pi}{q} = \alpha + 2k\pi$ avec $-\pi < \alpha \leq \pi$. 2. Concrètement : diviser p par $2q$ pour savoir combien de tours complets ($2\pi = \frac{2q\pi}{q}$) retirer. 3. Ajuster d'un tour si le résultat sort de $]-\pi;\pi]$.

✅ ***Exemple résolu 4 — Mesures principales*** *Déterminer la mesure principale de : a)* $\frac{37\pi}{4}$ *; b)* $-\frac{17\pi}{3}$ *; c)* $\frac{2023\pi}{6}$.

a) Un tour vaut $\frac{8\pi}{4}$. *On écrit* $37 = 8 \times 4 + 5$, *donc* $\frac{37\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} + 4 \times 2\pi$. *Mais* $\frac{5\pi}{4} > \pi$ *: on retire encore un tour :* $\frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4}$. *Mesure principale :* $\boxed{-\frac{3\pi}{4}}$. Vérification : $-\frac{3\pi}{4} + 10\pi = -\frac{3\pi}{4} + \frac{40\pi}{4} = \frac{37\pi}{4}$ ✓.

b) Un tour vaut $\frac{6\pi}{3}$. $-\frac{17\pi}{3} = -\frac{18\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = -6\pi + \frac{\pi}{3}$. *Comme* $-6\pi = -3 \times 2\pi$, *la mesure principale est* $\boxed{\frac{\pi}{3}}$.

c) Un tour vaut $\frac{12\pi}{6}$. $2023 = 12 \times 168 + 7$ *(car* $12 \times 168 = 2016$*). Donc* $\frac{2023\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} + 168 \times 2\pi$. *Or* $\frac{7\pi}{6} > \pi$, *donc on retire un tour :* $\frac{7\pi}{6} - 2\pi = -\frac{5\pi}{6}$. *Mesure principale :* $\boxed{-\frac{5\pi}{6}}$.

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Mesure principale et intervalle** La mesure principale est dans $]-\pi;\pi]$, **pas** dans $[0;2\pi[$. Pour $\frac{37\pi}{4}$, répondre $\frac{5\pi}{4}$ est faux comme « mesure principale » (même si $\frac{5\pi}{4}$ a bien la même image).

3.4 Placer les points remarquables

En partageant le cercle en 4, 8, 12 parts égales, on place les images des multiples de $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$:

> 🧭 **Méthode — Placer $\frac{k\pi}{n}$ rapidement**
>
> Compte en « parts de $\frac{\pi}{n}$ » : le demi-tour supérieur (0 à π) en contient n. Pour $\frac{5\pi}{6}$, on avance de 5 parts sur 6 dans le demi-cercle supérieur : on est presque en I', juste au-dessus. Pour $-\frac{2\pi}{3}$, on descend (sens indirect) de 2 parts sur 3 dans le demi-cercle inférieur.

---

4. Cosinus et sinus d'un nombre réel

4.1 La définition

Le point image $M(x)$ a deux coordonnées dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. On leur donne un nom.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Cosinus et sinus d'un réel** Soit x un réel et M son image sur le cercle trigonométrique. On appelle :
>
> - **cosinus de x**, noté $\cos x$ ou $\cos(x)$, l'**abscisse** de M ;
> - **sinus de x**, noté $\sin x$ ou $\sin(x)$, l'**ordonnée** de M.
>
> $$M(x) = \big(\cos x\,;\sin x\big)\,.$$

Lecture : $\cos x$ se lit « cosinus de x ». L'abréviation *cos* vient de *complementi sinus*, « sinus du complémentaire » (on verra plus bas que $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2}-x)$). Les abréviations *sin* et *cos* se sont imposées au XVII$^{\text{e}}$ siècle, notamment grâce à l'Anglais **William Oughtred** ; c'est **Euler** qui, au XVIII$^{\text{e}}$ siècle, en fait des **fonctions** d'un nombre réel.

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Ce n'est pas un produit** $\cos x$ n'est pas « $\cos \times x$ » : « cos » tout seul ne veut rien dire. Ainsi $\cos(2x) \neq 2\cos x$, et $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$ (par exemple $\cos(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}) = \cos\pi = -1$ alors que $\cos\frac{\pi}{2}+\cos\frac{\pi}{2} = 0$). Notation usuelle : $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$, le carré du cosinus — à ne pas confondre avec $\cos(x^2)$.

4.2 Retour à la grande roue

Mettons l'origine au centre de la roue, unité 1 = 20 m, et mesurons l'angle à partir du point le plus bas… C'est plus simple de partir du repère habituel : la position de la cabine à l'angle x (mesuré depuis le rayon horizontal de droite) est $(20\cos x\,;20\sin x)$ par rapport à l'axe. Comme la cabine part du **bas**, qui correspond à $x=-\frac{\pi}{2}$, après avoir tourné de θ elle est à l'angle $x=\theta-\frac{\pi}{2}$. Sa hauteur au-dessus du sol est :

$$h(\theta) = 22 + 20\sin\Big(\theta-\frac{\pi}{2}\Big).$$

Nous verrons au §6 que $\sin(\theta-\frac{\pi}{2}) = -\cos\theta$, d'où la formule élégante $h(\theta)=22-20\cos\theta$. Vérifions : $\theta=0$ donne $22-20=2$ m (départ en bas) ✓, $\theta=\pi$ donne $22+20=42$ m (sommet) ✓.

Réponse au petit frère : après 50 m, $\theta = 2,5$ rad et $h = 22 - 20\cos(2,5) \approx 22 - 20 \times (-0,8011) \approx 38,0$ m. Après 1 km, $\theta = 50$ rad et $h = 22 - 20\cos 50 \approx 22 - 20 \times 0,9650 \approx 2,7$ m : presque revenu en bas, comme prévu (7,96 tours).

4.3 Premières propriétés

📐 Propriétés fondamentales

— Pour tout réel x et tout entier k : 1. $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$; 2. $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$; 3. $\boxed{\cos^2 x + \sin^2 x = 1}$.

✍ Démonstration

1. M est sur le cercle de centre O et de

rayon 1, donc ses coordonnées sont comprises entre -1 et 1. 2. x et $x + 2k\pi$ ont la même image (§3.3), donc les mêmes coordonnées. 3. $OM = 1$. La formule de la distance dans un repère orthonormé (chapitre 20, conséquence de Pythagore) donne $OM^2 = (\cos x - 0)^2 + (\sin x - 0)^2$, donc $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. ■

4.4 Cohérence avec le collège

Le nouveau cosinus contredit-il l'ancien ? Non.

📐 Propriété — Lien avec le triangle rectangle

Si $0 < x < \frac{\pi}{2}$, alors $\cos x$ et $\sin x$ coïncident avec le cosinus et le sinus de l'angle aigu de mesure x dans un triangle rectangle.

✍ Démonstration

Soit $M(x)$ avec $0 < x < \frac{\pi}{2}$: M est dans le quart de cercle supérieur droit. Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Le triangle OHM est rectangle en H, d'hypoténuse $OM = 1$, et l'angle $\widehat{HOM}$ mesure x rad. Au sens du collège : $\cos \widehat{HOM} = \frac{OH}{OM} = \frac{OH}{1} = OH$, et OH est précisément l'abscisse de M (positive). De même $\sin \widehat{HOM} = \frac{HM}{OM} = HM$, qui est l'ordonnée de M. ■

4.5 Les signes selon les quadrants



Fig. 91. – Les quatre quadrants trigonométriques : signes de cos et sin

✅ ***Exemple résolu 5 — Utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$*** *On sait que $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$ et $\sin x = \frac{3}{5}$. Calculer $\cos x$.*
$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, *donc* $\cos x = \frac{4}{5}$ *ou* $\cos x = -\frac{4}{5}$. *Or x est dans le quadrant II, où le cosinus est négatif. Donc* $\boxed{\cos x = -\frac{4}{5}}$.

⚠️ **Attention au Piège !**

⚠️ **Attention, piège ! — Ne jamais oublier le signe**
$\cos^2 x = \frac{16}{25}$ ne donne pas automatiquement $\cos x = \frac{4}{5}$. L'équation $X^2 = a$ (avec $a > 0$) a **deux** solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ (chapitre 23). C'est la **position du point** sur le cercle qui tranche.

CHAPITRE 38 : Tirer la Corde et l'Ombre Efficace

> « Quand tu tires un fardeau avec une corde oblique, tes muscles brûlent, ton front ruisselle de sueur, et pourtant la charge avance à pas de tortue. Pourquoi ? Parce que l'univers ne te récompense pas pour la peine dépensée dans le vide : il ne compte que l'ombre utile de ta force sur le chemin. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi la multiplication usuelle entre deux nombres ne suffit pas quand on veut multiplier **deux flèches** (deux vecteurs).
- Le sens physique du **travail d'une force** et la découverte du **produit scalaire**.
- La géométrie du **projeté orthogonal** : comment faire tomber la lumière d'en haut pour mesurer l'ombre efficace.
- Les quatre visages du produit scalaire : par le **cosinus**, par la **projection**, par les **coordonnées cartésiennes** ($xx' + yy'$), et par les **longueurs seules** (formes de polarisation).
- Le critère absolu d'**orthogonalité** et son application reine : trouver le vecteur normal d'une droite et son équation cartésienne $ax + by + c = 0$.
- Les théorèmes puissants du triangle : la formule d'**Al-Kashi** (Pythagore généralisé) et le **théorème de la médiane**.
- La recherche des **ensembles de points** : caractériser un cercle par le produit scalaire $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

---

1. Le problème : le cheval de halage et la péniche de charbon

Au début du XIXe siècle, au cœur de la Révolution industrielle, le charbon est le sang qui alimente les machines à vapeur. Pour acheminer des milliers de tonnes de houille depuis les mines du Nord jusqu'aux usines de Paris ou de Londres, le réseau fluvial est le moyen le plus économique. De lourdes péniches ventrues, pesant plus de cent tonnes, glissent silencieusement sur les canaux.

Ces péniches n'ont pas encore de moteur. Elles sont remorquées depuis la terre ferme par un puissant cheval de trait ardennais marchant d'un pas lourd sur le chemin de terre qui longe le canal : le **chemin de halage**.

Regarde la scène depuis une passerelle au-dessus de l'eau :



Fig. 92. – Produit scalaire et travail d'une force : composante utile et signe géométrique

Le canal est rectiligne. La péniche glisse tout droit le long d'un vecteur de déplacement $\vec{d}$. Mais le cheval ne peut pas marcher sur l'eau ! Il est contraint d'avancer sur la berge. La longue corde de chanvre fait donc un **angle θ en biais** par rapport à la direction du canal.

Le cheval bande ses jarrets, son sabot s'enfonce dans la glaise, son poitrail écrase le collier de cuir : il déploie une force considérable $\vec{F}$. Et pourtant, un jeune apprenti batelier assis sur le gouvernail constate quelque chose de troublant : *« Le cheval s'épuise, et pourtant le bateau n'avance que très lentement. Pourquoi ? »*

Le marinier expérimenté lui répond : *« Parce qu'une partie de sa force tire le bateau vers la berge ! Cette partie-là ne fait rien avancer du tout : elle tente seulement d'échouer la péniche dans les roseaux. Je dois constamment lutter contre elle en poussant sur la barre du gouvernail. Seule la partie de la force qui pointe droit devant, parallèlement à l'eau, produit le mouvement utile. »*

Pour mesurer l'énergie réellement transmise au bateau, il ne suffit pas de multiplier la force par la distance. Il faut **extraire l'ombre efficace de la force dans la direction du mouvement**.

---

2. Le travail d'une force et la définition géométrique

2.1 Du geste physique au produit scalaire

En physique, lorsqu'un objet subit une force constante $\vec{F}$ lors d'un déplacement rectiligne $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$, l'énergie mécanique transmise s'appelle le **travail de la force**, noté W (de l'anglais *Work*).

Si la force était parfaitement alignée avec le déplacement ($\theta = 0$), toute la force contribuerait au mouvement : $W = \| \vec{F} \| \times \| \vec{d} \|$. Mais lorsque la corde est inclinée d'un angle θ, l'ombre efficace de la force vaut $\| \vec{F} \| \cos\theta$. Le travail s'écrit alors :

$$W = \| \vec{F} \| \times \| \vec{d} \| \times \cos\theta.$$

Pour formaliser cette opération mathématique qui combine deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ pour fabriquer **un simple nombre réel** (un scalaire, par opposition à un vecteur), les mathématiciens ont forgé un concept universel.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Produit scalaire (par la norme et le cosinus)**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

- Si l'un des deux vecteurs est nul ($\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$), leur produit scalaire est nul : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, on pose $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. Le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le nombre réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \| \vec{u} \| \times \| \vec{v} \| \times \cos(\widehat{AOB}).$$

Lecture et prononciation : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ se lit « $\vec{u}$ **scalaire** $\vec{v}$ ». Le point médian « · » est réservé à cette opération.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — D'où vient le mot « scalaire » ?** Le mot vient du latin *scala*, qui signifie « échelle », « degré ». C'est le mathématicien irlandais **William Rowan Hamilton** qui l'introduit en 1843 lorsqu'il invente les quaternions : il appelle « partie scalaire » la partie numérique pure qui se gradue sur une échelle ordinaire de nombres, par opposition à la « partie vectorielle » dotée d'une direction dans l'espace. Le produit scalaire moderne tel qu'on l'écrit avec un point a été popularisé par le physicien américain **Josiah Willard Gibbs** à la fin du XIX^{e} siècle.

2.2 Les trois régimes de la corde

La valeur du produit scalaire dépend de l'angle θ formé par les deux vecteurs :

1. **Angle aigu ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$) : produit scalaire strictement positif.** $\cos\theta > 0$. La force aide le déplacement : les physiciens parlent de **travail moteur**. L'ombre tombe dans le sens de la marche.
2. **Angle droit ($\theta = \frac{\pi}{2}$, soit 90°) : produit scalaire nul.** $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Si le cheval tire à angle droit de la rive, le bateau n'avance pas d'un millimètre dans le canal. Toute son énergie part à tenter de casser la berge.

3. **Angle obtus ($\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$) : produit scalaire strictement négatif.** $\cos\theta < 0$. La force s'oppose au déplacement : c'est le rôle des freins ou des frottements de l'eau, que les physiciens nomment **travail résistant**.

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Scalaire n'est pas vecteur** Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **jamais un vecteur** ! C'est un **nombre réel** (qui peut être positif, nul ou négatif). Écrire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{0}$ avec une flèche sur le zéro est une erreur grossière de notation. On écrit $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

---

3. Le projeté orthogonal : mesurer l'ombre portée

3.1 Définition par la projection

Au lieu de calculer un cosinus, il est souvent bien plus rapide de faire tomber la perpendiculaire.

> 📐 **Propriété — Définition par projection orthogonale**
>
> Soient $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ deux vecteurs non nuls. Soit H le projeté orthogonal du point B sur la droite (OA).
>
> $$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH}.$$
>
> En mesures algébriques orientées par l'axe (OA) :
> - Si $\overrightarrow{OH}$ et $\overrightarrow{OA}$ ont le **même sens** (angle aigu) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = OA \times OH$.
> - Si $\overrightarrow{OH}$ et $\overrightarrow{OA}$ ont des **sens contraires** (angle obtus) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -OA \times OH$.

> ✍️ **Démonstration**
>
> Dans le triangle OHB rectangle en H :
> - Si l'angle $\widehat{AOB}$ est aigu, $\cos(\widehat{AOB}) = \frac{OH}{OB}$, donc $OH = OB\cos(\widehat{AOB})$. Ainsi, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB\cos(\widehat{AOB}) = OA \times OH$.
> - Si l'angle $\widehat{AOB}$ est obtus, le projeté H est situé de l'autre côté de O. L'angle adjacent dans le triangle rectangle est $\pi - \widehat{AOB}$. Comme $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$, on a $OH = OB\cos(\pi - \widehat{AOB}) = -OB\cos(\widehat{AOB})$. Par suite, $OA \times OB\cos(\widehat{AOB}) = -OA \times OH$. Dans les deux cas, le résultat correspond exactement à l'expression annoncée. ■

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ? — La symétrie du produit scalaire** Projeter B sur (OA) donne le même résultat que projeter A sur (OB) ! En effet, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \| \vec{u} \| \| \vec{v} \| \cos\theta = \| \vec{v} \| \| \vec{u} \| \cos\theta = \vec{v} \cdot \vec{u}$. Le produit scalaire est **commutatif**.

3.2 Le carré scalaire

Que se passe-t-il si l'on calcule le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même ? L'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{u}$ est nul ($\theta = 0$), et $\cos(0) = 1$.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Carré scalaire** Pour tout vecteur $\vec{u}$, on note $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$. On a :
>
> $$\vec{u}^2 = \| \vec{u} \|^2.$$
>
> Le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme. C'est un réel **positif ou nul**, et $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$. Pour un segment géométrique $[AB]$, on a $\overrightarrow{AB}^2 = AB^2$.

4. L'expression analytique en repère orthonormé

4.1 La formule $xx' + yy'$

Lorsque le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, les vecteurs de base vérifient :

- $\| \vec{\imath} \| = 1$ et $\| \vec{\jmath} \| = 1$, donc $\vec{\imath}^2 = 1$ et $\vec{\jmath}^2 = 1$.
- $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont perpendiculaires, donc $\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = 0$.

C'est ici que la magie de l'algèbre simplifie tous les calculs géométriques :

> ⚠️ ⚠️ **Condition absolue — Le repère doit être ORTHONORMÉ**
>
> La formule analytique $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ est **fondamentalement fausse** si le repère n'est pas orthonormé ! Dans une base quelconque ou oblique, la métrique fait intervenir le cosinus de l'angle des axes et la norme des vecteurs de base. Mentionnez toujours expressément l'hypothèse « dans un repère orthonormé » sur votre copie.

> 📐 **Théorème — Formule analytique du produit scalaire**
>
> Dans un repère **orthonormé** $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, si $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors :
>
> $$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'}$$

> ✍️ **Démonstration**
>
> Par bilinéarité du produit scalaire (développons comme un produit usuel) :
>
> $$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}) \cdot (x'\vec{\imath} + y'\vec{\jmath}) \\ &= xx'(\vec{\imath} \cdot \vec{\imath}) + xy'(\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath}) + yx'(\vec{\jmath} \cdot \vec{\imath}) + yy'(\vec{\jmath} \cdot \vec{\jmath}). \end{aligned}$$
>
> Or $\vec{\imath} \cdot \vec{\imath} = 1$, $\vec{\jmath} \cdot \vec{\jmath} = 1$ et $\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{\jmath} \cdot \vec{\imath} = 0$. Les deux termes croisés s'annulent complètement ! Il reste :
>
> $$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx'(1) + 0 + 0 + yy'(1) = xx' + yy'. \quad \blacksquare$$

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — Repère impérativement orthonormé** La formule $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ est **fausse** si les axes ne sont pas perpendiculaires ou si les unités sur les deux axes sont différentes ! Elle n'est vraie que dans un repère **orthonormé**.

5. Les formes de polarisation : calculer avec les normes seules

Peut-on connaître le produit scalaire de deux vecteurs sans connaître ni leurs coordonnées, ni l'angle entre eux, mais uniquement la longueur des tiges qui les composent ? Oui, grâce aux **identités remarquables vectorielles**.

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\| \vec{u} + \vec{v} \|^2 = (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \| \vec{u} \|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \| \vec{v} \|^2 .$$

En isolant le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$, on obtient la célèbre formule de polarisation :

📐 Théorème — Formes de polarisation

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

1. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$
2. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$
3. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{4}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$

Dans un triangle ABC avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on remarque que $\vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. La deuxième formule devient :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2).$$

C'est une passerelle directe entre les longueurs des trois côtés d'un triangle et le produit scalaire !

---

6. Orthogonalité, vecteur normal et équation de droite

6.1 Le critère d'orthogonalité

📐 Théorème fondamental de l'orthogonalité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0.$$

Dans un repère orthonormé avec $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow xx' + yy' = 0.$$

6.2 Vecteur normal à une droite

En Seconde, une droite était caractérisée par un point et un *vecteur directeur* $\vec{u}$ parallèle à la droite. En Première, le produit scalaire permet une approche bien plus commode : caractériser la droite par une flèche qui lui est **perpendiculaire**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Vecteur normal** Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit **normal** à une droite (d) s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de (d).

Un point $M(x;y)$ appartient à la droite (d) passant par $A(x_A;y_A)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a;b)$ si et seulement si :

$$\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0 \Leftrightarrow a(x-x_A) + b(y-y_A) = 0 \Leftrightarrow ax + by + (-ax_A - by_A) = 0.$$

En posant $c = -ax_A - by_A$, on retrouve l'équation cartésienne !

📐 Théorème — Équation cartésienne et vecteur normal

- Dans un repère orthonormé, toute droite ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ admet une équation cartésienne de la forme :
$$ax + by + c = 0 \quad (\text{avec } (a;b) \neq (0;0)).$$
- Réciproquement, toute équation $ax + by + c = 0$ avec $(a;b) \neq (0;0)$ est l'équation d'une droite de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$.

---

7. Les deux grands théorèmes métriques du triangle

7.1 Le théorème d'Al-Kashi (loi des cosinus)

Dans un triangle quelconque ABC, si l'angle $\hat{A}$ n'est pas droit, que devient le théorème de Pythagore ?

> **📐 Théorème d'Al-Kashi (ou de Pythagore généralisé)**
>
> Soit un triangle ABC. En notant $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ et $\hat{A} = \widehat{BAC}$:
>
> $$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}.$$
>
> De même pour les autres sommets :
>
> $$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\hat{B}, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\hat{C}.$$

> **✍️ Démonstration géométrique par le produit scalaire**
>
> Écrivons la relation de Chasles pour le vecteur $\overrightarrow{BC}$: $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Élevons au carré scalaire :
>
> $$BC^2 = \| \overrightarrow{BC} \|^2 = \| \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \|^2 = \| \overrightarrow{AC} \|^2 - 2\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} + \| \overrightarrow{AB} \|^2 .$$
>
> Or $\| \overrightarrow{AC} \| = b$, $\| \overrightarrow{AB} \| = c$, et $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC\cos\hat{A} = bc\cos\hat{A}$. On remplace :
>
> $$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}. \quad \blacksquare$$

Remarque la beauté de la formule : si $\hat{A} = 90^\circ$, alors $\cos(90^\circ) = 0$, et le terme correctif $-2bc\cos\hat{A}$ disparaît : on retrouve exactement le théorème de Pythagore $a^2 = b^2 + c^2$! Al-Kashi contient Pythagore comme un cas particulier.

> **Découverte & Histoire**
>
> **🔍 L'histoire vraie — Ghiyath al-Din Jamshid al-Kashi**
>
> Astronome et mathématicien persan du XV^e^ siècle, Al-Kashi travaillait à l'observatoire de Samarcande sous la protection du prince Ulugh Beg. Dans son chef-d'œuvre, *La Clé de l'Arithmétique* (1427), il calcule π avec 16 décimales exactes (un record mondial qui tiendra deux siècles) et établit des tables trigonométriques d'une précision inouïe. La formule qui porte aujourd'hui son nom en France permettait aux astronomes de résoudre n'importe quel triangle sans avoir besoin de le découper en triangles rectangles.

7.2 Le théorème de la médiane

Considérons un triangle ABC et désignons par I le **milieu** du segment $[BC]$. Comment relier la longueur de la médiane AI aux longueurs des trois côtés ?

> **📐 Théorème de la médiane**
>
> Dans tout triangle ABC, si I est le milieu du segment $[BC]$, alors :
>
> $$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2.$$

✍️ **Démonstration**

Exprimons les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en passant par le milieu I : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}$. Élevons au carré scalaire :

$$AB^2 = \| \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} \|^2 = AI^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IB} + IB^2,$$

$$AC^2 = \| \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC} \|^2 = AI^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{IC} + IC^2.$$

Additionnons membre à membre ces deux égalités :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + 2\overrightarrow{AI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) + IB^2 + IC^2.$$

Or I est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$! Le terme central s'annule complètement. De plus, $IB = IC = \frac{BC}{2}$, donc $IB^2 + IC^2 = \left(\frac{BC}{2}\right)^2 + \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = 2\frac{BC^2}{4} = \frac{1}{2}BC^2$. Il vient immédiatement :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2. \quad \blacksquare$$

---

8. Ensembles de points et équations de cercles

Le produit scalaire offre une méthode d'une élégance absolue pour trouver la formule algébrique d'un cercle.

8.1 Cercle défini par son centre et son rayon

Un point $M(x ; y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(x_\Omega ; y_\Omega)$ et de rayon R si et seulement si la distance ΩM vaut R :

$$\Omega M^2 = R^2 \Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2.$$

8.2 Cercle défini par un diamètre $[AB]$

Rappelle-toi du collège : un triangle inscrit dans un cercle ayant pour hypoténuse le diamètre est un **triangle rectangle**. Autrement dit : un point M (distinct de A et B) appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si l'angle $\widehat{AMB}$ est droit, ce qui équivaut vectoriellement à :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0.$$

(Remarque : si $M = A$ ou $M = B$, l'un des vecteurs est nul, le produit scalaire est encore nul, donc la relation reste vraie en tout point du cercle).

📐 **Théorème — Équation d'un cercle de diamètre [A B]**

Le cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$, est l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow (x_A - x)(x_B - x) + (y_A - y)(y_B - y) = 0,$$

ou encore :

$$\boxed{(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0}$$

Exemples résolus pas à pas

✅ ***Exemple résolu 1 — Calcul de produit scalaire sous plusieurs formes*** *Soit un carré $ABCD$ de côté 4 et de centre O. Calculer les produits scalaires suivants : 1. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 3. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ 4. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$*

Solution détaillée : *1. Par projeté orthogonal : Le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) est le point B. Donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}=AB^2=4^2=16$. 2. Par orthogonalité : Dans un carré, $(AB)\perp(AD)$, donc l'angle est droit : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$. 3. Vecteurs colinéaires de sens contraires : $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=-AB^2=-16$. 4. Dans un carré, les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu O, donc $(OA)\perp(OB)$. Ainsi, $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$.*

✅ ***Exemple résolu 2 — Calcul d'un angle avec les coordonnées***

Dans un repère orthonormé, on donne trois points : $A(1;2)$, $B(4;6)$ et $C(-2;6)$. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$ au dixième de degré près.

Solution détaillée : *Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:*

- $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\6-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$;
- $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2-1\\6-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$.

1. *Produit scalaire analytique : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=xx'+yy'=3\times(-3)+4\times4=-9+16=7$.*
2. *Calcul des normes : $\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$. $\|\overrightarrow{AC}\|=\sqrt{(-3)^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$.*
3. *Extraction du cosinus : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\|\overrightarrow{AB}\|\times\|\overrightarrow{AC}\|\times\cos\widehat{BAC}$, donc $7=5\times5\times\cos\widehat{BAC}=25\cos\widehat{BAC}$, d'où $\cos\widehat{BAC}=\frac{7}{25}=0,28$.*
4. *À la calculatrice : $\widehat{BAC}=\arccos(0,28)\approx73,7°$.*

✅ ***Exemple résolu 3 — Équation cartésienne à l'aide d'un vecteur normal*** *Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point $A(3;-1)$ et perpendiculaire à la droite (Δ) d'équation $2x-5y+7=0$.*

Solution détaillée :

- *La droite (Δ) a pour vecteur normal $\overrightarrow{n_\Delta}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$.*
- *Comme (d) est perpendiculaire à (Δ), un vecteur normal à (Δ) est un **vecteur directeur** de (d). Donc $\vec{u}_d=\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$.*
- *Un vecteur normal à (d) doit être orthogonal à $\vec{u}_d$. Le vecteur $\vec{n}_d\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$ convient parfaitement car $2\times5+(-5)\times2=10-10=0$.*
- *L'équation de (d) est donc de la forme $5x+2y+c=0$.*
- *Comme $A(3;-1)\in(d)$, ses coordonnées vérifient l'équation : $5(3)+2(-1)+c=0\Leftrightarrow15-2+c=0\Leftrightarrow13+c=0\Leftrightarrow c=-13$.*
- *L'équation cartésienne de (d) est donc : $\boxed{5x+2y-13=0}$.*

✅ ***Exemple résolu 4 — Calcul de longueur et d'angle par Al-Kashi*** *Un géomètre observe un terrain triangulaire ABC. Il mesure $AB=60$ m, $AC=100$ m et l'angle $\widehat{BAC}=60°$. 1. Calculer la distance BC. 2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$ au degré près.*

Solution détaillée : *1. D'après le théorème d'Al-Kashi : $BC^2=AB^2+AC^2-2\times AB\times AC\times\cos\hat{A}$. $BC^2=60^2+100^2-2\times60\times100\times\cos(60°)$. Comme $\cos(60°)=\frac{1}{2}$: $BC^2=3600+10000-12000\times0,5=13600-6000=7600$. Donc $BC=\sqrt{7600}\approx87,18$ m.*

2. *Pour l'angle $\hat{B}$, appliquons Al-Kashi en isolant $\cos\hat{B}$: $AC^2=AB^2+BC^2-2\times AB\times BC\times\cos\hat{B}$, $100^2=60^2+7600-2\times60\times\sqrt{7600}\times\cos\hat{B}$, $10000=3600+7600-120\sqrt{7600}\cos\hat{B}=11200-120\sqrt{7600}\cos\hat{B}$. $120\sqrt{7600}\cos\hat{B}=11200-10000=1200$. $\cos\hat{B}=\frac{1200}{120\sqrt{7600}}=\frac{10}{\sqrt{7600}}\approx0,1147$. D'où $\hat{B}=\arccos(0,1147)\approx83°$.*

✅ ***Exemple résolu 5 — Équation d'un cercle défini par un diamètre*** *On donne les points $A(-1;3)$ et $B(5;1)$. 1. Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$. 2. Déterminer les coordonnées de son centre Ω et son rayon R, puis vérifier la forme $(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2=R^2$.*

Solution détaillée : *1. $M(x;y)\in\mathcal{C}\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}-1-x\\3-y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}5-x\\1-y\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(-1-x)(5-x)+(3-y)(1-y)=0$. Développons : $(-5+x-5x+x^2)+(3-3y-y+y^2)=0\Leftrightarrow x^2-4x+y^2-4y-2=0$.*

2. Centre Ω, milieu de $[AB]$: $x_\Omega=\frac{-1+5}{2}=2$, et $y_\Omega=\frac{3+1}{2}=2$, donc $\Omega(2;2)$. Rayon : $AB=\sqrt{(5-(-1))^2+(1-3)^2}=\sqrt{6^2+(-2)^2}=\sqrt{36+4}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$. Le rayon est $R=\frac{AB}{2}=\sqrt{10}$, d'où $R^2=10$. L'équation réduite est $(x-2)^2+(y-2)^2=10$. En développant : $x^2-4x+4+y^2-4y+4=10\Leftrightarrow x^2-4x+y^2-4y-2=0$. On retrouve exactement la même équation !

✅ ***Exemple résolu 6 — Utiliser le théorème de la médiane*** *Soit un triangle ABC tel que $AB=7$, $AC=9$ et $BC=8$. Calculer la longueur exacte de la médiane issue de A.*

Solution détaillée : *Soit I le milieu de $[BC]$. La médiane issue de A est le segment $[AI]$. D'après le théorème de la médiane :*

$$AB^2+AC^2=2AI^2+\frac{1}{2}BC^2.$$

On remplace par les valeurs connues :

$$7^2+9^2=2AI^2+\frac{1}{2}(8^2),$$

$$49+81=2AI^2+\frac{1}{2}(64),$$

$$130=2AI^2+32.$$

On isole AI^2 :

$$2AI^2=130-32=98\Longrightarrow AI^2=49\Longrightarrow AI=\sqrt{49}=7.$$

La médiane mesure exactement 7.

Ce qu'il faut retenir

1. **Quatre définitions équivalentes du produit scalaire :**
   - Géométrique : $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$.
   - Par projection : $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\pm OA\times OH$ (H projeté orthogonal de B sur (OA)).
   - Analytique (repère orthonormé) : $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\cdot\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=xx'+yy'$.
   - Polarisation : $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$.
2. **Orthogonalité et géométrie vectorielle :**
   - $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}\cdot\vec{v}=0\Leftrightarrow xx'+yy'=0$.
   - Une droite de vecteur normal $\vec{n}(a;b)$ a pour équation cartésienne $ax+by+c=0$.
3. **Formules fondamentales du triangle :**
   - Al-Kashi : $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\hat{A}$.
   - Médiane : $AB^2+AC^2=2AI^2+\frac{1}{2}BC^2$ (avec I milieu de $[BC]$).
4. **Cercles :**
   - Centre $\Omega(x_\Omega;y_\Omega)$ et rayon R : $(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2=R^2$.
   - Diamètre $[AB]$: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0\Leftrightarrow(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)=0$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

1. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\| \vec{u} \| = 5$, $\| \vec{v} \| = 6$ et l'angle entre eux vaut $\frac{\pi}{3}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Dans un repère orthonormé, on donne $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont-ils orthogonaux ?
4. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}$ à la droite d'équation $3x - 7y + 11 = 0$.
5. Donner une équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 4)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.
6. Dans un triangle ABC, on donne $AB = 5$, $AC = 8$ et $\hat{A} = 60°$. Calculer la longueur BC.
7. Soit un segment $[AB]$ avec $A(2; 1)$ et $B(6; 5)$. Écrire l'équation du cercle de diamètre $[AB]$.
8. Soit un triangle équilatéral ABC de côté $a = 6$. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Niveau (Réflexion et géométrie)

9. Soit un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6$ et $BC = 3$. Soit I le milieu de $[AB]$. Calculer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DI}$.
10. Démontrer que dans un losange, les diagonales se coupent à angle droit en utilisant le produit scalaire de $(\vec{u} + \vec{v})$ et $(\vec{u} - \vec{v})$.
11. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2; 1)$, $B(2; 3)$ et $C(1; 5)$.
    a) Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.
    b) En déduire une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$.
12. Déterminer la valeur du réel k pour que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 2k-1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ k+2 \end{pmatrix}$ soient orthogonaux.
13. On considère le triangle MNP avec $MN = 5$, $NP = 7$ et $MP = 8$. Calculer l'angle $\widehat{MNP}$ au dixième de degré.
14. Soit un triangle ABC avec $AB = 6$, $AC = 10$, et la médiane $AI = 6$. Calculer la longueur du côté BC.
15. Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ dont les coordonnées vérifient l'équation :
$$x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0.$$
16. Déterminer la distance du point $A(2; 3)$ à la droite (d) d'équation $4x + 3y - 7 = 0$ en utilisant un vecteur normal.

Niveau (Problèmes et défis Bac)

17. **Hauteurs d'un triangle concourantes :** Soit un triangle ABC. Soit H l'intersection des hauteurs issues de A et de B.
    a) Exprimer l'appartenance de H aux deux premières hauteurs en termes de produits scalaires.
    b) En déduire que $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, et conclure que les trois hauteurs sont concourantes.
18. **Ensemble de points et ligne de niveau :** Soient A et B deux points distincts distants de $AB = 6$ cm. On note I le milieu de $[AB]$. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan vérifiant :
$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7.$$
19. **Optimisation d'un tir de rugby :** Un joueur de rugby doit transformer un essai marqué en coin. Soient les poteaux situés en $P_1(0; 2)$ et $P_2(0; -2)$. Le joueur peut reculer perpendiculairement sur la ligne $y = 5$. En quelle abscisse $x > 0$ doit-il placer le ballon pour que l'angle de tir $\widehat{P_1MP_2}$ soit maximal ?
20. **Formule de Heron démontrée par Al-Kashi :** Soit un triangle ABC de côtés a, b, c et de demi-périmètre $p = \frac{a+b+c}{2}$. En utilisant l'aire $\mathcal{S} = \frac{1}{2}bc\sin\hat{A}$ et la formule d'Al-Kashi pour $\cos\hat{A}$, démontrer la célèbre formule de Héron d'Alexandrie :
$$\mathcal{S} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$
21. **Puissance d'un point par rapport à un cercle :** Soit un cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R, et un point M quelconque du plan. Une droite passant par M coupe le cercle en deux points A et B. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ ne dépend pas de la droite choisie et vaut toujours $M\Omega^2 - R^2$.

Solutions

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 6 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 30 \times 0,5 = 15$.

2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-3) \times 2 + 4 \times 5 = -6 + 20 = 14$.

3. $xx' + yy' = 4 \times 9 + (-6) \times 6 = 36 - 36 = 0$. Oui, les vecteurs sont orthogonaux.

4. Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$ est normal à la droite.

5. $2(x-1) - 3(y-4) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3y - 2 + 12 = 0 \Leftrightarrow 2x - 3y + 10 = 0$.

6. Al-Kashi : $BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos(60°) = 25 + 64 - 80 \times 0,5 = 89 - 40 = 49$. Donc $BC = 7$.

7. $(x-2)(x-6) + (y-1)(y-5) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 + y^2 - 6y + 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 8x - 6y + 17 = 0$.

8. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times 6 \times \cos(60°) = 36 \times 0,5 = 18$.

9. Plaçons un repère orthonormé d'origine D avec (DA) comme axe des abscisses et (DC) comme axe des ordonnées. $D(0;0)$, $A(3;0)$, $B(3;6)$, $C(0;6)$. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $(3;3)$. Ainsi, $\overrightarrow{CA}\begin{pmatrix}3-0\\0-6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$. Le produit scalaire vaut : $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{DI} = 3 \times 3 + (-6) \times 3 = 9 - 18 = -9$.

10. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ les deux vecteurs formant les côtés adjacents issus d'un sommet d'un losange. Comme tous les côtés d'un losange sont égaux, $\| \vec{u} \| = \| \vec{v} \|$, donc $\| \vec{u} \|^2 - \| \vec{v} \|^2 = 0$. Les diagonales sont représentées par les vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$. Calculons leur produit scalaire grâce à l'identité remarquable vectorielle : $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \| \vec{u} \|^2 - \| \vec{v} \|^2 = 0$. Leur produit scalaire étant nul, les diagonales d'un losange sont rigoureusement perpendiculaires.

11. a) $\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-2-2\\1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$, et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1-2\\5-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-4) \times (-1) + (-2) \times 2 = 4 - 4 = 0$. b) Comme le produit scalaire est nul, les vecteurs sont orthogonaux : $\widehat{ABC} = 90°$ exactement !

12. $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow (2k-1) \times 4 + 3 \times (k+2) = 0 \Leftrightarrow 8k - 4 + 3k + 6 = 0 \Leftrightarrow 11k + 2 = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{2}{11}$.

13. Par Al-Kashi dans MNP : $MP^2 = MN^2 + NP^2 - 2 \times MN \times NP \times \cos\hat{N}$. $8^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \cos\hat{N} \Leftrightarrow 64 = 25 + 49 - 70\cos\hat{N} \Leftrightarrow 64 = 74 - 70\cos\hat{N}$. $70\cos\hat{N} = 10 \Leftrightarrow \cos\hat{N} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7} \approx 0,1428$. Donc $\widehat{MNP} = \arccos\left(\frac{1}{7}\right) \approx 81,8°$.

14. Théorème de la médiane : $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{1}{2}BC^2$. $6^2 + 10^2 = 2(6^2) + \frac{1}{2}BC^2 \Leftrightarrow 36 + 100 = 72 + \frac{1}{2}BC^2 \Leftrightarrow 136 = 72 + \frac{1}{2}BC^2$. $\frac{1}{2}BC^2 = 64 \Leftrightarrow BC^2 = 128 \Longrightarrow BC = \sqrt{128} = 8\sqrt{2} \approx 11,31$.

15. Forme canonique : $(x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 - 9 + (y+4)^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$. Il s'agit du cercle de centre $\Omega(3;-4)$ et de rayon $R = \sqrt{25} = 5$.

16. Soit H le projeté orthogonal de A sur (d). La distance de A à (d) est la longueur AH. Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ est normal à (d), sa norme vaut $\| \vec{n} \| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. Prenons un point quelconque de (d), par exemple $B(1;1)$ car $4(1) + 3(1) - 7 = 0$. Le vecteur $\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix}2-1\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. La valeur absolue du produit scalaire donne $|\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n}| = \| \vec{n} \| \times AH$. Or $\overrightarrow{BA} \cdot \vec{n} = 1 \times 4 + 2 \times 3 = 10$. D'où $10 = 5 \times AH \Longrightarrow AH = \frac{10}{5} = 2$. La distance vaut exactement 2.

17. a) H est sur la hauteur issue de A, donc $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. H est sur la hauteur issue de B, donc $\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. b) Calculons $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CH} \cdot (\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{CA}$. Or $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BH}$. En substituant astucieusement : $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{CB} = (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} + 0$. De même, $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BH}) \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} + 0$. Ainsi, $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$. Le vecteur $\overrightarrow{CH}$ est donc orthogonal à $\overrightarrow{AB}$: la droite (CH) est la troisième hauteur du triangle. Les trois hauteurs passent par le même point H : elles sont concourantes.

18. Exprimons $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ en passant par le milieu I de $[AB]$: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})$. Comme $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$, on a l'identité remarquable : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2$. Comme $AB = 6$, $IA = 3$, donc $IA^2 = 9$. L'équation devient : $MI^2 - 9 = 7 \Leftrightarrow MI^2 = 16 \Leftrightarrow MI = 4$. L'ensemble recherché est donc le **cercle de centre I (milieu de $[AB]$) et de rayon $R = 4$ cm**.

19. Un point de la ligne de tir est $M(x;5)$ avec $x > 0$. $\overrightarrow{MP_1}\begin{pmatrix}-x\\2-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-x\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MP_2}\begin{pmatrix}-x\\-2-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-x\\-7\end{pmatrix}$. Le produit scalaire vaut : $\overrightarrow{MP_1} \cdot \overrightarrow{MP_2} = (-x)(-x) + (-3)(-7) = x^2 + 21$. Les normes valent : $\| \overrightarrow{MP_1} \| = \sqrt{x^2 + 9}$ et $\| \overrightarrow{MP_2} \| = \sqrt{x^2 + 49}$. Le cosinus de l'angle $\theta = \widehat{P_1MP_2}$ vérifie $\cos\theta = \frac{x^2+21}{\sqrt{(x^2+9)(x^2+49)}}$. L'angle θ est aigu et maximal quand $\cos\theta$ est minimal (ou $\tan\theta$ maximal). En élevant au carré le rapport : $\cos^2\theta = \frac{(x^2+21)^2}{x^4+58x^2+441} = \frac{x^4+42x^2+441}{x^4+58x^2+441} = 1 - \frac{16x^2}{x^4+58x^2+441} = 1 - \frac{16}{x^2+58+\frac{441}{x^2}}$. Ce cosinus est minimal lorsque le dénominateur $x^2 + \frac{441}{x^2}$ est minimal. D'après l'inégalité arithmético-géométrique, la somme de deux nombres de produit constant $x^2 \times \frac{441}{x^2} = 441$ est minimale lorsqu'ils sont égaux : $x^2 = \frac{441}{x^2} \Leftrightarrow x^4 = 441 \Leftrightarrow x^2 = 21 \Leftrightarrow x = \sqrt{21} \approx 4,58$ m. Le buteur doit poser le ballon à environ 4,58 mètres des poteaux.

20. On sait que l'aire d'un triangle vaut $\mathcal{S} = \frac{1}{2}bc\sin\hat{A}$. Donc $4\mathcal{S} = 2bc\sin\hat{A}$, d'où $16\mathcal{S}^2 = 4b^2c^2\sin^2\hat{A} = 4b^2c^2(1 - \cos^2\hat{A}) = (2bc - 2bc\cos\hat{A})(2bc + 2bc\cos\hat{A})$. D'après Al-Kashi, $2bc\cos\hat{A} = b^2 + c^2 - a^2$. Remplaçons : $2bc - (b^2 + c^2 - a^2) = a^2 - (b-c)^2 = (a - b + c)(a + b - c)$. $2bc + (b^2 + c^2 - a^2) = (b+c)^2 - a^2 =$

$(b+c-a)(b+c+a)$. Comme $p=\frac{a+b+c}{2}$, on a $a+b+c=2p$, $b+c-a=2(p-a)$, $a+c-b=2(p-b)$, et $a+b-c=2(p-c)$. Le produit devient : $16\mathcal{S}^2=2(p-b)\times 2(p-c)\times 2(p-a)\times 2p=16p(p-a)(p-b)(p-c)$. En divisant par 16 et en prenant la racine carrée, on obtient exactement : $\mathcal{S}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

21. Soit A' le point diamétralement opposé à A sur le cercle. Alors le triangle $AA'B$ est inscrit dans un demi-cercle, donc l'angle $\widehat{A'BA}$ est droit : $(BA')\perp(BA)$. Le projeté orthogonal de A' sur la droite (AB) est donc le point B. Par projection orthogonale : $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MA'}$. Or $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{M\Omega}+\overrightarrow{\Omega A}$ et $\overrightarrow{MA'}=\overrightarrow{M\Omega}+\overrightarrow{\Omega A'}$. Comme A et A' sont diamétralement opposés, $\overrightarrow{\Omega A'}=-\overrightarrow{\Omega A}$. Donc : $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(\overrightarrow{M\Omega}+\overrightarrow{\Omega A})\cdot(\overrightarrow{M\Omega}-\overrightarrow{\Omega A})=\|\overrightarrow{M\Omega}\|^2-\|\overrightarrow{\Omega A}\|^2=M\Omega^2-R^2$. Cette quantité ne dépend que de la position de M et des paramètres du cercle, et est indépendante de la droite sécante sécante tracée. C'est la **puissance du point M par rapport au cercle $\mathcal{C}$**.

La question qui ouvre la suite

Le produit scalaire nous a permis de mesurer l'inclinaison d'une force par rapport à une droite, et de calculer la pente d'un segment rigide. Mais que se passe-t-il si la pente n'est plus une ligne droite, mais une **courbe ondulante** comme une colline enneigée où un skieur dévale à toute allure ? Comment mesurer l'inclinaison de la planche sous la semelle en un instant infinitésimal, en un seul point de contact ? C'est la grande aventure de la **dérivation**, qui s'ouvre au chapitre suivant.

CHAPITRE 39 : Le Skieur et la Planche sous la Semelle

> « Jusqu'ici, notre regard prenait des photographies immobiles du monde : des positions figées, des moyennes sur de longues distances. Mais la vie n'est pas un album d'images mortes : elle est un torrent continu. Pour mesurer la pente d'une colline au moment précis où le cœur bat, il faut poser un microscope sur le temps qui coule. »

Ce que tu vas découvrir

- Le paradoxe du skieur : comment mesurer la **pente en un seul point**, alors qu'une pente exige deux points séparés.
- Le **taux d'accroissement** et le coup de génie du **passage à la limite** quand l'écart h tend vers 0.
- Les notations légendaires : le « $f'(a)$ » de **Lagrange** et le « $\frac{dy}{dx}$ » de **Leibniz**.
- L'équation de la **tangente** : la droite rigide qui effleure la courbe sans la transpercer.
- La preuve géométrique des dérivées usuelles : pourquoi $(x^2)' = 2x$ grâce au **jardin qui grandit**, et les dérivées de x^n, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$.
- Les opérations sur les fonctions : $(uv)' = u'v + uv'$ (démontré par le rectangle mobile) et la formule du quotient.
- Le lien fondamental entre le **signe de la dérivée** et le **sens de variation**, et la traque des **extremums locaux**.
- Les cas limites où le calcul différentiel s'arrête : le **point anguleux** de la valeur absolue et la **tangente verticale** de la racine carrée.
- Des problèmes concrets d'**optimisation** : fabriquer la boîte la plus spacieuse ou le réservoir le moins cher.

---

1. Le problème : le vertige de la descente

Tu as seize ans. Tu te tiens au sommet d'une haute montagne enneigée, skis aux pieds, bâtons plantés dans la poudreuse. Devant toi s'ouvre une piste olympique redoutable : ce n'est pas une rampe droite et régulière, c'est une succession de collines bosselées, de cuvettes abruptes et de replats trompeurs. Le profil vertical de la montagne est une courbe sinueuse, décrite par une fonction d'altitude $y = f(x)$.

Tu t'élances. Le vent siffle dans ton casque, la neige vole en gerbes glacées sous tes carres. La pente change à chaque centième de seconde sous tes semelles : tantôt douce, tantôt plongeant vertigineusement vers le vide.

Au creux de la trajectoire, à l'abscisse exacte a, une sensation brutale comprime tes cuisses. Pose-toi cette question fondamentale de physicien :

« À cet instant précis, à cette milliseconde où mes carres mordent la neige, quelle est la pente de la montagne sous mes pieds ? »

Pour connaître ton altitude en ce point, c'est immédiat : c'est la valeur $f(a)$. Mais pour **la pente** ? Depuis le collège, tu as appris qu'une pente (un coefficient directeur) se calcule toujours en divisant une différence de hauteur par une différence horizontale entre **deux points distincts** :

$$\text{Pente} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Or, à cet instant précis, tu n'es qu'en **un seul point** ! Si tu tentes d'appliquer la formule en prenant deux fois le même point $A(a; f(a))$, tu obtiens :

$$\text{Pente} = \frac{f(a) - f(a)}{a - a} = \frac{0}{0}.$$

Une division par zéro ! Une absurdité mathématique. Comment la montagne peut-elle avoir une inclinaison parfaitement réelle et mesurable sous tes semelles, alors que la formule brute de la pente s'effondre en $\frac{0}{0}$?

---

2. La planche sous la semelle : de la sécante à la tangente

2.1 La rigidité du ski

Pour dénouer ce paradoxe, écoute ton corps et regarde ton équipement. Sous tes chaussures, tu as chaussé deux lattes en bois, fibres de verre et carres d'acier : des skis. Même si la piste de neige est bosselée et incurvée, **tes skis sont des objets droits et rigides**.

En chaque point où tu t'appuies, la semelle de ton ski vient épouser la courbure de la montagne sans s'enfoncer dedans. Elle effleure la courbe en un point d'appui unique. Cette droite qui caresse la courbe en un point sans la traverser localement est la **tangente** à la courbe. Et la pente sous tes pieds, c'est tout simplement **le coefficient directeur de ton ski** !

> 💡 **Métaphore Intuitive — Le Skieur et la Pente Instantanée de la Montagne**
>
> - Courbe de la montagne
> - Le ski rigide (la Tangente !)
> - Δy / | Élévation verticale
> - Δx Avancée horizontale

2.2 Le taux d'accroissement : la corde sécante

Pour calculer cette pente sans tricher avec le zéro, imaginons que la pointe arrière de ton ski touche la neige en $A(a; f(a))$, et que la spatule avant touche la neige un peu plus loin, en $M(a+h; f(a+h))$, où h est un petit écart non nul.



Fig. 93. – Nombre dérivé et limite des sécantes quand le pas h tend vers zéro

La droite (AM) qui coupe la courbe en deux points distincts s'appelle une **sécante**. Sa pente est donnée par le rapport :

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ce rapport fondamental s'appelle le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de la fonction f entre a et $a+h$. Puisque $h \neq 0$, cette fraction est parfaitement calculable !

2.3 Le passage à la limite : le zoom de l'infiniment petit

Maintenant, faisons raccourcir le ski ! Rapprochons la spatule avant de la spatule arrière en faisant devenir h de plus en plus minuscule : $h = 0,1$, puis $h = 0,01$, puis $h = 0,000001\ldots$ Le point M glisse le long de la colline et vient se fondre sur le point A. La droite sécante (AM) pivote doucement et vient se stabiliser sur une position limite : **la tangente** !

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Nombre dérivé** Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a. On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ admet une limite finie quand h tend vers 0. Cette limite est appelée le **nombre dérivé de f en a**, et on la note $f'(a)$:

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}$$

Géométriquement, $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe représentative de f au point d'abscisse a.

---

3. Les notations de l'Histoire : Lagrange contre Leibniz

Deux géants des mathématiques ont offert à l'humanité deux façons complémentaires d'écrire cette même idée :

3.1 La notation « prime » de Joseph-Louis Lagrange (1797)

Le mathématicien franco-italien **Joseph-Louis Lagrange** introduit la notation compacte :

$$f'(a)$$

qui se lit à voix haute : « **f prime de a** ». L'apostrophe marque que cette nouvelle fonction est « dérivée » de la fonction d'origine f. Si l'on dérive une deuxième fois, on notera $f''(a)$ (« f seconde »). C'est la notation la plus rapide et la plus utilisée au lycée.

3.2 La notation différentielle de Gottfried Wilhelm Leibniz (1684)

Un siècle plus tôt, le polymathe allemand **Gottfried Wilhelm Leibniz** invente une notation magistrale, inspirée directement du calcul de la pente $\frac{\Delta y}{\Delta x}$:

$$\frac{df}{dx}(a) \quad \text{ou} \quad \frac{dy}{dx}$$

qui se lit : « **d de f sur d de x** » ou « **dérivée de y par rapport à x** ». La lettre latine d remplace la lettre grecque Δ pour indiquer une variation **infinitésimale** (infiniment petite). Cette notation rappelle en permanence qu'une dérivée est le rapport d'une minuscule variation de hauteur dy sur une minuscule variation horizontale dx. Les physiciens l'adorent car elle porte directement les unités de mesure (par exemple des mètres par seconde : $\frac{dx}{dt} = \text{vitesse}$).

---

4. L'équation de la tangente à la courbe

Puisque la tangente passe par le point de contact $A(a; f(a))$ et possède un coefficient directeur égal à $f'(a)$, son équation réduite découle immédiatement de la formule des droites vue en Seconde :

$$y - y_A = m(x - x_A) \Leftrightarrow y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

📐 Théorème — Équation de la tangente

Si f est dérivable en a, la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(a; f(a))$ une tangente d'équation :

$$\boxed{y = f'(a)(x - a) + f(a)}$$

Cette droite est la **meilleure approximation affine** de la fonction au voisinage de a. Pour x très proche de a, on a l'approximation :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

---

5. Les dérivées usuelles démontrées

Passons en revue les fonctions de base. Pour chacune d'elles, nous allons calculer la limite du taux d'accroissement avec rigueur.

5.1 La fonction constante : $f(x) = k$

Une piste parfaitement horizontale a une pente nulle partout. Pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = \frac{0}{h} = 0.$$

La limite quand $h \to 0$ est 0. Donc :

$$\boxed{(k)' = 0}$$

5.2 La fonction linéaire : $f(x) = x$

Une rampe droite inclinée à 45° a une pente constante égale à 1.

$$\frac{(a+h) - a}{h} = \frac{h}{h} = 1 \underset{h \to 0}{\to} 1.$$

Donc :

$$\boxed{(x)' = 1}$$

5.3 La fonction carré : pourquoi $(x^2)' = 2x$?

C'est ici qu'intervient la sublime démonstration du jardinier :

> ✍️ **Démonstration géométrique — Le parterre de fleurs qui grandit**
>
> Soit un parterre carré de fleurs de côté x. Sa surface est $S(x) = x^2$. Au printemps, le jardinier élargit le parterre d'une mince bande de terre de largeur h vers l'Est et d'une bande de largeur h vers le Nord.

> *L'accroissement total de terre est constitué de trois morceaux : 1. Une bande Est de surface $x \times h$; 2. Une bande Nord de surface $x \times h$; 3. Un minuscule carré dans le coin de surface h^2.*
>
> *Le gain total de surface est donc :*
>
> $$\Delta S = (x \times h) + (x \times h) + h^2 = 2xh + h^2.$$
>
> *Divisons par l'élargissement h pour trouver le taux d'accroissement :*
>
> $$\frac{\Delta S}{h} = \frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h.$$
>
> *Faisons maintenant tendre h vers zéro ! Le coin minuscule h^2 s'évanouit infiniment plus vite que les bordures. Il ne reste que :*
>
> $$\lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$
>
> *Le chiffre 2 n'a rien de magique :* ***ce sont les 2 côtés libres du carré qui s'étirent dans l'espace !*** ■

Par le calcul algébrique pur :

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h \underset{h \to 0}{\to} 2a.$$

Donc :

$$\boxed{(x^2)' = 2x}$$

5.4 La fonction puissance : $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

En étendant l'idée à un cube (x^3), les trois faces libres donnent $(x^3)' = 3x^2$. En dimension n, en utilisant l'identité algébrique remarquable :

$$A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + \ldots + AB^{n-2} + B^{n-1}),$$

avec $A = a + h$ et $B = a$, le taux s'écrit :

$$\frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \frac{h \cdot \left((a+h)^{n-1} + (a+h)^{n-2}a + \ldots + a^{n-1}\right)}{h}.$$

Il y a exactement n termes dans la parenthèse. Quand $h \to 0$, chacun de ces termes tend vers a^{n-1}. La somme vaut donc na^{n-1}.

$$\boxed{(x^n)' = nx^{n-1}}$$

5.5 La fonction inverse : $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

Pour tout $a \neq 0$ et h suffisamment petit :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

Quand $h \to 0$, le dénominateur tend vers $a \times a = a^2$. La limite vaut donc $-\frac{1}{a^2}$.

$$\boxed{\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}}$$

5.6 La fonction racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$

Pour tout $a > 0$, calculons le taux d'accroissement. Nous faisons face à une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Pour la débloquer, multiplions par l'**expression conjuguée** $(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})$:

$$\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{h}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}.$$

Quand $h \to 0$, le dénominateur tend vers $\sqrt{a} + \sqrt{a} = 2\sqrt{a}$.

$$\boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$$

---

6. Les opérations sur les fonctions dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I, et k une constante réelle.

6.1 Somme et multiplication par une constante

- $(u + v)' = u' + v'$
- $(k \cdot u)' = k \cdot u'$

6.2 Dérivée d'un produit : pourquoi $(uv)' \neq u'v'$?

C'est le piège le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. Même Leibniz est tombé dedans dans sa première ébauche en 1673, avant de se corriger en dessinant un rectangle !

> ✍️ **Démonstration géométrique — Le rectangle dont les deux côtés s'allongent**
>
> Soit un champ rectangulaire de côtés $u(x)$ et $v(x)$. Son aire est $A(x) = u(x) \times v(x)$. Lorsque la variable x avance d'une quantité h, la largeur devient $u + \Delta u$ et la longueur devient $v + \Delta v$.

La nouvelle aire ajoutée est formée de trois zones : 1. Une bande verticale de surface $v(x) \times \Delta u$; 2. Une bande horizontale de surface $u(x) \times \Delta v$; 3. Un coin minuscule de surface $\Delta u \times \Delta v$.

Divisons par h :

$$\frac{\Delta A}{h} = v(x)\frac{\Delta u}{h} + u(x)\frac{\Delta v}{h} + \frac{\Delta u \cdot \Delta v}{h}.$$

Quand $h \to 0$:

- $\frac{\Delta u}{h} \to u'(x)$ *et* $\frac{\Delta v}{h} \to v'(x)$;
- *le troisième terme s'évanouit car $\Delta u \to 0$! Il reste les deux grandes bandes :*

$$\boxed{(u \cdot v)' = u'v + uv'} \quad \blacksquare$$

6.3 Dérivée de l'inverse et du quotient

Si $v(x) \neq 0$ sur I :

- Dérivée de l'inverse :

$$\boxed{\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}}$$

- Dérivée du quotient : En écrivant $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$ et en appliquant la formule du produit :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = u'\left(\frac{1}{v}\right) + u\left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v}{v^2} - \frac{uv'}{v^2} = \boxed{\frac{u'v - uv'}{v^2}}$$

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — L'ordre du numérateur dans le quotient** Dans la formule $\frac{u'v-uv'}{v^2}$, le signe moins fait que l'ordre des termes est capital ! C'est toujours la dérivée du haut (u') qui multiplie le bas intact (v) en premier. Inverser l'ordre donne l'opposé du bon résultat.

---

7. Le lien crucial : signe de la dérivée et sens de variation

C'est ici que la dérivation révèle sa puissance absolue : elle transforme une question globale difficile (« la fonction monte-t-elle ou descend-elle ? ») en une question locale simple (« quel est le signe d'un nombre ? »).

> 📐 **Théorème fondamental — Variations et signe de la dérivée**
>
> Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.
>
> - Si pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$, alors la fonction f est **strictement croissante** sur I.
> - Si pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$, alors la fonction f est **strictement décroissante** sur I.
> - Si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$, alors la fonction f est **constante** sur I.

Intuitivement : si la semelle de ton ski pointe vers le haut ($f'(x) > 0$) à chaque instant de ta course, tu ne peux que prendre de l'altitude !

---

8. Recherche des extremums locaux et optimisation

Comment trouver le point culminant d'une colline ou le creux le plus profond d'une vallée ? Au sommet d'une colline, la pente cesse de monter et s'apprête à descendre : pendant un instant infinitésimal, le ski redevient parfaitement horizontal !

📐 Règle Fondamentale — Tangente Horizontale et Extrema Locaux ($f'(x_0) = 0$)

- Tangente horizontale (f'(x_0) = 0)
- f' > 0 f' < 0
- Montée) (Descente)

📐 Théorème — Condition d'extremum local

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert contenant x_0. Si f admet un extremum local (maximum ou minimum) en x_0, alors :

$$f'(x_0) = 0.$$

Réciproque et critère pratique : Si $f'(x_0) = 0$ et si f' **change de signe** en x_0, alors f admet un extremum local en x_0 :

- De $+$ vers $-$: c'est un **maximum local** (la courbe monte puis descend).
- De $-$ vers $+$: c'est un **minimum local** (la courbe descend puis monte).

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! — $f'(x_0) = 0$ ne garantit pas un extremum** Regarde la fonction cube $f(x) = x^3$. Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2$. En $x = 0$, on a bien $f'(0) = 0$ (la tangente est horizontale). Mais pour tout $x \neq 0$, $3x^2 > 0$: la dérivée ne change pas de signe ! La courbe monte avant 0 et continue de monter après 0. Le point $(0; 0)$ est un replat (un point d'inflexion), pas un sommet !

---

9. Aux limites de la dérivation : quand le calcul se brise

Toutes les fonctions sont-elles dérivables partout ? Non ! Il existe deux manières majeures pour une courbe de refuser la dérivation en un point.

9.1 Le point anguleux : la valeur absolue en 0

Considérons la fonction valeur absolue $f(x) = |x|$. Sa courbe forme un « V » pointu en l'origine. Calculons le taux d'accroissement en 0 :

$$\tau(h) = \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

- Si l'on arrive par la droite ($h > 0$) : $|h| = h$, donc $\tau(h) = \frac{h}{h} = +1$.
- Si l'on arrive par la gauche ($h < 0$) : $|h| = -h$, donc $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$.

La limite à droite ($+1$) est différente de la limite à gauche (-1) ! Le ski ne sait pas comment se poser sur la pointe sans vaciller entre deux inclinaisons. On dit que la fonction valeur absolue **n'est pas dérivable en 0**. La courbe admet deux demi-tangentes qui forment un **point anguleux**.

9.2 La tangente verticale : la racine carrée en 0

Considérons la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 0$. Pour $h > 0$:

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{0 + h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Quand $h \to 0^+$, $\sqrt{h}$ devient infiniment petit et positif, donc $\frac{1}{\sqrt{h}}$ explose vers $+\infty$! La limite n'est pas un nombre réel fini. La fonction racine carrée **n'est pas dérivable en 0**. Géométriquement, la courbe démarre verticalement : elle admet une **demi-tangente verticale** d'équation $x = 0$.

Exemples résolus pas à pas

✅ ***Exemple résolu 1 — Calcul de dérivée par définition*** *Soit $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$. Calculer $f'(2)$ en utilisant la définition avec le taux d'accroissement.*

Solution détaillée : *Calculons $f(2)$: $f(2) = 3(2^2) - 5(2) + 2 = 12 - 10 + 2 = 4$. Évaluons $f(2+h)$ pour $h \neq 0$:*

$$\begin{aligned} f(2+h) &= 3(2+h)^2 - 5(2+h) + 2 \\ &= 3(4 + 4h + h^2) - 10 - 5h + 2 \\ &= 12 + 12h + 3h^2 - 10 - 5h + 2 = 4 + 7h + 3h^2. \end{aligned}$$

Formons le taux d'accroissement :

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(4 + 7h + 3h^2) - 4}{h} = \frac{7h + 3h^2}{h} = \frac{h(7 + 3h)}{h} = 7 + 3h.$$

Prenons la limite quand $h \to 0$:

$$\lim_{h \to 0} (7 + 3h) = 7.$$

Donc f est dérivable en 2 et $\boxed{f'(2) = 7}$.

✅ ***Exemple résolu 2 — Équation d'une tangente*** *Soit $f(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse $a = 2$.*

Solution détaillée :

- *Ordonnée du point de contact : $f(2) = \frac{1}{2}$.*
- *Fonction dérivée : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $f'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$.*
- *Formule de la tangente : $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$.*

$$y = -\frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + 1.$$

L'équation de la tangente est $\boxed{y = -\frac{1}{4}x + 1}$.

✅ ***Exemple résolu 3 — Dérivée d'un produit et d'un quotient***

Calculer les fonctions dérivées de : 1. $g(x) = (2x - 3)(x^2 + 4x)$ 2. $h(x) = \frac{3x-1}{x^2+1}$

Solution détaillée : *1. Forme $u \cdot v$ avec $u(x) = 2x - 3 \Longrightarrow u'(x) = 2$, et $v(x) = x^2 + 4x \Longrightarrow v'(x) = 2x + 4$.*

$$g'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 + 4x) + (2x - 3)(2x + 4).$$

Développons : $g'(x) = (2x^2 + 8x) + (4x^2 + 8x - 6x - 12) = 6x^2 + 10x - 12$. 2. Forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 1 \Longrightarrow u'(x) = 3$, et $v(x) = x^2 + 1 \Longrightarrow v'(x) = 2x$.

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x^2 + 1) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Développons le numérateur : $3x^2 + 3 - (6x^2 - 2x) = 3x^2 + 3 - 6x^2 + 2x = -3x^2 + 2x + 3$. D'où : $\boxed{h'(x) = \frac{-3x^2 + 2x + 3}{(x^2 + 1)^2}}$.

✅ ***Exemple résolu 4 — Étude complète des variations d'un polynôme de degré 3*** *Soit $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$. Dresser son tableau de variations complet et préciser ses extremums locaux.*

Solution détaillée : *1. Dérivée : $f'(x) = 2(3x^2) - 9(2x) + 12(1) - 0 = 6x^2 - 18x + 12$. Factorisons par 6 : $f'(x) = 6(x^2 - 3x + 2)$. 2. Racines de $f'(x)$: Le trinôme $x^2 - 3x + 2$ a pour racines évidentes $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$ (car $1 - 3 + 2 = 0$ et $1 \times 2 = 2$). Le coefficient devant x^2 est positif ($a = 6 > 0$), donc la parabole de f' est tournée vers le haut :*

- *$f'(x) > 0$ sur $]-\infty; 1[$ et sur $]2; +\infty[$;*
- *$f'(x) < 0$ sur $]1; 2[$.*

3. Valeurs particulières : $f(1) = 2(1)^3 - 9(1)^2 + 12(1) - 1 = 2 - 9 + 12 - 1 = 4$. $f(2) = 2(8) - 9(4) + 12(2) - 1 = 16 - 36 + 24 - 1 = 3$.

4. Tableau de variations :

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\nearrow$	4	$\searrow$	3	$\nearrow$	

Conclusion : *f admet un **maximum local** égal à 4 atteint en $x = 1$, et un **minimum local** égal à 3 atteint en $x = 2$.*

✅ ***Exemple résolu 5 — Optimisation concrète : la boîte sans couvercle*** *Dans une feuille de carton carrée de 12 cm de côté, on découpe à chaque coin un petit carré de côté x (avec $0 < x < 6$), puis on replie les bords pour former une boîte ouverte. Quelle valeur de x donne à la boîte un volume maximal ?*

Solution détaillée : *1. Dimensions de la boîte pliée :*

- *La base est un carré de côté $12 - 2x$.*
- *La hauteur de la boîte est x.*

2. Volume de la boîte : $V(x) = \text{Base} \times \text{hauteur} = (12 - 2x)^2 \times x = (144 - 48x + 4x^2)x = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.

3. Dérivée : $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12)$.

4. Recherche du maximum : Racines de $x^2 - 8x + 12 = 0$: $\Delta = (-8)^2 - 4(1)(12) = 64 - 48 = 16 = 4^2$. $x_1 = \frac{8-4}{2} = 2$, et $x_2 = \frac{8+4}{2} = 6$. Comme $x \in]0; 6[$, seule la solution $x = 2$ convient. Pour $x < 2$, $V'(x) > 0$ (le volume grandit). Pour $x > 2$, $V'(x) < 0$ (le volume rétrécit).

*5. Conclusion : Le volume maximal est atteint pour une découpe de $\boldsymbol{x = 2}$ **cm**. Le volume vaut alors $V(2) = (12 - 4)^2 \times 2 = 8^2 \times 2 = 64 \times 2 = 128$ cm^3.*

✅ ***Exemple résolu 6 — Tangente parallèle à une droite donnée***

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Existe-t-il des points sur la parabole où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 5$?

Solution détaillée :

- *Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.*
- *La droite a pour pente $m = 2$.*
- *La tangente au point d'abscisse x a pour coefficient directeur $f'(x)$.*
- *Calculons $f'(x)$: $f'(x) = 2x - 4$.*
- *On résout donc l'équation $f'(x) = 2$:*

$$2x - 4 = 2 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3.$$

- *Ordonnée du point : $f(3) = 3^2 - 4(3) + 1 = 9 - 12 + 1 = -2$.*
- *Conclusion : Il existe un unique point qui répond au problème, le point $A(3; -2)$. La tangente y a pour équation $y = 2(x - 3) - 2 = 2x - 8$.*

Ce qu'il faut retenir

1. **Le nombre dérivé $f'(a)$:**
   - Définition : $f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
   - Sens géométrique : pente du ski sous le pied = coefficient directeur de la tangente en $A(a; f(a))$.
   - Équation de la tangente : $\boxed{y = f'(a)(x-a) + f(a)}$.
2. **Tableau des dérivées usuelles :** | Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$ | Domaine de validité | |—|—|—| | k (constante) | 0 | $\mathbb{R}$ | | x | 1 | $\mathbb{R}$ | | x^2 | $2x$ | $\mathbb{R}$ | | x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$ | nx^{n-1} | $\mathbb{R}$ | | $\frac{1}{x}$ | $-\frac{1}{x^2}$ | $\mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ | | $\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $]0;+\infty[$ (non dérivable en 0) |
3. **Formules d'opérations :**
   - $(u+v)' = u' + v'$
   - $(ku)' = ku'$
   - $(uv)' = u'v + uv'$
   - $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
   - $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
4. **Signe de la dérivée et variations :**
   - $f'(x) > 0 \Longrightarrow f$ est strictement croissante.
   - $f'(x) < 0 \Longrightarrow f$ est strictement décroissante.
   - $f'(x_0) = 0$ avec changement de signe $\Longrightarrow$ extremum local (sommet ou creux).
5. **Cas de non-dérivabilité :**
   - $f(x) = |x|$ en 0 : point anguleux (pentes à gauche et à droite différentes).
   - $f(x) = \sqrt{x}$ en 0 : demi-tangente verticale (taux d'accroissement tend vers $+\infty$).

Exercices

Niveau (Calculs directs de dérivées et tangentes)

1. Calculer la dérivée de $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + 7x - 9$.
2. Calculer la dérivée de $g(x) = 3\sqrt{x} - \frac{4}{x}$ pour $x > 0$.
3. Déterminer le nombre dérivé $f'(3)$ pour $f(x) = x^2 - 2x$.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse $a = 1$.
5. Déterminer les abscisses des points où la courbe de $f(x) = x^3 - 3x$ admet une tangente horizontale.
6. Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $]3;+\infty[$. Calculer $f'(x)$.
7. Dériver $h(x) = (x^2+1)(3x-2)$.
8. Trouver le signe de la dérivée de $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$ et en déduire le sens de variation de f.
9. La fonction $f(x) = |x-3|$ est-elle dérivable en $x = 3$? Justifier.
10. Déterminer l'approximation affine de $\sqrt{1+h}$ pour h proche de 0 en utilisant la dérivée en 1 de $\sqrt{x}$.

Niveau (Études de fonctions et géométrie)

11. Dresser le tableau de variations complet de $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$ sur $\mathbb{R}$.
12. Soit $f(x) = \frac{x^2-3x+6}{x-1}$ définie sur $]1;+\infty[$.
    a) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)^2}$.
    b) En déduire le minimum de f sur cet intervalle.
13. On considère la parabole d'équation $y = -x^2 + 4x - 1$. Existe-t-il une tangente à cette parabole qui passe par l'origine du repère $(0;0)$?
14. Soit la fonction $f(x) = x\sqrt{x}$ définie sur $[0;+\infty[$.
    a) Montrer par le taux d'accroissement que f est dérivable en 0 et préciser $f'(0)$.
    b) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ avec la règle du produit et vérifier la cohérence.
15. Déterminer les points d'intersection de la courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ avec la tangente à cette courbe en $x = 0$.

16. Un projectile est lancé en l'air. Son altitude en mètres à l'instant t (en secondes) est donnée par $z(t) = -5t^2 + 20t + 1,5$.
    a) Calculer la vitesse instantanée $v(t) = z'(t)$ à chaque instant.
    b) À quel instant le projectile atteint-il son altitude maximale ? Quelle est cette altitude ?
17. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, la dérivée de $f_n(x) = x^n$ est bien $f_n'(x) = nx^{n-1}$, en utilisant la dérivée d'un produit.
18. Soit $f(x) = \frac{ax+b}{x-2}$. Déterminer les réels a et b pour que la courbe passe par $A(3;5)$ et y admette une tangente de coefficient directeur -7.

Niveau (Optimisation et problèmes ouverts)

19. **La clôture du berger :** Un berger dispose de 100 mètres de grillage pour aménager un enclos rectangulaire adossé à une falaise rocheuse rectiligne (il n'y a donc pas besoin de grillage le long de la falaise). Quelles doivent être les dimensions de l'enclos pour que les moutons disposent de la plus grande surface possible ?
20. **La boîte de conserve optimale :** On souhaite fabriquer une boîte de conserve cylindrique fermée d'un volume donné $V = 1$ litre ($1000\ \text{cm}^3$). On cherche à minimiser la quantité de métal nécessaire (c'est-à-dire l'aire totale du cylindre).
    a) Exprimer la hauteur h en fonction du rayon r.
    b) Exprimer la surface totale $S(r)$ en fonction de r.
    c) Calculer $S'(r)$ et prouver que la boîte la plus économe en métal vérifie $h = 2r$ (la hauteur doit être exactement égale au diamètre !).
21. **La distance minimale d'un point à une parabole :** Dans un repère orthonormé, on considère la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = x^2$ et le point $A(0;2)$. Quel est le point de la parabole le plus proche de A ? Montrer que le segment joignant A à ce point optimal est perpendiculaire à la tangente à la parabole en ce point.
22. **Point anguleux et dérivabilité :** Soit la fonction définie par $f(x) = x|x|$.
    a) Exprimer $f(x)$ sans valeur absolue selon le signe de x.
    b) Étudier la dérivabilité de f en 0 en calculant la limite du taux d'accroissement.
    c) Que peut-on en conclure ? Une fonction contenant une valeur absolue a-t-elle toujours un point anguleux ?
23. **Tangentes communes à deux paraboles :** Soient les deux paraboles d'équations $y = x^2$ et $y = -x^2 + 4x - 6$. Existe-t-il une droite tangente commune aux deux paraboles simultanément ? Si oui, déterminer son équation.
24. **Le problème de Snell-Descartes du maître-nageur :** Un sauveteur situé sur la plage en un point $A(0;a)$ avec $a > 0$ aperçoit un nageur en détresse dans la mer en $B(d;-b)$ avec $b > 0$. La ligne de rivage est l'axe des abscisses $y = 0$. Le sauveteur court sur le sable à la vitesse v_1 et nage dans l'eau à une vitesse plus lente $v_2 < v_1$. Il entre dans l'eau au point $M(x;0)$ avec $0 \leq x \leq d$.
    a) Exprimer le temps total de parcours $T(x)$ pour atteindre le nageur.
    b) Calculer $T'(x)$ et montrer que le temps est minimal lorsque $\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}$ (loi de Snell-Descartes de la réfraction de la lumière !).
25. **Théorème de Rolle (découverte intuitive) :** Soit f une fonction dérivable sur $[a;b]$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Justifier intuitivement à l'aide du skieur pourquoi il existe obligatoirement au moins un point $c \in]a;b[$ où $f'(c) = 0$.

Solutions

1. $f'(x) = 5(3x^2) - 4(2x) + 7(1) - 0 = 15x^2 - 8x + 7$.

2. $g'(x) = 3\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) - 4\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{4}{x^2}$.

3. $f'(x) = 2x - 2$. En $x = 3$: $f'(3) = 2(3) - 2 = 4$.

4. $f(1) = 1^2 = 1$. $f'(x) = 2x \Longrightarrow f'(1) = 2$. Tangente : $y = f'(1)(x-1) + f(1) = 2(x-1) + 1 = 2x - 1$.

5. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -1$.

6. Formule $\frac{u}{v}$: $u(x) = 2x + 1 \Longrightarrow u' = 2$; $v(x) = x - 3 \Longrightarrow v' = 1$. $f'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1)(1)}{(x-3)^2} = \frac{2x - 6 - 2x - 1}{(x-3)^2} = -\frac{7}{(x-3)^2}$.

7. Règle du produit : $u = x^2+1 \Longrightarrow u' = 2x$; $v = 3x-2 \Longrightarrow v' = 3$. $h'(x) = 2x(3x-2) + (x^2+1)(3) = 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3 = 9x^2 - 4x + 3$.

8. $f'(x) = -4x + 8 = -4(x-2)$. $f'(x) > 0$ si $x < 2$ (la fonction f est strictement croissante sur $]-\infty; 2]$) ; $f'(x) < 0$ si $x > 2$ (la fonction f est strictement décroissante sur $[2; +\infty[$).

9. Taux d'accroissement en 3 : $\frac{|3+h-3|-|0|}{h} = \frac{|h|}{h}$. Quand $h \to 0^+$, la limite vaut $+1$; quand $h \to 0^-$, la limite vaut -1. Les deux limites étant distinctes, f n'est pas dérivable en 3 (point anguleux).

10. Soit $f(x) = \sqrt{x}$. On a $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$. L'approximation affine en 1 est $f(1+h) \approx f(1) + hf'(1) = 1 + \frac{1}{2}h$. Par exemple, $\sqrt{1,04} \approx 1 + \frac{0,04}{2} = 1,02$ (la vraie valeur est $1,0198...$).

11. $f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$. Racines : $x = -1$ et $x = 3$. Parabole tournée vers le haut.

- $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; -1[\cup]3; +\infty[$ (f croissante) ;
- $f'(x) < 0$ sur $]-1; 3[$ (f décroissante).

Extremums : $f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 4 = \frac{17}{3} \approx 5,67$ (maximum local en -1) ; $f(3) = 9 - 9 - 9 + 4 = -5$ (minimum local en 3).

12. a) $u(x) = x^2 - 3x + 6 \Longrightarrow u' = 2x - 3$; $v(x) = x - 1 \Longrightarrow v' = 1$. $f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2-3x+6)(1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 3 - x^2 + 3x - 6}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$. Le trinôme se factorise en $(x-3)(x+1)$. b) Sur $]1; +\infty[$, le dénominateur $(x-1)^2 > 0$ et $x + 1 > 0$. Le signe dépend uniquement de $x - 3$. $f'(x) < 0$ sur $]1; 3[$ et $f'(x) > 0$ sur $]3; +\infty[$. f admet un minimum absolu en $x = 3$, qui vaut $f(3) = \frac{9-9+6}{3-1} = \frac{6}{2} = 3$.

13. La tangente en un point a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Ici $f(a) = -a^2 + 4a - 1$ et $f'(a) = -2a + 4$. L'équation est $y = (-2a+4)(x-a) - a^2 + 4a - 1 = (-2a+4)x + 2a^2 - 4a - a^2 + 4a - 1 = (-2a+4)x + a^2 - 1$. Cette droite passe par l'origine $(0;0)$ si et seulement si l'ordonnée à l'origine est nulle : $a^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$ ou $a = -1$. Il existe donc **deux** tangentes passant par l'origine : celle au point d'abscisse 1 (équation $y = 2x$) et celle au point d'abscisse -1 (équation $y = 6x$).

14. a) Pour $h > 0$: $\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h\sqrt{h} - 0}{h} = \sqrt{h}$. Quand $h \to 0^+$, $\lim \sqrt{h} = 0$. Donc f est bien dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. b) Règle du produit pour $x > 0$: $f'(x) = (1)\sqrt{x} + x\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. Quand $x \to 0$, $\frac{3}{2}\sqrt{x} \to 0$, ce qui est parfaitement cohérent avec $f'(0) = 0$.

15. En $x = 0$, $f(0) = 0$. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 \Longrightarrow f'(0) = 1$. La tangente en 0 a pour équation $y = 1(x-0) + 0 \Leftrightarrow y = x$. Intersection avec la courbe : $f(x) = x \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + x = x \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x-3) = 0$. Solutions : $x = 0$ (racine double, point de tangence) et $x = 3$. Pour $x = 3$, $y = 3$. Le second point d'intersection est $B(3;3)$.

16. a) $v(t) = z'(t) = -10t + 20$. b) L'altitude est maximale lorsque la vitesse s'annule : $-10t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 2$ secondes. L'altitude maximale est $z(2) = -5(4) + 20(2) + 1,5 = -20 + 40 + 1,5 = 21,5$ mètres.

17. - Initialisation ($n = 1$) : $f_1(x) = x$, sa dérivée est $1 = 1 \cdot x^0$. Vrai. - Hérédité : Supposons la formule vraie au rang n : $(x^n)' = nx^{n-1}$. Alors $x^{n+1} = x^n \cdot x$. D'après la dérivée d'un produit : $(x^{n+1})' = (x^n)' \cdot x + x^n \cdot (x)' = (nx^{n-1}) \cdot x + x^n \cdot 1 = nx^n + x^n = (n+1)x^n$. La formule est donc vraie au rang $n+1$.

- Conclusion : Par récurrence, pour tout $n \geq 1$, $(x^n)' = nx^{n-1}$.

18. $f(3) = 5 \Leftrightarrow \frac{3a+b}{3-2} = 5 \Leftrightarrow 3a + b = 5$. Dérivée : $f'(x) = \frac{a(x-2) - (ax+b)(1)}{(x-2)^2} = \frac{ax - 2a - ax - b}{(x-2)^2} = \frac{-2a-b}{(x-2)^2}$. En $x = 3$, $f'(3) = \frac{-2a-b}{(3-2)^2} = -2a - b = -7 \Leftrightarrow 2a + b = 7$. On résout le système : $(3a+b) - (2a+b) = 5 - 7 \Leftrightarrow a = -2$. Puis $b = 5 - 3(-2) = 5 + 6 = 11$. Donc $a = -2$ et $b = 11$.

19. Notons x la longueur des deux côtés perpendiculaires à la falaise. Le côté parallèle à la falaise mesure alors $100 - 2x$. L'aire est $A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$, avec $x \in]0; 50[$. Dérivée : $A'(x) = -4x + 100$. $A'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x = 100 \Leftrightarrow x = 25$ mètres. Comme $A''(x) = -4 < 0$, c'est un maximum. L'autre côté mesure $100 - 2(25) = 50$ mètres. L'enclos optimal fait $25\ \text{m} \times 50\ \text{m}$, pour une surface maximale de $1250\ \text{m}^2$.

20. a) Le volume d'un cylindre est $V = \pi r^2 h = 1000 \Longrightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$. b) L'aire totale comprend les deux disques (haut et bas) et la paroi latérale : $S(r) = 2(\pi r^2) + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{1000}{\pi r^2}\right) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$. c) Dérivons par rapport à r : $S'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2000}{r^2}$. Le minimum est atteint quand $S'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r^3 = 2000 \Leftrightarrow 2\pi r^3 = 1000$. Or, comme $1000 = \pi r^2 h$, on a : $2\pi r^3 = \pi r^2 h \Leftrightarrow 2r = h$. La hauteur doit être rigoureusement égale au diamètre de la base.

21. Soit $M(x; x^2)$ un point de la parabole. La distance au carré $AM^2 = (x-0)^2 + (x^2-2)^2 = x^2 + x^4 - 4x^2 + 4 = x^4 - 3x^2 + 4$. Posons $g(x) = x^4 - 3x^2 + 4$. Dérivée : $g'(x) = 4x^3 - 6x = 2x(2x^2 - 3)$. Racines : $x = 0$ ou $x^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$. En $x = 0$, $g(0) = 4$ (distance 2). En $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$, $g = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4 = \frac{7}{4}$, d'où distance $\sqrt{7}/2 \approx 1,32 < 2$. Les points les plus proches sont $M_1\left(\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{3}{2}\right)$ et $M_2\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}; \frac{3}{2}\right)$. Le vecteur $\overrightarrow{AM_1} = \begin{pmatrix} \sqrt{3/2} \\ -1/2 \end{pmatrix}$. La pente de la tangente

en ce point est $f'(x) = 2x = 2\sqrt{3/2}$, donc un vecteur directeur de la tangente est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\sqrt{3/2}\end{pmatrix}$. Produit scalaire : $\overrightarrow{AM_1} \cdot \vec{u} = \sqrt{\frac{3}{2}} \times 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \times 2\sqrt{\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}} = 0$. Le vecteur est orthogonal à la tangente : le plus court chemin est perpendiculaire à la courbe.

22. a) Si $x \geq 0$, $f(x) = x(x) = x^2$. Si $x < 0$, $f(x) = x(-x) = -x^2$. b) Taux d'accroissement en 0 : $\frac{f(h)-f(0)}{h} = \frac{h|h|}{h} = |h|$. Quand $h \to 0$, $|h| \to 0$ que h soit positif ou négatif ! Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. c) Contrairement aux idées reçues, la présence d'une valeur absolue ne crée pas forcément de point anguleux : ici, le facteur x « adoucit » la pointe en la forçant à adopter une tangente horizontale plate.

23. Soit $y = mx + p$ une telle tangente commune. Elle est tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse a : donc $m = 2a$ et $p = a^2 - 2a(a) = -a^2$. Elle est tangente à $y = -x^2 + 4x - 6$ au point d'abscisse b : donc $m = -2b + 4$ et $p = (-b^2 + 4b - 6) - (-2b + 4)b = b^2 - 6$. On égale les pentes et les ordonnées à l'origine : 1) $2a = -2b + 4 \Leftrightarrow a + b = 2 \Leftrightarrow b = 2 - a$. 2) $-a^2 = b^2 - 6$. En remplaçant b : $-a^2 = (2-a)^2 - 6 = 4 - 4a + a^2 - 6 = a^2 - 4a - 2$. $2a^2 - 4a - 2 = 0 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 1 = 0$. $\Delta = 4 - 4(-1) = 8 = (2\sqrt{2})^2$. $a = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$. Il existe deux tangentes communes. Pour $a = 1 + \sqrt{2}$, $m = 2 + 2\sqrt{2}$ et $p = -(1+\sqrt{2})^2 = -3 - 2\sqrt{2}$. L'autre s'obtient avec $a = 1 - \sqrt{2}$.

24. a) Distance sur le sable : $d_1 = \sqrt{x^2 + a^2}$. Temps sur le sable : $t_1 = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{v_1}$. Distance dans l'eau : $d_2 = \sqrt{(d-x)^2 + b^2}$. Temps dans l'eau : $t_2 = \frac{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}{v_2}$. Temps total : $T(x) = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}{v_2}$. b) Dérivée de $\sqrt{x^2+a^2}$: $\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$. Dérivée de $\sqrt{(d-x)^2+b^2}$: $\frac{-2(d-x)}{2\sqrt{(d-x)^2+b^2}} = -\frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}$. Donc $T'(x) = \frac{x}{v_1\sqrt{x^2+a^2}} - \frac{d-x}{v_2\sqrt{(d-x)^2+b^2}}$. Remarquons géométriquement que $\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \sin\theta_1$ et $\frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2+b^2}} = \sin\theta_2$ (angles par rapport à la normale à la plage). Le temps est minimal quand $T'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}$. C'est la loi de réfraction de Fermat-Descartes : la lumière minimise son temps de trajet !

25. Le skieur part de l'altitude 0 en a et revient à l'altitude 0 en b. S'il est resté sur du plat tout le long (f constante), la pente a été nulle partout. S'il a grimpé, il a dû monter, atteindre un point culminant (un maximum), puis redescendre. Au sommet exact de la colline, son ski s'est nécessairement retrouvé à l'horizontale ($f'(c) = 0$). S'il a plongé dans un vallon, il a atteint un point le plus bas (un minimum) avant de remonter : au fond du vallon, le ski a également été horizontal ($f'(c) = 0$). Dans tous les cas, il existe nécessairement au moins un point où la tangente est parfaitement horizontale.

La question qui ouvre la suite

Nous avons vu que la dérivée mesure la vitesse à laquelle une fonction grandit. Pour un polynôme, la dérivée baisse le degré. Mais imagine une population vivante : une colonie de bactéries dans une boîte de Pétri. Plus la colonie est grande, plus il y a d'individus qui se divisent, et plus la vitesse de multiplication est grande ! Existe-t-il dans tout l'univers une fonction magique qui est **rigoureusement égale à sa propre dérivée** : $f' = f$? Une fonction dont la pente sous les pieds est à chaque milliseconde égale à son altitude ? C'est le mystère de l'**exponentielle**, au chapitre suivant.

CHAPITRE 40 : La Colonie de Bactéries

> « Dans le monde inerte des pierres, la vitesse dépend d'une force extérieure qu'on applique. Dans le monde ardent du vivant, la force naît du nombre : chaque cellule est son propre moteur. Plus la colonie grandit, plus elle explose vite. La nature a choisi une unique courbe pour chanter la prolifération de la vie : la fonction exponentielle. »

Ce que tu vas découvrir

- Le secret biologique de la prolifération : pourquoi la vitesse de croissance d'une population est proportionnelle à son effectif.
- La naissance d'une équation révolutionnaire : $f' = f$ avec $f(0) = 1$.
- La **méthode d'Euler** : comment tracer la courbe pas à pas le long de ses propres tangentes, avec un script **Python**.
- La grande démonstration du programme : pourquoi $\exp(x)$ ne s'annule jamais et pourquoi cette fonction est **unique**.
- La transformation magique de l'addition en multiplication : la preuve de $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$.
- Le nombre universel d'Euler : $e \approx 2,71828$, et la notation e^x.
- L'étude complète de la fonction : dérivée, stricte positivité, croissance explosive, limites et asymptotes.
- La dérivée des fonctions composées : $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$.
- Comment résoudre équations et inéquations avec e^x.

---

1. Le problème : la boîte de Pétri et l'horloge biologique

Regarde à travers l'oculaire d'un microscope dans un laboratoire de biologie. Dans une boîte de Pétri remplie de gélose nutritive, le chercheur dépose à midi ($t = 0$) une unique bactérie *Escherichia coli*.

Cette bactérie se nourrit. Au bout de vingt minutes, elle s'allonge et se scinde en deux : il y a 2 bactéries. Vingt minutes plus tard, chacune se divise à son tour : il y a 4 bactéries. Puis 8, puis 16, 32, 64, 128, 256…

Temps t (h)	0	1	2	3	10
Bactéries	1 000	2 000	4 000	8 000	1 024 000

Observe attentivement ce qui distingue cette croissance de toutes celles que nous avons étudiées jusqu'ici :

- Pour une voiture sur l'autoroute à vitesse constante, la distance augmente de 100 km chaque heure, quelle que soit la distance déjà parcourue. La dérivée est constante.
- Pour une pierre qui tombe en chute libre, la vitesse augmente de $9,8\ \text{m/s}$ chaque seconde sous l'action de la gravité : l'accélération est constante, la position suit un polynôme du second degré (x^2).
- Mais pour la colonie de bactéries, **les nouveaux venus sont eux-mêmes de futures usines à naissances** !
  - Quand la colonie compte 10 bactéries, il y a 10 naissances potentielles par génération. La pente est faible.
  - Quand la colonie compte un million d'individus, il y a **un million de divisions cellulaires simultanées** ! La vitesse de prolifération devient titanesque.

En notant $N(t)$ le nombre d'individus à l'instant t, la vitesse de croissance instantanée (la dérivée $N'(t)$) n'est pas constante : elle est **directement proportionnelle au nombre d'individus déjà présents** :

$$N'(t) = k \cdot N(t).$$

En choisissant judicieusement l'unité de temps pour que $k = 1$, et en partant d'un individu unique à l'instant $t = 0$, nous faisons face au défi le plus fascinant posé au calcul différentiel :

> ***L'Énigme fondamentale :*** *Existe-t-il une fonction mathématique f, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, qui est* ***rigoureusement égale à sa propre dérivée*** *à chaque instant, et qui vaut 1 à l'origine ?*
>
> $$\{f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout} \quad x \in \mathbb{R}$$
> $$f(0) = 1$$

C'est une fonction dont la pente du ski sous la semelle en chaque point est exactement égale à son altitude ! Plus elle monte haut, plus la pente devient raide ; plus la pente est raide, plus elle s'élève vite vers le ciel.

---

2. La méthode d'Euler : construire la courbe à petits pas

Avant de prouver théoriquement qu'une telle fonction existe, comment pouvons-nous dessiner son allure et calculer ses valeurs approchées ? Au XVIII^{e} siècle, le génie suisse **Leonhard Euler** imagine une méthode numérique révolutionnaire : avancer pas à pas le long de la tangente.

2.1 Le principe géométrique

Rappelle-toi du chapitre précédent : au voisinage d'un point x_0, la courbe se confond presque avec sa tangente :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + h \cdot f'(x_0).$$

Mais ici, notre fonction a un pouvoir magique : **sa dérivée est égale à sa valeur** ($f'(x_0) = f(x_0)$) ! La formule d'approximation devient prodigieusement simple :

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + h \cdot f(x_0) = (1 + h) \cdot f(x_0).$$

Chaque pas en avant de largeur h revient simplement à **multiplier l'altitude précédente par $(1 + h)$** !

2.2 Calcul manuel avec un pas $h = 0,2$

Partons de $x_0 = 0$ et $y_0 = 1$ avec un pas $h = 0,2$:

- En $x_1 = 0,2$: $y_1 = y_0 \times (1 + 0,2) = 1 \times 1,2 = 1,2$.
- En $x_2 = 0,4$: $y_2 = y_1 \times 1,2 = 1,2 \times 1,2 = 1,44$.
- En $x_3 = 0,6$: $y_3 = 1,44 \times 1,2 = 1,728$.
- En $x_4 = 0,8$: $y_4 = 1,728 \times 1,2 = 2,0736$.
- En $x_5 = 1,0$: $y_5 = 2,0736 \times 1,2 \approx 2,488$.

En 5 pas, nous atteignons $x = 1$, et notre approximation donne $f(1) \approx 2,488$. Si l'on prend un pas dix fois plus petit ($h = 0,02$), on effectue 50 multiplications par $1,02$, et l'on trouve $(1,02)^{50} \approx 2,691$. Avec $h = 0,001$ (1000 pas), on obtient $(1,001)^{1000} \approx 2,7169$. La courbe existe bel et bien sous nos yeux !

2.3 L'algorithme Python officiel

Voici le script Python exigé par le programme de Première Spécialité pour simuler la méthode d'Euler :

```python
def methode_euler(n_pas):
    h = 1.0 / n_pas  # largeur du pas pour aller de 0 à 1
    x = 0.0
    y = 1.0
    for _ in range(n_pas):
        y = y + h * y  # équivalent à y = y * (1 + h)
        x = x + h
    return y

# Testons avec un découpage de plus en plus fin :
for n in [10, 100, 1000, 10000]:
    print(f"Pour n = {n:5d} pas : f(1) ≈ {methode_euler(n):.6f}")
```

Exécution :

Méthode Pas à Pas

🛠️ **Méthode Pas à Pas — Approximation Pas à Pas par la Méthode d'Euler**

- Pour n = 10 pas : f(1) ≈ 2.593742
- Pour n = 100 pas : f(1) ≈ 2.704814
- Pour n = 1000 pas : f(1) ≈ 2.716924
- Pour n = 10000 pas : f(1) ≈ 2.718146

Les décimales se stabilisent vers un nombre mystérieux : $\mathbf{2,71828...}$

---

3. Théorème d'existence et démonstration d'unicité

📐 **Théorème fondamental (admis pour l'existence, démontré pour l'unicité)**

Il existe une **unique** fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\{f'(x) = f(x) \quad \text{pour tout} \quad x \in \mathbb{R}$$
$$f(0) = 1$$

Cette fonction est appelée la **fonction exponentielle**, notée exp.

La démonstration de l'unicité est une merveille d'ingéniosité mathématique au programme du lycée. Elle repose sur un lemme capital : la fonction ne peut jamais s'évanouir à zéro.

3.1 Lemme : la fonction ne s'annule jamais

✍️ **Démonstration — Non-annulation de f**

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$. Considérons la fonction auxiliaire g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = f(x) \times f(-x).$$

Dérivons la fonction g à l'aide de la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$: La dérivée de $f(-x)$ est $-f'(-x)$ (dérivée de fonction composée).

$$g'(x) = f'(x) \cdot f(-x) + f(x) \cdot \big(-f'(-x)\big) = f'(x)f(-x) - f(x)f'(-x).$$

Mais par hypothèse, $f' = f$ partout, donc $f'(x) = f(x)$ et $f'(-x) = f(-x)$! Remplaçons :

$$g'(x) = f(x)f(-x) - f(x)f(-x) = 0.$$

La dérivée de g est **identiquement nulle sur** $\mathbb{R}$. Une fonction dont la dérivée est nulle partout est **constante** ! Donc pour tout réel x :

$$g(x) = g(0) = f(0) \times f(-0) = 1 \times 1 = 1.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{f(x) \times f(-x) = 1}$$

Si un produit de deux nombres vaut 1, aucun des deux ne peut être égal à zéro ! Par conséquent, **pour tout réel x, $f(x) \neq 0$.** ■

3.2 Preuve de l'unicité

✍️ Démonstration — Unicité de la fonction exponentielle

Supposons qu'il existe deux fonctions f_1 et f_2 vérifiant toutes deux les conditions : $f_1' = f_1$ avec $f_1(0) = 1$, et $f_2' = f_2$ avec $f_2(0) = 1$. Puisque f_1 ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$ d'après le lemme ci-dessus, nous avons le droit absolu de considérer la fonction quotient :

$$\phi(x) = \frac{f_2(x)}{f_1(x)}.$$

Dérivons ce quotient grâce à la règle $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\phi'(x) = \frac{f_2'(x)f_1(x) - f_2(x)f_1'(x)}{(f_1(x))^2}.$$

Comme $f_2' = f_2$ et $f_1' = f_1$:

$$\phi'(x) = \frac{f_2(x)f_1(x) - f_2(x)f_1(x)}{(f_1(x))^2} = \frac{0}{(f_1(x))^2} = 0.$$

La dérivée de ϕ est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$, donc ϕ est constante. Or en $x = 0$:

$$\phi(0) = \frac{f_2(0)}{f_1(0)} = \frac{1}{1} = 1.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\phi(x) = 1$, ce qui signifie que :

$$f_2(x) = f_1(x).$$

Il ne peut donc exister qu'une seule et unique fonction vérifiant ce problème ! ■

---

4. La propriété fondamentale : transformer l'addition en multiplication

C'est la propriété reine qui fait de l'exponentielle la fonction la plus puissante des sciences :

📐 Théorème fondamental — Relation fonctionnelle

Pour tous réels x et y :

$$\boxed{\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)}$$

✍️ Démonstration exigible au Bac

Fixons un nombre réel y quelconque, et considérons la fonction d'une seule variable x définie par :

$$h(x) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(x)}.$$

(Le quotient est légitime puisque le dénominateur $\exp(x)$ ne s'annule jamais). Dérivons h par rapport à x : Le numérateur $u(x) = \exp(x+y)$ a pour dérivée $u'(x) = 1 \cdot \exp'(x+y) = \exp(x+y)$. Le dénominateur $v(x) = \exp(x)$ a pour dérivée $v'(x) = \exp(x)$. Calculons la dérivée du quotient :

$$h'(x) = \frac{\exp(x+y)\exp(x) - \exp(x+y)\exp(x)}{(\exp(x))^2} = 0.$$

La fonction h est donc constante sur $\mathbb{R}$. Sa valeur pour tout x est égale à sa valeur en $x = 0$:

$$h(0) = \frac{\exp(0+y)}{\exp(0)} = \frac{\exp(y)}{1} = \exp(y).$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{\exp(x+y)}{\exp(x)} = \exp(y) \Leftrightarrow \exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y). \quad \blacksquare$$

4.1 Propriétés algébriques dérivées

De cette formule découlent instantanément toutes les règles familières des puissances :

📐 Propriétés algébriques

— Pour tous réels x, y et tout entier relatif n : 1. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$ 2. $\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$ 3. $\exp(n \cdot x) = \big(\exp(x)\big)^n$

✍️ Démonstrations rapides

1. D'après le lemme :
$\exp(x) \times \exp(-x) = \exp(x-x) = \exp(0) = 1 \Longrightarrow \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$. 2. $\exp(x-y) = \exp(x+(-y)) = \exp(x) \times \exp(-y) = \exp(x) \times \frac{1}{\exp(y)} = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$. 3. Par récurrence immédiate pour $n \in \mathbb{N}$: $\exp(2x) = \exp(x+x) = (\exp(x))^2$, etc. $\blacksquare$

---

5. La notation d'Euler et le nombre e

Regarde la ressemblance stupéfiante entre les propriétés de exp et celles des puissances de collège :

- $a^{x+y} = a^x \times a^y$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
- $a^{nx} = (a^x)^n$

Cette coïncidence totale pousse **Leonhard Euler** en 1728 à poser une notation audacieuse. Posons le nombre e comme l'image de 1 par la fonction exponentielle :

$$e = \exp(1) \approx 2,718281828459...$$

Alors, pour tout entier n, $\exp(n) = (\exp(1))^n = e^n$. Euler généralise cette écriture à tous les nombres réels x :

📐 Notation d'Euler

Pour tout nombre réel x, on note :

$$\boxed{\exp(x) = e^x}$$

On prononce indifféremment « exponentielle de x » ou « **e exposant x** ». Les règles d'écriture s'alignent sur les puissances :

$$e^0 = 1, \quad e^1 = e, \quad e^{x+y} = e^x \cdot e^y, \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}.$$

---

6. Étude complète de la fonction exponentielle

6.1 Signe et stricte positivité

Nous avons déjà prouvé que $e^x \neq 0$ pour tout x. De plus, $e^x = e^{x/2+x/2} = \left(e^{x/2}\right)^2$. Or un carré est toujours positif ou nul. Comme il ne peut pas valoir 0, il est **strictement positif** !

📐 Théorème — Stricte positivité

Pour tout nombre réel x :

$$\boxed{e^x > 0}$$

La courbe représentative de l'exponentielle est **entièrement située au-dessus de l'axe des abscisses**. Elle ne traverse jamais la ligne zéro.

6.2 Sens de variation

La dérivée de la fonction exponentielle est elle-même :

$$(e^x)' = e^x.$$

Comme $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, **la dérivée est strictement positive sur tout** $\mathbb{R}$.

📐 Théorème — Stricte croissance

La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. Par conséquent :

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

6.3 Limites aux infinis et asymptotes

- Quand $x \to +\infty$: e^x explose vers l'infini avec une rapidité vertigineuse :

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty.$$

- Quand $x \to -\infty$: posons $X = -x$. Quand $x \to -\infty$, $X \to +\infty$.

$$e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X} \underset{X \to +\infty}{\to} 0^+.$$

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0.$$

📐 Propriété géométrique — Asymptote horizontale

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est une **asymptote horizontale** à la courbe de l'exponentielle en $-\infty$.

6.4 Tableau de variations et tracé de la courbe

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$(e^x)' = e^x$		$+$	1	$+$	e	$+$	
e^x	0	$\nearrow$	1	$\nearrow$	$e \approx 2,718$	$\nearrow$	$+\infty$

Tangente en 0 ($a = 0$) : $y = e^0(x - 0) + e^0 \Leftrightarrow \boxed{y = x + 1}$.



Fig. 94. – La fonction exponentielle : croissance continue et propriétés

La courbe est entièrement située au-dessus de sa tangente en 0 :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \boxed{e^x \geq x + 1}$$

---

7. Dérivée de la composée $e^{u(x)}$

Dans les applications concrètes (radioactivité, épidémies, électronique), l'exposant n'est presque jamais un simple x, mais une fonction du temps : e^{-3t}, $e^{-x^2/2}$, etc.

> **📐 Théorème — Dérivée de e^u**
>
> Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I, et :
>
> $$\boxed{\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x) \cdot e^{u(x)}}$$

> **⚠️ Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — N'oublie jamais $u'(x)$** La dérivée de e^{5x} n'est pas e^{5x} ! Ici $u(x) = 5x \Longrightarrow u'(x) = 5$. Donc $(e^{5x})' = 5e^{5x}$. De même : $(e^{-x})' = -e^{-x}$, et $(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$.

Exemples résolus pas à pas

> ✅ ***Exemple résolu 1 — Simplification d'expressions exponentielles*** *Simplifier au maximum les expressions suivantes : 1.* $A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{(e^2)^3}$ *2.* $B = \frac{e^{2x+1} \times e^{-x+3}}{e^{x-2}}$ *3.* $C = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$
>
> ***Solution détaillée :*** *1.* $A = \frac{e^{3+(-5)}}{e^{2\times 3}} = \frac{e^{-2}}{e^6} = e^{-2-6} = e^{-8} = \frac{1}{e^8}$. *2.* $B = \frac{e^{(2x+1)+(-x+3)}}{e^{x-2}} = \frac{e^{x+4}}{e^{x-2}} = e^{(x+4)-(x-2)} = e^{x+4-x+2} = e^6$. *3. Identité remarquable* $(u+v)^2 - (u-v)^2 = 4uv$ *:* $C = 4 \times e^x \times e^{-x} = 4 \times e^{x-x} = 4 \times e^0 = 4 \times 1 = 4$.

✅ ***Exemple résolu 2 — Résolution d'équations avec exponentielles*** *Résoudre dans $\mathbb{R}$: 1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$ 2. $e^{x^2-4} = 1$ 3. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$*

Solution détaillée : *1. Par stricte croissance : $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$.*

$$3x - 1 = x + 5 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3. \quad S = \{3\}.$$

2. Rappelons que $1 = e^0$:

$$e^{x^2-4} = e^0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+2) = 0. \quad S = \{-2; 2\}.$$

3. On remarque que $e^{2x} = (e^x)^2$. Posons le changement de variable $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Racines évidentes : $X_1 = 1$ et $X_2 = 2$ (car $1 - 3 + 2 = 0$). Revenons à x :

- $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$.
- $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln(2)$ *(nous verrons le logarithme en Terminale, retenons que c'est une unique valeur réelle $\approx 0,693$).*

$$S = \{0; \ln 2\}.$$

✅ ***Exemple résolu 3 — Résolution d'inéquations*** *Résoudre dans $\mathbb{R}$: 1. $e^{4x-7} \leq 1$ 2. $\frac{e^x-3}{e^x+2} > 0$*

Solution détaillée : *1. $e^{4x-7} \leq e^0 \Leftrightarrow 4x - 7 \leq 0 \Leftrightarrow 4x \leq 7 \Leftrightarrow x \leq \frac{7}{4}$.*

$$S =]-\infty; \frac{7}{4}[.$$

2. Pour tout réel x, $e^x > 0$, donc le dénominateur $e^x + 2 > 2 > 0$ est strictement positif ! Le signe de la fraction est donc uniquement celui du numérateur :

$$e^x - 3 > 0 \Leftrightarrow e^x > 3 \Leftrightarrow x > \ln 3. \quad S =]\ln 3; +\infty[.$$

✅ ***Exemple résolu 4 — Dérivation de fonctions composées***

Dériver les fonctions suivantes : 1. $f(x) = (2x-3)e^{-x}$ 2. $g(x) = e^{-x^2+4x}$ 3. $h(x) = \frac{e^x}{x+1}$ pour $x \neq -1$

Solution détaillée : *1. Forme $u \cdot v$ avec $u(x) = 2x - 3 \Longrightarrow u'(x) = 2$, et $v(x) = e^{-x} \Longrightarrow v'(x) = -e^{-x}$.*

$$f'(x) = u'v + uv' = 2e^{-x} + (2x-3)(-e^{-x}) = [2 - (2x-3)]e^{-x} = (5 - 2x)e^{-x}.$$

2. Forme e^u avec $u(x) = -x^2 + 4x \Longrightarrow u'(x) = -2x + 4$.

$$g'(x) = u'(x)e^{u(x)} = (-2x+4)e^{-x^2+4x}.$$

3. Forme $\frac{u}{v}$:

$$h'(x) = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1) - e^x(1)}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1-1)}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$$

✅ ***Exemple résolu 5 — Étude complète d'une fonction avec exponentielle*** *Soit $f(x) = (x-1)e^x$ définie sur $\mathbb{R}$. Dresser son tableau de variations complet et préciser l'équation de la tangente en 0.*

Solution détaillée : *1. Dérivée : Règle du produit avec $u(x) = x - 1 \Longrightarrow u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x \Longrightarrow v'(x) = e^x$.*

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x-1)e^x = (1 + x - 1)e^x = xe^x.$$

2. Signe de $f'(x)$: Comme $e^x > 0$ pour tout réel x, le signe de $f'(x)$ est ***strictement identique au signe de x !***

- $f'(x) < 0$ *pour* $x < 0$;
- $f'(0) = 0$;
- $f'(x) > 0$ *pour* $x > 0$.

3. Variations : f est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Elle admet un minimum absolu en $x = 0$, qui vaut $f(0) = (0-1)e^0 = -1$.

4. Tangente en 0 : $f(0) = -1$ et $f'(0) = 0 \cdot e^0 = 0$. La tangente est horizontale d'équation : $\boxed{y = -1}$.

✅ ***Exemple résolu 6 — Modélisation concrète : la décharge d'un condensateur*** *Dans un circuit électrique, la tension aux bornes d'un condensateur qui se décharge à travers une résistance est modélisée par $U(t) = 12e^{-0,5t}$ où t est le temps en secondes et U en volts. 1. Quelle est la tension initiale à $t = 0$? 2. Au bout de combien de temps la tension est-elle divisée par 2 ? 3. Calculer la vitesse de chute de tension à l'instant $t = 0$.*

Solution détaillée : *1. $U(0) = 12e^0 = 12 \times 1 = 12$ V. 2. On cherche t tel que $U(t) = 6$ V :*

$$12e^{-0,5t} = 6 \Leftrightarrow e^{-0,5t} = 0,5 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^{0,5t} = 2.$$

Comme $0,5 = \frac{1}{2}$, cela donne $t \approx 2 \times 0,693 \approx 1,39$ seconde. 3. Vitesse de décharge : c'est la dérivée $U'(t)$.

$$U'(t) = 12 \times (-0,5)e^{-0,5t} = -6e^{-0,5t}.$$

À $t = 0$, $U'(0) = -6e^0 = -6$ V/s. La tension chute initialement à une vitesse de 6 volts par seconde.

Ce qu'il faut retenir

1. **Définition de l'exponentielle :**
   - Unique fonction vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.
   - Notée $\exp(x)$ ou e^x, avec $e = \exp(1) \approx 2,71828$.
2. **Propriété fondamentale (morphisme addition → multiplication) :**
   - $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
   - $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
   - $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
   - $(e^a)^n = e^{na}$
3. **Propriétés analytiques :**
   - Strictement positive : $e^x > 0$ sur $\mathbb{R}$.
   - Strictement croissante sur $\mathbb{R}$: $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$.
   - Limites : $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$ (axe $y = 0$ asymptote) et $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$.
   - Dérivée usuelle : $(e^x)' = e^x$.
   - Dérivée d'une composée : $\left(e^{u(x)}\right)' = u'(x)e^{u(x)}$.
   - Tangente en 0 : $y = x + 1$, avec $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x.

Exercices

Niveau (Calculs d'expressions, équations élémentaires)

1. Écrire sous la forme d'une seule puissance de e : $A = e^4 \times e^{-7}$, $B = \frac{e^8}{e^3}$, $C = (e^{-2})^5$.
2. Dériver la fonction $f(x) = 3e^x - 4x + 1$.
3. Dériver $g(x) = e^{4x-1}$.
4. Dériver $h(x) = e^{-3x}$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x-3} = e^5$.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{3x+1} > e^{x-5}$.
7. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = e^x$ au point d'abscisse $a = 1$.
8. Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x^2e^x$.

Niveau (Études de fonctions et variations)

9. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$ à l'aide d'un changement de variable.
10. Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f(x) = (2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.
11. Soit la fonction « cloche de Gauss » $f(x) = e^{-x^2}$.

a) Calculer $f'(x)$.
b) Dresser le tableau de variations de f et déterminer son maximum absolu.

12. Résoudre l'inéquation $e^{2x} - e^x \leq 0$.
13. On considère la fonction $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.
    a) Démontrer que f est impaire ($f(-x) = -f(x)$).
    b) Calculer $f'(x)$ et montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
14. Soit la fonction $g(x) = e^{2x} - 2x$.
    a) Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
    b) En déduire que pour tout réel x, $e^{2x} \geq 2x + 1 > 2x$.
15. Déterminer les abscisses des points de la courbe de $f(x) = e^{x^2 - 3x}$ où la tangente est horizontale.
16. Un bol de soupe chaude est posé dans une cuisine à 20°C. Sa température en degrés Celsius après t minutes est modélisée par $T(t) = 20 + 60e^{-0{,}05t}$.
    a) Quelle est la température de la soupe au moment où on la sert ($t = 0$) ?
    b) Quelle sera la température au bout de 20 minutes ? (Donnée : $e^{-1} \approx 0{,}368$)
    c) Vers quelle température la soupe tend-elle quand $t \to +\infty$?

Niveau (Problèmes et défis Bac)

17. **Démonstration de l'inégalité $e^x \geq x + 1$:** Soit la fonction $\varphi(x) = e^x - x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.
    a) Étudier les variations de φ et dresser son tableau de variations.
    b) En déduire son minimum et conclure que la courbe de l'exponentielle est toujours située au-dessus de sa tangente en 0.
18. **Intersection de courbes et position relative :** Soient les fonctions $f(x) = e^x$ et $g(x) = e^{-x}$.
    a) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de leurs deux courbes.
    b) Montrer que leurs tangentes en ce point sont perpendiculaires !
19. **La chaînette (cosinus hyperbolique) :** Un câble électrique suspendu entre deux pylônes prend la forme d'une courbe appelée la « chaînette », d'équation $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.
    a) Montrer que f est une fonction paire.
    b) Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f.
    c) Prouver que pour tout réel x, $(f(x))^2 - (f'(x))^2 = 1$.
20. **Algorithme d'Euler et comparaison :** Écrire un programme Python qui compare à l'abscisse $x = 1$ la valeur approchée obtenue par la méthode d'Euler avec 100 pas et la valeur exacte donnée par `math.exp(1)`. Calculer l'erreur relative en pourcentage.
21. **Famille de fonctions et point fixe :** Pour tout réel $k > 0$, on définit la fonction $f_k(x) = ke^{kx}$. Montrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_k$ passent par un même point fixe si l'on effectue une translation, et déterminer les coordonnées du point où la tangente à $\mathcal{C}_k$ a pour pente k^2.

Solutions

1. $A = e^{4-7} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$. $B = e^{8-3} = e^5$. $C = e^{-2\times 5} = e^{-10}$.

2. $f'(x) = 3e^x - 4$.

3. Forme e^u avec $u = 4x - 1 \Longrightarrow u' = 4$. $g'(x) = 4e^{4x-1}$.

4. Forme e^u avec $u = -3x \Longrightarrow u' = -3$. $h'(x) = -3e^{-3x}$.

5. $e^{2x-3} = e^5 \Leftrightarrow 2x - 3 = 5 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4$. $S = \{4\}$.

6. $e^{3x+1} > e^{x-5} \Leftrightarrow 3x + 1 > x - 5 \Leftrightarrow 2x > -6 \Leftrightarrow x > -3$. $S =]-3; +\infty[$.

7. En $a = 1$: $f(1) = e^1 = e$, $f'(1) = e$. Tangente : $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = e(x - 1) + e = ex - e + e = ex$. La tangente en 1 passe par l'origine : $y = ex$.

8. Règle du produit : $u = x^2 \Longrightarrow u' = 2x$; $v = e^x \Longrightarrow v' = e^x$. $f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = (x^2 + 2x)e^x = x(x + 2)e^x$.

9. En posant $X = e^x > 0$, l'équation devient $X^2 - 4X + 3 = 0$. $\Delta = 16 - 12 = 4 = 2^2$. $X_1 = \frac{4-2}{2} = 1$ et $X_2 = \frac{4+2}{2} = 3$.

• $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$.
• $e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3 \approx 1,0986$. $S = \{0; \ln 3\}$.

10. $f'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x = (2 + 2x - 1)e^x = (2x+1)e^x$. Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $2x+1$:

• $f'(x) < 0$ sur $]-\infty; -0,5[$ (f décroissante) ;
• $f'(-0,5) = 0$;
• $f'(x) > 0$ sur $]-0,5; +\infty[$ (f croissante).

Minimum absolu en $x = -0,5$: $f(-0,5) = (2(-0,5) - 1)e^{-0,5} = -2e^{-0,5} = -\frac{2}{\sqrt{e}} \approx -1,213$.

11. a) $u(x) = -x^2 \Longrightarrow u'(x) = -2x$. Donc $f'(x) = -2xe^{-x^2}$. b) Comme $e^{-x^2} > 0$, le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de x : Pour $x < 0$, $f'(x) > 0$ (croissante) ; pour $x > 0$, $f'(x) < 0$ (décroissante). f admet un maximum absolu en $x = 0$, qui vaut $f(0) = e^0 = 1$.

12. Factorisons par e^x : $e^{2x} - e^x = e^x(e^x - 1) \leq 0$. Comme $e^x > 0$ toujours, cela équivaut à $e^x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow e^x \leq 1 = e^0 \Leftrightarrow x \leq 0$. $S =]-\infty; 0]$.

13. a) $f(-x) = \frac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1} = \frac{\frac{1}{e^x}-1}{\frac{1}{e^x}+1} = \frac{\frac{1-e^x}{e^x}}{\frac{1+e^x}{e^x}} = \frac{-(e^x-1)}{e^x+1} = -f(x)$. La fonction est impaire. b) Formule du quotient : $f'(x) = \frac{e^x(e^x+1)-(e^x-1)e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^{2x}+e^x-e^{2x}+e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$. Le numérateur est strictement positif ($2e^x > 0$) et le dénominateur est un carré non nul (> 0). Donc $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante.

14. a) $g'(x) = 2e^{2x} - 2 = 2(e^{2x} - 1)$. $g'(x) > 0 \Leftrightarrow e^{2x} > 1 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0$. g décroît sur $]-\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$. Minimum absolu en 0 : $g(0) = e^0 - 0 = 1$. b) Comme le minimum vaut 1, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geq 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 2x \geq 1 \Leftrightarrow e^{2x} \geq 2x + 1$. Comme $2x + 1 > 2x$, on en déduit immédiatement $e^{2x} > 2x$.

15. $f'(x) = (2x-3)e^{x^2-3x}$. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} = 1,5$.

16. a) $T(0) = 20 + 60e^0 = 20 + 60 = 80$°C. b) $T(20) = 20 + 60e^{-0,05\times 20} = 20 + 60e^{-1} \approx 20 + 60 \times 0,368 = 20 + 22,08 = 42,08$°C. c) Quand $t \to +\infty$, $-0,05t \to -\infty$, donc $e^{-0,05t} \to 0$. $\lim_{t\to+\infty} T(t) = 20 + 0 = 20$°C (la température ambiante de la pièce).

17. a) $\varphi'(x) = e^x - 1$.

• $\varphi'(x) < 0$ pour $x < 0$ (φ décroissante) ;
• $\varphi'(0) = 0$;
• $\varphi'(x) > 0$ pour $x > 0$ (φ croissante).

b) φ atteint son minimum absolu en $x = 0$, qui vaut $\varphi(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq x + 1$. La courbe $\mathcal{C}_{\exp}$ est donc toujours au-dessus de sa tangente en 0.

18. a) $e^x = e^{-x} \Leftrightarrow e^x = \frac{1}{e^x} \Leftrightarrow (e^x)^2 = 1 \Leftrightarrow e^{2x} = 1 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Ordonnée : $y = e^0 = 1$. L'intersection est le point $A(0; 1)$. b) Tangente à f en 0 : coefficient directeur $f'(0) = e^0 = 1$. Tangente à g en 0 : $g'(x) = -e^{-x} \Longrightarrow g'(0) = -e^0 = -1$. Le produit de leurs pentes vaut $m_1 \times m_2 = 1 \times (-1) = -1$. D'après la propriété d'orthogonalité des droites, les deux tangentes sont rigoureusement perpendiculaires !

19. a) $f(-x) = \frac{e^{-x}+e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x}+e^x}{2} = f(x)$. La fonction est paire. b) $f'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - e^{-x} > 0 \Leftrightarrow e^x > e^{-x} \Leftrightarrow x > -x \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0$. La fonction décroît sur $]-\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$. Minimum en 0 valant $f(0) = 1$. c) $(f(x))^2 - (f'(x))^2 = \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^{2x}+2+e^{-2x})-(e^{2x}-2+e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1$. (C'est l'équivalent hyperbolique de la relation trigonométrique $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$!).

20.

```python
import math


def euler_comparaison(n=100):
  h = 1.0 / n
  y = 1.0
  for _ in range(n):
    y = y * (1 + h)
  exact = math.exp(1)
  erreur = abs(y - exact) / exact * 100
  print(f"Euler (n={n}) : {y:.6f}")
  print(f"Exact : {exact:.6f}")
  print(f"Erreur relative : {erreur:.3f}%")


euler_comparaison(100)
# Donne une erreur relative d'environ 0.49% seulement !
```

21. En $x = 0$, $f_k(0) = ke^0 = k$. Dérivée : $f_k'(x) = k \cdot (ke^{kx}) = k^2 e^{kx}$. La pente vaut k^2 si et seulement si $k^2 e^{kx} = k^2 \Leftrightarrow e^{kx} = 1 \Leftrightarrow kx = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (car $k > 0$). Pour toutes les fonctions de la famille, c'est systématiquement au point d'abscisse $x = 0$ que la pente de la tangente vaut k^2.

La question qui ouvre la suite

L'exponentielle nous a permis de modéliser des populations qui se multiplient selon des lois mathématiques pures et parfaites. Mais lorsque le biologiste compte ses bactéries dans la boîte de Pétri, ou lorsque le statisticien interroge un échantillon de mille citoyens dans la rue, les mesures ne tombent jamais sur une courbe lisse : elles oscillent, elles s'éparpillent, elles fluctuent au hasard. Comment résumer un nuage de mesures éparpillées par deux nombres maîtres : le centre de gravité (**la moyenne**) et la largeur de dispersion (**l'écart-type**) ? C'est ce que nous allons découvrir au chapitre suivant avec **le sondeur et l'écart-type**.

CHAPITRE 41 : Le Sondeur et l'Écart-Type

> « Si vous mettez votre tête dans un four brûlant et vos pieds dans un bloc de glace, un statisticien imprudent vous dira que, « en moyenne », votre température corporelle est idéale. La moyenne est un phare qui éclaire le centre, mais qui plonge dans l'ombre les tempêtes de la périphérie. Pour comprendre le monde réel, il faut mesurer l'éparpillement. »

Ce que tu vas découvrir

- Le piège mortel de la moyenne : pourquoi deux usines, deux classes ou deux traitements médicaux ayant la même moyenne peuvent être radicalement opposés.
- Les indicateurs de position : la **moyenne pondérée** ($\bar{x}$) contre la **médiane** (M_e), et pourquoi la médiane ne se laisse pas tromper par les milliardaires.
- Les sentinelles du quart : les **quartiles** Q_1 et Q_3, et l'**écart interquartile**.
- L'art du résumé graphique : le **diagramme en boîte à moustaches** (*boxplot*) de John Tukey.
- Le mystère du carré : pourquoi la somme des écarts à la moyenne s'annule toujours ($\sum(x_i - \bar{x}) = 0$), et pourquoi il a fallu inventer la **variance** et l'**écart-type** σ.
- La formule magique de **König-Huygens** pour calculer la variance en un clin d'œil.
- La loi de l'échantillonnage : comment un sondeur peut prédire le vote de 45 millions d'électeurs en interrogeant seulement 1 000 personnes, grâce à l'**intervalle de fluctuation**.
- Des simulations d'échantillonnage programmées en **Python**.

---

1. Le problème : les deux usines d'arbres de transmission

Nous sommes dans une usine aéronautique de pointe près de Toulouse. L'usine fabrique des axes de transmission en titane destinés aux réacteurs d'avions de ligne. Le cahier des charges des ingénieurs est formel : pour s'insérer au millième de millimètre près dans les roulements à billes de la turbine, le diamètre nominal d'un axe doit être exactement de $\mathbf{50,00}$ **millimètres**. Un axe de $50,10$ mm coincera le moteur ; un axe de $49,90$ mm créera un jeu mécanique destructeur à 10 000 tours par minute.

Deux entreprises sous-traitantes, l'atelier **Alpha** et l'atelier **Beta**, soumettent chacune un lot de 1 000 axes usinés. Le responsable qualité mesure les échantillons :

- Dans l'atelier **Alpha**, la moyenne des diamètres est très exactement de $\mathbf{50,00}$ **mm**.
- Dans l'atelier **Beta**, la moyenne des diamètres est également très exactement de $\mathbf{50,00}$ **mm**.

Un acheteur naïf dirait : *« Les deux ateliers se valent, choisissons le moins cher ! »* Mais le directeur technique examine les pièces d'un peu plus près au microscope électronique :

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu — Dispersion Comparée : Atelier Alpha vs Atelier Bêta

- Atelier Alpha :
- Toutes les pièces sont comprises entre 49,98 mm et 50,02 mm.
- Elles sont quasi parfaites, regroupées comme un essaim serré autour de 50,00 mm.
- 49,99 50 50,01
- Atelier Beta :
- Une pièce fait 46,00 mm, une autre 54,00 mm, une autre 48,20 mm…
- Les pièces sont dispersées dans un désordre effrayant !
- 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Dans l'atelier Beta, **aucune pièce ou presque ne pourra être montée dans l'avion** ! Certaines sont beaucoup trop grosses, d'autres beaucoup trop fines, même si par un pur hasard de symétrie, leur moyenne mathématique tombe pile sur 50 mm. Si l'on montait les pièces de l'atelier Beta, les avions s'écraseraient.

Voilà la crise intellectuelle qui a donné naissance à la statistique moderne : **Un indicateur de position (la moyenne) ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'un indicateur de dispersion (l'écart-type).**

---

2. Les indicateurs de position : Moyenne contre Médiane

Soit une série statistique quantitative discrète où la variable prend les valeurs ordonnées $x_1 < x_2 < ... < x_p$, associées aux effectifs respectifs $n_1, n_2, ..., n_p$. L'effectif total est noté $N = \sum_{i=1}^{p} n_i$.

2.1 La moyenne pondérée ($\bar{x}$)

La moyenne est le centre de gravité de la série : c'est la valeur que chacun recevrait si l'on mettait toutes les ressources en commun pour les redistribuer équitablement.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Moyenne pondérée** La **moyenne pondérée** d'une série statistique, notée $\bar{x}$ (lire « **x barre** »), est donnée par :

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{p} n_i x_i}{N} = \sum_{i=1}^{p} f_i x_i}$$

où $f_i = \frac{n_i}{N}$ désigne la fréquence de la valeur x_i.

Propriété de linéarité : Si l'on multiplie toutes les valeurs par une constante a et qu'on leur ajoute une constante b (transformation affine $y_i = ax_i + b$), la nouvelle moyenne devient simplement :

$$\bar{y} = a\bar{x} + b.$$

2.2 La médiane (M_e) : la justice du rang

La médiane ne s'intéresse pas à la masse totale, mais au **rang** dans la file d'attente.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Médiane** La **médiane** d'une série statistique ordonnée par ordre croissant, notée M_e, est une valeur qui sépare la population en deux groupes de même effectif :

- Au moins 50 % des individus ont une valeur inférieure ou égale à M_e ;
- Au moins 50 % des individus ont une valeur supérieure ou égale à M_e.

Méthode pratique de calcul : 1. Si l'effectif total N est **impair** : $N = 2k+1$. La médiane est la valeur de l'individu situé au rang $k+1$. *(Exemple : pour $N = 9$, $\frac{9+1}{2} = 5$: la médiane est la 5e valeur).* 2. Si l'effectif total N est **pair** : $N = 2k$. La médiane est généralement prise comme la demi-somme des valeurs situées aux rangs k et $k+1$. *(Exemple : pour $N = 10$, on prend la moyenne entre la 5e et la 6e valeur).*

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — Le bar de Bill Gates** Imagine un petit café de quartier où dix ouvriers et employés discutent au comptoir. Chacun gagne 2 000 € par mois. Le salaire moyen est de 2 000 €, et le salaire médian est de 2 000 €. Soudain, le milliardaire **Bill Gates** pousse la porte et s'assoit au comptoir. Ses revenus mensuels sont estimés à 10 millions d'euros. Recalculons instantanément les statistiques du bar :

- Le **salaire moyen** explose : $\frac{10\times 2\,000 + 10\,000\,000}{11} \approx \mathbf{910\,900}$ **€ par mois** ! Le statisticien imprudent conclurait : « Dans ce café, le client moyen est presque millionnaire ! » Ce qui est absurde.
- Le **salaire médian**, lui, range les 11 clients par ordre croissant. Le 6e client de la file gagne toujours **2 000 €** ! La médiane n'a pas bougé d'un centime : elle est **robuste** aux valeurs extrêmes (*outliers*), tandis que la moyenne est hypersensible.

---

3. Les quartiles et le diagramme en boîte à moustaches

Pour sonder plus finement la répartition, on découpe la série en **quatre quarts** de 25 % chacun.

3.1 Définitions officielles des quartiles

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Quartiles** Dans une série ordonnée de taille N :

- Le **premier quartile**, noté Q_1, est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins **25 %** des données soient inférieures ou égales à Q_1. Son rang dans la liste ordonnée est le premier entier supérieur ou égal à $\frac{N}{4}$ (noté $\lceil N/4 \rceil$).
- Le **troisième quartile**, noté Q_3, est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins **75 %** des données soient inférieures ou égales à Q_3. Son rang est le premier entier supérieur ou égal à $\frac{3N}{4}$ (noté $\lceil 3N/4 \rceil$).
- Le deuxième quartile Q_2 n'est autre que la médiane M_e.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Écart interquartile** La différence entre le troisième et le premier quartile s'appelle l'**écart interquartile** :

$$\boxed{IQR = Q_3 - Q_1}$$

Il mesure la largeur de l'intervalle dans lequel sont concentrés les **50 % centraux** de la population. Comme la médiane, cet indicateur est insensible aux valeurs aberrantes.

3.2 La boîte à moustaches de John Tukey (1977)

Inventé par le grand statisticien américain **John Tukey**, le diagramme en boîte à moustaches (*boxplot*) résume une distribution en un coup d'œil :



Fig. 95. – Boîte à moustaches : médiane, quartiles et dispersion statistique

- La **boîte rectangulaire** s'étend de Q_1 à Q_3. Sa longueur est l'écart interquartile.
- Le trait vertical au milieu de la boîte marque la **médiane**. Si la médiane n'est pas au centre de la boîte, la distribution est asymétrique.
- Les deux **moustaches** s'étirent de part et d'autre jusqu'au minimum et au maximum (ou jusqu'aux valeurs extrêmes non aberrantes).

---

4. Le mystère du carré : Variance et Écart-Type

Revenons à nos deux usines d'arbres de transmission. Comment mesurer mathématiquement la distance moyenne des pièces par rapport à la cible $\bar{x}$?

4.1 La première fausse bonne idée : la moyenne des écarts

L'idée la plus naturelle serait de calculer l'écart $(x_i - \bar{x})$ pour chaque individu, puis d'en faire la moyenne. Testons cela sur un exemple simple : trois notes $8, 12, 16$. La moyenne vaut $\bar{x} = \frac{8+12+16}{3} = 12$. Les écarts à la moyenne sont :

- Pour 8 : $8 - 12 = -4$
- Pour 12 : $12 - 12 = 0$
- Pour 16 : $16 - 12 = +4$

Faisons la somme de ces écarts : $(-4) + 0 + (+4) = \mathbf{0}$! Les écarts positifs ont été exactement annulés par les écarts négatifs !

> **📐 Théorème — La somme des écarts est toujours nulle**
>
> Pour toute série statistique :
>
> $$\sum_{i=1}^{p} n_i(x_i - \bar{x}) = 0$$

> **✍️ Démonstration**
>
> Développons la somme :
>
> $$\sum_{i=1}^{p} n_i(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^{p} n_i x_i - \sum_{i=1}^{p} n_i \bar{x} = \sum_{i=1}^{p} n_i x_i - \bar{x} \sum_{i=1}^{p} n_i = N\bar{x} - \bar{x} \times N = 0. \quad \blacksquare$$

La moyenne des écarts bruts est **toujours égale à zéro**, quelle que soit la dispersion de la série ! Elle ne sert strictement à rien.

4.2 L'artifice du carré : la Variance

Pour empêcher les signes négatifs de neutraliser les signes positifs, les mathématiciens élèvent chaque écart **au carré** : $(-4)^2 = +16$! Un carré est toujours positif.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Variance** La **variance** d'une série statistique, notée V, est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$\boxed{V = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{p} n_i(x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{p} f_i(x_i - \bar{x})^2}$$

⚠ ⚠ **Échantillon vs Population : pourquoi la calculatrice affiche σ et s (division par n ou n - 1)**

Lorsque vous calculez un écart-type, vos calculatrices affichent systématiquement deux valeurs distinctes (σ_x et s_x, ou σ et σ_{n-1}). Ne les confondez jamais :

- **Population complète (σ, division par N) :** Si vous disposez de l'ensemble absolu des données (par exemple toutes les notes d'une classe), la variance descriptive est $V = \frac{1}{N}\sum (x_i - \bar{x})^2$ et son écart-type est $\sigma = \sqrt{V}$.
- **Échantillon représentatif (s, division par $n-1$) :** Si vous prélevez au hasard un échantillon de n individus pour **estimer** la dispersion d'une immense population inconnue, la moyenne empirique de l'échantillon $\bar{x}$ s'ajuste trop fidèlement aux données recueillies, sous-estimant légèrement la vraie dispersion globale. Pour éliminer ce biais mathématique, la théorie de Gauss et Bessel démontre qu'il faut diviser par $n-1$:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}.$$

s est appelé l'**écart-type échantillonnal non biaisé**. Dès que n grandit ($n > 100$), la différence entre $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n-1}$ devient négligeable, mais elle est cruciale en inférence statistique.

4.3 L'écart-type (σ) : retrouver l'unité physique

La variance résout le problème du signe, mais elle crée un monstre dimensionnel : Si l'on mesure des longueurs en **mètres** (m), les écarts sont en mètres, mais leurs carrés sont en **mètres carrés** (m^2) ! La variance d'une série de tailles humaines s'exprime en m^2, ce qui n'a aucun sens physique. Pour revenir à l'unité de départ (des mètres, des euros, des millimètres), on applique la **racine carrée** :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Écart-type** L'**écart-type**, noté σ (lettre grecque minuscule « **sigma** »), est la racine carrée de la variance :

$$\boxed{\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{p} n_i(x_i - \bar{x})^2}}$$

Sens intuitif : L'écart-type représente l'**écart type** (au sens d'écart modèle, d'écart caractéristique) que fait en moyenne un individu par rapport à la moyenne du groupe.

- Dans l'atelier Alpha : $\bar{x} = 50,00$ mm et $\sigma = \mathbf{0,01}\ \ \mathbf{mm}$ (dispersion infime).
- Dans l'atelier Beta : $\bar{x} = 50,00$ mm et $\sigma = \mathbf{2,45}\ \ \mathbf{mm}$ (dispersion colossale).

Grâce à σ, l'ingénieur démasque immédiatement l'atelier défaillant !

---

5. La formule de König-Huygens : le raccourci magique

Calculer chaque terme $(x_i - \bar{x})^2$ à la main est un calvaire dès que la moyenne comporte des virgules. Heureusement, deux savants du XVII^{e} siècle, le mathématicien allemand **Samuel König** et le physicien hollandais **Christiaan Huygens**, ont démontré une formule alternative éblouissante :

📐 Théorème — Formule de König-Huygens

La variance est égale à **la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne** :

$$\boxed{V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$

où $\overline{x^2} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{p} n_i x_i^2$ désigne la moyenne des carrés des valeurs.

✍️ Démonstration

Développons le carré dans l'expression de la variance :

$$V = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{p} n_i \left(x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2 \right).$$

Distribuons la somme :

$$V = \frac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \frac{2\bar{x}}{N}\sum n_i x_i + \frac{\bar{x}^2}{N}\sum n_i.$$

Or $\frac{1}{N}\sum n_i x_i^2 = \overline{x^2}$, $\frac{1}{N}\sum n_i x_i = \bar{x}$, et $\sum n_i = N$. L'expression devient :

$$V = \overline{x^2} - 2\bar{x}(\bar{x}) + \frac{\bar{x}^2}{N}(N) = \overline{x^2} - 2(\bar{x})^2 + (\bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2. \quad \blacksquare$$

💡 Propriété de transformation affine —

Si l'on pose $y_i = ax_i + b$, alors :

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \quad \text{et} \quad \boxed{\sigma(aX + b) = |a| \cdot \sigma(X)}$$

Remarque : ajouter une constante b (par exemple donner 2 points de bonus à toute la classe) translate toutes les notes sans modifier leur dispersion : l'écart-type reste inchangé !

---

6. Échantillonnage, fluctuation et simulation en Python

Comment un institut de sondage peut-il estimer le résultat d'une élection présidentielle avec seulement 1 000 personnes interrogées par téléphone ? C'est le miracle mathématique de la **fluctuation d'échantillonnage**.

6.1 Le principe de la fluctuation

Supposons qu'une proportion réelle p de citoyens dans le pays entier soutienne une certaine mesure. Si l'on tire au sort un échantillon de taille n, la fréquence observée f dans cet échantillon ne sera presque jamais exactement égale à p : elle va osciller autour de p. Cependant, pour un échantillon suffisamment grand ($n \geq 30$, $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$), les mathématiques démontrent que dans **au moins 95 % des cas**, la fréquence observée f tombe dans une fourchette très précise :

Définition Fondamentale

Définition — Intervalle de fluctuation à 95 %

- Au niveau Seconde :

$$I = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} \, ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

- Formule asymptotique précise de Première Spécialité (issue de la loi normale) :

$$\boxed{I_{0,95} = \left[p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \, ; p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]}$$

6.2 Simulation d'échantillonnage en Python

Pour vérifier expérimentalement ce phénomène, simulons 1 000 sondages de taille $n = 100$ dans une population où la vraie proportion vaut $p = 0,40$ (40 %) :

```python
import random


def simuler_echantillon(n, p):
  """Simule le tirage d'un échantillon de taille n et renvoie la fréquence f."""
  succes = sum(1 for _ in range(n) if random.random() < p)
  return succes / n


def etude_fluctuation(nb_echantillons=1000, n=100, p=0.40):
  borne_inf = p - 1.96 * (p * (1 - p) / n) ** 0.5
  borne_sup = p + 1.96 * (p * (1 - p) / n) ** 0.5

  dans_intervalle = 0
  for _ in range(nb_echantillons):
    f = simuler_echantillon(n, p)
    if borne_inf <= f <= borne_sup:
      dans_intervalle += 1

  pourcentage = (dans_intervalle / nb_echantillons) * 100
  print(f"Intervalle théorique à 95 % : [{borne_inf:.4f} ; {borne_sup:.4f}]")
  print(
      f"Proportion d'échantillons tombés dans l'intervalle : {pourcentage:.1f} %"
  )


etude_fluctuation()
```

Résultat d'une exécution :

Règle Fondamentale — Intervalle de Fluctuation Asymptotique à 95 %

- Intervalle théorique à 95 % : [0.3040 ; 0.4960]
- Proportion d'échantillons tombés dans l'intervalle : 95.3 %

Exactement ce que la théorie prédisait : 95 % des échantillons tombent dans la cible !

Exemples résolus pas à pas

✅ ***Exemple résolu 1 — Calcul pas à pas de la moyenne et de l'écart-type*** *Les notes obtenues par un groupe de 20 élèves à un devoir sont réparties ainsi :*

Note x_i	6	8	10	12	15	18
Effectif n_i	2	4	6	5	2	1

Calculer la moyenne $\bar{x}$, la variance V et l'écart-type σ.

Solution détaillée : *Effectif total : $N = 2+4+6+5+2+1 = 20$. 1. Moyenne :*

$$\sum n_i x_i = (2\times 6)+(4\times 8)+(6\times 10)+(5\times 12)+(2\times 15)+(1\times 18)$$
$$= 12+32+60+60+30+18 = 212.$$
$$\bar{x} = \frac{212}{20} = 10,6.$$

2. Formule de König-Huygens pour la variance : Calculons $\sum n_i x_i^2$:

$$2(36)+4(64)+6(100)+5(144)+2(225)+1(324)$$
$$= 72+256+600+720+450+324 = 2422.$$
$$\overline{x^2} = \frac{2422}{20} = 121,1.$$
$$V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 121,1 - (10,6)^2 = 121,1 - 112,36 = 8,74.$$

3. Écart-type :

$$\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{8,74} \approx 2,96.$$

La moyenne de la classe est de $10,6$ avec un écart-type de près de 3 points.

✅ ***Exemple résolu 2 — Détermination de la médiane et des quartiles*** *Déterminer M_e, Q_1, Q_3 et l'écart interquartile pour la série de notes de l'exemple 1.*

Solution détaillée : *Dressons le tableau des effectifs cumulés croissants (ECC) :*

Note x_i	6	8	10	12	15	18
Effectif n_i	2	4	6	5	2	1
ECC	2	6	12	17	19	20

- ***Médiane :*** *$N = 20$ (pair). $\frac{N}{2} = 10$. La médiane est la moyenne entre la 10e et la 11e valeur. D'après les ECC, la 10e valeur est un 10, et la 11e est aussi un 10. Donc* $\boxed{M_e = 10}$.
- ***Premier quartile Q_1 :*** *$\frac{N}{4} = \frac{20}{4} = 5$. Q_1 est la 5e valeur de la série ordonnée. D'après les ECC, les valeurs de rang 3 à 6 sont des 8. Donc* $\boxed{Q_1 = 8}$.
- ***Troisième quartile Q_3 :*** *$\frac{3N}{4} = \frac{60}{4} = 15$. Q_3 est la 15e valeur. D'après les ECC, les valeurs de rang 13 à 17 sont des 12. Donc* $\boxed{Q_3 = 12}$.
- ***Écart interquartile :*** *$IQR = Q_3 - Q_1 = 12 - 8 = 4$. La moitié centrale de la classe a des notes comprises entre 8 et 12.*

✅ ***Exemple résolu 3 — Comparaison de deux séries par boîte à moustaches*** *Deux sportifs A et B s'entraînent au tir à l'arc. Leurs scores sur 50 tirs donnent les résumés suivants :*

- *Tireur A :* $\text{Min} = 5$, $Q_1 = 8$, $M_e = 9$, $Q_3 = 10$, $\text{Max} = 10$.
- *Tireur B :* $\text{Min} = 2$, $Q_1 = 6$, $M_e = 9$, $Q_3 = 9$, $\text{Max} = 10$. *Comparer leurs performances.*

Solution détaillée :

- *Les deux tireurs ont la même médiane ($M_e = 9$) : au moins la moitié de leurs flèches sont plantées dans le 9 ou le 10.*
- *Regardons l'éparpillement :*
  - *Pour A : $IQR = 10 - 8 = 2$, et l'étendue totale est de $10 - 5 = 5$. 75 % de ses tirs valent 8 ou plus.*
  - *Pour B : $IQR = 9 - 6 = 3$, et l'étendue vaut $10 - 2 = 8$. Un quart de ses tirs est inférieur ou égal à 6, et il a même fait un tir désastreux à 2.*
- ***Conclusion :*** *Le tireur A est bien plus **régulier et fiable** que le tireur B, même si leurs performances médianes semblent identiques.*

✅ ***Exemple résolu 4 — Effet d'une transformation sur moyenne et écart-type*** *Un professeur fait un contrôle difficile : la moyenne est $\bar{x} = 8$ et l'écart-type est $\sigma = 3$. Il décide d'harmoniser les notes en appliquant la formule suivante à chaque note x :*

$$y = 1,2x + 2.$$

Déterminer la nouvelle moyenne $\bar{y}$ et le nouvel écart-type σ_y.

Solution détaillée :

- *Par linéarité de la moyenne :*

$$\bar{y} = 1,2\bar{x} + 2 = 1,2(8) + 2 = 9,6 + 2 = 11,6.$$

- *Par propriété de l'écart-type : $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.*

$$\sigma_y = |1,2| \times \sigma = 1,2 \times 3 = 3,6.$$

La moyenne monte de $3,6$ points, mais l'écart-type augmente aussi : les écarts entre élèves se sont légèrement creusés !

✅ ***Exemple résolu 5 — Prise de décision sur un échantillon***

Une usine de fabrication de biscuits affirme que seulement 2 % de sa production présente des défauts de cuisson ($p = 0,02$). Une association de consommateurs achète un lot de $n = 500$ biscuits et découvre 18 biscuits brûlés. Peut-on rejeter l'affirmation du fabricant au seuil de confiance de 95 % ?

Solution détaillée : *1. Conditions d'application : $n = 500 \geq 30$, $np = 500 \times 0,02 = 10 \geq 5$, $n(1-p) = 500 \times 0,98 = 490 \geq 5$. Les conditions sont vérifiées. 2. Intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % :*

$$I_{0,95} = \left[0,02 - 1,96\sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{500}} \,;\, 0,02 + 1,96\sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{500}}\right].$$

Calculons l'écart-type de la proportion :

$$\sqrt{\frac{0,0196}{500}} = \sqrt{0,0000392} \approx 0,00626.$$

La marge d'erreur vaut $1,96 \times 0,00626 \approx 0,0123$.

$$I_{0,95} = [0,02 - 0,0123 \,;\, 0,02 + 0,0123] = [0,0077 \,;\, 0,0323].$$

En pourcentage : entre $0,77$ % et $3,23$ %. 3. Fréquence observée dans l'échantillon :

$$f = \frac{18}{500} = 0,036 = 3,6 \text{ \% }.$$

*4. Décision : La fréquence observée $f = 0,036 \notin I_{0,95}$ (elle dépasse la borne supérieure de $0,0323$). **Conclusion :** Au seuil de 95 %, l'affirmation du fabricant doit être **rejetée**. Il y a anormalement trop de biscuits défectueux.*

> ✅ ***Exemple résolu 6 — Détection de données aberrantes*** *Tukey a défini un critère rigoureux pour repérer une valeur aberrante (*outlier*) : une valeur est aberrante si elle est strictement en dehors de l'intervalle :*
>
> $$[Q_1 - 1,5 \times IQR\,;\, Q_3 + 1,5 \times IQR].$$
>
> *Dans une entreprise, on a $Q_1 = 1800$ € et $Q_3 = 2600$ €. Un salaire de 4 000 € est-il considéré comme aberrant ?*
>
> ***Solution détaillée :***
>
> - *Écart interquartile : $IQR = 2600 - 1800 = 800$ €.*
> - *Seuil maximal acceptable : $Q_3 + 1,5 \times IQR = 2600 + 1,5(800) = 2600 + 1200 = 3800$ €.*
> - *Comme 4000 € > 3800 €, ce salaire dépasse la limite : il s'agit bel et bien d'une **valeur aberrante** au sens statistique.*

Ce qu'il faut retenir

1. **Indicateurs de position :**
   - Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum n_i x_i = \sum f_i x_i$. Sensible aux valeurs extrêmes.
   - Médiane M_e : valeur centrale (50 % au-dessus, 50 % en dessous). Robuste.
   - Quartiles : Q_1 (au moins 25 %) et Q_3 (au moins 75 %).
2. **Indicateurs de dispersion :**
   - Écart interquartile : $IQR = Q_3 - Q_1$.
   - Variance : $V = \frac{1}{N}\sum n_i (x_i - \bar{x})^2$.
   - Formule de König-Huygens : $\boxed{V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2}$.
   - Écart-type : $\boxed{\sigma = \sqrt{V}}$ (exprimé dans la même unité que les données).
3. **Transformation affine $y = ax + b$:**
   - $\bar{y} = a\bar{x} + b$
   - $V(aX + b) = a^2 V(X)$
   - $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$
4. **Échantillonnage et fluctuation (à 95 %) :**
   - $I_{0,95} = \left[p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\,;\, p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]$ (pour $n \geq 30$, $np \geq 5$, $n(1-p) \geq 5$).
   - Si la fréquence observée $f \notin I_{0,95}$, on rejette l'hypothèse de proportion p.

Exercices

Niveau (Calculs directs d'indicateurs)

1. Calculer la moyenne et la médiane de la série : $4, 7, 9, 11, 14$.
2. Calculer la moyenne et la médiane de la série : $3, 5, 8, 12, 16, 20$.
3. Une série de 5 valeurs a pour moyenne 10. Quatre des valeurs sont $6, 8, 11, 13$. Trouver la cinquième valeur.
4. Calculer la variance et l'écart-type de la série $2, 4, 6, 8, 10$.
5. On sait que $\overline{x^2} = 53$ et $\bar{x} = 7$. Calculer la variance V et l'écart-type σ.
6. Si les salaires d'une entreprise ont un écart-type $\sigma = 250$ €, quel sera le nouvel écart-type si chaque salarié reçoit une augmentation forfaitaire de 100 € ?
7. Même question si chaque salaire est augmenté de 5 % (multiplié par 1,05).
8. Déterminer Q_1, M_e et Q_3 pour la série ordonnée de 12 valeurs : $1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20$.

Niveau (Analyses comparatives et propriétés)

9. Soit la série statistique suivante : | Valeur x_i | 10 | 20 | 30 | 40 | |—|—|—|—|—| | Effectif n_i | 3 | 5 | 8 | 4 |
   a) Calculer $\bar{x}$.

b) Utiliser la formule de König-Huygens pour trouver V et σ.

10. Démontrer que pour deux nombres réels a et b, la variance de la série $\{a; b\}$ est égale à $\left(\frac{a-b}{2}\right)^2$.
11. Un contrôle est passé par deux groupes :
    - Groupe 1 (15 élèves) : moyenne $\bar{x}_1 = 12$.
    - Groupe 2 (25 élèves) : moyenne $\bar{x}_2 = 10$. Calculer la moyenne globale de l'ensemble des 40 élèves.
12. Dans une classe, les notes ont pour moyenne 11 et pour écart-type 2,5. Le professeur décide de normaliser les notes pour que la moyenne passe à 12 et l'écart-type à 3. Quelle transformation affine $y = ax + b$ doit-il appliquer ?
13. Un échantillon de 400 électeurs révèle que 228 comptent voter pour le candidat C. Calculer l'intervalle de fluctuation au niveau 95 % sous l'hypothèse que la population est partagée à égalité ($p = 0,50$). Peut-on affirmer que le candidat C a une avance significative ?
14. Les températures maximales enregistrées en juillet dans deux stations météo donnent :
    - Station A : $\bar{x} = 28^\circ$ C, $\sigma = 1,5^\circ$ C.
    - Station B : $\bar{x} = 28^\circ$ C, $\sigma = 6,2^\circ$ C. Commenter le climat des deux stations.
15. Écrire une fonction Python `statistiques(liste)` qui prend une liste de nombres et renvoie son effectif, sa moyenne, sa variance et son écart-type sans utiliser de bibliothèque externe.

Niveau (Défis théoriques et modélisation)

16. **Variance d'une réunion de deux séries :** Soient deux séries statistiques de tailles N_1 et N_2, de moyennes $\bar{x}_1$ et $\bar{x}_2$, et de variances V_1 et V_2. Démontrer que la variance V de la série réunie de taille $N = N_1 + N_2$ vérifie :
$$V = \frac{N_1 V_1 + N_2 V_2}{N} + \frac{N_1 N_2}{N^2}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2.$$
Interpréter physiquement les deux termes (dispersion intra-groupe et dispersion inter-groupe).
17. **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev (découverte) :** Soit une série statistique de moyenne $\bar{x}$ et d'écart-type σ. Montrer que la proportion d'individus situés à une distance supérieure ou égale à 2σ de la moyenne ne peut jamais dépasser $\frac{1}{4} = 25\ \%$, quelle que soit la forme de la série !
18. **L'élection présidentielle et la marge d'erreur :** Un sondage interroge n personnes pour départager deux finalistes d'une élection au coude-à-coude ($p \approx 0,50$). Combien de personnes au minimum faut-il interroger pour que la marge d'erreur à 95 % ($1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$) soit strictement inférieure à 1 % (soit $0,01$) ?
19. **La moyenne des rangs :** On considère la série des n premiers entiers naturels non nuls : $1, 2, 3, ..., n$.
    a) Calculer la moyenne $\bar{x}$ en fonction de n.
    b) En utilisant $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, démontrer que la variance vaut $V = \frac{n^2-1}{12}$.
20. **Algorithme de détection de valeurs aberrantes en Python :** Écrire un programme Python qui prend une liste de données brutes, calcule Q_1, Q_3, l'intervalle de Tukey et extrait la liste de toutes les valeurs aberrantes.

Solutions

1. Moyenne : $\bar{x} = \frac{4+7+9+11+14}{5} = \frac{45}{5} = 9$. Médiane : 3e valeur sur 5, donc $M_e = 9$.

2. Moyenne : $\bar{x} = \frac{3+5+8+12+16+20}{6} = \frac{64}{6} \approx 10,67$. Médiane : demi-somme des 3e et 4e valeurs : $M_e = \frac{8+12}{2} = 10$.

3. Somme totale = $5 \times 10 = 50$. Somme des quatre valeurs = $6 + 8 + 11 + 13 = 38$. La 5e valeur est $50 - 38 = 12$.

4. $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$. Écarts à la moyenne : $-4, -2, 0, 2, 4$. Carrés des écarts : $16, 4, 0, 4, 16$. Variance : $V = \frac{16+4+0+4+16}{5} = \frac{40}{5} = 8$. Écart-type : $\sigma = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$.

5. $V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 53 - 7^2 = 53 - 49 = 4$. $\sigma = \sqrt{4} = 2$.

6. L'écart-type est insensible aux additions : le nouvel écart-type est toujours $\sigma = 250\ $ €.

7. $y = 1,05x \Longrightarrow \sigma_y = 1,05 \times \sigma = 1,05 \times 250 = 262,50\ $ €.

8. $N = 12$. - Q_1 : rang $\frac{12}{4} = 3 \Longrightarrow$ 3e valeur, soit $Q_1 = 4$. - Médiane : demi-somme des 6e et 7e valeurs $\Longrightarrow M_e = \frac{9+10}{2} = 9,5$. - Q_3 : rang $\frac{3 \times 12}{4} = 9 \Longrightarrow$ 9e valeur, soit $Q_3 = 13$.

9. a) $N = 3+5+8+4 = 20$. $\sum n_i x_i = 3(10)+5(20)+8(30)+4(40) = 30+100+240+160 = 530$. $\bar{x} = \frac{530}{20} = 26,5$. b) $\sum n_i x_i^2 = 3(100)+5(400)+8(900)+4(1600) = 300+2000+7200+6400 = 15900$. $\overline{x^2} = \frac{15900}{20} = 795$. $V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 795 - (26,5)^2 = 795 - 702,25 = 92,75$. $\sigma = \sqrt{92,75} \approx 9,63$.

10. Moyenne : $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$. Les écarts sont $a - \frac{a+b}{2} = \frac{a-b}{2}$, et $b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} = -\frac{a-b}{2}$. La moyenne des carrés des écarts vaut : $V = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + \left(-\frac{a-b}{2}\right)^2\right] = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$.

11. Moyenne pondérée globale : $\bar{x} = \frac{N_1\bar{x}_1 + N_2\bar{x}_2}{N_1+N_2} = \frac{15\times12+25\times10}{40} = \frac{180+250}{40} = \frac{430}{40} = 10,75$.

12. On veut $\sigma_y = |a|\sigma \Leftrightarrow 3 = a \times 2,5 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2,5} = 1,2$. On veut ensuite $\bar{y} = a\bar{x} + b \Leftrightarrow 12 = 1,2(11) + b \Leftrightarrow 12 = 13,2 + b \Leftrightarrow b = -1,2$. La formule est : $y = 1,2x - 1,2$.

13. Fréquence observée : $f = \frac{228}{400} = 0,57$. Sous l'hypothèse $p = 0,50$, l'intervalle à 95 % est : $I = \left[0,50 - 1,96\sqrt{\frac{0,25}{400}} ; 0,50 + 1,96\sqrt{\frac{0,25}{400}}\right] = [0,50 - 1,96\times0,025 ; 0,50 + 1,96\times0,025] = [0,451 ; 0,549]$. Comme $f = 0,57 > 0,549$, la fréquence sort de l'intervalle : le candidat C a une avance statistiquement significative par rapport au 50/50.

14. Les deux stations ont la même température moyenne (28°C). Mais la station A a un écart-type très faible (1,5°C) : c'est un climat très régulier et tempéré (sans doute une île océanique). La station B a un écart-type important (6,2°C) : les températures y subissent de violentes variations entre jours étouffants et vagues d'orage (climat continental).

15.

```
def statistiques(liste):
  N = len(liste)
  moyenne = sum(liste) / N
  variance = sum((x - moyenne) ** 2 for x in liste) / N
  ecart_type = variance**0.5
  return {'effectif': N, 'moyenne': moyenne, 'ecart_type': ecart_type}
```

16. Notons $S_1 = \sum_{x\in G_1} x^2$ et $S_2 = \sum_{x\in G_2} x^2$. Par König-Huygens dans chaque groupe : $S_1 = N_1(V_1 + \bar{x}_1^2)$ et $S_2 = N_2(V_2 + \bar{x}_2^2)$. Dans le groupe réuni : $\bar{x} = \frac{N_1\bar{x}_1+N_2\bar{x}_2}{N}$, et $V = \frac{S_1+S_2}{N} - \bar{x}^2$. En développant et simplifiant, les termes croisés font apparaître : $V = \frac{N_1V_1+N_2V_2}{N} + \frac{N_1N_2}{N^2}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2$.

- Le premier terme représente la **dispersion intra-groupe** (la moyenne des variances de chaque groupe).
- Le second terme représente la **dispersion inter-groupe** (l'écart entre les moyennes des deux groupes).

17. Soit E l'ensemble des individus vérifiant $|x_i - \bar{x}| \geq 2\sigma$, et N_E leur nombre. Pour chaque individu de E, $(x_i - \bar{x})^2 \geq 4\sigma^2$. La somme de tous les carrés d'écarts vérifie : $NV = \sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2 \geq \sum_{i\in E}(x_i - \bar{x})^2 \geq N_E \times 4\sigma^2$. Comme $V = \sigma^2$, on a $N\sigma^2 \geq N_E \times 4\sigma^2$. En divisant par $4N\sigma^2$, il vient : $\frac{N_E}{N} \leq \frac{1}{4} = 25\ \%$.

18. Marge d'erreur : $1,96\sqrt{\frac{0,5\times0,5}{n}} = 1,96 \times \frac{0,5}{\sqrt{n}} = \frac{0,98}{\sqrt{n}}$. On veut $\frac{0,98}{\sqrt{n}} < 0,01 \Leftrightarrow \sqrt{n} > \frac{0,98}{0,01} = 98 \Leftrightarrow n > 98^2 = 9\,604$. Il faut interroger au moins **9 605 personnes** pour garantir une marge d'erreur inférieure à 1 %.

19. a) $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$. b) $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$. Par König-Huygens : $V = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = (n+1)\left[\frac{2(2n+1)-3(n+1)}{12}\right] = (n+1)\frac{4n+2-3n-3}{12} = \frac{(n+1)(n-1)}{12} = \frac{n^2-1}{12}$.

20.

```
import math


def detecter_outliers(donnees):
  s = sorted(donnees)
  N = len(s)
  q1 = s[math.ceil(N / 4) - 1]
  q3 = s[math.ceil(3 * N / 4) - 1]
  iqr = q3 - q1
  seuil_bas = q1 - 1.5 * iqr
  seuil_haut = q3 + 1.5 * iqr
  outliers = [x for x in donnees if x < seuil_bas or x > seuil_haut]
  return {'Q1': q1, 'Q3': q3, 'IQR': iqr, 'outliers': outliers}
```

La question qui ouvre la suite

Nous savons désormais décrire et résumer des données passées. Mais comment passer de la constatation des faits passés à **la prédiction du futur** ? Comment calculer la probabilité qu'un patient soit réellement malade lorsqu'un test médical à 99 % de fiabilité s'allume en rouge ? Pourquoi nos intuitions sur le hasard nous trompent-elles presque toujours ? C'est le grand carrefour des **probabilités conditionnelles** et de la **formule de Bayes**, au chapitre suivant.

CHAPITRE 42 : Le Médecin, le Test et l'Arbre des Possibles

> « Le bon sens devant le hasard est un aveugle qui avance à tâtons. Quand un test médical fiable à 99 % vous déclare malade, la panique vous crie que vous êtes perdu à 99 %. Le mathématicien, lui, respire, trace un arbre dans l'espace des possibles, rétrécit l'univers, et découvre que vous avez neuf chances sur dix d'être parfaitement sain. »

Ce que tu vas découvrir

- Le paradoxe du test médical : comment un test presque infaillible peut produire une majorité de faux positifs pour une maladie rare.
- La notion révolutionnaire de **probabilité conditionnelle** : comment une information nouvelle **rétrécit l'univers des possibles**.
- Les lois de l'**arbre pondéré** : la règle du produit le long des branches et la somme des chemins.
- La **formule des probabilités totales** : découper l'univers en tranches pour calculer l'inconnu.
- La formule légendaire du pasteur **Thomas Bayes** pour remonter le temps des causes.
- La frontière capitale entre deux événements **indépendants** et deux événements **disjoints**.
- Les **variables aléatoires discrètes** : associer un gain en euros à chaque issue du hasard.
- L'**espérance mathématique** $E(X)$: la moyenne à long terme et le juste prix d'un billet de loterie.
- La **variance** $V(X)$, l'**écart-type** $\sigma(X)$ et la **linéarité de l'espérance** : $E(aX + b) = aE(X) + b$.

---

1. Le problème : le cauchemar de Thomas dans le cabinet médical

Thomas a dix-sept ans. Pour son inscription sportive en compétition, le médecin lui fait passer un test de dépistage sanguin pour une anomalie cardiaque rare mais dangereuse, qui touche **1 personne sur 1 000** dans la population générale.

Trois jours plus tard, le téléphone sonne. La voix du médecin est grave : *« Thomas, votre test sanguin est revenu positif. »*

Thomas sent la terre se dérober sous ses pieds. Il demande d'une voix tremblante : *« Docteur, quelle est la fiabilité de votre test ? »* Le médecin consulte la notice du laboratoire : *« Le test est d'une fiabilité remarquable de **99 % :** - Si une personne est malade, le test est positif dans 99 % des cas (sensibilité). - Si une personne est saine, le test est négatif dans 99 % des cas (spécificité). »*

Thomas s'effondre sur sa chaise : *« Le test est fiable à 99 %. Mon test est positif. J'ai donc 99 % de risque d'avoir cette maladie cardiaque ! »*

Thomas a-t-il raison de paniquer ? La réponse des mathématiques est éclatante, spectaculaire, et va bouleverser ton intuition : **NON ! Thomas a en réalité moins de 10 % de risque d'être malade !** Il a plus de **90 % de chances d'être en parfaite santé** !

Comment est-ce possible ? Comment un test fiable à 99 % peut-il se tromper neuf fois sur dix lorsqu'il annonce une maladie ?

---

2. Le rétrécissement de l'univers : la probabilité conditionnelle

Pour comprendre ce prodige sans formule obscure, prenons un échantillon concret de **100 000 personnes** représentatives de la population :



Fig. 96. – L'arbre pondéré du dépistage médical et la formule de Bayes

Regarde attentivement les chiffres : 1. Sur 100 000 personnes, comme la maladie touche 1 personne sur 1 000, il y a **100 malades** et **99 900 personnes saines**. 2. Parmi les 100 malades : le test en détecte 99 % : il y a **99 tests positifs** (et 1 malade testé négatif par erreur). 3. Mais regarde maintenant les **99 900 personnes saines** : Le test est fiable à 99 %, ce qui signifie qu'il se trompe sur 1 % d'entre elles. 1 % de 99 900, cela fait très exactement **999 personnes saines testées positives à tort** (des faux positifs) !

Et maintenant, mettons-nous dans la peau de Thomas : Le médecin lui a annoncé que son test est positif. L'univers entier de Thomas vient de **rétrécir** : Thomas ne fait plus partie des 100 000 personnes du début, il fait partie du club restreint des personnes ayant reçu un **test positif** !

Combien y a-t-il de personnes positives au total dans la salle d'attente ?

$$\text{Total Positifs} = 99 \ \ (\text{malades}) + 999 \ \ (\text{sains}) = \mathbf{1098} \ \ \mathbf{\text{personnes}} \ .$$

Et parmi ces 1 098 personnes testées positives, combien sont véritablement malades ? Seulement **99 personnes** !

La probabilité que Thomas soit malade sachant que son test est positif est donc :

$$P(\text{Malade sachant Positif}) = \frac{99}{1098} \approx \mathbf{0,0902} = \mathbf{9,02}\,\%.$$

Plus de **91 % des gens testés positifs sont des personnes bien portantes** ! Pourquoi ? Parce que la maladie est tellement rare que le minuscule taux d'erreur de 1 % appliqué à l'immense océan des personnes saines produit dix fois plus de faux positifs que de vrais malades !

---

3. La théorie : définition et notation de la probabilité conditionnelle

3.1 Définition officielle

Soit un univers Ω muni d'une loi de probabilité P. Soient A et B deux événements.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Probabilité conditionnelle** Soit A un événement de probabilité non nulle ($P(A) > 0$). On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A**, notée $P_A(B)$ ou $P(B \mid A)$:

$$\boxed{P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}}$$

On prononce à voix haute : « **probabilité de B sachant A** ».

Sens géométrique : On remplace le grand univers Ω de référence (qui pesait une probabilité 1) par le sous-ensemble A. L'événement A devient le nouvel univers. La fraction de B qui vit à l'intérieur de ce nouvel univers est la zone commune $A \cap B$, divisée par la taille de A.

3.2 La règle du produit (principe multiplicatif)

En multipliant par $P(A)$, on obtient la formule fondamentale :

Théorème — Règle du produit

Pour tous événements A et B avec $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)}$$

---

4. L'arbre pondéré et la formule des probabilités totales

4.1 Les deux règles d'or de l'arbre pondéré

Un arbre pondéré est un outil visuel d'une puissance redoutable pour organiser chronologiquement les épreuves aléatoires successives.

Règles de l'arbre pondéré

1. **Règle des nœuds :** La
somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est **toujours égale à 1**.

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1, \qquad P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1.$$

2. **Règle du chemin (produit) :** La probabilité d'un chemin complet est le **produit** des probabilités inscrites sur chaque branche du chemin. 3. **Règle des feuilles (somme) :** La probabilité d'un événement final est la **somme** des probabilités de tous les chemins menant à cet événement.

4.2 La formule des probabilités totales

Définition Fondamentale

Définition — Partition de l'univers On dit que des événements $A_1, A_2, ..., A_n$ forment une **partition** de l'univers Ω si :

- Ils sont deux à deux disjoints ($A_i \cap A_j = \varnothing$ pour $i \neq j$) ;
- Leur réunion forme l'univers tout entier ($A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$) ;
- Aucun d'eux n'est impossible ($P(A_i) > 0$).

Le cas le plus fréquent est la partition élémentaire formée par un événement et son contraire : $\left\{A; \overline{A}\right\}$.

Théorème — Formule des probabilités totales

Si $A_1, A_2, ..., A_n$ forment une partition de l'univers, alors pour tout événement B :

$$\boxed{P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \times P_{A_i}(B)}$$

Dans le cas d'une partition à deux issues $\left\{A; \overline{A}\right\}$:

$$\boxed{P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)}$$

---

5. La formule de Bayes : remonter le temps des causes

En 1763, un pasteur presbytérien et mathématicien britannique, **Thomas Bayes**, publie à titre posthume un mémoire qui va bouleverser la philosophie des sciences. Il se pose la question inverse : *« Sachant que l'effet s'est produit (le test est positif), quelle est la probabilité que telle cause en soit à l'origine (le patient est malade) ? »*

Théorème — Formule de Bayes

Soit $\left\{A; \overline{A}\right\}$ une partition de l'univers et B un événement de probabilité non nulle.

$$\boxed{P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)}}$$

Appliquons cette formule magistrale au cas de Thomas :

- Cause M : « être malade », $P(M) = 0,001 \Longrightarrow P(\overline{M}) = 0,999$.
- Effet T : « test positif ».
  - Sensibilité : $P_M(T) = 0,99$.
  - Faux positifs : $P_{\overline{M}}(T) = 1 - 0,99 = 0,01$.
- Probabilité totale d'un test positif :

$$P(T) = P(M)P_M(T) + P(\overline{M})P_{\overline{M}}(T) = (0,001 \times 0,99) + (0,999 \times 0,01)$$
$$= 0,00099 + 0,00999 = 0,01098.$$

- Probabilité d'être malade sachant le test positif :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,00099}{0,01098} = \frac{99}{1098} \approx \mathbf{9,02}\,\%.$$

La formule retrouve instantanément le résultat de notre tableau !

---

6. Indépendance : le hasard sans mémoire

Quand deux événements n'ont aucune influence l'un sur l'autre, connaître la réalisation du premier ne change absolument rien aux chances du second.

Définition Fondamentale

Définition — Événements indépendants Deux événements A et B sont dits **indépendants** si :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$$

Si $P(A) > 0$, cela équivaut à :

$$P_A(B) = P(B).$$

⚠ **Attention au Piège !**

⚠ **Attention, piège absolu ! — Ne confonds jamais « indépendants » et « disjoints »** C'est l'erreur numéro un au lycée !

- Deux événements sont **disjoints** (incompatibles) s'ils ne peuvent pas se produire en même temps : $A \cap B = \varnothing$, donc $P(A \cap B) = 0$.
- Deux événements sont **indépendants** si la réalisation de l'un n'influence pas l'autre : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Deux événements de probabilités non nulles qui sont disjoints ne sont **JAMAIS indépendants** ! Au contraire, ils sont hyper-dépendants : si A se produit, on est certain à 100 % que B ne s'est pas produit ($P_A(B) = 0 \neq P(B)$) !

---

7. Les variables aléatoires discrètes

Jusqu'ici, les issues du hasard étaient des mots ou des événements : « pile », « face », « malade », « carte rouge ». Une **variable aléatoire** fait franchir un pas immense à l'analyse : elle associe à chaque issue **un nombre réel** (un gain d'argent, un nombre de clients, une durée d'attente).

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Variable aléatoire** Une **variable aléatoire discrète** X sur un univers Ω est une fonction qui associe un nombre réel x_i à chaque issue élémentaire de Ω. On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_k\}$ l'ensemble des valeurs possibles prises par X.

7.1 La loi de probabilité

Définir la **loi de probabilité** d'une variable aléatoire X, c'est déterminer pour chaque valeur x_i la probabilité de l'événement $(X = x_i)$. On la présente sous forme de tableau :

x_i	x_1	x_2	...	x_k	**Total**
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_k	**1**

La somme des probabilités doit toujours être égale à 1 : $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$.

7.2 L'espérance mathématique : le juste prix d'un jeu

Imagine une loterie foraine : que peux-tu espérer gagner en moyenne par ticket si tu joues des millions de fois ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Espérance mathématique** L'**espérance mathématique** d'une variable aléatoire discrète X, notée $E(X)$, est la moyenne pondérée des valeurs prises par X :

$$\boxed{E(X) = \sum_{i=1}^{k} x_i \cdot P(X = x_i)}$$

- Si X représente le gain algébrique d'un joueur (gain reçu moins la mise) :
  - $E(X) > 0$: le jeu est **favorable** au joueur.
  - $E(X) < 0$: le jeu est **défavorable** au joueur (c'est le cas de tous les jeux de casino et de la Française des Jeux !).
  - $E(X) = 0$: le jeu est dit **équitable**.

7.3 Variance et Écart-Type d'une variable aléatoire

De même qu'en statistique descriptive au chapitre 41, on mesure le risque et la dispersion des gains :

Définition Fondamentale

📐 Définition — Variance et Écart-type

- La **variance** de X est :

$$\boxed{V(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = \sum_{i=1}^{k} (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)}$$

- Formule de König-Huygens probabiliste :

$$\boxed{V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2}$$

- L'**écart-type** est :

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}}$$

7.4 Propriétés fondamentales de linéarité

📐 Théorème — Transformation affine d'une variable aléatoire

Pour tous réels a et b :

1. $\boxed{E(aX + b) = aE(X) + b}$ (Linéarité de l'espérance)
2. $\boxed{V(aX + b) = a^2 V(X)}$
3. $\boxed{\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)}$

✍️ Démonstration de la linéarité

$$E(aX + b) = \sum_{i=1}^{k} (ax_i + b)p_i = \sum_{i=1}^{k} ax_i p_i + \sum_{i=1}^{k} bp_i = a\sum_{i=1}^{k} x_i p_i + b\sum_{i=1}^{k} p_i.$$

Or $\sum x_i p_i = E(X)$ et $\sum p_i = 1$. Donc $E(aX + b) = aE(X) + b \times 1 = aE(X) + b$. ■

Exemples résolus pas à pas

✅ ***Exemple résolu 1 — Calcul de probabilité conditionnelle simple*** *Dans une classe de 32 élèves, 18 font de l'espagnol, 10 font de l'allemand, et 6 font les deux langues. On choisit un élève au hasard. 1. Quelle est la probabilité qu'il fasse de l'allemand ? 2. L'élève choisi fait de l'espagnol. Quelle est la probabilité qu'il fasse aussi de l'allemand ?*

Solution détaillée : *Notons E l'événement « faire espagnol » et A « faire allemand ». $P(E) = \frac{18}{32}$, $P(A) = \frac{10}{32}$, et $P(E \cap A) = \frac{6}{32}$. 1. $P(A) = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125$. 2. On cherche $P_E(A)$ (univers réduit aux élèves d'espagnol) :*

$$P_E(A) = \frac{P(E \cap A)}{P(E)} = \frac{6/32}{18/32} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

✅ ***Exemple résolu 2 — Arbre pondéré et probabilités totales***

Une entreprise s'approvisionne en puces électroniques auprès de deux fournisseurs :

- *Le fournisseur A fournit 70 % des puces. Parmi elles, 2 % sont défectueuses.*
- *Le fournisseur B fournit les 30 % restants. Parmi elles, 5 % sont défectueuses. On prélève une puce au hasard dans le stock.*

1. *Construire l'arbre pondéré.*
2. *Calculer la probabilité que la puce soit défectueuse.*
3. *La puce prélevée est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne du fournisseur B ?*

Solution détaillée : *1. Données : $P(A) = 0,70$ et $P(B) = 0,30$. $P_A(D) = 0,02$ et $P_B(D) = 0,05$. 2. D'après la formule des probabilités totales avec la partition $\{A; B\}$:*

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = P(A) \times P_A(D) + P(B) \times P_B(D)$$

$$P(D) = (0,70 \times 0,02) + (0,30 \times 0,05) = 0,014 + 0,015 = 0,029 = 2,9\,\%.$$

3. Formule de Bayes : on cherche $P_D(B)$:

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,015}{0,029} = \frac{15}{29} \approx 0,5172 = 51,7\,\%.$$

Bien que le fournisseur B ne livre que 30 % des composants, il est responsable de plus de la moitié des pièces défectueuses !

✅ ***Exemple résolu 3 — Test de l'indépendance*** *On lance deux dés cubiques équilibrés à 6 faces, un rouge et un bleu. On note A : « le dé rouge donne 4 » et B : « la somme des deux dés vaut 7 ». Les événements A et B sont-ils indépendants ?*

Solution détaillée : *Il y a $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.*

- *Pour A : 6 issues $(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6)$, donc $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.*
- *Pour B : les paires donnant 7 sont $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$, soit 6 issues. Donc $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.*
- *Pour $A \cap B$: il n'y a qu'une seule issue où le dé rouge vaut 4 et la somme vaut 7 : c'est l'issue $(4,3)$. Donc $P(A \cap B) = \frac{1}{36}$.*
- *Vérifions le produit : $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.*
- *Comme $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, **les événements A et B sont rigoureusement indépendants** ! Savoir que le dé rouge donne 4 ne modifie en rien la probabilité que la somme fasse 7.*

✅ ***Exemple résolu 4 — Variable aléatoire et espérance d'un jeu*** *Un forain propose le jeu suivant pour une mise de 5 € : On lance un dé équilibré à 6 faces :*

- *Si l'on obtient un 6, on reçoit 20 € (gain net : $+15$ €).*
- *Si l'on obtient un 4 ou un 5, on reçoit 6 € (gain net : $+1$ €).*
- *Si l'on obtient 1, 2 ou 3, on ne reçoit rien (gain net : -5 €).*

1. *Définir la variable aléatoire X représentant le gain net du joueur et donner sa loi de probabilité.*
2. *Calculer son espérance. Le jeu est-il favorable au forain ou au joueur ?*

Solution détaillée : *1. Les valeurs possibles de X sont $X(\Omega) = \{-5; 1; 15\}$.*

- *$P(X = 15) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$*
- *$P(X = 1) = P(\{4; 5\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$*
- *$P(X = -5) = P(\{1; 2; 3\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ Vérification : $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = 1$.*

2. *Espérance mathématique :*

$$E(X) = \left(-5 \times \frac{3}{6}\right) + \left(1 \times \frac{2}{6}\right) + \left(15 \times \frac{1}{6}\right) = \frac{-15 + 2 + 15}{6} = \frac{2}{6} = +\frac{1}{3} \approx +0,33 \ \text{€}.$$

*Comme $E(X) > 0$, le jeu est **favorable au joueur** ! En moyenne, le joueur gagne 33 centimes par partie. Le forain va rapidement faire faillite s'il ne modifie pas les règles !*

✅ ***Exemple résolu 5 — Variance et écart-type d'une variable aléatoire*** *Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ pour le jeu de l'exemple 4.*

Solution détaillée : *1. Calculons $E(X^2)$:*

$$E(X^2) = (-5)^2 \times \frac{3}{6} + (1)^2 \times \frac{2}{6} + (15)^2 \times \frac{1}{6}$$

$$= 25 \times \frac{3}{6} + 1 \times \frac{2}{6} + 225 \times \frac{1}{6} = \frac{75+2+225}{6} = \frac{302}{6} = \frac{151}{3} \approx 50,33.$$

2. Formule de König-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{151}{3} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{453}{9} - \frac{1}{9} = \frac{452}{9} \approx 50,22.$$

3. Écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{452}{9}} = \frac{\sqrt{452}}{3} \approx 7,09 \ \text{€}.$$

L'écart-type est élevé : les gains subissent de fortes variations autour de la moyenne.

✅ ***Exemple résolu 6 — Linéarité de l'espérance*** *Une compagnie d'assurance garantit des flottes de vélos en libre-service. Le nombre de vélos accidentés par jour X a une espérance $E(X) = 4$ et un écart-type $\sigma(X) = 1,5$. Chaque accident coûte 50 € de réparation, auxquels s'ajoute un forfait d'astreinte quotidien de 100 €. Le coût quotidien total est donc $Y = 50X + 100$. Déterminer l'espérance et l'écart-type du coût quotidien pour l'assureur.*

Solution détaillée :

- *Espérance : par linéarité :*

$$E(Y) = E(50X + 100) = 50E(X) + 100 = 50(4) + 100 = 200 + 100 = 300 \ \text{€}.$$

- *Écart-type :*

$$\sigma(Y) = \sigma(50X + 100) = |50| \times \sigma(X) = 50 \times 1,5 = 75 \ \text{€}.$$

L'assureur doit provisionner en moyenne 300 € par jour, avec une fluctuation type de 75 €.

Ce qu'il faut retenir

1. **Probabilité conditionnelle :**
   - $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (univers réduit à A).
   - Règle du produit : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
2. **Arbre pondéré et probabilités totales :**
   - Somme des branches d'un nœud = 1.
   - Probabilité d'un chemin = produit des branches.
   - Formule des probabilités totales : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.
3. **Formule de Bayes (inversion des conditionnements) :**
   - $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)}$.
4. **Indépendance :**
   - A et B indépendants $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \Leftrightarrow P_A(B) = P(B)$.
   - Deux événements disjoints non impossibles ne sont jamais indépendants.
5. **Variables aléatoires :**
   - Espérance : $E(X) = \sum x_i p_i$. Linéarité : $E(aX + b) = aE(X) + b$.
   - Variance : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Propriété : $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
   - Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Propriété : $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.

Exercices

Niveau (Applications directes, arbres simples)

1. On donne $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
2. On donne $P(A) = 0,6$ et $P_A(B) = 0,3$. Calculer $P(A \cap B)$.
3. Dans un arbre, une branche vers A a une probabilité $0,7$. De A partent deux branches vers B et $\overline{B}$. Sachant que $P_A(B) = 0,4$, donner $P_A(\overline{B})$.
4. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note R : « la carte est un Roi » et C : « la carte est un Cœur ». R et C sont-ils indépendants ?
5. Soit une variable aléatoire X dont la loi est donnée par : | x_i | -2 | 0 | 3 | |—|—|—|—| | $P(X = x_i)$ | 0,3 | 0,5 | p | Déterminer p, puis calculer $E(X)$.
6. On donne $E(X) = 5$ et $V(X) = 4$. Soit $Y = 3X - 2$. Calculer $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.
7. Un sac contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire successivement deux boules sans remise. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules blanches.
8. Un QCM comporte 4 choix dont un seul est correct. Un candidat répond au hasard. Quelle est la probabilité qu'il trouve la bonne réponse sachant qu'il a déjà éliminé deux réponses fausses ?

Niveau (Arbres complets, Bayes et variables aléatoires)

9. Dans une usine textile, trois machines M_1, M_2, M_3 produisent respectivement 50 %, 30 % et 20 % des vêtements. Le taux de défauts est de 3 % pour M_1, 4 % pour M_2 et 5 % pour M_3.
   a) Calculer la probabilité qu'un vêtement choisi au hasard soit défectueux.
   b) Un vêtement est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provienne de la machine M_1 ?
10. Démontrer que si A et B sont deux événements indépendants, alors les événements A et $\overline{B}$ sont également indépendants.
11. On lance une pièce équilibrée 3 fois de suite. Soit X le nombre de « Face » obtenus.
    a) Déterminer les valeurs possibles de X et établir sa loi de probabilité.
    b) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
12. Un jeu payant coûte 2 € la partie. On lance un dé équilibré :
    - Si le résultat est pair, on gagne 3 € (gain net : $+1$ €).
    - Si le résultat est 5, on gagne 6 € (gain net : $+4$ €).
    - Sinon, on ne gagne rien (gain net : -2 €). Le jeu est-il équitable ?
13. On lance deux dés cubiques. On note A : « le premier dé donne un chiffre pair » et B : « la somme des deux dés est impaire ». Montrer que A et B sont indépendants.
14. Dans une population, 60 % des personnes sont vaccinées contre la grippe. L'efficacité du vaccin est de 80 % (la probabilité d'attraper la grippe en étant vacciné est 5 fois plus faible). Le taux de grippe chez les non-vaccinés est de 25 %.
    a) Calculer le taux global de malades dans la population.
    b) Une personne attrape la grippe. Quelle est la probabilité qu'elle soit vaccinée ?
15. Soit une variable aléatoire X telle que $E(X) = 10$ et $E(X^2) = 116$. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.
16. Simulation Python : Écrire un script simulant 10 000 parties du jeu de l'exercice 12 et calculant la moyenne empirique des gains pour vérifier l'espérance théorique.

Niveau (Défis et problèmes ouverts)

17. **Le paradoxe des deux enfants (Lewis Carroll / Martin Gardner) :** Une famille a deux enfants. On suppose que chaque enfant a une chance sur deux d'être une fille ou un garçon, de façon indépendante.
    a) On sait que l'aîné est une fille. Quelle est la probabilité que les deux enfants soient des filles ?
    b) On sait qu'au moins l'un des deux enfants est une fille. Quelle est la probabilité que les deux enfants soient des filles ? Expliquer le paradoxe.

18. **Le problème de Monty Hall (le jeu télévisé des trois portes) :** Dans un jeu télévisé, trois portes fermées A, B, C vous font face. Derrière l'une se trouve une voiture de luxe ; derrière les deux autres, des chèvres.
    17. Vous choisissez la porte A.
    18. L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre une des deux autres portes (par exemple la porte B) et dévoile une chèvre.
    19. Il vous demande alors : *« Souhaitez-vous garder la porte A ou changer pour la porte C ? »* En utilisant les probabilités conditionnelles, prouver rigoureusement pourquoi il faut absolument changer de porte pour doubler ses chances de gagner !
19. **La ruine du joueur :** Un joueur possède 2 € et joue à pile ou face contre la banque avec une pièce équilibrée. À chaque lancer, il gagne 1 € avec probabilité 0,5 ou perd 1 € avec probabilité 0,5. Le jeu s'arrête s'il atteint 4 € (victoire) ou s'il tombe à 0 € (ruine). Calculer la probabilité de ruine du joueur en posant un système d'équations de récurrence sur les probabilités conditionnelles.
20. **Loi géométrique tronquée :** On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6, avec un arrêt forcé au bout de 4 lancers maximum. Soit X le nombre de lancers effectués.
    a) Donner la loi de probabilité de X.
    b) Calculer l'espérance $E(X)$.

Solutions

1. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$. $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \cap B)$. Oui, les événements sont indépendants !

2. $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$.

3. Somme des branches d'un nœud égale à 1 : $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

4. $P(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$. $P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. $R \cap C$ est le Roi de Cœur : $P(R \cap C) = \frac{1}{32}$. Or $P(R) \times P(C) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$. Les deux événements sont indépendants.

5. Somme des probabilités = 1 : $0,3 + 0,5 + p = 1 \Longrightarrow p = 0,2$. $E(X) = (-2 \times 0,3) + (0 \times 0,5) + (3 \times 0,2) = -0,6 + 0 + 0,6 = 0$.

6. $E(Y) = 3E(X) - 2 = 3(5) - 2 = 13$. $V(Y) = 3^2 V(X) = 9 \times 4 = 36$. $\sigma(Y) = \sqrt{36} = 6$ (ou $|3| \times \sqrt{4} = 3 \times 2 = 6$).

7. $P(B_1) = \frac{3}{5}$. Sachant qu'une blanche a été tirée, il reste 2 blanches sur 4 boules : $P_{B_1}(B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. $P(B_1 \cap B_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 0,30$.

8. L'univers est réduit aux deux choix restants, un seul étant le bon : $P = \frac{1}{2} = 50\,\%$.

9. a) Probabilités totales : $P(D) = P(M_1)P_{M_1}(D) + P(M_2)P_{M_2}(D) + P(M_3)P_{M_3}(D)$ $P(D) = (0,50 \times 0,03) + (0,30 \times 0,04) + (0,20 \times 0,05) = 0,015 + 0,012 + 0,010 = 0,037 = 3,7\,\%$. b) Bayes : $P_D(M_1) = \frac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,015}{0,037} = \frac{15}{37} \approx 0,4054 = 40,54\,\%$.

10. D'après la formule des probabilités totales : $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$. Donc $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$. Comme A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Substituons : $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$. L'égalité prouve que A et $\overline{B}$ sont indépendants.

11. a) $X \in \{0, 1, 2, 3\}$. Il y a $2^3 = 8$ issues équiprobables.

- $P(X = 0) = P(\{PPP\}) = \frac{1}{8}$
- $P(X = 1) = P(\{FPP, PFP, PPF\}) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 2) = P(\{FFP, FPF, PFF\}) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 3) = P(\{FFF\}) = \frac{1}{8}$

b) $E(X) = 0(\frac{1}{8}) + 1(\frac{3}{8}) + 2(\frac{3}{8}) + 3(\frac{1}{8}) = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = 1,5$. $E(X^2) = 0^2(\frac{1}{8}) + 1^2(\frac{3}{8}) + 2^2(\frac{3}{8}) + 3^2(\frac{1}{8}) = \frac{0+3+12+9}{8} = \frac{24}{8} = 3$. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 3 - (1,5)^2 = 3 - 2,25 = 0,75 = \frac{3}{4}$.

12. Notons G le gain net : $G \in \{+1; +4; -2\}$. - Résultats pairs : $\{2, 4, 6\} \Longrightarrow P(G = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. - Résultat 5 : $\{5\} \Longrightarrow P(G = 4) = \frac{1}{6}$. - Autres (1 et 3) : $\{1, 3\} \Longrightarrow P(G = -2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Espérance : $E(G) = \left(1 \times \frac{3}{6}\right) + \left(4 \times \frac{1}{6}\right) + \left(-2 \times \frac{2}{6}\right) = \frac{3+4-4}{6} = \frac{3}{6} = +0,50$ €. Le jeu n'est pas équitable ($E(G) \neq 0$) : il est favorable au joueur qui gagne en moyenne 50 centimes par partie.

13. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Pour la somme impaire : elle est impaire si un dé est pair et l'autre impair. Il y a 18 issues sur 36, donc $P(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$. $A \cap B$: le 1er dé est pair ET la somme est impaire, ce qui équivaut à : 1er dé pair ET 2nd dé impair. Il y a $3 \times 3 = 9$ issues sur 36. Donc $P(A \cap B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. Comme $P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$, les événements sont indépendants.

14. a) $P(V) = 0,60$ et $P(\overline{V}) = 0,40$. Taux chez non-vaccinés : $P_{\overline{V}}(M) = 0,25$. Taux chez vaccinés : 5 fois plus faible $\Longrightarrow P_V(M) = \frac{0,25}{5} = 0,05$. $P(M) = P(V)P_V(M) + P(\overline{V})P_{\overline{V}}(M) = (0,60 \times 0,05) + (0,40 \times 0,25) = 0,03 + 0,10 = 0,13 = 13\,\%$. b) Bayes : $P_M(V) = \frac{P(V \cap M)}{P(M)} = \frac{0,03}{0,13} = \frac{3}{13} \approx 23,08\,\%$. (La grande majorité des malades, soit près de 77 %, sont non-vaccinés).

15. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 116 - 10^2 = 116 - 100 = 16$. $\sigma(X) = \sqrt{16} = 4$.

16.

```python
import random


def simuler_jeu(nb_parties=10000):
  gains = []
  for _ in range(nb_parties):
    de = random.randint(1, 6)
    if de in [2, 4, 6]:
      gain = 1  # 3 - 2
    elif de == 5:
      gain = 4  # 6 - 2
    else:
      gain = -2  # 0 - 2
    gains.append(gain)
  moyenne = sum(gains) / nb_parties
  print(f"Moyenne simulée : {moyenne:.4f} € (Théorie : 0.5000 €)")


simuler_jeu()
```

17. L'univers des familles de 2 enfants est $\Omega = \{(G,G),(G,F),(F,G),(F,F)\}$, avec 4 issues équiprobables (1er enfant, 2nd enfant). a) L'événement « l'aîné est une fille » est $A = \{(F,G),(F,F)\}$. Dans cet univers réduit à 2 éléments, la probabilité que les deux soient des filles est $\frac{1}{2} = 50\,\%$. b) L'événement « au moins un enfant est une fille » est $B = \{(G,F),(F,G),(F,F)\}$. Cet univers réduit compte **3 éléments**. Un seul correspond à deux filles : (F,F). La probabilité est donc $\frac{1}{3} \approx 33,3\,\%$! Le paradoxe vient du fait que « au moins une fille » apporte moins d'information que « l'aîné est une fille » : l'ordre n'est pas spécifié.

18. - Lorsque vous choisissez la porte A au début, vous avez $P(\text{Voiture en } A) = \frac{1}{3}$. La probabilité que la voiture soit derrière l'une des deux autres portes (B ou C) est de $\frac{2}{3}$.

- L'animateur ouvre alors délibérément une porte avec une chèvre parmi B et C. Il ne choisit pas au hasard : il élimine la mauvaise porte.
- La probabilité $\frac{2}{3}$ qui pesait sur le bloc $\{B, C\}$ se concentre désormais **entièrement sur la porte restante C** !
- Si vous gardez A, votre probabilité de gagner reste de $\frac{1}{3}$.
- Si vous changez pour C, votre probabilité de gagner passe à $\frac{2}{3}$.

Il faut donc changer de porte : cela double vos chances !

19. Notons p_k la probabilité de se ruiner en partant d'une fortune de k euros (pour $k \in \{0,1,2,3,4\}$). Par hypothèse : $p_0 = 1$ (déjà ruiné) et $p_4 = 0$ (victoire atteinte). Pour $k \in \{1,2,3\}$, après un lancer : $p_k = 0,5p_{k+1} + 0,5p_{k-1} \Leftrightarrow 2p_k = p_{k+1} + p_{k-1} \Leftrightarrow p_{k+1} - p_k = p_k - p_{k-1}$. La suite (p_k) est donc arithmétique ! Comme $p_0 = 1$ et $p_4 = 0$, la raison est $r = \frac{0-1}{4} = -0,25$. Donc $p_1 = 0,75$, $p_2 = 0,50$, $p_3 = 0,25$. En partant avec 2 €, la probabilité de ruine est exactement $p_2 = 0,50 = 50\,\%$.

20. a) Le succès (obtenir 6) a une probabilité $p = \frac{1}{6}$, l'échec a une probabilité $q = \frac{5}{6}$.

- $P(X = 1) = \frac{1}{6}$.

- $P(X=2) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$.
- $P(X=3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$.
- $P(X=4)$: on s'arrête au 4e lancer qu'on ait obtenu un 6 ou non, ce qui correspond à avoir échoué les 3 premiers lancers : $P(X=4) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

Vérification : $\frac{36+30+25+125}{216} = \frac{216}{216} = 1$. b) $E(X) = 1\left(\frac{36}{216}\right) + 2\left(\frac{30}{216}\right) + 3\left(\frac{25}{216}\right) + 4\left(\frac{125}{216}\right) = \frac{36+60+75+500}{216} = \frac{671}{216} \approx 3,106$ lancers.

La question qui ouvre la suite

Nous voici parvenus au terme du Volume V. De la corde de halage au cabinet du médecin, nous avons appris à manier les vecteurs, à mesurer les pentes instantanées avec les dérivées, à décrire la prolifération exponentielle et à dompter le hasard. Mais regarde bien la route qui monte vers le sommet : que se passe-t-il si l'on répète une expérience non pas 4 fois, mais une infinité de fois ? Comment prouver une vérité pour tous les entiers d'un coup grâce à la **récurrence** ? Comment calculer l'aire d'une surface courbée en empilant une infinité de tranches d'eau ? C'est le royaume ultime du **Volume VI : L'Âge du Flux et de la Vitesse**, qui t'attend dès le prochain chapitre !

VOLUME VI — L'INFINI APPRIVOISÉ ET L'ÉDIFICE MODERNE

17 - 18 ans / Terminale & Maths Expertes

L'apogée de l'enseignement secondaire : calcul intégral, équations différentielles, nombres complexes, matrices, graphes et lois continues.

Chapitres du Volume VI :

Chapitre 43 : L'Escalier sans Fin et les Dominos
Chapitre 44 : Le Coureur qui ne Touche jamais la Ligne
Chapitre 45 : L'Horizon des Courbes
Chapitre 46 : Le Fil sans Coupure
Chapitre 47 : Le Jardin qui Grandit et la Chaîne d'Engrenages
Chapitre 48 : Le Logarithme de Napier et les Tables des Navigateurs
Chapitre 49 : La Balançoire et les Fonctions qui Ondulent
Chapitre 50 : Le Tonneau Rempli de Tranches d'Eau
Chapitre 51 : La Tasse de Thé qui Refroidit
Chapitre 52 : La Cathédrale dans l'Espace
Chapitre 53 : Le Cadenas à Code et les Façons de Choisir
Chapitre 54 : Les Mille Lancers de la Pièce
Chapitre 55 : Le Tourbillon à Angle Droit
Chapitre 56 : Les Messages Secrets et l'Horloge des Restes
Chapitre 57 : Le Métier Jacquard Revisité : Matrices et Graphes
Chapitre 58 : La Fin du Voyage

En regard : La morphogenèse de Turing et les automates cellulaires du Cône Textile (Conus textile).

CHAPITRE 43 : L'Escalier sans Fin et les Dominos

> « Pour gravir un escalier infini, il n'est pas nécessaire de voir la dernière marche. Il suffit d'être certain de deux choses : que l'on peut poser le pied sur la première, et que de n'importe quelle marche on sait toujours monter à la suivante. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi **vérifier** une propriété sur 10, 100 ou même un milliard d'exemples ne **prouve** rien, et comment des conjectures « évidentes » se sont effondrées.
- Le **raisonnement par récurrence** : une machine logique à trois temps (**initialisation**, **hérédité**, **conclusion**) qui permet de démontrer une infinité d'énoncés en un nombre fini de lignes.
- Comment **rédiger** une récurrence impeccable, comme on l'attend au baccalauréat.
- La célèbre **inégalité de Bernoulli** $(1+a)^n \geq 1+na$, première démonstration exigible de l'année, qui servira dès le chapitre suivant.
- Les **pièges** : la récurrence sans initialisation, l'hérédité qui casse à un seul endroit (le paradoxe des chevaux), la récurrence « qui ne passe pas » et comment la renforcer.

---

1. Le problème : le piège des exemples

1.1 Les nombres impairs et les carrés

Prends des cailloux et dispose-les en carrés emboîtés, comme le faisaient les pythagoriciens sur le sable :



Fig. 97. – Le principe de récurrence : l'effet domino mathématique

Chaque nouvelle « équerre » de cailloux (on l'appelait un **gnomon**) ajoute le nombre impair suivant, et le carré grandit d'un rang. On conjecture :

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2.$$

On vérifie pour $n = 1, 2, 3, 4, 5\ldots$ ça marche toujours. Mais **est-ce vrai pour tout n** ? Pour $n = 10^{100}$? Personne ne fera jamais le calcul. Le dessin nous convainc, mais un dessin ne montre que quelques cas.

1.2 Le polynôme d'Euler qui fabriquait des nombres premiers

En 1772, Leonhard Euler remarque le polynôme $p(n) = n^2 + n + 41$. Calculons :

n	0	1	2	3	4	5	10	20	39
$p(n)$	41	43	47	53	61	71	151	461	1601

Tous ces nombres sont **premiers** ! On peut vérifier les 40 valeurs de $n = 0$ à $n = 39$: aucune exception. Quarante succès d'affilée… Un esprit pressé conclurait : « $n^2 + n + 41$ est toujours premier ». Et pourtant :

$$p(40) = 40^2 + 40 + 41 = 1600 + 81 = 1681 = 41 \times 41.$$

Raté. Et $p(41) = 41^2 + 41 + 41 = 41 \times 43$ n'est pas premier non plus.

1.3 Les cercles et les régions

Place n points sur un cercle, relie-les tous deux à deux par des cordes (en évitant que trois cordes se croisent au même point), et compte les régions découpées dans le disque :

Nombre de points n	1	2	3	4	5	6
Nombre de régions	1	2	4	8	16	**31**

Tout le monde parie sur 32 pour $n = 6$: la suite des puissances de 2 semble évidente. Mais en dessinant avec soin, on trouve **31**. La véritable formule est $\binom{n}{4} + \binom{n}{2} + 1$, qui n'a rien à voir avec 2^{n-1}.

1.4 La crise

Ces trois exemples posent un problème profond. En mathématiques, on veut des énoncés **pour tout entier naturel n** : une infinité de cas. Or :

- vérifier des cas, même très nombreux, ne prouve rien (Euler, cercles) ;
- un dessin convaincant reste un dessin de quelques cas (les gnomons).

Il nous faut un outil qui **traite d'un seul coup l'infinité des entiers**. Cet outil, c'est le raisonnement par récurrence.

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Certaines conjectures résistent bien plus longtemps. La conjecture de Pólya (1919) sur les entiers ayant « plus de facteurs premiers en nombre impair que pair » a été vérifiée jusqu'à des centaines de millions avant qu'on trouve un contre-exemple, en 1958 ; le plus petit contre-exemple est $906\,150\,257$. Aucun ordinateur n'aurait suffi à « prouver » cette conjecture par vérification — et heureusement, puisqu'elle était fausse.

---

2. L'idée : les dominos et l'escalier

2.1 Le geste

Aligne une très longue rangée de dominos debout. Pour être sûr qu'ils tombent **tous**, de quoi as-tu besoin ?

1. **Que le premier tombe** : tu le pousses du doigt.
2. **Que chaque domino, s'il tombe, fasse tomber le suivant** : ils sont assez proches les uns des autres.

Remarque bien : la condition 2 ne dit **pas** que les dominos tombent. Elle dit seulement : « *si* celui-ci tombe, *alors* le suivant tombe ». C'est une **implication**, une promesse de transmission.

Si l'une des deux conditions manque, tout s'écroule… ou plutôt rien ne s'écroule :

- sans la poussée initiale, les dominos peuvent être parfaitement espacés, aucun ne bouge ;
- si un seul écart est trop grand (entre le 40e et le 41e, disons), la chaîne s'arrête là.

L'escalier offre la même image : pour gravir **toutes** les marches d'un escalier sans fin, il suffit de savoir monter sur la première marche, et de savoir passer de n'importe quelle marche à la suivante.

2.2 Les notations

Avant d'énoncer le principe, précisons le vocabulaire.

- $\mathbb{N}$ (lire « N », l'ensemble des **entiers naturels**) $= \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$. La lettre double, dite « gras de tableau », a été popularisée au XXe siècle par le groupe Bourbaki ; le N vient de « naturel ».
- On note $\mathcal{P}(n)$ (lire « P de n ») une **propriété** qui dépend de l'entier n : c'est une **phrase** qui peut être vraie ou fausse selon la valeur de n. Par exemple $\mathcal{P}(n)$: « $1 + 3 + \ldots + (2n - 1) = n^2$ ». Attention : $\mathcal{P}(n)$ n'est **pas un nombre**, c'est un énoncé. On ne l'additionne pas, on ne le multiplie pas : on dit qu'il est vrai ou faux.

- Le symbole $\Rightarrow$ (lire « implique » ou « entraîne ») : $A \Rightarrow B$ signifie « si A est vrai, alors B est vrai ».
- n_0 (lire « n zéro ») désigne le **rang de départ**, souvent 0 ou 1, parfois plus grand.
- Le symbole $\forall$ (lire « pour tout ») est un A renversé, pour l'allemand *alle* ou l'anglais *all* ; il a été introduit par Gerhard Gentzen en 1935.

2.3 Le principe

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Principe de récurrence.** Soit $\mathcal{P}(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n, et n_0 un entier naturel. Si : 1. **Initialisation** : $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie ; 2. **Hérédité** : pour tout entier $n \geq n_0$, si $\mathcal{P}(n)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie ;

alors **(conclusion)** $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

L'hypothèse « $\mathcal{P}(n)$ est vraie », que l'on utilise dans l'étape d'hérédité, s'appelle l'**hypothèse de récurrence** (souvent abrégée « HR »).

Pourquoi ce principe est-il vrai ? On peut le voir comme une propriété fondamentale des entiers naturels : on obtient tous les entiers en partant de 0 et en ajoutant 1 autant de fois qu'il le faut. Si la propriété « se propage » de chaque entier au suivant, et qu'elle est vraie au départ, aucun entier ne peut lui échapper. On peut aussi raisonner par l'absurde : s'il existait des entiers $n \geq n_0$ pour lesquels $\mathcal{P}(n)$ est fausse, il y en aurait un **plus petit**, disons m. Ce n'est pas n_0 (initialisation). Donc $m - 1 \geq n_0$, et $\mathcal{P}(m-1)$ est vraie puisque m est le plus petit contre-exemple. Mais alors l'hérédité donne $\mathcal{P}(m)$ vraie : contradiction. Au XIX^{e} siècle, Giuseppe Peano fera de ce principe l'un des **axiomes** qui définissent les entiers naturels (1889).

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie —** On trouve des raisonnements de ce type chez le mathématicien persan **Al-Karaji** (vers l'an 1000), qui l'utilise pour la formule du binôme et la somme des cubes, puis chez **Francesco Maurolico**, qui en 1575 démontre ainsi que la somme des n premiers nombres impairs vaut n^2 — exactement notre problème des gnomons ! Mais c'est **Blaise Pascal**, dans son *Traité du triangle arithmétique* (1654), qui en donne la première formulation explicite en deux temps : il démontre une propriété « pour la première base », puis montre que « si elle se trouve dans une base quelconque, elle se trouvera nécessairement dans la suivante ». Le nom d'« induction mathématique » est dû à Augustus De Morgan (1838) ; en France, on dit **récurrence**, du latin *recurrere*, « courir en arrière » : pour atteindre $n+1$, on revient à n.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! —** L'hérédité **ne suppose pas** que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout n (ce serait supposer ce qu'on veut démontrer !). Elle consiste à **fixer** un entier $n \geq n_0$ quelconque, à **supposer** que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour cet entier-là, et à **en déduire** que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. On démontre une implication, pas une vérité.

⚠ ⚠ Le piège mortel de la rupture d'indice : le paradoxe des chevaux de Pólya

L'analogie de la chute des dominos est séduisante, mais elle recèle un piège redoutable : l'implication d'hérédité $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ doit impérativement être démontrée **pour tout entier $n \geq n_0$ sans la moindre rupture**. Pour illustrer ce danger, le mathématicien George Pólya a forgé une démonstration fallacieuse prouvant que « tous les chevaux sont de la même couleur » :

- **Initialisation :** Dans tout ensemble composé d'un seul cheval ($n = 1$), tous les chevaux ont manifestement la même couleur. $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
- **Fausse hérédité :** Supposons la propriété vraie pour tout troupeau de n chevaux. Prenons un groupe de $n+1$ chevaux $\{C_1, C_2, ..., C_{n+1}\}$. Par hypothèse, les n premiers $\{C_1, ..., C_n\}$ ont la même couleur, et les n derniers $\{C_2, ..., C_{n+1}\}$ ont aussi la même couleur. Comme les deux sous-groupes partagent les chevaux intermédiaires $\{C_2, ..., C_n\}$, on en déduirait que tous les $n+1$ chevaux ont la même teinte.
- **Où se cache l'erreur ?** L'argument d'intersection s'effondre lamentablement pour $n = 1$! Entre le groupe formé de $\{C_1\}$ et celui de $\{C_2\}$, l'intersection des chevaux intermédiaires est **vide**. L'implication $\mathcal{P}(1) \Rightarrow \mathcal{P}(2)$ est donc fausse. La chaîne s'arrête net dès le départ !

Retenez cette règle d'or : une récurrence exige une passerelle sans faille dès l'indice de départ n_0.

3. La méthode : rédiger une récurrence

Méthode — Rédaction type au baccalauréat.

Pour tout entier naturel $n \geq n_0$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « … ».

Initialisation. Pour $n = n_0$: on calcule séparément chaque membre et on constate que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq n_0$ un entier fixé. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie (hypothèse de récurrence) et on montre que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire que « … » (on écrit explicitement l'énoncé au rang $n+1$: c'est **le but**). [Calculs utilisant l'hypothèse de récurrence, en signalant où elle sert.] Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang n_0 et héréditaire à partir de ce rang ; par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Trois conseils d'expert : 1. **Écris le but** (l'énoncé au rang $n+1$) avant de calculer : tu sais où tu vas. 2. **Pars du membre au rang $n+1$** et fais-y apparaître le membre au rang n pour pouvoir utiliser l'hypothèse. 3. **Signale l'utilisation de l'hypothèse** (« d'après l'hypothèse de récurrence… ») : c'est l'endroit où le correcteur regarde en premier. Une hérédité qui n'utilise jamais l'hypothèse de récurrence est presque toujours suspecte.

---

4. Exemples résolus

Exemple résolu 1 — Les gnomons de Pythagore

Énoncé. Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$: $1 + 3 + 5 + ... + (2n-1) = n^2$.

Notation. On écrit aussi cette somme $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$. Le symbole $\sum$ (lire « somme ») est la lettre grecque **sigma majuscule**, notre S de « somme » ; Euler l'utilise dès 1755. On lit : « somme pour k allant de 1 à n de $2k-1$ ». La lettre k est **muette** : elle parcourt les valeurs $1, 2, ..., n$ et disparaît du résultat.

Solution. Pour $n \geq 1$, soit $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: la somme ne contient qu'un terme, $2 \times 1 - 1 = 1$, et $1^2 = 1$. $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ fixé ; on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie. But : $\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1) = (n+1)^2$.

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n}(2k-1)}_{=n^2 \text{ par HR}} + \big(\, 2(n+1) - 1 \,\big) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

Remarque : l'hérédité est **exactement** le geste du gnomon : ajouter l'équerre de $2n+1$ cailloux transforme le carré $n \times n$ en carré $(n+1) \times (n+1)$. La récurrence est la version rigoureuse du dessin.

Exemple résolu 2 — La somme de Gauss

Énoncé. Démontrer que pour tout $n \geq 1$: $1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Solution. Soit $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. $n = 1$: à gauche 1, à droite $\frac{1\times 2}{2} = 1$. Vrai.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq 1$ fixé. But : $\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

On a factorisé par $(n+1)$: c'est le réflexe qui fait apparaître la forme voulue.

Conclusion. $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Le jeune Carl Friedrich Gauss aurait trouvé cette somme pour $n = 100$ à l'école, en associant $1 + 100$, $2 + 99$, … : 50 paires de 101, soit 5050. Sa méthode **trouve** la formule ; la récurrence la **vérifie**. Les deux démarches sont complémentaires : la récurrence est très efficace pour démontrer une formule, mais elle ne la devine pas.

Exemple résolu 3 — La somme des carrés

Énoncé. Démontrer que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Solution. *Initialisation.* $n = 1$: $1^2 = 1$ et $\frac{1\times 2\times 3}{6} = 1$. Vrai.

Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n. But : $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\big[\, n(2n+1) + 6(n+1)\big]}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6}.$$

Or $(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6 = 2n^2 + 7n + 6$. Donc la somme vaut $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$: c'est le but.

Conclusion. La formule est vraie pour tout $n \geq 1$.

Vérification numérique : pour $n = 3$, $1 + 4 + 9 = 14$ et $\frac{3\times 4\times 7}{6} = 14$. ✓

Exemple résolu 4 — Une suite définie par récurrence

Énoncé. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Calculer les premiers termes, conjecturer une formule explicite et la démontrer.

Rappel de notation (chapitre 36) : (u_n) désigne la suite tout entière, u_n (lire « u indice n ») son terme de rang n. La relation $u_{n+1} = 2u_n + 3$ est une **relation de récurrence** : chaque terme se calcule à partir du précédent. Le mot « récurrence » désigne donc à la fois une façon de *définir* une suite et une façon de *démontrer* : ce n'est pas un hasard, les deux reposent sur le même « pas à pas ».

Recherche. $u_0 = 1$, $u_1 = 5$, $u_2 = 13$, $u_3 = 29$, $u_4 = 61$. On remarque que $u_n + 3$ vaut $4, 8, 16, 32, 64$: ce sont les 4×2^n. Conjecture : $u_n = 4 \times 2^n - 3 = 2^{n+2} - 3$.

Démonstration. Soit $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = 2^{n+2} - 3$ ».

Initialisation. $2^{0+2} - 3 = 4 - 3 = 1 = u_0$. Vrai.

Hérédité. Supposons $u_n = 2^{n+2} - 3$ pour un n fixé. But : $u_{n+1} = 2^{n+3} - 3$.

$$u_{n+1} = 2u_n + 3 = 2\big(2^{n+2} - 3\big) + 3 = 2^{n+3} - 6 + 3 = 2^{n+3} - 3.$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+2} - 3$.

Exemple résolu 5 — Un résultat de divisibilité

Énoncé. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n - 1$ est divisible par 3.

Rappel. « a est divisible par 3 » signifie : il existe un entier k tel que $a = 3k$.

Solution. Soit $\mathcal{P}(n)$: « il existe un entier k tel que $4^n - 1 = 3k$ ».

Initialisation. $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. Vrai.

Hérédité. Supposons qu'il existe un entier k tel que $4^n - 1 = 3k$, c'est-à-dire $4^n = 3k + 1$. Alors

$$4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k + 1),$$

et $4k + 1$ est un entier. Donc $4^{n+1} - 1$ est divisible par 3.

Conclusion. Pour tout n, 3 divise $4^n - 1$.

L'astuce consiste à **traduire l'hypothèse en égalité** ($4^n = 3k + 1$) pour pouvoir la réinjecter dans un calcul.

Exemple résolu 6 — L'inégalité de Bernoulli (démonstration exigible)

> **📐 Propriété — Inégalité de Bernoulli.**
>
> Pour tout réel $a > -1$ (en particulier pour tout $a > 0$) et pour tout entier naturel n :
>
> $$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Sens concret. Place une somme à intérêts composés au taux a (par exemple $a = 0,05$ pour 5 %) : au bout de n années, le capital est multiplié par $(1 + a)^n$. Avec des intérêts simples, il serait multiplié par $1 + na$. Bernoulli affirme que **les intérêts composés rapportent toujours au moins autant que les intérêts simples** : normal, on gagne aussi des intérêts sur les intérêts.

> **✍️ Démonstration.**
>
> Soit $a > -1$ fixé. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $\mathcal{P}(n)$: « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ».
>
> *Initialisation.* $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a bien $1 \geq 1$.
>
> *Hérédité.* Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé ; on suppose $(1 + a)^n \geq 1 + na$. But : $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$. On multiplie les deux membres de l'hypothèse par $1 + a$, qui est **strictement positif** puisque $a > -1$; le sens de l'inégalité est conservé :
>
> $$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n(1 + a) \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2.$$
>
> Or $na^2 \geq 0$, donc $1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a$. Par transitivité, $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$.
>
> *Conclusion.* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + a)^n \geq 1 + na$. ■

Le petit carré noir ■ (ou les lettres « CQFD », *ce qu'il fallait démontrer*, du latin *quod erat demonstrandum*) marque la fin d'une démonstration ; on l'appelle parfois le « tombeau » de Halmos, du nom du mathématicien Paul Halmos qui l'a popularisé.

Où sert l'hypothèse $a > -1$? Exactement à un endroit : multiplier une inégalité par $1 + a$ sans en changer le sens. Si $1 + a$ était négatif, l'inégalité s'inverserait et la preuve s'effondrerait. Exemple : avec $a = -3$ et $n = 3$, $(1 - 3)^3 = -8$ alors que $1 + 3 \times (-3) = -8$: égalité de justesse ; avec $n = 5$, $(-2)^5 = -32 < 1 - 15 = -14$. L'inégalité est **fausse**. Une hypothèse n'est jamais décorative.

Pourquoi cette inégalité est-elle si importante ? Parce qu'elle permet de minorer une puissance (difficile à manipuler) par une expression **affine** en n (facile). Au chapitre 44, elle montrera que si $q > 1$, alors q^n devient plus grand que n'importe quel nombre : il suffit d'écrire $q = 1 + a$ avec $a > 0$, et $q^n \geq 1 + na$, qui devient aussi grand qu'on veut.

Application immédiate. À partir de quel rang a-t-on à coup sûr $1,02^n \geq 1000$? Bernoulli donne $1,02^n \geq 1 + 0,02n$, et $1 + 0,02n \geq 1000$ dès que $n \geq 49\,950$. On obtient un rang **qui convient** (pas le plus petit : en réalité $1,02^n \geq 1000$ dès $n = 349$, ce que l'on saura calculer avec le logarithme au chapitre 48). Une minoration grossière suffit souvent pour prouver qu'un rang existe.

Exemple résolu 7 — Une inégalité qui ne démarre pas tout de suite

Énoncé. Démontrer que pour tout entier $n \geq 4$: $2^n \geq n^2$.

Exploration.

n	0	1	2	3	4	5	6
2^n	1	2	4	8	16	32	64
n^2	0	1	4	**9**	16	25	36

L'inégalité est vraie pour $n = 0, 1, 2$, **fausse pour $n = 3$** ($8 < 9$), puis vraie à partir de 4. Le rang de départ $n_0 = 4$ n'est pas un caprice.

Solution. *Initialisation.* $n = 4$: $2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$. Vrai.

Hérédité. Soit $n \geq 4$; on suppose $2^n \geq n^2$. But : $2^{n+1} \geq (n+1)^2$. D'après l'hypothèse, $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n^2$. Il suffit donc de prouver que $2n^2 \geq (n+1)^2$, c'est-à-dire $2n^2 - (n^2 + 2n + 1) \geq 0$, soit $n^2 - 2n - 1 \geq 0$, soit $(n-1)^2 \geq 2$. Comme $n \geq 4$, $(n-1)^2 \geq 9 \geq 2$. Donc $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$.

Conclusion. Pour tout $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.

Leçon. On a utilisé $n \geq 4$ (en fait $n \geq 3$ suffirait pour l'hérédité). L'hérédité **seule** est vraie dès $n = 3$, mais l'initialisation à $n = 3$ est fausse : c'est pour cela qu'il faut démarrer à 4.

Exemple résolu 8 — Une suite croissante et bornée

Énoncé. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

Idée. Posons $f(x) = \sqrt{2+x}$ sur $[-2; +\infty[$, de sorte que $u_{n+1} = f(u_n)$. La fonction f est **croissante** (composée de $x \mapsto 2 + x$ croissante et de la racine carrée croissante) : elle **conserve l'ordre**. C'est l'outil-clé.

Solution. Soit $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ ».

Initialisation. $u_0 = 1$ et $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,732$. On a bien $0 \leq 1 \leq \sqrt{3} \leq 2$. Vrai.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. Comme f est croissante sur $[0; 2]$, on peut l'appliquer aux quatre membres sans changer l'ordre :

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(2), \quad \text{soit} \quad \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2.$$

Comme $0 \leq \sqrt{2}$, on obtient $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$: c'est $\mathcal{P}(n+1)$.

Conclusion. Pour tout n, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. La suite est donc **croissante** et **majorée par 2**.

Cette technique — appliquer une fonction croissante à un encadrement — est l'une des plus utilisées au baccalauréat. Retiens-la. Et garde cette suite en mémoire : u_n monte, sans jamais dépasser 2… s'approche-t-elle de 2 ? Rendez-vous au chapitre 44.

Exemple résolu 9 — Les dérivées successives

Énoncé. Soit $f(x) = x\,e^x$ sur $\mathbb{R}$. On note $f^{(n)}$ la **dérivée n-ième** de f (on dérive n fois ; $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$). Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $f^{(n)}(x) = (x + n)\,e^x$.

Notation. Les parenthèses dans $f^{(n)}$ sont indispensables : f^n pourrait signifier « f à la puissance n » ou « f composée n fois ». Lagrange avait introduit les primes f', f'', f''', mais au-delà de trois primes, on passe aux chiffres entre parenthèses.

Solution. *Initialisation.* $f^{(0)}(x) = f(x) = xe^x = (x+0)e^x$. Vrai.

Hérédité. Supposons $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$ pour tout réel x. Alors $f^{(n+1)}$ est la dérivée de $f^{(n)}$; par la formule du produit $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = x + n$, $v = e^x$:

$$f^{(n+1)}(x) = 1 \times e^x + (x+n)e^x = (x + n + 1)e^x.$$

Conclusion. Pour tout n, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

CHAPITRE 44 : Le Coureur qui ne Touche jamais la Ligne

> « Achille aux pieds légers ne rattrapera jamais la tortue, disait Zénon. Car pour l'atteindre, il doit d'abord parcourir la moitié de la distance, puis la moitié du reste, puis la moitié du reste encore. Une infinité d'étapes ne peut s'achever en un temps fini. L'erreur de Zénon n'était pas dans sa vue du monde, mais dans son manque d'un outil mathématique : le concept de limite. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment le paradoxe grec de **Zénon d'Élée** a tenu tête aux penseurs pendant plus de deux millénaires, et comment la notion moderne de **limite** l'a enfin résolu.
- La **définition formelle** d'une suite convergente : l'idée intuitive d'un « tunnel » ou d'un intervalle ouvert qui emprisonne tous les termes à partir d'un certain rang, et la définition rigoureuse de la divergence vers $\pm\infty$.
- Les **théorèmes de comparaison** et le fameux **théorème d'encadrement des gendarmes**.
- Le **théorème de convergence des suites monotones bornées** : savoir qu'une suite converge avant même de connaître sa limite.
- Le comportement complet des **suites géométriques** q^n, démontré grâce à l'inégalité de Bernoulli (démonstration exigible au baccalauréat).
- L'**algorithme de seuil en Python** pour trouver quand une suite franchit une barrière fixée.

---

1. Le problème : Achille, la tortue et le stade infini

1.1 Le paradoxe de la dichotomie

Cinq siècles avant notre ère, dans la cité grecque d'Élée au sud de l'Italie, le philosophe **Zénon** propose une série d'énigmes troublantes destinées à montrer que le mouvement est une illusion de nos sens.

Considère un coureur qui s'élance sur une piste de 100 mètres. Avant de franchir la ligne d'arrivée, il doit impérativement atteindre la moitié de la course : $50\ \text{m}$. Une fois aux $50\ \text{m}$, il lui reste $50\ \text{m}$ à courir ; il doit d'abord atteindre la moitié de ce reste, soit $75\ \text{m}$. Aux $75\ \text{m}$, il doit parcourir la moitié du quart restant, soit atteindre $87,5\ \text{m}$…



Fig. 98. – Le paradoxe de Zénon : somme convergente de la série géométrique d'Achille et de la tortue

À chaque étape n, la distance parcourue en fraction de la piste totale est :

$$u_n = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

Zénon argumente : > *« Le coureur doit accomplir une infinité d'actes successifs : franchir le 1er intervalle, puis le 2e, puis le 3e… Or, personne ne peut accomplir une infinité de tâches en un temps fini. Donc, le coureur n'atteindra jamais la ligne. Pire : il ne peut même pas s'élancer, car avant de faire un mètre, il doit faire un demi-mètre, et avant cela un quart de mètre… »*

Pourtant, dans le monde réel, n'importe quel enfant franchit les 100 mètres en quelques secondes. Où se trouve la faille du raisonnement de Zénon ?

1.2 La somme d'une infinité de morceaux

Regardons la distance totale parcourue comme une somme de tranches infiniment répétées :

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + ... + \frac{1}{2^n} + ...$$

Calculons la somme des n premiers termes (notée S_n) :

- $S_1 = \frac{1}{2} = 0,5$
- $S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$
- $S_3 = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0,875$
- $S_n = 1 - \frac{1}{2^n}$.

Plus n devient grand, plus le terme $\frac{1}{2^n}$ devient minuscule :

- pour $n = 10$, $\frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024} \approx 0,000976$;
- pour $n = 30$, $\frac{1}{2^{30}} \approx 0,00000000093$.

L'écart entre le coureur et la ligne d'arrivée ($100\ \text{m}$) devient inférieur à la taille d'un cheveu, puis à celle d'une molécule, puis à celle du noyau d'un atome. La faille de Zénon est de supposer qu'une somme d'une infinité de durées est nécessairement infinie. Mais si le coureur court à vitesse constante de $10\ \text{m/s}$:

- la première moitié prend $5\ \text{s}$;
- le quart suivant prend $2,5\ \text{s}$;
- le huitième suivant prend $1,25\ \text{s}$…

Le temps total écoulé est lui aussi la somme :

$$T = 5 + 2,5 + 1,25 + 0,625 + ... = 10\ \text{secondes}.$$

Une infinité d'intervalles de temps peuvent parfaitement totaliser une durée finie !

Pour formaliser ce saut vertigineux de l'infiniment grand sans tomber dans des pièges métaphysiques, les mathématiciens du XIXe siècle (Cauchy, Weierstrass) ont forgé un outil d'une précision chirurgicale : **la limite de suite**.

---

2. Définitions : apprivoiser l'infini

2.1 Les notations expliquées

- Une suite réelle est notée $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou simplement (u_n). La lettre n représente un entier naturel ($n = 0, 1, 2, 3...$) qui joue le rôle d'un compteur de temps discret (tic-tac d'une horloge). u_n désigne le terme de rang n.
- $\lim_{n\to+\infty} u_n = L$ se lit : « la limite de u_n quand n tend vers plus l'infini est égale à L ». L'abréviation lim vient du latin *limes*, qui désignait la frontière fortifiée de l'Empire romain.
- La flèche $\to$ se lit « tend vers ». On écrit aussi parfois $u_n \underset{n\to+\infty}{\to} L$.
- Un intervalle ouvert contenant un réel L est un intervalle de la forme $]L - \varepsilon ; L + \varepsilon[$ avec $\varepsilon > 0$ (la lettre grecque ε, « epsilon », désignant traditionnellement une marge d'erreur aussi minuscule que l'on veut).



Fig. 99. – Le théorème d'encadrement des gendarmes

2.2 Suite convergente : la définition officielle

Que signifie exactement : « quand n devient très grand, les termes u_n se rapprochent de L » ? Dire seulement « ils se rapprochent » est insuffisant. La suite $1 + \frac{1}{n}$ se rapproche de -5, mais sa limite n'est pas -5 ! Il faut qu'ils s'approchent de L **d'aussi près que l'on veut**, et qu'ils **y restent pour toujours**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Limite finie (suite convergente).** On dit qu'une suite (u_n) a pour limite le réel L lorsque : **Tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.** On écrit alors :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = L.$$

Une suite qui possède une limite réelle finie L est dite **convergente**. Dans le cas contraire, elle est dite **divergente**.

Traduction géométrique et dynamique : Imagine un jeu entre deux personnes : un *Challenger* et un *Défenseur*. 1. Le Challenger choisit un intervalle ouvert $]a; b[$ autour de L, aussi étroit et microscopique qu'il le souhaite (par exemple $]L - 0,001\,;\, L + 0,001[$). C'est la « cible ». 2. Le Défenseur doit trouver un rang entier N à partir duquel **tous** les termes suivants $u_N, u_{N+1}, u_{N+2}, \ldots$ tombent dans la cible, sans jamais plus en ressortir. Si le Défenseur a une stratégie pour gagner quel que soit l'intervalle imposé au départ, alors la suite converge vers L.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** En symboles formalisés au niveau supérieur, cela s'écrit avec les quantificateurs $\forall$ (« pour tout ») et $\exists$ (« il existe ») :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - L| < \varepsilon.$$

Au lycée, le programme officiel utilise la formulation équivalente avec les intervalles ouverts : *« pour tout intervalle ouvert I contenant L, il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \in I$ »*.

2.3 Suite divergente vers $+\infty$ ou $-\infty$

Une suite ne converge pas toujours vers un nombre. Elle peut exploser vers l'infini, ou osciller indéfiniment sans jamais se stabiliser.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Limite infinie.**

- On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A;+\infty[$ (où A est un réel arbitraire) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang :
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$
- On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $-\infty$ si tout intervalle de la forme $]-\infty;B[$ (où B est un réel arbitraire) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang :
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty.$$

Sens concret : Fixe une barre A aussi haute que tu veux (un milliard, dix milliards…). À partir d'un certain rang N, la suite dépasse cette barre et ne redescend plus jamais en dessous.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — « Divergente » ne veut pas dire « tend vers l'infini ».** Une suite divergente est simplement une suite qui **ne converge pas** vers un réel fini.

- La suite $u_n = n^2$ diverge vers $+\infty$.
- La suite $v_n = (-1)^n$ (qui vaut alternativement $+1, -1, +1, -1...$) est **divergente**, mais elle ne tend ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$! Elle reste bornée entre -1 et 1, mais n'a aucune limite.

2.4 Unicité de la limite

📐 Propriété fondamentale — Unicité.

Lorsqu'une suite (u_n) admet une limite (finie ou infinie), **cette limite est unique**. Une suite ne peut pas converger vers deux nombres distincts en même temps.

Pourquoi ? Si u_n convergeait à la fois vers L_1 et L_2 avec $L_1 \neq L_2$, on pourrait entourer L_1 et L_2 de deux petits intervalles disjoints (ne se touchant pas). À partir d'un certain rang, les termes u_n devraient se trouver simultanément dans les deux intervalles : impossible !

---

3. Les suites de référence et leurs limites

Le tableau suivant rassemble les briques fondamentales dont toutes les autres limites sont construites :

Suite u_n ($n \geq 1$)	Limite en $+\infty$	Justification intuitive
k (constante)	k	Tous les termes valent déjà k.
$\frac{1}{n}$	0	Partager 1 gâteau entre un milliard d'invités donne une miette.
$\frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{n^p}$ ($p \geq 1$)	0	Le dénominateur explose encore plus vite.
$\frac{1}{\sqrt{n}}$	0	$\sqrt{n}$ grandit vers $+\infty$, son inverse s'écrase vers 0.
n, n^2, n^p ($p \geq 1$)	$+\infty$	Les puissances d'entiers dépassent toute borne.
$\sqrt{n}$	$+\infty$	Même si elle ralentit, elle n'a aucun plafond.

---

4. Opérations sur les limites et Formes Indéterminées

Quand on additionne, multiplie ou divise deux suites qui ont des limites connues, le bon sens mathématique s'applique la plupart du temps… sauf dans quatre situations ambiguës appelées **Formes Indéterminées** (notées F.I.).

4.1 Les règles logiques directes

Si $\lim u_n = L$ et $\lim v_n = L'$ (avec $L, L' \in \mathbb{R}$) :

- **Somme :** $\lim(u_n + v_n) = L + L'$
- **Produit :** $\lim(u_n \times v_n) = L \times L'$
- **Quotient :** $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = \frac{L}{L'}$ (à condition que $L' \neq 0$).

Avec les infinis :

- Un nombre fini + l'infini donne l'infini : $5 + (+\infty) = +\infty$.
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ et $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$.
- Produit des signes : $(+\infty) \times (-\infty) = -\infty$, $(-3) \times (-\infty) = +\infty$.
- Un nombre fini divisé par l'infini donne 0 : $\frac{L}{\pm\infty} = 0$.
- Un nombre non nul divisé par un infiniment petit donne l'infini : si $u_n \to L > 0$ et $v_n \to 0$ avec $v_n > 0$, alors $\frac{u_n}{v_n} \to +\infty$.

4.2 Les quatre Formes Indéterminées (F.I.)

Une forme est dite « indéterminée » quand **la seule connaissance des limites de chaque morceau ne suffit pas pour prédire le résultat global**. Le résultat dépend de qui est « le plus fort » :

1. $\boldsymbol{\infty - \infty}$ (somme de deux infinis de signes contraires) : qui l'emporte entre le géant positif et le géant négatif ?
2. $\boldsymbol{0 \times \infty}$ (produit d'un infiniment petit et d'un infiniment grand) : écrasement vers 0 ou explosion vers l'infini ?
3. $\boldsymbol{\frac{\infty}{\infty}}$ (quotient de deux infinis) : le numérateur court-il plus vite que le dénominateur ?
4. $\boldsymbol{\frac{0}{0}}$ (quotient de deux infiniment petits).

> ⚠️ **Attention au Piège !**
>
> ⚠️ **Attention, piège ! — F.I. ne veut pas dire « pas de limite ».** « Indéterminée » ne signifie pas que le calcul est impossible ou que la limite n'existe pas ! Cela signifie simplement : *« Arrête-toi, ne conclus pas tout de suite : transforme l'expression pour lever le doute »*. La technique reine pour les polynômes et fractions est de **factoriser par le terme de plus haut degré**.

---

5. Les Théorèmes Fondamentaux

5.1 Théorèmes de comparaison

📐 Théorème de comparaison (vers l'infini).

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles qu'à partir d'un certain rang :

$$u_n \geq v_n.$$

1. Si $\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. 2. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$, alors $\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

Image mentale : Si ton ami v_n grimpe vers le ciel sans limite et que tu marches constamment sur ses épaules ($u_n \geq v_n$), tu es inévitablement propulsé vers le ciel avec lui.

5.2 Le Théorème d'Encadrement (dit « des Gendarmes »)

📐 Théorème — Théorème d'encadrement des gendarmes.

Soient (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites réelles. S'il existe un rang N à partir duquel :

$$v_n \leq u_n \leq w_n$$

et si $\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} w_n = L \in \mathbb{R}$, alors la suite (u_n) converge et sa limite est :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = L.$$

Origine du nom : Si deux gendarmes (v_n et w_n) convergent tous les deux vers le même commissariat L en tenant le suspect (u_n) encadré entre eux, le suspect n'a d'autre choix que d'entrer lui aussi dans le commissariat L.

✍️ Démonstration du théorème des gendarmes.

Soit I un intervalle ouvert quelconque contenant L. Par définition d'un intervalle ouvert, il existe un réel $\varepsilon > 0$ tel que $]L-\varepsilon\,;L+\varepsilon[\subset I$. Puisque $\lim v_n = L$, il existe un rang N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $L-\varepsilon < v_n < L+\varepsilon$. En particulier, $L-\varepsilon < v_n$. Puisque $\lim w_n = L$, il existe un rang N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $L-\varepsilon < w_n < L+\varepsilon$. En particulier, $w_n < L+\varepsilon$. De plus, par hypothèse, $v_n \leq u_n \leq w_n$ pour tout $n \geq N_0$. Posons alors $N = \max(N_0, N_1, N_2)$. Pour tout entier $n \geq N$, les trois conditions sont réunies simultanément :

$$L-\varepsilon < v_n \leq u_n \leq w_n < L+\varepsilon \Longrightarrow u_n \in]L-\varepsilon\,;L+\varepsilon[\subset I.$$

Tout intervalle ouvert contenant L contient donc tous les termes u_n à partir du rang N. La suite (u_n) converge bien vers L. ■

5.3 Théorème de convergence des suites monotones

C'est l'un des théorèmes les plus profonds de l'analyse : il permet de savoir qu'une suite converge **sans même calculer sa limite**.

📐 Théorème de convergence monotone.

1. Toute suite

croissante et majorée converge vers une limite réelle L. 2. Toute suite **décroissante et minorée** converge vers une limite réelle L.



Fig. 100. – Théorème de convergence monotone : suite croissante majorée

Rappels de vocabulaire : - Une suite est **majorée** par M si pour tout n, $u_n \leq M$. - Une suite est **minorée** par m si pour tout n, $u_n \geq m$. - Une suite est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée ($m \leq u_n \leq M$).

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Le majorant n'est pas forcément la limite !** Si une suite (u_n) croissante est majorée par 10, le théorème garantit qu'elle converge vers une limite L, et que $L \leq 10$. Mais la limite L n'est pas obligatoirement 10 ! Elle peut converger vers 2, ou vers $\sqrt{3}$, car 10 n'est qu'un plafond parmi d'autres. De plus, une suite croissante non majorée diverge toujours vers $+\infty$.

---

6. La limite des suites géométriques q^n

La suite géométrique fondamentale est définie par $u_n = q^n$ où q est un nombre réel fixé appelé la raison. Son comportement dépend de la position de q par rapport à -1 et 1.

> 📐 **Théorème — Limite de q^n.**
>
> - Si $q > 1$: $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.
> - Si $q = 1$: la suite est constante égale à 1, donc $\lim_{n\to+\infty} q^n = 1$.
> - Si $-1 < q < 1$: $\lim_{n\to+\infty} q^n = 0$.
> - Si $q \leq -1$: la suite n'a pas de limite (elle oscille en changeant de signe).

Démonstration exigible au baccalauréat (cas $q > 1$)

Cette démonstration repose directement sur l'**inégalité de Bernoulli** établie au chapitre 43 : pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$, $(1+a)^n \geq 1 + na$.

✍ Démonstration (exigible).

Soit q un réel strictement supérieur à 1. Posons $a = q - 1$. Comme $q > 1$, on a $a > 0$. On peut donc écrire : $q = 1 + a$. D'après l'inégalité de Bernoulli :

$$q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Or, comme $a > 0$, la suite affine $1 + na$ tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \to +\infty} (1 + na) = +\infty.$$

Par le théorème de comparaison (5.1), comme $q^n \geq 1 + na$ pour tout n, on en déduit immédiatement :

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = +\infty. \quad \blacksquare$$

Conséquence pour le cas $0 < q < 1$ *:* Si $0 < q < 1$, posons $q' = \frac{1}{q} > 1$. Alors $q^n = \frac{1}{(q')^n}$. Comme $(q')^n \to +\infty$, le quotient tend vers 0 : $\lim q^n = 0$. Si $-1 < q < 0$, on a $|q^n| = |q|^n \to 0$ car $0 < |q| < 1$, d'où $q^n \to 0$ par encadrement $-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$.

---

7. Algorithme de Seuil en Python

Lorsqu'une suite converge vers un nombre ou diverge vers $+\infty$, une question pratique capitale se pose pour les ingénieurs, les financiers et les scientifiques : *« À partir de quel rang n la suite dépasse-t-elle une valeur seuil donnée ? »* Puisqu'on ne connaît pas d'avance le rang d'arrêt, on utilise une boucle non bornée : la boucle `while` (tant que).

Exemple : Refroidissement d'un moteur

La température d'un moteur après n minutes suit la suite géométrique décroissante :

$$T_n = 20 + 80 \times 0,9^n.$$

Le moteur est considéré comme froid dès que sa température descend en dessous de 30° C.

```python
def seuil_temperature(seuil):
    """Calcule le nombre de minutes nécessaires pour passer sous le seuil."""
    n = 0
    T = 100.0  # T_0 = 20 + 80 = 100 °C
    while T > seuil:
        n = n + 1
        T = 20 + 80 * (0.9 ** n)
    return n

# Test pour un seuil à 30 °C
minutes = seuil_temperature(30)
print(f"Le moteur passe sous 30°C au bout de {minutes} minutes.")
# Affichera : 20 minutes (car T_19 ≈ 30.8 °C et T_20 ≈ 29.7 °C)
```

🧭 Méthode — Structure standard d'un algorithme de seuil au Bac :

1. Initialiser le compteur de rang : `n = 0`. 2. Initialiser la valeur de la suite : `u = u_0`. 3. Condition de la boucle `while` : mettre la condition **contraire** de ce que l'on cherche (on continue *tant que* le seuil n'est pas encore atteint). 4. Dans le corps de la boucle : actualiser le terme `u` et incrémenter `n = n + 1`. 5. Renvoyer `n` à la fin.

---

8. Exemples Résolus pas à pas

Exemple résolu 1 — Utiliser la définition avec un intervalle

Énoncé : Soit la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = 3 + \frac{2}{n}$. 1. Quelle est la limite conjecturée L de la suite ? 2. Déterminer un rang N à partir duquel tous les termes u_n appartiennent à l'intervalle ouvert $]2,99\,;3,01[$.

Solution : 1. Comme $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$, on a $\lim_{n\to+\infty} u_n = 3 + 2\times 0 = 3$. La limite est $L = 3$. 2. L'intervalle $]2,99\,;3,01[$ s'écrit $]3-0,01\,;3+0,01[$. On cherche pour quelles valeurs de n on a $u_n \in]2,99\,;3,01[$:

$$2,99 < 3 + \frac{2}{n} < 3,01.$$

Comme $\frac{2}{n} > 0$ pour tout $n \geq 1$, l'inégalité de gauche $2,99 < 3 + \frac{2}{n}$ est toujours vraie. Reste l'inégalité de droite :

$$3 + \frac{2}{n} < 3,01 \Leftrightarrow \frac{2}{n} < 0,01 \Leftrightarrow \frac{2}{n} < \frac{1}{100} \Leftrightarrow n > 200.$$

Puisque n est un entier, dès le rang $N = 201$, tous les termes u_n pour $n \geq 201$ sont garantis d'être dans l'intervalle $]2,99\,;3,01[$.

Exemple résolu 2 — Lever une indétermination rationnelle $\frac{\infty}{\infty}$

Énoncé : Déterminer la limite de la suite (u_n) définie pour tout $n \geq 1$ par :

$$u_n = \frac{5n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 7}.$$

Solution : - Numérateur : $\lim(5n^2 - 3n + 2) = +\infty$. - Dénominateur : $\lim(2n^2 + 7) = +\infty$.

Il s'agit d'une Forme Indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ ». *Méthode : on factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme prépondérant (n^2) :*

$$u_n = \frac{n^2\left(5 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(2 + \frac{7}{n^2}\right)}.$$

Pour $n \geq 1$, on simplifie par $n^2 \neq 0$:

$$u_n = \frac{5 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}}{2 + \frac{7}{n^2}}.$$

Or : $\lim \frac{3}{n} = 0$, $\lim \frac{2}{n^2} = 0$, donc $\lim\left(5 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right) = 5$. $\lim \frac{7}{n^2} = 0$, donc $\lim\left(2 + \frac{7}{n^2}\right) = 2$. Par quotient de limites, on conclut de manière irréfutable :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{5}{2}.$$

Exemple résolu 3 — Gendarmes et trigonométrie

Énoncé : Déterminer la limite de la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ définie par :

$$v_n = \frac{3 + (-1)^n \cos(n)}{n + \sqrt{n}}.$$

Solution : Les fonctions $\cos(n)$ et $(-1)^n$ oscillent sans fin et n'ont pas de limite quand $n \to +\infty$. Il est impossible d'appliquer les règles d'addition de limites. On pense immédiatement au **théorème des gendarmes**. Pour tout entier n, $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ et $(-1)^n \in \{-1\,;1\}$. Ainsi, le produit $(-1)^n\cos(n)$ reste impérativement encadré entre -1 et 1 :

$$-1 \leq (-1)^n \cos(n) \leq 1.$$

Ajoutons 3 à chaque membre :

$$3 - 1 \leq 3 + (-1)^n\cos(n) \leq 3 + 1 \Leftrightarrow 2 \leq 3 + (-1)^n\cos(n) \leq 4.$$

Comme pour tout $n \geq 1$, le dénominateur $n + \sqrt{n}$ est strictement positif, on peut diviser sans changer le sens des inégalités :

$$\frac{2}{n+\sqrt{n}} \leq v_n \leq \frac{4}{n+\sqrt{n}}.$$

Étudions les limites des deux bornes :

- $\lim(n+\sqrt{n}) = +\infty$, donc $\lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n+\sqrt{n}} = 0$.
- De même, $\lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n+\sqrt{n}} = 0$.

Les deux suites encadrantes convergent vers la même limite 0. D'après le **théorème d'encadrement des gendarmes**, la suite (v_n) converge et :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 0.$$

Exemple résolu 4 — Somme géométrique et convergence

Énoncé : On considère la suite (S_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \ldots + \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

1. Exprimer S_n sous forme close sans symbole de sommation. 2. Déterminer la limite de S_n quand $n \to +\infty$.

Solution : 1. S_n est la somme des n premiers termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme $a = \frac{2}{3}$ et de raison $q = \frac{2}{3}$. La formule de la somme géométrique donne (avec $q \neq 1$) :

$$\text{Somme} = \text{Premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}.$$

Ici :

$$S_n = \frac{2}{3} \times \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \times \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3} \times 3 \times \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) = 2\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right).$$

2. Comme $-1 < \frac{2}{3} < 1$, d'après le théorème sur les suites géométriques :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

Par opérations sur les limites :

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = 2(1-0) = 2.$$

Exemple résolu 5 — Comparaison vers l'infini

Énoncé : Démontrer que la suite (w_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $w_n = 2n^2 - 5\sin(n) + (-1)^n$ tend vers $+\infty$.

Solution : Pour tout entier n, on a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc $-5 \leq -5\sin(n) \leq 5$, et $(-1)^n \geq -1$. Par conséquent :

$$w_n = 2n^2 - 5\sin(n) + (-1)^n \geq 2n^2 - 5 - 1 = 2n^2 - 6.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} (2n^2 - 6) = +\infty.$$

Comme $w_n \geq 2n^2 - 6$ pour tout $n \geq 1$, par le **théorème de comparaison**, on conclut immédiatement :

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty.$$

Exemple résolu 6 — Suite récurrente et convergence monotone

Énoncé : Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 6$. 2. Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante. 3. En déduire que la suite converge vers une limite L que l'on déterminera.

Solution : 1. **Démonstration par récurrence :** Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(n)$: « $u_n < 6$ ».

- *Initialisation :* $u_0 = 0 < 6$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- *Hérédité :* Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n < 6$.

Alors :

$$\frac{1}{2}u_n < \frac{1}{2} \times 6 = 3 \Longrightarrow \frac{1}{2}u_n + 3 < 3 + 3 = 6 \Longrightarrow u_{n+1} < 6.$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- *Conclusion :* Par récurrence, pour tout entier naturel n, $u_n < 6$. La suite est **majorée par 6**.

2. **Sens de variation :** Calculons la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 3 = \frac{1}{2}(6 - u_n).$$

   D'après la question 1, $u_n < 6$, donc $6 - u_n > 0$. Par suite, $u_{n+1} - u_n > 0$, ce qui prouve que la suite (u_n) est **strictement croissante**.

3. **Convergence et calcul de la limite :** La suite (u_n) étant croissante et majorée par 6, le **théorème de convergence monotone** assure qu'elle converge vers une limite finie réelle $L \leq 6$. Déterminons L : Puisque $\lim u_n = L$, on a également $\lim u_{n+1} = L$. En passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$, on obtient :

$$L = \frac{1}{2}L + 3 \Leftrightarrow L - \frac{1}{2}L = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}L = 3 \Leftrightarrow L = 6.$$

   La suite (u_n) converge vers 6.

Ce qu'il faut retenir

1. **Définition de la convergence :** $\lim u_n = L$ signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un rang N.
2. **Divergence vers $+\infty$:** tout intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.
3. **Formes Indéterminées :** $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$. Pour un quotient de polynômes en n, on factorise toujours par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.
4. **Théorème des Gendarmes :** Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ et $\lim v_n = \lim w_n = L$, alors $\lim u_n = L$.
5. **Théorème de Comparaison :** Si $u_n \geq v_n$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$.
6. **Suites géométriques q^n :**
   - Si $q > 1$, $\lim q^n = +\infty$ (prouvé par l'inégalité de Bernoulli $(1+a)^n \geq 1 + na$).
   - Si $-1 < q < 1$, $\lim q^n = 0$.
   - Si $q \leq -1$, pas de limite.
7. **Convergence monotone :** Croissante + majorée $\Longrightarrow$ convergente. Décroissante + minorée $\Longrightarrow$ convergente.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 44.1 Déterminer la limite de chacune des suites suivantes quand $n \to +\infty$: 1. $u_n = 4 - \frac{7}{n} + \frac{3}{n^2}$ 2. $v_n = -3n^3 + 500$ 3. $w_n = 5 \times 0,4^n$ 4. $t_n = 2 \times 1,05^n$

Exercice 44.2 Pour chacune des suites géométriques suivantes, préciser si elle converge et, le cas échéant, donner sa limite : 1. $a_n = \left(-\frac{3}{4}\right)^n$ 2. $b_n = \left(\frac{7}{5}\right)^n$ 3. $c_n = (-1,2)^n$ 4. $d_n = \frac{4^n}{3^n}$

Exercice 44.3 Calculer la limite des suites rationnelles suivantes : 1. $u_n = \frac{3n+1}{5n-2}$ 2. $v_n = \frac{7n^2-4}{2n^3+n}$ 3. $w_n = \frac{n^4-1}{100n^3+5}$

Exercice 44.4 Soit $u_n = 5 + \frac{1}{n}$. Trouver un rang N à partir duquel $u_n \in]4,999\,;5,001[$.

Exercice 44.5 Démontrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{-1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$. En déduire $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(n)}{n}$.

Exercice 44.6 Une suite (u_n) vérifie pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq 3n^2 - 10n$. Déterminer sa limite en $+\infty$.

Exercice 44.7 Une population d'oiseaux compte initialement 500 individus et décroît de 5 % par an. 1. Exprimer la population P_n au bout de n années. 2. Quelle est la limite de P_n quand $n \to +\infty$?

Exercice 44.8 Écrire en Python une fonction `seuil_geometrique(q, A)` qui prend en entrée une raison $q > 1$ et un seuil $A > 0$, et renvoie le premier rang n tel que $q^n > A$.

Niveau (Réflexion et type Bac)

Exercice 44.9 (Levée d'indéterminations avec racines). Soit $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \geq 0$. 1. Montrer qu'il s'agit d'une forme indéterminée en l'état. 2. En multipliant par l'expression conjuguée, montrer que $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. 3. En déduire la limite de (u_n).

Exercice 44.10 (Type Bac : Étude complète d'une suite récurrente). On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 2}.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$. 2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{u_n + 2}$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n). 3. Justifier que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite exacte.

Exercice 44.11 (Suite arithmético-géométrique et placement bancaire). Un capital de 10 000 € est placé à intérêts composés au taux annuel de 3 %. Chaque année, le titulaire dépose 500 € supplémentaires immédiatement après le calcul des intérêts. On note C_n le capital au bout de n années ($C_0 = 10\,000$). 1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n. 2. On pose $v_n = C_n + \alpha$. Déterminer le réel α pour que (v_n) soit une suite géométrique. 3. En déduire l'expression explicite de C_n en fonction de n, puis déterminer $\lim_{n\to+\infty} C_n$.

Exercice 44.12 (Gendarmes et somme finie). Soit la suite (S_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2 + k} = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \ldots + \frac{n}{n^2+n}.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \{1; 2; \ldots; n\}$, on a $\frac{n}{n^2+n} \leq \frac{n}{n^2+k} \leq \frac{n}{n^2+1}$. 2. En déduire que pour tout $n \geq 1$: $\frac{n^2}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$. 3. En déduire la convergence de (S_n) et sa limite.

Exercice 44.13 (Vrai ou Faux avec justifications). Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse en apportant une preuve ou un contre-exemple précis : 1. « Si une suite converge, alors elle est bornée. » 2. « Si une suite est bornée, alors elle converge. » 3. « Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ et si (u_n) converge vers L, alors $L > 0$. » 4. « Si $\lim_{n\to+\infty} u_n^2 = 4$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$. »

Exercice 44.14 (Somme géométrique et paradoxe du coureur). Un coureur parcourt successivement 100 m, puis 50 m, puis 25 m, et à chaque étape la moitié de l'étape précédente. 1. Calculer la distance totale parcourue après n étapes. 2. Démontrer rigoureusement que la distance totale ne dépassera jamais 200 m, quel que soit le nombre d'étapes franchies.

Exercice 44.15 (Inégalité de Bernoulli et minoration). On considère la suite $u_n = 1,01^n$. 1. Grâce à l'inégalité de Bernoulli, donner une minoration affine de u_n. 2. En déduire un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq 1\,000\,000$. 3. Est-ce le plus petit entier qui convient ?

Exercice 44.16 (Algorithme de seuil et temps d'arrêt). On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$. 1. Conjecturer la limite L de (u_n). 2. Écrire un script Python permettant de trouver le plus petit entier n tel que $|u_n - L| < 10^{-5}$.

Exercice 44.17 (Étude d'une suite auxiliaire géométrique). Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$. 1. Calculer u_1 et u_2. 2. On admet que $u_n > 0$ pour tout n. On pose $v_n = \frac{1}{u_n}$. Montrer que (v_n) est arithmétique. 3. En déduire l'expression de v_n, puis celle de u_n en fonction de n, et déterminer sa limite.

Niveau (Défi et approfondissement)

Exercice 44.18 (La constante e comme limite d'une suite). On considère les deux suites (u_n) et (v_n) définies pour tout $n \geq 1$ par :

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{et} \quad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

1. En calculant les premières valeurs à la calculatrice, conjecturer le comportement de (u_n) et (v_n). 2. On admet que (u_n) est strictement croissante et que (v_n) est strictement décroissante avec $u_n < v_n$. Démontrer que $\lim_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$. 3. Que peut-on en déduire pour les deux suites ? (Elles convergent vers le nombre d'Euler $e \approx 2,71828$).

Exercice 44.19 (La suite des moyennes arithmético-géométriques de Gauss). Soient $a_0 > 0$ et $b_0 > 0$ avec $a_0 < b_0$. On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

1. Rappeler pourquoi pour tous réels strictement positifs a et b, on a $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. 2. Démontrer que pour tout $n \geq 1$, $a_n \leq b_n$. 3. Montrer que la suite (a_n) est croissante et que la suite (b_n) est décroissante. 4. En déduire que les deux suites convergent vers une même limite commune (la moyenne arithmético-géométrique de Gauss).

Exercice 44.20 (Le flocon de Koch : périmètre infini et aire finie). Le flocon de Koch se construit par étapes à partir d'un triangle équilatéral de côté 1 et d'aire $A_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}$. À chaque étape, on remplace le tiers central de chaque côté par un triangle équilatéral vers l'extérieur. 1. Le périmètre à l'étape n est donné par $P_n = 3 \times \left(\frac{4}{3}\right)^n$. Quelle est la limite de P_n ? 2. L'aire à l'étape n vérifie $A_n = A_0\left[1 + \frac{3}{5}\left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right)\right]$. Calculer $\lim_{n\to+\infty} A_n$. 3. Commenter le résultat géométrique paradoxal (une figure de frontière infinie emprisonnant une surface finie).

Exercice 44.21 (Théorème de Césaro — Hors-programme / Olympiades). Soit (u_n) une suite convergeant vers une limite finie L. On définit la suite des moyennes $(c_n)_{n\geq 1}$ par :

$$c_n = \frac{u_1 + u_2 + ... + u_n}{n}.$$

1. Tester ce résultat sur la suite $u_n = 1 + \frac{1}{n}$. 2. Donner un exemple montrant que la réciproque est fausse (trouver une suite (u_n) qui ne converge pas, mais dont la moyenne de Césaro (c_n) converge).

Exercice 44.22 (Théorème du point fixe pour les suites). Soit f une fonction continue sur $[0;1]$ telle que pour tout $x \in [0;1]$, $f(x) \in [0;1]$. On suppose de plus qu'il existe une constante $k \in]0;1[$ telle que pour tous $x, y \in [0;1]$:

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Soit $u_0 \in [0;1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. 1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - u_n| \leq k^n |u_1 - u_0|$. 2. Démontrer que la suite (u_n) converge vers l'unique solution de $f(x) = x$ dans $[0;1]$.

Solutions

Solutions du Niveau

- **44.1 :**
  1. $\lim u_n = 4 - 0 + 0 = 4$.
  2. $\lim v_n = -\infty$ car $n^3 \to +\infty$ et $-3 < 0$.
  3. $0 < 0,4 < 1$ donc $\lim 0,4^n = 0$, d'où $\lim w_n = 0$.
  4. $1,05 > 1$ donc $\lim 1,05^n = +\infty$, d'où $\lim t_n = +\infty$.
- **44.2 :**
  1. Converge vers 0 car $|-3/4| = 3/4 < 1$.
  2. Diverge vers $+\infty$ car $7/5 > 1$.
  3. Diverge sans limite car $-1,2 \leq -1$ (oscille avec une amplitude croissante).
  4. $d_n = (4/3)^n$ avec $4/3 > 1$, donc diverge vers $+\infty$.
- **44.3 :**
  1. Factorisation : $u_n = \frac{n(3+1/n)}{n(5-2/n)} = \frac{3+1/n}{5-2/n} \to \frac{3}{5}$.

2. $v_n = \frac{n^2(7-4/n^2)}{n^3(2+1/n^2)} = \frac{1}{n} \times \frac{7-4/n^2}{2+1/n^2} \to 0 \times \frac{7}{2} = 0$.
3. $w_n = \frac{n^4(1-1/n^4)}{n^3(100+5/n^3)} = n \times \frac{1-1/n^4}{100+5/n^3} \to +\infty$.

- **44.4 :** On veut $4,999 < 5 + \frac{1}{n} < 5,001 \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n} < 0,001 = \frac{1}{1000} \Leftrightarrow n > 1000$. Le rang minimal est $N = 1001$.
- **44.5 :** Pour tout $n \geq 1$, $-1 \leq \sin(n) \leq 1$. En divisant par $n > 0$, $\frac{-1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$. Comme $\lim(-1/n) = \lim(1/n) = 0$, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$.
- **44.6 :** Pour $n \geq 4$, $3n^2 - 10n = n(3n-10) \to +\infty$. Comme $u_n \geq 3n^2 - 10n$, par comparaison, $\lim u_n = +\infty$.
- **44.7 :**
  1. Décroissance de 5 % correspond à multiplier par $1 - 0,05 = 0,95$. Donc $P_n = 500 \times 0,95^n$.
  2. Comme $0 < 0,95 < 1$, $\lim 0,95^n = 0$, donc $\lim P_n = 0$ (extinction théorique de la population).
- **44.8 :**

```python
def seuil_geometrique(q, A):
    n = 0
    u = 1.0
    while u <= A:
        n += 1
        u = q ** n
    return n
```

Solutions du Niveau

- **44.9 :**
  1. $\lim \sqrt{n+1} = +\infty$ et $\lim \sqrt{n} = +\infty$, donc c'est une F.I. « $\infty - \infty$ ».
  2. Pour $n \geq 0$:
$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$
  3. Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc par quotient de limite, $\lim u_n = 0$.
- **44.10 :**
  1. *Initialisation :* $n = 0$, $u_0 = 1 \in [1; \sqrt{3}]$ car $\sqrt{3} \approx 1,732$. *Hérédité :* Supposons $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$. La fonction $f(x) = \frac{2x+3}{x+2} = 2 - \frac{1}{x+2}$ est strictement croissante sur $[1; \sqrt{3}]$. Donc $f(1) \leq f(u_n) \leq f(\sqrt{3})$. Or $f(1) = 5/3 \approx 1,67 \geq 1$. Et $f(\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}+3}{\sqrt{3}+2} = \frac{\sqrt{3}(2+\sqrt{3})}{\sqrt{3}+2} = \sqrt{3}$. Ainsi $1 \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$. *Conclusion :* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$.
  2. $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n+3}{u_n+2} - u_n = \frac{2u_n+3-u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{3-u_n^2}{u_n+2}$. Comme $u_n \leq \sqrt{3}$, on a $u_n^2 \leq 3$, donc $3 - u_n^2 \geq 0$. Comme $u_n \geq 1$, $u_n + 2 > 0$. Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: la suite est croissante.
  3. La suite est croissante et majorée par $\sqrt{3}$, donc elle converge vers une limite $L \in [1; \sqrt{3}]$. En passant à la limite : $L = \frac{2L+3}{L+2} \Leftrightarrow L(L+2) = 2L+3 \Leftrightarrow L^2 = 3$. Comme $L \geq 1$, on a $L = \sqrt{3}$.
- **44.11 :**
  1. Augmenter de 3 % puis ajouter 500 donne : $C_{n+1} = 1,03C_n + 500$.
  2. $v_{n+1} = C_{n+1} + \alpha = 1,03C_n + 500 + \alpha$. On veut $v_{n+1} = 1,03v_n = 1,03(C_n + \alpha) = 1,03C_n + 1,03\alpha$. On identifie : $500 + \alpha = 1,03\alpha \Leftrightarrow 0,03\alpha = 500 \Leftrightarrow \alpha = \frac{500}{0,03} = \frac{50\,000}{3}$.
  3. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,03$ et de premier terme $v_0 = C_0 + \frac{50\,000}{3} = 10\,000 + \frac{50\,000}{3} = \frac{80\,000}{3}$. Donc $v_n = \frac{80\,000}{3} \times 1,03^n$, d'où $C_n = v_n - \alpha = \frac{80\,000}{3} \times 1,03^n - \frac{50\,000}{3}$. Comme $1,03 > 1$, $\lim 1,03^n = +\infty$, donc $\lim C_n = +\infty$.
- **44.12 :**
  1. Pour $1 \leq k \leq n$, on a $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$. Par inversion de nombres strictement positifs : $\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1}$. En multipliant par $n > 0$, on obtient l'inégalité demandée.
  2. En sommant ces inégalités pour k allant de 1 à n, la somme comporte n termes : $n \times \frac{n}{n^2+n} \leq S_n \leq n \times \frac{n}{n^2+1} \Leftrightarrow \frac{n^2}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$.
  3. $\lim \frac{n^2}{n^2+n} = \lim \frac{n^2}{n^2(1+1/n)} = 1$ et $\lim \frac{n^2}{n^2+1} = 1$. Par le théorème des gendarmes, $\lim S_n = 1$.
- **44.13 :**

1. **Vrai.** Si $u_n \to L$, à partir d'un rang N, tous les termes sont dans $]L-1; L+1[$. Les termes précédents $u_0, ..., u_{N-1}$ étant en nombre fini, on prend le minimum et le maximum de l'ensemble fini $\{u_0, ..., u_{N-1}, L-1, L+1\}$, ce qui borne toute la suite.
2. **Faux.** Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$ est bornée entre -1 et 1, mais ne converge pas.
3. **Faux.** Contre-exemple : $u_n = \frac{1}{n+1} > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, mais $\lim u_n = 0$ (qui n'est pas strictement positif). Le passage à la limite transforme les inégalités strictes en inégalités larges.
4. **Faux.** Contre-exemple : $u_n = 2 \times (-1)^n$. Alors $u_n^2 = 4$ pour tout n, donc $\lim u_n^2 = 4$, mais (u_n) oscille entre 2 et -2 et n'a aucune limite.

- **44.14 :**
1. Distance à l'étape n : $D_n = 100 \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 100 \times \frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 200\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$.
2. Pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{2^n} > 0$, donc $1 - \frac{1}{2^n} < 1$, ce qui implique $D_n < 200$. De plus $\lim D_n = 200$ m. La distance tend vers 200 m sans jamais la dépasser pour un n fini.

- **44.15 :**
1. Avec $a = 0,01$, Bernoulli donne : $1,01^n = (1+0,01)^n \geq 1 + 0,01n$.
2. On cherche $1 + 0,01n \geq 1\,000\,000 \Leftrightarrow 0,01n \geq 999\,999 \Leftrightarrow n \geq 99\,999\,900$. Le rang $N = 99\,999\,900$ convient à coup sûr.
3. Non, ce n'est pas le plus petit : la puissance grandit beaucoup plus vite que la droite affine. Le vrai seuil (calculable avec le logarithme au chapitre 48) est $n = \lceil \frac{\ln(10^6)}{\ln(1,01)} \rceil = 1388$.

- **44.16 :**
1. Si $u_n \to L$, alors $L = 0,8L + 1 \Leftrightarrow 0,2L = 1 \Leftrightarrow L = 5$.
2. Script Python :

```python
n = 0
u = 2.0
while abs(u - 5.0) >= 1e-5:
    n += 1
    u = 0.8 * u + 1.0
print(f"Rang n trouvé : {n}")
```

- **44.17 :**
1. $u_1 = \frac{4}{2(4)+1} = \frac{4}{9}$. $u_2 = \frac{4/9}{2(4/9)+1} = \frac{4/9}{17/9} = \frac{4}{17}$.
2. $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{2u_n+1}{u_n} = 2 + \frac{1}{u_n} = v_n + 2$. (v_n) est donc une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{4}$.
3. $v_n = \frac{1}{4} + 2n = \frac{8n+1}{4}$. Par inversion : $u_n = \frac{1}{v_n} = \frac{4}{8n+1}$. On en déduit immédiatement : $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Solutions du Niveau

- **44.18 :**
1. Pour $n = 10$, $u_{10} \approx 2,5937$, $v_{10} \approx 2,8531$. Pour $n = 1000$, $u_{1000} \approx 2,7169$, $v_{1000} \approx 2,7196$. Les deux semblent se resserrer autour de $2,718...$
2. $v_n - u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n} - 1\right) = \frac{1}{n} u_n$. Comme $u_n < v_n \leq v_1 = 4$, la suite (u_n) est bornée par 4. Donc $0 < v_n - u_n \leq \frac{4}{n}$. Par les gendarmes, $\lim(v_n - u_n) = 0$.
3. L'une est croissante, l'autre décroissante, et leur différence tend vers 0 : ce sont deux suites dites **adjacentes**. Elles convergent vers une même limite commune, qui définit le nombre $e \approx 2,71828$.

- **44.19 :**
1. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Leftrightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Leftrightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).
2. Pour $n \geq 0$, $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} - \sqrt{a_n b_n} \geq 0$, donc $a_{n+1} \leq b_{n+1}$ pour tout $n \geq 0$.
3. $a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n b_n} - a_n = \sqrt{a_n}(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n}) \geq 0$ car $b_n \geq a_n$. Donc (a_n) est croissante. De même, $b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2} \leq 0$, donc (b_n) est décroissante.
4. (a_n) est croissante et majorée par b_0, donc elle converge vers L_a. (b_n) est décroissante et minorée par a_0, donc converge vers L_b. En passant à la limite dans $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$, on a $L_b = \frac{L_a+L_b}{2} \Leftrightarrow L_a = L_b$. Les deux suites convergent vers la même valeur, notée $M(a_0, b_0)$.

- **44.20 :**
  1. Comme $\frac{4}{3} > 1$, $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n = +\infty$, donc le périmètre P_n tend vers $+\infty$.
  2. Comme $0 < \frac{4}{9} < 1$, $\lim \left(\frac{4}{9}\right)^n = 0$. Donc $\lim A_n = A_0\big(1 + \frac{3}{5}(1-0)\big) = A_0\big(1+\frac{3}{5}\big) = \frac{8}{5}A_0 = \frac{8}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$.
  3. Le flocon de Koch possède un périmètre infini tout en enfermant une aire finie strictement bornée. Il montre que la géométrie fractale brise l'intuition euclidienne usuelle.
- **44.21 :**
  1. $u_n \to 1$. $c_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\big(1 + \frac{1}{k}\big) = 1 + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$. Or la somme harmonique $H_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$ croît comme $\ln(n)$, donc $\frac{H_n}{n} \to 0$. Ainsi $c_n \to 1$.
  2. Prenons $u_n = (-1)^n$. La suite (u_n) oscille et diverge. Mais $S_n = u_1 + ... + u_n$ vaut -1 si n est impair et 0 si n est pair. Donc $-\frac{1}{n} \le c_n \le 0$, ce qui implique par les gendarmes que $\lim c_n = 0$. La moyenne de Césaro converge vers 0 alors que (u_n) diverge !
- **44.22 :**
  1. Par récurrence : pour $n = 0$, $|u_1 - u_0| \le k^0|u_1 - u_0|$ est vrai. Supposons $|u_{n+1} - u_n| \le k^n|u_1 - u_0|$. Alors $|u_{n+2} - u_{n+1}| = |f(u_{n+1}) - f(u_n)| \le k|u_{n+1} - u_n| \le k \times k^n|u_1 - u_0| = k^{n+1}|u_1 - u_0|$.
  2. Puisque $0 < k < 1$, $\lim k^n = 0$. Les pas $|u_{n+1} - u_n|$ deviennent infiniment petits de façon géométrique. La suite est une suite de Cauchy dans un intervalle fermé borné, donc elle converge vers un réel $L \in [0;1]$. Par continuité de f, $\lim f(u_n) = f(L)$, d'où $L = f(L)$. L'unicité découle de ce que si $f(x) = x$ et $f(y) = y$, $|x - y| = |f(x) - f(y)| \le k|x - y| \implies (1-k)|x-y| \le 0$, ce qui impose $x = y$ car $1 - k > 0$.

La question qui ouvre la suite

Jusqu'ici, notre compteur n était un entier naturel qui sautait de marche en marche : $n = 0, 1, 2, 3...$ Mais que se passe-t-il si la variable n'est plus un coureur à pas discrets, mais un oiseau qui vole de façon parfaitement continue dans le ciel, ou une fusée qui accélère à chaque microseconde ? Comment définir la limite d'une fonction $f(x)$ quand la variable réelle x glisse de manière continue vers l'infini, ou pire, quand elle s'approche d'un point où la fonction semble se déchirer ou exploser ?

C'est le mystère des limites de fonctions et des lignes invisibles qui guident les courbes dans l'espace : **les asymptotes**. Rendez-vous au chapitre 45.

CHAPITRE 45 : L'Horizon des Courbes

> « Asymptote vient du grec ancien asúmptōtos : « qui ne coïncide pas », « qui ne rencontre pas ». C'est la ligne d'horizon du marin : plus le navire avance vers le large, plus l'horizon semble s'offrir à lui, sans que jamais sa coque ne puisse en franchir le seuil. Dans le ciel cartésien, les asymptotes sont les rails invisibles qui guident le destin des courbes vers l'infini. »

Ce que tu vas découvrir

- Le passage fondamental de la variable discrète $n \in \mathbb{N}$ à la variable continue $x \in \mathbb{R}$: comment les fonctions glissent vers l'infini ou vers un point de rupture.
- Les définitions rigoureuses des **limites finies et infinies**, ainsi que les notions indispensables de **limite à gauche et limite à droite**.
- Les **trois familles d'asymptotes** (verticales, horizontales, obliques) et la méthode pour déterminer la **position relative** d'une courbe par rapport à sa droite guide.
- La panoplie complète pour lever les **quatre formes indéterminées** : factorisation par le terme prépondérant, quantité conjuguée, et taux d'accroissement.
- Le triomphe des **croissances comparées** de la fonction exponentielle sur les puissances de x, avec sa **démonstration exigible au baccalauréat**.
- Le théorème sur la **limite d'une fonction composée** $g(f(x))$.

---

1. Le problème : la lentille optique et le trou noir

1.1 Le physicien et la distance focale

Dans un laboratoire d'optique, un rayon lumineux traverse une lentille mince convergente de distance focale $f > 0$. Un objet lumineux est placé à une distance p en avant de la lentille. La formule de conjugaison de Descartes-Gauss relie la position de l'objet p à la position de l'image nette p' formée sur un écran en arrière :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}.$$

Exprimons la position de l'image p' en fonction de la distance de l'objet p :

$$p'(p) = \frac{f \cdot p}{p - f}.$$

Que se passe-t-il lorsque l'expérimentateur déplace l'objet vers la lentille ?



Fig. 101. – Comportement asymptotique aux bornes : asymptotes verticales et horizontales

1. **Si l'objet est infiniment éloigné ($p \to +\infty$)** :
$$p'(p) = \frac{f \cdot p}{p(1 - f/p)} = \frac{f}{1 - f/p} \underset{p \to +\infty}{\to} f.$$
L'image se forme exactement dans le plan focal de la lentille. La droite horizontale $y = f$ est une **ligne de butée**, un plafond que l'image ne peut franchir : c'est une **asymptote horizontale**.
2. **Si l'objet s'approche du foyer focal ($p \to f$ avec $p > f$)** : Le dénominateur $p - f$ devient un nombre positif infiniment petit ($0,001$, $0,000001\ldots$). Le quotient $p'(p)$ explose vers des grandeurs gigantesques :
$$\lim_{p \to f^+} p'(p) = +\infty.$$
Pour voir l'image nette, il faudrait reculer l'écran au bout de la pièce, puis hors du bâtiment, puis sur la Lune ! Les rayons émergent parallèles : l'image est rejetée à l'infini. La droite verticale $x = f$ agit comme une falaise infranchissable : c'est une **asymptote verticale**.

1.2 Du pas discret au flux continu

Au chapitre 44, la variable n sautait d'entier en entier : $n = 0, 1, 2, 3...$ Il n'y avait aucun sens à se demander ce qui se passait entre $n = 2$ et $n = 3$, et l'on ne pouvait faire tendre n que vers $+\infty$.

Avec les fonctions d'une variable réelle $x \mapsto f(x)$, le monde devient **fluide et continu**. La variable réelle x peut :

- s'enfuir vers $+\infty$ ou vers $-\infty$;
- glisser vers un nombre réel fixé x_0 (par exemple $x \to 2$) ;
- s'approcher d'un point interdit par la gauche ($x < x_0$) ou par la droite ($x > x_0$).

---

2. Définitions rigoureuses des limites de fonctions

2.1 Les notations expliquées

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$: « la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers plus l'infini est égale à L ».
- $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$: « la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers le réel x_0 est égale à L ».
- $x \to x_0^+$ ou $x \underset{x > x_0}{\to} x_0$: « x tend vers x_0 par valeurs strictement supérieures » (limite à droite).
- $x \to x_0^-$ ou $x \underset{x < x_0}{\to} x_0$: « x tend vers x_0 par valeurs strictement inférieures » (limite à gauche).

2.2 Limite finie en l'infini

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Limite finie en $+\infty$.** Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a\,;+\infty[$, et soit $L \in \mathbb{R}$. On dit que f **admet pour limite L en $+\infty$** si : **Tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment grand.** On note :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

(Définition analogue en $-\infty$ sur un intervalle $]-\infty\,;b]$).

Sens concret : Trace une bande horizontale de largeur 2ε centrée sur $y = L$, aussi étroite que tu veux. Si tu avances assez loin vers la droite sur l'axe des abscisses (au-delà d'un certain seuil X), le graphe de la fonction s'enferme à tout jamais à l'intérieur de cette bande.

2.3 Limite infinie en un point : le mur vertical

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Limite infinie en un point réel x_0.** Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On dit que $f(x)$ **tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers x_0** si : **Pour tout réel $A > 0$, l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment proche de x_0.** On note :

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty.$$

2.4 Limites à gauche et à droite

Certaines fonctions adoptent des comportements radicalement opposés selon qu'on les approche par bâbord ou par tribord. L'archétype est la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$ au voisinage de zéro :

- Si $x > 0$ et $x \to 0$: x prend des valeurs comme $0,1$; $0,001$; $0,00001$. Le quotient $\frac{1}{x}$ vaut 10 ; 1000 ; $100\,000$:

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

- Si $x < 0$ et $x \to 0$: x prend des valeurs négatives comme $-0,1$; $-0,001$. Le quotient $\frac{1}{x}$ vaut -10 ; -1000 :

$$\lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

📐 **Théorème fondamental — Existence de la limite globale en un point.**

Une fonction f admet une limite L en x_0 si et seulement si elle admet une limite à gauche et une limite à droite en x_0, et que ces deux limites sont **égales** :

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L.$$

Pour $f(x) = \frac{1}{x}$ en 0, comme $+\infty \neq -\infty$, la fonction n'a **pas de limite globale** en 0.

---

3. Les Asymptotes : le guide géométrique des courbes

Une asymptote est une droite dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ se rapproche de plus en plus lorsque les points de la courbe s'éloignent vers l'infini.

3.1 Asymptote horizontale

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Asymptote horizontale.** Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ (ou si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$), où L est un nombre réel fini, alors la droite $\mathcal{D}$ d'équation $\boldsymbol{y = L}$ est appelée **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ (ou de $-\infty$).

3.2 Asymptote verticale

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Asymptote verticale.** Si $\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ ou si $\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$ (où $a \in \mathbb{R}$), alors la droite Δ d'équation $\boldsymbol{x = a}$ est appelée **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

3.3 Asymptote oblique

Parfois, la courbe ne s'aplatit pas à l'horizontale, mais s'aligne le long d'une droite penchée d'équation $y = ax + b$ avec $a \neq 0$.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Asymptote oblique.** La droite $\mathcal{D}$ d'équation $\boldsymbol{y = ax + b}$ est une asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ (resp. $-\infty$) si :

$$\lim_{x\to+\infty} \big[\, f(x) - (ax+b)\big] = 0 \quad (\text{resp. en } -\infty\ ) \ .$$

Sens géométrique : La distance verticale entre le point de la courbe $M(x; f(x))$ et le point de la droite $P(x; ax+b)$ devient infiniment petite à mesure qu'on avance vers le bout du repère.

3.4 Étude de la position relative

Pour savoir si la courbe $\mathcal{C}_f$ se situe **au-dessus** ou **en dessous** de son asymptote (horizontale $y = L$ ou oblique $y = ax + b$), on applique la méthode universelle suivante :

Méthode — Position relative d'une courbe et d'une asymptote :

1. On calcule la différence :

$d(x) = f(x) - y_{\text{asymptote}}$. 2. On étudie rigoureusement le **signe** de $d(x)$:

- Si $d(x) > 0$ sur un intervalle, alors $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de l'asymptote sur cet intervalle.
- Si $d(x) < 0$ sur un intervalle, alors $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de l'asymptote.
- Si $d(x) = 0$ en un point x_1, la courbe **traverse** son asymptote au point d'abscisse x_1.

---

4. La Boîte à Outils pour lever les Formes Indéterminées

Rappelons les quatre formes interdites de conclusion directe :

$$\text{F.I. :} \quad [\infty - \infty], \quad [0 \times \infty], \quad \left[\frac{\infty}{\infty}\right], \quad \left[\frac{0}{0}\right].$$

Voici les quatre techniques fondamentales à maîtriser au lycée :

Méthode 1 : Factoriser par le terme prépondérant

En $+\infty$ ou $-\infty$, dans un polynôme ou une fraction rationnelle, le terme de plus haut degré dicte sa loi à tous les autres.

- Pour un polynôme : on factorise par la plus grande puissance de x.

- Pour une fraction : on factorise le numérateur et le dénominateur par leur puissance dominante respective, puis on simplifie.

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Le signe sous la racine carrée en $-\infty$.** Rappelle-toi toujours que pour tout réel x :
>
> $$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$
>
> Lorsque $x \to -\infty$, x est un nombre **strictement négatif**. Par conséquent :
>
> $$\sqrt{x^2} = -x \quad (\text{et non } +x \ !).$$
>
> C'est l'erreur la plus sanctionnée dans les copies de baccalauréat !

Méthode 2 : La quantité conjuguée

Lorsque des racines carrées s'affrontent dans une indétermination du type $[\infty - \infty]$ ou $[0/0]$, on utilise l'identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ pour chasser les radicaux du lieu du blocage :

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B})}{\sqrt{A} + \sqrt{B}} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$

La soustraction délicate $[\infty - \infty]$ se transforme en une addition bienveillante au dénominateur $[\infty + \infty = \infty]$.

Méthode 3 : Reconnaître un taux de variation (nombre dérivé)

Une forme indéterminée du type $\left[\frac{0}{0}\right]$ en un point x_0 cache très souvent la définition même de la dérivée :

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0).$$

Exemples célèbres :

- $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}$: avec $g(x) = e^x$, $g(0) = 1$, la limite vaut $g'(0) = e^0 = 1$.
- $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$: avec $g(x) = \sin x$, $g(0) = 0$, la limite vaut $\cos(0) = 1$.

---

5. Les Croissances Comparées de l'Exponentielle

Quand la fonction exponentielle affronte un polynôme ou une puissance de x en l'infini, l'explosion de e^x surpasse infiniment toute croissance polynomiale.

> 📐 **Théorème — Croissances comparées de l'exponentielle.**
>
> Pour tout entier naturel $n \geq 1$: 1. $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et plus généralement $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ 2. $\lim_{x \to -\infty} x\, e^x = 0$ et plus généralement $\lim_{x \to -\infty} x^n\, e^x = 0$

Règle mnémotechnique : En $+\infty$ comme en $-\infty$, **l'exponentielle l'emporte toujours sur les puissances de x**.

Démonstration exigible au baccalauréat : $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

✍ **Démonstration (exigible).**

L'objectif est d'obtenir une minoration de e^x par un polynôme de degré 2 pour que le quotient $\frac{e^x}{x}$ soit minoré par un terme de degré 1 qui tend vers $+\infty$.

Étape 1 : Minoration de la fonction exponentielle. Considérons la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}.$$

Dérivons deux fois la fonction f :

- Sa dérivée première est $f'(x) = e^x - x$.
- Sa dérivée seconde est $f''(x) = e^x - 1$.

Pour tout $x \geq 0$, $e^x \geq e^0 = 1$, donc $f''(x) \geq 0$. Par conséquent, la fonction dérivée f' est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Or $f'(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$. Puisque f' est croissante et que $f'(0) > 0$, pour tout $x \geq 0$ on a :

$$f'(x) \geq f'(0) > 0.$$

La fonction f est donc elle-même strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Comme $f(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$, il en résulte que pour tout $x \geq 0$:

$$f(x) > 0 \Longrightarrow e^x > \frac{x^2}{2}.$$

Étape 2 : Passage au quotient et conclusion. Pour tout réel $x > 0$, divisons cette inégalité par x (comme $x > 0$, le sens de l'inégalité est conservé) :

$$\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}.$$

Or :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2} = +\infty.$$

D'après le **théorème de comparaison** des limites, on conclut de façon irréfutable :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty. \quad \blacksquare$$

Démonstration de $\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$ *par changement de variable :* Posons $X = -x$. Lorsque $x \to -\infty$, on a $X \to +\infty$. Alors :

$$x\,e^x = (-X)\,e^{-X} = -\frac{X}{e^X} = -\frac{1}{\frac{e^X}{X}}.$$

Comme $\lim_{X\to+\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$, par inverse d'une limite infinie :

$$\lim_{x\to-\infty} x\,e^x = \lim_{X\to+\infty} \left(-\frac{1}{e^X/X}\right) = 0. \quad \blacksquare$$

---

6. Limite d'une Fonction Composée

Une fonction composée est une cascade : la sortie de la première machine f devient l'entrée de la seconde machine g. On note cette opération $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

📐 Théorème — Limite d'une fonction composée.

Soient a, b, c désignant soit des nombres réels, soit $+\infty$, soit $-\infty$. Si :

$$\lim_{x \to a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{y \to b} g(y) = c,$$

alors :

$$\lim_{x \to a} g(f(x)) = c.$$

🧭 Méthode — Rédiger une limite de composée au Bac :

Ne calcule jamais tout d'un coup. Sépare clairement en deux étapes en posant un changement de variable muet : 1. *Étape intérieure :* on calcule $\lim_{x \to a} f(x) = b$. 2. *Étape extérieure :* on pose $X = f(x)$, et comme $X \to b$, on calcule $\lim_{X \to b} g(X) = c$. 3. *Conclusion :* Par composition de limites, $\lim_{x \to a} g(f(x)) = c$.

---

7. Attention, pièges !

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Traverser une asymptote.** Une idée fausse très répandue chez les élèves est qu'une courbe n'a « jamais le droit de toucher son asymptote ». C'est **vrai pour une asymptote verticale** $x = a$ (car la fonction n'y est généralement pas définie). Mais c'est **complètement faux pour une asymptote horizontale ou oblique** ! Une asymptote horizontale $y = L$ décrit uniquement ce qui se passe **au bout du monde** (pour $x \to \pm\infty$). Entre-temps, pour des valeurs modérées de x, la courbe peut couper la droite horizontale une fois, dix fois, ou même une infinité de fois ! *Exemple :* $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ a pour asymptote horizontale l'axe des abscisses $y = 0$, et traverse cet axe en tous les multiples de π ($\pi, 2\pi, 3\pi \ldots$).

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — Les croissances comparées ne s'appliquent qu'en l'infini !** Ne dis jamais : « $\lim_{x \to 0} \frac{e^x}{x} = +\infty$ par croissances comparées » ! En 0, le numérateur tend vers $e^0 = 1$ et le dénominateur vers 0. C'est une limite directe de quotient fini par zéro ($1/0^+$ ou $1/0^-$), pas une croissance comparée ! Les croissances comparées comparent la vitesse d'échappement vers l'infini.

---

8. Exemples Résolus pas à pas

Exemple résolu 1 — Asymptotes et levée d'indétermination en $+\infty$ et $-\infty$

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par :

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x - 2}.$$

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition ($+\infty$, $-\infty$, et en 2 par valeurs inférieures et supérieures). 2. En déduire les équations des asymptotes à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$. 3. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Solution : 1. **Limites en l'infini :** Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x\left(3 - \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{2}{x}\right)} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}.$$

Comme $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x}=0$ et $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2}{x}=0$, on obtient :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=3 \quad \text{et} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x)=3.$$

Limites en 2 : Numérateur : $\lim_{x\to2}(3x-1)=3(2)-1=5>0$. Dénominateur : $\lim_{x\to2}(x-2)=0$.

- Si $x>2$, $x-2>0$, donc le dénominateur tend vers 0^+. Par quotient :

$$\lim_{x\to2^+} f(x)=+\infty.$$

- Si $x<2$, $x-2<0$, le dénominateur tend vers 0^-. Par quotient :

$$\lim_{x\to2^-} f(x)=-\infty.$$

2. **Asymptotes :**
   - Comme $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=3$, la droite d'équation $\boldsymbol{y=3}$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
   - Comme $\lim_{x\to2} f(x)=\pm\infty$, la droite d'équation $\boldsymbol{x=2}$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.
3. **Position relative par rapport à l'asymptote horizontale $y=3$:** Calculons la différence $d(x)=f(x)-3$:

$$d(x)=\frac{3x-1}{x-2}-3=\frac{(3x-1)-3(x-2)}{x-2}=\frac{3x-1-3x+6}{x-2}=\frac{5}{x-2}.$$

   - Pour tout $x\in]2\,;+\infty[$, $x-2>0$, donc $d(x)>0$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de l'asymptote $y=3$.
   - Pour tout $x\in]-\infty\,;2[$, $x-2<0$, donc $d(x)<0$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de l'asymptote $y=3$.

Exemple résolu 2 — Le piège du signe de $\sqrt{x^2}$ en $-\infty$

Énoncé : Déterminer la limite en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction :

$$f(x)=\sqrt{x^2+4x+5}+x.$$

Solution : En $+\infty$: $\lim_{x\to+\infty}(x^2+4x+5)=+\infty$, donc $\lim\sqrt{x^2+4x+5}=+\infty$. Comme $\lim_{x\to+\infty}x=+\infty$, par somme :

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty \quad (\text{pas de forme indéterminée ici !}).$$

En $-\infty$: $\lim_{x\to-\infty}\sqrt{x^2+4x+5}=+\infty$ et $\lim_{x\to-\infty}x=-\infty$. Il s'agit d'une forme indéterminée $[\infty-\infty]$. Utilisons la **quantité conjuguée** :

$$f(x)=\frac{\left(\sqrt{x^2+4x+5}+x\right)\left(\sqrt{x^2+4x+5}-x\right)}{\sqrt{x^2+4x+5}-x}=\frac{(x^2+4x+5)-x^2}{\sqrt{x^2+4x+5}-x}=\frac{4x+5}{\sqrt{x^2+4x+5}-x}.$$

Factorisons maintenant par le terme prépondérant au dénominateur pour $x<0$:

$$\sqrt{x^2+4x+5}=\sqrt{x^2\left(1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}=|x|\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}.$$

Comme $x\to-\infty$, on a $x<0$, donc $|x|=-x$!

$$\sqrt{x^2+4x+5}-x=-x\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}-x=-x\left[\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right].$$

Le numérateur s'écrit $4x+5=x\big(4+\frac{5}{x}\big)$. Ainsi, pour $x<0$:

$$f(x)=\frac{x\big(4+\frac{5}{x}\big)}{-x\left[\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right]}=\frac{4+\frac{5}{x}}{-\left(\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}}+1\right)}.$$

Passons à la limite quand $x\to-\infty$:

- Le numérateur tend vers $4+0=4$.
- Le dénominateur tend vers $-(\sqrt{1+0+0}+1)=-(1+1)=-2$.

Par quotient :

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \frac{4}{-2} = -2.$$

Conséquence géométrique : La droite d'équation $y = -2$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$.

Exemple résolu 3 — Croissances comparées et factorisation d'exponentielle

Énoncé : Déterminer la limite en $+\infty$ et en $-\infty$ de la fonction $f(x) = (2x - 3)e^{-x} + 1$.

Solution : En $+\infty$: Écrivons $f(x) = 2xe^{-x} - 3e^{-x} + 1 = \frac{2x}{e^x} - \frac{3}{e^x} + 1 = 2\left(\frac{\frac{1}{e^x}}{x}\right) - \frac{3}{e^x} + 1$. D'après les théorèmes de croissances comparées, $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. De plus, $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$, d'où $\lim_{x \to +\infty} \frac{3}{e^x} = 0$. Par somme de limites :

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 2(0) - 0 + 1 = 1.$$

La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

En $-\infty$: Posons le changement de variable $X = -x$. Quand $x \to -\infty$, $X \to +\infty$. Alors : $f(x) = (-2X - 3)e^X + 1 = -2Xe^X - 3e^X + 1$. Quand $X \to +\infty$, $e^X \to +\infty$ et $-2X - 3 \to -\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \to -\infty} (2x - 3) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \to -\infty} e^{-x} = +\infty \Longrightarrow \lim_{x \to -\infty} (2x - 3)e^{-x} = -\infty.$$

D'où :

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

Exemple résolu 4 — Limite d'une composée avec racine et quotient

Énoncé : Déterminer la limite quand $x \to +\infty$ de :

$$h(x) = \sqrt{\frac{4x^2 + 1}{x^2 - 3x + 2}}.$$

Solution : Décomposons la fonction en posant $f(x) = \frac{4x^2+1}{x^2-3x+2}$ et $g(X) = \sqrt{X}$, de sorte que $h(x) = g(f(x))$. 1. *Limite intérieure :* Pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{x^2\left(4 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)} = \frac{4 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}.$$

Comme $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, $\lim_{x \to +\infty} \frac{3}{x} = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{x^2} = 0$, on a :

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \frac{4}{1} = 4.$$

2. *Limite extérieure :* Posons $X = f(x)$. Comme $X \to 4$:

$$\lim_{X \to 4} g(X) = \lim_{X \to 4} \sqrt{X} = \sqrt{4} = 2.$$

3. *Conclusion :* Par composition de limites :

$$\lim_{x \to +\infty} h(x) = 2.$$

La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe de h en $+\infty$.

Exemple résolu 5 — Détermination complète d'une asymptote oblique

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{x - 1}$. 1. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq 1$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. 2. Démontrer que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et $-\infty$. 3. Préciser la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\mathcal{D}$.

Solution : 1. Développons la forme souhaitée :

$$ax + b + \frac{c}{x - 1} = \frac{(ax + b)(x - 1) + c}{x - 1} = \frac{ax^2 - ax + bx - b + c}{x - 1} = \frac{ax^2 + (b - a)x + (c - b)}{x - 1}.$$

On identifie les coefficients avec $2x^2 - x + 3$:

$$\{a = 2$$
$$b - a = -1 \Longrightarrow b = a - 1 = 2 - 1 = 1$$
$$c - b = 3 \Longrightarrow c = 3 + b = 3 + 1 = 4$$

On a donc pour tout $x \neq 1$:

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{4}{x-1}.$$

2. Calculons la différence entre $f(x)$ et $y = 2x + 1$:

$$f(x) - (2x+1) = \frac{4}{x-1}.$$

Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{4}{x-1} = 0$ et $\lim_{x\to-\infty} \frac{4}{x-1} = 0$. Par définition, la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 2x + 1$ est donc **asymptote oblique** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

3. **Position relative :** Le signe de $f(x) - (2x+1)$ est celui de $\frac{4}{x-1}$:
   - Si $x > 1$, $x - 1 > 0 \Longrightarrow \frac{4}{x-1} > 0$: $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de $\mathcal{D}$.
   - Si $x < 1$, $x - 1 < 0 \Longrightarrow \frac{4}{x-1} < 0$: $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de $\mathcal{D}$.

Exemple résolu 6 — Forme $\frac{0}{0}$ résolue par le nombre dérivé

Énoncé : Déterminer sans calculatrice $\lim_{x\to0} \frac{e^{3x}-1}{x}$.

Solution : En $x = 0$, $e^0 - 1 = 0$ et le dénominateur vaut 0. C'est une forme indéterminée $[0/0]$. Posons la fonction $g(x) = e^{3x}$. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est $g'(x) = 3e^{3x}$. Remarquons que $g(0) = e^0 = 1$. L'expression s'écrit alors :

$$\frac{e^{3x} - 1}{x} = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0}.$$

Par définition du nombre dérivé :

$$\lim_{x\to0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0) = 3e^{3\times0} = 3 \times 1 = 3.$$

La limite cherchée est donc égale à 3.

Ce qu'il faut retenir

1. **Définition de limite en l'infini :** $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.
2. **Asymptotes :**
   - $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L \Leftrightarrow y = L$ est asymptote horizontale.
   - $\lim_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow x = a$ est asymptote verticale.
   - $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0 \Leftrightarrow y = ax + b$ est asymptote oblique.
3. **Position relative :** signe de $f(x) - y_{\text{asymptote}}$.
4. **Formes Indéterminées :** $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.
5. **Croissances comparées :** $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$. En cas d'affrontement, l'exponentielle l'emporte toujours sur les polynômes.
6. **Composée :** $\lim_{x\to a} f(x) = b$ et $\lim_{X\to b} g(X) = c \Longrightarrow \lim_{x\to a} g(f(x)) = c$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 45.1 Déterminer par lecture immédiate ou opérations élémentaires les limites suivantes : 1. $\lim_{x\to+\infty}(3x^3 - 5x + 1)$ 2. $\lim_{x\to-\infty}(-2x^4 + x^2)$ 3. $\lim_{x\to+\infty}\left(4 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^3}\right)$ 4. $\lim_{x\to0^+}\left(\frac{3}{x} - 2\right)$

Exercice 45.2 Déterminer les asymptotes éventuelles (verticales et horizontales) aux courbes des fonctions suivantes : 1. $f(x) = \frac{2x+7}{x-3}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{3\}$ 2. $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{-2;2\}$ 3. $h(x) = 5 + e^{-x}$ sur $[0\,;+\infty[$

Exercice 45.3 Calculer la limite à gauche et la limite à droite de $f(x) = \frac{x+1}{x-4}$ en $x_0 = 4$. La fonction admet-elle une limite globale en 4 ?

Exercice 45.4 Lever l'indétermination pour les fonctions rationnelles suivantes : 1. $\lim_{x\to+\infty}\frac{4x^2-3x+1}{2x^2+5x}$ 2. $\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+2}{5x^4-x}$ 3. $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^5-1}{x^2+100}$

Exercice 45.5 Utiliser les croissances comparées de l'exponentielle pour déterminer : 1. $\lim_{x\to+\infty}(e^x - 3x^4)$ 2. $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+2}{x^3+1}$ 3. $\lim_{x\to-\infty}(x^2+1)e^x$

Exercice 45.6 Soit $f(x) = \sqrt{2x+3}$. Déterminer $\lim_{x\to3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}$ en reconnaissant un taux d'accroissement.

Exercice 45.7 Soit $f(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x^2+1}$. Démontrer que la droite $y = 2x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et déterminer la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à cette droite.

Exercice 45.8 Déterminer par composition : $\lim_{x\to+\infty}\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$ et $\lim_{x\to0^+}\exp\left(-\frac{1}{x}\right)$.

Niveau (Réflexion et type Bac)

Exercice 45.9 (Type Bac : Étude de fonction avec exponentielle). On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x-2)e^x + x.$$

1. Déterminer la limite de f en $-\infty$. 2. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$. 3. Préciser la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (Δ) sur $]-\infty\,;+\infty[$. 4. Déterminer la limite de f en $+\infty$.

Exercice 45.10 (Quantité conjuguée et asymptotes). Soit $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$. 1. Déterminer la limite de f en $+\infty$. 2. Démontrer que pour tout $x > 0$:

$$f(x) - (x-1) = \frac{2}{\sqrt{x^2-2x+3} + (x-1)}.$$

3. En déduire que la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe en $+\infty$.

Exercice 45.11 (Le piège de la racine en $-\infty$). Reprendre la fonction de l'exercice 45.10 en $-\infty$. Démontrer que la droite d'équation $y = -x + 1$ est asymptote oblique à la courbe en $-\infty$.

Exercice 45.12 (Modélisation de population : la courbe logistique). Le nombre d'individus d'une population animale (en milliers) au cours du temps $t \geq 0$ (en années) est modélisé par :

$$N(t) = \frac{10}{1 + 9e^{-0{,}5t}}.$$

1. Calculer la population initiale $N(0)$. 2. Déterminer $\lim_{t\to+\infty} N(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte du biotope (notion de capacité de charge). 3. Déterminer l'équation de l'asymptote horizontale au graphe de N.

Exercice 45.13 (Forme indéterminée résolue par factorisation habile). Déterminer les limites suivantes : 1. $\lim_{x\to1}\frac{x^3-1}{x^2-1}$ 2. $\lim_{x\to4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ 3. $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

Exercice 45.14 (Fonction rationnelle et décomposition en éléments simples). Soit $f(x) = \frac{3x^2+5x-2}{x+1}$. 1. Trouver trois réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ pour tout $x \neq -1$. 2. En déduire toutes les asymptotes à la courbe de f. 3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux asymptotes.

Exercice 45.15 (Composée et fonctions trigonométriques). 1. Déterminer $\lim_{x\to+\infty}\cos\left(\frac{\pi x+1}{2x-3}\right)$. 2. Démontrer que la fonction $g(x) = x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ admet pour limite 1 en $+\infty$. (Poser $X = 1/x$).

Exercice 45.16 (Gendarmes pour les fonctions). Soit $f(x) = \frac{2x+\sin(x)}{x-1}$ définie sur $]1\,;+\infty[$. 1. Montrer que pour tout $x > 1$: $\frac{2x-1}{x-1} \leq f(x) \leq \frac{2x+1}{x-1}$. 2. En déduire $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.

Exercice 45.17 (Étude complète d'une limite avec paramètre). Soit $f_m(x) = \frac{mx^2+4x-1}{2x^2+3}$ où m est un paramètre réel. Déterminer la limite de $f_m(x)$ quand $x \to +\infty$ selon les valeurs du réel m.

Niveau (Défi et approfondissement)

Exercice 45.18 (La règle de L'Hôpital — Hors-programme / Supérieur). Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle ouvert contenant a, telles que $f(a) = g(a) = 0$ et $g'(a) \neq 0$. 1. En écrivant $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}}$, démontrer que :

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

2. Utiliser ce résultat pour calculer : $\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - \cos(x)}{x}$.

Exercice 45.19 (Asymptote parabolique). Soit la fonction $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$. 1. Montrer qu'il existe un polynôme du second degré $P(x)$ et un réel R tels que $f(x) = P(x) + \frac{R}{x-1}$. 2. En déduire que lorsque $x \to \pm\infty$, la courbe de f se rapproche d'une parabole d'équation $y = P(x)$ (notion de parabole asymptote).

Exercice 45.20 (Une fonction sans aucune limite en zéro). On considère la fonction $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ définie sur $\mathbb{R}^*$. 1. Calculer les valeurs de $f(x)$ pour les suites $u_n = \frac{1}{2n\pi}$ et $v_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$ avec $n \geq 1$. 2. Quelles sont les limites de (u_n) et (v_n) quand $n \to +\infty$? 3. En déduire que la fonction f ne possède aucune limite en 0.

Exercice 45.21 (Croissances comparées généralisées : preuve pour tout $n \in \mathbb{N}^*$). On sait que $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. 1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x > 0$:

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^{x/n}}{x/n} \right)^n.$$

2. En posant $u = \frac{x}{n}$, en déduire que $\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Exercice 45.22 (L'escalier du diable et limites à l'infini). Soit $f(x) = x - E(x)$ où $E(x)$ désigne la partie entière de x (le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x). 1. Tracer l'allure de la courbe de f sur $[-2\,;3]$. 2. La fonction admet-elle une limite quand $x \to +\infty$? 3. Déterminer la limite à gauche et la limite à droite de f en tout entier relatif $k \in \mathbb{Z}$.

Solutions

Solutions du Niveau

- **45.1 :**
  1. $\lim(3x^3 - 5x + 1) = \lim 3x^3 = +\infty$.
  2. $\lim(-2x^4 + x^2) = \lim -2x^4 = -\infty$ (car $x^4 \to +\infty$ et $-2 < 0$).
  3. $\lim(4 - 0 + 0) = 4$.
  4. Pour $x \to 0^+$, $3/x \to +\infty$, donc $\lim = +\infty$.
- **45.2 :**
  1. $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 2 \Longrightarrow y = 2$ asymptote horizontale. $\lim_{x \to 3} f(x) = \pm\infty \Longrightarrow x = 3$ asymptote verticale.
  2. $\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = 0 \Longrightarrow y = 0$ asymptote horizontale. $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$, d'où deux asymptotes verticales : $x = 2$ et $x = -2$.
  3. $\lim_{x \to +\infty} e^{-x} = 0 \Longrightarrow \lim_{x \to +\infty} h(x) = 5 \Longrightarrow y = 5$ asymptote horizontale en $+\infty$.
- **45.3 :** Numérateur : $4 + 1 = 5 > 0$. Dénominateur : $x - 4 \to 0$.
  - Si $x > 4$, $x - 4 > 0 \Longrightarrow \lim_{x \to 4^+} f(x) = +\infty$.
  - Si $x < 4$, $x - 4 < 0 \Longrightarrow \lim_{x \to 4^-} f(x) = -\infty$. Comme ces limites diffèrent, il n'existe pas de limite globale en 4.
- **45.4 :**
  1. $\lim \frac{x^2(4 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(2 + 5/x)} = \frac{4}{2} = 2$.
  2. $\lim \frac{x^3}{5x^4} = \lim \frac{1}{5x} = 0$.
  3. $\lim \frac{x^5}{x^2} = \lim x^3 = +\infty$.
- **45.5 :**
  1. $e^x - 3x^4 = x^4\left(\frac{e^x}{x^4} - 3\right) \to +\infty \times (+\infty - 3) = +\infty$.

2. $\frac{e^x(1+2e^{-x})}{x^3(1+x^{-3})} = \frac{e^x}{x^3} \times \frac{1+2e^{-x}}{1+x^{-3}} \to +\infty \times 1 = +\infty$.
3. $(x^2+1)e^x = x^2e^x + e^x \to 0 + 0 = 0$ par croissances comparées en $-\infty$.

- **45.6 :** $f(3) = \sqrt{9} = 3$. La limite est le nombre dérivé $f'(3)$. Comme $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$, on a $f'(3) = \frac{1}{3}$.
- **45.7 :** $f(x) - (2x-1) = \frac{3}{x^2+1} \to 0$ en $+\infty$, donc $y = 2x-1$ est asymptote oblique. Comme $x^2+1 > 0$, la différence est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'asymptote.
- **45.8 :**
  - $\lim_{x\to+\infty}(-1/x^2) = 0$, donc $\lim \exp(-1/x^2) = e^0 = 1$.
  - $\lim_{x\to 0^+}(-1/x) = -\infty$, donc $\lim_{X\to-\infty} e^X = 0$.

Solutions du Niveau

- **45.9 :**
  1. En $-\infty$, $(x-2)e^x = xe^x - 2e^x \to 0 - 0 = 0$ par croissances comparées. Comme $\lim_{x\to-\infty} x = -\infty$, on a $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
  2. $f(x) - x = (x-2)e^x \to 0$ quand $x \to -\infty$. Donc $(\Delta) : y = x$ est asymptote oblique en $-\infty$.
  3. Signe de $f(x) - x = (x-2)e^x$: comme $e^x > 0$, le signe est celui de $x-2$. Sur $]-\infty\,;2[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de (Δ). Sur $]2\,;+\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (Δ). En $x=2$, la courbe coupe son asymptote en $(2;2)$.
  4. En $+\infty$, $x-2 \to +\infty$ et $e^x \to +\infty$, donc $(x-2)e^x \to +\infty$, d'où $\lim f(x) = +\infty$.
- **45.10 :**
  1. $\lim_{x\to+\infty}(x^2-2x+3) = +\infty \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
  2. Pour $x > 0$:

$$(x-1) = \frac{(\sqrt{x^2-2x+3}-(x-1))(\sqrt{x^2-2x+3}+(x-1))}{\sqrt{x^2-2x+3}+(x-1)} = \frac{(x^2-2x+3)-(x-1)^2}{\sqrt{x^2-2x+3}+(x-1)} = \frac{x^2-2x+3-(x^2-2x+1)}{\sqrt{x^2-2x+3}+(x-1)} = \frac{2}{\sqrt{x^2-2x+3}}$$

  3. Quand $x \to +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0. Ainsi, $y = x-1$ est asymptote oblique en $+\infty$.
- **45.11 :** Quand $x \to -\infty$, on pose $X = -x > 0$. $f(x) = \sqrt{X^2+2X+3}$. L'asymptote conjecturée est $y = -x+1 = X+1$. $\quad f(x) - (-x+1) = \sqrt{X^2+2X+3} - (X+1) = \frac{(X^2+2X+3)-(X+1)^2}{\sqrt{X^2+2X+3}+(X+1)} = \frac{2}{\sqrt{X^2+2X+3}+X+1} \underset{X\to+\infty}{\to} 0$. Donc $y = -x+1$ est bien asymptote oblique en $-\infty$.
- **45.12 :**
  1. $N(0) = \frac{10}{1+9e^0} = \frac{10}{10} = 1$ millier d'individus (soit 1000 individus).
  2. Quand $t \to +\infty$, $-0,5t \to -\infty$, donc $e^{-0,5t} \to 0$. Ainsi $\lim_{t\to+\infty} N(t) = \frac{10}{1+0} = 10$ milliers (10 000 individus). Le biotope ne peut nourrir qu'un maximum de 10 000 animaux en raison des ressources limitées (nourriture, espace) : c'est la capacité de charge du milieu.
  3. L'asymptote horizontale a pour équation $y = 10$.
- **45.13 :**
  1. $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$ et $x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Pour $x \neq 1$, $\frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{x^2+x+1}{x+1} \underset{x\to1}{\to} \frac{3}{2}$.
  2. $\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2} \underset{x\to4}{\to} \frac{1}{4}$.
  3. Quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(1+x)-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \underset{x\to0}{\to} \frac{1}{2}$. (Ou taux d'accroissement de $\sqrt{1+x}$ en 0).
- **45.14 :**
  1. $ax+b+\frac{c}{x+1} = \frac{ax^2+(a+b)x+b+c}{x+1}$. Identification : $a=3$, $a+b=5 \Longrightarrow b=2$, $b+c=-2 \Longrightarrow c=-4$. Donc $f(x) = 3x+2-\frac{4}{x+1}$.
  2. Asymptote verticale : $x=-1$. Asymptote oblique : $y=3x+2$ (car $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-4}{x+1}=0$).
  3. L'asymptote verticale a pour abscisse $x=-1$. Sur l'asymptote oblique, $y = 3(-1)+2 = -1$. Le point d'intersection est $I(-1;-1)$.
- **45.15 :**
  1. $\frac{\pi x+1}{2x-3} = \frac{\pi+1/x}{2-3/x} \to \frac{\pi}{2}$. Par continuité du cosinus : $\lim = \cos(\pi/2) = 0$.
  2. Avec $X = 1/x$, quand $x \to +\infty$, $X \to 0^+$. L'expression devient $\frac{\sin X}{X}$, dont la limite en 0 est $\sin'(0) = \cos(0) = 1$.

- **45.16 :**
  1. Pour tout réel x, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$. On ajoute $2x$: $2x-1 \leq 2x+\sin(x) \leq 2x+1$. Comme $x>1$, $x-1>0$, on divise sans changer l'ordre.
  2. $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x-1}{x-1} = 2$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$. Par le théorème des gendarmes, $\lim f(x) = 2$.
- **45.17 :** $f_m(x) = \frac{x^2(m+4/x-1/x^2)}{x^2(2+3/x^2)} = \frac{m+4/x-1/x^2}{2+3/x^2} \underset{x\to+\infty}{\to} \frac{m}{2}$. La limite est donc $\frac{m}{2}$ pour toute valeur de $m \in \mathbb{R}$.

Solutions du Niveau

- **45.18 :**
  1. Comme $f(a)=g(a)=0$, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}}$. Par quotient de limites de taux d'accroissement, comme $g'(a)\neq 0$, la limite vaut $\frac{f'(a)}{g'(a)}$.
  2. Avec $f(x)=e^{2x}-\cos(x)$ et $g(x)=x$, on a $f(0)=1-1=0$ et $g(0)=0$. $f'(x)=2e^{2x}+\sin(x) \Longrightarrow f'(0)=2+0=2$. $g'(x)=1 \Longrightarrow g'(0)=1$. La limite vaut $\frac{f'(0)}{g'(0)} = \frac{2}{1} = 2$.
- **45.19 :**
  1. Division euclidienne de x^3+2x^2-1 par $x-1$: $x^3+2x^2-1 = (x-1)(x^2+3x+3)+2$. Donc $f(x) = x^2+3x+3+\frac{2}{x-1}$. Ici $P(x)=x^2+3x+3$ et $R=2$.
  2. $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-P(x)] = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{2}{x-1} = 0$. La parabole d'équation $y=x^2+3x+3$ épouse le tracé de la courbe à l'infini.
- **45.20 :**
  1. $f(u_n) = \sin(2n\pi) = 0$. $f(v_n) = \sin(2n\pi+\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$.
  2. $\lim u_n = 0$ et $\lim v_n = 0$.
  3. Si f avait une limite L en 0, alors pour toute suite tendant vers 0, l'image devrait tendre vers L. Or $f(u_n)\to 0$ et $f(v_n)\to 1$. Comme $0\neq 1$, f oscille infiniment vite au voisinage de 0 et n'admet aucune limite en 0.
- **45.21 :**
  1. $\frac{1}{n^n}\left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n = \frac{1}{n^n}\frac{(e^{x/n})^n}{(x/n)^n} = \frac{e^x}{n^n\frac{x^n}{n^n}} = \frac{e^x}{x^n}$.
  2. Posons $u=x/n$. Quand $x\to+\infty$, $u\to+\infty$. Comme $\lim_{u\to+\infty}\frac{e^u}{u}=+\infty$, on a $\lim_{u\to+\infty}\left(\frac{e^u}{u}\right)^n = +\infty$. En multipliant par la constante strictement positive $\frac{1}{n^n}$, on conclut que $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$.
- **45.22 :**
  1. $f(x)$ est la « partie décimale » (ou fractionnaire) de x. C'est une fonction en dents de scie, périodique de période 1, formée de segments obliques de pente 1 valant 0 en k et tendant vers 1 en k^-.
  2. La fonction oscille périodiquement entre 0 et 1 quand $x\to+\infty$, elle n'admet donc aucune limite en $+\infty$.
  3. Soit $k\in\mathbb{Z}$. Pour $x\in[k\,;k+1[$, $E(x)=k$, donc $f(x)=x-k \underset{x\to k^+}{\to} 0$. Pour $x\in]k-1\,;k[$, $E(x)=k-1$, donc $f(x)=x-(k-1) \underset{x\to k^-}{\to} k-k+1=1$. La limite à droite vaut 0 et la limite à gauche vaut 1 : la courbe subit un saut de hauteur 1 à chaque entier.

La question qui ouvre la suite

Nous venons de voir que certaines fonctions subissent de brutales ruptures : des asymptotes verticales où la courbe se déchire vers l'infini, ou des marches d'escalier où la courbe saute sans prévenir d'une altitude à une autre. Mais la plupart des lois de la nature — la trajectoire d'une balle de tennis, le niveau de l'eau qui monte dans un vase, la croissance d'une plante — ne connaissent pas de tels sauts instantanés. Comment exprimer avec la plus haute rigueur mathématique l'idée qu'une courbe se trace **d'un seul trait de crayon, sans jamais lever la pointe de la feuille** ? Et pourquoi cette propriété fondamentale garantit-elle qu'en traversant un fleuve d'une rive à l'autre, on est absolument certain de couper le courant au milieu ?

C'est l'essence de la **continuité** et du prestigieux **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)**. Rendez-vous au chapitre 46.

CHAPITRE 46 : Le Fil sans Coupure

> « Natura non facit saltus — La nature ne fait pas de sauts, disait Gottfried Wilhelm Leibniz. Si un train quitte Paris à midi et entre en gare de Lyon à deux heures, il n'a pas disparu à Dijon pour réapparaître subitement cinquante kilomètres plus loin. Il a foulé chaque mètre, chaque millimètre de rail sans jamais lever les roues. En mathématiques, cette fidélité au chemin s'appelle la continuité, et elle possède le pouvoir magique de garantir qu'une équation a une solution même lorsqu'on est incapable de la calculer à la main. »

Ce que tu vas découvrir

- L'intuition motrice de la **continuité** : le tracé que l'on effectue d'un seul trait de crayon sans jamais décoller la mine de la feuille, et sa traduction formelle $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Pourquoi la quasi-totalité des fonctions de la physique et des sciences sont continues, et le lien crucial : **dérivable implique continue** (mais la réciproque est fausse !).
- Le **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)** : l'assurance absolue de traverser un fleuve si l'on passe d'une rive à l'autre.
- Le **corollaire de la bijection** (ou TVI pour fonctions strictement monotones) : l'outil n°1 du baccalauréat pour prouver l'existence et l'unicité de la solution d'une équation $f(x) = k$.
- La méthode d'encadrement par **dichotomie** et son implémentation en **Python**.
- Les suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: comment la continuité de f force la limite de la suite à être un **point fixe** ($f(L) = L$).

---

1. Le problème : traverser la rivière sans se téléporter

1.1 La randonneuse et le pont invisible

Imagine une randonneuse qui part d'une vallée située à 500 mètres d'altitude à 8 heures du matin. À midi, elle atteint le sommet de la montagne à 2200 mètres. Peux-tu affirmer avec certitude qu'à un moment précis de la matinée, son altimètre a affiché très exactement 1500 mètres ?

Le Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) : f continue sur [a, b]



Puisque le tracé ne comporte aucune déchirure, la droite horizontale y = k est obligatoirement traversée au moins une fois

Fig. 102. – Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) sur un intervalle fermé

La réponse est évidemment **oui**. À moins que la randonneuse ne possède un appareil de téléportation de science-fiction, son corps s'est déplacé continûment dans l'espace. Elle n'a pas pu passer sous la barre des 1500 m puis au-dessus sans **couper** le plan horizontal des 1500 m.

Considère maintenant un autre phénomène : le tarif d'un stationnement souterrain.

- De 0 à 1 heure : $2,00$ €.
- De 1 heure à 2 heures : $4,00$ €.

Si tu es resté garé 1 heure et 1 seconde, l'automate t'affiche directement $4,00$ €. Le prix a fait un **saut brutal**. Il n'a jamais valu $2,87$ € ni $3,50$ €. La fonction tarifaire est **discontinue**.



Fig. 103. – Continuité mathématique : trajectoire continue vs saut de palier

La question fondamentale de l'analyse mathématique est la suivante : *quelles garanties mathématiques possède-t-on lorsqu'une courbe n'a pas de coupure ?*

---

2. La Continuité : du trait de crayon à la définition formelle

2.1 Définition en un point

Intuitivement, une fonction est continue si l'on peut tracer sa courbe représentative sans lever le crayon. Mais comment un ordinateur ou une équation peuvent-ils « savoir » si un crayon s'est levé ? Les mathématiciens traduisent cette idée motrice par une égalité de limites :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Continuité en un point.** Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant x_0. On dit que f **est continue en** x_0 si :

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Décomposition du geste : Pour que cette égalité soit vraie, trois conditions doivent être réunies : 1. $f(x_0)$ existe (la fonction est bien définie au point x_0) ; 2. $f(x)$ admet une limite finie lorsque $x \to x_0$; 3. Cette limite coïncide rigoureusement avec la valeur réelle $f(x_0)$.

Si $\lim_{x \to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \to x_0^+} f(x)$, ou si la limite ne vaut pas $f(x_0)$, la courbe présente une rupture (un trou, ou un saut) : f est dite **discontinue** en x_0.

2.2 Continuité sur un intervalle

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Continuité sur un intervalle.** Une fonction f est dite **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point x_0 de cet intervalle.

2.3 Continuité des fonctions usuelles

Toutes les fonctions de référence étudiées au lycée sont continues sur chaque intervalle où elles sont définies :

- Les fonctions **polynômes** (droites, paraboles…) sont continues sur $\mathbb{R}$.
- Les fonctions **rationnelles** (quotients de polynômes) sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.
- La fonction **racine carrée** $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0\,;+\infty[$.
- La fonction **valeur absolue** $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction **exponentielle** $x \mapsto e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Les fonctions trigonométriques cos et sin sont continues sur $\mathbb{R}$.

De plus, la somme, le produit, le quotient (si le dénominateur ne s'annule pas) et la **composée** de fonctions continues sont des fonctions continues.

2.4 Le lien capital : Dérivabilité et Continuité

📐 Théorème fondamental — Dérivable implique continue.

Si une fonction f est dérivable en un point x_0, alors elle est **nécessairement continue** en x_0. Si f est dérivable sur un intervalle I, alors elle est continue sur I.

✍️ Démonstration (exigible).

Supposons f dérivable en x_0. Cela signifie que le taux d'accroissement admet une limite finie notée $f'(x_0)$:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Écrivons pour tout $x \neq x_0$:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \times (x - x_0).$$

Passons à la limite quand $x \to x_0$ en appliquant la règle du produit de limites :

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right) \times \lim_{x \to x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \times 0 = 0.$$

On en déduit immédiatement :

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

La fonction f est donc bien continue en x_0. ■

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — La réciproque est FAUSSE !** Une fonction peut être parfaitement continue en un point sans y être dérivable. **Contre-exemple absolu n°1 : La fonction valeur absolue $f(x) = |x|$ en 0.** Sa courbe forme une pointe (un V). Elle se trace sans lever le crayon, elle est continue en 0 car $\lim_{x \to 0} |x| = 0 = |0|$. Mais son taux d'accroissement en 0 vaut :

- $\frac{|x|-0}{x-0} = \frac{x}{x} = 1$ pour $x > 0$;
- $\frac{|x|-0}{x-0} = \frac{-x}{x} = -1$ pour $x < 0$. La limite à droite (1) et la limite à gauche (-1) sont différentes : f n'est **pas dérivable en 0**. **Contre-exemple n°2 :** $f(x) = \sqrt{x}$ en 0 est continue en 0 mais non dérivable (tangente verticale).

> ⚠ ⚠ **Existence vs Unicité : ne confondez jamais le TVI et son corollaire !**
>
> C'est l'une des erreurs les plus pénalisées aux examens :
> - Le **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)** classique garantit uniquement l'**existence d'au moins une solution** à l'équation $f(x) = k$. Si la fonction ondule, il peut exister 3, 5 ou une infinité de solutions !
> - Pour prouver l'**unicité de la solution**, le TVI seul est totalement impuissant : il faut impérativement convoquer son corollaire (dit **théorème de la bijection**), qui exige la condition supplémentaire que la fonction soit **strictement monotone** (strictement croissante ou strictement décroissante) sur l'intervalle.

3. Le Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

3.1 L'énoncé général

Le mathématicien tchèque Bernard Bolzano (1817) puis le Français Augustin-Louis Cauchy (1821) ont donné la première preuve rigoureuse de ce principe géométrique limpide :

> 📐 **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI).**
>
> Soit f une fonction **continue** sur un intervalle fermé $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins un réel** c appartenant à l'intervalle $[a\,;b]$ tel que :
>
> $$f(c) = k.$$

Remarques capitales : - Le théorème affirme l'**existence** d'au moins une solution, mais il n'en donne pas le nombre exact : sur le schéma ci-dessus, il y a deux solutions c_1 et c_2. - Si f n'était pas continue, la courbe pourrait sauter par-dessus la ligne horizontale $y = k$ sans jamais la toucher !

3.2 Le cas particulier du zéro : Théorème de Bolzano

C'est la forme la plus courante dans les applications pratiques :

> 📐 **Corollaire — Changement de signe.**
>
> Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de **signes contraires** (c'est-à-dire $f(a) \times f(b) \leq 0$), alors il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = 0$.

En clair : Pour passer d'une altitude négative (sous l'eau) à une altitude positive (en l'air), une courbe continue doit impérativement percer la surface de l'eau ($y = 0$).

---

4. Le Théorème de la Bijection (TVI pour fonctions strictement monotones)

Au baccalauréat, on ne cherche presque jamais « au moins une solution » : on veut prouver qu'il existe **une et une seule** solution. Pour obtenir l'unicité, il faut interdire à la courbe de faire des demi-tours. On exige donc que la fonction soit **strictement monotone** (toujours strictement croissante ou toujours strictement décroissante).

> 📐 **Théorème — Corollaire du TVI (Théorème de la bijection).**
>
> Soit f une fonction définie sur un intervalle $I = [a\,;b]$. Si : 1. f est **continue** sur $[a\,;b]$; 2. f est **strictement monotone** (strictement croissante ou strictement décroissante) sur $[a\,;b]$;
>
> Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation :
>
> $$f(x) = k$$
>
> admet **une unique solution** α dans l'intervalle $[a\,;b]$.

Extension aux intervalles ouverts ou infinis

Le théorème reste parfaitement valable sur un intervalle ouvert $]a\,;b[$ ou infini comme $]-\infty\,;+\infty[$, $[0\,;+\infty[$, etc. Il suffit de remplacer les valeurs aux bornes $f(a)$ et $f(b)$ par les **limites** de la fonction aux bornes de l'intervalle : Si f est continue et strictement croissante sur $]a\,;b[$, alors pour tout $k \in]\lim_{x\to a^+} f(x)\,;\lim_{x\to b^-} f(x)[$, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans $]a\,;b[$.

> 🧭 **Méthode — La rédaction canonique parfaite au Baccalauréat :**
>
> Pour justifier que l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α sur un intervalle I : 1. **Continuité :** Mentionner que f est continue sur I (par exemple comme somme, produit ou quotient de fonctions usuelles, ou parce qu'elle y est dérivable). 2. **Stricte monotonie :** Indiquer que f est strictement croissante (ou décroissante) sur I, en s'appuyant sur le signe de sa dérivée $f'(x)$. 3. **Appartenance de la valeur cible :** Calculer les images des bornes (ou leurs limites) et vérifier que k appartient à l'intervalle image : $k \in [f(a)\,;f(b)]$ (ou $]\lim_a f\,;\lim_b f[$). 4. **Conclusion :** Écrire : *« D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans I. »*

---

5. Résolution approchée : l'Algorithme de Dichotomie en Python

Le TVI prouve qu'une solution α existe et qu'elle est unique, mais il ne donne pas sa valeur numérique exacte (souvent impossible à exprimer avec des fractions ou des racines simples). Pour trouver une valeur approchée de α avec une précision chirurgicale (par exemple 10^{-6}), on utilise la **méthode de dichotomie** (du grec *dicha*, « en deux », et *tomein*, « couper »).

5.1 Principe du découpage en deux

On sait que la racine α est enfermée dans un intervalle $[a\,;b]$ avec $f(a) \times f(b) < 0$. 1. On calcule le milieu de l'intervalle : $m = \frac{a+b}{2}$. 2. On regarde le signe de $f(m)$:

- Si $f(a)$ et $f(m)$ sont de signes contraires ($f(a) \times f(m) < 0$), alors la racine est dans la moitié gauche : on remplace b par m.
- Sinon, la racine est dans la moitié droite : on remplace a par m.

3. À chaque étape, la largeur de l'intervalle est **divisée par 2**. Au bout de n étapes, l'incertitude sur la racine n'est plus que de $\frac{b-a}{2^n}$.

> **Méthode Pas à Pas**
>
> 🛠️ **Méthode Pas à Pas — Recherche de Racine par Dichotomie**
>
> - Étape 0 : [α] Largeur L
> - Étape 1 : [α] Largeur L/2
> - Étape 2 : [α] Largeur L/4

5.2 Script Python officiel

Considérons l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ sur $[0\,;1]$. La fonction $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue, strictement croissante, $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. Il existe une unique solution $\alpha \in [0\,;1]$.

```python
def f(x):
    """Fonction dont on cherche le zéro."""
    return x**3 + x - 1

def dichotomie(a, b, precision):
    """
    Renvoie un encadrement [a, b] de la racine de f(x) = 0
    avec une largeur b - a <= precision.
    """
    while (b - a) > precision:
        m = (a + b) / 2
        # Si f(a) et f(m) ont le même signe, la racine est dans [m, b]
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b

# Recherche d'un encadrement à 10^-4 près
inf, sup = dichotomie(0.0, 1.0, 1e-4)
print(f"Encadrement obtenu : {inf:.5f} < alpha < {sup:.5f}")
# Affichera : 0.68231 < alpha < 0.68237
```

Vitesse spectaculaire : Pour obtenir une précision de 10^{-6} (un millionième) sur un intervalle de départ de longueur 1 : Comme $2^{20} = 1\,048\,576 > 10^6$, **20 itérations seulement** suffisent pour donner six décimales exactes !

---

6. Suites Récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ et Recherche du Point Fixe

Au chapitre 44, nous avons étudié des suites monotones bornées qui convergeaient vers une limite L. Mais comment calculer cette limite L lorsque la suite est définie par une formule de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$?
C'est ici que la continuité révèle toute sa puissance !

📐 Théorème du Point Fixe.

Soit (u_n) une suite définie par u_0 et par la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si : 1. La suite (u_n) **converge** vers un nombre réel L ; 2. La fonction f est **continue** au point L ;
Alors la limite L est solution de l'équation :

$$f(L) = L.$$

Un tel nombre L est appelé un **point fixe** de la fonction f.

✍️ Démonstration.

Puisque $\lim_{n\to+\infty} u_n = L$, la suite décalée (u_{n+1}) converge évidemment vers la même limite : $\lim_{n\to+\infty} u_{n+1} = L$. D'autre part, comme f est continue en L, par composition de limites :

$$\lim_{n\to+\infty} f(u_n) = f\Big(\lim_{n\to+\infty} u_n\Big) = f(L).$$

Or, pour tout entier n, $u_{n+1} = f(u_n)$. En passant à la limite des deux côtés de l'égalité, on obtient nécessairement :

$$L = f(L). \quad \blacksquare$$

Interprétation géométrique (le diagramme en toile d'araignée / escalier) : La limite L est l'abscisse d'un point d'intersection entre la courbe de la fonction $y = f(x)$ et la première bissectrice d'équation $\boldsymbol{y = x}$.



Fig. 104. – Méthode de l'escalier (Cobweb) : itération graphique de la suite u_(n+1) = f(u_n)

---

7. Attention, pièges !

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Oublier la stricte monotonie.** Si tu écris seulement « f est continue sur $[a;b]$ et k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ », le TVI garantit seulement l'existence d'**au moins une** solution. Pour affirmer qu'il n'y en a **qu'une seule**, la mention de la **stricte monotonie** est rigoureusement indispensable. Sans elle, le correcteur retire des points.

> ⚠ **Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Les fonctions non continues.**
> Considère la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[-1\,;1] \setminus \{0\}$. On a $f(-1) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. Pourtant, l'équation $f(x) = 0$ n'a **aucune solution** ! Pourquoi le TVI ne s'applique-t-il pas ? Parce que la fonction n'est **pas continue en 0** (elle n'y est même pas définie). Le fil est coupé au milieu.

---

8. Exemples Résolus pas à pas

Exemple résolu 1 — Application type Bac du corollaire du TVI

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$. 1. Dresser le tableau de variations complet de f sur $[-3\,;4]$. 2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles dans l'intervalle $[-3\,;4]$.

Solution : 1. **Dérivation et variations :** La fonction f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in [-3\,;4]$:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2).$$

Factorisons le trinôme $x^2 - x - 2$: son discriminant est $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2) = 1 + 8 = 9 = 3^2$. Les racines sont $x_1 = \frac{1-3}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{1+3}{2} = 2$. Donc $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$. Calculons les valeurs remarquables :

- $f(-3) = 2(-27) - 3(9) - 12(-3) + 5 = -54 - 27 + 36 + 5 = -40$.
- $f(-1) = 2(-1) - 3(1) - 12(-1) + 5 = -2 - 3 + 12 + 5 = 12$.
- $f(2) = 2(8) - 3(4) - 12(2) + 5 = 16 - 12 - 24 + 5 = -15$.

- $f(4) = 2(64) - 3(16) - 12(4) + 5 = 128 - 48 - 48 + 5 = 37$.

Tableau de variations :

- Sur $[-3\,;-1]$, $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante de -40 à 12.
- Sur $[-1\,;2]$, $f'(x) < 0$ donc f est strictement décroissante de 12 à -15.
- Sur $[2\,;4]$, $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante de -15 à 37.

2. **Application du corollaire du TVI sur chaque sous-intervalle :**
   - **Sur $[-3\,;-1]$:** f est continue et strictement croissante. Comme $0 \in [-40\,;12]$, d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha_1 \in [-3\,;-1]$.
   - **Sur $[-1\,;2]$:** f est continue et strictement décroissante. Comme $0 \in [-15\,;12]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha_2 \in [-1\,;2]$.
   - **Sur $[2\,;4]$:** f est continue et strictement croissante. Comme $0 \in [-15\,;37]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha_3 \in [2\,;4]$.

   Conclusion : L'équation $f(x) = 0$ admet très exactement **trois solutions distinctes** dans l'intervalle $[-3\,;4]$.

Exemple résolu 2 — Équation avec exponentielle sur un intervalle non borné

Énoncé : Démontrer que l'équation $e^x = \frac{2}{x}$ admet une unique solution réelle sur $]0\,;+\infty[$.

Solution : Pour $x > 0$, l'équation est équivalente à $e^x - \frac{2}{x} = 0$. Considérons la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$g(x) = e^x - \frac{2}{x}.$$

1. **Continuité :** g est la somme de la fonction exponentielle et de la fonction rationnelle $x \mapsto -2/x$, qui sont toutes deux continues sur $]0\,;+\infty[$. Donc g est continue sur $]0\,;+\infty[$. 2. **Variations :** g est dérivable sur $]0\,;+\infty[$:

$$g'(x) = e^x - \left(-\frac{2}{x^2}\right) = e^x + \frac{2}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$, $e^x > 0$ et $\frac{2}{x^2} > 0$, donc $g'(x) > 0$. La fonction g est donc **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$. 3. **Limites aux bornes :**

- En 0^+ : $\lim_{x\to 0^+} e^x = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} \frac{2}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x\to 0^+} g(x) = 1 - (+\infty) = -\infty$.
- En $+\infty$: $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$, donc $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

4. **Conclusion :** La fonction g est continue et strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$. Elle réalise une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur l'intervalle image $\left]\lim_{0^+} g\,;\lim_{+\infty} g\right[=]-\infty\,;+\infty[= \mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, d'après le corollaire du TVI, l'équation $g(x) = 0$, c'est-à-dire $e^x = \frac{2}{x}$, admet une unique solution réelle α sur $]0\,;+\infty[$. *(À la calculatrice : $\alpha \approx 0,853$).*

Exemple résolu 3 — Suite récurrente et point fixe

Énoncé : On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. 2. En déduire que la suite (u_n) converge. 3. Déterminer la valeur exacte de sa limite L (le nombre d'or φ).

Solution : 1. Posons la fonction $f(x) = \sqrt{1+x}$ définie sur $[0\,;2]$. La fonction f est strictement croissante sur $[0\,;2]$ (composée d'une fonction affine croissante et de la racine carrée). Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ ».

- *Initialisation :* $u_0 = 1$, $u_1 = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1,414$. On a bien $1 \leq 1 \leq \sqrt{2} \leq 2$. $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- *Hérédité :* Supposons $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. Appliquons la fonction f, qui est strictement croissante :

  $$f(1) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(2) \Longrightarrow \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \sqrt{3}.$$

  Comme $1 \leq \sqrt{2}$ et $\sqrt{3} \leq 2$, on a bien $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$. $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
- *Conclusion :* Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

2. **Convergence :** La suite (u_n) est croissante et majorée par 2. D'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers une limite réelle L vérifiant $1 \leq L \leq 2$.
3. **Calcul de la limite par le théorème du point fixe :** La fonction $f(x) = \sqrt{1+x}$ est continue sur $[1\,;2]$. D'après le théorème du point fixe, la limite L vérifie :

$$L = f(L) \Leftrightarrow L = \sqrt{1+L}.$$

Comme $L \geq 1 > 0$, cette équation est équivalente en élevant au carré à :

$$L^2 = 1 + L \Leftrightarrow L^2 - L - 1 = 0.$$

C'est l'équation caractéristique du **nombre d'or** ! $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-1) = 5$. Les racines sont $L_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$ et $L_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Comme $L \geq 1$, on retient l'unique valeur positive :

$$L = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi.$$

Exemple résolu 4 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } \ x \leq 2 \\ 3x - 1 & \text{si } \ x > 2 \end{cases}$$

où a est une constante réelle. Déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue sur $\mathbb{R}$.

Solution : - Pour $x < 2$, $f(x) = x^2 + a$ est un polynôme, donc continue sur $]-\infty\,;2[$. - Pour $x > 2$, $f(x) = 3x - 1$ est un polynôme, donc continue sur $]2\,;+\infty[$.

Le seul point critique est $x_0 = 2$. Calculons : 1. La valeur en 2 : $f(2) = 2^2 + a = 4 + a$. 2. La limite à gauche : $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} (x^2 + a) = 4 + a$. 3. La limite à droite : $\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (3x - 1) = 3(2) - 1 = 5$. Pour que f soit continue en 2, il faut et il suffit que la limite à gauche soit égale à la limite à droite et à la valeur en 2 :

$$4 + a = 5 \Leftrightarrow a = 1.$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $a = 1$.

Exemple résolu 5 — Démonstration de l'existence d'une température identique

Énoncé : Un thermomètre enregistre la température $T(x)$ le long d'une route rectiligne de $100\ \text{km}$, où $x \in [0\,;100]$ désigne la distance au point de départ en kilomètres. La fonction T est supposée continue. On constate que la température de départ et la température d'arrivée sont identiques : $T(0) = T(100)$. Démontrer qu'il existe deux points distants de très exactement $50\ \text{km}$ qui ont exactement la même température.

Solution : Considérons la fonction auxiliaire D définie pour tout $x \in [0\,;50]$ par :

$$D(x) = T(x + 50) - T(x).$$

$D(x)$ représente la différence de température entre le point situé au kilomètre $x + 50$ et celui au kilomètre x. 1. **Continuité :** Comme T est continue, la fonction D est continue sur l'intervalle $[0\,;50]$ comme différence de fonctions continues. 2. **Calcul aux extrémités :**

- En $x = 0$: $D(0) = T(50) - T(0)$.
- En $x = 50$: $D(50) = T(100) - T(50)$. Or, par hypothèse, $T(100) = T(0)$. Remplaçons $T(100)$ par $T(0)$:

$$D(50) = T(0) - T(50) = -\big(\,T(50) - T(0)\big) = -D(0).$$

3. **Discussion des signes :**
   - Si $D(0) = 0$, alors $T(50) = T(0)$: les points $x = 0$ et $x = 50$ répondent à la question.
   - Si $D(0) \neq 0$, alors $D(0)$ et $D(50) = -D(0)$ sont de **signes strictement contraires** :

$$D(0) \times D(50) < 0.$$

D'après le Théorème des Valeurs Intermédiaires appliqué à la fonction continue D sur $[0\,;50]$, il existe au moins un réel $c \in]0\,;50[$ tel que :

$$D(c) = 0 \Leftrightarrow T(c+50) - T(c) = 0 \Leftrightarrow T(c+50) = T(c).$$

Les deux points d'abscisses c et $c+50$ sont distants de $50 \ \text{km}$ et ont rigoureusement la même température.

Exemple résolu 6 — Encadrement à la main par dichotomie

Énoncé : On considère la fonction $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur $[1\,;2]$. 1. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [1\,;2]$. 2. Effectuer trois étapes de dichotomie à la main pour trouver un encadrement de α d'amplitude $0,125$.

Solution : 1. f est polynomiale donc continue sur $[1;2]$. Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ pour tout x, donc f est strictement croissante. $f(1) = 1 + 2 - 5 = -2 < 0$ et $f(2) = 8 + 4 - 5 = 7 > 0$. Comme $0 \in [-2\,;7]$, d'après le corollaire du TVI, il existe une unique racine $\alpha \in [1\,;2]$.

2. **Dichotomie :**
   - **Étape 1 :** Milieu de $[1\,;2]$: $m_1 = 1,5$. $f(1,5) = (1,5)^3 + 2(1,5) - 5 = 3,375 + 3 - 5 = 1,375 > 0$. Comme $f(1) < 0$ et $f(1,5) > 0$, la racine est dans :
   $$\alpha \in [1\,;1,5] \quad (\text{amplitude } \ 0,5).$$
   - **Étape 2 :** Milieu de $[1\,;1,5]$: $m_2 = 1,25$. $f(1,25) = (1,25)^3 + 2(1,25) - 5 = 1,953125 + 2,5 - 5 = -0,546875 < 0$. Comme $f(1,25) < 0$ et $f(1,5) > 0$, la racine est dans :
   $$\alpha \in [1,25\,;1,5] \quad (\text{amplitude } \ 0,25).$$
   - **Étape 3 :** Milieu de $[1,25\,;1,5]$: $m_3 = 1,375$. $f(1,375) = (1,375)^3 + 2(1,375) - 5 \approx 2,5996 + 2,75 - 5 = 0,3496 > 0$. Comme $f(1,25) < 0$ et $f(1,375) > 0$, la racine est dans :
   $$\alpha \in [1,25\,;1,375] \quad (\text{amplitude } \ 0,125).$$
   L'encadrement au bout de trois étapes est bien $1,25 \leq \alpha \leq 1,375$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Continuité en un point :** $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
2. **Dérivable implique continue :** toute fonction dérivable sur un intervalle y est continue. La réciproque est fausse (ex: $|x|$ en 0).
3. **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI) :** Si f est continue sur $[a;b]$, elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre $f(a)$ et $f(b)$ au moins une fois.
4. **Corollaire de la bijection :** Si f est **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I, alors l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** dans I pour tout $k \in f(I)$.
5. **Dichotomie :** méthode de division par 2 de l'intervalle pour encadrer numériquement une solution avec une précision arbitraire en un nombre fini d'étapes.
6. **Point fixe :** Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue et si $u_n \to L$, alors $f(L) = L$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 46.1 Parmi les fonctions suivantes, déterminer celles qui sont continues sur leur ensemble de définition : 1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$ sur $\mathbb{R}$ 2. $g(x) = \frac{1}{x-5}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ 3. $h(x) = \sqrt{x-3}$ sur $[3\,;+\infty[$ 4. $k(x) = E(x)$ (partie entière) sur $\mathbb{R}$

Exercice 46.2 Soit la fonction f définie sur $[-2\,;5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$. 1. Calculer $f(-2)$ et $f(5)$. 2. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution sur $[-2\,;5]$.

Exercice 46.3 On donne le tableau de variations d'une fonction g continue sur $[-5\,;4]$: - g est strictement croissante de -3 à 7 sur $[-5\,;-1]$. - g est strictement décroissante de 7 à 1 sur $[-1\,;4]$.

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x)=4$ sur $[-5\,;4]$.

Exercice 46.4 Justifier la continuité de la fonction $f(x)=\frac{e^x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 46.5 Soit $f(x)=x^3+3x-1$. 1. Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. 2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$. 3. En déduire qu'il existe un unique réel $\alpha\in[0\,;1]$ tel que $f(\alpha)=0$.

Exercice 46.6 Soit la suite récurrente définie par $u_0=3$ et $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+1$. On admet qu'elle converge vers L. Déterminer L par le théorème du point fixe.

Exercice 46.7 Soit la fonction définie par morceaux :

$$f(x)=\begin{cases}2x+k & \text{si } \ x\le 1\\ x^2+3 & \text{si } \ x>1\end{cases}$$

Pour quelle valeur de la constante k la fonction f est-elle continue en $x=1$?

Exercice 46.8 Écrire en Python une fonction `f(x)` valant x^2-2, puis utiliser la dichotomie pour approcher $\sqrt{2}$ à 10^{-3} près sur $[1\,;2]$.

Niveau (Réflexion et type Bac)

Exercice 46.9 (Type Bac : Résolution complète et encadrement). On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=x^3-3x^2+1.$$

1. Étudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 2. Dresser le tableau de variations complet de f. 3. Démontrer que l'équation $f(x)=0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. 4. Donner un encadrement d'amplitude $0,1$ de la plus grande solution. 5. En déduire le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 46.10 (Type Bac : Étude d'une fonction auxiliaire pour une tangente). On souhaite étudier la fonction $g(x)=(x-1)e^x+1$ sur $\mathbb{R}$. 1. Déterminer les variations de g sur $\mathbb{R}$. 2. Montrer que $g(x)\ge 0$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, et préciser pour quelle valeur l'égalité a lieu. 3. En déduire la position relative de la courbe de $y=e^x$ par rapport à sa tangente en 1.

Exercice 46.11 (Équation transcendante et point d'intersection). On cherche à déterminer le point d'intersection entre la courbe de l'exponentielle $y=e^{-x}$ et la droite $y=x$. 1. Poser la fonction appropriée et prouver qu'elle admet un unique zéro α sur $\mathbb{R}$. 2. Démontrer que $\alpha\in[0\,;1]$. 3. Écrire une fonction Python qui calcule α à 10^{-6} près.

Exercice 46.12 (Vrai ou Faux rigoureusement justifié). 1. « Si f est continue sur $[a;b]$ et si $f(a)<0$ et $f(b)>0$, alors f s'annule exactement une fois sur $]a;b[$. » 2. « Si f est strictement croissante sur $[a;b]$, alors f est continue sur $[a;b]$. » 3. « Si f est continue sur $]0;1[$, alors l'ensemble de ses images est un intervalle borné. » 4. « Une fonction continue qui ne s'annule jamais sur un intervalle I garde un signe constant sur I. »

Exercice 46.13 (Dichotomie : calcul du nombre d'itérations théoriques). On applique l'algorithme de dichotomie sur un intervalle $[a\,;b]$ de longueur initiale $L_0=4$. 1. Exprimer la longueur L_n de l'intervalle après n itérations. 2. Combien d'étapes au minimum sont nécessaires pour garantir une précision inférieure ou égale à 10^{-5} ?

Exercice 46.14 (Suite récurrente et fonction homographique). On considère la suite (u_n) définie par $u_0=2$ et $u_{n+1}=\frac{4u_n-2}{u_n+1}$. 1. Vérifier que la fonction associée $f(x)=\frac{4x-2}{x+1}$ est continue sur $[1\,;3]$. 2. Déterminer les deux points fixes de la fonction f. 3. On admet que (u_n) converge vers un réel $L\ge 1$. Déterminer sa limite exacte.

Exercice 46.15 (Théorème du point fixe pour une application d'un segment dans lui-même). Soit f une fonction continue de $[0\,;1]$ dans $[0\,;1]$ (c'est-à-dire que pour tout $x\in[0;1]$, $0\le f(x)\le 1$). 1. On pose $g(x)=f(x)-x$. Calculer les signes de $g(0)$ et $g(1)$. 2. En déduire que toute fonction continue de $[0;1]$ dans $[0;1]$ admet au moins un point fixe (c'est le théorème de Brouwer en dimension 1).

Exercice 46.16 (Le paradoxe du moine bouddhiste). Un moine monte à un monastère au sommet d'une montagne en empruntant un unique sentier. Il part à 6h du matin le samedi et arrive à 18h au sommet. Le dimanche, il redescend par le même sentier en partant à 6h du matin et arrive en bas à 18h. Démontrer qu'il existe un endroit sur le sentier où le moine se trouve à la même heure exacte le samedi et le dimanche.

Exercice 46.17 (Continuité et injectivité). Démontrer qu'une fonction continue sur un intervalle I est injective (deux réels distincts ont des images distinctes) si et seulement si elle est strictement monotone sur I.

Niveau (Défi et approfondissement)

Exercice 46.18 (La fonction de Dirichlet : discontinue en tout point). On considère la fonction indicatrice des rationnels f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } & x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ si } & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

1. En utilisant le fait que dans tout intervalle ouvert non vide, il existe au moins un rationnel et un irrationnel (densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$), démontrer que pour tout réel x_0, f n'admet aucune limite en x_0. 2. En déduire que f est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$.

Exercice 46.19 (Théorème de Borsuk-Ulam en dimension 1 : les antipodes terrestres). La température à la surface de l'équateur terrestre est modélisée par une fonction continue $T(\theta)$, où $\theta \in [0\,;2\pi]$ est la longitude en radians (0 et 2π représentant le même point méridien de Greenwich, de sorte que $T(0) = T(2\pi)$). Démontrer qu'il existe au moins deux points antipodaux sur l'équateur qui possèdent rigoureusement la même température :

$$\exists \theta_0 \in [0\,;\pi], \quad T(\theta_0 + \pi) = T(\theta_0).$$

Exercice 46.20 (L'équation fonctionnelle de Cauchy). Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction **continue** vérifiant pour tous réels x et y :

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

1. Calculer $f(0)$, puis exprimer $f(n)$ en fonction de n et de $c = f(1)$ pour tout entier naturel n. 2. Démontrer que pour tout entier relatif p, $f(p) = c \cdot p$. 3. Démontrer que pour tout rationnel $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $f(r) = c \cdot r$. 4. En utilisant la continuité de f et la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, conclure que pour tout réel $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = c \cdot x$ (les seules solutions continues sont les fonctions linéaires).

Exercice 46.21 (Théorème du passage de la douane / théorème de la corde de longueur $1/n$). Soit f une fonction continue sur $[0\,;1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On pose $g(x) = f\big(x + \frac{1}{n}\big) - f(x)$ définie sur $\big[0\,;1 - \frac{1}{n}\big]$. 1. Calculer la somme $\sum_{k=0}^{n-1} g\big(\frac{k}{n}\big)$. 2. En déduire qu'il existe au moins un réel $x_0 \in \big[0\,;1 - \frac{1}{n}\big]$ tel que $f\big(x_0 + \frac{1}{n}\big) = f(x_0)$.

Exercice 46.22 (Accélération de la dichotomie : la méthode de Newton). La méthode de Newton remplace le milieu du segment par l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

1. Écrire un script Python pour calculer le zéro de $f(x) = x^2 - 2$ en partant de $x_0 = 1$. 2. Observer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir 10 décimales exactes comparé à la dichotomie (convergence quadratique).

Solutions

Solutions du Niveau

- **46.1 :**
  1. f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.
  2. g est rationnelle, donc continue sur son domaine $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.
  3. h est la composée de $x \mapsto x - 3$ et de la racine carrée, continue sur $[3\,;+\infty[$.
  4. $k(x)$ n'est pas continue : elle fait un saut de 1 à chaque entier relatif.
- **46.2 :**
  1. $f(-2) = (-2)^2 - 4(-2) + 1 = 4 + 8 + 1 = 13 > 0$. $f(5) = 25 - 20 + 1 = 6 > 0$. Attention : ici $f(-2)$ et $f(5)$ sont tous deux positifs, mais calculons le sommet de la parabole en $x = 2$: $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3 <$

0. Comme f est continue sur $[-2\,;2]$ avec $f(-2) > 0$ et $f(2) < 0$, d'après le TVI, elle s'annule sur $[-2\,;2] \subset [-2\,;5]$.

- **46.3 :**
  - Sur $[-5\,;-1]$, g est continue et strictement croissante de -3 à 7. Comme $4 \in [-3\,;7]$, il y a exactement une solution.
  - Sur $[-1\,;4]$, g est continue et strictement décroissante de 7 à 1. Comme $4 \in [1\,;7]$, il y a exactement une solution.

  Au total, l'équation $g(x) = 4$ admet exactement **2 solutions** sur $[-5\,;4]$.
- **46.4 :** L'exponentielle est continue sur $\mathbb{R}$, le polynôme x^2+1 est continu sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule jamais car $x^2+1 \geq 1 > 0$. Le quotient de deux fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas est continu sur $\mathbb{R}$.
- **46.5 :**
  1. $f'(x) = 3x^2+3 = 3(x^2+1) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc f est strictement croissante.
  2. $f(0) = -1$ et $f(1) = 1+3-1 = 3$.
  3. f est continue et strictement croissante sur $[0\,;1]$, et $0 \in [-1\,;3]$. D'après le corollaire du TVI, il existe un unique réel $\alpha \in [0\,;1]$ tel que $f(\alpha) = 0$.
- **46.6 :** La fonction $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème du point fixe, $L = f(L) \Leftrightarrow L = \frac{1}{2}L + 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}L = 1 \Leftrightarrow L = 2$.
- **46.7 :** Pour être continue en 1 : $f(1) = 2(1) + k = 2 + k$. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1^2 + 3 = 4$. On doit avoir $2 + k = 4 \Leftrightarrow k = 2$.
- **46.8 :**

```python
def f(x):
    return x**2 - 2

a, b = 1.0, 2.0
while (b - a) > 1e-3:
    m = (a + b) / 2
    if f(a) * f(m) <= 0:
        b = m
    else:
        a = m
print(f"sqrt(2) ≈ {(a + b)/2:.4f}")
```

Solutions du Niveau

- **46.9 :**
  1. $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim x^3 = -\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
  2. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Racines : $x = 0$ et $x = 2$. $f(0) = 1$ (maximum local) et $f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$ (minimum local). f est croissante sur $]-\infty;0]$, décroissante sur $[0;2]$, croissante sur $[2;+\infty[$.
  3. Sur $]-\infty;0]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ à 1. Comme $0 \in]-\infty;1]$, il y a une unique solution α_1. Sur $[0;2]$, f est continue et strictement décroissante de 1 à -3. Comme $0 \in [-3;1]$, il y a une unique solution α_2. Sur $[2;+\infty[$, f est continue et strictement croissante de -3 à $+\infty$. Comme $0 \in [-3;+\infty[$, il y a une unique solution α_3. Il y a donc exactement 3 solutions réelles.
  4. Pour la plus grande solution $\alpha_3 \in [2;+\infty[$: $f(2) = -3 < 0$, $f(3) = 27 - 27 + 1 = 1 > 0$, donc $\alpha_3 \in [2;3]$. $f(2,8) = (2,8)^3 - 3(2,8)^2 + 1 = 21,952 - 23,52 + 1 = -0,568 < 0$. $f(2,9) = (2,9)^3 - 3(2,9)^2 + 1 = 24,389 - 25,23 + 1 = 0,159 > 0$. Encadrement : $2,8 < \alpha_3 < 2,9$.
  5. Signe : négatif sur $]-\infty;\alpha_1]$, positif sur $[\alpha_1;\alpha_2]$, négatif sur $[\alpha_2;\alpha_3]$, positif sur $[\alpha_3;+\infty[$.
- **46.10 :**
  1. $g'(x) = 1 \cdot e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Comme $e^x > 0$, $g'(x)$ est du signe de x : décroissante sur $]-\infty;0]$ et croissante sur $[0;+\infty[$.
  2. Minimum en 0 : $g(0) = (0-1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$. Comme le minimum absolu est 0, $g(x) \geq 0$ pour tout réel x, avec égalité uniquement en $x = 0$.

3. L'équation de la tangente à $y = e^x$ en $x = 1$ est : $y = e^1(x-1) + e^1 = e \cdot x$. (Ou ici, réécrivons : $(x-1)e^x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^{-x} \geq 1 - x$ en posant un changement approprié, prouvant la convexité).

- **46.11 :**
  1. Soit $h(x) = e^{-x} - x$ sur $\mathbb{R}$. h est continue sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = -e^{-x} - 1 < 0$ (car $-e^{-x} < 0$). Donc h est strictement décroissante. $\lim_{x \to -\infty} h(x) = +\infty$ et $\lim_{x \to +\infty} h(x) = -\infty$. D'après le corollaire du TVI, il existe un unique zéro α sur $\mathbb{R}$.
  2. $h(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$ et $h(1) = e^{-1} - 1 \approx 0,368 - 1 = -0,632 < 0$. Donc $\alpha \in [0\,;1]$.
  3. Script Python :

```python
import math
def h(x):
    return math.exp(-x) - x

a, b = 0.0, 1.0
while (b - a) > 1e-6:
    m = (a + b) / 2
    if h(a) * h(m) <= 0:
        b = m
    else:
        a = m
print(f"Point d'intersection alpha ≈ {(a + b)/2:.6f}")
# alpha ≈ 0.567143 (constante Oméga)
```

- **46.12 :**
  1. **Faux.** Elle s'annule *au moins* une fois, mais peut s'annuler plusieurs fois si elle n'est pas strictement monotone.
  2. **Faux.** Contre-exemple : une fonction en escalier strictement croissante par paliers ou avec des sauts. La stricte monotonie n'implique pas la continuité.
  3. **Faux.** Contre-exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0\,;1[$ est continue, mais son image est $]1\,;+\infty[$, qui n'est pas borné.
  4. **Vrai.** Si elle changeait de signe, le TVI forcerait l'existence d'un zéro, ce qui contredirait l'hypothèse qu'elle ne s'annule jamais.
- **46.13 :**
  1. À chaque étape, la longueur est divisée par 2 : $L_n = \frac{L_0}{2^n} = \frac{4}{2^n} = \frac{1}{2^{n-2}}$.
  2. On cherche n tel que $\frac{4}{2^n} \leq 10^{-5} \Leftrightarrow 2^n \geq 4 \times 10^5 = 400\,000$. Comme $2^{18} = 262\,144$ et $2^{19} = 524\,288$, il faut au minimum **19 étapes**.
- **46.14 :**
  1. $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \notin [1\,;3]$. f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $[1\,;3]$, elle y est donc continue.
  2. Points fixes : $f(x) = x \Leftrightarrow \frac{4x-2}{x+1} = x \Leftrightarrow 4x - 2 = x^2 + x \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$. Racines : $(x-1)(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = 2$.
  3. Si $u_0 = 2$, alors $u_1 = f(2) = 2$: la suite est constante égale à 2. Si elle converge vers $L \geq 1$, par le théorème du point fixe, $L \in \{1; 2\}$. Ici avec $u_0 = 2$, $L = 2$.
- **46.15 :**
  1. $g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$ (car $f(x) \in [0; 1]$). $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ (car $f(1) \leq 1$).
  2. La fonction g est continue sur $[0\,;1]$ car f l'est. Comme $g(0) \geq 0$ et $g(1) \leq 0$, par le TVI, il existe au moins un réel $c \in [0\,;1]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$.
- **46.16 :** Soit $x(t)$ la position du moine le samedi à l'heure $t \in [6\,;18]$ (avec $x(6) = 0$ et $x(18) = D$, où D est la distance totale). Soit $y(t)$ sa position le dimanche à l'heure t (avec $y(6) = D$ et $y(18) = 0$). Posons $h(t) = x(t) - y(t)$. h est continue sur $[6\,;18]$. $h(6) = 0 - D = -D < 0$ et $h(18) = D - 0 = D > 0$. D'après le TVI, il existe un instant $t_0 \in]6\,;18[$ tel que $h(t_0) = 0 \Leftrightarrow x(t_0) = y(t_0)$. À cette heure-là, le moine est exactement au même endroit.
- **46.17 :**
  - Si f est strictement monotone, elle est clairement injective (si $x < y$, alors $f(x) < f(y)$ ou $f(x) > f(y)$, donc $f(x) \neq f(y)$).

- Réciproquement, si f n'est pas strictement monotone, elle admet un changement de sens de variation (ou n'est pas monotone), ce qui crée deux points distincts $a < b$ avec $f(a) = f(b)$ par le TVI, contredisant l'injectivité.

Solutions du Niveau

- **46.18 :**
  1. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Dans tout intervalle $]x_0 - \varepsilon\,;x_0 + \varepsilon[$, il existe une infinité de rationnels (où $f(x) = 1$) et une infinité d'irrationnels (où $f(x) = 0$). Toute suite de rationnels tendant vers x_0 a pour image une suite constante égale à 1. Toute suite d'irrationnels tendant vers x_0 a pour image une suite constante égale à 0.
  2. Puisque les deux limites (1 et 0) sont distinctes, f ne possède aucune limite en x_0. Elle est donc discontinue en tout point de $\mathbb{R}$.
- **46.19 :** Posons $D(\theta) = T(\theta + \pi) - T(\theta)$ pour $\theta \in [0\,;\pi]$. D est continue sur $[0\,;\pi]$. $D(0) = T(\pi) - T(0)$. $D(\pi) = T(2\pi) - T(\pi) = T(0) - T(\pi) = -D(0)$ car $T(2\pi) = T(0)$. Si $D(0) = 0$, $\theta = 0$ convient. Sinon, $D(0)$ et $D(\pi)$ sont de signes opposés : par le TVI, il existe $\theta_0 \in]0\,;\pi[$ tel que $D(\theta_0) = 0 \Leftrightarrow T(\theta_0 + \pi) = T(\theta_0)$.
- **46.20 :**
  1. $f(0+0) = f(0) + f(0) \Longrightarrow f(0) = 0$. Par récurrence, $f(n) = nf(1) = c \cdot n$.
  2. $f(0) = f(p + (-p)) = f(p) + f(-p) = 0 \Longrightarrow f(-p) = -f(p) = -c \cdot p = c \cdot (-p)$. Vrai pour tout $p \in \mathbb{Z}$.
  3. Soit $r = p/q$. Alors $q \cdot f(p/q) = f(q \cdot p/q) = f(p) = c \cdot p \Longrightarrow f(p/q) = c \cdot \frac{p}{q}$.
  4. Pour tout réel x, il existe une suite de rationnels (r_n) convergeant vers x. Par continuité de f : $f(x) = \lim f(r_n) = \lim(c \cdot r_n) = c \cdot x$.
- **46.21 :**
  1. La somme est télescopique :
$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] = f(1) - f(0) = 0.$$
  2. Une somme de n termes qui vaut 0 impose que tous les termes sont nuls, ou bien qu'il y en a au moins un positif (ou nul) et au moins un négatif (ou nul). La fonction continue g prend donc une valeur positive ou nulle et une valeur négative ou nulle. Par le TVI, g s'annule en un point x_0, d'où $f(x_0 + 1/n) = f(x_0)$.
- **46.22 :**
  1. Script Python :

```python
def f(x):
    return x**2 - 2
def f_prime(x):
    return 2*x

x = 1.0
for i in range(5):
    x = x - f(x) / f_prime(x)
    print(f"Étape {i+1} : x = {x:.12f}")
# Étape 1 : 1.500000000000
# Étape 2 : 1.416666666667
# Étape 3 : 1.414215686275
# Étape 4 : 1.414213562375 (12 décimales exactes en 4 étapes !)
```

  2. La dichotomie gagne 1 chiffre binaire par étape (il faut environ 33 étapes pour 10 décimales). Newton double le nombre de décimales exactes à chaque étape (convergence quadratique) : 4 à 5 étapes suffisent !

La question qui ouvre la suite

Nous venons de voir que la continuité assure qu'une courbe ne se déchire jamais. Mais une courbe continue peut être pleine de pointes agressives (comme $|x|$ en zéro) ou de virages cassés. Pour pouvoir parler de **vitesse**, d'**accélération** et de **trajectoire fluide**, il nous faut l'outil suprême du calcul différentiel : la dérivation. Que se passe-t-il lorsque l'on dérive une fonction de fonction, comme une boîte de vitesses mécanique où un premier pignon entraîne un second, qui entraîne un troisième ? Comment la dérivée seconde nous indique-t-elle si une courbe tourne son creux vers le ciel comme un bol qui retient la pluie (**convexité**) ou si elle traverse sa propre tangente (**point d'inflexion**) ?

C'est l'art des engrenages et de la courbure : rendez-vous au chapitre 47.

CHAPITRE 47 : Le Jardin qui Grandit et la Chaîne d'Engrenages

> « Ne mémorise jamais une formule de dérivation comme une incantation magique pour réussir un examen. Regarde les roues dentées d'une bicyclette qui démultiplient l'effort de la pédale à la roue arrière : chaque vitesse multiplie la précédente. Regarde un bol de céramique qui recueille la pluie sans en perdre une goutte : sa forme tournée vers le ciel est une courbe convexe, et c'est l'accélération de sa pente qui décide si elle retient ou si elle verse. »

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi la dérivation d'une fonction composée fonctionne exactement comme une **boîte de vitesses de vélo** : la prestigieuse règle de la chaîne (*chain rule*) $(g \circ u)' = u' \cdot (g' \circ u)$.
- Les trois formules reines indispensables au baccalauréat : la dérivée de $e^{u(x)}$, de $\sqrt{u(x)}$ et de $(u(x))^n$.
- La **dérivée seconde** $f''(x)$: après la vitesse instantanée, voici l'**accélération** et la courbure du tracé.
- La **convexité** : comprendre intuitivement et géométriquement ce qu'est une courbe « en forme de bol » tournée vers le haut ou « en cloche » tournée vers le bas.
- Les équivalences fondamentales du programme : sécantes au-dessus de la courbe, tangentes sous la courbe, et positivité de $f''(x)$.
- Les **points d'inflexion** : l'endroit précis où le cycliste redresse son guidon pour changer de virage, là où la courbe **traverse sa tangente**.
- Les **inégalités de convexité**, dont la célèbre $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x.

---

1. Le problème : les engrenages en cascade et le bol de soupe

1.1 Le cycliste et la boîte de vitesses

Imagine un vélo de course équipé d'un grand plateau de 50 dents au niveau du pédalier et d'un petit pignon de 25 dents sur la roue arrière.

- Lorsque le cycliste fait tourner ses pédales d'un angle x, le plateau avant tourne d'un angle $u = x$.
- La chaîne transmet le mouvement : puisque le pignon a deux fois moins de dents que le plateau, le pignon tourne deux fois plus vite :

$$u \mapsto y = 2u.$$

- La roue arrière, solidaire du pignon, fait tourner le pneu sur le bitume : chaque tour de roue fait avancer le vélo d'une distance $z = 2,10 \times y$ mètres.



Fig. 105. – Convexité, concavité et point d'inflexion : position relative des tangentes

Si le cycliste appuie un peu plus vite sur les pédales (variation Δx) :

- la vitesse intermédiaire varie à un certain rythme : $\frac{\Delta u}{\Delta x}$;
- la vitesse finale de la roue varie par rapport à la vitesse intermédiaire au rythme : $\frac{\Delta z}{\Delta u}$.

À quelle vitesse la distance z varie-t-elle par rapport à l'effort initial x sur les pédales ? La réponse du bon sens physique est immédiate : on **multiplie les rapports de démultiplication** !

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\Delta z}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

Le physicien et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz écrivait cette formule dès 1684 sous la forme lumineuse :

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Les deux du semblent se simplifier comme dans une banale fraction de nombres ! C'est le secret de la dérivation des fonctions composées : **les sensibilités s'enchaînent par multiplication**.

1.2 Le jardinier et le bol qui retient la pluie

Regarde maintenant deux récipients posés dans un jardin au printemps : 1. Un bol creux posé sur sa base : il se remplit d'eau de pluie. Si tu tires un trait droit entre deux points opposés du bord (une sécante), tout le fond du bol plonge **en dessous** du fil. Si tu poses une règle plate tangente sous le bol, tout le récipient repose **au-dessus** de la règle. C'est une courbe **convexe**. 2. Une cloche en verre posée à l'envers : l'eau de pluie glisse le long des parois et s'échappe. Une sécante reste sous la cloche, et une tangente reste au-dessus. C'est une courbe **concave**.

Comment la dérivée peut-elle distinguer ces deux formes ? Comment une seule équation peut-elle prédire si un virage de montagne s'accentue ou s'adoucit ? C'est le rôle de la **dérivée seconde**.

---

2. La Dérivée d'une Fonction Composée : la règle de la chaîne

2.1 Les notations expliquées

- Soit u une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J, et soit g une fonction définie sur J.
- La fonction composée est notée $g \circ u$ (lire « g rond u ») : pour tout $x \in I$, $(g \circ u)(x) = g\big(u(x)\big)$.
- Attention à l'ordre de lecture : dans $g\big(u(x)\big)$, on calcule **d'abord** $u(x)$ (la fonction intérieure), puis on donne le résultat à manger à g (la fonction extérieure).
- La dérivée se note $(g \circ u)'$ ou $[g(u(x))]'$.

2.2 Le Théorème Fondamental

📐 Théorème — Dérivée d'une fonction composée.

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I, et soit g une fonction dérivable sur un intervalle J contenant $u(I)$. Alors la fonction composée $f = g \circ u$ est dérivable sur l'intervalle I, et pour tout réel $x \in I$:

$$(g \circ u)'(x) = u'(x) \times g'\big(u(x)\big).$$

À voix haute : « La dérivée de $g(u)$ est égale à u' multiplié par g' pris en u ».

✍️ Idée de la démonstration.

Soit $x_0 \in I$. On forme le taux d'accroissement de la fonction composée entre x et x_0 :

$$\frac{g(u(x)) - g(u(x_0))}{x - x_0}.$$

Si $u(x) \neq u(x_0)$ au voisinage de x_0, on peut insérer astucieusement le terme intermédiaire $u(x) - u(x_0)$ au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{g(u(x)) - g(u(x_0))}{x - x_0} = \frac{g(u(x)) - g(u(x_0))}{u(x) - u(x_0)} \times \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}.$$

Lorsque $x \to x_0$:

- Par continuité de la fonction dérivable u, on a $\lim_{x \to x_0} u(x) = u(x_0)$.
- En posant $Y = u(x)$ et $Y_0 = u(x_0)$, le premier facteur devient $\frac{g(Y) - g(Y_0)}{Y - Y_0}$, qui tend vers le nombre dérivé $g'(Y_0) = g'\big(u(x_0)\big)$ puisque g est dérivable en $u(x_0)$.
- Le second facteur est le taux d'accroissement de u, qui tend par définition vers $u'(x_0)$. Par produit de limites :

$$(g \circ u)'(x_0) = g'\big(u(x_0)\big) \times u'(x_0) = u'(x_0) \cdot g'\big(u(x_0)\big). \quad \blacksquare$$

---

3. Les Trois Formules Reines du Baccalauréat

Toutes les dérivées délicates de l'épreuve de spécialité mathématiques sont des cas particuliers immédiats de cette règle de la chaîne, où l'on remplace g par les trois grandes fonctions du cours :

3.1 Dérivée de $e^{u(x)}$: la reine des fonctions

Prenons $g(y) = e^y$. On sait que $g'(y) = e^y$. En appliquant la formule générale $(g \circ u)' = u' \cdot g'(u)$:

📐 Propriété — Dérivée de l'exponentielle composée.

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. La fonction $f : x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$:

$$\big(\mathbf{e}^{\mathbf{u(x)}}\big)' = \mathbf{u'(x)}\,\mathbf{e}^{\mathbf{u(x)}}.$$

Exemple éclair : Soit $f(x) = e^{-3x^2+5x}$. Ici $u(x) = -3x^2 + 5x$, donc $u'(x) = -6x + 5$. On applique directement : $f'(x) = (-6x + 5)e^{-3x^2+5x}$.

3.2 Dérivée de $\sqrt{u(x)}$

Prenons $g(y) = \sqrt{y}$ définie pour $y > 0$. Sa dérivée est $g'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

📐 Propriété — Dérivée de la racine carrée composée.

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I. La fonction $f : x \mapsto \sqrt{u(x)}$ est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$:

$$\big(\sqrt{\mathbf{u(x)}}\big)' = \frac{\mathbf{u'(x)}}{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{u(x)}}}.$$

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — La condition $u(x) > 0$.** La fonction $\sqrt{u(x)}$ est définie dès que $u(x) \geq 0$, mais elle n'est **dérivable** que là où $u(x) > 0$ (strictement positif). Si $u(x_0) = 0$, la courbe présente généralement une demi-tangente verticale en x_0, et le dénominateur $2\sqrt{u(x)}$ s'annulerait !

3.3 Dérivée de $(u(x))^n$

Prenons $g(y) = y^n$ avec $n \in \mathbb{Z}^*$. Sa dérivée est $g'(y) = ny^{n-1}$.

📐 Propriété — Dérivée d'une puissance composée.

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. Pour tout entier relatif $n \geq 1$ (ou $n < 0$ sur les intervalles où $u(x) \neq 0$) :

$$\big(\mathbf{u^n}\big)' = \mathbf{n}\,\mathbf{u'(x)}\big(\mathbf{u(x)}\big)^{\mathbf{n-1}}.$$

Cas particulier fondamental : Pour $n = -1$, la formule donne la dérivée de l'inverse :

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \big(u^{-1}\big)' = -1 \cdot u' \cdot u^{-2} = -\frac{\mathbf{u'}}{\mathbf{u^2}}.$$

Tableau récapitulatif comparatif

Fonction simple $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Fonction composée $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Condition de validité
x^n	nx^{n-1}	$\big(u(x)\big)^n$	$\mathbf{n\,u'(x)}\big(\mathbf{u(x)}\big)^{\mathbf{n-1}}$	u dérivable ($u \neq 0$ si $n \leq 0$)
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{u(x)}$	$-\frac{\mathbf{u'(x)}}{\big(\mathbf{u(x)}\big)^{\mathbf{2}}}$	$u(x) \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u(x)}$	$\frac{\mathbf{u'(x)}}{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{u(x)}}}$	$\mathbf{u(x) > 0}$
e^x	e^x	$e^{u(x)}$	$\mathbf{u'(x)}\,\mathbf{e^{u(x)}}$	u dérivable sur I

---

4. La Dérivée Seconde : après la vitesse, l'accélération

4.1 Définition et notations

Lorsque la fonction dérivée f' est elle-même dérivable sur un intervalle I, sa propre dérivée est appelée la **dérivée seconde** de f, et on la note :

$$\mathbf{f''(x)} \quad \text{ou} \quad \frac{\mathbf{d^2 f}}{\mathbf{dx^2}}\mathbf{(x)} \quad \text{(notation de Leibniz)}\ .$$

- $f(x)$ décrit la **position** (altitude, température, capital).
- $f'(x)$ décrit la **vitesse instantanée** d'évolution (pente de la tangente).
- $f''(x)$ décrit l'**accélération** : la vitesse à laquelle la pente elle-même augmente ou diminue.

En physique : Si $x(t)$ est la position d'un mobile au cours du temps, la vitesse est $v(t) = x'(t)$ et l'accélération est $a(t) = v'(t) = x''(t)$. Isaac Newton a fondé toute la mécanique classique sur cette équation universelle :

$$F = m \cdot a = m \cdot x''(t).$$

Sans dérivée seconde, impossible de comprendre la gravitation des planètes ou le freinage d'un véhicule.

---

5. La Convexité : le bol, les cordes et les tangentes

5.1 Définition géométrique fondamentale

Définition Fondamentale

📐 **Définition géométrique — Fonction convexe / concave.** Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous points A et B appartenant à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$, le segment $[AB]$ (la corde) est situé **au-dessus** de la courbe sur l'intervalle entre A et B.
- On dit que f est **concave** sur I si, pour tous points A et B de la courbe, le segment $[AB]$ est situé **en dessous** de la courbe.

Remarque pratique : Une fonction f est concave si et seulement si son opposée $-f$ est convexe.

5.2 Les caractérisations équivalentes (Théorème du programme)

Pour une fonction deux fois dérivable, le programme officiel établit une triple équivalence magistrale reliant la géométrie des cordes, le tracé des tangentes et le calcul différentiel :

📐 **Théorème fondamental — Caractérisations de la convexité.**

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. Les propositions suivantes sont **strictement équivalentes** : 1. f est **convexe** sur I ; 2. La fonction dérivée f' est **croissante** sur I ; 3. Pour tout $x \in I$, la dérivée seconde est positive ou nulle : $\boldsymbol{f''(x) \geq 0}$; 4. La courbe $\mathcal{C}_f$ est entièrement située **au-dessus de toutes ses tangentes**.

Et de façon symétrique pour la concavité :

📐 **Théorème — Caractérisations de la concavité.**

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I. Les propositions suivantes sont équivalentes : 1. f est **concave** sur I ; 2. La fonction dérivée f' est **décroissante** sur I ; 3. Pour tout $x \in I$, la dérivée seconde est négative ou nulle : $\boldsymbol{f''(x) \leq 0}$; 4. La courbe $\mathcal{C}_f$ est entièrement située **en dessous de toutes ses tangentes**.

5.3 Les Inégalités de Convexité

Puisque la courbe d'une fonction convexe est toujours au-dessus de sa tangente en n'importe quel point d'abscisse x_0, on a immédiatement pour tout réel x :

$$\mathbf{f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)}.$$

Appliquons cette propriété magique à la fonction exponentielle $f(x) = e^x$ au point $x_0 = 0$:

- $f(0) = e^0 = 1$;
- $f'(x) = e^x \Longrightarrow f'(0) = 1$;
- $f''(x) = e^x > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc l'exponentielle est **strictement convexe** sur $\mathbb{R}$.

La tangente en 0 a pour équation : $y = 1 \cdot (x - 0) + 1 = x + 1$. Puisque la courbe est au-dessus de sa tangente, on obtient l'inégalité fondamentale du lycée :

📐 Inégalité de convexité remarquable — L'exponentielle au-dessus de sa tangente :

Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathbf{e^x \geq x + 1}.$$

Avec égalité si et seulement si $x = 0$.

Cette inégalité permet de démontrer en deux lignes que $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$, car $e^x \geq x + 1 \to +\infty$.

---

6. Le Point d'Inflexion : le virage qui s'inverse

Imagine que tu conduis une voiture sur une route de campagne sinueuse :

- Au début, la route tourne vers la droite : tu inclines ton volant vers la droite (la courbure est convexe).
- Plus loin, la route tourne vers la gauche : tu inclines ton volant vers la gauche (la courbure devient concave).
- Il y a un instant infinitésimal, pile entre les deux virages, où **ton volant repasse rigoureusement au centre (neutre)**.

Cet instant de transition est un **point d'inflexion**.

6.1 Définition géométrique

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Point d'inflexion.** Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. On appelle **point d'inflexion** tout point $A\left(\ x_0\ ;f(x_0)\right)$ de la courbe $\mathcal{C}_f$ où la courbe **traverse sa tangente**.

6.2 Caractérisation par la dérivée seconde

📐 Théorème fondamental — Condition nécessaire et suffisante d'inflexion.

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I. Le point $A\left(\ x_0\ ;f(x_0)\right)$ est un **point d'inflexion** si et seulement si : **La dérivée seconde f'' s'annule en x_0 EN CHANGEANT DE SIGNE.**

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — L'annulation seule NE SUFFIT PAS !**

C'est l'un des pièges favoris des épreuves de baccalauréat. Si $f''(x_0) = 0$, cela ne garantit **absolument pas** que x_0 soit un point d'inflexion ! Il faut impérativement vérifier que f'' **change de signe** (de $+$ vers $-$ ou de $-$ vers $+$). **Contre-exemple éclatant :** Soit $f(x) = x^4$.

- $f'(x) = 4x^3$;
- $f''(x) = 12x^2$. En $x_0 = 0$, on a bien $f''(0) = 12 \times 0^2 = 0$. Pourtant, pour tout $x \neq 0$, $12x^2 > 0$: la dérivée seconde est toujours positive ! Elle s'annule en 0 sans jamais changer de signe. La courbe de x^4 est entièrement convexe (un bol aplati), et sa tangente en 0 est l'axe des abscisses ($y = 0$). La courbe reste constamment au-dessus de sa tangente : **il n'y a aucun point d'inflexion en 0 !**

---

7. Attention, pièges !

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — Oublier $u'(x)$ dans les dérivées de composées.

- Écrire $\left(e^{5x}\right)' = e^{5x}$ est faux ! La bonne réponse est $5e^{5x}$.
- Écrire $\left(\sqrt{x^2+1}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$ est faux ! La bonne réponse est $\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
- Écrire $\left((3x-2)^4\right)' = 4(3x-2)^3$ est faux ! La bonne réponse est $4 \times 3 \times (3x-2)^3 = 12(3x-2)^3$. Le réflexe absolu : dès que l'argument n'est pas un banal x, **on doit faire sortir $u'(x)$ devant**.

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — Confondre variations et convexité.

- Une fonction peut être **croissante et convexe** (ex: e^x sur $\mathbb{R}$, x^2 sur $[0;+\infty[$).
- Une fonction peut être **croissante et concave** (ex: $\sqrt{x}$ sur $[0;+\infty[$, $\ln x$ sur $]0;+\infty[$).
- Une fonction peut être **décroissante et convexe** (ex: e^{-x} sur $\mathbb{R}$, $\frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$).
- Une fonction peut être **décroissante et concave** (ex: $-x^2$ sur $[0;+\infty[$). Le signe de f' donne les variations (monte ou descend) ; le signe de f'' donne la courbure (creux vers le haut ou bosse vers le bas).

---

8. Exemples Résolus pas à pas

Exemple résolu 1 — Dérivation de composées multiples

Énoncé : Calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes en précisant le domaine de dérivation : 1. $f(x) = e^{-x^2+4x}$ sur $\mathbb{R}$ 2. $g(x) = \sqrt{3x^2+6}$ sur $\mathbb{R}$ 3. $h(x) = (2x^3-5x)^4$ sur $\mathbb{R}$ 4. $k(x) = \frac{1}{(x^2+1)^3}$ sur $\mathbb{R}$

Solution : 1. f est de la forme e^u avec $u(x) = -x^2+4x$. $u'(x) = -2x+4$.

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)} = (-2x+4)e^{-x^2+4x}.$$

2. g est de la forme $\sqrt{u}$ avec $u(x) = 3x^2+6$. Pour tout réel x, $3x^2+6 \geq 6 > 0$, donc g est dérivable sur $\mathbb{R}$. $u'(x) = 6x$.

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+6}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+6}}.$$

3. h est de la forme u^4 avec $u(x) = 2x^3-5x$. $u'(x) = 6x^2-5$.

$$h'(x) = 4\,u'(x)\big(\,u(x)\big)^3 = 4(6x^2-5)(2x^3-5x)^3.$$

4. Écrivons $k(x) = (x^2+1)^{-3}$, soit u^{-3} avec $u(x) = x^2+1$. $u'(x) = 2x$.

$$k'(x) = -3 \cdot u'(x) \cdot \big(\,u(x)\big)^{-4} = -3(2x)(x^2+1)^{-4} = \frac{-6x}{(x^2+1)^4}.$$

Exemple résolu 2 — Étude complète de convexité d'une fonction polynomiale

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 5x - 1$. 1. Calculer $f'(x)$ puis la dérivée seconde $f''(x)$. 2. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe, et ceux sur lesquels f est concave. 3. En déduire les coordonnées des points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Solution : 1. f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme :

- $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 24x + 5$
- $f''(x) = 12x^2 - 12x - 24 = 12(x^2 - x - 2)$.

2. Factorisons le trinôme $x^2 - x - 2$: Ses racines évidentes sont $x_1 = -1$ et $x_2 = 2$ (car $(-1)^2 - (-1) - 2 = 0$ et $2^2 - 2 - 2 = 0$). Le trinôme est du signe de $a = 12 > 0$ à l'extérieur des racines et strictement négatif entre les racines :
   - Pour $x \in]-\infty\,;-1]$, $f''(x) \geq 0$: la fonction f est **convexe**.
   - Pour $x \in [-1\,;2]$, $f''(x) \leq 0$: la fonction f est **concave**.
   - Pour $x \in [2\,;+\infty[$, $f''(x) \geq 0$: la fonction f est **convexe**.
3. La dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe en $x = -1$ et en $x = 2$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet donc deux points d'inflexion :
   - En $x = -1$: $f(-1) = 1 + 2 - 12 - 5 - 1 = -15$. Premier point d'inflexion : $I_1(-1\,;-15)$.
   - En $x = 2$: $f(2) = 16 - 16 - 48 + 10 - 1 = -39$. Second point d'inflexion : $I_2(2\,;-39)$.

Exemple résolu 3 — La courbe en cloche de Gauss : convexité et inflexions

Énoncé : On considère la fonction gaussienne $f(x) = e^{-x^2/2}$ définie sur $\mathbb{R}$. 1. Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f. 2. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe. 3. Déterminer les points d'inflexion de la courbe en cloche de Gauss.

Solution : 1. $f(x) = e^{u(x)}$ avec $u(x) = -\frac{1}{2}x^2$, d'où $u'(x) = -x$.

$$f'(x) = -xe^{-x^2/2}.$$

Comme $e^{-x^2/2} > 0$ pour tout réel x, $f'(x)$ est du signe de $-x$:

- $f'(x) > 0$ sur $]-\infty\,;0[$: f est strictement croissante.
- $f'(x) < 0$ sur $]0\,;+\infty[$: f est strictement décroissante.
- En $x = 0$, $f(0) = e^0 = 1$ est le maximum absolu.

2. Dérivons $f'(x)$ sous forme d'un produit $u \cdot v$ avec $u(x) = -x$ ($u' = -1$) et $v(x) = e^{-x^2/2}$ ($v' = -xe^{-x^2/2}$) :

$$f''(x) = u'v + uv' = (-1)e^{-x^2/2} + (-x)(-xe^{-x^2/2}) = (-1 + x^2)e^{-x^2/2} = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}.$$

   Puisque $e^{-x^2/2} > 0$, le signe de $f''(x)$ est exactement celui de $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$:
   - $f''(x) \geq 0$ sur $]-\infty\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$: f y est **convexe**.
   - $f''(x) \leq 0$ sur $[-1\,;1]$: f y est **concave**.
3. La dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe en $x = -1$ et en $x = 1$. Les ordonnées associées sont $f(-1) = f(1) = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,6065$. La courbe en cloche admet donc exactement **deux points d'inflexion** en $(-1\,;e^{-1/2})$ et $(1\,;e^{-1/2})$. *(En statistiques et probabilités, ces points d'inflexion correspondent exactement à un écart-type $\pm\sigma$ de la moyenne).*

Exemple résolu 4 — Tangente et position relative par convexité

Énoncé : Soit la fonction $f(x) = (2x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$. 1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$. 2. Démontrer que f est convexe sur $[-\frac{1}{2}\,;+\infty[$. 3. Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. 4. En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (T) sur $[-\frac{1}{2}\,;+\infty[$.

Solution : 1. **Dérivées :** $f'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x = (2x+1)e^x$. $f''(x) = 2e^x + (2x+1)e^x = (2x+3)e^x$. 2. **Convexité :** Comme $e^x > 0$, le signe de $f''(x)$ est celui de $2x + 3$. Pour tout $x \geq -\frac{1}{2}$, on a $2x + 3 \geq 2(-\frac{1}{2}) + 3 = -1 + 3 = 2 > 0$. Ainsi, $f''(x) \geq 0$ sur $[-\frac{1}{2}\,;+\infty[$, ce qui prouve que f est **strictement convexe** sur cet intervalle. 3. **Tangente en 0 :** $f(0) = (0-1)e^0 = -1$. $f'(0) = (0+1)e^0 = 1$. L'équation de la tangente (T) est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1(x) - 1 = x - 1.$$

4. **Position relative :** Puisque f est convexe sur $[-\frac{1}{2}\,;+\infty[$ et que le point d'abscisse 0 appartient à cet intervalle ($0 \geq -\frac{1}{2}$), la courbe $\mathcal{C}_f$ est située **au-dessus de sa tangente (T)** sur $[-\frac{1}{2}\,;+\infty[$. C'est-à-dire que pour tout $x \geq -\frac{1}{2}$:

$$(2x - 1)e^x \geq x - 1.$$

Exemple résolu 5 — Dérivation d'une fonction puissance avec quotient

Énoncé : Soit la fonction $f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Calculer sa dérivée $f'(x)$ et déterminer son sens de variation sur son ensemble de définition.

Solution : Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$. Calculons d'abord $u'(x)$ par la formule du quotient $\left(\frac{w}{v}\right)' = \frac{w'v - wv'}{v^2}$:

$$u'(x) = \frac{1(x+1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

La fonction f est de la forme u^3, donc sa dérivée est $f'(x) = 3\,u'(x)\big(\,u(x)\big)^2$:

$$f'(x) = 3 \times \frac{2}{(x+1)^2} \times \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 = \frac{6(x-1)^2}{(x+1)^4}.$$

Étudions le signe de $f'(x)$:

- Le dénominateur $(x+1)^4$ est une puissance 4ème, strictement positive pour tout $x \neq -1$.
- Le numérateur $6(x-1)^2$ est un carré multiplié par 6, donc toujours positif ou nul, s'annulant uniquement en $x = 1$.

Par conséquent, $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in]-\infty\,;-1[\cup]-1\,;+\infty[$. La fonction f est donc **strictement croissante** sur $]-\infty\,;-1[$ et **strictement croissante** sur $]-1\,;+\infty[$.

Exemple résolu 6 — Trouver l'abscisse du point d'inflexion d'un coût moyen

Énoncé : Une entreprise produit une quantité $q \in [0\,;10]$ (en tonnes) d'un polymère chimique. Le coût total de production en milliers d'euros est modélisé par la fonction :

$$C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10.$$

1. Démontrer que le coût marginal $C'(q)$ est strictement croissant sur $[2\,;10]$. 2. Déterminer l'abscisse du point d'inflexion de la courbe du coût total et interpréter économiquement ce point (loi des rendements décroissants).

Solution : 1. Calculons le coût marginal (dérivée première) et sa variation (dérivée seconde) :

$$C'(q) = 3q^2 - 12q + 15.$$

$$C''(q) = 6q - 12 = 6(q-2).$$

Pour tout $q > 2$, $C''(q) > 0$. Donc la fonction C' est **strictement croissante** sur $[2\,;10]$. 2. **Point d'inflexion :** $C''(q) = 0 \Leftrightarrow 6q - 12 = 0 \Leftrightarrow q = 2$.

- Pour $q < 2$, $C''(q) < 0$: la fonction coût est concave.
- Pour $q > 2$, $C''(q) > 0$: la fonction coût est convexe. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe en $q = 2$. Le point d'abscisse $q = 2$ est donc le **point d'inflexion** de la courbe des coûts. *Interprétation économique :*
- Pour $q \in [0\,;2]$, la production bénéficie d'économies d'échelle : chaque tonne supplémentaire coûte moins cher à fabriquer que la précédente (le coût marginal diminue).
- À partir de $q = 2$ tonnes, l'atelier commence à saturer, les machines s'usent, les heures supplémentaires s'accumulent : chaque tonne supplémentaire coûte de plus en plus cher (rendements décroissants). $q = 2$ est le point de bascule de rentabilité.

Ce qu'il faut retenir

1. **Règle de la chaîne :** $(g \circ u)'(x) = u'(x) \cdot g'\,\big(\,u(x)\big)$.
2. **Les 3 dérivées composées indispensables :**
   - $\big(\,e^u\big)' = u'e^u$
   - $\big(\,\sqrt{u}\big)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (pour $u > 0$)
   - $\big(\,u^n\big)' = nu'u^{n-1}$
3. **Convexité et dérivée seconde :**
   - $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow f'$ croissante $\Leftrightarrow f$ convexe $\Leftrightarrow$ courbe au-dessus de ses tangentes.

- $f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow f'$ décroissante $\Leftrightarrow f$ concave $\Leftrightarrow$ courbe en dessous de ses tangentes.

4. **Point d'inflexion :** point où la courbe traverse sa tangente $\Leftrightarrow f''(x)$ s'annule **en changeant de signe**.
5. **Inégalité de convexité fondamentale :** Pour tout réel x, $e^x \geq x + 1$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 47.1 Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes : 1. $f(x) = e^{4x-1}$ 2. $g(x) = e^{-x^3}$ 3. $h(x) = \sqrt{5x+2}$ sur $]-\frac{2}{5}\,;+\infty[$ 4. $k(x) = (3x-7)^5$

Exercice 47.2 Calculer la dérivée seconde $f''(x)$ des fonctions suivantes : 1. $f(x) = 2x^4 - 5x^3 + x - 8$ 2. $g(x) = e^{2x}$ 3. $h(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 47.3 On donne la fonction $f(x) = x^3 - 6x^2 + 2x - 1$. 1. Calculer $f''(x)$. 2. Déterminer les intervalles où f est convexe, et ceux où elle est concave. 3. Préciser le point d'inflexion de sa courbe.

Exercice 47.4 La courbe d'une fonction deux fois dérivable f admet une tangente en $x_0 = 3$ d'équation $y = 4x - 1$. Sachant que $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, comparer sans calcul $f(3,1)$ et $11,4$.

Exercice 47.5 Déterminer la dérivée de $f(x) = \sqrt{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 47.6 Soit $f(x) = xe^{-x}$. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.

Exercice 47.7 Une fonction f vérifie $f''(x) = (x-3)^2(x+1)$. Quelles sont les abscisses des points d'inflexion de la courbe de f ? (Attention au piège !).

Exercice 47.8 Déterminer les variations de $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$.

Niveau (Réflexion et type Bac)

Exercice 47.9 (Type Bac : Étude complète d'une fonction avec exponentielle et convexité). On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x.$$

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (x^2 - 1)e^x$. 2. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$ en précisant les limites en $-\infty$ et en $+\infty$. 3. Calculer $f''(x)$ et prouver que $f''(x) = (x^2 + 2x - 1)e^x$. 4. Déterminer les intervalles de convexité de f. 5. Déterminer les abscisses exactes des points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Exercice 47.10 (Position relative et inégalité de convexité). Soit $f(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0\,;+\infty[$. 1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ pour $x > 0$. 2. En déduire la concavité de la fonction racine carrée sur $]0\,;+\infty[$. 3. Donner l'équation de la tangente (T) à la courbe de la racine carrée en $x_0 = 1$. 4. En déduire que pour tout $x > 0$: $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$. *(Retrouver ainsi l'inégalité arithmético-géométrique entre $\sqrt{x}$ et la moyenne de x et 1).*

Exercice 47.11 (Type Bac : Étude de profil de rampe de skatepark). Un architecte conçoit la coupe transversale d'une rampe de skatepark sur $[-2\,;2]$ modélisée par la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-2x}}.$$

1. Démontrer que $f'(x) = \frac{2e^{-2x}}{(1+e^{-2x})^2}$. 2. Calculer $f''(x)$ et montrer qu'elle s'écrit sous la forme $f''(x) = \frac{4e^{-2x}(e^{-2x}-1)}{(1+e^{-2x})^3}$. 3. Déterminer le point d'inflexion de la rampe. Pourquoi ce point correspond-il à la zone où la pente de la rampe est maximale en valeur absolue ?

Exercice 47.12 (Vrai ou Faux rigoureusement argumenté). 1. « Si $f''(x_0) = 0$, alors la courbe de f admet un point d'inflexion en x_0. » 2. « Si une fonction est strictement croissante, alors elle est convexe. » 3. « La somme de deux fonctions convexes sur un intervalle I est une fonction convexe sur I. » 4. « Le produit de deux fonctions convexes sur I est toujours une fonction convexe sur I. »

Exercice 47.13 (Dérivation d'une fonction composée trigonométrique). Calculer la dérivée des fonctions suivantes : 1. $f(x) = \cos(3x^2 - 2)$ 2. $g(x) = e^{\sin(x)}$ 3. $h(x) = \sin^3(2x)$

Exercice 47.14 (Convexité de l'inverse d'une fonction). Soit u une fonction deux fois dérivable, strictement positive et concave sur un intervalle I. On pose $f = \frac{1}{u}$. 1. Calculer f' puis f'' en fonction de u, u' et u''. 2. Démontrer que f est une fonction convexe sur I.

Exercice 47.15 (Inégalité de convexité pour la fonction carré). Soit $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$. 1. Rappeler pourquoi f est convexe. 2. Écrire la définition géométrique de la convexité pour deux réels quelconques a et b avec le milieu $m = \frac{a+b}{2}$: montrer que $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$. 3. Démontrer algébriquement cette inégalité en développant $\frac{a^2+b^2}{2} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

Exercice 47.16 (Cinématique et freinage d'un TGV). La position (en mètres) d'un train à grande vitesse lors d'une séquence de freinage d'urgence est donnée pour $t \in [0\,;20]$ (en secondes) par :

$$x(t) = -0,15t^3 + 4,5t^2 + 30t.$$

1. Déterminer la vitesse instantanée $v(t) = x'(t)$ du train à $t = 0$ et à $t = 10$ s. 2. Déterminer l'accélération $a(t) = x''(t)$. 3. À quel instant la décélération subie par les passagers est-elle la plus forte en intensité ?

Exercice 47.17 (Étude complète de la dérivée de u^n). Soit la fonction $f(x) = (x^2 - 4x + 3)^3$ sur $\mathbb{R}$. 1. Déterminer les zéros de f. 2. Calculer $f'(x)$ sous forme factorisée. 3. Dresser le tableau de variations complet de f.

Niveau (Défi et approfondissement)

Exercice 47.18 (L'inégalité de Jensen pour les fonctions convexes). Soit f une fonction convexe sur un intervalle I. 1. L'inégalité de convexité pour deux points affirme que pour tout $\lambda \in [0\,;1]$ et tous $x, y \in I$:

$$f\left(\,\lambda x + (1-\lambda)y\,\right) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$

Interpréter cette inégalité géométriquement en reliant λ à la position sur le segment $[AB]$. 2. Par récurrence, démontrer l'inégalité de Jensen pour n nombres : si $x_1, x_2, ..., x_n \in I$, alors :

$$f\Big(\frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}\Big) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + ... + f(x_n)}{n}.$$

3. Appliquer l'inégalité de Jensen à la fonction convexe $f(x) = x^2$ pour démontrer que la moyenne des carrés est toujours supérieure ou égale au carré de la moyenne (variance positive).

Exercice 47.19 (Démonstration rigoureuse de la position relative par Taylor-Lagrange). Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I. Soit $a \in I$. La formule de Taylor avec reste intégral (ou l'inégalité des accroissements finis appliquée à $g(t) = f(t) - f'(a)(t-a)$) montre que pour tout $x \in I$:

$$f(x) - \big[\,f'(a)(x-a) + f(a)\big] = \int_a^x (x-t) f''(t)\,dt.$$

1. Montrer que la fonction intégrée $(x-t)f''(t)$ garde un signe positif pour t entre a et x dès lors que $f''(t) \geq 0$. 2. En déduire de façon analytique pure que toute fonction vérifiant $f'' \geq 0$ est située au-dessus de sa tangente en tout point a.

Exercice 47.20 (Recherche d'un polynôme de degré 3 avec point d'inflexion imposé). On considère un polynôme général de degré 3 : $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$. 1. Calculer $P''(x)$. 2. Démontrer que la courbe de **tout polynôme de degré 3** admet un unique point d'inflexion I, dont l'abscisse est $x_I = -\frac{b}{3a}$. 3. Démontrer que le point d'inflexion I est le centre de symétrie de la courbe de P.

Exercice 47.21 (Composée de deux fonctions convexes). Soient $u : I \to J$ et $g : J \to \mathbb{R}$ deux fonctions deux fois dérivables. 1. Calculer $(g \circ u)''(x)$ en fonction des dérivées premières et secondes de g et de u. 2. Démontrer que si u est convexe et si g est **convexe ET croissante**, alors la composée $g \circ u$ est convexe sur I. 3. Donner un contre-exemple montrant que si g n'est pas croissante, le résultat peut être faux.

Exercice 47.22 (Inégalité arithmético-géométrique générale par convexité). On admet que la fonction $x \mapsto -\ln(x)$ est strictement convexe sur $]0\,;+\infty[$. 1. Soient $x_1, x_2, ..., x_n$ des réels strictement positifs. Appliquer l'inégalité de Jensen à la fonction $-\ln(x)$. 2. En utilisant les propriétés du logarithme, en déduire l'inégalité arithmético-géométrique pour n nombres :

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 ... x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}.$$

Solutions

Solutions du Niveau

- **47.1 :**
  1. $u(x) = 4x - 1 \Longrightarrow u'(x) = 4$. $f'(x) = 4e^{4x-1}$.
  2. $u(x) = -x^3 \Longrightarrow u'(x) = -3x^2$. $g'(x) = -3x^2 e^{-x^3}$.
  3. $u(x) = 5x + 2 \Longrightarrow u'(x) = 5$. $h'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x+2}}$.
  4. $u(x) = 3x - 7 \Longrightarrow u'(x) = 3$. $k'(x) = 5 \times 3 \times (3x-7)^4 = 15(3x-7)^4$.
- **47.2 :**
  1. $f'(x) = 8x^3 - 15x^2 + 1 \Longrightarrow f''(x) = 24x^2 - 30x$.
  2. $g'(x) = 2e^{2x} \Longrightarrow g''(x) = 4e^{2x}$.
  3. $h'(x) = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2} \Longrightarrow h''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$.
- **47.3 :**
  1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 2 \Longrightarrow f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$.
  2. Pour $x \leq 2$, $f''(x) \leq 0$: f est concave. Pour $x \geq 2$, $f''(x) \geq 0$: f est convexe.
  3. f'' s'annule en changeant de signe en $x = 2$. $f(2) = 8 - 24 + 4 - 1 = -13$. Le point d'inflexion est $I(2\,;-13)$.
- **47.4 :** Comme $f''(x) \geq 0$, f est convexe sur $\mathbb{R}$, donc sa courbe est au-dessus de sa tangente $y = 4x - 1$. Pour $x = 3,1$, la tangente vaut $4(3,1) - 1 = 12,4 - 1 = 11,4$. Comme la courbe est au-dessus de la tangente, on a $f(3,1) \geq 11,4$.
- **47.5 :** $u(x) = e^x + 1 > 0$, $u'(x) = e^x$. $f'(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}$.
- **47.6 :** $f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$. $f''(x) = (-1)e^{-x} + (1-x)(-e^{-x}) = (-1-1+x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$.
- **47.7 :** Pour tout réel x, $(x-3)^2 \geq 0$. Donc $f''(x)$ est du signe de $x + 1$.
  - En $x = 3$, $f''(3) = 0$, mais f'' ne change pas de signe autour de 3 : **pas de point d'inflexion en 3 !**
  - En $x = -1$, $f''(-1) = 0$ et f'' passe de négatif à positif : **unique point d'inflexion en $x = -1$.**
- **47.8 :** $f'(x) = x^2 - 2x + 5$. La dérivée de f' est $f''(x) = 2x - 2 = 2(x-1)$. f' est strictement décroissante sur $]-\infty\,;1]$ et strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$.

Solutions du Niveau

- **47.9 :**
  1. $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x = (x-1)^2 e^x$. $f'(x) = (2x-2)e^x + (x^2-2x+1)e^x = (x^2-1)e^x$.
  2. Signe de $f'(x)$: comme $e^x > 0$, du signe de $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Croissante sur $]-\infty;-1]$, décroissante sur $[-1;1]$, croissante sur $[1;+\infty[$. En $-\infty$: $(x^2-2x+1)e^x \to 0$ par croissances comparées. En $+\infty$: $\lim f(x) = +\infty$. Maximum local en -1 : $f(-1) = 4e^{-1} = 4/e \approx 1,47$. Minimum local en 1 : $f(1) = 0$.
  3. $f''(x) = (2x)e^x + (x^2-1)e^x = (x^2+2x-1)e^x$.
  4. Racines de $x^2 + 2x - 1$: $\Delta = 4 - 4(1)(-1) = 8 = (2\sqrt{2})^2$. $x_1 = \frac{-2-2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2} \approx -2,41$. $x_2 = -1 + \sqrt{2} \approx 0,41$. f est convexe sur $]-\infty\,;-1-\sqrt{2}]$ et sur $[-1+\sqrt{2}\,;+\infty[$. f est concave sur $[-1-\sqrt{2}\,;-1+\sqrt{2}]$.
  5. Les abscisses des points d'inflexion sont $x_1 = -1 - \sqrt{2}$ et $x_2 = -1 + \sqrt{2}$.
- **47.10 :**
  1. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$. $f''(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)x^{-3/2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}$.
  2. Pour tout $x > 0$, $4x\sqrt{x} > 0$, donc $f''(x) < 0$: la fonction racine carrée est **strictement concave** sur $]0\,;+\infty[$.
  3. En $x_0 = 1$: $f(1) = 1$, $f'(1) = 1/2$. Tangente : $y = \frac{1}{2}(x-1) + 1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} = \frac{x+1}{2}$.
  4. La courbe d'une fonction concave est entièrement sous ses tangentes, donc pour tout $x > 0$: $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.
- **47.11 :**
  1. $f(x) = (1+e^{-2x})^{-1}$. $f'(x) = -(-2e^{-2x})(1+e^{-2x})^{-2} = \frac{2e^{-2x}}{(1+e^{-2x})^2}$.
  2. On dérive comme un quotient u/v : $u' = -4e^{-2x}$, $v' = 2(1+e^{-2x})(-2e^{-2x}) = -4e^{-2x}(1+e^{-2x})$. $f''(x) = \frac{-4e^{-2x}(1+e^{-2x})^2 - 2e^{-2x}[-4e^{-2x}(1+e^{-2x})]}{(1+e^{-2x})^4} = \frac{-4e^{-2x}(1+e^{-2x}) + 8e^{-4x}}{(1+e^{-2x})^3} = \frac{4e^{-2x}(e^{-2x}-1)}{(1+e^{-2x})^3}$.

3. $f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-2x} - 1 = 0 \Leftrightarrow -2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$. f'' change de signe en 0. Le point d'inflexion est $(0\,;1/2)$. Puisque $f''(0) = 0$, la dérivée première f' admet un extremum en 0 : $f'(0) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. C'est la pente maximale de la rampe.

- **47.12 :**
  1. **Faux.** Contre-exemple : $f(x) = x^4$ en 0 ($f''(0) = 0$ mais $f'' \geq 0$ ne change pas de signe).
  2. **Faux.** Contre-exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ est strictement croissante et strictement concave.
  3. **Vrai.** Si f et g sont convexes, $(f+g)'' = f'' + g'' \geq 0$.
  4. **Faux.** Contre-exemple : $f(x) = x$ et $g(x) = x$ sont convexes sur $\mathbb{R}$ (affines), mais leur produit x^2 est convexe, alors que pour $f(x) = x$ et $g(x) = -x$ (toutes deux convexes/concaves au sens large), le produit est $-x^2$ qui est concave !
- **47.13 :**
  1. $(\cos u)' = -u' \sin u$. $u(x) = 3x^2 - 2 \Longrightarrow u' = 6x$. $f'(x) = -6x \sin(3x^2 - 2)$.
  2. $(e^u)' = u' e^u$. $u(x) = \sin x \Longrightarrow u' = \cos x$. $g'(x) = \cos(x) e^{\sin(x)}$.
  3. $h(x) = v^3$ avec $v(x) = \sin(2x)$. $v'(x) = 2\cos(2x)$. $h'(x) = 3v'v^2 = 3(2\cos(2x))\sin^2(2x) = 6\cos(2x)\sin^2(2x)$.
- **47.14 :**
  1. $f = u^{-1} \Longrightarrow f' = -u'u^{-2} = -\frac{u'}{u^2}$. $f'' = \left(-\frac{u'}{u^2}\right)' = -\frac{u''u^2 - u'(2uu')}{u^4} = -\frac{u''u - 2(u')^2}{u^3} = \frac{2(u')^2 - uu''}{u^3}$.
  2. Comme u est concave, $u'' \leq 0$, donc $-uu'' \geq 0$ (car $u > 0$). Comme $(u')^2 \geq 0$ et $u^3 > 0$, le numérateur $2(u')^2 - uu'' \geq 0$ et le dénominateur est strictement positif. Ainsi $f'' \geq 0$: la fonction f est convexe sur I.
- **47.15 :**
  1. $f''(x) = 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc f est convexe.
  2. Le segment joignant $(a; a^2)$ et $(b; b^2)$ a pour milieu au niveau des ordonnées $\frac{a^2+b^2}{2}$. L'image du milieu des abscisses est $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$. Par convexité, la courbe est sous la sécante : $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$.
  3. $\frac{a^2+b^2}{2} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \frac{2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2}{4} = \frac{a^2-2ab+b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$.
- **47.16 :**
  1. $v(t) = x'(t) = -0,45t^2 + 9t + 30$. $v(0) = 30$ m/s (soit 108 km/h). $v(10) = -0,45(100) + 90 + 30 = -45 + 120 = 75$ m/s.
  2. $a(t) = x''(t) = -0,9t + 9$.
  3. L'accélération $a(t)$ décroît linéairement de $+9$ m/s² à $t = 0$ jusqu'à $a(20) = -0,9(20) + 9 = -18 + 9 = -9$ m/s². La décélération maximale est atteinte à $t = 20$ s avec une intensité de 9 m/s² (presque 1 g !).
- **47.17 :**
  1. $x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-3) = 0$. Les zéros sont 1 et 3.
  2. $f'(x) = 3(2x-4)(x^2-4x+3)^2 = 6(x-2)(x-1)^2(x-3)^2$.
  3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-1)^2(x-3)^2 \geq 0$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $x - 2$. f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;2]$ et strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$. Minimum en $x = 2$: $f(2) = (4 - 8 + 3)^3 = (-1)^3 = -1$. En $x = 1$ et $x = 3$, $f'(x) = 0$: tangentes horizontales avec méplats (points d'inflexion horizontaux).

Solutions du Niveau

- **47.18 :**
  1. $\lambda x + (1-\lambda)y$ est le barycentre des abscisses de $A(x, f(x))$ et $B(y, f(y))$, et $\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ est l'ordonnée correspondante sur le segment $[AB]$. L'inégalité traduit que le point de la courbe est en dessous du point du segment.
  2. Récurrence sur n : vrai pour $n = 2$. Supposons vrai au rang n. Écrivons $\frac{x_1+\ldots+x_{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1}\left(\frac{x_1+\ldots+x_n}{n}\right) + \frac{1}{n+1}x_{n+1}$. Par convexité à 2 points avec $\lambda = \frac{n}{n+1}$, puis par hypothèse de récurrence, on obtient le résultat pour $n+1$.
  3. Avec $f(x) = x^2$: $\left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2 \leq \frac{\sum x_i^2}{n} \Leftrightarrow \overline{x}^2 \leq \overline{x^2} \Leftrightarrow V(X) = \overline{x^2} - \overline{x}^2 \geq 0$.
- **47.19 :**

1. Si $x > a$, pour tout $t \in [a\,;x]$, $x - t \geq 0$. Comme $f''(t) \geq 0$, le produit est positif ou nul. Son intégrale de a à x est positive. Si $x < a$, $x - t \leq 0$ pour $t \in [x\,;a]$. L'intégrale de a à x s'écrit $-\int_x^a (x-t)f''(t)dt = \int_x^a (t-x)f''(t)dt \geq 0$.
2. Dans les deux cas, $f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)] \geq 0$, ce qui prouve rigoureusement que la courbe reste au-dessus de sa tangente en tout point a.

- **47.20 :**
1. $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \Longrightarrow P''(x) = 6ax + 2b$.
2. $P''(x) = 0 \Leftrightarrow 6ax + 2b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{2b}{6a} = -\frac{b}{3a}$. Comme $a \neq 0$, $6ax + 2b$ est une droite de coefficient directeur non nul, elle change impérativement de signe en $x_I = -\frac{b}{3a}$. Tout polynôme cubique a donc un unique point d'inflexion.
3. En effectuant le changement de variable $X = x - x_I$, le terme en X^2 disparaît dans $P(X + x_I)$: le polynôme devient de la forme $aX^3 + pX + Y_I$, qui vérifie $P(X) - Y_I = -(P(-X) - Y_I)$: c'est une fonction impaire centrée en $(x_I ; Y_I)$, d'où la symétrie centrale.

- **47.21 :**
1. $(g \circ u)' = u' \cdot (g' \circ u)$. Par la règle du produit :
$$(g \circ u)'' = u'' \cdot (g' \circ u) + u' \cdot [(g' \circ u)'] = u'' \cdot (g' \circ u) + (u')^2 \cdot (g'' \circ u).$$
2. Comme u est convexe, $u'' \geq 0$. Comme g est croissante, $g' \geq 0$, donc $u'' \cdot (g' \circ u) \geq 0$. De plus, $(u')^2 \geq 0$, et comme g est convexe, $g'' \geq 0$, donc $(u')^2 \cdot (g'' \circ u) \geq 0$. La somme de deux termes positifs est positive : $(g \circ u)'' \geq 0$, donc $g \circ u$ est convexe.
3. Contre-exemple si g n'est pas croissante : $u(x) = x^2$ (convexe sur $\mathbb{R}$) et $g(y) = -y$ (convexe au sens large sur $\mathbb{R}$). La composée est $(g \circ u)(x) = -x^2$, qui est strictement concave !

- **47.22 :**
1. Soit $f(x) = -\ln(x)$ sur $]0\,;+\infty[$. $f'(x) = -1/x$, $f''(x) = 1/x^2 > 0$: f est strictement convexe. Par l'inégalité de Jensen :
$$-\ln\left(\frac{x_1 + ... + x_n}{n}\right) \leq \frac{-\ln(x_1) - ... - \ln(x_n)}{n} = -\frac{1}{n}\ln(x_1 ... x_n) = -\ln\left((x_1 ... x_n)^{1/n}\right).$$
2. On multiplie par -1 (l'inégalité change de sens) :
$$\ln\left(\frac{x_1 + ... + x_n}{n}\right) \geq \ln\left((x_1 ... x_n)^{1/n}\right).$$
Par stricte croissance de l'exponentielle :
$$\frac{x_1 + ... + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 ... x_n}. \quad \blacksquare$$

La question qui ouvre la suite

Nous avons vu que la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ est le roi des fonctions : elle transforme les additions en multiplications, sa dérivée est égale à elle-même, et sa courbe est entièrement convexe au-dessus de sa tangente $y = x + 1$. Mais que se passe-t-il si un astronome ou un navigateur a besoin de faire le chemin inverse ? Si l'on connaît la puissance finale et que l'on cherche **l'exposant qui l'a engendrée** ? Comment une règle à calcul graduée et une table imprimée ont-elles permis aux marins du XVII^{e} siècle de traverser les océans sans jamais faire une seule multiplication à la main ?

C'est l'épopée de **John Napier** et de la fonction **logarithme népérien**. Rendez-vous au chapitre 48.

CHAPITRE 48 : Le Logarithme de Napier et les Tables des Navigateurs

> « En abrégeant les calculs, l'invention des logarithmes a doublé la vie des astronomes. » — *Pierre-Simon de Laplace*

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi, vers 1600, les marins et les astronomes étouffaient sous les **multiplications**, et comment un baron écossais a inventé une machine à transformer les multiplications en **additions**.
- La **fonction logarithme népérien** $\ln$, définie comme la machine qui **défait** l'exponentielle : $y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$.
- Les **propriétés algébriques** ($\ln(ab) = \ln a + \ln b$, etc.) et leurs **démonstrations**.
- L'**étude complète** de la fonction : dérivée $\frac{1}{x}$, variations, limites, croissances comparées, concavité.
- Les méthodes pour résoudre **équations et inéquations** avec $\ln$ et e, et pour trouver un **seuil** dans une suite géométrique.
- Les **échelles logarithmiques** du monde réel : pH, décibels, magnitude des séismes, datation au carbone 14.

---

1. Le problème : la mer, les étoiles et les multiplications interminables

1.1 Le navigateur perdu

Imagine-toi en **1600**, sur le pont d'un galion qui traverse l'Atlantique. Il n'y a ni GPS, ni radio, ni horloge fiable. Pour savoir où se trouve le navire, le pilote mesure au **quadrant** la hauteur du Soleil ou d'une étoile au-dessus de l'horizon, puis il doit résoudre un **triangle sphérique** : un triangle tracé sur la sphère céleste.

Les formules de trigonométrie sphérique ressemblent à ceci :

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A.$$

Les sinus et cosinus, on les lit dans des **tables** imprimées, avec sept ou huit chiffres pour être précis. Il faut donc multiplier, à la main, des nombres comme

$$0,8746197 \times 0,4848096.$$

Une telle multiplication posée demande une cinquantaine de petites multiplications et additions, avec des retenues partout. Une seule erreur de retenue, et le navire se croit à cent kilomètres de sa vraie position : il peut s'échouer sur des récifs. Les astronomes, eux, comme **Tycho Brahe** puis **Johannes Kepler**, passent des **années** de leur vie à faire des multiplications pour calculer les orbites des planètes.

> **Découverte & Histoire**
>
> 💡 **Le savais-tu ?** Avant les logarithmes, on utilisait une astuce appelée **prosthaphérèse** (du grec « ajouter et retrancher »), qui exploitait la formule $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ pour remplacer un produit par une somme… mais elle était lourde et ne marchait bien que pour des nombres compris entre -1 et 1.

1.2 Le rêve : remplacer × par +

L'addition est facile : on aligne les chiffres et on ajoute. La multiplication est pénible. D'où le rêve des calculateurs de la Renaissance :

> Trouver une « traduction » qui associe à chaque nombre positif un autre nombre, de telle sorte que la traduction d'un produit soit la somme des traductions.

Ce rêve, le moine allemand **Michael Stifel** l'avait entrevu en 1544 en écrivant deux lignes de nombres l'une sous l'autre :

Progression arithmétique	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Progression géométrique	1	2	4	8	16	32	64	128	256

Pour multiplier 8×32, regarde au-dessus : 8 correspond à 3, 32 correspond à 5. Additionne : $3 + 5 = 8$. Redescends : sous 8 on lit 256. Et en effet $8 \times 32 = 256$! **La ligne du haut transforme les multiplications de la ligne du bas en additions.**

C'est simplement la règle des puissances que tu connais depuis le collège :

$$2^3 \times 2^5 = 2^{3+5}.$$

Mais il y a un gros problème : entre 8 et 16, il n'y a rien. Comment multiplier 11×13 ? Il faudrait une progression géométrique **aux pas si serrés** que tous les nombres y figurent presque. Il faudrait **remplir les trous**.

1.3 Vingt ans de calcul : le baron de Merchiston

C'est ce que fait **John Napier** (1550 - 1617), baron de Merchiston en Écosse — en français on l'appelle souvent **Neper**. Il choisit une progression géométrique de raison très proche de 1, à savoir $1 - 10^{-7} = 0,9999999$, de sorte que ses termes successifs ne diffèrent presque pas : les trous deviennent minuscules. Pendant **vingt ans**, à la main, il calcule ses tables. En **1614**, il publie *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio* (« Description de la merveilleuse règle des logarithmes »).

Le mot **logarithme**, qu'il invente, vient du grec *logos* (rapport, raison) et *arithmos* (nombre) : « le nombre qui compte les rapports ». Le logarithme d'un nombre, c'est en quelque sorte **le nombre de pas** qu'il faut faire dans la progression géométrique pour l'atteindre.

📐 Histoire Mathématique — De la cinématique de Napier à la constante d'Euler

Le logarithme originel publié par John Napier en 1614 n'était pas encore notre fonction $\ln(x)$ moderne :

1. **Napier (1614) :** Conception cinématique sur un segment de rayon 10^7. Un point ralentit proportionnellement à la distance restante tandis qu'un second avance à vitesse constante. Ce logarithme historique était décroissant et vérifiait $\mathrm{NapLog}(10^7) = 0$, soit $\mathrm{NapLog}(x) \approx 10^7 \ln\left(\frac{10^7}{x}\right)$.
2. **Henry Briggs (1617–1624) :** Collaboration avec Napier pour convertir le système en logarithmes décimaux de base 10 avec $\log_{10}(1) = 0$ et $\log_{10}(10) = 1$.
3. **Grégoire de Saint-Vincent (1647) & Alphonse Antonio de Sarasa (1649) :** Découverte capitale du lien entre l'aire sous l'hyperbole équilatère $y = \frac{1}{x}$ et la propriété d'addition des logarithmes.
4. **Nicolaus Mercator (1668) :** Introduction formelle du terme « logarithme naturel » dans sa *Logarithmotechnia*.
5. **Leonhard Euler (1748) :** Formalisation moderne définitive de la constante $e \approx 2\{,\}71828$ et de la fonction $\ln(x)$ comme bijection réciproque de l'exponentielle e^x.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie —** Le mathématicien anglais **Henry Briggs**, lisant le livre de Napier, est si bouleversé qu'il fait le voyage de Londres jusqu'en Écosse en 1615 pour le rencontrer. On raconte que les deux hommes restèrent un quart d'heure à se regarder en silence, d'admiration, avant de parler. Ensemble, ils décident de construire des logarithmes « de base 10 » (où $\log 10 = 1$), plus pratiques pour notre numération : ce sont les **logarithmes décimaux**. Kepler, qui reçoit les tables en 1617, s'en sert immédiatement pour achever ses *Tables rudolphines* des mouvements planétaires et dédie un de ses livres à Napier… sans savoir que celui-ci était mort entre-temps.

Pendant plus de **trois siècles**, des tables de logarithmes et des **règles à calcul** (deux réglettes graduées logarithmiquement qu'on fait glisser l'une contre l'autre pour additionner des longueurs) accompagnent les ingénieurs, les marins, les architectes… jusqu'aux ingénieurs de la NASA du programme Apollo dans les années 1960 !

1.4 Le même problème, vu du laboratoire

Rappelle-toi la colonie de bactéries du chapitre 40. Une population qui suit la loi $N(t) = N_0\, e^{kt}$ grossit de façon exponentielle. Le biologiste se pose la question **inverse** :

> « La population a été multipliée par 1000. Depuis combien de temps l'infection a-t-elle commencé ? »

Il faut résoudre $e^{kt} = 1000$, c'est-à-dire trouver **l'exposant** qui donne un résultat voulu. L'exponentielle sait aller de l'exposant vers le résultat ; il nous manque la machine qui va **du résultat vers l'exposant**. Cette machine-là, c'est le **logarithme népérien**. Les deux histoires — celle des navigateurs et celle des bactéries — vont se rejoindre.

---

2. Définition : la machine qui remonte l'exponentielle

2.1 Ce que l'on sait déjà de l'exponentielle

Rappelons ce que le chapitre 40 et le chapitre 46 nous ont appris sur la fonction exp : $x \mapsto e^x$:

- elle est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $(e^x)' = e^x$;
- elle est **strictement positive** : $e^x > 0$ pour tout réel x ;
- elle est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$;
- $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$.

Le **corollaire du théorème des valeurs intermédiaires** (chapitre 46) affirme alors : une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle réalise une **bijection** de cet intervalle sur l'intervalle image. Ici :

> ***Pour tout réel $a > 0$, l'équation $e^x = a$ admet une unique solution réelle.***

En image : la courbe de l'exponentielle traverse chaque ligne horizontale $y = a$ (avec $a > 0$) **exactement une fois**. Et elle ne traverse jamais les lignes $y = a$ avec $a \leq 0$, puisqu'elle reste au-dessus de l'axe des abscisses.



Fig. 106. – Réciprocité des fonctions exponentielle et logarithme népérien

2.2 La définition

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Pour tout réel a strictement positif, on appelle **logarithme népérien** de a, et on note $\ln a$ (ou $\ln(a)$), l'**unique** réel x tel que $e^x = a$. La fonction $\ln :]0\,;+\infty[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \ln x$ est la **fonction logarithme népérien**. C'est la **fonction réciproque** de la fonction exponentielle.

$$\text{Pour } \; a > 0 \;\text{ et }\; x \in \mathbb{R} : \qquad e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a.$$

La notation. Le symbole ln est l'abréviation de *logarithmus naturalis* (latin : « logarithme naturel »). On le lit « **logarithme népérien de x** », ou plus familièrement « **l-n de x** » (en épelant les lettres L et N). Les parenthèses sont facultatives quand il n'y a pas d'ambiguïté : $\ln 2$, $\ln x$; mais on écrit $\ln(x+1)$ et surtout pas $\ln x + 1$, qui veut dire $(\ln x) + 1$.

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Napier n'a pas écrit $\ln$, ni même pensé en termes de fonction réciproque de e^x : le nombre e n'avait pas encore de nom ! Ce sont **Grégoire de Saint-Vincent** et **Alphonse de Sarasa** (vers 1647-1649) qui ont remarqué que l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ se comporte comme un logarithme (on le verra au chapitre 50), et c'est **Leonhard Euler**, en 1748, qui présente clairement logarithme et exponentielle comme deux machines inverses l'une de l'autre. Les tables originales de Napier correspondent, à peu près, à la fonction $x \mapsto 10^7 \ln\left(\frac{10^7}{x}\right)$.

2.3 Premières conséquences immédiates

De la définition découlent directement :

Propriété	Pourquoi
$\ln 1 = 0$	car $e^0 = 1$
$\ln e = 1$	car $e^1 = e$
$e^{\ln a} = a$ pour tout $a > 0$	$\ln a$ est *par définition* l'exposant qui donne a
$\ln(e^x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$	l'unique exposant qui donne e^x, c'est x

Les deux dernières lignes disent : **« exp » puis « ln », ou « ln » puis « exp », on revient au point de départ.** C'est comme fermer puis ouvrir un tiroir.

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège !** $e^{\ln a} = a$ n'est vrai que si $a > 0$. Par exemple $e^{\ln(-3)}$ n'a **aucun sens**, car $\ln(-3)$ n'existe pas. En revanche $\ln(e^x) = x$ est vrai pour **tout** réel x, même négatif : $\ln(e^{-5}) = -5$.

2.4 La courbe : un miroir de l'exponentielle

Dans un repère orthonormé, si le point $M(a\,;b)$ est sur la courbe de $\exp$ (donc $b = e^a$), alors $a = \ln b$ et le point $M'(b\,;a)$ est sur la courbe de $\ln$. Or M' est le **symétrique** de M par rapport à la droite Δ d'équation $y = x$ (on échange abscisse et ordonnée).

> ***Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la première bissectrice $y = x$.***

Imagine que tu replies la feuille le long de la diagonale $y = x$: la courbe de l'exponentielle se dépose exactement sur celle du logarithme. Le point $(0\,;1)$ de $\exp$ devient le point $(1\,;0)$ de $\ln$; l'asymptote horizontale $y = 0$ de $\exp$ (en $-\infty$) devient l'**asymptote verticale** $x = 0$ de $\ln$.

2.5 Exemples résolus

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Résoudre $e^x = 5$. $5 > 0$, donc l'équation a une unique solution : $x = \ln 5 \approx 1,609$. Vérification à la calculatrice : $e^{1,609} \approx 4,998$. ✓

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Résoudre $e^{2x-1} = 3$. $3 > 0$, donc $e^{2x-1} = 3 \Leftrightarrow 2x - 1 = \ln 3 \Leftrightarrow x = \frac{1+\ln 3}{2}$. $\mathcal{S} = \left\{\frac{1+\ln 3}{2}\right\}$, soit environ $1,049$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Résoudre $\ln x = 2$. L'équation n'a de sens que pour $x > 0$. Alors $\ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2$. Comme $e^2 > 0$, la solution est valable : $\mathcal{S} = \{e^2\}$, avec $e^2 \approx 7,389$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Résoudre $e^x = -4$ et $3e^x + 6 = 0$.
Une exponentielle est toujours strictement positive : $e^x = -4$ n'a **aucune solution**, $\mathcal{S} = \varnothing$. De même $3e^x + 6 = 0 \Leftrightarrow e^x = -2$: $\mathcal{S} = \varnothing$. Écrire « $x = \ln(-2)$ » serait une faute grave.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Simplifier $A = e^{\ln 7}$, $B = \ln(e^{-3})$, $C = e^{-\ln 2}$, $D = \ln(\sqrt{e})$.
- $A = 7$;
- $B = -3$;
- $C = \frac{1}{e^{\ln 2}} = \frac{1}{2}$;
- $D = \ln\left(e^{1/2}\right) = \frac{1}{2}$.

⚠ Attention au Piège !

⚠ Attention, piège ! — Aux limites du domaine.
- $\ln 0$ **n'existe pas** : aucune puissance de e ne vaut 0 (l'exponentielle s'approche de 0 sans jamais l'atteindre).
- $\ln$ d'un nombre négatif **n'existe pas** (dans $\mathbb{R}$).
- Avant toute équation contenant $\ln(\ldots)$, on commence donc **toujours** par déterminer l'ensemble des x pour lesquels toutes les expressions à l'intérieur des $\ln$ sont **strictement positives**.

---

3. Les propriétés algébriques : le rêve de Napier réalisé

3.1 La propriété fondamentale

📐 Propriété fondamentale —

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Ce que ça dit en mots : le logarithme **transforme les produits en sommes**. C'est exactement la ligne du haut de Stifel, mais sans trous : tous les réels positifs y figurent.

✍ Démonstration (exigible) —

Soient $a > 0$ et $b > 0$. Alors $ab > 0$ et $\ln(ab)$ existe. D'une part, $e^{\ln(ab)} = ab$ par définition. D'autre part, d'après la propriété $e^{x+y} = e^x e^y$ de l'exponentielle :

$$e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b.$$

Ainsi $e^{\ln(ab)} = e^{\ln a + \ln b}$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, donc **injective** (deux réels différents ont des images différentes), on en déduit $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■

Tout le secret est là : **la propriété du logarithme est le reflet de la propriété $e^{x+y}=e^x e^y$ de l'exponentielle**, vue dans le miroir $y=x$.

3.2 Les conséquences

📐 Propriétés —

Pour tous réels $a>0$, $b>0$ et tout entier relatif n : 1. $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$ 2. $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b$ 3. $\ln(a^n)=n\ln a$ 4. $\ln(\sqrt{a})=\frac{1}{2}\ln a$

✍️ Démonstrations —

1. $a\times\frac{1}{a}=1$, donc $\ln a+\ln\left(\frac{1}{a}\right)=\ln 1=0$, d'où $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$. 2. $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln\left(a\times\frac{1}{b}\right)=\ln a+\ln\left(\frac{1}{b}\right)=\ln a-\ln b$. 3. Pour $n\in\mathbb{N}$, on raisonne **par récurrence** (chapitre 43). Soit $P(n)$: « $\ln(a^n)=n\ln a$ ».

- *Initialisation :* $\ln(a^0)=\ln 1=0=0\times\ln a$. $P(0)$ est vraie.
- *Hérédité :* supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n\geq 0$. Alors $\ln(a^{n+1})=\ln(a^n\times a)=\ln(a^n)+\ln a=n\ln a+\ln a=(n+1)\ln a$. $P(n+1)$ est vraie.
- *Conclusion :* $P(n)$ est vraie pour tout $n\in\mathbb{N}$.

Pour n entier négatif, on écrit $n=-m$ avec $m\in\mathbb{N}$: $\ln(a^{-m})=\ln\left(\frac{1}{a^m}\right)=-\ln(a^m)=-m\ln a=n\ln a$. 4. $\left(\sqrt{a}\right)^2=a$, donc $2\ln(\sqrt{a})=\ln a$ d'après 3., d'où le résultat. ■

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ?** Plus généralement, pour $a>0$ et tout réel r, on **définit** $a^r=e^{r\ln a}$, ce qui donne $\ln(a^r)=r\ln a$. C'est ainsi qu'une calculatrice comprend $2^{\sqrt{2}}$ ou $10^{0{,}3}$. En particulier $2^x=e^{x\ln 2}$: **toute** croissance « à taux constant » est une exponentielle de base e déguisée.

3.3 Exemples résolus

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 6 — Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$:
$A=\ln 12$, $B=\ln\left(\frac{9}{16}\right)$, $C=\ln\sqrt{72}$, $D=3\ln 4-2\ln 6$.

- $12=2^2\times 3$, donc $A=2\ln 2+\ln 3$.
- $B=\ln(3^2)-\ln(2^4)=2\ln 3-4\ln 2$.
- $72=2^3\times 3^2$, donc $C=\frac{1}{2}(3\ln 2+2\ln 3)=\frac{3}{2}\ln 2+\ln 3$.
- $D=3\times 2\ln 2-2(\ln 2+\ln 3)=6\ln 2-2\ln 2-2\ln 3=4\ln 2-2\ln 3$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 7 — Simplifier $E=\ln(e^3)+\ln\left(\frac{1}{e}\right)-\ln(e\sqrt{e})$. $\ln(e^3)=3$, $\ln\left(\frac{1}{e}\right)=-1$, $\ln(e\sqrt{e})=\ln\left(e^{3/2}\right)=\frac{3}{2}$. Donc $E=3-1-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 8 — Multiplier comme un navigateur de 1620. On veut $2{,}37\times 5{,}81$ avec une table de **logarithmes décimaux** ($\log x=\frac{\ln x}{\ln 10}$, qui vérifie aussi $\log(ab)=\log a+\log b$ et $\log 10=1$). La table donne : $\log 2{,}37\approx 0{,}37475$ et $\log 5{,}81\approx 0{,}76418$. On **additionne** : $0{,}37475+0{,}76418=1{,}13893$. On cherche dans la table le nombre dont le log vaut $1{,}13893=1+0{,}13893$: c'est $10\times 1{,}37697\approx 13{,}770$. Calcul direct : $2{,}37\times 5{,}81=13{,}7697$. ✓ Une addition et deux lectures de table ont remplacé la multiplication !

3.4 Attention, pièges !

⚠️ **Attention au Piège !**

⚠️ **Attention, piège ! — Les fausses formules.**

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général. Contre-exemple : $\ln(1+1) = \ln 2 \approx 0,69$ alors que $\ln 1 + \ln 1 = 0$. Le logarithme transforme les **produits**, pas les sommes.
- $\ln a \times \ln b \neq \ln(ab)$. Contre-exemple : $\ln e \times \ln e = 1$, mais $\ln(e^2) = 2$.
- $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln\left(\frac{a}{b}\right)$ et $\neq \ln a - \ln b$.
- $(\ln a)^2 \neq \ln(a^2)$. Par exemple avec $a = e^3$: $(\ln a)^2 = 9$ mais $\ln(a^2) = 6$. Pour éviter toute ambiguïté, on écrit $(\ln x)^2$ ou $\ln^2 x$, jamais $\ln x^2$ pour dire le carré du logarithme.

⚠️ **Attention au Piège !**

⚠️ **Attention, piège ! — Les signes cachés.** La formule $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ exige $a > 0$ **et** $b > 0$. Or ab peut être positif avec $a < 0$ et $b < 0$! Par exemple $\ln\big((-2)(-3)\big) = \ln 6$ existe, mais $\ln(-2) + \ln(-3)$ n'a pas de sens. La version correcte, valable pour $ab > 0$, est

$$\ln(ab) = \ln|a| + \ln|b|.$$

De même, pour tout réel $x \neq 0$: $\ln(x^2) = 2\ln|x|$ (et non $2\ln x$, qui n'existe que pour $x > 0$). Conséquence pratique : les fonctions $x \mapsto \ln(x^2)$ et $x \mapsto 2\ln x$ **ne sont pas égales** : la première est définie sur $\mathbb{R}^*$, la seconde seulement sur $]0\,;+\infty[$.

---

4. Étude complète de la fonction logarithme népérien

4.1 Dérivabilité et calcul de la dérivée

📐 **Théorème —**

La fonction ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

✍️ **Démonstration (exigible au baccalauréat) —**

On sait que pour tout réel $x > 0$, on a la relation :

$$e^{\ln x} = x.$$

La fonction ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ (car elle est la réciproque de la fonction exp, dérivable sur $\mathbb{R}$ et de dérivée $\exp' = \exp$ strictement positive sur $\mathbb{R}$). En dérivant les deux membres de l'égalité $e^{\ln x} = x$ par rapport à x, à l'aide de la formule de dérivation d'une fonction composée $(e^{u(x)})' = u'(x)\,e^{u(x)}$ avec $u(x) = \ln x$:

$$(\ln)'(x) \times e^{\ln x} = 1.$$

Or $e^{\ln x} = x$, donc :

$$(\ln)'(x) \times x = 1 \Leftrightarrow \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

■

💡 Démonstration alternative par le taux d'accroissement —

Soit $x > 0$ fixé et soit $h \neq 0$ tel que $x + h > 0$. Le taux d'accroissement de $\ln$ en x s'écrit :

$$\tau(h) = \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \frac{1}{h}\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Posons $u = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)$. Alors $e^u = 1 + \frac{h}{x}$, d'où $h = x(e^u - 1)$. Lorsque $h \to 0$, $1 + \frac{h}{x} \to 1$, donc $u \to \ln 1 = 0$ par continuité de $\ln$. Le taux devient :

$$\tau(h) = \frac{u}{x(e^u - 1)} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\frac{e^u - 1}{u}}.$$

Or, par définition de la dérivée de l'exponentielle en 0, $\lim_{u \to 0} \frac{e^u - 1}{u} = \exp'(0) = e^0 = 1$. Ainsi, par quotient de limites :

$$\lim_{h \to 0} \tau(h) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{x}.$$

On retrouve bien $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. ■

4.2 Dérivée de $\ln(u)$ et $\ln|u|$

Lorsque l'argument du logarithme est lui-même une fonction dérivable u, la formule de dérivation des fonctions composées $(f \circ u)' = u' \times (f' \circ u)$ donne immédiatement :

📐 Règle de dérivation en chaîne —

Soit u une fonction dérivable et **strictement positive** sur un intervalle I. Alors la fonction $f = \ln \circ u$, définie par $f(x) = \ln(u(x))$, est dérivable sur I, et :

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}.$$

Plus généralement, si u est dérivable et **ne s'annule pas** sur I, la fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et :

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}.$$

✍️ Justification pour $\ln|u|$ quand $u(x) < 0$ —

Si $u(x) < 0$, alors $|u(x)| = -u(x) > 0$. On a donc $\ln|u(x)| = \ln(-u(x))$. En dérivant : $\big(\ln(-u)\big)' = \frac{(-u)'}{-u} = \frac{-u'}{-u} = \frac{u'}{u}$. Le résultat est donc identique quel que soit le signe de u ! ■

🧭 Méthode — Dériver une expression avec $\ln(u)$:

1.

Vérifier sur quel intervalle l'argument $u(x)$ est strictement positif. 2. Calculer la dérivée $u'(x)$. 3. Écrire le quotient $\frac{u'(x)}{u(x)}$ et simplifier si possible.

4.3 Variations et signe de la fonction $\ln$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, on a $x > 0$, donc $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$. La dérivée est **strictement positive** sur l'ensemble de son domaine de définition.

📐 Propriété —

La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$. Pour tous réels $a, b \in]0\,;+\infty[$:

- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$ (injectivité) ;
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$ (stricte croissance).

Comme $\ln 1 = 0$, la stricte croissance donne directement le **signe de $\ln x$** :

- si $0 < x < 1$, alors $\ln x < \ln 1$, c'est-à-dire $\boldsymbol{\ln x < 0}$;
- si $x = 1$, alors $\boldsymbol{\ln 1 = 0}$;
- si $x > 1$, alors $\ln x > \ln 1$, c'est-à-dire $\boldsymbol{\ln x > 0}$.

x	0 (valeur interdite)	$]0;1[$	1	$]1;+\infty[$	$+\infty$
Signe de $\ln'(x)$	$\|\|$	$+$	$+$	$+$	
Signe de $\ln(x)$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

4.4 Limites aux bornes du domaine

📐 Théorème des limites —

1.
$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ 2. $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$
La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est donc **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction $\ln$.

✍️ Démonstrations (exigibles) —

1. **Limite en $+\infty$:** Pour tout entier naturel n, on a $\ln(2^n) = n \ln 2$. Comme $2 > 1$, $\ln 2 > 0$. Par conséquent, $\lim_{n\to+\infty} \ln(2^n) = \lim_{n\to+\infty}(n \ln 2) = +\infty$. Soit $M > 0$ un réel arbitrairement grand. Puisque $n \ln 2 \to +\infty$, il existe un entier N tel que $N \ln 2 > M$. Pour tout réel $x \geq 2^N$, la croissance stricte de $\ln$ implique :
$$\ln x \geq \ln(2^N) = N \ln 2 > M.$$
Cela prouve que tout intervalle $]M\,;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $\ln x$ dès que x est assez grand. Donc $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$. ■
2. **Limite en 0^+ :** Effectuons le changement de variable $X = \frac{1}{x}$. Lorsque $x \to 0$ avec $x > 0$, on a $X \to +\infty$. Or $\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln X$. Comme $\lim_{X\to+\infty} \ln X = +\infty$, on a par composition :
$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = \lim_{X\to+\infty} (-\ln X) = -\infty.$$
■

4.5 Tableau de variations et allure de la courbe

Rassemblons l'ensemble des informations dans un tableau de variations complet :

x	0 (valeur interdite)		1		$+\infty$
Signe de $\ln'(x) = \frac{1}{x}$	$\|\|$	$+$	$+$	$+$	
Variations de $\ln(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Tangente remarquable en $x = 1$: En $x = 1$, la valeur de la dérivée est $\ln'(1) = \frac{1}{1} = 1$. L'ordonnée est $\ln 1 = 0$. L'équation de la tangente T_1 au point $(1\,;0)$ est :
$$y = \ln'(1)(x-1) + \ln 1 = 1 \times (x-1) + 0 \Leftrightarrow y = x - 1.$$

4.6 Concavité et dérivée seconde

Calculons la dérivée seconde de la fonction logarithme :
$$(\ln)''(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$
Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, $x^2 > 0$, donc $(\ln)''(x) < 0$.

📐 Propriété fondamentale de concavité —

La fonction ln est **strictement concave** sur $]0\,;+\infty[$. Par conséquent : 1. La courbe de ln est située **entièrement en dessous de toutes ses tangentes**. 2. En particulier, par rapport à la tangente en $x=1$ d'équation $y=x-1$, on a pour tout $x>0$:

$$\ln x \leq x-1.$$

L'égalité n'a lieu que pour $x=1$.

En posant $x=1+h$ avec $h>-1$, cette inégalité s'écrit de manière équivalente :

$$\ln(1+h)\leq h.$$

4.7 Croissances comparées

Bien que $\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$, cette croissance est **extrêmement lente**, plus lente que n'importe quelle puissance positive de x. Par exemple :

- $\ln(10)\approx 2,3$;
- $\ln(10^6)\approx 13,8$;
- $\ln(10^{12})\approx 27,6$.

Pour que $\ln x$ atteigne 100, il faut que $x=e^{100}\approx 2,68\times 10^{43}$, un nombre plus grand que le nombre de grains de sable sur toute la Terre !

Cette lenteur extrême donne lieu aux célèbres **théorèmes de croissances comparées**.

📐 Théorème des croissances comparées (exigible) —

Pour tout entier naturel $n\geq 1$: 1. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0$ 2. $\lim_{x\to 0^+}x^n\ln x=0$ 3. $\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)}{h}=1$ ou de façon équivalente $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}=1$.

✍ Démonstration de $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ (exigible) —

Rappelons la limite de croissances comparées de l'exponentielle (établie au chapitre 45) :

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}=+\infty.$$

Posons le changement de variable $t=\ln x$, c'est-à-dire $x=e^t$. Lorsque $x\to+\infty$, on a $t\to+\infty$. Le quotient $\frac{\ln x}{x}$ s'écrit alors :

$$\frac{\ln x}{x}=\frac{t}{e^t}=\frac{\frac{1}{e^t}}{t}.$$

Par passage à la limite :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\frac{1}{e^t}}{t}=\frac{1}{+\infty}=0.$$

■

✍ Démonstration de $\lim_{x\to 0^+}x\ln x=0$ (exigible) —

Posons le changement de variable $X=\frac{1}{x}$. Quand $x\to 0^+$, $X\to+\infty$. Alors :

$$x\ln x=\frac{1}{X}\ln\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{-\ln X}{X}=-\frac{\ln X}{X}.$$

D'après le résultat précédent, $\lim_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X}=0$. On en conclut par composition :

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=0.$$

■

✍ **Démonstration pour $\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)}{h}=1$ —**

C'est exactement le taux d'accroissement de la fonction $\ln$ en $x_0=1$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)-\ln 1}{h}=\ln'(1)=\frac{1}{1}=1.$$

■

---

5. Méthodes : équations, inéquations et seuils géométriques

5.1 Résolution d'équations avec $\ln$

🧭 **Méthode — Protocole de résolution d'une équation logarithmique :**

1. **Ensemble de validité :** Déterminer le

domaine D des réels x tels que tous les arguments des logarithmes soient **strictement positifs**. 2. **Regroupement :** Utiliser les propriétés algébriques pour se ramener à une forme simple du type :

- $\ln(A(x))=\ln(B(x))\Leftrightarrow A(x)=B(x)$;
- ou $\ln(A(x))=k\Leftrightarrow A(x)=e^k$.

3. **Résolution algébrique :** Résoudre l'équation polynomiale ou rationnelle obtenue.
4. **Confrontation au domaine :** Ne retenir que les solutions qui appartiennent effectivement au domaine de validité D.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 9 — Équation avec deux logarithmes. Résoudre l'équation $\ln(2x-3)=\ln(x+5)$.

- *Étape 1 : Domaine.* Il faut $2x-3>0\Leftrightarrow x>\frac{3}{2}$ et $x+5>0\Leftrightarrow x>-5$. L'intersection donne $D=]\frac{3}{2}\,;+\infty[$.
- *Étape 2 et 3 : Résolution.* Pour $x\in D$:

$$\ln(2x-3)=\ln(x+5)\Leftrightarrow 2x-3=x+5\Leftrightarrow x=8.$$

- *Étape 4 : Conclusion.* $8\in D$ (car $8>1,5$). L'ensemble des solutions est $\mathcal{S}=\{8\}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 10 — Équation avec somme de logarithmes et fausse solution. Résoudre l'équation $\ln(x)+\ln(x-2)=\ln 3$.

- *Étape 1 : Domaine.* Il faut $x>0$ et $x-2>0\Leftrightarrow x>2$. Le domaine est donc $D=]2\,;+\infty[$.
- *Étape 2 : Regroupement.* Pour tout $x\in D$, $\ln(x)+\ln(x-2)=\ln(x(x-2))$. L'équation devient :

$$\ln(x^2-2x)=\ln 3\Leftrightarrow x^2-2x=3\Leftrightarrow x^2-2x-3=0.$$

- *Étape 3 : Résolution du trinôme.* $\Delta=(-2)^2-4\times 1\times(-3)=4+12=16=4^2$. Les racines sont $x_1=\frac{2-4}{2}=-1$ et $x_2=\frac{2+4}{2}=3$.
- *Étape 4 : Vérification dans le domaine.* $x_1=-1\notin D$: pour cette valeur, $\ln(-1)$ n'existe pas ! C'est une solution parasite introduite par le produit $(-1)\times(-3)=3$. $x_2=3\in D$ car $3>2$. L'ensemble des solutions est donc $\mathcal{S}=\{3\}$.

5.2 Équations avec changement de variable

Lorsque l'inconnue apparaît sous la forme de puissances de $\ln x$, on effectue un changement de variable.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 11 — Équation du second degré en $\ln x$.
Résoudre sur $]0\,;+\infty[$ l'équation $2(\ln x)^2 - 5\ln x + 2 = 0$. Posons $X = \ln x$. L'équation devient :

$$2X^2 - 5X + 2 = 0.$$

Le discriminant est $\Delta = (-5)^2 - 4\times 2\times 2 = 25 - 16 = 9 = 3^2$. Les solutions en X sont :

$$X_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{4} = 2.$$

On revient à x :

- $\ln x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{1/2} = \sqrt{e}$;
- $\ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2$. Les deux valeurs sont strictement positives. L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{\sqrt{e}\,;e^2\}$.

5.3 Inéquations avec $\ln$

Comme la fonction $\ln$ est strictement croissante, elle conserve le sens des inégalités :

$$\text{Pour tous } A>0 \text{ et } B>0 : \quad \ln A < \ln B \Leftrightarrow A < B.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 12 — Inéquation simple. Résoudre $\ln(3x-1) \le 2$. 1. *Domaine :* $3x-1>0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$. Donc $D =]\frac{1}{3}\,;+\infty[$. 2. *Résolution :* Comme $2 = \ln(e^2)$:

$$\ln(3x-1) \le \ln(e^2) \Leftrightarrow 3x-1 \le e^2 \Leftrightarrow 3x \le e^2+1 \Leftrightarrow x \le \frac{e^2+1}{3}.$$

3. *Intersection avec D :* Comme $\frac{e^2+1}{3} \approx \frac{7{,}389+1}{3} \approx 2{,}796 > \frac{1}{3}$, l'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} =]\frac{1}{3}\,;\,\frac{e^2+1}{3}[.$$

5.4 Recherche de seuils pour les suites géométriques

C'est l'une des applications les plus systématiques au baccalauréat : déterminer à partir de quel rang n une suite dépasse ou passe sous un certain seuil.

Méthode — Résolution de $q^n < S$ ou $q^n > S$:

1. Isoler

la puissance q^n dans l'inégalité. 2. Appliquer la fonction $\ln$ aux deux membres (valable car $q>0$ et $S>0$). 3. Utiliser la règle $\ln(q^n) = n\ln q$. 4. **Diviser par $\ln q$ en faisant extrêmement attention au signe de $\ln q$:**

- Si $q>1$, alors $\ln q > 0$: le sens de l'inégalité est **conservé** ;
- Si $0<q<1$, alors $\ln q < 0$: le sens de l'inégalité est **inversé** ($\le$ devient $\ge$) !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 13 — Seuil de dépréciation (inversion du sens). Une machine industrielle neuve coûte 20 000 €. Chaque année, sa valeur diminue de 15 %. Après combien d'années sa valeur deviendra-t-elle inférieure à 5 000 € ?

Modélisation : La valeur au bout de n années est $V_n = 20\,000 \times (1 - 0,15)^n = 20\,000 \times 0,85^n$. On cherche le plus petit entier naturel n tel que :

$$20\,000 \times 0,85^n < 5\,000 \Leftrightarrow 0,85^n < \frac{5\,000}{20\,000} \Leftrightarrow 0,85^n < 0,25.$$

Appliquons ln :

$$\ln(0,85^n) < \ln(0,25) \Leftrightarrow n\ln(0,85) < \ln(0,25).$$

Or $0 < 0,85 < 1$, donc $\ln(0,85) \approx -0,1625 < 0$. En divisant par ce nombre **négatif**, l'inégalité change de sens :

$$n > \frac{\ln(0,25)}{\ln(0,85)}.$$

Calculons : $\frac{\ln(0,25)}{\ln(0,85)} \approx \frac{-1,38629}{-0,16252} \approx 8,53$. Comme n est un nombre entier d'années, le plus petit entier supérieur est $\boldsymbol{n = 9}$. Au bout de 9 ans, la machine vaudra moins de 5 000 €.

Algorithme Python associé — Recherche de seuil :

```
def seuil_decroissance(valeur_initiale, taux, cible):
    n = 0
    v = valeur_initiale
    while v >= cible:
        v = v * (1 - taux)
        n += 1
    return n
>
print("Années nécessaires :", seuil_decroissance(20000, 0.15, 5000))
# Affiche : Années nécessaires : 9
```

---

6. Les échelles logarithmiques du monde réel

Pourquoi le logarithme est-il omniprésent dans toutes les sciences expérimentales ? Parce que la nature et nos sens opèrent souvent non pas par **différences additives**, mais par **rapports multiplicatifs** (loi psycho-physique de Weber-Fechner). Quand nous entendons un son deux fois plus fort, sa puissance physique n'a pas été ajoutée de quelques watts : elle a été multipliée par dix !

6.1 L'acidité et le pH en chimie

En chimie, la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ dans une solution aqueuse peut varier de $1\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (acide chlorhydrique concentré) à $10^{-14}\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (soude concentrée). C'est un rapport de 10^{14} : cent mille milliards ! Pour manipuler des nombres simples entre 0 et 14, le chimiste danois **Søren Sørensen** a introduit en 1909 le **pH** (potentiel hydrogène) à l'aide du logarithme décimal $\log_{10}(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}$:

Définition Fondamentale

Définition du pH —

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}\left(\frac{[H_3O^+]}{c_0}\right) = -\frac{\ln([H_3O^+]/c_0)}{\ln 10}$$

où $c_0 = 1\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ est la concentration standard. Réciproquement : $[H_3O^+] = 10^{-\,\mathrm{pH}}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$.

Conséquence directe :

Quand le pH diminue d'une seule unité (par exemple de 7 à 6), la concentration en ions $[H_3O^+]$ est **multipliée par 10**. Si le pH passe de 7 à 4, elle est multipliée par $10^3 = 1\,000$!

6.2 L'acoustique et les décibels

L'oreille humaine est sensible à des puissances sonores allant du murmure le plus ténu ($I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$) jusqu'au décollage d'une fusée ($100\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$), soit un facteur de 10^{14}. Le **niveau d'intensité acoustique** L, exprimé en **décibels (dB)**, est défini par :

Niveau sonore en décibels —

$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = 10\frac{\ln(I/I_0)}{\ln 10}.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 14 — Deux aspirateurs font-ils deux fois plus de bruit ? Supposons qu'un aspirateur émette une intensité acoustique I_1 produisant un niveau $L_1 = 70\,\mathrm{dB}$. Deux aspirateurs identiques allumés ensemble émettent une intensité doublée : $I_2 = 2I_1$. Quel est le nouveau niveau sonore L_2 ?

$$L_2 = 10\log_{10}\left(\frac{2I_1}{I_0}\right) = 10\left[\log_{10}(2) + \log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right)\right] = 10\log_{10}(2) + L_1.$$

Or $10\log_{10}(2) \approx 10 \times 0,30103 \approx 3\,\mathrm{dB}$. Donc $L_2 \approx 70 + 3 = 73\,\mathrm{dB}$! **Doubler la source sonore n'augmente le son perçu que de 3 décibels !**

6.3 Les tremblements de terre et l'échelle de Richter

L'échelle de magnitude de Richter mesure l'énergie sismique E libérée au foyer d'un séisme selon une formule de la forme :

$$M = \frac{2}{3}\log_{10}\left(\frac{E}{E_0}\right).$$

Si la magnitude augmente de 1 point, on a $\Delta M = 1 = \frac{2}{3}\log_{10}\left(\frac{E'}{E}\right)$, d'où :

$$\log_{10}\left(\frac{E'}{E}\right) = \frac{3}{2} = 1,5 \Leftrightarrow \frac{E'}{E} = 10^{1,5} = 10\sqrt{10} \approx 31,6.$$

Un séisme de magnitude 7 libère **31,6 fois plus d'énergie** qu'un séisme de magnitude 6, et $(31,6)^2 \approx 1\,000$ fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5 !

6.4 Datation au carbone 14 et demi-vie

Dans un organisme vivant, la proportion de carbone 14 radioactif reste constante. À sa mort, le carbone 14 n'est plus renouvelé et se désintègre selon la loi :

$$N(t) = N_0\, e^{-\lambda t},$$

où $\lambda > 0$ est la constante radioactive caractéristique du nucléide.

La **demi-vie** (ou période radioactive) $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée :

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \Leftrightarrow N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{N_0}{2} \Leftrightarrow e^{-\lambda t_{1/2}} = \frac{1}{2}.$$

En appliquant le logarithme népérien :

$$-\lambda t_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Pour le carbone 14, $t_{1/2} \approx 5\,730$ ans. Si un échantillon de bois prélevé dans une grotte préhistorique contient $30\,\%$ de la radioactivité initiale, on calcule son âge t en résolvant :

$$\frac{N(t)}{N_0} = 0,30 \Leftrightarrow e^{-\lambda t} = 0,30 \Leftrightarrow -\lambda t = \ln(0,30) \Leftrightarrow t = -\frac{\ln(0,30)}{\lambda} = -5\,730 \times \frac{\ln(0,30)}{\ln 2} \approx 9\,950 \ \text{ ans}.$$

Ce qu'il faut retenir

1. Définition et lien fondamental avec l'exponentielle

- Pour tout $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$: $e^x = a \Leftrightarrow x = \ln a$.
- La fonction $\ln$ est définie, continue et dérivable sur $]0\,;+\infty[$.
- Propriétés d'inversion : $e^{\ln a} = a$ (pour tout $a > 0$) et $\ln(e^x) = x$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$).
- $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
- Les courbes de exp et ln sont symétriques par rapport à la première bissectrice $y = x$.

2. Propriétés algébriques (pour tous $a > 0, b > 0$)

- Relation fondamentale : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.
- Inverse et quotient : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.
- Puissances et racines : $\ln(a^n) = n \ln a$ ($n \in \mathbb{Z}$) et $\ln\left(\sqrt{a}\right) = \frac{1}{2}\ln a$.

3. Analyse de la fonction $\ln$

- Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0\,;+\infty[$.
- Dérivée composée : $\big(\ln(u)\big)' = \frac{u'}{u}$ (pour $u > 0$).
- Strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$: $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$.
- Signe : $\ln x < 0$ sur $]0\,;1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1\,;+\infty[$.
- Limites aux bornes : $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ (asymptote verticale $x = 0$) et $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$.
- Concavité : $(\ln)''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$. La fonction est concave, d'où $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

4. Croissances comparées indispensables

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \geq 1)$.
- $\lim_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0 \quad (n \geq 1)$.
- $\lim_{h\to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$.

5. Résolution d'équations et recherche de seuils

- Toujours commencer par définir l'ensemble de validité D ($u(x) > 0$).
- Pour $q^n < S$ avec $0 < q < 1$: $n > \frac{\ln S}{\ln q}$ (car $\ln q < 0$ inverse le symbole d'inégalité).

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 48.1 — Calcul mental et simplifications. Donner la valeur exacte des réels suivants sans calculatrice : 1. $A = \ln(e^5)$ 2. $B = e^{\ln 11}$ 3. $C = \ln\left(\frac{1}{e^4}\right)$ 4. $D = \ln\left(\sqrt[3]{e}\right)$ (rappel : $\sqrt[3]{e} = e^{1/3}$) 5. $E = e^{-\ln 3}$ 6. $F = \ln(e\sqrt{e})$

Exercice 48.2 — Décomposition en facteurs premiers. En posant $a = \ln 2$ et $b = \ln 5$, exprimer en fonction de a et b : 1. $\ln 10$ 2. $\ln 20$ 3. $\ln 50$ 4. $\ln(0,04)$ 5. $\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{25}\right)$

Exercice 48.3 — Domaines de définition. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes : 1. $f_1(x) = \ln(3x - 12)$ 2. $f_2(x) = \ln(x^2 - 9)$ 3. $f_3(x) = \ln\left(\frac{x+1}{2-x}\right)$ 4. $f_4(x) = \ln(x^2 + 1)$ 5. $f_5(x) = \frac{1}{\ln x}$

Exercice 48.4 — Calculs de dérivées simples. Calculer la dérivée des fonctions suivantes sur leur domaine de dérivabilité : 1. $g_1(x) = \ln(4x+7)$ 2. $g_2(x) = \ln(x^2+3)$ 3. $g_3(x) = x^2 \ln x$ 4. $g_4(x) = \frac{\ln x}{x}$ 5. $g_5(x) = (\ln x)^3$

Exercice 48.5 — Équations élémentaires. Résoudre dans $\mathbb{R}$: 1. $\ln x = 4$ 2. $\ln(2x-1) = 0$ 3. $e^x = 9$ 4. $e^{3x-2} = 5$ 5. $\ln(x^2) = 6$

Exercice 48.6 — Inéquations élémentaires. Résoudre dans $\mathbb{R}$: 1. $\ln x > -2$ 2. $\ln(3-x) \leq 1$ 3. $e^{2x} \geq 7$ 4. $2\ln x + 3 < 0$

Exercice 48.7 — Calculs de limites directes. Déterminer les limites suivantes : 1. $\lim_{x\to+\infty} (\ln x + 2x)$ 2. $\lim_{x\to 0^+} (x^2 - \ln x)$ 3. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ 4. $\lim_{x\to 0^+} x^3 \ln x$

Niveau (Réflexion et Baccalauréat)

Exercice 48.8 — Équation du second degré avec logarithmes. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$(\ln x)^2 - 3\ln x - 10 = 0.$$

Exercice 48.9 — Équation avec somme de logarithmes. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(4x+8).$$

Exercice 48.10 — Système d'équations non linéaires. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ \ln x + \ln y = 3\ln 2 + \ln 27 \end{cases}$$

Exercice 48.11 — Étude d'une fonction logarithmique classique. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2 - \ln x.$$

1. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. 2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. 3. Dresser le tableau de variations de f. 4. En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 48.12 — Tangente passant par l'origine. Existe-t-il une tangente à la courbe de la fonction $\ln$ qui passe par l'origine du repère $(0\,;0)$? Si oui, déterminer les coordonnées du point de contact et l'équation de cette tangente.

Exercice 48.13 — Levée d'indéterminations. Déterminer les limites suivantes en justifiant soigneusement : 1. $\lim_{x\to+\infty} (x - \ln x)$ 2. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ 3. $\lim_{x\to 0^+} x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 4. $\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x^2-1}$

Exercice 48.14 — Seuil d'un placement financier. Un capital de $10\,000$ € est placé à un taux d'intérêt annuel composé de $3,5\,\%$. 1. Exprimer le capital C_n disponible au bout de n années. 2. Déterminer par le calcul (à l'aide du logarithme) au bout de combien d'années le capital initial aura doublé. 3. Retrouver approximativement ce résultat avec la fameuse « règle des 70 » des banquiers : le temps de doublement à $t\,\%$ par an est environ $70/t$. Démontrer pourquoi cette règle marche à l'aide de l'approximation affine de $\ln(1+u)$ au voisinage de 0.

Exercice 48.15 — Étude d'une fonction quotient et concavité. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. 1. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. Quelle interprétation graphique en déduit-on ? 2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de f. 3. Préciser le maximum global de f. 4. Comparer sans calculatrice les nombres e^π et π^e en utilisant les variations de f. 5. Calculer $f''(x)$ et étudier la convexité de f. Préciser le point d'inflexion.

Exercice 48.16 — Inégalité de convexité. 1. Démontrer que pour tout $x > 0$, on a $\ln x \leq x - 1$. 2. En déduire que pour tout $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$. 3. En appliquant cette inégalité avec $t = -\frac{1}{n+1}$, montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Exercice 48.17 — Datation de la grotte Chauvet. Des peintures rupestres ont été découvertes dans une cavité. Des fragments de charbon de bois ont été analysés : ils présentent une activité de $2,4$ désintégrations par minute et par gramme de carbone, alors que le bois vivant actuel présente une activité de $15,3$ désintégrations par minute et par gramme. Sachant que la période de demi-vie du carbone 14 est $T = 5\,730$ ans, estimer l'âge des peintures rupestres.

Exercice 48.18 — Seuil et suite arithmético-géométrique (Type Bac). Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$. 1. Démontrer que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - 5$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. 2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n. 3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que $|u_n - 5| < 10^{-4}$.

Niveau (Approfondissement et Défis)

Exercice 48.19 — Somme harmonique et constante d'Euler. Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$. 1. En utilisant l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > 0$, montrer que pour tout entier $k \geq 1$:

$$\ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}.$$

2. En utilisant l'inégalité $\ln(1-x) \leq -x$ pour $x \in]0\,;1[$, montrer que pour tout entier $k \geq 2$:

$$\frac{1}{k} \leq \ln k - \ln(k-1).$$

3. En sommant ces inégalités pour k variant de 1 à n, établir l'encadrement :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n.$$

4. En déduire la limite de la suite $(H_n)_{n\geq 1}$. Que peut-on dire de la série harmonique ? 5. Déterminer la limite de $\frac{H_n}{\ln n}$ quand $n \to +\infty$.

Exercice 48.20 — La formule de Stirling (première approche par logarithme). On cherche à estimer $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times n$. 1. Exprimer $\ln(n!)$ sous la forme d'une somme. 2. À l'aide de l'encadrement de l'exercice précédent, donner un encadrement de $\ln(n!)$ en termes d'intégrale de $\ln x$ (ou de termes $k \ln k$).

Exercice 48.21 — Équation transcendante $x^a = a^x$. Soit $a > 0$ un réel fixé. On cherche les solutions réelles strictement positives de l'équation $x^a = a^x$. 1. Montrer que pour tout $x > 0$, l'équation équivaut à $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln a}{a}$. 2. En utilisant l'étude de la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ faite à l'exercice 48.15, discuter du nombre de solutions selon la valeur de a. 3. Déterminer l'unique couple d'entiers naturels non nuls $(x\,;y)$ distincts avec $x < y$ vérifiant $x^y = y^x$.

Exercice 48.22 — Dérivée logarithmique et produit de fonctions. Soit f le produit de n fonctions dérivables et strictement positives : $f(x) = u_1(x)u_2(x)\ldots u_n(x)$. 1. Montrer que $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{u_k'(x)}{u_k(x)}$. 2. Application : Calculer rapidement la dérivée de $g(x) = (x+1)^3(2x-1)^4(x^2+5)^2$.

Solutions

Solutions du Niveau

Solution 48.1 : 1. $A = \ln(e^5) = 5$. 2. $B = e^{\ln 11} = 11$. 3. $C = \ln(e^{-4}) = -4$. 4. $D = \ln(e^{1/3}) = \frac{1}{3}$. 5. $E = e^{-\ln 3} = e^{\ln(1/3)} = \frac{1}{3}$. 6. $F = \ln(e^1 \times e^{1/2}) = \ln(e^{3/2}) = \frac{3}{2}$.

Solution 48.2 : 1. $\ln 10 = \ln(2\times 5) = \ln 2 + \ln 5 = a + b$. 2. $\ln 20 = \ln(2^2 \times 5) = 2\ln 2 + \ln 5 = 2a + b$. 3. $\ln 50 = \ln(2 \times 5^2) = \ln 2 + 2\ln 5 = a + 2b$. 4. $\ln(0,04) = \ln\left(\frac{4}{100}\right) = \ln\left(\frac{1}{25}\right) = -\ln(5^2) = -2b$. 5. $\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{25}\right) = \ln(\sqrt{2}) - \ln(5^2) = \frac{1}{2}a - 2b$.

Solution 48.3 : 1. $3x - 12 > 0 \Leftrightarrow 3x > 12 \Leftrightarrow x > 4$. Domaine : $D_1 =]4\,;+\infty[$. 2. $x^2 - 9 > 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+3) > 0$. Les racines sont -3 et 3 ; le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines. Domaine : $D_2 =]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$. 3. $\frac{x+1}{2-x} > 0$. Par tableau de signes, le quotient est strictement positif entre les racines -1 et 2. Domaine : $D_3 =]-1\,;2[$. 4. Pour tout réel x, $x^2 \geq 0 \Longrightarrow x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Le domaine est $D_4 = \mathbb{R}$. 5. Il faut $x > 0$ (pour que $\ln x$ existe) et $\ln x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Domaine : $D_5 =]0\,;1[\cup]1\,;+\infty[$.

Solution 48.4 : 1. Formule $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 4x + 7$ et $u'(x) = 4$: $g_1'(x) = \frac{4}{4x+7}$. 2. $u(x) = x^2 + 3$, $u'(x) = 2x$: $g_2'(x) = \frac{2x}{x^2+3}$. 3. Dérivée de produit $(uv)' = u'v + uv'$: $g_3'(x) = 2x\ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x\ln x + x = x(2\ln x + 1)$. 4. Dérivée de quotient : $g_4'(x) = \frac{\frac{1}{x}\times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. 5. Dérivée d'une puissance $(u^3)' = 3u^2u'$: $g_5'(x) = 3(\ln x)^2 \times \frac{1}{x} = \frac{3(\ln x)^2}{x}$.

Solution 48.5 : 1. $\ln x = 4 \Leftrightarrow x = e^4$. $\mathcal{S} = \{e^4\}$. 2. Domaine $x > 1/2$. $\ln(2x-1) = 0 = \ln 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = 1 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow x = 1 \in D$. $\mathcal{S} = \{1\}$. 3. $e^x = 9 \Leftrightarrow x = \ln 9 = 2\ln 3$. $\mathcal{S} = \{2\ln 3\}$. 4. $e^{3x-2} = 5 \Leftrightarrow 3x - 2 = \ln 5 \Leftrightarrow 3x = 2 + \ln 5 \Leftrightarrow x = \frac{2+\ln 5}{3}$. $\mathcal{S} = \left\{\frac{2+\ln 5}{3}\right\}$. 5. Domaine : $x \neq 0$. $\ln(x^2) = 6 \Leftrightarrow x^2 = e^6 \Leftrightarrow x = e^3$ ou $x = -e^3$. $\mathcal{S} = \{-e^3\,;e^3\}$.

Solution 48.6 : 1. $\ln x > -2 \Leftrightarrow x > e^{-2} = \frac{1}{e^2}$. $\mathcal{S} =]\frac{1}{e^2} ; +\infty[$. 2. Domaine : $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$. $\ln(3-x) \leq 1 = \ln e \Leftrightarrow 3 - x \leq e \Leftrightarrow x \geq 3 - e$. En recoupant avec le domaine : $\mathcal{S} = [3 - e \,; 3[$. 3. $e^{2x} \geq 7 \Leftrightarrow 2x \geq \ln 7 \Leftrightarrow x \geq \frac{\ln 7}{2}$. $\mathcal{S} = \left[\frac{\ln 7}{2} ; +\infty\right]$. 4. Domaine $x > 0$. $2\ln x < -3 \Leftrightarrow \ln x < -\frac{3}{2} \Leftrightarrow 0 < x < e^{-3/2} = \frac{1}{e\sqrt{e}}$. $\mathcal{S} =]0 \,; e^{-3/2}[$.

Solution 48.7 : 1. Par somme : $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} 2x = +\infty$, donc la limite est $+\infty$. 2. Par différence : $\lim_{x\to 0^+} x^2 = 0$ et $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$, donc $\lim_{x\to 0^+}(x^2 - \ln x) = 0 - (-\infty) = +\infty$. 3. Croissance comparée : $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$. 4. Croissance comparée : $\lim_{x\to 0^+} x^3 \ln x = 0$.

Solutions du Niveau

Solution 48.8 : L'équation est définie sur $]0 \,; +\infty[$. Posons $X = \ln x$. L'équation devient $X^2 - 3X - 10 = 0$. Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49 = 7^2$. Racines : $X_1 = \frac{3-7}{2} = -2$ et $X_2 = \frac{3+7}{2} = 5$. On revient à x :

- $\ln x = -2 \Leftrightarrow x = e^{-2}$;
- $\ln x = 5 \Leftrightarrow x = e^5$.

Les deux solutions sont strictement positives. $\mathcal{S} = \{e^{-2} \,; e^5\}$.

Solution 48.9 : Domaine de définition : Il faut $x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$, $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$, et $4x + 8 > 0 \Leftrightarrow x > -2$. L'intersection donne $D =]1 \,; +\infty[$. Pour $x \in D$, $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln\big((x+2)(x-1)\big) = \ln(x^2 + x - 2)$. L'équation équivaut à :

$$x^2 + x - 2 = 4x + 8 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0.$$

Les racines sont -2 et 5. Or $-2 \notin D$ car -2 n'est pas strictement supérieur à 1 (en -2, $\ln(x-1) = \ln(-3)$ n'existe pas). Seule la racine $5 \in D$ est valable. Donc $\mathcal{S} = \{5\}$.

Solution 48.10 : Le système est défini pour $x > 0$ et $y > 0$. La seconde équation donne : $\ln(xy) = \ln(2^3 \times 27) = \ln(8 \times 27) = \ln(216) \Leftrightarrow xy = 216$. On cherche deux nombres réels connaissant leur somme $S = 30$ et leur produit $P = 216$. Ils sont les solutions de l'équation $t^2 - 30t + 216 = 0$. $\Delta = (-30)^2 - 4 \times 216 = 900 - 864 = 36 = 6^2$. $t_1 = \frac{30-6}{2} = 12$ et $t_2 = \frac{30+6}{2} = 18$. Les deux solutions étant strictement positives, les couples solutions sont :

$$\mathcal{S} = \{(12 \,; 18) \,; (18 \,; 12)\}.$$

Solution 48.11 : 1. En 0^+ : $\lim_{x\to 0^+}(x-2) = -2$ et $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$, donc $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -2 - (-\infty) = +\infty$. En $+\infty$: Forme indéterminée $\infty - \infty$. On factorise par x : $f(x) = x\big(1 - \frac{2}{x} - \frac{\ln x}{x}\big)$. Or $\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$ et par croissances comparées $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Donc $\lim_{x\to+\infty}\big(1 - \frac{2}{x} - \frac{\ln x}{x}\big) = 1$. Par produit, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. 2. $f'(x) = 1 - 0 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$:

- $f'(x) < 0$ sur $]0 \,; 1[$;
- $f'(1) = 0$;
- $f'(x) > 0$ sur $]1 \,; +\infty[$.

3. Variations : f est strictement décroissante sur $]0 \,; 1]$ puis strictement croissante sur $[1 \,; +\infty[$. Le minimum de f est atteint en 1 et vaut $f(1) = 1 - 2 - \ln 1 = -1$.
4. Sur $]0 \,; 1]$, f est continue, strictement décroissante, $f(]0 \,; 1]) = [-1 \,; +\infty[$. Comme $0 \in [-1 \,; +\infty[$, le corollaire du TVI assure l'existence d'une unique solution $\alpha_1 \in]0 \,; 1]$. Sur $[1 \,; +\infty[$, f est continue, strictement croissante, et $f([1 \,; +\infty[) = [-1 \,; +\infty[$. De même, $0 \in [-1 \,; +\infty[$, il existe une unique solution $\alpha_2 \in [1 \,; +\infty[$. L'équation $f(x) = 0$ admet donc exactement **deux solutions** réelles sur $]0 \,; +\infty[$. (Numériquement, $\alpha_1 \approx 0,158$ et $\alpha_2 \approx 3,146$).

Solution 48.12 : Soit $a > 0$. La tangente à la courbe de ln au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = \ln'(a)(x - a) + \ln a \Leftrightarrow y = \frac{1}{a}(x - a) + \ln a \Leftrightarrow y = \frac{1}{a}x - 1 + \ln a.$$

Cette droite passe par l'origine $(0 \,; 0)$ si et seulement si son ordonnée à l'origine est nulle :

$$-1 + \ln a = 0 \Leftrightarrow \ln a = 1 \Leftrightarrow a = e.$$

Il existe donc une **unique tangente** passant par l'origine. Le point de contact est $A(e \,; 1)$ et son équation est :

$$y = \frac{1}{e}x.$$

Solution 48.13 : 1. $\lim_{x\to+\infty}(x-\ln x)$: Forme indéterminée $\infty-\infty$. Factorisons par x : $x-\ln x = x\big(1-\frac{\ln x}{x}\big)$. Comme $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$, la parenthèse tend vers 1. Comme $\lim_{x\to+\infty}x=+\infty$, le produit tend vers $+\infty$. 2. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x^2+1)}{x}$: Pour $x>0$, $\ln(x^2+1)=\ln\big[x^2\big(1+\frac{1}{x^2}\big)\big]=2\ln x+\ln\big(1+\frac{1}{x^2}\big)$. Le quotient devient : $\frac{\ln(x^2+1)}{x}=2\frac{\ln x}{x}+\frac{\ln(1+1/x^2)}{x}$. Quand $x\to+\infty$, $\frac{\ln x}{x}\to 0$, $1+1/x^2\to 1\Longrightarrow\ln(1+1/x^2)\to 0$. La limite est donc 0. 3. $\lim_{x\to0^+}x\ln\big(1+\frac{1}{x}\big)$: Posons $u=\frac{1}{x}\to+\infty$. L'expression devient $\frac{\ln(1+u)}{u}=\frac{\ln\big(\,u(1+1/u)\big)}{u}=\frac{\ln u}{u}+\frac{\ln(1+1/u)}{u}$. Chacun des deux termes tend vers 0 quand $u\to+\infty$. La limite est donc 0. 4. $\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x^2-1}$: C'est une forme $\frac{0}{0}$. On factorise le dénominateur : $\frac{\ln x}{(x-1)(x+1)}=\frac{\ln x-\ln 1}{x-1}\times\frac{1}{x+1}$. Or $\lim_{x\to1}\frac{\ln x-\ln 1}{x-1}=\ln'(1)=1$ et $\lim_{x\to1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$. Par produit, la limite est $\frac{1}{2}$.

Solution 48.14 : 1. Chaque année le capital augmente de $3,5\,\%$, il est multiplié par $1+0,035=1,035$. Donc $C_n=10\,000\times1,035^n$. 2. Le capital double dès que $C_n\geq20\,000\Leftrightarrow1,035^n\geq2$. En appliquant ln : $n\ln(1,035)\geq\ln 2\Leftrightarrow n\geq\frac{\ln 2}{\ln(1,035)}$ (car $\ln(1,035)>0$). $\frac{\ln 2}{\ln(1,035)}\approx\frac{0,69315}{0,03440}\approx20,15$. Il faut donc 21 années complètes pour doubler le capital. 3. Règle des 70 : Pour un taux de $t\,\%$, le facteur multiplicateur annuel est $1+\frac{t}{100}$. Le temps de doublement est $n=\frac{\ln 2}{\ln(1+t/100)}$. Pour t petit, l'approximation du premier ordre donne $\ln(1+u)\approx u$, donc $\ln(1+t/100)\approx\frac{t}{100}$. De plus, $\ln 2\approx0,693\approx0,70$. Ainsi : $n\approx\frac{0,693}{t/100}=\frac{69,3}{t}\approx\frac{70}{t}$. Pour $t=3,5$, cela donne $\frac{70}{3,5}=20$ ans, ce qui est extrêmement proche des $20,15$ ans trouvés !

Solution 48.15 : 1. $\lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ et $\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}=+\infty$, donc par produit $\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=-\infty$. L'axe (Oy) ($x=0$) est asymptote verticale. Par croissances comparées, $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$. L'axe (Ox) ($y=0$) est asymptote horizontale en $+\infty$. 2. f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables : $f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$. Le dénominateur x^2 est strictement positif. Le signe de $f'(x)$ est celui de $1-\ln x$:

- $1-\ln x>0\Leftrightarrow\ln x<1\Leftrightarrow0<x<e$: f est strictement croissante ;
- $1-\ln x=0\Leftrightarrow x=e$;
- $1-\ln x<0\Leftrightarrow x>e$: f est strictement décroissante.

3. Le maximum global de f sur $]0\,;+\infty[$ est donc atteint en $x=e$ et vaut $f(e)=\frac{\ln e}{e}=\frac{1}{e}$.

4. Comparons e^π et π^e. Puisque $e\approx2,718<\pi\approx3,14$, et que f est strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$, on a :

$$f(e)>f(\pi)\Leftrightarrow\frac{\ln e}{e}>\frac{\ln\pi}{\pi}.$$

Multiplions par $e\pi>0$:

$$\pi\ln e>e\ln\pi\Leftrightarrow\ln(e^\pi)>\ln(\pi^e).$$

Comme ln est strictement croissante :

$$e^\pi>\pi^e.$$

(Vérification numérique : $e^\pi\approx23,14$ et $\pi^e\approx22,46$).

5. $f''(x)=\frac{(-\frac{1}{x})\times x^2-(1-\ln x)\times2x}{x^4}=\frac{-x-2x+2x\ln x}{x^4}=\frac{x(2\ln x-3)}{x^4}=\frac{2\ln x-3}{x^3}$. Le signe dépend de $2\ln x-3$:
   - $2\ln x-3<0\Leftrightarrow\ln x<\frac{3}{2}\Leftrightarrow0<x<e^{3/2}=e\sqrt{e}$: $f''(x)<0$, f est **concave**.
   - $2\ln x-3>0\Leftrightarrow x>e^{3/2}$: $f''(x)>0$, f est **convexe**. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe en $x_0=e^{3/2}$. La courbe admet donc un **point d'inflexion** en $I\big(e^{3/2}\,;\frac{3}{2e^{3/2}}\big)$.

Solution 48.16 : 1. Soit $\varphi(x)=\ln x-(x-1)$ sur $]0\,;+\infty[$. $\varphi'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$. φ' est positive sur $]0\,;1[$, nulle en 1, et négative sur $]1\,;+\infty[$. Le maximum de φ est $\varphi(1)=0-0=0$. Donc pour tout $x>0$, $\varphi(x)\leq0\Leftrightarrow\ln x\leq x-1$. 2. En posant $x=1+t$ avec $1+t>0\Leftrightarrow t>-1$, l'inégalité précédente devient directement $\ln(1+t)\leq(1+t)-1=t$. 3. - Appliquons $\ln(1+t)\leq t$ avec $t=\frac{1}{n}>0$: $\ln\big(1+\frac{1}{n}\big)\leq\frac{1}{n}\Leftrightarrow n\ln\big(1+\frac{1}{n}\big)\leq1$. En appliquant l'exponentielle (croissante) : $\big(1+\frac{1}{n}\big)^n\leq e$.

- Appliquons $\ln(1+t)\leq t$ avec $t=-\frac{1}{n+1}>-1$:

$$\ln\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\leq-\frac{1}{n+1}\Leftrightarrow\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)\leq-\frac{1}{n+1}\Leftrightarrow-\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)\leq-\frac{1}{n+1}.$$

En multipliant par $-(n+1)<0$:

$$(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\geq1.$$

En appliquant l'exponentielle : $\big(1+\frac{1}{n}\big)^{n+1}\geq e$. On en déduit l'encadrement voulu : $\big(1+\frac{1}{n}\big)^n\leq e\leq\big(1+\frac{1}{n}\big)^{n+1}$.

Solution 48.17 : L'activité suit la loi $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$, avec $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{5\,730}$. On a $\frac{A(t)}{A_0} = \frac{2,4}{15,3} \approx 0,15686$. $e^{-\lambda t} = \frac{2,4}{15,3} \Leftrightarrow -\lambda t = \ln\left(\frac{2,4}{15,3}\right) \Leftrightarrow t = -\frac{\ln(2,4/15,3)}{\lambda} = -5\,730 \times \frac{\ln(2,4/15,3)}{\ln 2}$. Calcul numérique : $\ln\left(\frac{2,4}{15,3}\right) \approx \ln(0,15686) \approx -1,8524$. $t \approx -5\,730 \times \frac{-1,8524}{0,69315} \approx 5\,730 \times 2,672 \approx 15\,310$ ans. Les peintures ont approximativement 15 300 ans (époque magdalénienne).

Solution 48.18 : 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = (0,6u_n + 2) - 5 = 0,6u_n - 3 = 0,6(u_n - 5) = 0,6v_n$. Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,6$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 5 = 5 - 5 = 0$… Ah ! Si $u_0 = 5$, alors $u_n = 5$ est constante ! Prenons $u_0 = 10$: alors $v_0 = 10 - 5 = 5$. 2. Avec $u_0 = 10$, $v_n = 5 \times 0,6^n$, et $u_n = 5 + 5 \times 0,6^n$. 3. $|u_n - 5| < 10^{-4} \Leftrightarrow 5 \times 0,6^n < 10^{-4} \Leftrightarrow 0,6^n < \frac{10^{-4}}{5} = 2 \times 10^{-5}$. En prenant ln : $n \ln(0,6) < \ln(2 \times 10^{-5})$. Comme $0,6 < 1$, $\ln(0,6) \approx -0,5108 < 0$, donc le sens s'inverse :

$$n > \frac{\ln(2 \times 10^{-5})}{\ln(0,6)} \approx \frac{-10,8198}{-0,5108} \approx 21,18.$$

Le plus petit entier cherché est donc $\boldsymbol{n = 22}$.

Solutions du Niveau

Solution 48.19 : 1. Pour tout $x > 0$, $\ln(1 + x) \leq x$. Posons $x = \frac{1}{k}$ avec $k \geq 1$ entier :

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \leq \frac{1}{k} \Leftrightarrow \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}.$$

2. Pour tout $x \in]0\,;1[$, $\ln(1 - x) \leq -x \Leftrightarrow -\ln(1 - x) \geq x$. Posons $x = \frac{1}{k}$ avec $k \geq 2$:

$$\frac{1}{k} \leq -\ln\left(1 - \frac{1}{k}\right) = -\ln\left(\frac{k-1}{k}\right) = \ln k - \ln(k-1).$$

3. - Sommons l'inégalité 1 pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln k) \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n.$$

La somme de gauche est télescopique : $(\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \ldots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$. Donc $\ln(n+1) \leq H_n$.

- Sommons l'inégalité 2 pour k allant de 2 à n :

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=2}^{n} (\ln k - \ln(k-1)).$$

La somme télescopique vaut $\ln n - \ln 1 = \ln n$. Comme $H_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k}$, on a $H_n - 1 \leq \ln n \Leftrightarrow H_n \leq 1 + \ln n$. On a bien démontré l'encadrement : $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$.

4. Puisque $\lim_{n\to+\infty} \ln(n+1) = +\infty$, le théorème de comparaison donne immédiatement $\lim_{n\to+\infty} H_n = +\infty$. La série harmonique diverge, bien que ses termes $\frac{1}{n}$ tendent vers 0 !
5. Divisons l'encadrement par $\ln n$ (qui est strictement positif pour $n \geq 2$) :

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \leq \frac{H_n}{\ln n} \leq \frac{1}{\ln n} + 1.$$

Or $\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = \frac{\ln[n(1+1/n)]}{\ln n} = \frac{\ln n + \ln(1+1/n)}{\ln n} = 1 + \frac{\ln(1+1/n)}{\ln n} \to 1$. De plus $\frac{1}{\ln n} + 1 \to 1$. D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n\to+\infty} \frac{H_n}{\ln n} = 1$. (La différence $H_n - \ln n$ converge vers une célèbre constante irrationnelle appelée **constante d'Euler-Mascheroni** $\gamma \approx 0,577215$).

Solution 48.20 : 1. $\ln(n!) = \ln(1 \times 2 \times \ldots \times n) = \sum_{k=1}^{n} \ln k$. 2. Pour $k \geq 2$, la fonction ln étant croissante sur $[k-1\,;k]$ et sur $[k\,;k+1]$, on a pour tout $t \in [k-1\,;k]$: $\ln(k-1) \leq \ln t \leq \ln k$. En intégrant (notion introduite au chapitre 50) ou par l'encadrement discret de l'exercice 48.19, on montre que $\ln(n!) \approx n \ln n - n$, ce qui conduit à l'équivalent de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Solution 48.21 : 1. Pour $x > 0$ et $a > 0$, $x^a = a^x \Leftrightarrow e^{a \ln x} = e^{x \ln a} \Leftrightarrow a \ln x = x \ln a \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln a}{a}$. 2. D'après l'exercice 48.15, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0\,;e]$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ à 0 sur $[e\,;+\infty[$.

- Si $a = e$: $f(a) = \frac{1}{e}$ est le maximum absolu. L'équation $f(x) = f(e)$ a pour unique solution $x = e$.

- Si $a \neq e$ et $a > 1$: la valeur $f(a) \in]0\,;\tfrac{1}{e}[$ est atteinte exactement deux fois : une fois sur $]1\,;e[$ et une fois sur $]e\,;+\infty[$. L'une des solutions est évidemment $x = a$, l'autre est une valeur distincte.
- Si $0 < a \leq 1$: $f(a) \leq 0$. Sur $]0\,;1]$, f est strictement croissante et prend chaque valeur négative une seule fois, tandis que sur $]1\,;+\infty[$, $f(x) > 0$. Il n'y a donc que l'unique solution $x = a$.

3. On cherche deux entiers naturels distincts $1 \leq x < y$ tels que $x^y = y^x$. D'après ce qui précède, il faut que l'un soit strictement inférieur à $e \approx 2,718$ et l'autre strictement supérieur à e. Le seul entier naturel strictement compris entre 1 et e est $x = 2$. Testons $x = 2$: l'équation devient $2^y = y^2$. Pour $y = 3$: $2^3 = 8 \neq 9$. Pour $y = 4$: $2^4 = 16 = 4^2$. C'est une égalité ! Comme f est strictement décroissante sur $[e\,;+\infty[$, il n'existe aucune autre solution entière pour $y > e$. L'unique couple d'entiers naturels cherché est donc $\mathbf{(2\,;4)}$.

Solution 48.22 : 1. Prenons le logarithme népérien des deux membres : $\ln f(x) = \ln(u_1(x)u_2(x)...u_n(x)) = \sum_{k=1}^{n} \ln(u_k(x))$. En dérivant les deux membres par rapport à x :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{u_k'(x)}{u_k(x)}.$$

2. Pour $g(x) = (x+1)^3(2x-1)^4(x^2+5)^2$, on a :

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{3}{x+1} + \frac{4 \times 2}{2x-1} + \frac{2 \times 2x}{x^2+5} = \frac{3}{x+1} + \frac{8}{2x-1} + \frac{4x}{x^2+5}.$$

Il suffit de multiplier cette somme rationnelle par $g(x)$ pour obtenir $g'(x)$ sans avoir à effectuer un long produit de Leibniz !

La question qui ouvre la suite

Le logarithme et l'exponentielle ont permis de maîtriser les croissances qui explosent et les décroissances qui s'éteignent. Mais dans la nature, tout ne grandit pas et ne meurt pas à l'infini : les saisons reviennent, le cœur bat, les planètes tournent, les cordes de guitare vibrent et la balançoire va et vient.

Comment les mathématiques décrivent-elles ce qui **revient sans cesse au point de départ** ? Comment calcule-t-on la vitesse d'un balancier au moment précis où il passe par sa position la plus basse ?

C'est le monde des oscillations, des ondes et du cercle : rendez-vous au chapitre 49 avec **la balançoire et les fonctions qui ondulent**.

CHAPITRE 49 : La Balançoire et les Fonctions qui Ondulent

> « Le mouvement pendulaire m'a révélé que le temps n'est pas une ligne droite qui s'enfuit, mais une respiration qui revient. » — *Inspiré des observations de Galileo Galilei (1583)*

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi le va-et-vient d'une balançoire ou d'un pendule n'est rien d'autre que **l'ombre d'un point qui tourne en rond à vitesse constante**.
- La géométrie du **cercle trigonométrique** et comment le **radian** devient l'unique unité naturelle d'angle pour faire du calcul différentiel.
- Les propriétés de symétrie indispensables : **parité**, **imparité**, **périodicité 2π**, et les formules d'addition et de duplication.
- La dérivation des fonctions sinus et cosinus : la démonstration géométrique fondamentale de $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, pourquoi $(\sin)' = \cos$ et $(\cos)' = -\sin$.
- Le mystère du quart de tour : pourquoi la dérivée avance de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à la fonction.
- La dérivation des fonctions composées du type $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$ et l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique $y'' + \omega^2 y = 0$.
- L'étude complète des variations, des tangentes et de la convexité des courbes sinusoïdales.
- Les applications concrètes : ondes sonores, courant alternatif à 50 Hz, marées et sismologie.

---

1. Le problème : le lustre de Pise et l'ombre du cercle

1.1 L'intuition de Galilée

En **1583**, un jeune étudiant en médecine de dix-neuf ans nommé **Galileo Galilei** (Galilée) assiste à un office dans la cathédrale de Pise. Son regard s'égare vers la voûte. Un sacristain vient d'allumer un grand lustre suspendu à une chaîne immense, et en le lâchant, lui a imprimé un mouvement de balancier régulier.

Galilée remarque une chose extraordinaire : que l'amplitude du balancement soit grande au début, ou minuscule lorsqu'il commence à ralentir à cause des frottements de l'air, **la durée d'un aller-retour semble exactement la même**.

N'ayant pas de montre — les montres mécaniques de précision n'existent pas encore —, Galilée prend son propre pouls à son poignet. Il compte les battements : 4 battements pour un grand balancement, 4 battements pour un moyen, 4 battements pour un tout petit. C'est la découverte de **l'isochronisme des petites oscillations du pendule**.

Ce phénomène est universel : une balançoire d'enfant au parc, une corde de violon pincée, l'eau qui clapote dans une baie fermée, les électrons dans une antenne radio, tous obéissent à ce même rythme fondamental de va-et-vient.



Fig. 107. – Le pendule simple : modélisation du mouvement périodique oscillant

1.2 Du cercle à la vague : la projection lumineuse

Comment représenter mathématiquement ce mouvement d'aller-retour ? Imaginons une expérience visuelle très simple : 1. Une grande roue verticale tourne à vitesse constante dans une pièce sombre. Un petit voyant lumineux M est fixé sur son bord extérieur. 2. Une source de lumière éclaire la roue horizontalement et projette l'ombre du voyant M sur un mur vertical situé derrière.

Que fait l'ombre sur le mur ?

- Lorsque le voyant monte en haut de la roue, son ombre monte jusqu'au sommet du mur, ralentit, s'arrête un instant infinitésimal, puis redescend.
- Au milieu de la course, l'ombre fonce à sa vitesse maximale.
- En bas, elle ralentit, s'arrête et repart vers le haut.

L'ombre sur le mur effectue **exactement le mouvement d'un pendule ou d'une balançoire** ! Si l'on fait défiler un rouleau de papier verticalement à vitesse constante derrière le mur, le voyant trace une onde parfaite : **une sinusoïde**.



Fig. 108. – Génération de l'onde sinusoïdale par rotation du cercle

Le mouvement rectiligne oscillatoire n'est rien d'autre que **la projection d'un mouvement circulaire uniforme**. Pour comprendre la balançoire, il faut donc maîtriser le cercle.

2. Le cercle trigonométrique et les symétries fondamentales

2.1 Le radian : la mesure naturelle de l'arc

Au collège, tu as appris à mesurer les angles en degrés (360° pour un tour complet). Ce choix de 360 est hérité des astronomes babyloniens de l'Antiquité, qui aimaient le nombre 360 car il est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, etc., et proche des 365 jours de l'année.

Mais en mathématiques supérieures et en physique, le degré est un choix arbitraire et catastrophique : si l'on dérivait en degrés, des facteurs parasites comme $\frac{\pi}{180}$ viendraient polluer toutes les formules de dérivation !

L'unité naturelle, c'est le **radian** :

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition du radian —** Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, le **cercle trigonométrique** $\mathcal{C}$ est le cercle de centre l'origine $O(0\,;0)$ et de rayon $R=1$, orienté dans le **sens direct** (sens inverse des aiguilles d'une montre, dit sens anti-horaire). La mesure d'un angle en **radians** est égale à la **longueur de l'arc** intercepté par cet angle sur le cercle trigonométrique de rayon 1.

Puisque le périmètre complet d'un cercle de rayon 1 est $2\pi R = 2\pi$, un tour complet de 360° correspond à un angle de **2π radians**.

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

2.2 Enroulement de la droite réelle et coordonnées

Imaginons une droite numérique graduée tangente au cercle trigonométrique au point $I(1\,;0)$. Enroulons cette droite infinie autour du cercle :

- Les nombres réels positifs s'enroulent dans le sens direct (vers le haut) ;
- Les nombres réels négatifs s'enroulent dans le sens indirect (vers le bas).

À chaque réel $x \in \mathbb{R}$ correspond un unique point M du cercle trigonométrique.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition des fonctions cosinus et sinus —** Pour tout nombre réel x, on note M le point du cercle trigonométrique associé à x par l'enroulement de la droite réelle.
>
> - Le **cosinus** de x, noté $\cos x$, est **l'abscisse** du point M.
> - Le **sinus** de x, noté $\sin x$, est **l'ordonnée** du point M.
>
> $$M(x) = \big(\cos x\,;\sin x\big)\,.$$

2.3 Conséquences immédiates et valeurs remarquables

1. **Bornes absolues :** Puisque le cercle est de rayon 1, les coordonnées de tout point M sont comprises entre -1 et 1 :
$$\text{Pour tout } \; x\in\mathbb{R} : \quad -1 \le \cos x \le 1 \quad \text{et} \quad -1 \le \sin x \le 1.$$
2. **Équation du cercle (Pythagore) :** Le triangle rectangle formé par les projections de M a pour côtés de l'angle droit $|\cos x|$ et $|\sin x|$, et pour hypoténuse le rayon $OM = 1$. Le théorème de Pythagore donne :
$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$
(Rappel de notation : $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$).
3. **Tableau des valeurs remarquables (à connaître par cœur) :**

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

> 💡 **Astuce mnémotechnique pour la ligne du sinus :**
> Remarque la suite des racines : $\sin 0 = \frac{\sqrt{0}}{2} = 0$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$. Les numérateurs montent de $\sqrt{0}$ à $\sqrt{4}$, tandis que pour le cosinus ils descendent en sens inverse !

2.4 Périodicité et parité : la force des symétries

Faire un tour complet supplémentaire sur le cercle revient à ajouter 2π à la longueur enroulée : le point M revient exactement au même endroit.

> 📐 **Périodicité —**
> Les fonctions cosinus et sinus sont **périodiques de période 2π** (ou 2π-périodiques). Pour tout réel x et tout entier relatif $k \in \mathbb{Z}$:
> $$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \text{et} \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x.$$

Examinons maintenant les symétries géométriques sur le cercle :

- Les points associés à x et $-x$ sont symétriques par rapport à **l'axe des abscisses (Ox)**. Ils ont donc la même abscisse et des ordonnées opposées.

> 📐 **Parité —**
> - La fonction cosinus est **paire** : $\cos(-x) = \cos x$. Sa courbe représentative dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à **l'axe des ordonnées (Oy)**.
> - La fonction sinus est **impaire** : $\sin(-x) = -\sin x$. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à **l'origine $O(0\,;0)$**.

2.5 Formules d'angles associés (les reflets du cercle)

En faisant tourner le point $M(x)$ par un demi-tour $(+\pi)$ ou par symétrie par rapport aux axes, on obtient les relations fondamentales :

Transformation	Angle	Cosinus	Sinus	Interprétation
Demi-tour	$x + \pi$	$-\cos x$	$-\sin x$	Symétrie centrale par rapport à O
Angle supplémentaire	$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	Symétrie par rapport à l'axe vertical (Oy)
Quart de tour	$x + \frac{\pi}{2}$	$-\sin x$	$\cos x$	Rotation de $+90°$
Angle complémentaire	$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	Symétrie par rapport à la bissectrice $y = x$

> **Découverte & Histoire**
> 💡 **Le savais-tu ? Le mot « cosinus » :** Le préfixe *co-* vient du latin *complementi* : le **cosinus** d'un angle est simplement le **sinus du complémentaire** ($\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$).

2.6 Formules d'addition et de duplication

Ces formules permettent d'exprimer les fonctions d'une somme en fonction des composantes :

Formules d'addition —

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$
$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$
$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Formules de duplication —

En posant $a = b = x$:

$$\sin(2x) = 2\sin x \cos x$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Calcul exact de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Remarquons que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$. En appliquant la formule d'addition du cosinus :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4}.$$

Remplaçons par les valeurs remarquables :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

---

3. La dérivation du sinus et du cosinus : le virage à angle droit

Pour calculer la vitesse d'une balançoire ou l'accélération d'un oscillateur, nous devons dériver les fonctions sinus et cosinus. Mais avant cela, une question vertigineuse se pose : **quelle est la dérivée de $\sin x$ en $x = 0$?**

3.1 La limite fondamentale $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0 s'écrit :

$$\tau(x) = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = \frac{\sin x}{x}.$$

Quand x tend vers 0, nous faisons face à une forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Levons cette indétermination par un argument géométrique éclatant.

Lemme fondamental (encadrement trigonométrique) —

Pour tout réel $x \in]0\,;\,\frac{\pi}{2}[$:

$$\sin x \leq x \leq \tan x \quad \left(\text{où } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}\right).$$

✍ Démonstration géométrique (exigible) —

Considérons sur le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1 :

- le point $A(1\,;0)$;
- le point $M(\cos x\,;\sin x)$ associé à l'angle $x \in]0\,;\frac{\pi}{2}[$;
- le point $T(1\,;\tan x)$, intersection de la demi-droite $[OM)$ avec la tangente verticale au cercle en A.

Comparons les aires de trois surfaces géométriques imbriquées les unes dans les autres : 1. Le **triangle intérieur** OAM : sa base est $OA = 1$, sa hauteur est l'ordonnée de M, soit $\sin x$.

$$\text{Aire}(OAM) = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{1 \times \sin x}{2} = \frac{\sin x}{2}.$$

2. Le **secteur angulaire** OAM (la portion de disque de rayon 1 d'angle au centre x) : Puisque l'aire d'un disque complet de rayon 1 est $\pi \times 1^2 = \pi$ pour un angle de 2π, l'aire d'un secteur d'angle x radians est proportionnelle :

$$\text{Aire}(\text{secteur } \ OAM) = \frac{x}{2\pi} \times \pi = \frac{x}{2}.$$

3. Le **triangle extérieur** OAT : sa base est $OA = 1$, sa hauteur est $AT = \tan x$.

$$\text{Aire}(OAT) = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{1 \times \tan x}{2} = \frac{\tan x}{2}.$$

Puisque le triangle OAM est strictement contenu dans le secteur angulaire OAM, lui-même strictement contenu dans le triangle OAT :

$$\text{Aire}(OAM) \leq \text{Aire}(\text{secteur } \ OAM) \leq \text{Aire}(OAT) \Leftrightarrow \frac{\sin x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2}.$$

En multipliant par 2 :

$$\sin x \leq x \leq \tan x.$$

■



Fig. 109. – Ligne trigonométrique de la tangente sur le cercle unité

📐 Théorème — Limite remarquable en 0 :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

✍ Démonstration —

Pour tout $x \in]0\,;\tfrac{\pi}{2}[$, on a $\sin x > 0$. Divisons l'encadrement $\sin x \leq x \leq \frac{\sin x}{\cos x}$ par $\sin x$:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

En passant aux inverses (les termes étant strictement positifs) :

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Cette inégalité est également vraie pour $x \in]-\tfrac{\pi}{2}\,;0[$, car $\cos(-x) = \cos x$ et $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$. Or, par continuité du cosinus en 0, $\lim_{x\to 0} \cos x = \cos 0 = 1$. D'après le **théorème des gendarmes** :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

■

📐 Corollaire fondamental — Limite de $\frac{1-\cos x}{x^2}$ en 0 :

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \text{et par conséquent} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0.$$

Démonstration : Utilisons la formule de duplication $\cos(2u) = 1 - 2\sin^2 u$ avec $u = \frac{x}{2}$, d'où $1 - \cos x = 2\sin^2(\frac{x}{2})$. Alors :

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{2}{4} \times \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2.$$

Quand $x \to 0$, $u = \frac{x}{2} \to 0$, donc $\frac{\sin(x/2)}{x/2} \to 1$. Par produit de limites : $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$. De plus, $\frac{\cos x - 1}{x} = -x \times \frac{1-\cos x}{x^2} \to 0 \times \frac{1}{2} = 0$. ■

3.2 Le calcul des dérivées de sinus et cosinus

📐 Théorème (Démonstrations exigibles au baccalauréat) —

Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos x \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin x.$$

✍ Démonstration pour $\sin'(x)$ —

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé et soit $h \neq 0$. Formons le taux d'accroissement de la fonction sinus entre x et $x+h$:

$$\tau(h) = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}.$$

D'après la formule d'addition : $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$. Donc :

$$\tau(h) = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \left(\frac{\cos h - 1}{h}\right) + \cos x \left(\frac{\sin h}{h}\right).$$

Lorsque $h \to 0$:

- $\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$;
- $\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} = 1$.

On en déduit :

$$\lim_{h\to 0} \tau(h) = \sin x \times 0 + \cos x \times 1 = \cos x.$$

La fonction sinus est donc dérivable en tout réel x, et $\sin'(x) = \cos x$. ■

✍ **Démonstration pour $\cos'(x)$ —**

On utilise la formule d'addition pour le cosinus :

$$\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} = \frac{\cos x\cos h - \sin x\sin h - \cos x}{h} = \cos x\left(\frac{\cos h - 1}{h}\right) - \sin x\left(\frac{\sin h}{h}\right).$$

Par passage à la limite quand $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h} = \cos x \times 0 - \sin x \times 1 = -\sin x.$$

La fonction cosinus est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $\cos'(x) = -\sin x$. ■

3.3 Le mystère du quart de tour : la vision cinématique

Pourquoi la dérivée de sinus est-elle cosinus, et la dérivée de cosinus est-elle **moins** sinus ? Regarde ce qui se passe lorsqu'on ajoute un quart de tour, c'est-à-dire un angle de $+\frac{\pi}{2}$:

- $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \cos x$;
- $\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$.

> ***Dériver une sinusoïde, c'est lui faire faire un quart de tour en avance de phase !***

En physique cinématique, si un point parcourt le cercle trigonométrique dans le sens direct avec une position $\overrightarrow{OM}(t) = \cos t\,\vec{\imath} + \sin t\,\vec{\jmath}$, son vecteur vitesse instantanée $\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ est :

$$\vec{v}(t) = -\sin t\,\vec{\imath} + \cos t\,\vec{\jmath}.$$

Or le produit scalaire $\overrightarrow{OM}(t)\cdot\vec{v}(t) = \cos t(-\sin t) + \sin t(\cos t) = 0$! Le vecteur vitesse est **strictement perpendiculaire** au rayon : il est orienté tangentiellement dans le sens de rotation, soit exactement $90°$ en avant.

3.4 Dérivées de fonctions composées

D'après le théorème de dérivation des composées $(f\circ u)' = u' \times (f'\circ u)$:

📐 **Formules de composition —**

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I : 1. $\big(\sin(u(x))\big)' = u'(x)\cos(u(x))$ 2. $\big(\cos(u(x))\big)' = -u'(x)\sin(u(x))$

En particulier, pour les pulsations harmoniques $u(t) = \omega t + \varphi$ avec $\omega, \varphi \in \mathbb{R}$:

$$\big(\sin(\omega t+\varphi)\big)' = \omega\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\big(\cos(\omega t+\varphi)\big)' = -\omega\sin(\omega t+\varphi)$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calculs de dérivées composées.

1. $f_1(x) = \sin(3x-\pi) \Longrightarrow f_1'(x) = 3\cos(3x-\pi)$. 2. $f_2(x) = \cos(x^2+1) \Longrightarrow f_2'(x) = -(2x)\sin(x^2+1) = -2x\sin(x^2+1)$. 3. $f_3(x) = \sin^3(x) = (\sin x)^3 \Longrightarrow f_3'(x) = 3(\sin x)^2 \times (\sin x)' = 3\sin^2 x\cos x$. 4. $f_4(x) = e^{-x}\cos(2x) \Longrightarrow$ règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f_4'(x) = (-e^{-x})\cos(2x) + e^{-x}(-2\sin(2x)) = -e^{-x}\left(\cos(2x) + 2\sin(2x)\right).$$

3.5 Dérivée seconde et l'équation de l'oscillateur harmonique

Calculons la dérivée seconde de la fonction $f(t) = \cos(\omega t)$:

- $f'(t) = -\omega\sin(\omega t)$;
- $f''(t) = -\omega \times \big(\,\omega\cos(\omega t)\big) = -\omega^2\cos(\omega t) = -\omega^2 f(t)$.

En passant tout du même côté :

$$f''(t) + \omega^2 f(t) = 0.$$

> 💡 **Découverte magistrale —**
>
> Les fonctions sinusoïdales sont les **uniques solutions** de l'équation différentielle du second ordre :
>
> $$y'' + \omega^2 y = 0.$$
>
> C'est l'équation maîtresse de toute la physique classique : celle du ressort (loi de Hooke $ma = -kx$), du circuit électrique bobine-condensateur (oscillateur LC), du son, de la lumière et des ondes électromagnétiques !

---

4. Étude complète des fonctions sinus et cosinus

Puisque les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π, il suffit de les étudier sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi\,;\pi]$. De plus, grâce à la parité :

- Pour le cosinus (fonction paire) : on étudie sur $[0\,;\pi]$, puis on complète par symétrie axiale par rapport à (Oy) sur $[-\pi\,;\pi]$.
- Pour le sinus (fonction impaire) : on étudie sur $[0\,;\pi]$, puis on complète par symétrie centrale par rapport à l'origine O sur $[-\pi\,;\pi]$.

Enfin, on reproduit le motif à l'infini vers la gauche et vers la droite par translations successives de vecteur $2\pi\vec{\imath}$.

4.1 Étude de la fonction cosinus

Sur l'intervalle $[0\,;\pi]$:

- $\cos'(x) = -\sin x$.
- Pour tout $x \in]0\,;\pi[$, $\sin x > 0$, donc $\cos'(x) < 0$.
- La fonction cosinus est donc **strictement décroissante** sur $[0\,;\pi]$.
- $\cos 0 = 1$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, et $\cos \pi = -1$.

Tableau de variations sur $[-\pi\,;\pi]$:

x	$-\pi$		0		π
Signe de $\cos'(x) = -\sin(x)$	0	$+$	0	$-$	0
Variations de $\cos(x)$	-1 (Min)	↗	1 (Max)	↘	-1 (Min)

Tangentes et concavité : - En $x = 0$, $\cos'(0) = 0$: la courbe admet une **tangente horizontale** au sommet $(0\,;1)$. - En $x = \pi$, $\cos'(\pi) = 0$: **tangente horizontale** au creux $(\pi\,;-1)$. - Dérivée seconde : $\cos''(x) = -\cos x$. Sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$, $\cos x \geq 0 \Longrightarrow \cos''(x) \leq 0$: la fonction est **concave**. Sur $[\frac{\pi}{2}\,;\pi]$, $\cos x \leq 0 \Longrightarrow \cos''(x) \geq 0$: la fonction est **convexe**. Le point d'inflexion se situe en $x = \frac{\pi}{2}$, là où la courbe traverse l'axe des abscisses avec une pente de -1.

4.2 Étude de la fonction sinus

Sur l'intervalle $[0\,;\pi]$:

- $\sin'(x) = \cos x$.
- Sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$, $\cos x > 0$: sin est **strictement croissante**.
- En $x = \frac{\pi}{2}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$: tangente horizontale au point $(\frac{\pi}{2}\,;1)$.
- Sur $]\frac{\pi}{2}\,;\pi[$, $\cos x < 0$: sin est **strictement décroissante**.

Tableau de variations sur $[-\pi\,;\pi]$:

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin'(x) = \cos(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$\sin(x)$	0	-1 (Min)	0	1 (Max)	0

Tangentes remarquables : - En $x = 0$, $\sin'(0) = 1$ et $\sin 0 = 0$. La tangente à l'origine est la droite d'équation :

$$y = x.$$

Pour $x \approx 0$, l'approximation affine donne $\boldsymbol{\sin x \approx x}$. C'est la célèbre approximation des petits angles utilisée par tous les physiciens !

---

5. Résolution d'équations et inéquations trigonométriques

5.1 Les équations fondamentales

Méthode — Résolution de $\cos x = \cos \alpha$:

Deux points du cercle trigonométrique ont la même abscisse si et seulement si leurs angles sont égaux ou opposés, à un nombre entier de tours près :

$$\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Méthode — Résolution de $\sin x = \sin \alpha$:

Deux points du cercle trigonométrique ont la même ordonnée si et seulement si leurs angles sont égaux ou supplémentaires ($\pi - \alpha$), à un nombre entier de tours près :

$$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Résolution sur un intervalle donné.

Résoudre l'équation $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0\,;2\pi]$.

- On sait que $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$.
- L'équation équivaut à :

$$2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

ou

$$2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

- Sélectionnons les valeurs qui tombent dans l'intervalle $[0\,;2\pi]$:
  - Pour la première série $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$:
    - $k = 0 \Longrightarrow x_1 = \frac{\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$;
    - $k = 1 \Longrightarrow x_2 = \frac{\pi}{6} + \pi = \frac{7\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$;
    - $k = 2 \Longrightarrow x = \frac{13\pi}{6} > 2\pi$ (hors intervalle).
  - Pour la seconde série $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$:
    - $k = 0 \Longrightarrow x = -\frac{\pi}{6} < 0$ (hors intervalle) ;
    - $k = 1 \Longrightarrow x_3 = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$;
    - $k = 2 \Longrightarrow x_4 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$.
- Conclusion : $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\,\frac{5\pi}{6}\,;\,\frac{7\pi}{6}\,;\,\frac{11\pi}{6}\right\}$.

5.2 Équations avec changement de variable

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Équation du second degré. Résoudre sur $[0\,;2\pi[$ l'équation $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$. Posons $X = \sin x$. L'équation devient un trinôme du second degré :

$$2X^2 - 3X + 1 = 0.$$

$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1$. Les racines en X sont $X_1 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{3+1}{4} = 1$.
Revenons à $\sin x$: 1. $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}$. 2. $\sin x = \frac{1}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.
Les solutions dans $[0\,;2\pi[$ sont : $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\,\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{5\pi}{6}\right\}$.

5.3 Inéquations trigonométriques

Pour résoudre une inéquation du type $\cos x \geq c$ ou $\sin x < c$, on lit directement l'ensemble des solutions sur le cercle trigonométrique en traçant la droite frontière verticale ($x = c$) ou horizontale ($y = c$).

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Inéquation sur $]-\pi\,;\pi]$. Résoudre sur $[-\pi\,;\pi]$ l'inéquation $\sin x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Traçons la droite horizontale d'ordonnée $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Elle coupe le cercle aux angles $-\frac{\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$. La zone où l'ordonnée est supérieure ou égale à $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ correspond à l'arc supérieur. En parcourant l'intervalle de $-\pi$ à π :

- de $-\pi$ à $-\frac{3\pi}{4}$: $\sin x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
- de $-\frac{3\pi}{4}$ à $-\frac{\pi}{4}$: $\sin x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
- de $-\frac{\pi}{4}$ à π : $\sin x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \left[-\pi\,;-\frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{4}\,;\pi\right].$$

---

6. Le monde des signaux et des ondes : modélisations concrètes

Une oscillation physique réelle ne fait pas toujours un aller-retour en 2π secondes, et son amplitude n'est pas forcément égale à 1 mètre. On utilise la forme générale d'un **signal sinusoïdal** :

$$s(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

où :

- $\boldsymbol{A > 0}$ est **l'amplitude** (la valeur maximale atteinte par le signal) ;
- $\boldsymbol{\omega > 0}$ est la **pulsation** (en radians par seconde, $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$) ;
- $\boldsymbol{T = \frac{2\pi}{\omega}}$ est la **période** temporelle (durée d'un cycle complet en secondes) ;
- $\boldsymbol{f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}}$ est la **fréquence** (nombre de cycles par seconde, en Hertz Hz) ;
- φ est la **phase à l'origine** (le déphasage au temps $t = 0$).

6.1 Le courant alternatif du réseau électrique

Dans les prises de courant européennes, la tension électrique est une onde sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz. La pulsation est $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 100\pi \approx 314,16$ $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$. La période d'oscillation est $T = \frac{1}{50} = 0,02$ s $= 20$ millisecondes. La tension efficace de 230 V correspond à une amplitude maximale de crête $U_{\max} = 230\sqrt{2} \approx 325$ V :

$$u(t) = 325\cos(100\pi t).$$

6.2 Les notes de musique et l'acoustique

Le son pur produit par un diapason est une variation de pression de l'air de forme purement sinusoïdale. Le « *La 440* » de référence des musiciens correspond à 440 vibrations complètes par seconde ($f = 440 \ \text{Hz}$). La longueur d'onde dans l'air (à la vitesse du son $c \approx 340 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$) est :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{440} \approx 0,77 \ \text{m} \ .$$

💻 Simulation Python — Échantillonnage d'une sinusoïde :

```
import math
>
def signal_sinusoidal(amplitude, frequence, duree, nb_points):
    omega = 2 * math.pi * frequence
    pas = duree / nb_points
    points = [
]

    for i in range(nb_points):
        t = i * pas
        valeur = amplitude * math.sin(omega * t)
        points.append((round(t, 4), round(valeur, 3)))
    return points
>
# Générons un signal de 50 Hz pendant 0.02 seconde (1 période complète)
ech = signal_sinusoidal(amplitude=325, frequence=50, duree=0.02, nb_points=5)
print("Points échantillonnés :", ech)
```

Ce qu'il faut retenir

1. Le cercle trigonométrique et les symétries

- Le radian mesure la longueur d'arc : $180^\circ = \pi \ \text{rad}$.
- Coordonnées : $M(x) = (\cos x \,;\sin x)$, d'où $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $-1 \leq \cos x, \sin x \leq 1$.
- Périodicité : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- Parité : $\cos(-x) = \cos x$ (cosinus est paire) ; $\sin(-x) = -\sin x$ (sinus est impaire).
- Formules d'angles associés : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

2. Dérivation fondamentale

- Limite remarquable à l'origine : $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- Dérivées des fonctions usuelles :

$$(\sin x)' = \cos x \quad \text{et} \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

- Dérivées des fonctions composées :

$$\big(\sin(u)\big)' = u' \cos(u) \quad \text{et} \quad \big(\cos(u)\big)' = -u' \sin(u).$$

- En particulier : $\big(\cos(\omega t + \varphi)\big)' = -\omega \sin(\omega t + \varphi)$.
- Dérivée seconde : $(\sin)''(x) = -\sin x$ et $(\cos)''(x) = -\cos x$.
- Équation différentielle de l'oscillateur harmonique : $y'' + \omega^2 y = 0$.

3. Allure des courbes et tangentes

- Tangente à l'origine de $\sin$: $y = x$. Pour x proche de 0, $\sin x \approx x$.
- Tangente au sommet de $\cos$ en 0 : $y = 1$ (tangente horizontale).

- Période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et fréquence $f = \frac{1}{T}$.

4. Résolution des équations trigonométriques

- $\cos x = \cos\alpha \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin\alpha \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 49.1 — Conversions et valeurs exactes. 1. Convertir en radians les angles suivants : $15°$, $75°$, $150°$, $315°$. 2. Donner sans calculatrice les valeurs exactes de : $A = \cos(\frac{2\pi}{3})$, $\quad B = \sin(-\frac{\pi}{4})$, $\quad C = \cos(\frac{7\pi}{6})$, $\quad D = \sin(\frac{5\pi}{2})$.

Exercice 49.2 — Simplification d'expressions trigonométriques. Simplifier pour tout réel x : 1. $E(x) = \cos(x + \pi) + \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 2. $F(x) = \sin(\pi - x) - \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 3. $G(x) = \cos(-x) + \cos(\pi - x) + \sin(-x) + \sin(\pi + x)$ 4. $H(x) = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2$

Exercice 49.3 — Calculs de dérivées directes. Dériver sur $\mathbb{R}$ les fonctions suivantes : 1. $f_1(x) = 3\sin x - 2\cos x$ 2. $f_2(x) = x\sin x$ 3. $f_3(x) = \frac{\cos x}{x^2+1}$ 4. $f_4(x) = \sin(5x - 2)$ 5. $f_5(x) = \cos(4x^2)$

Exercice 49.4 — Équations élémentaires dans $\mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{R}$: 1. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 2. $\sin x = -\frac{1}{2}$ 3. $\cos(3x) = 0$ 4. $\sin(2x) = 1$

Exercice 49.5 — Équations sur un intervalle restreint. 1. Résoudre $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $[0\,;2\pi]$. 2. Résoudre $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$.

Exercice 49.6 — Inéquations immédiates. Résoudre sur $[-\pi\,;\pi]$: 1. $\cos x > 0$ 2. $\sin x \leq \frac{1}{2}$

Exercice 49.7 — Calcul de limites trigonométriques. Déterminer : 1. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ 2. $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x}$ 3. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\cos x}{x}$ (utiliser le théorème des gendarmes)

Niveau (Réflexion et Baccalauréat)

Exercice 49.8 — Équation du second degré en cosinus. Résoudre sur $[0\,;2\pi[$ l'équation :

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$$

Exercice 49.9 — Étude d'une fonction oscillante amortie. Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(t) = e^{-t}\sin t$. 1. Déterminer la limite de f en $+\infty$. 2. Calculer $f'(t)$ et montrer que $f'(t) = \sqrt{2}e^{-t}\cos(t + \frac{\pi}{4})$. 3. Dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0\,;2\pi]$. 4. Tracer l'allure de la courbe en faisant apparaître les courbes enveloppes $y = e^{-t}$ et $y = -e^{-t}$.

Exercice 49.10 — Étude complète d'une fonction trigonométrique classique. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x) + 2\cos x.$$

1. Montrer que f est 2π-périodique et paire. En déduire que l'on peut limiter l'étude à l'intervalle $[0\,;\pi]$. 2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -2\sin x(2\cos x + 1)$. 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\pi]$ et dresser le tableau de variations de f sur cet intervalle. 4. Préciser les extremums de f sur $[0\,;\pi]$.

Exercice 49.11 — Tangentes et approximation locale. Soit $g(x) = \frac{\sin x}{2+\cos x}$ définie sur $\mathbb{R}$. 1. Justifier que le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$. 2. Démontrer que la fonction g est impaire. 3. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = \frac{2\cos x + 1}{(2+\cos x)^2}$. 4. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de g à l'origine $(0\,;0)$.

Exercice 49.12 — Formules d'addition et calculs d'angles. 1. Démontrer que pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b)\cos(a-b) = \cos^2 a - \sin^2 b.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(3x) = \sin(2x)$ en utilisant $\sin(u) = \cos(\frac{\pi}{2} - u)$.

Exercice 49.13 — Convexité et points d'inflexion. Soit $f(x) = \sin^2 x$ définie sur $[0\,;\pi]$. 1. Exprimer $f(x)$ à l'aide de $\cos(2x)$. 2. Calculer $f'(x)$ puis $f''(x)$. 3. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe, puis concave. 4. Préciser les coordonnées des points d'inflexion sur $[0\,;\pi]$.

Exercice 49.14 — Modélisation d'une marée océanique. Dans un port breton, la hauteur de la mer $H(t)$ (en mètres) est modélisée en fonction du temps t (en heures écoulées depuis minuit) par :

$$H(t) = 6 + 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right).$$

1. Quelle est la période de la marée ? 2. Quelle est la hauteur d'eau à marée haute (pleine mer) ? À marée basse (basse mer) ? 3. À quelle heure de la matinée (pour $t \in [0\,;12]$) la marée haute est-elle atteinte ? 4. Un chalutier ne peut entrer dans le port que si la hauteur d'eau dépasse 8 mètres. Sur quels créneaux horaires de la matinée le chalutier peut-il naviguer en toute sécurité ?

Exercice 49.15 — Limites de formes indéterminées avec trigonométrie. Déterminer en justifiant : 1. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(2x)}{x\sin x}$ 2. $\lim_{x\to \pi/2} \frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$ 3. $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}$

Niveau (Approfondissement et Défis)

Exercice 49.16 — La formule de Machin et le calcul de π. On définit la fonction tangente par $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ pour $x \in]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}[$. 1. Montrer que $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1-\tan a\tan b}$. 2. Soit α tel que $\tan\alpha = \frac{1}{5}$. Calculer $\tan(2\alpha)$ puis $\tan(4\alpha)$. 3. En déduire la remarquable relation de John Machin (1706) :

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

(Cette formule a permis de calculer les 100 premières décimales de π à la main !)

Exercice 49.17 — Somme trigonométrique de Dirichlet. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$, on pose :

$$S_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = \frac{1}{2} + \cos x + \cos(2x) + \dots + \cos(nx).$$

1. Démontrer la relation trigonométrique : $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos(kx) = \sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)x\right) - \sin\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)x\right)$. 2. En multipliant $S_n(x)$ par $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)$, obtenir par somme télescopique :

$$S_n(x) = \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

(Ce noyau de Dirichlet est au cœur de la théorie des séries de Fourier).

Exercice 49.18 — Inégalité de Jordan et encadrement fin. 1. Démontrer que la fonction $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ est strictement décroissante sur $]0\,;\frac{\pi}{2}[$. 2. En déduire la célèbre **inégalité de Jordan** :

$$\text{Pour tout } \; x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right] : \quad \frac{2}{\pi}x \le \sin x \le x.$$

3. Interpréter graphiquement cette inégalité à l'aide de la corde et de la tangente.

Exercice 49.19 — Système oscillant couplé et déphasage. On considère deux signaux $s_1(t) = 3\cos(\omega t)$ et $s_2(t) = 4\sin(\omega t)$. On forme la somme $S(t) = s_1(t) + s_2(t)$. 1. Montrer qu'il existe une amplitude $A > 0$ et un angle de phase $\varphi \in [0\,;2\pi[$ tels que :

$$S(t) = A\cos(\omega t - \varphi).$$

2. Calculer exactement A et donner une valeur approchée de φ. 3. Généralisation : Montrer que toute combinaison linéaire $a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t)$ peut s'écrire sous la forme $R\cos(\omega t - \theta)$ avec $R = \sqrt{a^2+b^2}$.

Exercice 49.20 — Absence de limite en l'infini. Démontrer rigoureusement à l'aide de suites que la fonction $x \mapsto \cos x$ n'admet **aucune limite** lorsque $x \to +\infty$.

Solutions

Solutions du Niveau

Solution 49.1 : 1. Formule de conversion : $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \times \frac{\pi}{180}$.

• $15^\circ = 15 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$ rad.

- $75^\circ = 75 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}$ rad.
- $150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ rad.
- $315^\circ = 315 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{4}$ rad.

2. Valeurs exactes :
   - $A = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$.
   - $B = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
   - $C = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
   - $D = \sin\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Solution 49.2 : 1. $E(x) = -\cos x + \cos x = 0$. 2. $F(x) = \sin x - \sin x = 0$. 3. $G(x) = \cos x - \cos x - \sin x - \sin x = -2\sin x$. 4. Développons : $(\cos^2 x + 2\sin x\cos x + \sin^2 x) + (\cos^2 x - 2\sin x\cos x + \sin^2 x) = 2(\cos^2 x + \sin^2 x) = 2 \times 1 = 2$.

Solution 49.3 : 1. $f_1'(x) = 3\cos x - 2(-\sin x) = 3\cos x + 2\sin x$. 2. Produit $(uv)' = u'v + uv'$: $f_2'(x) = 1 \times \sin x + x\cos x = \sin x + x\cos x$. 3. Quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$: $f_3'(x) = \frac{(-\sin x)(x^2+1) - \cos x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-(x^2+1)\sin x - 2x\cos x}{(x^2+1)^2}$. 4. Dérivée composée : $f_4'(x) = 5\cos(5x-2)$. 5. Dérivée composée : $u(x) = 4x^2 \Longrightarrow u'(x) = 8x$, donc $f_5'(x) = -8x\sin(4x^2)$.

Solution 49.4 : 1. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). 2. $\sin x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). 3. $\cos(3x) = 0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$). 4. $\sin(2x) = 1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Solution 49.5 : 1. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$. Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ et $x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $[0\,;2\pi]$: pour $k=0$, $x_1 = \frac{3\pi}{4}$; pour $k=1$ dans la seconde, $x_2 = 2\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$. $\mathcal{S} = \left\{\frac{3\pi}{4}\,;\,\frac{5\pi}{4}\right\}$. 2. $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$. Donc $2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ ou $2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. Dans $[-\pi\,;\pi]$:

- $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ donne pour $k=0$: $\frac{\pi}{6}$ et pour $k=-1$: $-\frac{5\pi}{6}$.
- $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ donne pour $k=0$: $\frac{\pi}{3}$ et pour $k=-1$: $-\frac{2\pi}{3}$. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{5\pi}{6}\,;\,-\frac{2\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{6}\,;\,\frac{\pi}{3}\right\}$.

Solution 49.6 : 1. $\cos x > 0$ sur $[-\pi\,;\pi]$: correspond aux abscisses strictement positives du cercle, soit $\mathcal{S} =]-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}[$. 2. $\sin x \le \frac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$: la droite $y = 1/2$ coupe en $-\frac{7\pi}{6}$ (qui vaut $\frac{5\pi}{6}$) et $\frac{\pi}{6}$. Sur $[-\pi\,;\pi]$, l'ordonnée est inférieure ou égale à $1/2$ sur $\left[-\pi\,;\,\frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}\,;\,\pi\right]$.

Solution 49.7 : 1. Posons $u = 3x$. Quand $x \to 0$, $u \to 0$. $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin u}{u}$. Comme $\lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{u} = 1$, la limite vaut $3 \times 1 = 3$. 2. $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x\cos x} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x}$. Or $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$. La limite vaut $1 \times 1 = 1$. 3. Pour tout réel $x > 0$, $-1 \le \cos x \le 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{x} \le \frac{\cos x}{x} \le \frac{1}{x}$. Comme $\lim_{x\to+\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$.

Solutions du Niveau

Solution 49.8 : Posons $X = \cos x$. L'équation devient $2X^2 + X - 1 = 0$. $\Delta = 1^2 - 4(2)(-1) = 9 = 3^2$. $X_1 = \frac{-1-3}{4} = -1$ et $X_2 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2}$.

- $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi$ sur $[0\,;2\pi[$.
- $\cos x = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$. $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{3}\,;\,\pi\,;\,\frac{5\pi}{3}\right\}$.

Solution 49.9 : 1. Pour tout $t \ge 0$, $-1 \le \sin t \le 1 \Leftrightarrow -e^{-t} \le e^{-t}\sin t \le e^{-t}$. Comme $\lim_{t\to+\infty} e^{-t} = 0$, le théorème des gendarmes implique $\lim_{t\to+\infty} f(t) = 0$. 2. Dérivée du produit : $f'(t) = -e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t = e^{-t}(\cos t - \sin t)$. Or $\cos t - \sin t = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin t\right) = \sqrt{2}(\cos t\cos\frac{\pi}{4} - \sin t\sin\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}\cos(t + \frac{\pi}{4})$. Donc $f'(t) = \sqrt{2}e^{-t}\cos(t+\frac{\pi}{4})$. 3. Sur $[0\,;2\pi]$, $e^{-t} > 0$, donc $f'(t)$ s'annule quand $\cos(t+\frac{\pi}{4}) = 0$: $t + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t_1 = \frac{\pi}{4}$, et $t + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow t_2 = \frac{5\pi}{4}$.

- Sur $\left[0\,;\frac{\pi}{4}\right]$, $f'(t) \ge 0$: f croît de 0 à $f(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\pi/4} \approx 0,322$.
- Sur $\left[\frac{\pi}{4}\,;\frac{5\pi}{4}\right]$, $f'(t) \le 0$: f décroît jusqu'à $f(5\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-5\pi/4} \approx -0,014$.
- Sur $\left[\frac{5\pi}{4}\,;2\pi\right]$, $f'(t) \ge 0$: f remonte jusqu'à $f(2\pi) = 0$.

4. L'oscillation sinusoïdale est pincée entre les deux courbes exponentielles amorties $y = e^{-t}$ et $y = -e^{-t}$, touchant alternativement ces enveloppes aux crêtes et creux déphasés.

Solution 49.10 : 1. $f(x+2\pi) = \cos(2x+4\pi) + 2\cos(x+2\pi) = \cos(2x) + 2\cos x = f(x)$: f est 2π-périodique. $f(-x) = \cos(-2x) + 2\cos(-x) = \cos(2x) + 2\cos x = f(x)$: f est paire. On peut donc restreindre l'étude à un demi-intervalle de période : $[0\,;\pi]$. 2. $f'(x) = -2\sin(2x) - 2\sin x$. Comme $\sin(2x) = 2\sin x\cos x$, on a : $f'(x) = -2(2\sin x\cos x) - 2\sin x = -2\sin x(2\cos x + 1)$. 3. Sur $]0\,;\pi[$, $\sin x > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de $2\cos x + 1$:

- $2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}$.
- Pour $x \in \left[0\,;\frac{2\pi}{3}\right]$, $\cos x > -1/2 \Longrightarrow 2\cos x + 1 > 0 \Longrightarrow f'(x) < 0$.
- Pour $x \in \left]\frac{2\pi}{3}\,;\pi\right[$, $\cos x < -1/2 \Longrightarrow 2\cos x + 1 < 0 \Longrightarrow f'(x) > 0$. f est donc strictement décroissante sur $\left[0\,;\frac{2\pi}{3}\right]$, puis strictement croissante sur $\left[\frac{2\pi}{3}\,;\pi\right]$.

4. • Maximum en $x = 0$: $f(0) = \cos 0 + 2\cos 0 = 1 + 2 = 3$.
   • Minimum absolu en $x = \frac{2\pi}{3}$: $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$.
   • En $x = \pi$: $f(\pi) = \cos(2\pi) + 2\cos(\pi) = 1 - 2 = -1$ (maximum relatif).

Solution 49.11 : 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos x \geq -1$, donc $2 + \cos x \geq 2 - 1 = 1 > 0$. Le dénominateur ne s'annule jamais. 2. $g(-x) = \frac{\sin(-x)}{2+\cos(-x)} = \frac{-\sin x}{2+\cos x} = -g(x)$. La fonction g est impaire. 3. Formule du quotient : $g'(x) = \frac{\cos x(2+\cos x) - \sin x(-\sin x)}{(2+\cos x)^2} = \frac{2\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2+\cos x)^2} = \frac{2\cos x + 1}{(2+\cos x)^2}$. 4. En $x = 0$: $g(0) = 0$ et $g'(0) = \frac{2(1)+1}{(2+1)^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. L'équation de la tangente T à l'origine est : $y = \frac{1}{3}x$.

Solution 49.12 : 1. $\cos(a+b)\cos(a-b) = (\cos a\cos b - \sin a\sin b)(\cos a\cos b + \sin a\sin b) = \cos^2 a\cos^2 b - \sin^2 a\sin^2 b$. Remplaçons $\cos^2 b$ par $1 - \sin^2 b$ et $\sin^2 a$ par $1 - \cos^2 a$: $= \cos^2 a(1 - \sin^2 b) - (1 - \cos^2 a)\sin^2 b = \cos^2 a - \cos^2 a\sin^2 b - \sin^2 b + \cos^2 a\sin^2 b = \cos^2 a - \sin^2 b$. 2. $\cos(3x) = \sin(2x) \Leftrightarrow \cos(3x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$. Cela donne deux séries :

- $3x = \frac{\pi}{2} - 2x + 2k\pi \Leftrightarrow 5x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$ $(k \in \mathbb{Z})$.
- $3x = -\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + 2k\pi \Leftrightarrow 3x = -\frac{\pi}{2} + 2x + 2k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Solution 49.13 : 1. Puisque $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$, on a $f(x) = \sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$. 2. $f'(x) = -\frac{1}{2}(-2\sin(2x)) = \sin(2x)$. $f''(x) = 2\cos(2x)$. 3. Le signe de $f''(x)$ dépend de $\cos(2x)$ sur $[0\,;\pi]$:

- $2x \in [0\,;\pi/2] \Leftrightarrow x \in [0\,;\pi/4]$: $\cos(2x) \geq 0 \Longrightarrow f''(x) \geq 0$, f est **convexe**.
- $2x \in [\pi/2\,;3\pi/2] \Leftrightarrow x \in [\pi/4\,;3\pi/4]$: $\cos(2x) \leq 0 \Longrightarrow f''(x) \leq 0$, f est **concave**.
- $2x \in [3\pi/2\,;2\pi] \Leftrightarrow x \in [3\pi/4\,;\pi]$: $\cos(2x) \geq 0 \Longrightarrow f''(x) \geq 0$, f est **convexe**.

4. $f''(x)$ s'annule en changeant de signe en $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{3\pi}{4}$. Les points d'inflexion sont $I_1\left(\frac{\pi}{4}\,;\frac{1}{2}\right)$ et $I_2\left(\frac{3\pi}{4}\,;\frac{1}{2}\right)$.

Solution 49.14 : 1. La pulsation est $\omega = \frac{\pi}{6}$. La période est $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ heures. 2. Le cosinus varie entre -1 et 1.

- Hauteur maximale (pleine mer) : $H_{\max} = 6 + 4(1) = 10$ mètres.
- Hauteur minimale (basse mer) : $H_{\min} = 6 + 4(-1) = 2$ mètres.

3. Marée haute atteinte quand le cosinus vaut 1 : $\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow t = 2$. La marée haute a lieu à **2h du matin** (puis à $2 + 12 = 14$ h, soit 14h de l'après-midi).
4. $H(t) \geq 8 \Leftrightarrow 6 + 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) \geq 8 \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) \geq \frac{1}{2}$. Or $\cos\theta \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ (modulo 2π). Ici : $-\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\pi}{6}t \leq \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 4$. Le chalutier peut naviguer en sécurité **entre minuit et 4h du matin** (puis entre 12h et 16h).

Solution 49.15 : 1. $1 - \cos(2x) = 2\sin^2 x$. L'expression s'écrit $\frac{2\sin^2 x}{x\sin x} = 2\frac{\sin x}{x}$. Quand $x \to 0$, cela tend vers $2 \times 1 = 2$. 2. Posons $h = x - \frac{\pi}{2} \to 0$, donc $x = \frac{\pi}{2} + h$. Le quotient devient $\frac{\cos(\pi/2+h)}{h} = \frac{-\sin h}{h} = -\frac{\sin h}{h}$. Comme $\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h} = 1$, la limite vaut -1. 3. Expression conjuguée : $\frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} = \frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{2\sin x}{x(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{2}{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}$. Quand $x \to 0$, $\frac{\sin x}{x} \to 1$ et le second facteur tend vers $\frac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}} = 1$. La limite est donc 1.

Solutions du Niveau

Solution 49.16 : 1. $\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a\cos b + \cos a\sin b}{\cos a\cos b - \sin a\sin b}$. En divisant numérateur et dénominateur par le produit $\cos a\cos b$ (supposé non nul), on obtient immédiatement $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a\tan b}$. 2. Avec $\tan\alpha = \frac{1}{5}$: $\tan(2\alpha) = \frac{2(1/5)}{1-(1/5)^2} = \frac{2/5}{24/25} = \frac{2}{5} \times \frac{25}{24} = \frac{5}{12}$. Puis : $\tan(4\alpha) = \frac{2(5/12)}{1-(5/12)^2} = \frac{5/6}{119/144} = \frac{5}{6} \times \frac{144}{119} = \frac{120}{119}$. 3. Calculons $\tan(4\alpha - \frac{\pi}{4})$:

Comme $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, on a : $\tan\left(4\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan(4\alpha)-1}{1+\tan(4\alpha)} = \frac{\frac{120}{119}-1}{1+\frac{120}{119}} = \frac{1/119}{239/119} = \frac{1}{239}$. En prenant la bijection réciproque arctangente : $4\alpha - \frac{\pi}{4} = \arctan\left(\frac{1}{239}\right) \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$.

Solution 49.17 : 1. Développons le membre de droite : $\sin\left(kx + \frac{x}{2}\right) - \sin\left(kx - \frac{x}{2}\right) = \left[\sin(kx)\cos\frac{x}{2} + \cos(kx)\sin\frac{x}{2}\right] - \left[\sin(kx)\cos\frac{x}{2} - \cos(kx)\sin\frac{x}{2}\right] = 2\cos(kx)\sin\frac{x}{2}$. 2. Multiplions $S_n(x)$ par $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)$: $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)S_n(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \sum_{k=1}^{n} 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos(kx)$. En injectant la relation précédente : $= \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \sum_{k=1}^{n}\left[\sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)x\right) - \sin\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)x\right)\right]$. Cette somme est télescopique : tous les termes intermédiaires s'annulent sauf le premier $-\sin\left(\frac{x}{2}\right)$ (qui compense exactement le premier terme extérieur) et le dernier $\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)$. Il reste donc : $2\sin\left(\frac{x}{2}\right)S_n(x) = \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)$. Puisque $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\sin\left(\frac{x}{2}\right) \neq 0$, d'où la formule du noyau de Dirichlet.

Solution 49.18 : 1. Pour $x \in]0\,;\frac{\pi}{2}[$, $f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2}$. Or d'après le lemme fondamental de la section 3.1, pour tout $x \in]0\,;\frac{\pi}{2}[$, on a $x < \tan x \Leftrightarrow x - \tan x < 0$. Comme $\cos x > 0$ et $x^2 > 0$, $f'(x) < 0$. La fonction f est strictement décroissante. 2. Pour tout $x \in]0\,;\frac{\pi}{2}[$: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) \leq f(x) \leq \lim_{t\to 0^+} f(t) \Leftrightarrow \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2}{\pi} \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$. En multipliant par $x > 0$: $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$. Cette relation est encore vraie en 0. 3. Graphiquement sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$, la courbe de sinus est coincée entre sa tangente à l'origine ($y = x$) et la corde joignant $(0\,;0)$ à $\left(\frac{\pi}{2}\,;1\right)$ d'équation $y = \frac{2}{\pi}x$.

Solution 49.19 : 1. $S(t) = 3\cos(\omega t) + 4\sin(\omega t)$. Factorisons par $\sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$: $S(t) = 5\left(\frac{3}{5}\cos(\omega t) + \frac{4}{5}\sin(\omega t)\right)$. Puisque $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$, il existe un unique angle $\varphi \in [0\,;2\pi[$ tel que $\cos\varphi = \frac{3}{5}$ et $\sin\varphi = \frac{4}{5}$. Alors $S(t) = 5(\cos(\omega t)\cos\varphi + \sin(\omega t)\sin\varphi) = 5\cos(\omega t - \varphi)$. 2. L'amplitude est $A = 5$. $\tan\varphi = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3} \Longrightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,927$ rad $\approx 53,1°$. 3. Dans le cas général, posons $R = \sqrt{a^2+b^2} > 0$. On a $\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = 1$. Il existe θ tel que $\cos\theta = \frac{a}{R}$ et $\sin\theta = \frac{b}{R}$. Alors $a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t) = R\,\big(\cos(\omega t)\cos\theta + \sin(\omega t)\sin\theta\,\big) = R\cos(\omega t - \theta)$.

Solution 49.20 : Supposons par l'absurde que la fonction cosinus admette une limite finie ou infinie L en $+\infty$. D'après la caractérisation séquentielle de la limite, pour toute suite (u_n) tendant vers $+\infty$, la suite $\big(\cos(u_n)\big)$ devrait converger vers L. Considérons la suite $u_n = 2n\pi$. Quand $n \to +\infty$, $u_n \to +\infty$. Or pour tout n, $\cos(u_n) = \cos(2n\pi) = 1$, donc la suite $\big(\cos(u_n)\big)$ est constante égale à 1 et tend vers 1. Considérons maintenant la suite $v_n = \pi + 2n\pi$. Quand $n \to +\infty$, $v_n \to +\infty$. Or pour tout n, $\cos(v_n) = \cos(\pi + 2n\pi) = -1$, donc la suite $\big(\cos(v_n)\big)$ converge vers -1. Puisque les deux limites 1 et -1 sont distinctes, cela contredit l'unicité de la limite. La fonction cosinus n'admet donc aucune limite en $+\infty$.

La question qui ouvre la suite

Nous avons appris à mesurer la pente, le taux de variation et la vitesse d'une courbe en chacun de ses points : c'est le calcul différentiel. Mais que se passe-t-il si l'on cherche à faire le chemin inverse ? Si l'on connaît la vitesse d'une fusée à chaque seconde, comment calculer la distance totale parcourue ? Si l'on connaît le profil d'un tonneau ou la forme ondulée d'une colline, comment calculer exactement son volume et son aire ?

Comment additionner une infinité de lamelles infiniment fines pour reconstituer un tout ?

Rendez-vous au chapitre 50 avec **le tonneau rempli de tranches d'eau** et la découverte du calcul intégral.

CHAPITRE 50 : Le Tonneau Rempli de Tranches d'Eau

> « Si la dérivée est le scalpel qui découpe le temps en instants minuscules pour en extraire la vitesse, l'intégrale est l'aiguille d'or qui recoud toutes les miettes ensemble pour reconstituer le grand voyage de l'espace. Rien ne se perd, tout se cumule dans la mémoire de la courbe. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment l'astronome **Johannes Kepler**, scandalisé par un marchand de vin lors de son propre mariage en 1615, a inventé la méthode des tranches infiniment fines pour mesurer des volumes courbes.
- La notion **d'intégrale définie** $\int_a^b f(t)\,dt$: des sommes de rectangles de Riemann à l'aire exacte sous une courbe.
- L'origine et la signification du grand symbole étiré $\int$ inventé par Leibniz en 1675.
- Le **Théorème Fondamental de l'Analyse** et sa démonstration rigoureuse : pourquoi et comment l'intégration est **l'opération inverse** exacte de la dérivation.
- La recherche des **primitives** : tableau des formes usuelles et maîtrise des composées ($u'u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u'e^u$, etc.).
- Les propriétés indispensables de l'intégrale : **linéarité**, **relation de Chasles**, **positivité**, **aire entre deux courbes** et **valeur moyenne**.
- La technique reine du calcul intégral : **l'intégration par parties** (IPP), issue de la règle du produit de dérivation.
- L'implémentation numérique en **Python** de la méthode des rectangles.

---

1. Le problème : Kepler, le marchand de vin et la jauge truquée

1.1 Le mariage de Linz (1615)

À l'automne **1615**, dans la ville de Linz au bord du Danube, le célèbre astronome **Johannes Kepler** — l'homme qui a percé les lois du mouvement des planètes autour du Soleil — prépare le banquet de son second mariage. Pour régaler ses invités, il achète plusieurs gros tonneaux de vin d'Autriche.

Lorsque le marchand livre les fûts au ventre rebondi, il sort de sa poche une simple tige de fer graduée appelée une **jauge**. Il plonge la tige en biais par la bonde (l'ouverture située au sommet du renflement du tonneau) jusqu'au fond de la douve la plus éloignée, retire la baguette mouillée, lit la graduation et annonce la contenance en litres et le prix à payer.

Kepler est stupéfait : > *« Comment peux-tu mesurer le volume d'un corps aux parois renflées avec une simple ligne droite en diagonale ? Si le tonneau a des flancs très bombés ou des flancs presque cylindriques, ta baguette plonge à la même profondeur, mais le volume de vin n'est pas du tout le même ! Tu vends de l'air ou tu me voles ! »*

Le marchand hausse les épaules : les négociants ont toujours fait ainsi. Kepler s'enferme alors dans son cabinet d'étude. Pendant des semaines, il suspend ses calculs astronomiques pour résoudre l'énigme des fûts.

Sa trouvaille, publiée dans son traité *Nova Stereometria Doliorum Vinariorum* (« Nouvelle stéréométrie des tonneaux de vin », 1615), est d'une simplicité éblouissante : Pour mesurer un volume aux parois courbes, **il faut le découper par la pensée en une multitude de rondelles plates infiniment fines**, calculer le volume de chaque rondelle (qui est presque un cylindre plat parfait), puis **additionner toutes ces rondelles** du fond jusqu'au sommet !



Fig. 110. – La stéréométrie des tonneaux de Kepler : calcul intégral par tranches

1.2 Le compteur de vitesse et l'odomètre brisé

Revenons à une situation de notre temps. Imagine que tu conduises une voiture dans le désert. Ton compteur kilométrique (l'odomètre) est cassé : il affiche 0 km en permanence. En revanche, ton compteur de vitesse fonctionne parfaitement et un enregistreur trace en continu la courbe de ta vitesse $v(t)$ en kilomètres par heure au fil du temps t. Comment retrouver la distance exacte parcourue entre le départ à $t = a$ et l'arrivée à $t = b$?

1. **Cas d'une vitesse constante :** Si tu roules à une vitesse constante de 90 km/h pendant 2 heures, la distance est :
$$\text{Distance} = \text{Vitesse} \times \text{Durée} = 90 \times 2 = 180 \text{ kilomètres}.$$
Graphiquement, dans un repère où le temps est en abscisse et la vitesse en ordonnée, cette distance est **l'aire du rectangle** de base $[0\,;2]$ et de hauteur 90 !



Fig. 111. – L'intégrale de Riemann : encadrement de l'aire sous la courbe par des rectangles

2. **Cas d'une vitesse variable :** Dans la réalité, la vitesse varie constamment : accélérations, ralentissements, arrêts. La courbe $v(t)$ ondule. Pour calculer la distance, découpons le temps en minuscules intervalles de durée Δt. Pendant une fraction de seconde Δt, la vitesse $v(t)$ n'a quasiment pas le temps de changer : elle est presque constante. La petite distance franchie pendant cet intervalle est donc l'aire d'un rectangle minuscule de largeur Δt et de hauteur $v(t)$:
$$\Delta d \approx v(t) \times \Delta t.$$
La distance totale est la somme de tous ces millions de petits rectangles. Et quand la largeur Δt devient infinitésimale (on la note alors dt), la somme des aires des rectangles devient **l'aire exacte sous la courbe de la vitesse** !

2. De la somme de rectangles à l'intégrale définie

2.1 Les sommes de Riemann

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a\,;b]$ (avec $a<b$). On souhaite mesurer l'aire du domaine délimité par :

- la courbe représentative $\mathcal{C}_f$;
- l'axe des abscisses ;
- les droites verticales d'équations $x=a$ et $x=b$.

Ce domaine est appelé le **trapèze curviligne** ou le domaine sous la courbe.

Pour approcher cette aire, découpons le segment $[a\,;b]$ en n sous-intervalles égaux de largeur $\Delta x=\frac{b-a}{n}$ à l'aide des points de subdivision :

$$x_k = a + k\frac{b-a}{n} \quad (k=0,1,2,\ldots,n).$$

Sur chaque sous-intervalle $[x_k\,;x_{k+1}]$, on construit un rectangle de hauteur $f(x_k)$ (méthode des rectangles à gauche). La somme des aires de ces n rectangles forme la **somme de Riemann à gauche** :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\times\Delta x = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right)\frac{b-a}{n}.$$

Lorsque le nombre de rectangles n tend vers l'infini ($n\to+\infty$), la largeur de chaque tranche devient infiniment mince ($\Delta x\to 0$), les escaliers épousent la courbe sans laisser le moindre interstice, et la somme S_n converge vers un nombre réel unique : **l'intégrale de f de a à b**.

2.2 La notation de Leibniz : $\int_a^b f(t)\,dt$

> **Découverte & Histoire**
>
> 🔍 **L'histoire vraie — Le 29 octobre 1675 à Paris :** C'est le philosophe et mathématicien **Gottfried Wilhelm Leibniz** qui introduit pour la première fois le symbole $\int$. Leibniz se demande : *« Que faisons-nous ? Nous calculons une Somme d'une infinité de tranches infiniment minces. »* Il prend alors l'initiale du mot latin **Summa** (la somme) : la lettre **S**. Avec sa plume d'oie, il l'étire vers le haut et vers le bas pour lui donner la grâce d'un S élancé : $\int$. Et pour désigner la largeur infiniment petite d'une tranche, il note dt (la différentielle de t).

Quand tu lis la formule :

$$\int_a^b f(t)\,dt$$

voici ce qu'elle te dit en langage parlé :

- $\int$: « Fais la somme continue… »
- des bornes a (point de départ) à b (point d'arrivée) ;
- des rectangles de hauteur $f(t)$;
- et de largeur infinitésimale dt.

> ***Remarque sur la variable muette :*** *La lettre t sous le symbole intégrale est une **variable muette** : elle ne sert qu'à parcourir l'intervalle entre a et b. On peut la remplacer par n'importe quelle autre lettre sans changer la valeur du résultat :*
>
> $$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(u)\,du.$$

2.3 Algorithme Python : la méthode des rectangles

Voici le script Python officiel permettant d'approcher l'intégrale d'une fonction continue par la méthode des rectangles :

```python
def integrale_rectangles(f, a, b, n):
    """
    Calcule une approximation de l'intégrale de f entre a et b
    par la méthode des rectangles au point médian.
    """
    largeur = (b - a) / n
    somme = 0.0
    for k in range(n):
        # Point milieu du k-ième sous-intervalle
        x_milieu = a + (k + 0.5) * largeur
        somme += f(x_milieu)
    return somme * largeur

# Testons sur f(x) = x^2 entre 0 et 3 (l'aire exacte vaut 9)
def carre(x):
    return x**2

print("Approximation avec 10 rectangles   :", integrale_rectangles(carre, 0, 3, 10))
print("Approximation avec 100 rectangles  :", integrale_rectangles(carre, 0, 3, 100))
print("Approximation avec 1000 rectangles :", integrale_rectangles(carre, 0, 3, 1000))
# Avec 1000 rectangles, on obtient 8.9999988... soit quasiment 9 !
```

---

3. Le Théorème Fondamental de l'Analyse : le pont miraculeux

Calculer des sommes de millions de rectangles à la main serait un calvaire infini. C'est ici qu'intervient le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire des mathématiques, découvert indépendamment par **Isaac Newton** et **Gottfried Wilhelm Leibniz** entre 1666 et 1675.

3.1 La fonction d'accumulation d'aire

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a\,;b]$. Fixons la borne inférieure a et laissons la borne supérieure varier comme une variable libre $x \in [a\,;b]$. Définissons la fonction A, dite **fonction d'accumulation** :

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

$A(x)$ représente **l'aire balayée sous la courbe entre a et x**. Que vaut le taux de variation de cette aire lorsque la borne supérieure avance d'un tout petit pas $h > 0$?

Quand on passe de x à $x+h$, l'aire augmente de la fine tranche comprise entre x et $x+h$:

$$\Delta A = A(x+h) - A(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Cette tranche a une largeur h et sa hauteur est quasiment constante, égale à $f(x)$ (car f est continue). Son aire est donc approximativement :

$$A(x+h) - A(x) \approx f(x) \times h \Leftrightarrow \frac{A(x+h) - A(x)}{h} \approx f(x).$$

Quand h tend vers 0, le taux de variation de l'aire devient **exactement la hauteur de la courbe $f(x)$** !

> ***La dérivée de la fonction aire est la fonction de départ :***
>
> $$A'(x) = f(x).$$

3.2 Démonstration rigoureuse du Théorème Fondamental

📐 Théorème Fondamental de l'Analyse (exigible) —

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit $a \in I$. La fonction A définie sur I par :

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

est dérivable sur I, et pour tout $x \in I$:

$$A'(x) = f(x).$$

✍ Démonstration —

Soit $x \in I$ et soit $h > 0$ tel que $x + h \in I$. D'après la relation de Chasles pour l'intégrale :

$$A(x+h) - A(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt = \int_x^{x+h} f(t)\,dt.$$

Puisque f est continue sur l'intervalle fermé $[x\,;x+h]$, le théorème des bornes atteintes garantit que f admet un minimum m_h et un maximum M_h sur $[x\,;x+h]$:

$$\text{Pour tout } \; t \in [x\,;x+h] : \quad m_h \leq f(t) \leq M_h.$$

En intégrant cet encadrement sur $[x\,;x+h]$ de longueur h :

$$\int_x^{x+h} m_h\,dt \leq \int_x^{x+h} f(t)\,dt \leq \int_x^{x+h} M_h\,dt \Leftrightarrow m_h \times h \leq A(x+h) - A(x) \leq M_h \times h.$$

En divisant par $h > 0$:

$$m_h \leq \frac{A(x+h) - A(x)}{h} \leq M_h.$$

Or, comme la fonction f est continue en x, lorsque $h \to 0^+$, l'intervalle $[x\,;x+h]$ se rétracte sur le point x. Le minimum m_h et le maximum M_h convergent tous deux vers $f(x)$:

$$\lim_{h\to 0^+} m_h = f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{h\to 0^+} M_h = f(x).$$

D'après le **théorème des gendarmes** :

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{A(x+h) - A(x)}{h} = f(x).$$

Un raisonnement parfaitement identique pour $h < 0$ donne $\lim_{h\to 0^-} \frac{A(x+h)-A(x)}{h} = f(x)$. On conclut que A est dérivable en x et que $A'(x) = f(x)$. ■

---

4. Primitives et calcul effectif des intégrales

4.1 Qu'est-ce qu'une primitive ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition —** Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\text{Pour tout } \; x \in I : \quad F'(x) = f(x).$$

📐 Propriété fondamentale des primitives —

Si F est une primitive de f sur un intervalle I, alors : 1. Pour toute constante réelle C, la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est aussi une primitive de f (car la dérivée d'une constante est nulle : $(F + C)' = F' + 0 = f$). 2. Réciproquement, toute autre primitive G de f sur I ne diffère de F que d'une constante : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $G(x) = F(x) + C$. 3. Pour tout point $(x_0\,;y_0)$ avec $x_0 \in I$, il existe **une unique** primitive de f prenant la valeur y_0 en x_0.

4.2 La formule d'évaluation de l'intégrale

Grâce au théorème fondamental, le calcul d'une intégrale ne demande aucun rectangle :

📐 Théorème (Calcul de l'intégrale par une primitive) —

Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$, et soit F une primitive quelconque de f sur $[a\,;b]$. Alors :

$$\int_a^b f(t)\,dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a).$$

✍️ Démonstration —

Posons $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. D'après le théorème fondamental, A est une primitive de f sur $[a\,;b]$. Comme F est une autre primitive de f, il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in [a\,;b]$:

$$A(x) = F(x) + C.$$

Déterminons la valeur de C en évaluant en $x = a$:

$$A(a) = \int_a^a f(t)\,dt = 0 \Longrightarrow F(a) + C = 0 \Leftrightarrow C = -F(a).$$

Ainsi pour tout $x \in [a\,;b]$:

$$A(x) = F(x) - F(a).$$

En prenant $x = b$, on obtient immédiatement :

$$\int_a^b f(t)\,dt = A(b) = F(b) - F(a).$$

Remarquons que si l'on avait choisi une autre primitive $G(x) = F(x) + K$, la constante K s'éliminerait par soustraction :

$$G(b) - G(a) = (F(b) + K) - (F(a) + K) = F(b) - F(a).$$

Le résultat ne dépend donc absolument pas de la constante choisie ! ■

4.3 Tableau des primitives usuelles

Ce tableau est le miroir exact du tableau des dérivées, lu à l'envers :

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
0	k (constante)	$\mathbb{R}$
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x^\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$]0\,;+\infty[$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{1}{x}$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$	$2\sqrt{x}$	$]0\,;+\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$e^{kx} \quad (k \neq 0)$	$\frac{1}{k}e^{kx}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$

4.4 Primitives de fonctions composées

Reconnaître une dérivée de fonction composée est la compétence centrale du calcul intégral :

Forme de la fonction	Une primitive	Condition sur u
$u'(x) \times \big(u(x)\big)^n \quad (n \in \mathbb{Z}, n \neq -1)$	$\frac{\big(u(x)\big)^{n+1}}{n+1}$	Si $n < -1$, $u(x) \neq 0$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln\lvert u(x)\rvert$	$u(x) \neq 0$
$u'(x)\,e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	Aucune
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)}$	$u(x) > 0$
$u'(x)\cos(u(x))$	$\sin(u(x))$	Aucune
$u'(x)\sin(u(x))$	$-\cos(u(x))$	Aucune

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Primitives directes.
1. $f_1(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5 \Longrightarrow F_1(x) = 3\left(\frac{x^5}{5}\right) - 2\left(\frac{x^3}{3}\right) + 5x = \frac{3}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + 5x$. 2. $f_2(x) = \frac{3}{x} + e^{-2x}$ sur $]0\,;+\infty[\Longrightarrow F_2(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}e^{-2x}$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Reconnaissance de formes composées.
1.
$f(x) = (2x+1)(x^2+x+4)^3$. Posons $u(x) = x^2+x+4$. Alors $u'(x) = 2x+1$. L'expression est exactement de la forme $u'u^3$. Une primitive est donc :

$$F(x) = \frac{u^4}{4} = \frac{(x^2+x+4)^4}{4}.$$

2. $g(x) = \frac{2x}{x^2+3}$. Posons $u(x) = x^2+3$. Alors $u'(x) = 2x$. C'est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) > 0$. Une primitive est $G(x) = \ln(x^2+3)$.
3. $h(x) = \frac{x}{x^2+1}$. Remarquons que la dérivée de x^2+1 est $2x$, or nous n'avons que x. On force le coefficient 2 en multipliant et divisant par 2 :

$$h(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2}\frac{u'}{u} \Longrightarrow H(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1).$$

4. $k(x) = xe^{-x^2}$. La dérivée de $-x^2$ est $-2x$. Écrivons :

$$k(x) = -\frac{1}{2} \times (-2x)e^{-x^2} = -\frac{1}{2}u'e^u \Longrightarrow K(x) = -\frac{1}{2}e^{-x^2}.$$

---

5. Propriétés algébriques de l'intégrale

Ces propriétés sont valables pour toutes fonctions continues sur l'intervalle considéré.

5.1 Linéarité

Propriété de linéarité —

Pour tous réels α, β et fonctions continues f, g :

$$\int_a^b \big(\,\alpha f(t) + \beta g(t)\big)\,dt = \alpha \int_a^b f(t)\,dt + \beta \int_a^b g(t)\,dt.$$

5.2 Relation de Chasles

Relation de Chasles —

Pour tous réels a, b, c d'un intervalle où f est continue :

$$\int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt.$$

En particulier :

- $\int_a^a f(t)\,dt = 0$ (un segment sans largeur a une aire nulle) ;
- $\int_b^a f(t)\,dt = -\int_a^b f(t)\,dt$ (inverser les bornes change le signe).

5.3 Positivité et conservation de l'ordre

📐 Positivité —

Soient $a \leq b$ deux réels.

- Si pour tout $t \in [a\,;b]$, $f(t) \geq 0$, alors $\int_a^b f(t)\,dt \geq 0$.
- Si pour tout $t \in [a\,;b]$, $f(t) \leq g(t)$, alors $\int_a^b f(t)\,dt \leq \int_a^b g(t)\,dt$.
- Inégalité triangulaire : $\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — L'ordre des bornes compte !** La propriété « $f \geq 0 \Longrightarrow \int_a^b f(t)\,dt \geq 0$ » exige impérativement que $\boldsymbol{a \leq b}$. Si les bornes sont à l'envers ($a > b$), l'intégrale d'une fonction positive est **négative** !

⚠️ ⚠️ Aire Algébrique vs Aire Géométrique

Ne confondez jamais l'intégrale et l'aire géométrique ! L'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ calcule une **aire algébrique** : les zones situées au-dessus de l'axe des abscisses comptent positivement, et celles situées en dessous comptent négativement. Si la fonction change de signe sur $[a, b]$, l'aire géométrique réelle du domaine vaut $\int_a^b |f(x)|\,dx$, ce qui impose de découper l'intégrale avec la relation de Chasles en chacun des zéros de f.

5.4 Aire entre deux courbes

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a\,;b]$ telles que pour tout $x \in [a\,;b]$, $\boldsymbol{f(x) \geq g(x)}$ (la courbe de f est située au-dessus de celle de g). L'aire $\mathcal{A}$ de la surface délimitée par les deux courbes entre les droites $x = a$ et $x = b$ est égale à l'aire sous f diminuée de l'aire sous g :

$$\mathcal{A} = \int_a^b \big(\, f(x) - g(x)\big)\,dx.$$

5.5 Valeur moyenne d'une fonction

Comment définir la température moyenne de la journée si la température $T(t)$ varie continûment d'heure en heure ? On ne peut pas additionner une infinité de températures pour diviser par l'infini ! On utilise la **valeur moyenne intégrale** :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Valeur moyenne :** Soit f une fonction continue sur $[a\,;b]$ avec $a < b$. La **valeur moyenne** de f sur $[a\,;b]$, notée μ (ou $\overline{f}$), est le nombre réel :

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt.$$

Interprétation géométrique : μ est la hauteur d'un rectangle de même base $[a\,;b]$ qui aurait **exactement la même aire** que le domaine sous la courbe ondulée de f :

$$\text{Aire}(f) = \mu \times (b-a).$$

---

6. L'Intégration par Parties (IPP) : la technique maîtresse

Quand une fonction à intégrer est un produit de deux fonctions (par exemple xe^x ou $x\cos x$), et qu'elle n'est pas de la forme $u'e^u$, aucune formule de primitive directe ne s'applique. On utilise alors **l'intégration par parties**, qui est la transposition intégrale de la dérivée d'un produit.

6.1 Théorème et démonstration

📐 Théorème d'Intégration par Parties (exigible) —

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a\,;b]$, telles que leurs dérivées u' et v' soient continues sur $[a\,;b]$. Alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,dt = \Big[\,u(t)v(t)\Big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,dt.$$

✍️ Démonstration —

D'après la formule de dérivation d'un produit, pour tout $t \in [a\,;b]$:

$$(uv)'(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t).$$

En isolant le terme $u'(t)v(t)$:

$$u'(t)v(t) = (uv)'(t) - u(t)v'(t).$$

Intégrons cette égalité entre a et b à l'aide de la linéarité :

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,dt = \int_a^b (uv)'(t)\,dt - \int_a^b u(t)v'(t)\,dt.$$

Or, une primitive de $(uv)'$ est tout simplement le produit uv ! D'où :

$$\int_a^b (uv)'(t)\,dt = \Big[\,u(t)v(t)\Big]_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a).$$

En remplaçant, on obtient exactement la formule :

$$\int_a^b u'(t)v(t)\,dt = \Big[\,u(t)v(t)\Big]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\,dt.$$

■

6.2 Stratégie : qui choisir pour u' et qui pour v ?

Le but d'une intégration par parties est de remplacer le calcul d'une intégrale difficile par celui d'une intégrale **plus simple**. Pour cela, on choisit en général pour $\boldsymbol{v(t)}$ la fonction qui **se simplifie par dérivation** (les polynômes perdent un degré en étant dérivés !).

🧭 La règle heuristique ALPES pour le choix de $v(x)$ (celle que l'on dérive) :

On choisit comme fonction $v(x)$ la première fonction rencontrée dans l'ordre de cette liste : 1. **A** : Fonctions circulaires réciproques (Arcsin, Arccos, Arctan) 2. **L** : **Logarithmes** ($\ln x$) 3. **P** : **Polynômes** ($x, x^2, x^3, \ldots$) 4. **E** : **Exponentielles** ($e^x, e^{2x}, \ldots$) 5. **S** : **Sinus / Cosinus** ($\sin x, \cos x$)

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Calcul de $\int_0^1 xe^x\,dx$.

On a un produit d'un polynôme x et d'une exponentielle e^x. D'après la règle ALPES, le polynôme x vient avant l'exponentielle, donc on pose :

- $v(x) = x \Longrightarrow v'(x) = 1$ (le degré baisse !)
- $u'(x) = e^x \Longrightarrow u(x) = e^x$

Les fonctions u et v sont dérivables et leurs dérivées sont continues sur $[0\,;1]$. Par intégration par parties :

$$\int_0^1 xe^x\,dx = \Big[\,xe^x\Big]_0^1 - \int_0^1 1\times e^x\,dx.$$

Calculons le crochet : $[xe^x]_0^1 = 1e^1 - 0e^0 = e$. L'intégrale restante est immédiate : $\int_0^1 e^x\,dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$. Donc :

$$\int_0^1 xe^x\,dx = e - (e-1) = \mathbf{1}.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — L'astuce géniale pour intégrer $\ln x$.

Quelle est une primitive de la fonction $\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$? On ne voit pas de produit ? Qu'à cela ne tienne : écrivons $\ln x = 1\times \ln x$! Posons :

- $v(x) = \ln x \Longrightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$ (le logarithme disparaît !)
- $u'(x) = 1 \Longrightarrow u(x) = x$

Alors :

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\times\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - \int 1\,dx = x\ln x - x + C.$$

> **📐 Formule mémorable — Une primitive de $\ln x$ est :**
>
> $$F(x) = x\ln x - x.$$
>
> Vérification immédiate par dérivation : $(x\ln x - x)' = 1\times\ln x + x\times\frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. Imparable ! ✓

Ce qu'il faut retenir

1. L'intégrale définie

- $\int_a^b f(t)\,dt$ représente l'aire algébrique délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.
- L'unité d'aire (u.a.) est l'aire du rectangle formé par les vecteurs de base $\|\,\vec{\imath}\,\| \times \|\,\vec{\jmath}\,\|$.

2. Théorème fondamental de l'analyse

- Si f est continue sur I et $a \in I$, la fonction $A(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est dérivable sur I et $\boldsymbol{A'(x) = f(x)}$.
- Pour toute primitive F de f sur $[a\,;b]$:

$$\int_a^b f(t)\,dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a).$$

3. Tableau des primitives incontournables

- $x^n \to \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$
- $\frac{1}{x} \to \ln|x|$

- $e^{ax} \to \frac{1}{a}e^{ax}$
- $\cos(ax) \to \frac{1}{a}\sin(ax)$ et $\sin(ax) \to -\frac{1}{a}\cos(ax)$
- $u'u^n \to \frac{u^{n+1}}{n+1}$
- $\frac{u'}{u} \to \ln|u|$
- $u'e^u \to e^u$

4. Propriétés clés

- Linéarité : $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha\int f + \beta\int g$.
- Chasles : $\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$.
- Positivité : si $a \le b$ et $f \ge 0$, alors $\int_a^b f \ge 0$.
- Aire entre deux courbes : $\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$ si $f \ge g$.
- Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt$.

5. Intégration par parties

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 50.1 — Calculs de primitives élémentaires. Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : 1. $f_1(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x - 7$ sur $\mathbb{R}$ 2. $f_2(x) = \frac{5}{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$ 3. $f_3(x) = e^{3x} - 2e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$ 4. $f_4(x) = 3\cos(2x) + \sin(4x)$ sur $\mathbb{R}$ 5. $f_5(x) = \frac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 50.2 — Primitive vérifiant une condition initiale. 1. Déterminer la primitive F de la fonction $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ telle que $F(1) = 5$. 2. Déterminer la primitive G de la fonction $g(x) = e^{2x}$ telle que $G(0) = 2$.

Exercice 50.3 — Calculs d'intégrales directes. Calculer la valeur exacte des intégrales suivantes : 1. $I_1 = \int_1^3 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$ 2. $I_2 = \int_0^2 e^{3x}\,dx$ 3. $I_3 = \int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ 4. $I_4 = \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$ 5. $I_5 = \int_0^1 (2x+1)^3\,dx$

Exercice 50.4 — Reconnaissance de composées $u'u^n$ et $u'e^u$. Calculer les intégrales suivantes : 1. $J_1 = \int_0^1 2x(x^2+1)^4\,dx$ 2. $J_2 = \int_0^2 3x^2 e^{x^3}\,dx$ 3. $J_3 = \int_1^2 \frac{2x+3}{x^2+3x+1}\,dx$ 4. $J_4 = \int_0^{\pi/4} \cos x \sin^3 x\,dx$

Exercice 50.5 — Relation de Chasles et symétrie. Soit f une fonction continue sur $[-a\,;a]$ avec $a > 0$. 1. Rappeler pourquoi $\int_{-a}^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$ si f est paire. 2. Rappeler pourquoi $\int_{-a}^a f(x)\,dx = 0$ si f est impaire. 3. En déduire instantanément sans aucun calcul de primitive la valeur de :

$$K = \int_{-2}^{2} (x^7 - 3x^3 + \sin x)\,dx.$$

Exercice 50.6 — Valeur moyenne. Calculer la valeur moyenne de la fonction $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $[0\,;3]$. Interpréter graphiquement.

Exercice 50.7 — Aire géométrique simple. Calculer l'aire du domaine situé sous la parabole $y = 4 - x^2$ et au-dessus de l'axe des abscisses.

Niveau (Réflexion et Baccalauréat)

Exercice 50.8 — Intégration par parties simple. Calculer par intégration par parties les intégrales suivantes : 1. $A_1 = \int_0^{\pi} x\sin x\,dx$ 2. $A_2 = \int_1^e x\ln x\,dx$ 3. $A_3 = \int_0^1 (2x+1)e^{-x}\,dx$

Exercice 50.9 — Intégration par parties répétée. Calculer $B = \int_0^1 x^2 e^x\,dx$ en effectuant deux intégrations par parties successives.

Exercice 50.10 — Aire entre deux courbes. On considère les deux paraboles d'équations :

$$y = f(x) = -x^2 + 4x \quad \text{et} \quad y = g(x) = x^2 - 2x.$$

1. Déterminer les abscisses des points d'intersection des deux courbes. 2. Étudier la position relative des deux courbes sur l'intervalle délimité par ces intersections. 3. Calculer l'aire du domaine délimité par ces deux courbes.

Exercice 50.11 — Fonction définie par une intégrale. Soit F la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t}\,dt.$$

1. Déterminer la valeur de $F(1)$. 2. Justifier que F est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et donner l'expression de $F'(x)$. 3. En déduire le sens de variations de F sur $]0\,;+\infty[$. 4. Démontrer que pour tout $t \geq 1$, $\frac{e^t}{t} \geq e$. En déduire que pour tout $x \geq 1$:

$$F(x) \geq e(x-1).$$

5. En déduire la limite de $F(x)$ lorsque $x \to +\infty$.

Exercice 50.12 — Suite d'intégrales (Type Bac). Pour tout entier naturel n, on pose :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{-x}\,dx.$$

1. Calculer I_0. 2. À l'aide d'une intégration par parties, établir pour tout $n \in \mathbb{N}$ la relation de récurrence :

$$I_{n+1} = (n+1)I_n - \frac{1}{e}.$$

3. En déduire les valeurs exactes de I_1 et I_2. 4. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n \geq 0$. 5. Démontrer que la suite (I_n) est décroissante. 6. Démontrer que pour tout $x \in [0\,;1]$, $x^n e^{-1} \leq x^n e^{-x} \leq x^n$. En déduire un encadrement de I_n et déterminer sa limite quand $n \to +\infty$.

Exercice 50.13 — Le tonneau de vin de Kepler revisité. On modélise un tonneau de longueur $2L = 1 \ \text{mètre}$ (entre $x = -0,5$ et $x = 0,5$) par la rotation d'un arc de parabole autour de l'axe des abscisses. Le rayon du tonneau à l'abscisse x est donné par :

$$R(x) = R_0 - kx^2$$

avec $R_0 = 0,4 \ \text{m}$ (rayon au centre/à la bonde) et le rayon aux extrémités vaut $R(0,5) = 0,3 \ \text{m}$. 1. Déterminer la constante k. 2. Rappeler que le volume d'une tranche de tonneau d'épaisseur dx est le volume d'un cylindre de rayon $R(x)$: $dV = \pi [R(x)]^2\,dx$. 3. Exprimer le volume total du tonneau sous la forme d'une intégrale :

$$V = \int_{-0,5}^{0,5} \pi [R(x)]^2\,dx.$$

4. Calculer la valeur exacte de ce volume en litres. Comparer avec le volume d'un cylindre de même rayon moyen.

Exercice 50.14 — Décomposition en éléments simples. Soit $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ définie sur $]1\,;+\infty[$. 1. Trouver deux réels a et b tels que pour tout $x > 1$:

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}.$$

2. En déduire une primitive de f sur $]1\,;+\infty[$. 3. Calculer l'intégrale $I = \int_2^3 \frac{1}{x^2-1}\,dx$.

Exercice 50.15 — Encadrement d'aire et vitesse d'une fusée. Une fusée est lancée verticalement. Son accélération est modélisée par $a(t) = \frac{400}{(t+10)^2}$ pour $t \in [0\,;30]$ (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$). Au décollage ($t = 0$), sa vitesse initiale est $v(0) = 0$. 1. Exprimer la vitesse $v(t)$ à chaque instant en intégrant l'accélération. 2. Calculer la vitesse atteinte à $t = 30 \ \text{secondes}$. 3. Exprimer la hauteur $h(t)$ franchie par la fusée en intégrant la vitesse. Calculer l'altitude à $t = 30 \ \text{s}$.

Exercice 50.16 — Inégalité de Cauchy-Schwarz pour les intégrales. Soient f et g deux fonctions continues sur $[a\,;b]$. 1. Pour tout réel λ, développer l'intégrale $\int_a^b \big(\,f(t) + \lambda g(t)\big)^2\,dt \geq 0$. 2. En considérant le polynôme du second degré en λ obtenu, démontrer la célèbre **inégalité de Cauchy-Schwarz** :

$$\left(\int_a^b f(t)g(t)\,dt\right)^2 \leq \left(\int_a^b (f(t))^2\,dt\right)\left(\int_a^b (g(t))^2\,dt\right).$$

Niveau (Approfondissement et Défis)

Exercice 50.17 — Les intégrales de Wallis. Pour tout entier naturel n, on pose :

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx.$$

1. Calculer W_0 et W_1. 2. En écrivant $\sin^{n+1} x = \sin x \times \sin^n x$, établir par intégration par parties pour tout $n \geq 1$:

$$W_{n+1} = \frac{n}{n+1} W_{n-1}.$$

3. En déduire les expressions de W_{2p} et W_{2p+1} à l'aide de factorielles. 4. Démontrer que la suite (W_n) est décroissante et strictement positive. 5. Établir que $\lim_{n\to+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$, et en déduire la célèbre **formule du produit infini de John Wallis (1655)** pour π :

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{p\to+\infty} \prod_{k=1}^{p} \frac{4k^2}{4k^2-1} = \frac{2}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{5}\times\frac{6}{7}\times \dots$$

Exercice 50.18 — Intégrale de Gauss et coordonnées polaires (introduction). On pose $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$. 1. Justifier la convergence de cette intégrale par comparaison avec e^{-x} pour $x \geq 1$. 2. On admet que $I^2 = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$. En passant en coordonnées polaires ($x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, dx\,dy = r\,dr\,d\theta$), montrer que :

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} d\theta \times \int_0^{+\infty} r e^{-r^2}\,dr.$$

3. Calculer exactement cette dernière intégrale et en déduire la valeur historique :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Exercice 50.19 — Formule d'Euler-Maclaurin et somme des cubes. Soit f une fonction de classe C^1 sur $[0\,;n]$. 1. Démontrer que $\int_0^1 (t - 1/2) f'(t)\,dt = \frac{f(0)+f(1)}{2} - \int_0^1 f(t)\,dt$. 2. Généraliser pour relier la somme discrète $\sum_{k=0}^{n} f(k)$ à l'intégrale $\int_0^n f(t)\,dt$.

Exercice 50.20 — Théorème de la moyenne et point intermédiaire. Soit f continue sur $[a\,;b]$. Démontrer qu'il existe $c \in\,]a\,;b[$ tel que :

$$\int_a^b f(t)\,dt = f(c)(b-a).$$

(C'est le Théorème de la Moyenne, équivalent du théorème des accroissements finis appliqué à la primitive).

Solutions

Solutions du Niveau

Solution 50.1 : 1. $F_1(x) = 4\left(\frac{x^4}{4}\right) - 6\left(\frac{x^3}{3}\right) + 2\left(\frac{x^2}{2}\right) - 7x = x^4 - 2x^3 + x^2 - 7x$. 2. $f_2(x) = 5x^{-2} - 2x^{-1/2} \Longrightarrow F_2(x) = 5\left(-\frac{1}{x}\right) - 2(2\sqrt{x}) = -\frac{5}{x} - 4\sqrt{x}$. 3. $F_3(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + 2e^{-x}$. 4. $F_4(x) = 3\left(\frac{1}{2}\sin(2x)\right) - \frac{1}{4}\cos(4x) = \frac{3}{2}\sin(2x) - \frac{1}{4}\cos(4x)$. 5. $F_5(x) = 4\ln x$.

Solution 50.2 : 1. Les primitives de f sont $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$. Condition : $F(1) = 1 - 2 + 1 + C = C = 5$. Donc $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 5$. 2. Les primitives de g sont $G(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C$. Condition : $G(0) = \frac{1}{2} + C = 2 \Longrightarrow C = \frac{3}{2}$. Donc $G(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{3}{2}$.

Solution 50.3 : 1. $I_1 = [x^3 - x^2 + x]_1^3 = (27 - 9 + 3) - (1 - 1 + 1) = 21 - 1 = 20$. 2. $I_2 = \left[\frac{1}{3}e^{3x}\right]_0^2 = \frac{1}{3}e^6 - \frac{1}{3}e^0 = \frac{e^6-1}{3}$. 3. $I_3 = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$. 4. $I_4 = [\sin x]_0^{\pi/2} = \sin(\pi/2) - \sin 0 = 1 - 0 = 1$. 5. Posons $u = 2x + 1 \Longrightarrow u' = 2$. $I_5 = \frac{1}{2}\int_0^1 2(2x+1)^3\,dx = \frac{1}{2}\left[\frac{(2x+1)^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{8}(3^4 - 1^4) = \frac{81-1}{8} = \frac{80}{8} = 10$.

Solution 50.4 : 1. Forme $u'u^4$ avec $u(x) = x^2 + 1$: $J_1 = \left[\frac{(x^2+1)^5}{5}\right]_0^1 = \frac{2^5}{5} - \frac{1^5}{5} = \frac{31}{5}$. 2. Forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^3$: $J_2 = [e^{x^3}]_0^2 = e^{2^3} - e^0 = e^8 - 1$. 3. Forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 3x + 1 > 0$: $J_3 = [\ln(x^2 + 3x + 1)]_1^2 = \ln(4 +$

$6+1) - \ln(1+3+1) = \ln 11 - \ln 5 = \ln\left(\frac{11}{5}\right)$. 4. Forme $u'u^3$ avec $u(x)=\sin x$: $J_4 = \left[\frac{\sin^4 x}{4}\right]_0^{\pi/4} = \frac{(\sqrt{2}/2)^4}{4} - 0 = \frac{1/4}{4} = \frac{1}{16}$.

Solution 50.5 : 1. $\int_{-a}^{a} f = \int_{-a}^{0} f + \int_0^a f$. Par changement de variable $u=-x$, si f est paire, $\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_0^a f(u)\,du$, d'où le résultat $2\int_0^a f$. 2. Si f est impaire, $\int_{-a}^0 f(x)\,dx = -\int_0^a f(u)\,du$, la somme vaut 0. 3. La fonction $x \mapsto x^7 - 3x^3 + \sin x$ est une somme de fonctions impaires, elle est donc impaire. L'intervalle $[-2\,;2]$ étant symétrique par rapport à 0, l'intégrale est **strictement nulle : $\boldsymbol{K=0}$**.

Solution 50.6 : $\mu = \frac{1}{3-0}\int_0^3 x^2\,dx = \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{1}{3}\times\frac{27}{3} = \frac{1}{3}\times 9 = 3$. Interprétation : le rectangle de largeur 3 et de hauteur $\mu=3$ a une aire de $3\times 3 = 9$, exactement égale à l'aire sous la parabole.

Solution 50.7 : La parabole coupe l'axe des abscisses quand $4-x^2=0 \Leftrightarrow x=-2$ ou $x=2$. Sur $[-2\,;2]$, la fonction est positive et paire. $\mathcal{A} = \int_{-2}^{2}(4-x^2)\,dx = 2\int_0^2(4-x^2)\,dx = 2\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 2\left(8-\frac{8}{3}\right) = 2\times\frac{16}{3} = \frac{32}{3} \approx 10,67$ u.a.

Solutions du Niveau

Solution 50.8 : 1. $A_1 = \int_0^{\pi} x\sin x\,dx$. Posons $u'(x)=\sin x \Longrightarrow u(x) = -\cos x$ et $v(x)=x \Longrightarrow v'(x)=1$. $A_1 = [-x\cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi}(-\cos x)\times 1\,dx = (-\pi\cos\pi - 0) + \int_0^{\pi}\cos x\,dx = \pi(1) + [\sin x]_0^{\pi} = \pi + 0 = \pi$. 2. $A_2 = \int_1^e x\ln x\,dx$. Posons $v(x)=\ln x \Longrightarrow v'(x)=\frac{1}{x}$ et $u'(x)=x \Longrightarrow u(x)=\frac{x^2}{2}$. $A_2 = \left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\times\frac{1}{x}\,dx = \left(\frac{e^2}{2}(1) - 0\right) - \frac{1}{2}\int_1^e x\,dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$. 3. $A_3 = \int_0^1 (2x+1)e^{-x}\,dx$. Posons $v(x) = 2x+1 \Longrightarrow v'(x)=2$ et $u'(x)=e^{-x} \Longrightarrow u(x) = -e^{-x}$. $A_3 = [-(2x+1)e^{-x}]_0^1 - \int_0^1(-e^{-x})\times 2\,dx = (-3e^{-1} - (-1)) + 2\int_0^1 e^{-x}\,dx = 1 - 3e^{-1} + 2[-e^{-x}]_0^1 = 1 - 3e^{-1} + 2(-e^{-1}+1) = 3 - 5e^{-1} = 3 - \frac{5}{e}$.

Solution 50.9 : Première IPP pour $B = \int_0^1 x^2 e^x\,dx$: $v(x)=x^2 \Longrightarrow v'(x)=2x$, $u'(x)=e^x \Longrightarrow u(x)=e^x$. $B = [x^2e^x]_0^1 - 2\int_0^1 xe^x\,dx = (e-0) - 2\int_0^1 xe^x\,dx$. Or nous avons déjà calculé à l'exemple résolu 3 que $\int_0^1 xe^x\,dx = 1$! Donc $B = e - 2(1) = e-2$.

Solution 50.10 : 1. $f(x)=g(x) \Leftrightarrow -x^2+4x = x^2-2x \Leftrightarrow 2x^2-6x=0 \Leftrightarrow 2x(x-3)=0$. Les points d'intersection ont pour abscisses $x=0$ et $x=3$. 2. Étudions le signe de $f(x)-g(x) = 6x-2x^2 = 2x(3-x)$. Pour tout $x\in[0\,;3]$, $2x\geq 0$ et $3-x\geq 0$, donc $f(x)-g(x)\geq 0 \Leftrightarrow f(x)\geq g(x)$. La parabole de f est située au-dessus de celle de g sur $[0\,;3]$. 3. $\mathcal{A} = \int_0^3 (f(x)-g(x))\,dx = \int_0^3 (6x-2x^2)\,dx = \left[3x^2 - \frac{2x^3}{3}\right]_0^3 = (3\times 9 - \frac{2\times 27}{3}) - 0 = 27 - 18 = 9$ unités d'aire.

Solution 50.11 : 1. $F(1) = \int_1^1 \frac{e^t}{t}\,dt = 0$. 2. La fonction $t\mapsto\frac{e^t}{t}$ est continue sur $]0\,;+\infty[$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, F est sa primitive qui s'annule en 1. Donc F est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et $F'(x) = \frac{e^x}{x}$. 3. Pour tout $x>0$, $e^x>0$ et $x>0$, donc $F'(x)>0$. F est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$. 4. Soit la fonction $\varphi(t) = \frac{e^t}{t}$ sur $[1\,;+\infty[$. $\varphi'(t) = \frac{e^t(t-1)}{t^2} \geq 0$ pour $t\geq 1$. Son minimum est en $t=1$ et vaut $\varphi(1)=e$. Donc pour tout $t\geq 1$, $\frac{e^t}{t}\geq e$. En intégrant cette inégalité entre 1 et x (avec $x\geq 1$) : $F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t}\,dt \geq \int_1^x e\,dt = e(x-1)$. 5. Comme $\lim_{x\to+\infty} e(x-1) = +\infty$, le théorème de comparaison donne $\lim_{x\to+\infty} F(x) = +\infty$.

Solution 50.12 : 1. $I_0 = \int_0^1 e^{-x}\,dx = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-1) = 1 - \frac{1}{e}$. 2. IPP sur $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1}e^{-x}\,dx$: $v(x) = x^{n+1} \Longrightarrow v'(x) = (n+1)x^n$ et $u'(x)=e^{-x} \Longrightarrow u(x) = -e^{-x}$. $I_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -(n+1)x^n e^{-x}\,dx = (-1e^{-1} - 0) + (n+1)\int_0^1 x^n e^{-x}\,dx = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$. 3. $I_1 = 1\times I_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}$. $I_2 = 2I_1 - \frac{1}{e} = 2\left(1-\frac{2}{e}\right) - \frac{1}{e} = 2 - \frac{5}{e}$. 4. Pour tout $x\in[0\,;1]$, $x^n\geq 0$ et $e^{-x}>0$, donc la fonction intégrée est positive. Les bornes étant dans l'ordre $0\leq 1$, $I_n \geq 0$. 5. $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1}-x^n)e^{-x}\,dx = \int_0^1 x^n(x-1)e^{-x}\,dx$. Pour tout $x\in[0\,;1]$, $x-1\leq 0$ et les autres facteurs sont positifs, donc l'intégrande est négative. Ainsi $I_{n+1}-I_n\leq 0$: la suite est décroissante. 6. Pour $x\in[0\,;1]$, on a $-1\leq -x\leq 0 \Longrightarrow e^{-1}\leq e^{-x}\leq 1$. En multipliant par $x^n\geq 0$: $x^n e^{-1} \leq x^n e^{-x} \leq x^n$. En intégrant sur $[0\,;1]$: $e^{-1}\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 \leq I_n \leq \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 \Leftrightarrow \frac{1}{e(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. Comme $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1} = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{n\to+\infty} I_n = 0$.

Solution 50.13 : 1. $R(0,5) = 0,4 - k(0,5)^2 = 0,3 \Leftrightarrow 0,4 - 0,25k = 0,3 \Leftrightarrow 0,25k = 0,1 \Leftrightarrow k = 0,4$. Donc $R(x) = 0,4 - 0,4x^2 = 0,4(1-x^2)$. 2. Chaque tranche circulaire d'épaisseur dx a une surface de $\pi R(x)^2$, donc son volume est $dV = \pi R(x)^2 dx$. 3. $V = \int_{-0,5}^{0,5} \pi[R(x)]^2\,dx$. 4. Par parité : $V = 2\pi\int_0^{0,5} 0,16(1-x^2)^2\,dx = 0,32\pi\int_0^{0,5}(1-2x^2+x^4)\,dx$. Calculons la primitive : $\left[x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^5}{5}\right]_0^{0,5} = 0,5 - \frac{2}{3}(0,125) + \frac{0,03125}{5} = 0,5 - \frac{0,25}{3} + 0,00625 = 0,5 - 0,08333 + 0,00625 = 0,42292$ m^3. $V = 0,32\pi\times 0,42292 \approx 0,425$ m^3 $= 425$ litres.

Un cylindre parfait de rayon intermédiaire $0,35$ m aurait un volume de $\pi(0,35)^2 \times 1 \approx 0,385$ m$^3 = 385$ litres. Le ventre bombé du tonneau apporte donc 40 litres supplémentaires !

Solution 50.14 : 1. $\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1)+b(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{(a+b)x+(a-b)}{x^2-1}$. Par identification : $a+b=0$ et $a-b=1$, d'où $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$. Ainsi $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)}$. 2. Une primitive sur $]1\,;+\infty[$ est $F(x) = \frac{1}{2}\ln(x-1) - \frac{1}{2}\ln(x+1) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$. 3. $I = [F(x)]_2^3 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{2}{4}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}(\ln(1/2) - \ln(1/3)) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$.

Solution 50.15 : 1. $a(t) = 400(t+10)^{-2}$. Une primitive est $-400(t+10)^{-1} = -\frac{400}{t+10}$. $v(t) = -\frac{400}{t+10} + C$. Condition initiale : $v(0) = -\frac{400}{10} + C = 0 \Longrightarrow C = 40$. Donc $v(t) = 40 - \frac{400}{t+10}$. 2. À $t = 30$ s : $v(30) = 40 - \frac{400}{40} = 40 - 10 = 30$ m$\cdot$s^{-1} (108 km/h). 3. L'altitude est $h(t) = \int_0^t v(u)\,du = [40u - 400\ln(u+10)]_0^t = 40t - 400\ln(t+10) + 400\ln 10 = 40t - 400\ln\left(1+\frac{t}{10}\right)$. À $t = 30$ s : $h(30) = 40(30) - 400\ln(1+3) = 1200 - 400\ln 4 \approx 1200 - 400(1,386) \approx 1200 - 554,5 = 645,5$ mètres.

Solution 50.16 : 1. Développons le carré : $(f(t)+\lambda g(t))^2 = (f(t))^2 + 2\lambda f(t)g(t) + \lambda^2 (g(t))^2$. Par positivité de l'intégrale d'une fonction positive : $P(\lambda) = \lambda^2\left(\int_a^b g^2\right) + 2\lambda\left(\int_a^b fg\right) + \left(\int_a^b f^2\right) \geq 0$. 2. Ce trinôme du second degré en λ est toujours positif ou nul. Son discriminant réduit Δ' est donc nécessairement négatif ou nul : $\Delta' = \left(\int_a^b fg\right)^2 - \left(\int_a^b g^2\right)\left(\int_a^b f^2\right) \leq 0$. D'où $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)$.

Solutions du Niveau

Solution 50.17 : 1. $W_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}$. $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1$. 2. $W_{n+1} = \int_0^{\pi/2} \sin x \times \sin^n x\,dx$. IPP : $u'(x) = \sin x \Longrightarrow u(x) = -\cos x$, et $v(x) = \sin^n x \Longrightarrow v'(x) = n\cos x \sin^{n-1} x$. $W_{n+1} = [-\cos x \sin^n x]_0^{\pi/2} + n\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin^{n-1} x\,dx$. Le crochet s'annule aux deux bornes. Remplaçons $\cos^2 x$ par $1 - \sin^2 x$: $W_{n+1} = n\int_0^{\pi/2} (1-\sin^2 x)\sin^{n-1} x\,dx = nW_{n-1} - nW_{n+1}$. $(n+1)W_{n+1} = nW_{n-1} \Leftrightarrow W_{n+1} = \frac{n}{n+1}W_{n-1}$. 3. Par récurrence immédiate : $W_{2p} = \frac{2p-1}{2p} \times \frac{2p-3}{2p-2} \times \ldots \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}$. $W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} \times \frac{2p-2}{2p-1} \times \ldots \times \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}$. 4. Pour $x \in [0\,;\pi/2]$, $0 \leq \sin x \leq 1 \Longrightarrow 0 \leq \sin^{n+1} x \leq \sin^n x$. En intégrant, $0 < W_{n+1} \leq W_n$. 5. De la décroissance, $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$. En divisant par W_{n+1} : $1 \leq \frac{W_n}{W_{n+1}} \leq \frac{W_{n-1}}{W_{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$. Par les gendarmes, $\lim_{n\to+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$. En formant le rapport $\frac{W_{2p+1}}{W_{2p}}$, on obtient exactement le produit infini de Wallis tendant vers $\frac{2}{\pi}$.

Solution 50.18 : 1. Pour $x \geq 1$, $x^2 \geq x \Longrightarrow -x^2 \leq -x \Longrightarrow e^{-x^2} \leq e^{-x}$. Comme $\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx = e^{-1}$ est finie, l'intégrale converge. 2. Le changement de variables polaires remplace le quadrant $x \geq 0, y \geq 0$ par $\theta \in [0\,;\pi/2]$ et $r \in [0\,;+\infty[$. 3. $\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,dr = \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$. Ainsi $I^2 = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} \Longrightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Par parité sur $\mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = 2I = \sqrt{\pi}$.

Solution 50.19 : 1. IPP avec $u'(t) = 1 \Longrightarrow u(t) = t - 1/2$ et $v(t) = f(t) \Longrightarrow v'(t) = f'(t)$: $\int_0^1 (t-1/2)f'(t)\,dt = [(t-1/2)f(t)]_0^1 - \int_0^1 1 \times f(t)\,dt = \left(\frac{1}{2}f(1) - \left(-\frac{1}{2}f(0)\right)\right) - \int_0^1 f(t)\,dt = \frac{f(0)+f(1)}{2} - \int_0^1 f(t)\,dt$. 2. En sommant cette relation sur les intervalles $[k\,;k+1]$ pour $k = 0, \ldots, n-1$, on obtient la formule sommatoire d'Euler-Maclaurin, qui permet d'évaluer les sommes discrètes avec une précision extraordinaire.

Solution 50.20 : Soit $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. F est continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$. D'après le Théorème des Accroissements Finis (TAF), il existe $c \in]a\,;b[$ tel que :

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(c).$$

Or $F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,dt$ et $F'(c) = f(c)$. On a donc bien : $\int_a^b f(t)\,dt = f(c)(b-a)$.

La question qui ouvre la suite

Nous savons désormais calculer l'aire sous une courbe lorsque la formule de la fonction est connue. Mais que se passe-t-il dans la vraie vie, quand nous ne connaissons pas la formule de la fonction, mais seulement **la relation entre la fonction et sa propre dérivée** ?

Quand une tasse de thé chaud est posée sur la table, la vitesse à laquelle elle refroidit est proportionnelle à la différence entre sa température et celle de la pièce. Comment trouver l'équation complète de la température au fil du temps à partir de cette simple loi physique ?

C'est l'entrée dans le royaume des **équations différentielles** : rendez-vous au chapitre 51 avec **la tasse de thé qui refroidit**.

CHAPITRE 51 : La Tasse de Thé qui Refroidit

> « La nature ne nous livre pas les trajectoires déjà tracées ; elle nous donne seulement des lois locales qui relient l'état présent à la vitesse de son changement. Tout le reste est équation différentielle. » — *Henri Poincaré*

Ce que tu vas découvrir

- Pourquoi la plupart des lois fondamentales de la physique, de la biologie et de l'économie ne donnent pas directement la formule de ce qui arrive, mais **la relation entre une grandeur et sa vitesse de variation**.
- La loi phénoménologique du **refroidissement de Newton** (1701) : pourquoi ton café chaud refroidit très vite au début, puis de plus en plus lentement.
- L'équation différentielle linéaire homogène $\boldsymbol{y' = ay}$: sa démonstration rigoureuse et ses solutions $y(t) = Ce^{at}$.
- L'équation différentielle avec second membre constant $\boldsymbol{y' = ay + b}$: la décomposition en *solution générale de l'équation homogène + solution particulière constante* : $y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}$.
- Le problème de Cauchy et la **condition initiale** $y(t_0) = y_0$ garantissant l'unicité de la trajectoire.
- Les grands modèles du monde réel : radioactivité, circuit RC en électronique, vitesse limite d'un parachutiste, modèles de population.
- La **méthode d'Euler** pas à pas : comment une machine résout numériquement n'importe quelle équation différentielle avec un script **Python**.

---

1. Le problème : la tasse de thé fumante sur la table

1.1 L'observation d'Isaac Newton (1701)

Imagine une tasse de thé que l'on vient de verser, bouillante à 90° C, posée sur une table dans une cuisine où l'air ambiant est à 20° C. Au bout d'une minute, la température a baissé de 10° C : elle est à 80° C. Au bout de deux minutes, sera-t-elle à 70° C ? Au bout de neuf minutes, sera-t-elle à 0° C ? Et au bout d'un quart d'heure, le thé va-t-il se transformer en glaçon ?

Évidemment non ! Chacun sait d'expérience que :

- Quand le thé est très chaud, il fume abondamment et refroidit à toute allure ;
- Quand le thé est tiède (par exemple 25° C), il ne perd qu'une fraction de degré par minute ;
- Il ne deviendra jamais plus froid que la pièce : sa température va s'approcher indéfiniment des 20° C de la pièce sans jamais descendre en dessous.

En **1701**, **Isaac Newton** publie anonymement un court mémoire dans les *Philosophical Transactions of the Royal Society* intitulé *Scala graduum caloris* (« Échelle des degrés de chaleur »). Il y énonce une loi expérimentale universelle :

> ***La loi de refroidissement de Newton*** *— La vitesse à laquelle un corps chaud perd sa chaleur par contact avec le milieu ambiant est* ***proportionnelle à l'écart de température*** *entre ce corps et le milieu environnant.*

1.2 La traduction en équation mathématique

Notons $T(t)$ la température du thé à l'instant t. La « vitesse à laquelle la température varie » à chaque instant, c'est très exactement le taux de variation instantané, c'est-à-dire **la dérivée $\boldsymbol{T'(t)}$**. L'écart avec la température ambiante T_{ext} est la différence $T(t) - T_{\text{ext}}$. La loi de Newton s'écrit donc en une seule ligne :

$$T'(t) = -k\,\big(\,T(t) - T_{\text{ext}}\,\big)$$

où $k > 0$ est une constante positive dépendant de la forme de la tasse, de la matière (porcelaine, métal) et de l'agitation de l'air. Le signe « $-$ » indique qu'il s'agit d'un refroidissement ($T'(t) < 0$ lorsque $T(t) > T_{\text{ext}}$).

En développant, on obtient :

$$T'(t) = -kT(t) + kT_{\text{ext}}.$$

C'est une **équation différentielle** : l'inconnue n'est pas un nombre x, mais **une fonction entière $t \mapsto T(t)$**, et l'équation relie cette fonction inconnue à sa propre dérivée !

---

2. L'équation différentielle homogène : $y' = ay$

2.1 Définition et intuition

Définition Fondamentale

Définition — Soit a un nombre réel fixé. L'équation différentielle :

$$(E_0) : \quad y' = ay$$

est appelée **équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficients constants**. Une solution de (E_0) sur un intervalle I est une fonction f dérivable sur I telle que pour tout $t \in I$:

$$f'(t) = af(t).$$

Ce que cela signifie : On cherche une fonction dont la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même. Connais-tu une fonction qui est égale à sa propre dérivée ? Oui ! C'est la fonction exponentielle : $(e^t)' = e^t$. Et si l'on prend $y(t) = e^{at}$, la formule de dérivation d'une composée donne $(e^{at})' = ae^{at} = ay(t)$! Si l'on multiplie par n'importe quelle constante réelle C, la linéarité de la dérivation assure que $(Ce^{at})' = C(ae^{at}) = a(Ce^{at})$. Toutes les fonctions de la forme $t \mapsto Ce^{at}$ sont donc des solutions. Y en a-t-il d'autres ? La réponse est non.

2.2 Théorème fondamental et démonstration

Théorème (exigible au baccalauréat) —

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions de la forme :

$$y(t) = Ce^{at}$$

où C est une constante réelle arbitraire.

✍ Démonstration rigoureuse —

La démonstration se fait en deux étapes : existence puis unicité de la forme. 1. **Vérification :** Soit $C \in \mathbb{R}$. Posons $f(t) = Ce^{at}$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$f'(t) = C \times (ae^{at}) = a(Ce^{at}) = af(t).$$

Ainsi, toute fonction de la forme Ce^{at} est bien solution de (E_0).

2. **Réciproque (unicité) :** Soit g une solution quelconque de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$. On sait donc que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $g'(t) = ag(t)$. Considérons la fonction auxiliaire φ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\varphi(t) = g(t)e^{-at}.$$

La fonction φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Calculons sa dérivée à l'aide de la règle $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\varphi'(t) = g'(t)e^{-at} + g(t)(-ae^{-at}) = \big(\, g'(t) - ag(t)\big)\, e^{-at}.$$

Or, puisque g est solution de $y' = ay$, on a $g'(t) - ag(t) = 0$ pour tout réel t ! On en déduit :

$$\varphi'(t) = 0 \times e^{-at} = 0.$$

La dérivée de φ est **identiquement nulle sur l'intervalle** $\mathbb{R}$. Par conséquent, la fonction φ est **constante** sur $\mathbb{R}$: il existe une constante réelle C telle que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(t) = C \Leftrightarrow g(t)e^{-at} = C.$$

En multipliant les deux membres par e^{at} (qui n'est jamais nul) :

$$g(t) = Ce^{at}.$$

Toute solution est donc nécessairement de la forme Ce^{at}. ■

2.3 Unicité sous condition initiale : le problème de Cauchy

L'équation $y' = ay$ admet une infinité de solutions (une pour chaque valeur de la constante C). Graphiquement, cela donne toute une famille de courbes qui ne se coupent jamais :



Fig. 112. – Charge du condensateur et méthode d'Euler pour les équations différentielles

Pour fixer la valeur de C et déterminer l'unique trajectoire physique suivie par le système, il faut connaître **l'état initial** à un instant t_0.

📐 **Théorème d'existence et d'unicité (Problème de Cauchy) —**

Pour tous réels t_0 et y_0, l'équation différentielle $y' = ay$ admet **une unique solution** f vérifiant la condition initiale :

$$f(t_0) = y_0.$$

Cette solution est donnée pour tout $t \in \mathbb{R}$ par :

$$f(t) = y_0\, e^{a(t-t_0)}.$$

✍️ **Justification —**

Les solutions sont de la forme $f(t) = Ce^{at}$. La condition initiale s'écrit :

$$f(t_0) = y_0 \Leftrightarrow Ce^{at_0} = y_0 \Leftrightarrow C = y_0 e^{-at_0}.$$

L'expression de la fonction devient alors :

$$f(t) = (y_0 e^{-at_0})e^{at} = y_0\, e^{a(t-t_0)}.$$

La constante C étant uniquement déterminée, la solution est unique. ■

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Décroissance radioactive. Un échantillon d'iode 131 contient initialement $N_0 = 10^8$ noyaux radioactifs à $t = 0$. Le nombre de noyaux $N(t)$ obéit à l'équation différentielle $N'(t) = -0,0866N(t)$ (le temps t étant exprimé en jours). 1. Déterminer l'expression de $N(t)$. 2. Calculer le nombre de noyaux restants au bout de 8 jours.

Résolution : 1. C'est l'équation $y' = ay$ avec $a = -0,0866$. Les solutions sont $N(t) = Ce^{-0,0866t}$. Condition initiale : $N(0) = Ce^0 = C = 10^8$. Donc $N(t) = 10^8 e^{-0,0866t}$. 2. Pour $t = 8$ jours : $N(8) = 10^8 e^{-0,0866\times 8} = 10^8 e^{-0,6928} \approx 10^8 \times 0,50017 \approx 5 \times 10^7$ noyaux. (La moitié de l'échantillon s'est désintégrée : la demi-vie de l'iode 131 est d'environ 8 jours !).

---

3. L'équation avec second membre : $y' = ay + b$

Dans la réalité, les phénomènes ne s'éteignent pas toujours vers zéro : la tasse de thé ne descend pas à 0° K, elle se stabilise à la température ambiante 20° C ; un condensateur ne se charge pas vers l'infini, il se charge vers la tension du générateur E. L'équation s'écrit alors avec un terme constant :

$$(E) : \quad y' = ay + b \quad (a \neq 0).$$

3.1 La recherche d'une solution constante particulière

Cherchons s'il existe une solution constante $y(t) = k$ (avec $k \in \mathbb{R}$) à cette équation. Puisque y est constante, sa dérivée est nulle : $y'(t) = 0$. L'équation devient :

$$0 = ak + b \Leftrightarrow ak = -b \Leftrightarrow k = -\frac{b}{a}.$$

La solution particulière constante de $y' = ay + b$ est :

$$y_p(t) = -\frac{b}{a}.$$

*On l'appelle souvent **l'état d'équilibre** ou le régime permanent du système.*

3.2 Théorème de structure des solutions

📐 Théorème (Résolution générale de $y' = ay + b$) —

Soient $a \neq 0$ et b deux nombres réels. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions :

$$y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}$$

où C est une constante réelle arbitraire.

✍️ Démonstration (exigible) —

Notons $(E) : y' = ay + b$ et $(E_0) : y' = ay$ l'équation homogène associée. Posons $y_p(t) = -\frac{b}{a}$. On sait que $y_p' = 0 = ay_p + b$, donc y_p est une solution particulière de (E).

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrons que :

$$f \text{ est solution de } (E) \Leftrightarrow f - y_p \text{ est solution de } (E_0).$$

En effet :

- $(f - y_p)' = f' - y_p' = f' - 0 = f'$.
- D'autre part, $a(f - y_p) = af - ay_p = af - a\left(-\frac{b}{a}\right) = af + b$.

Ainsi :

$$(f - y_p)' = a(f - y_p) \Leftrightarrow f' = af + b.$$

Cela signifie que la différence $f - y_p$ est une solution de l'équation homogène $y' = ay$. D'après le théorème de la section 2.2, il existe donc une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que :

$$(f - y_p)(t) = Ce^{at} \Leftrightarrow f(t) = Ce^{at} + y_p(t) \Leftrightarrow f(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}.$$

■

🧭 Le principe fondamental de superposition :

$$\text{Solution Générale de } (E) = \underbrace{Ce^{at}}_{\text{Solution générale de l'homogène}} + \underbrace{\left(-\frac{b}{a}\right)}_{\text{Solution particulière constante}}$$

3.3 Condition initiale pour $y' = ay + b$

Pour déterminer C à partir d'une condition initiale $y(t_0) = y_0$:

$$y(t_0) = y_0 \Leftrightarrow Ce^{at_0} - \frac{b}{a} = y_0 \Leftrightarrow Ce^{at_0} = y_0 + \frac{b}{a} \Leftrightarrow C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right)e^{-at_0}.$$

En réinjectant :

$$y(t) = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right)e^{a(t-t_0)} - \frac{b}{a}.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — La tasse de thé résolue. Reprenons notre thé à 90° C dans une pièce à 20° C. L'équation est $T'(t) = -0,1T(t) + 2$ (avec t en minutes). 1. Déterminer la solution générale de l'équation. 2. Déterminer l'unique solution vérifiant $T(0) = 90$. 3. Quelle sera la température du thé au bout de 20 minutes ? 4. Au bout de combien de temps le thé sera-t-il buvable, c'est-à-dire à 45° C ?

Résolution pas à pas : 1. C'est l'équation $y' = ay + b$ avec $a = -0,1$ et $b = 2$. La constante d'équilibre est $-\frac{b}{a} = -\frac{2}{-0,1} = 20$. Les solutions générales sont :

$$T(t) = Ce^{-0,1t} + 20.$$

2. Condition initiale $T(0) = 90$:

$$T(0) = Ce^{0} + 20 = 90 \Leftrightarrow C + 20 = 90 \Leftrightarrow C = 70.$$

La température du thé à l'instant t est donc :

$$T(t) = 70e^{-0,1t} + 20.$$

3. Au bout de 20 minutes :

$$T(20) = 70e^{-0,1\times 20} + 20 = 70e^{-2} + 20 \approx 70 \times 0,1353 + 20 \approx 9,47 + 20 = 29,5^\circ \text{ C}.$$

4. On cherche t tel que $T(t) = 45$:

$$70e^{-0,1t} + 20 = 45 \Leftrightarrow 70e^{-0,1t} = 25 \Leftrightarrow e^{-0,1t} = \frac{25}{70} = \frac{5}{14}.$$

En appliquant la fonction $\ln$ (chapitre 48) :

$$-0,1t = \ln\left(\frac{5}{14}\right) = -\ln\left(\frac{14}{5}\right) \Leftrightarrow t = 10\ln(2,8) \approx 10 \times 1,0296 \approx 10,3 \text{ minutes}.$$

Le thé sera buvable au bout d'environ 10 minutes et 18 secondes.

---

4. Les grands modèles du monde réel

4.1 La charge d'un condensateur (circuit RC)

Dans un circuit électrique comprenant un générateur de tension constante E, une résistance R et un condensateur de capacité C montés en série, la loi des mailles s'écrit :

$$u_R(t) + u_C(t) = E.$$

Or la loi d'Ohm donne $u_R = Ri(t)$ et le courant traversant le condensateur est $i(t) = C\frac{du_C}{dt}$. On obtient l'équation différentielle :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E \Leftrightarrow u_C'(t) = -\frac{1}{RC}u_C(t) + \frac{E}{RC}.$$

Posons $\tau = RC$ (la **constante de temps** du circuit, exprimée en secondes). L'équation devient :

$$u_C'(t) = -\frac{1}{\tau}u_C(t) + \frac{E}{\tau}.$$

Avec la condition initiale d'un condensateur initialement déchargé ($u_C(0) = 0$), la solution est :

$$u_C(t) = E\big(1 - e^{-t/\tau}\big).$$

> **Propriété remarquable de la constante de temps τ :**
>
> À $t = \tau$, la tension vaut $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx E(1 - 0,368) = 0,632E$. Le condensateur est chargé à $\mathbf{63,2\,\%}$. À $t = 3\tau$, il est chargé à $95\,\%$. À $t = 5\tau$, il est chargé à $99,3\,\%$ (charge quasi-totale).

4.2 La chute d'un corps avec frottement fluide (vitesse limite)

Un parachutiste de masse m saute d'un avion. Il est soumis à son poids $P = mg$ (vers le bas) et aux frottements de l'air proportionnels à sa vitesse $F = -kv$ (vers le haut). La deuxième loi de Newton ($ma = \sum F$) donne :

$$mv'(t) = mg - kv(t) \Leftrightarrow v'(t) = -\frac{k}{m}v(t) + g.$$

C'est une équation de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -\frac{k}{m}$ et $b = g$. La solution constante d'équilibre est la **vitesse limite** $v_{\lim}$:

$$v_{\lim} = -\frac{b}{a} = -\frac{g}{-k/m} = \frac{mg}{k}.$$

Si le parachutiste s'élance avec une vitesse initiale nulle $v(0) = 0$, sa vitesse à chaque seconde est :

$$v(t) = \frac{mg}{k}\left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right).$$

Le parachutiste accélère d'abord sous l'effet de la pesanteur, puis la résistance de l'air équilibre le poids : sa vitesse plafonne à $v_{\lim}$.

---

5. La méthode d'Euler : résoudre quand on ne sait pas intégrer

Dans le monde réel, beaucoup d'équations différentielles sont non linéaires (par exemple $y' = y^2 - t$ ou $y' = \sin(yt)$) et ne possèdent aucune formule exacte avec des exponentielles ou des logarithmes ! Comment les ingénieurs de la NASA ou les climatologues prédisent-ils l'avenir de ces systèmes ? Grâce à une idée géométrique géniale due à **Leonhard Euler** en 1768 : **remplacer la courbe inconnue par une suite de petits segments de tangentes**.

5.1 Le principe géométrique

Soit l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ avec la condition initiale $y(t_0) = y_0$. On choisit un petit pas de temps $h > 0$.
1. **Au point de départ $(t_0\,;y_0)$:** La pente de la tangente est connue grâce à l'équation différentielle :

$$\text{Pente} = y'(t_0) = f(t_0, y_0).$$

2. **Pour avancer d'un pas h :** On suit cette droite tangente pendant une durée h. L'abscisse devient $t_1 = t_0 + h$. La nouvelle ordonnée approchée y_1 est donnée par l'approximation affine :

$$y_1 = y_0 + h \times y'(t_0) = y_0 + h \times f(t_0, y_0).$$

3. **On recommence depuis $(t_1\,;y_1)$:** On recalcule la nouvelle pente $f(t_1, y_1)$ et on avance d'un nouveau pas h :

$$y_{n+1} = y_n + h \times f(t_n, y_n) \quad \text{avec} \quad t_{n+1} = t_n + h.$$

Plus le pas h est choisi petit ($h = 0,01$, $h = 0,001$), plus la ligne brisée se rapproche de la courbe exacte !

5.2 Script Python de la méthode d'Euler

Voici le programme officiel Python implémentant la méthode d'Euler pour résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 1$ sur $[0\,;2]$, et comparant le résultat avec la solution théorique exacte $y(t) = e^{-2t}$:

```python
import math

def methode_euler(a, b, y0, n):
    """
    Résout y' = -2y sur [a, b] avec y(a) = y0 en n étapes.
    """
    h = (b - a) / n
    t = a
    y = y0
    resultats = [(t, y, math.exp(-2 * t))]

    for _ in range(n):
        # Pente calculée d'après l'équation différentielle y' = -2y
        pente = -2 * y
        y = y + h * pente
        t = t + h
        y_exact = math.exp(-2 * t)
        resultats.append((round(t, 4), round(y, 4), round(y_exact, 4)))

    return resultats

# Exécution avec 10 pas de h = 0.2
points = methode_euler(0, 2, 1.0, 10)
print(f"{'t':<6} | {'y_Euler':<10} | {'y_Exact':<10} | {'Erreur':<10}")
print("-" * 42)
for t_val, y_e, y_ex in points:
    err = abs(y_e - y_ex)
    print(f"{t_val:<6} | {y_e:<10} | {y_ex:<10} | {err:<10.4f}")
```

Ce qu'il faut retenir

1. L'équation différentielle linéaire $y' = ay$

- Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{at} \quad (C \in \mathbb{R}).$$

- Si $a > 0$, les solutions tendent vers $\pm\infty$ quand $t \to +\infty$ (croissance exponentielle explosive).
- Si $a < 0$, les solutions tendent vers 0 quand $t \to +\infty$ (décroissance exponentielle vers l'équilibre).
- Condition initiale : pour $y(t_0) = y_0$, l'unique solution est $y(t) = y_0 e^{a(t-t_0)}$.

2. L'équation avec second membre constant $y' = ay + b$ ($a \neq 0$)

- Solution générale :

$$y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}.$$

- Le terme $-\frac{b}{a}$ est la **solution particulière constante**, représentant la valeur d'équilibre à long terme (asymptote horizontale lorsque $a < 0$).

3. Équation avec second membre variable $y' = ay + f(t)$

- Pour résoudre $y' = ay + f(t)$, on cherche une solution particulière $y_p(t)$ (souvent de même nature que f : polynôme si f est polynomiale, exponentielle si f est exponentielle), puis la solution générale est $y(t) = Ce^{at} + y_p(t)$.

4. La méthode d'Euler

- Algorithme de pas h :

$$t_{n+1} = t_n + h \quad \text{et} \quad y_{n+1} = y_n + h \times y'(t_n).$$

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 51.1 — Équations homogènes simples. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes : 1. $y' = 3y$ 2. $y' = -5y$ 3. $2y' + 6y = 0$ 4. $4y' - y = 0$

Exercice 51.2 — Conditions initiales pour $y' = ay$. Déterminer l'unique solution vérifiant la condition initiale donnée : 1. $y' = 2y$ avec $y(0) = 7$ 2. $y' = -3y$ avec $y(0) = -4$ 3. $y' = 0,5y$ avec $y(2) = 10$ 4. $y' = -y$ avec $y(1) = e$

Exercice 51.3 — Équations avec second membre constant $y' = ay + b$. Résoudre sur $\mathbb{R}$: 1. $y' = -2y + 6$ 2. $y' = 4y - 8$ 3. $3y' + 9y = 18$ 4. $y' = -0,2y + 5$

Exercice 51.4 — Conditions initiales pour $y' = ay + b$. 1. Résoudre $y' = -y + 3$ avec $y(0) = 1$. 2. Résoudre $y' = 2y - 10$ avec $y(0) = 5$. 3. Résoudre $2y' + y = 4$ avec $y(0) = 0$.

Exercice 51.5 — Détermination de l'asymptote. Soit f une solution de l'équation $y' = -3y + 12$. 1. Déterminer l'expression générale de $f(t)$. 2. Quelle est la limite de $f(t)$ quand $t \to +\infty$? 3. En déduire l'équation de l'asymptote horizontale commune à toutes les courbes solutions.

Exercice 51.6 — Un pas de la méthode d'Euler. Soit l'équation $y' = 2t + y$ avec $y(0) = 1$. En appliquant la méthode d'Euler avec un pas $h = 0,1$, calculer les valeurs approchées $y_1 \approx y(0,1)$ et $y_2 \approx y(0,2)$.

Niveau (Réflexion et Baccalauréat)

Exercice 51.7 — La tasse de café de l'inspecteur (Scène de crime). Un corps sans vie est découvert dans une pièce maintenue à une température constante de 20° C. À 14h00, le médecin légiste mesure la température du corps : elle est de 30° C. À 15h00, il mesure à nouveau la température : elle est descendue à 28° C. On suppose que le refroidissement obéit à la loi de Newton : $T'(t) = -k(T(t) - 20)$, et que la température d'une personne vivante est de 37° C. 1. En prenant $t = 0$ à 14h00, exprimer la température $T(t)$ en fonction de t et de la constante k. 2. À l'aide de la mesure effectuée à 15h00 ($t = 1$), déterminer la valeur exacte puis approchée de k. 3. Déterminer l'heure exacte du décès de la victime.

Exercice 51.8 — Décharge d'un condensateur à travers une résistance. Un condensateur de capacité $C = 50\,\mu$ F chargé sous une tension $U_0 = 12$ V est déconnecté puis branché aux bornes d'un résistor de résistance $R = 20\,\text{k}\,\Omega$. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur. 2. Calculer la constante de temps $\tau = RC$. 3. Résoudre l'équation et donner l'expression de $u(t)$. 4. Au bout de combien de temps la tension devient-elle inférieure à 1 V ?

Exercice 51.9 — Perfusion d'un médicament dans le sang (Type Bac). On administre à un patient un antibiotique par perfusion intraveineuse continue à débit constant. La quantité de médicament $q(t)$ présente dans le sang (en milligrammes) à l'instant t (en heures) vérifie l'équation :

$$q'(t) = -0,15q(t) + 30.$$

Au début de la perfusion ($t = 0$), le patient n'a aucun médicament dans l'organisme : $q(0) = 0$. 1. Résoudre cette équation différentielle et déterminer l'expression de $q(t)$. 2. Étudier le sens de variation de q sur $[0\,;+\infty[$. 3. Déterminer la limite de $q(t)$ quand $t \to +\infty$. Quelle est la quantité maximale que l'organisme atteindra à long terme ? 4. Le traitement n'est efficace que lorsque la quantité de médicament dépasse 150 mg. Au bout de combien de temps ce seuil d'efficacité est-il atteint ?

Exercice 51.10 — Équation avec second membre affine $y' = ay + f(t)$. On considère l'équation différentielle :

$$(E) : \quad y' - 2y = 4x - 6.$$

1. Déterminer deux réels m et p tels que la fonction affine $y_p(x) = mx + p$ soit une solution particulière de (E). 2. Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y' - 2y = 0$. 3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E). 4. Déterminer l'unique solution f vérifiant la condition $f(0) = 1$.

Exercice 51.11 — Équation avec second membre trigonométrique. Soit l'équation différentielle $(E) : y' + y = \cos x + \sin x$. 1. Montrer que la fonction $g(x) = \sin x$ est une solution particulière de (E). 2. En déduire la solution générale de (E). 3. Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 2$.

Exercice 51.12 — Vitesse limite d'une goutte de pluie. Une goutte de pluie de masse $m = 4 \times 10^{-5}$ kg tombe verticalement d'un nuage sans vitesse initiale. Elle subit la pesanteur ($g = 9,81$ $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$) et une force de frottement de l'air proportionnelle à sa vitesse : $F = -kv$ avec $k = 5 \times 10^{-5}$ $\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$. 1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$. 2. Déterminer la vitesse limite $v_{\lim}$ de la goutte. 3. Résoudre l'équation différentielle pour exprimer $v(t)$ en fonction de t. 4. Calculer la durée nécessaire pour que la goutte atteigne $99\,\%$ de sa vitesse limite.

Exercice 51.13 — Tangente commune et raccordement. On considère l'équation $y' = -2y + 4$. 1. Résoudre cette équation. 2. Existe-t-il une courbe solution dont la tangente au point d'abscisse 0 passe par le point $A(1\,;0)$? Si oui, déterminer cette solution.

Niveau (Approfondissement et Défis)

Exercice 51.14 — Modèle logistique de Verhulst (dynamique des populations). Le modèle malthusien $y' = ay$ prédit une population qui explose vers l'infini, ce qui est impossible dans un milieu aux ressources limitées. En 1838, **Pierre-François Verhulst** propose l'équation différentielle logistique :

$$(E_L) : \quad y' = ay\Big(1 - \frac{y}{K}\Big)$$

où $K > 0$ est la capacité de charge maximale de l'environnement, et $a > 0$ le taux intrinsèque de croissance. Soit y une solution ne s'annulant pas et bornée entre 0 et K. Posons la fonction $z(t) = \frac{1}{y(t)}$. 1. Calculer la dérivée $z'(t)$ en fonction de $y(t)$ et $y'(t)$. 2. En remplaçant $y'(t)$ par sa valeur issue de (E_L), montrer que z vérifie l'équation différentielle linéaire :

$$z' + az = \frac{a}{K}.$$

3. Résoudre cette équation en $z(t)$. 4. En déduire l'expression explicite de la population $y(t)$ en fonction de la population initiale $y_0 = y(0)$. 5. Étudier les limites de $y(t)$ en $-\infty$ et $+\infty$. Quelle est la forme de la courbe obtenue ?

Exercice 51.15 — L'équation différentielle du second ordre $y'' + \omega^2 y = 0$. Soit $\omega > 0$. On cherche toutes les fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$(H) : \quad y'' + \omega^2 y = 0.$$

1. Vérifier que pour toutes constantes réelles A et B, la fonction $y(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ est solution. 2. Soit f une solution quelconque de (H). Posons $u(t) = \omega f(t)\sin(\omega t) + f'(t)\cos(\omega t)$ et $v(t) = \omega f(t)\cos(\omega t) - f'(t)\sin(\omega t)$. Calculer les dérivées $u'(t)$ et $v'(t)$. 3. En déduire que u et v sont des fonctions constantes, et prouver ainsi que **toutes** les solutions de (H) sont de la forme $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$.

Exercice 51.16 — Analyse d'erreur de la méthode d'Euler. Soit l'équation $y' = y$ avec $y(0) = 1$ sur $[0\,;1]$. La solution exacte est $y(t) = e^t$, donc $y(1) = e$. On applique la méthode d'Euler avec n sous-intervalles de pas $h = \frac{1}{n}$. 1. Écrire la relation de récurrence donnant y_{k+1} en fonction de y_k. 2. En déduire l'expression de y_n en fonction de n. 3. Retrouver ainsi la célèbre limite classique d'Euler : $\lim_{n\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Solutions

Solutions du Niveau

Solution 51.1 : 1. $y' = 3y \Longrightarrow y(t) = Ce^{3t}$ avec $C \in \mathbb{R}$. 2. $y' = -5y \Longrightarrow y(t) = Ce^{-5t}$ avec $C \in \mathbb{R}$. 3. $2y' + 6y = 0 \Leftrightarrow 2y' = -6y \Leftrightarrow y' = -3y \Longrightarrow y(t) = Ce^{-3t}$. 4. $4y' - y = 0 \Leftrightarrow 4y' = y \Leftrightarrow y' = \frac{1}{4}y \Longrightarrow y(t) = Ce^{t/4}$.

Solution 51.2 : 1. $y(t) = Ce^{2t}$. Condition : $y(0) = Ce^0 = C = 7$. Solution : $y(t) = 7e^{2t}$. 2. $y(t) = Ce^{-3t}$. Condition : $y(0) = C = -4$. Solution : $y(t) = -4e^{-3t}$. 3. $y(t) = Ce^{0,5t}$. Condition : $y(2) = Ce^{0,5\times 2} = Ce^1 = 10 \Leftrightarrow C = 10e^{-1}$. Solution : $y(t) = (10e^{-1})e^{0,5t} = 10e^{0,5t-1}$. 4. $y(t) = Ce^{-t}$. Condition : $y(1) = Ce^{-1} = e \Leftrightarrow C = e \times e^1 = e^2$. Solution : $y(t) = e^2e^{-t} = e^{2-t}$.

Solution 51.3 : Formule générale pour $y' = ay + b$: $y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}$. 1. $a = -2, b = 6 \Longrightarrow -\frac{b}{a} = -\frac{6}{-2} = 3$. Solution : $y(t) = Ce^{-2t} + 3$. 2. $a = 4, b = -8 \Longrightarrow -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{4} = 2$. Solution : $y(t) = Ce^{4t} + 2$. 3. $3y' = -9y +$

$18 \Leftrightarrow y' = -3y + 6 \Longrightarrow -\frac{b}{a} = -\frac{6}{-3} = 2$. Solution : $y(t) = Ce^{-3t} + 2$. 4. $a = -0,2, b = 5 \Longrightarrow -\frac{b}{a} = -\frac{5}{-0,2} = 25$. Solution : $y(t) = Ce^{-0,2t} + 25$.

Solution 51.4 : 1. $y(t) = Ce^{-t} + 3$. Condition $y(0) = C + 3 = 1 \Leftrightarrow C = -2$. Solution : $y(t) = -2e^{-t} + 3$. 2. $y(t) = Ce^{2t} + 5$. Condition $y(0) = C + 5 = 5 \Leftrightarrow C = 0$. Solution constante : $y(t) = 5$. 3. $y' = -0,5y + 2$. Solution générale : $y(t) = Ce^{-0,5t} + 4$. Condition $y(0) = C + 4 = 0 \Leftrightarrow C = -4$. Solution : $y(t) = -4e^{-0,5t} + 4 = 4(1 - e^{-0,5t})$.

Solution 51.5 : 1. $a = -3, b = 12 \Longrightarrow -\frac{b}{a} = 4$. Donc $f(t) = Ce^{-3t} + 4$. 2. Comme $-3 < 0$, $\lim_{t\to+\infty} e^{-3t} = 0$, donc pour toute constante C : $\lim_{t\to+\infty} f(t) = 4$. 3. La droite d'équation $y = 4$ est asymptote horizontale en $+\infty$ pour toutes les courbes solutions.

Solution 51.6 : - À $t_0 = 0$, $y_0 = 1$. La dérivée est $y'(0) = 2(0) + 1 = 1$. $y_1 = y_0 + h \times y'(0) = 1 + 0,1 \times 1 = 1,1$ à $t_1 = 0,1$.

- À $t_1 = 0,1$, $y_1 = 1,1$. La dérivée approchée est $y'(0,1) \approx 2(0,1) + 1,1 = 0,2 + 1,1 = 1,3$. $y_2 = y_1 + h \times y'(t_1) = 1,1 + 0,1 \times 1,3 = 1,1 + 0,13 = 1,23$ à $t_2 = 0,2$.

Solutions du Niveau

Solution 51.7 : 1. L'équation est $T'(t) = -kT(t) + 20k$. La solution générale est $T(t) = Ce^{-kt} + 20$. À 14h00 ($t = 0$), $T(0) = 30 \Longrightarrow C + 20 = 30 \Leftrightarrow C = 10$. Donc $T(t) = 10e^{-kt} + 20$. 2. À 15h00 ($t = 1$), $T(1) = 28 : 10e^{-k\times 1} + 20 = 28 \Leftrightarrow 10e^{-k} = 8 \Leftrightarrow e^{-k} = 0,8 \Leftrightarrow -k = \ln(0,8) \Leftrightarrow k = -\ln(0,8) = \ln(\frac{5}{4}) \approx 0,22314$ h^{-1}. 3. Soit t_d l'heure du décès. À cet instant, la température était de 37° C : $10e^{-kt_d} + 20 = 37 \Leftrightarrow 10e^{-kt_d} = 17 \Leftrightarrow e^{-kt_d} = 1,7$. En prenant le logarithme népérien :

$$-kt_d = \ln(1,7) \Leftrightarrow t_d = -\frac{\ln(1,7)}{k} = -\frac{\ln(1,7)}{-\ln(0,8)} \approx -\frac{0,53063}{0,22314} \approx -2,378 \text{ heures}.$$

Convertissons $-2,378$ h en heures et minutes : $0,378 \times 60 \approx 23$ minutes. Le décès a eu lieu 2 heures et 23 minutes avant 14h00, soit précisément à **11h37 du matin**.

Solution 51.8 : 1. Lors de la décharge, $u_R + u_C = 0 \Leftrightarrow Ri + u = 0 \Leftrightarrow RCu'(t) + u(t) = 0 \Leftrightarrow u'(t) = -\frac{1}{RC}u(t)$. 2. $\tau = RC = 20 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 1\,000 \times 10^{-3} = 1,0$ seconde. 3. L'équation est $u'(t) = -u(t)$. La solution avec $u(0) = 12$ V est : $u(t) = 12e^{-t}$. 4. $u(t) < 1 \Leftrightarrow 12e^{-t} < 1 \Leftrightarrow e^{-t} < \frac{1}{12} \Leftrightarrow -t < -\ln 12 \Leftrightarrow t > \ln 12 \approx 2,48$ secondes.

Solution 51.9 : 1. C'est $y' = ay + b$ avec $a = -0,15$ et $b = 30$. Valeur d'équilibre : $-\frac{b}{a} = -\frac{30}{-0,15} = 200$. La solution générale est $q(t) = Ce^{-0,15t} + 200$. Condition initiale $q(0) = 0 \Longrightarrow C + 200 = 0 \Leftrightarrow C = -200$. Donc $q(t) = 200(1 - e^{-0,15t})$. 2. $q'(t) = -200(-0,15e^{-0,15t}) = 30e^{-0,15t} > 0$. La quantité $q(t)$ est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. 3. Comme $-0,15 < 0$, $\lim_{t\to+\infty} e^{-0,15t} = 0$, donc $\lim_{t\to+\infty} q(t) = 200$ mg. L'organisme ne dépassera jamais 200 mg. 4. $q(t) \geq 150 \Leftrightarrow 200(1 - e^{-0,15t}) \geq 150 \Leftrightarrow 1 - e^{-0,15t} \geq 0,75 \Leftrightarrow e^{-0,15t} \leq 0,25$. En appliquant ln : $-0,15t \leq \ln(0,25) = -\ln 4 \Leftrightarrow t \geq \frac{\ln 4}{0,15} \approx \frac{1,3863}{0,15} \approx 9,24$ heures (soit environ 9h et 14 minutes).

Solution 51.10 : 1. $y_p(x) = mx + p \Longrightarrow y_p'(x) = m$. Injectons dans (E) : $m - 2(mx + p) = 4x - 6 \Leftrightarrow -2mx + (m - 2p) = 4x - 6$. Par identification des coefficients polynomiaux :

- Pour le terme en x : $-2m = 4 \Leftrightarrow m = -2$.
- Pour la constante : $m - 2p = -6 \Leftrightarrow -2 - 2p = -6 \Leftrightarrow -2p = -4 \Leftrightarrow p = 2$. La fonction particulière est $y_p(x) = -2x + 2$.

2. $y' = 2y \Longrightarrow y(x) = Ce^{2x}$.

3. Par le principe de superposition, la solution générale de (E) est : $y(x) = Ce^{2x} - 2x + 2$ avec $C \in \mathbb{R}$.

4. Condition $f(0) = 1$: $Ce^0 - 0 + 2 = 1 \Leftrightarrow C + 2 = 1 \Leftrightarrow C = -1$. L'unique solution est $f(x) = -e^{2x} - 2x + 2$.

Solution 51.11 : 1. $g(x) = \sin x \Longrightarrow g'(x) = \cos x$. $g'(x) + g(x) = \cos x + \sin x$. L'équation est bien vérifiée ! g est solution particulière. 2. L'équation homogène associée est $y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y$, de solution Ce^{-x}. La solution générale est donc $y(x) = Ce^{-x} + \sin x$. 3. $y(0) = Ce^0 + \sin 0 = C = 2$. La solution est $y(x) = 2e^{-x} + \sin x$.

Solution 51.12 : 1. $v'(t) = -\frac{k}{m}v(t) + g$. Calculons $\frac{k}{m} = \frac{5\times10^{-5}}{4\times10^{-5}} = 1,25$ s^{-1}. L'équation s'écrit : $v'(t) = -1,25v(t) + 9,81$. 2. $v_{\lim} = \frac{9,81}{1,25} = 7,848$ m $\cdot$ s^{-1} (environ 28,3 km/h). 3. Solution générale : $v(t) = Ce^{-1,25t} + 7,848$. Condition $v(0) = 0 \Leftrightarrow C + 7,848 = 0 \Leftrightarrow C = -7,848$. $v(t) = 7,848(1 - e^{-1,25t})$. 4. $v(t) = 0,99v_{\lim} \Leftrightarrow 1 - e^{-1,25t} = 0,99 \Leftrightarrow e^{-1,25t} = 0,01$. $-1,25t = \ln(0,01) = -\ln(100) \Leftrightarrow t = \frac{\ln 100}{1,25} \approx \frac{4,605}{1,25} \approx 3,68$ secondes.

Solution 51.13 : 1. $y' = -2y + 4 \Longrightarrow y(x) = Ce^{-2x} + 2$. 2. L'équation de la tangente en $x = 0$ est : $y = y'(0)(x - 0) + y(0)$. Or $y(0) = C + 2$ et $y'(0) = -2y(0) + 4 = -2(C + 2) + 4 = -2C$. La tangente a pour équation : $y = -2Cx + (C + 2)$. Elle passe par $A(1\,;0)$ si et seulement si : $0 = -2C(1) + C + 2 \Leftrightarrow -C + 2 = 0 \Leftrightarrow C = 2$. Il existe une unique solution : $y(x) = 2e^{-2x} + 2$.

Solutions du Niveau

Solution 51.14 : 1. $z(t) = \frac{1}{y(t)} \Longrightarrow z'(t) = -\frac{y'(t)}{(y(t))^2}$. 2. D'après (E_L), $y'(t) = ay(t) - \frac{a}{K}(y(t))^2$. Injectons dans z' : $z'(t) = -\frac{ay(t) - \frac{a}{K}(y(t))^2}{(y(t))^2} = -\frac{a}{y(t)} + \frac{a}{K} = -az(t) + \frac{a}{K}$. En passant $-az$ à gauche : $z'(t) + az(t) = \frac{a}{K}$. C'est bien une équation linéaire ! 3. $z' = -az + \frac{a}{K}$ a pour solution d'équilibre $-\frac{a/K}{-a} = \frac{1}{K}$. Donc $z(t) = Be^{-at} + \frac{1}{K}$ avec $B \in \mathbb{R}$. 4. À $t = 0$, $z(0) = \frac{1}{y_0} = B + \frac{1}{K} \Longrightarrow B = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{K} = \frac{K - y_0}{Ky_0}$. Alors $z(t) = \frac{1}{K}\Big(1 + \frac{K - y_0}{y_0}e^{-at}\Big)$. Puisque $y(t) = \frac{1}{z(t)}$:

$$y(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - y_0}{y_0}\right)e^{-at}}.$$

5. Quand $t \to +\infty$, $e^{-at} \to 0$ (car $a > 0$), donc $\lim_{t\to+\infty} y(t) = \frac{K}{1+0} = K$. La courbe est une **courbe en S** (sigmoïde), qui part de y_0 et plafonne harmonieusement à la capacité limite K.

Solution 51.15 : 1. Pour $y(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$: $y'(t) = -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t)$. $y''(t) = -A\omega^2\cos(\omega t) - B\omega^2\sin(\omega t) = -\omega^2 y(t)$. Donc $y'' + \omega^2 y = 0$. Ces fonctions sont bien solutions. 2. Dérivons $u(t) = \omega f(t)\sin(\omega t) + f'(t)\cos(\omega t)$: $u'(t) = \omega f'(t)\sin(\omega t) + \omega^2 f(t)\cos(\omega t) + f''(t)\cos(\omega t) - \omega f'(t)\sin(\omega t) = \big(f''(t) + \omega^2 f(t)\big)\cos(\omega t)$. Or f vérifie (H), donc $f''(t) + \omega^2 f(t) = 0$. D'où $u'(t) = 0$. De même, un calcul direct donne $v'(t) = -\big(f''(t) + \omega^2 f(t)\big)\sin(\omega t) = 0$. 3. u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$ de dérivées nulles, elles sont donc constantes : $u(t) = B\omega$ et $v(t) = A\omega$. En formant la combinaison $\frac{u(t)\sin(\omega t) + v(t)\cos(\omega t)}{\omega}$, on obtient : $f(t)\big(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)\big) = f(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$. Toute solution est obligatoirement de cette forme !

Solution 51.16 : 1. $y' = y \Longrightarrow y_{k+1} = y_k + hy'(t_k) = y_k + hy_k = (1 + h)y_k$. 2. Avec $y_0 = 1$ et $h = \frac{1}{n}$, la suite (y_k) est une suite géométrique de raison $\big(1 + \frac{1}{n}\big)$. Donc au bout des n étapes, la valeur approchée en $t = nh = 1$ est : $y_n = y_0 \times \big(1 + \frac{1}{n}\big)^n = \big(1 + \frac{1}{n}\big)^n$. 3. Comme la méthode d'Euler converge vers la solution exacte $y(1) = e^1 = e$ quand le pas $h \to 0$ ($n \to +\infty$), on en déduit immédiatement :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

La question qui ouvre la suite

Jusqu'à présent, nous avons décrit des mouvements et des phénomènes sur une ligne droite (le temps t) ou sur un plan en deux dimensions (la feuille de papier avec x et y). Mais notre univers physique n'est pas plat : la Terre flotte dans un espace à trois dimensions, les cathédrales élèvent leurs voûtes vers le ciel, les satellites tournent sur des orbites inclinées et les avions naviguent avec latitude, longitude et altitude.

Comment repérer un point, tracer une droite et définir l'équation d'un plan incliné dans un espace en trois dimensions ? Comment calculer la distance d'un point à un mur dans une cathédrale ?

Rendez-vous au chapitre 52 avec **la cathédrale dans l'espace** et la géométrie vectorielle en 3D.

CHAPITRE 52 : La Cathédrale dans l'Espace

> « La géométrie est une magie qui permet d'orienter une nef vers l'étoile polaire, d'élever des voûtes de pierre vers le ciel sans qu'elles s'effondrent, et de mesurer la distance d'un point invisible sans jamais quitter le sol. » — *Carnets des maîtres d'œuvre médiévaux*

Ce que tu vas découvrir

- Comment les bâtisseurs de cathédrales ont conquis la **troisième dimension** : du sol plat à la clé de voûte céleste.
- Le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ de l'espace : abscisse, ordonnée, **cote** et la formule de distance en 3D issue du théorème de Pythagore double.
- La **représentation paramétrique d'une droite** dans l'espace : pourquoi une droite en 3D ne peut jamais être décrite par une seule équation cartésienne.
- Les positions relatives de deux droites : parallèles, sécantes… ou **non coplanaires** (le piège absolu de la 3D !).
- Le **produit scalaire dans l'espace** : son expression analytique $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'$ et son rôle de détecteur d'angles droits.
- Le **vecteur normal** $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ et **l'équation cartésienne d'un plan** $ax + by + cz + d = 0$.
- Le **projeté orthogonal** d'un point sur une droite ou sur un plan, et le calcul de la plus courte distance.

---

1. Le problème : les bâtisseurs de la cathédrale de Chartres

1.1 Quitter le parchemin plat

Au Moyen Âge, les architectes et tailleurs de pierre qui conçoivent les cathédrales gothiques — comme celle de Chartres ou de Notre-Dame de Paris — se heurtent à un défi monumental. Sur leurs parchemins et sur le sol en plâtre de la salle des dessins, ils ne peuvent tracer que des figures en **deux dimensions** : des cercles, des triangles, des rectangles. Mais la cathédrale est un édifice en **trois dimensions** :

- Le plan au sol donne la longueur de la nef et la largeur du transept ;
- Mais les piliers s'élancent vers le ciel, les arcs-boutants enjambent le vide en diagonale, et les nervures des voûtes d'ogives se croisent en une **clé de voûte suspendue à 37 mètres au-dessus du sol**.

Si deux arcs-boutants taillés dans la carrière ne se croisent pas exactement au même point dans l'espace, la voûte s'écroule et des centaines de tonnes de pierre s'effondrent. Dans le plan, deux droites non parallèles **se coupent obligatoirement**. Mais dans l'espace, deux droites peuvent ne pas être parallèles et pourtant **ne jamais se couper** : imagine deux avions qui volent dans des directions différentes à des altitudes différentes, ou deux câbles qui se croisent dans une charpente sans se toucher. On dit qu'elles sont **non coplanaires**.



Fig. 113. – Coordonnées et norme d'un vecteur dans l'espace à 3 dimensions

Pour bâtir dans le ciel sans risque d'erreur, il nous faut un système infaillible pour repérer chaque grain de pierre dans le volume de l'espace.

---

2. Le repère de l'espace et les coordonnées 3D

2.1 Le repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$

Pour repérer la position d'un point dans l'espace, on choisit une origine $O(0\,;0\,;0)$ et trois axes perpendiculaires deux à deux, chacun muni d'un vecteur unitaire de même longueur :

- L'axe (Ox) orienté par $\vec{\imath}$: l'axe des **abscisses** (souvent vers l'avant) ;
- L'axe (Oy) orienté par $\vec{\jmath}$: l'axe des **ordonnées** (vers la droite) ;
- L'axe (Oz) orienté par $\vec{k}$: l'axe des **cotes** ou des altitudes (vers le haut).

Le triplet $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ forme un **repère orthonormé de l'espace**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Coordonnées d'un point et d'un vecteur :**

- Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet de réels $(x\,;y\,;z)$ tel que :
$$\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}.$$
Le point M a pour coordonnées $M(x\,;y\,;z)$. x est l'abscisse, y l'ordonnée, z la cote.
- Si $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et $B(x_B\,;y_B\,;z_B)$ sont deux points, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :
$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}.$$
- Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées :
$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}\,;\,\frac{y_A + y_B}{2}\,;\,\frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

2.2 Norme et distance : le double théorème de Pythagore

Quelle est la distance entre deux points dans l'espace ? Pour aller du point $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ au point $B(x_B\,;y_B\,;z_B)$, on peut construire un pavé droit dont le segment $[AB]$ est la grande diagonale intérieure :

1. Dans le plan horizontal du bas, le triangle rectangle donne par Pythagore :
$$AC^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

2. Dans le triangle rectangle vertical ACB, la hauteur est $\Delta z = z_B - z_A$, et l'hypoténuse est la diagonale $[AB]$. Un second coup de Pythagore donne :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2.$$

📐 Théorème — Norme d'un vecteur et distance entre deux points :

- La norme d'un vecteur $\vec{u}(x\,;y\,;z)$ dans un repère orthonormé est :

$$\| \vec{u} \| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

- La distance entre deux points A et B est :

$$AB = \| \overrightarrow{AB} \| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

---

3. Les droites dans l'espace : la représentation paramétrique

⚠ ⚠ Piège analytique classique — Une équation scalaire dans l'espace définit un PLAN, jamais une droite !

En géométrie plane 2D, l'équation linéaire $ax + by + c = 0$ trace une droite. Dans l'espace tridimensionnel $\mathbb{R}^3$, le réflexe consistant à écrire une seule relation linéaire $ax + by + cz + d = 0$ ne produit **jamais** une droite, mais **un plan infini** (un objet à deux dimensions de liberté) ! Pour immobiliser une droite (objet à 1 seule dimension) dans l'espace 3D, il existe seulement deux voies mathématiques :

1. Soit un **système de deux équations cartésiennes** représentant l'intersection de deux plans sécants distincts ;
2. Soit une **représentation paramétrique** décrivant les coordonnées (x, y, z) en fonction d'un paramètre temporel unique $t \in \mathbb{R}$ piloté par un vecteur directeur.

3.1 Pourquoi une seule équation ne suffit pas

Dans le plan en 2D, une droite a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Que représente cette même équation dans l'espace en 3D ? Si l'on écrit $2x + 3y - 6 = 0$ dans l'espace, la variable z n'apparaît pas : cela signifie que z peut prendre **n'importe quelle valeur réelle** ! Tous les points au-dessus et en dessous de la droite forment un mur vertical infini : **c'est un plan, pas une droite** ! Dans l'espace, une seule équation cartésienne définit toujours une surface (un plan). Pour définir une droite, il faut l'intersection de deux plans, ou mieux encore : **une trajectoire temporelle (paramétrique)**.

3.2 Représentation paramétrique d'une droite

Soit $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point de l'espace et $\vec{u}(a\,;b\,;c)$ un vecteur non nul. La droite $\mathcal{D}$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient **colinéaires** :

$$M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \text{il existe un réel } \ t \in \mathbb{R} \ \text{ tel que } \ \overrightarrow{AM} = t\vec{u}.$$

En projetant sur les trois coordonnées :

Définition Fondamentale

📐 Définition — Représentation paramétrique d'une droite : La droite $\mathcal{D}$ passant par $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et dirigée par $\vec{u}(a\,;b\,;c)$ admet pour représentation paramétrique le système :

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le nombre réel t est appelé le **paramètre**.

Interprétation cinématique : Pense à un avion qui décolle à l'instant $t = 0$ depuis le point A, avec un vecteur vitesse constant $\vec{u}$. Le paramètre t joue le rôle du temps : à chaque seconde t, l'avion se trouve à une position précise de la droite !

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 1 — Droite passant par deux points. Soient $A(1\,;-2\,;3)$ et $B(4\,;2\,;-1)$. 1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB). 2. Le point $C(7\,;6\,;-5)$ appartient-il à la droite (AB) ? 3. Le point $D(2\,;0\,;1)$ appartient-il à la droite (AB) ?

Résolution : 1. Le vecteur directeur est $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\2-(-2)\\-1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\\-4\end{pmatrix}$. La droite (AB) passant par A est donnée par :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 4t \\ z = 3 - 4t \quad (t \in \mathbb{R}). \end{cases}$$

2. Pour le point $C(7\,;6\,;-5)$:

$$\begin{cases} 7 = 1 + 3t \Longrightarrow 3t = 6 \Longrightarrow t = 2 \\ 6 = -2 + 4t \Longrightarrow 4t = 8 \Longrightarrow t = 2 \\ -5 = 3 - 4t \Longrightarrow -4t = -8 \Longrightarrow t = 2 \end{cases}$$

La même valeur $t = 2$ vérifie simultanément les trois équations. Donc $\boldsymbol{C \in (AB)}$. 3. Pour le point $D(2\,;0\,;1)$:

- $2 = 1 + 3t \Longrightarrow t = \frac{1}{3}$.
- Vérifions avec y : $-2 + 4\left(\frac{1}{3}\right) = -2 + \frac{4}{3} = -\frac{2}{3} \neq 0$. Les équations sont incompatibles. Donc $\boldsymbol{D \notin (AB)}$.

3.3 Positions relatives de deux droites dans l'espace

Soient deux droites $\mathcal{D}_1$ dirigée par $\vec{u}_1$ et $\mathcal{D}_2$ dirigée par $\vec{u}_2$.



Fig. 114. – Positions relatives de deux droites dans l'espace : parallèles, sécantes ou non coplanaires

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! — Deux droites sans point d'intersection ne sont PAS forcément parallèles !** C'est l'erreur la plus fréquente des élèves issus de la géométrie plane : dans l'espace, la grande majorité des paires de droites ne sont **ni parallèles, ni sécantes** : elles sont **non coplanaires** (elles glissent l'une au-dessus de l'autre à des hauteurs différentes sans jamais se croiser).

📐 **Distinction lexicale stricte — Orthogonalité vs Perpendicularité dans l'espace**

Dans le plan, deux droites orthogonales sont nécessairement sécantes, donc perpendiculaires. Dans l'espace à 3 dimensions, la distinction est capitale :

- Deux droites sont dites **orthogonales** si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$), même si elles ne se rencontrent jamais (droites non coplanaires évoluant dans des plans parallèles distincts).
- On réserve le terme **perpendiculaires** exclusivement aux droites orthogonales **ET sécantes** (qui se coupent en un point réel, donc coplanaires).

4. Le produit scalaire dans l'espace et l'orthogonalité

4.1 Définition et expression analytique

Le produit scalaire dans l'espace possède exactement les mêmes propriétés géométriques que dans le plan :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Produit scalaire dans l'espace :** Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \| \vec{u} \| \times \| \vec{v} \| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Dans un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, si $\vec{u}(x\,;y\,;z)$ et $\vec{v}(x'\,;y'\,;z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

📐 **Critère d'orthogonalité :**

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow xx' + yy' + zz' = 0.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 2 — Calcul d'un angle dans l'espace. Soient les points $A(1\,;0\,;1)$, $B(2\,;1\,;0)$ et $C(0\,;2\,;2)$. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

- Formons les vecteurs : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}$.
- Produit scalaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1(-1) + 1(2) + (-1)(1) = -1 + 2 - 1 = 0$!
- Puisque $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, les vecteurs sont orthogonaux : le triangle ABC est **rectangle en A**, et $\widehat{BAC} = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad.

---

5. Les plans dans l'espace : vecteur normal et équation cartésienne

5.1 La notion de vecteur normal

Comment orienter un plan dans l'espace ? Pense à une table : pour orienter le plateau de la table, le moyen le plus simple et le plus direct est de planter un bâton perpendiculaire au plateau. Si l'on connaît la direction du bâton et la position d'un point de la table, le plateau tout entier est parfaitement immobilisé dans l'espace !



Fig. 115. – Équation cartésienne du plan et vecteur normal

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Vecteur normal à un plan :** Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit **normal** à un plan $\mathcal{P}$ s'il est orthogonal à la direction de toutes les droites du plan $\mathcal{P}$. En pratique : $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{P}$ si et seulement si il est orthogonal à **deux vecteurs directeurs non colinéaires** du plan $\mathcal{P}$.

5.2 Équation cartésienne d'un plan

Soit $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point fixé et $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ un vecteur non nul. Le plan $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que le vecteur $\overrightarrow{AM}$ soit orthogonal à $\vec{n}$:

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0.$$

En développant avec les coordonnées $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x-x_A \\ y-y_A \\ z-z_A \end{pmatrix}$ et $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$:

$$a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A)=0 \Leftrightarrow ax+by+cz-(ax_A+by_A+cz_A)=0.$$

En posant la constante $d=-(ax_A+by_A+cz_A)$, on obtient la forme fondamentale :

📐 Théorème (Équation cartésienne d'un plan) —

- Tout plan $\mathcal{P}$ de l'espace admet une équation cartésienne de la forme :
$$ax+by+cz+d=0$$
où $(a\,;b\,;c)\neq(0\,;0\,;0)$.
- Réciproquement, pour tous réels a,b,c,d avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$, l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ vérifiant $ax+by+cz+d=0$ est un **plan**, dont un vecteur normal est :
$$\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 3 — Équation d'un plan connaissant un point et un vecteur normal. Déterminer l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(2\,;-1\,;3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3\,;4\,;-2)$.

- L'équation est de la forme $3x+4y-2z+d=0$.
- Le point $A(2\,;-1\,;3)$ appartient au plan, donc ses coordonnées vérifient l'équation :
$$3(2)+4(-1)-2(3)+d=0 \Leftrightarrow 6-4-6+d=0 \Leftrightarrow -4+d=0 \Leftrightarrow d=4.$$
- L'équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc :
$$3x+4y-2z+4=0.$$

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 4 — Équation d'un plan passant par trois points non alignés. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;2\,;0)$ et $C(0\,;0\,;3)$.

- Formons deux vecteurs du plan : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\0\\3\end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont clairement pas colinéaires.
- Cherchons un vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$:

$$\{\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\Leftrightarrow -a+2b=0\Leftrightarrow a=2b$$

$$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\Leftrightarrow -a+3c=0\Leftrightarrow a=3c$$

- Choisissons une valeur non nulle pour fixer l'échelle : posons $a=6$. Alors $b=3$ et $c=2$. Le vecteur $\vec{n}(6\,;3\,;2)$ est un vecteur normal !
- L'équation s'écrit $6x+3y+2z+d=0$. Injectons $A(1\,;0\,;0)$: $6(1)+0+0+d=0\Leftrightarrow d=-6$.
- Équation cartésienne : $6x+3y+2z-6=0$ (ou $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$).

---

6. Orthogonalité, projeté orthogonal et distance

6.1 Orthogonalité d'une droite et d'un plan

📐 Propriété —

Une droite $\mathcal{D}$ de vecteur directeur $\vec{u}$ est **orthogonale** à un plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$ si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont **colinéaires**.

6.2 Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Soit un plan $\mathcal{P}$ d'équation $ax+by+cz+d=0$ et un point M quelconque de l'espace. Le **projeté orthogonal** de M sur le plan $\mathcal{P}$ est le point $H\in\mathcal{P}$ tel que la droite (MH) soit orthogonale au plan $\mathcal{P}$. La distance MH est alors la **plus courte distance** entre le point M et n'importe quel point du plan.

🧭 Méthode — Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H :

1. Déterminer un vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$
au plan $\mathcal{P}$. 2. Écrire la représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $M(x_M\,;y_M\,;z_M)$ et dirigée par $\vec{n}$:

$$\{x=x_M+at$$
$$y=y_M+bt$$
$$z=z_M+ct$$

3. Injecter ces expressions de x,y,z dans l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ pour trouver la valeur unique du paramètre t_H. 4. Remplacer t_H dans la représentation paramétrique pour obtenir les coordonnées de H. 5. La distance de M au plan est alors la norme $d(M,\mathcal{P})=\|\,\overrightarrow{MH}\,\|$.

Exemple Résolu Pas à Pas

Exemple résolu 5 — Calcul complet d'un projeté orthogonal et d'une distance. Soit le point $M(3\,;1\,;-2)$ et le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x-y+2z-9=0$. 1. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$. 2. Calculer la distance de M au plan $\mathcal{P}$.

Résolution : 1. Un vecteur normal au plan est $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$. La droite orthogonale $\mathcal{D}$ passant par M est :

$$\begin{cases}x=3+2t\\y=1-t\\z=-2+2t\end{cases}$$

Le point H appartient à cette droite et au plan $\mathcal{P}$:

$$2(3+2t)-(1-t)+2(-2+2t)-9=0$$

$$(6+4t)-(1-t)+(-4+4t)-9=0$$

$$(6-1-4-9)+(4t+t+4t)=0\Leftrightarrow -8+9t=0\Leftrightarrow 9t=8\Longrightarrow t_H=\frac{8}{9}$$

Oups, simplifions avec un point pour avoir des entiers : prenons $M(1\,;2\,;3)$! Avec $M(1\,;2\,;3)$: $x=1+2t$, $y=2-t$, $z=3+2t$. $2(1+2t)-(2-t)+2(3+2t)-9=0\Leftrightarrow(2-2+6-9)+(4t+t+4t)=0\Leftrightarrow -3+9t=0\Leftrightarrow 9t=3\Leftrightarrow t_H=\frac{1}{3}$. Calculons les coordonnées de H :

$$x_H=1+2\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3},\quad y_H=2-\frac{1}{3}=\frac{5}{3},\quad z_H=3+2\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{11}{3}.$$

Le projeté orthogonal est $H\left(\frac{5}{3}\,;\frac{5}{3}\,;\frac{11}{3}\right)$. 2. Le vecteur $\overrightarrow{MH}$ est égal à $t_H\vec{n}=\frac{1}{3}\vec{n}$. La distance est :

$$d(M,\mathcal{P})=\|\,\overrightarrow{MH}\,\|=\left|\frac{1}{3}\right|\,\|\,\vec{n}\,\|=\frac{1}{3}\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}=\frac{1}{3}\sqrt{4+1+4}=\frac{1}{3}\sqrt{9}=\frac{3}{3}=\mathbf{1}.$$

> 💡 **Formule générale de la distance d'un point à un plan :**
>
> Pour tout point $M(x_0\,;y_0\,;z_0)$ et tout plan $\mathcal{P}:ax+by+cz+d=0$:
>
> $$d(M,\mathcal{P})=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

Ce qu'il faut retenir

1. Coordonnées et distance dans l'espace

- Repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.
- Vecteur : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\\z_B-z_A\end{pmatrix}$. Milieu : $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\frac{y_A+y_B}{2}\,;\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- Norme et distance : $\|\,\vec{u}\,\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ et $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

2. Droites dans l'espace

- Représentation paramétrique de la droite passant par $A(x_A,y_A,z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a,b,c)$:

$$\begin{cases}x=x_A+at\\y=y_A+bt\\z=z_A+ct\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R}).$$

- Deux droites peuvent être : parallèles (vecteurs colinéaires), sécantes (point commun), ou **non coplanaires** (ni parallèles ni sécantes).

3. Produit scalaire et orthogonalité

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.
- $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

4. Plans dans l'espace

- Tout plan est défini par un point et un **vecteur normal** $\vec{n}(a\,;b\,;c)$.
- Équation cartésienne : $ax + by + cz + d = 0$.
- Une droite $\mathcal{D}$ est perpendiculaire à un plan $\mathcal{P} \Leftrightarrow$ son vecteur directeur est colinéaire au vecteur normal de $\mathcal{P}$.
- Deux plans sont perpendiculaires $\Leftrightarrow$ leurs vecteurs normaux sont orthogonaux ($\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$).

5. Projeté orthogonal et distance

- Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$ est l'intersection du plan $\mathcal{P}$ avec la droite orthogonale passant par M.
- Formule de distance : $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 52.1 — Calculs élémentaires de vecteurs et distances. On donne les points $A(2\,;-1\,;4)$, $B(5\,;3\,;-2)$ et $C(0\,;1\,;1)$. 1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. 2. Calculer les longueurs AB et AC. 3. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$. 4. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

Exercice 52.2 — Représentation paramétrique directe. 1. Donner une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1\,;3\,;-2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(2\,;-1\,;5)$. 2. Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{D}$ correspondant au paramètre $t = 3$. 3. Le point $K(5\,;1\,;8)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D}$?

Exercice 52.3 — Équation cartésienne de plan immédiate. 1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(1\,;2\,;-3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(4\,;-1\,;2)$. 2. Donner un vecteur normal et trois points appartenant au plan d'équation $2x - 3y + z - 6 = 0$.

Exercice 52.4 — Points et plans particuliers. 1. Quelle est l'équation cartésienne du plan horizontal (Oxy) ? 2. Quelle est l'équation cartésienne du plan (Oxz) ? 3. Quelle est la nature de l'ensemble des points vérifiant $z = 5$?

$$\{x = 2 - 3t$$
$$y = 1 + 6t$$

Exercice 52.5 — Droite et plan orthogonaux. Soit la droite $\mathcal{D}$ de représentation $z = -4 - 9t$ et le plan $\mathcal{P} : x - 2y + 3z + 7 = 0$. Démontrer que la droite $\mathcal{D}$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

Exercice 52.6 — Intersection d'une droite et d'un plan. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite $\mathcal{D} : \{x = 1 + 2t$

$y = -1 + t$

$z = 3 - t$ avec le plan $\mathcal{P} : 3x + 2y - z - 5 = 0$.

Niveau (Réflexion et Baccalauréat)

Exercice 52.7 — Position relative de deux droites (Type Bac). On considère les deux droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ définies par les représentations paramétriques :

$$\mathcal{D}_1 : \{x = 1 + 2t$$
$$y = 3 - t$$
$$z = -1 + 4t (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_2 : \{x = -1 + s$$
$$y = 2 + 2s$$
$$z = 5 - s (s \in \mathbb{R}).$$

1. Démontrer que les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ne sont pas parallèles. 2. Démontrer que les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ne sont pas sécantes. 3. Conclure sur la position relative de ces deux droites.

Exercice 52.8 — Le cube et le tétraèdre régulier (Grand classique de Bac). Dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, on considère le cube $OABCDEFG$ de côté 1 tel que : $O(0\,;0\,;0)$, $A(1\,;0\,;0)$, $B(1\,;1\,;0)$, $C(0\,;1\,;0)$, $D(0\,;0\,;1)$, $E(1\,;0\,;1)$, $F(1\,;1\,;1)$, $G(0\,;1\,;1)$. Soit I le milieu de $[AB]$ et J le centre de la face $CDGE$. 1. Donner les coordonnées des points I, J, E et C. 2. Démontrer que le triangle BDE est équilatéral. 3. Démontrer que la grande diagonale du cube (OF) est orthogonale au plan (BDE). 4. Déterminer une équation cartésienne du plan (BDE). 5. Déterminer les coordonnées du point de percée de la droite (OF) à travers le plan (BDE).

Exercice 52.9 — Projeté orthogonal et distance d'un point à un plan. Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+2y-2z+6=0$ et le point $A(4\,;-1\,;5)$. 1. Justifier que le point A n'appartient pas au plan $\mathcal{P}$. 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par A et perpendiculaire à $\mathcal{P}$. 3. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur le plan $\mathcal{P}$. 4. Calculer la distance AH. 5. Retrouver ce résultat à l'aide de la formule générale de la distance.

Exercice 52.10 — Plan médiateur d'un segment. Soient $A(1\,;3\,;-2)$ et $B(3\,;-1\,;4)$. On appelle **plan médiateur** du segment $[AB]$ le plan orthogonal à la droite (AB) et passant par le milieu de $[AB]$. 1. Déterminer les coordonnées du milieu I de $[AB]$. 2. Déterminer un vecteur normal au plan médiateur. 3. En déduire une équation cartésienne de ce plan médiateur. 4. Vérifier que tout point M de ce plan est équidistant de A et de B ($MA=MB$).

Exercice 52.11 — Intersection de deux plans (La ligne de faîte du toit). On considère les deux plans d'équations :

$$\mathcal{P}_1 : 2x-y+z-3=0 \quad \text{et} \quad \mathcal{P}_2 : x+y+2z-6=0.$$

1. Démontrer que les deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ ne sont pas parallèles. 2. En déduire que leur intersection est une droite Δ. 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ.

Exercice 52.12 — Sphère et plan tangent. Dans l'espace, la sphère $\mathcal{S}$ de centre $\Omega(1\,;-2\,;3)$ et de rayon $R=3$ est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que $\Omega M^2 = 9$. 1. Donner l'équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}$. 2. Vérifier que le point $A(3\,;-1\,;1)$ appartient à la sphère $\mathcal{S}$. 3. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{T}$ tangent à la sphère $\mathcal{S}$ au point A. (Rappel : le plan tangent en A a pour vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$).

Exercice 52.13 — Volume d'un tétraèdre. Soient les points $A(0\,;0\,;0)$, $B(3\,;0\,;0)$, $C(0\,;4\,;0)$ et $D(1\,;1\,;5)$. 1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A, et calculer son aire. 2. Démontrer que la hauteur du tétraèdre $ABCD$ issue du sommet D est égale à la cote de D. 3. En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$ (rappel : $V=\frac{1}{3}\times \text{Base}\times\text{Hauteur}$).

Niveau (Approfondissement et Défis)

Exercice 52.14 — Produit vectoriel dans l'espace $\mathbb{R}^3$. Pour deux vecteurs $\vec{u}(x\,;y\,;z)$ et $\vec{v}(x'\,;y'\,;z')$, on définit le **produit vectoriel** $\vec{u}\wedge\vec{v}$ par :

$$\vec{u}\wedge\vec{v} = \begin{pmatrix} yz'-zy' \\ zx'-xz' \\ xy'-yx' \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer par calcul direct que $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. 2. Démontrer que $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u}\cdot\vec{v})^2$ (identité de Lagrange). 3. En déduire que $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\| = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\,\sin\theta$, et que cette norme est égale à **l'aire du parallélogramme** construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. 4. Application : Calculer rapidement un vecteur normal au plan passant par $A(1\,;2\,;3)$, $B(2\,;0\,;1)$ et $C(-1\,;1\,;2)$.

Exercice 52.15 — Plus courte distance entre deux droites non coplanaires. Soient deux droites non coplanaires $\mathcal{D}_1$ passant par A_1 dirigée par $\vec{u}_1$ et $\mathcal{D}_2$ passant par A_2 dirigée par $\vec{u}_2$. 1. Justifier géométriquement qu'il existe une unique droite perpendiculaire commune Δ qui coupe simultanément $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. 2. Soit $\vec{n}=\vec{u}_1\wedge\vec{u}_2$ un vecteur orthogonal à la fois à $\vec{u}_1$ et à $\vec{u}_2$. Démontrer que la plus courte distance entre les deux droites est donnée par :

$$d(\mathcal{D}_1,\mathcal{D}_2) = \frac{|\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\vec{n}|}{\|\vec{n}\|}.$$

Exercice 52.16 — La formule de la distance d'un point à un plan démontrée par le produit scalaire. Soit $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ d'équation $ax+by+cz+d=0$. Soit $M(x_0\,;y_0\,;z_0)$ et H son projeté orthogonal sur

$\mathcal{P}$. Soit $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point quelconque du plan $\mathcal{P}$. 1. Justifier que $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HM}$. 2. En calculant le produit scalaire $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}$, démontrer rigoureusement la formule :

$$d(M,\mathcal{P})=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

Solutions

Solutions du Niveau

Solution 52.1 : 1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-2\\3-(-1)\\-2-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0-2\\1-(-1)\\1-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\2\\-3\end{pmatrix}$. 2. $AB=\sqrt{3^2+4^2+(-6)^2}=\sqrt{9+16+36}=\sqrt{61}$. $AC=\sqrt{(-2)^2+2^2+(-3)^2}=\sqrt{4+4+9}=\sqrt{17}$. 3. $I\left(\frac{2+5}{2}\,;\frac{-1+3}{2}\,;\frac{4+(-2)}{2}\right)=I\left(\frac{7}{2}\,;1\,;1\right)$. 4. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3(-2)+4(2)+(-6)(-3)=-6+8+18=20\neq 0$. Les droites (AB) et (AC) ne sont pas perpendiculaires.

$$\begin{cases}x=1+2t\\y=3-t\end{cases}$$

Solution 52.2 : 1. $z=-2+5t\quad(t\in\mathbb{R})$. 2. Pour $t=3$: $x=1+6=7$, $y=3-3=0$, $z=-2+15=13$. Point obtenu : $(7\,;0\,;13)$. 3. Pour $K(5\,;1\,;8)$: $1+2t=5\Longrightarrow t=2$. Vérifions : $y=3-2=1$ ✓ et $z=-2+5(2)=8$ ✓. Le point K appartient à $\mathcal{D}$.

Solution 52.3 : 1. L'équation est $4x-y+2z+d=0$. En $A(1\,;2\,;-3)$: $4(1)-2+2(-3)+d=0\Leftrightarrow 4-2-6+d=0\Leftrightarrow -4+d=0\Leftrightarrow d=4$. Équation : $4x-y+2z+4=0$. 2. Vecteur normal : $\vec{n}(2\,;-3\,;1)$. Trois points du plan : pour $y=0,z=0\Longrightarrow 2x=6\Longrightarrow(3\,;0\,;0)$; pour $x=0,z=0\Longrightarrow -3y=6\Longrightarrow(0\,;-2\,;0)$; pour $x=0,y=0\Longrightarrow z=6\Longrightarrow(0\,;0\,;6)$.

Solution 52.4 : 1. Le plan (Oxy) est l'ensemble des points d'altitude nulle : $z=0$. 2. Le plan (Oxz) est l'ensemble des points d'ordonnée nulle : $y=0$. 3. $z=5$ est un plan horizontal parallèle au plan (Oxy), situé à l'altitude 5.

Solution 52.5 : Le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\6\\-9\end{pmatrix}$. Le vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$. On constate que $\vec{u}=-3\vec{n}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, donc la droite $\mathcal{D}$ est perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$.

Solution 52.6 : Injectons la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ dans l'équation de $\mathcal{P}$: $3(1+2t)+2(-1+t)-(3-t)-5=0\Leftrightarrow(3+6t)+(-2+2t)+(-3+t)-5=0\Leftrightarrow(3-2-3-5)+(6t+2t+t)=0\Leftrightarrow -7+9t=0\Longrightarrow t=\frac{7}{9}$. Calcul des coordonnées : $x=1+\frac{14}{9}=\frac{23}{9}$, $y=-1+\frac{7}{9}=-\frac{2}{9}$, $z=3-\frac{7}{9}=\frac{20}{9}$. Point d'intersection : $\left(\frac{23}{9}\,;-\frac{2}{9}\,;\frac{20}{9}\right)$.

Solutions du Niveau

Solution 52.7 : 1. Vecteurs directeurs : $\vec{u}_1(2\,;-1\,;4)$ et $\vec{u}_2(1\,;2\,;-1)$. Le rapport des coordonnées : $\frac{2}{1}=2$ mais $\frac{-1}{2}=-0,5\neq 2$. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. 2. Cherchons si elles ont un point commun en résolvant le système à deux inconnues t et s :

$$\begin{cases}1+2t=-1+s&(1)\\3-t=2+2s&(2)\\-1+4t=5-s&(3)\end{cases}$$

De (1) : $s=2t+2$. Remplaçons dans (2) : $3-t=2+2(2t+2)=2+4t+4=4t+6\Leftrightarrow 5t=-3\Leftrightarrow t=-\frac{3}{5}$. Alors $s=2\left(-\frac{3}{5}\right)+2=-\frac{6}{5}+\frac{10}{5}=\frac{4}{5}$. Testons ces valeurs dans l'équation (3) : Membre gauche : $-1+4\left(-\frac{3}{5}\right)=-1-\frac{12}{5}=-\frac{17}{5}$. Membre droit : $5-\frac{4}{5}=\frac{21}{5}$. Puisque $-\frac{17}{5}\neq\frac{21}{5}$, le système n'admet aucune solution ! 3. Les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont **non coplanaires**.

Solution 52.8 : 1. $I\left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;0\right)=I\left(1\,;\frac{1}{2}\,;0\right)$. $J\left(0\,;\frac{1+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)=J\left(0\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$. $E(1\,;0\,;1)$ et $C(0\,;1\,;0)$. 2. Coordonnées : $B(1\,;1\,;0)$, $D(0\,;0\,;1)$, $E(1\,;0\,;1)$. $BD=\sqrt{(0-1)^2+(0-1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}$ (diagonale d'une face de côté 1). $BE=\sqrt{(1-1)^2+(0-1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{0+1+1}=\sqrt{2}$… Attention ! B est $(1,1,0)$ et

D est $(0,0,1)$, donc $BD = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$? Non ! D est sur l'axe z : $(0,0,1)$. La face du bas est $OABC$, la face du haut est $DEFG$ avec $D(0,0,1)$, $E(1,0,1)$, $F(1,1,1)$, $G(0,1,1)$. Calculons les longueurs :

- $BD^2 = (0-1)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 = 1+1+1 = 3 \Longrightarrow BD = \sqrt{3}$ (diagonale du cube).
- Les diagonales de face sont BE, ED, DB : si l'on prend les sommets $B(1,1,0)$, $D(0,0,1)$, $E(1,0,1)$: $BE = \sqrt{(1-1)^2+(0-1)^2+(1-0)^2} = \sqrt{2}$. $ED = \sqrt{(0-1)^2+(0-0)^2+(1-1)^2} = 1$. Ce triangle n'est pas équilatéral, le triangle équilatéral classique est formé par les trois diagonales de face : par exemple (B, D, E) avec $D(0,1,1)$ ou les sommets (B, D, E) où les 3 segments sont des diagonales de face : $A(1,0,0)$, $C(0,1,0)$, $E(1,0,1)$!

3. Calculons $\overrightarrow{OF}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. Prenons deux vecteurs du plan (BDE) avec $B(1,1,0), D(0,0,1), E(1,0,1)$: $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix} \Longrightarrow \overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{BE} = 1(0)+1(-1)+1(1) = 0$. $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \Longrightarrow \overrightarrow{OF}\cdot\overrightarrow{DE} = 1(1)+1(0)+1(0) = 1 \neq 0$. Le plan orthogonal à $\overrightarrow{OF}(1,1,1)$ est le plan passant par les trois sommets $B(1,1,0)$, D, etc. dont l'équation est $x+y+z=2$ ou $x+y+z=1$! Prenons les points $A(1,0,0)$, $C(0,1,0)$ et $D(0,0,1)$: $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}\cdot\overrightarrow{OF} = 0$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\cdot\overrightarrow{OF} = 0$. Le plan (ACD) a pour équation $x+y+z-1=0$, et la droite (OF) : $x=t, y=t, z=t$ le perce en $t+t+t=1 \Longrightarrow t = 1/3$, soit au point $\left(\frac{1}{3}\,;\frac{1}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$.

Solution 52.9 : 1. Testons les coordonnées de $A(4\,;-1\,;5)$ dans l'équation de $\mathcal{P}$: $4+2(-1)-2(5)+6 = 4-2-10+6 = -2 \neq 0$. Donc $A \notin \mathcal{P}$. 2. Le vecteur normal de $\mathcal{P}$ est $\vec{n}(1\,;2\,;-2)$. La droite Δ perpendiculaire passant par A est : $\begin{cases} x = 4+t \\ y = -1+2t \end{cases}$ $z = 5-2t \quad (t\in\mathbb{R})$. 3. Injectons dans l'équation de $\mathcal{P}$: $(4+t)+2(-1+2t)-2(5-2t)+6 = 0 \Leftrightarrow (4-2-10+6)+(t+4t+4t) = 0 \Leftrightarrow -2+9t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{9}$. Coordonnées de H : $x_H = 4+\frac{2}{9} = \frac{38}{9}$, $y_H = -1+\frac{4}{9} = -\frac{5}{9}$, $z_H = 5-\frac{4}{9} = \frac{41}{9}$. $H\left(\frac{38}{9}\,;-\frac{5}{9}\,;\frac{41}{9}\right)$. 4. $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{9}\vec{n}$. $AH = |\frac{2}{9}| \parallel \vec{n} \parallel = \frac{2}{9}\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2} = \frac{2}{9}\sqrt{9} = \frac{2\times3}{9} = \frac{2}{3}$. 5. Formule directe : $d(A,\mathcal{P}) = \frac{|4+2(-1)-2(5)+6|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}$. Cohérence parfaite !

Solution 52.10 : 1. $I\left(\frac{1+3}{2}\,;\frac{3-1}{2}\,;\frac{-2+4}{2}\right) = I(2\,;1\,;1)$. 2. Vecteur normal : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-1\\-1-3\\4-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\-4\\6\end{pmatrix}$, ou plus simplement $\vec{n} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$. 3. Équation du plan : $x-2y+3z+d=0$. Passe par $I(2\,;1\,;1)$: $2-2(1)+3(1)+d=0 \Leftrightarrow 3+d=0 \Leftrightarrow d=-3$. Équation : $x-2y+3z-3=0$. 4. $M(x\,;y\,;z)$ est équidistant de A et $B \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow (x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2 = (x-3)^2+(y+1)^2+(z-4)^2$. En développant, les termes x^2, y^2, z^2 s'annulent : $-2x+1-6y+9+4z+4 = -6x+9+2y+1-8z+16$ $4x-8y+12z-12 = 0 \Leftrightarrow x-2y+3z-3=0$. On retrouve exactement l'équation du plan médiateur !

Solution 52.11 : 1. Vecteurs normaux : $\vec{n}_1(2\,;-1\,;1)$ et $\vec{n}_2(1\,;1\,;2)$. Ces vecteurs ne sont manifestement pas colinéaires ($\frac{2}{1} \neq \frac{-1}{1}$). Les plans ne sont donc pas parallèles. 2. Deux plans non parallèles se coupent selon une unique droite Δ. 3. Résolvons le système des deux équations :

$$\begin{cases} 2x-y+z-3=0 \\ x+y+2z-6=0 \end{cases}$$

Additionnons les deux lignes pour éliminer y : $3x+3z-9=0 \Leftrightarrow x+z-3=0 \Leftrightarrow x = 3-z$. Soustrayons deux fois la seconde à la première pour éliminer x : $-3y-3z+9=0 \Leftrightarrow y = 3-z$. Posons $z=t$ comme paramètre réel ($t\in\mathbb{R}$) :

$$\begin{cases} x = 3-t \\ y = 3-t \\ z = t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R}).$$

C'est la représentation paramétrique de la droite d'intersection Δ (passant par $(3\,;3\,;0)$ et de vecteur directeur $(-1\,;-1\,;1)$).

Solution 52.12 : 1. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2 = 9$. 2. Pour $A(3\,;-1\,;1)$: $(3-1)^2+(-1+2)^2+(1-3)^2 = 2^2+1^2+(-2)^2 = 4+1+4 = 9$. Donc $A\in\mathcal{S}$. 3. Le vecteur normal au plan tangent en A est $\overrightarrow{\Omega A}\begin{pmatrix}3-1\\-1-(-2)\\1-3\end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$. L'équation de $\mathcal{T}$ est $2x+y-2z+d=0$. En $A(3\,;-1\,;1)$: $2(3)+(-1)-2(1)+d=0 \Leftrightarrow 6-1-2+d=0 \Leftrightarrow 3+d=0 \Leftrightarrow d=-3$. L'équation du plan tangent est : $2x+y-2z-3=0$.

Solution 52.13 : 1. $A(0,0,0)$, $B(3,0,0)$, $C(0,4,0)$. $\overrightarrow{AB}=3\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{AC}=4\vec{\jmath}$. Ils sont portés par deux axes perpendiculaires du repère, donc le triangle ABC est rectangle en A. Son aire vaut $\mathcal{A}_{\text{base}}=\frac{AB\times AC}{2}=\frac{3\times4}{2}=6$. 2. Les points A,B,C appartiennent tous au plan (Oxy) d'équation $z=0$. Le point $D(1\,;1\,;5)$ a pour cote $z=5$. Son projeté orthogonal sur le plan de base est $H(1\,;1\,;0)$. La hauteur est donc $DH=5-0=5$. 3. $V=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}_{\text{base}}\times\text{hauteur}=\frac{1}{3}\times6\times5=10$ unités de volume.

Solutions du Niveau

Solution 52.14 : 1. $\vec{u}\cdot(\vec{u}\wedge\vec{v})=x(yz'-zy')+y(zx'-xz')+z(xy'-yx')=xyz'-xzy'+yzx'-yxz'+zxy'-zyx'=0$. De même $\vec{v}\cdot(\vec{u}\wedge\vec{v})=0$. Le vecteur est bien orthogonal aux deux ! 2. Développons $\|\,\vec{u}\wedge\vec{v}\,\|^2=(yz'-zy')^2+(zx'-xz')^2+(xy'-yx')^2$ et développons $(x^2+y^2+z^2)(x'^2+y'^2+z'^2)-(xx'+yy'+zz')^2$: les termes carrés se simplifient et l'identité est exacte (identité de Lagrange). 3. $\|\,\vec{u}\wedge\vec{v}\,\|=\|\,\vec{u}\,\|\|\,\vec{v}\,\|\,(1-\cos^2\theta)=\|\,\vec{u}\,\|^2\|\,\vec{v}\,\|^2\sin^2\theta$. Puisque $\theta\in[0\,;\pi]$, $\sin\theta\geq0$, donc $\|\,\vec{u}\wedge\vec{v}\,\|=\|\,\vec{u}\,\|\|\,\vec{v}\,\|\sin\theta$, ce qui est exactement l'aire du parallélogramme de côtés $\|\,\vec{u}\,\|$ et $\|\,\vec{v}\,\|$. 4. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\\-1\\-1\end{pmatrix}$. $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}(-2)(-1)-(-2)(-1)\\(-2)(-2)-1(-1)\\1(-1)-(-2)(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2\\4+1\\-1-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\5\\-5\end{pmatrix}$. On peut choisir $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. Vérification : $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0-2+2=0$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0-1+1=0$!

Solution 52.15 : 1. La direction de la perpendiculaire commune doit être orthogonale à $\vec{u}_1$ et à $\vec{u}_2$, donc portée par $\vec{n}=\vec{u}_1\wedge\vec{u}_2$. Le plan contenant $\mathcal{D}_1$ et dirigé par $\vec{n}$ coupe $\mathcal{D}_2$ en un unique point H_2. La perpendiculaire issue de H_2 coupe $\mathcal{D}_1$ en H_1. 2. Le segment $[H_1H_2]$ est colinéaire à $\vec{n}$. Dans le parallélépipède formé par $\vec{u}_1,\vec{u}_2$ et $\overrightarrow{A_1A_2}$, la distance entre les deux droites est la projection orthogonale du vecteur $\overrightarrow{A_1A_2}$ sur la droite normale de vecteur unitaire $\frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|}$, ce qui donne immédiatement $d=\frac{|\overrightarrow{A_1A_2}\cdot\vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.

Solution 52.16 : 1. D'après la relation de Chasles, pour tout point $A\in\mathcal{P}$: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HM}$. 2. Prenons le produit scalaire avec le vecteur normal $\vec{n}$: $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HM})\cdot\vec{n}=\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}+\overrightarrow{HM}\cdot\vec{n}$. Puisque A et H appartiennent tous deux au plan $\mathcal{P}$, le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est contenu dans le plan, donc $\overrightarrow{AH}\perp\vec{n}\Longrightarrow\overrightarrow{AH}\cdot\vec{n}=0$. De plus, $\overrightarrow{HM}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $|\overrightarrow{HM}\cdot\vec{n}|=\|\,\overrightarrow{HM}\,\|\|\,\vec{n}\,\|=d(M,\mathcal{P})\,\|\,\vec{n}\,\|$. D'autre part, en coordonnées : $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=a(x_0-x_A)+b(y_0-y_A)+c(z_0-z_A)=ax_0+by_0+cz_0-(ax_A+by_A+cz_A)$. Or $A\in\mathcal{P}\Longrightarrow ax_A+by_A+cz_A+d=0\Longrightarrow-(ax_A+by_A+cz_A)=d$. Donc $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=ax_0+by_0+cz_0+d$. En prenant la valeur absolue : $|ax_0+by_0+cz_0+d|=d(M,\mathcal{P})\,\|\,\vec{n}\,\|\Leftrightarrow d(M,\mathcal{P})=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$. La formule est rigoureusement démontrée ! ■

La question qui ouvre la suite

Nous avons appris à mesurer l'espace continu : longueurs, angles, surfaces planes et volumes 3D. Mais le monde mathématique ne se résume pas à des continus géométriques. Il est aussi fait de choix discrets : Combien de chemins mènent d'un sommet à un autre ? Combien de combinaisons possibles sur un cadenas à roulettes ? De combien de manières peut-on choisir 5 cartes dans un jeu de 32 ou former une équipe de délégués ?

Comment dénombrer sans jamais compter un par un jusqu'à l'infini ?

Rendez-vous au chapitre 53 avec **le cadenas à code et les façons de choisir**.

CHAPITRE 53 : Le Cadenas à Code et les Façons de Choisir

> « Rien n'est plus trompeur que l'intuition du nombre de possibles : l'esprit humain s'égare sitôt que les choix se multiplient. Mais dès que la pensée structure l'éventail — ordonner ou mêler, répéter ou exclure —, le dédale infini devient un édifice de cristal gouverné par de simples factorielles. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment compter sans jamais énumérer un à un des millions d'objets grâce aux deux lois fondamentales : le **principe additif** et le **principe multiplicatif**.
- La distinction cruciale qui gouverne tout le dénombrement : **l'ordre compte-t-il ?** et **peut-on répéter les éléments ?**
- Les ***k*-uplets**, les **arrangements** et les **permutations**, articulés autour de la spectaculaire fonction factorielle $n!$.
- Les **combinaisons** $\binom{n}{k}$ (« k parmi n »), le **triangle de Pascal** et leurs propriétés de symétrie et de récurrence.
- La puissance de la **formule du binôme de Newton**, qui développe instantanément n'importe quelle puissance d'une somme $(a+b)^n$.
- Les pièges classiques de surcomptage et la stratégie du **passage au complémentaire**.

---

1. Le problème : compter l'invisible

1.1 Le cadenas du vestiaire

Imagine un cadenas de vélo à 4 molettes, chacune portant les chiffres de 0 à 9. Tu as oublié la combinaison. Combien de tentatives te faudrait-il, au pire, pour être certain de l'ouvrir ? Pour le premier chiffre, 10 choix. Pour le deuxième, 10 choix. Pour le troisième, 10 choix. Pour le quatrième, 10 choix. Le nombre total de codes possibles est :

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10\,000.$$

À raison d'un essai toutes les 3 secondes sans pause, il te faudrait plus de 8 heures pour tout tester.

Changeons maintenant une seule règle : le fabricant garantit que **les 4 chiffres d'un code sont tous distincts** (aucun chiffre ne se répète). Combien de codes reste-t-il ?

- Premier chiffre : 10 choix possibles.
- Deuxième chiffre : seulement 9 choix (celui déjà utilisé est interdit).
- Troisième chiffre : 8 choix.
- Quatrième chiffre : 7 choix.

Le total tombe à :

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040 \quad \text{codes}.$$

Près de la moitié des combinaisons s'est évaporée par la simple interdiction de répéter !

1.2 Le menu du bistrot

Un restaurant propose une formule à midi : 3 entrées au choix, 4 plats de résistance et 3 desserts. Combien de repas complets différents (entrée + plat + dessert) un client peut-il composer ? Ici, choisir une entrée n'empêche en rien de choisir n'importe quel plat, ni n'importe quel dessert. Les choix s'enchaînent de manière indépendante :

$$3 \times 4 \times 3 = 36 \quad \text{menus différents}.$$

Si tu venais y manger tous les midis du lundi au vendredi, il te faudrait plus de 7 semaines pour épuiser toutes les saveurs sans jamais prendre deux fois le même plateau !

1.3 La main de cartes et l'équipe de sport

Considérons maintenant une situation différente : un entraîneur doit choisir 3 joueurs parmi 10 disponibles pour former une patrouille de relais. Est-ce que choisir Alice, Bob et Chloé est différent de choisir Chloé, Bob et Alice ?

Non. L'équipe est la même. L'ordre dans lequel l'entraîneur prononce leurs prénoms n'a aucune importance : ils sont ensemble sur le terrain.

Si l'on comptait comme pour le cadenas sans répétition ($10 \times 9 \times 8 = 720$), on commettrait une erreur massive : le trio {Alice, Bob, Chloé} serait compté plusieurs fois :

- Alice, Bob, Chloé
- Alice, Chloé, Bob
- Bob, Alice, Chloé
- Bob, Chloé, Alice
- Chloé, Alice, Bob
- Chloé, Bob, Alice

Exactement 6 fois la même équipe ! Le vrai nombre d'équipes possibles n'est donc pas 720, mais :

$$\frac{720}{6} = 120.$$

1.4 La crise du dénombrement

Ces trois scènes posent les bases d'une science rigoureuse : le **dénombrement** (*combinatorics* en anglais). Dès que les ensembles grandissent, il devient physiquement impossible de dresser la liste exhaustive des possibles. Si une urne contient 50 boules et qu'on en tire 5, le nombre de tirages dépasse deux millions. Le mathématicien ne liste pas : il **structure**, il **catégorise** et il **calcule**.

---

2. Les fondations : Ensembles finis, principe additif et principe multiplicatif

2.1 Ensembles finis et cardinal

Soit E un ensemble. On dit que E est un **ensemble fini** s'il contient un nombre entier fini d'éléments.

> **Définition Fondamentale**
>
> 📐 **Définition — Cardinal d'un ensemble fini** Le nombre d'éléments d'un ensemble fini E est appelé le **cardinal** de E. On le note $\mathrm{Card}(E)$ ou, plus couramment au lycée et dans le supérieur, $|E|$ ou $\#E$. Si $E = \varnothing$ (ensemble vide), on a $|E| = 0$.

Notation expliquée : Le mot *cardinal* vient du latin *cardo*, « le gond, le pivot » : c'est le nombre fondamental autour duquel tourne la taille d'une collection. La notation $|E|$ rappelle la valeur absolue (qui mesure une taille ou une distance).

2.2 Le principe additif : partitions et disjonction

> 📐 **Propriété fondamentale — Principe additif**
>
> Soient A et B deux sous-ensembles finis d'un ensemble E. Si A et B sont **disjoints** (c'est-à-dire sans aucun élément commun : $A \cap B = \varnothing$), alors :
>
> $$|A \cup B| = |A| + |B|$$
>
> Plus généralement, si $A_1, A_2, ..., A_m$ forment une **partition** de E (ils sont deux à deux disjoints et leur réunion forme tout E), alors :
>
> $$|E| = |A_1| + |A_2| + ... + |A_m| = \sum_{i=1}^{m} |A_i|$$



Fig. 116. – Arbre de décision combinatoire : arrangements, combinaisons, permutations

Et si les deux ensembles se chevauchent ? C'est la célèbre formule du crible (ou formule de Poincaré pour 2 ensembles) :

📐 Théorème — Formule des deux ensembles

Pour tous ensembles finis A et B :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Démonstration visuelle : En additionnant $|A|$ et $|B|$, les éléments situés dans l'intersection $A \cap B$ ont été comptés deux fois. Il faut donc retrancher une fois $|A \cap B|$ pour rétablir le compte exact.

🧭 Méthode — Le principe du complémentaire

Si A est une partie d'un ensemble fini E, son complémentaire $\overline{A}$ (ou $E \setminus A$) vérifie :

$$|A| + |\overline{A}| = |E| \Leftrightarrow |A| = |E| - |\overline{A}|$$

Règle d'or : Chaque fois qu'un problème contient les mots *« au moins un… »*, il est presque toujours dix fois plus rapide de dénombrer le contraire (*« aucun… »*) et de soustraire au total !

2.3 Le principe multiplicatif et le produit cartésien

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Produit cartésien** Soient A et B deux ensembles. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble de tous les couples (a, b) où $a \in A$ et $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

📐 Théorème — Principe multiplicatif

Si A et B sont deux ensembles finis, alors :

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

De façon générale, pour k ensembles finis $A_1, A_2, ..., A_k$:

$$|A_1 \times A_2 \times ... \times A_k| = |A_1| \times |A_2| \times ... \times |A_k| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$$

L'arbre de choix : Chaque choix successif correspond à une ramification. Si la première étape offre n_1 branches, et que de chacune partent n_2 sous-branches, le nombre total de feuilles au bout de l'arbre est $n_1 \times n_2$.

3. L'ordre compte : k-uplets, arrangements et factorielle

3.1 Les k-uplets (avec remise / répétition autorisée)

On tire k objets parmi n, **l'un après l'autre**, en remettant l'objet tiré dans le sac à chaque étape (ou en réutilisant le même symbole, comme sur une molette).

> **📐 Théorème — Nombre de k-uplets**
>
> Soit E un ensemble à n éléments. Un ***k*-uplet** (ou liste de longueur k) d'éléments de E est un élément du produit cartésien $E^k = \underbrace{E \times E \times ... \times E}_{k \text{ facteurs}}$. Le nombre de k-uplets d'un ensemble à n éléments est :
>
> $$|E^k| = n^k$$

Exemples concrets : - Nombre d'octets possibles (mots de 8 bits formés de 0 et de 1) : $2^8 = 256$. - Nombre de codes de carte bancaire à 4 chiffres décimaux : $10^4 = 10\,000$. - Nombre de résultats possibles lors de 5 lancers d'une pièce de monnaie (Pile ou Face) : $2^5 = 32$.

3.2 Les arrangements (k-uplets d'éléments distincts, sans répétition)

Cette fois, on choisit k éléments parmi n **l'un après l'autre**, mais **sans remise** : chaque élément ne peut être utilisé qu'une seule fois.

> **Définition Fondamentale**
>
> **📐 Définition & Théorème — Arrangements** Soit E un ensemble à n éléments et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Un **arrangement** de k éléments de E (ou k-uplet d'éléments distincts) est une liste ordonnée $(x_1, x_2, ..., x_k)$ d'éléments deux à deux distincts de E. Le nombre de tels arrangements est noté A_n^k et vaut :
>
> $$A_n^k = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times (n-k+1)$$

Démonstration : Pour la 1re place, nous avons n candidats possibles. Pour la 2e place, il en reste $n-1$. Pour la 3e place, il en reste $n-2$. … Pour la k-ième place, il en reste $n-(k-1) = n-k+1$. D'après le principe multiplicatif, on multiplie ces entiers.

3.3 Permutations et la fonction factorielle $n!$

Que se passe-t-il si l'on prend tous les éléments, c'est-à-dire si $k = n$? On ordonne la totalité des n éléments : c'est une **permutation**.

> **Définition Fondamentale**
>
> **📐 Définition & Théorème — Permutations et Factorielle** Une **permutation** d'un ensemble E à n éléments est un arrangement de tous les éléments de E (un n-uplet d'éléments distincts de E). Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est noté $n!$ (qui se lit **« factorielle n »**) :
>
> $$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 2 \times 1$$
>
> Par convention fondamentale :
>
> $$0! = 1$$

Notation expliquée : Le point d'exclamation a été introduit en 1808 par le mathématicien français **Christian Kramp** de Strasbourg, simplement pour abréger les écritures typographiques longues. Pourquoi $0! = 1$? 1. **Combinatoire :** Combien de façons y a-t-il d'ordonner zéro objet ? Une seule façon : la liste vide ! 2. **Algébrique :** Pour tout $n \geq 1$, on a $n! = n \times (n-1)!$. En appliquant cette formule pour $n = 1$, il vient $1! = 1 \times 0!$. Comme $1! = 1$, on doit impérativement poser $0! = 1$ pour maintenir la cohérence de l'arithmétique.

Réécriture élégante de A_n^k : Remarquons que l'on peut compléter le produit de A_n^k jusqu'à 1 :

$$A_n^k = \frac{n \times (n-1) \times ... \times (n-k+1) \times (n-k) \times ... \times 1}{(n-k) \times ... \times 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? L'explosion factorielle** La factorielle croît à une vitesse vertigineuse :

- $3! = 6$
- $5! = 120$
- $10! = 3\,628\,800$
- $52! \approx 8,06 \times 10^{67}$ Lorsque tu mélanges un jeu de 52 cartes convenablement, l'ordre obtenu n'a très probablement **jamais existé** dans toute l'histoire de l'humanité, et ne réapparaîtra probablement jamais avant l'extinction du Soleil !

---

4. L'ordre ne compte pas : Les combinaisons $\binom{n}{k}$

4.1 La poignée de main et le sous-ensemble

Dans de nombreuses situations concrètes, l'ordre d'apparition n'a aucun sens :

- Tirer une main de 5 cartes au poker (qu'on reçoive l'As de pique en premier ou en dernier, on a l'As de pique en main).
- Choisir 3 délégués de classe parmi 30 élèves.
- Choisir 6 numéros parmi 49 sur une grille de Loto.

Dans ces cas, le résultat n'est pas un k-uplet (liste entre parenthèses), c'est une **partie** ou un **sous-ensemble** à k éléments (noté entre accolades $\{x_1, ..., x_k\}$).

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Combinaisons** Soit E un ensemble à n éléments et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Une **combinaison** de k éléments parmi n est un sous-ensemble (ou une partie) de E ayant exactement k éléments. Le nombre de ces combinaisons est noté $\binom{n}{k}$ (qui se lit **« k parmi n »**). *(Ancienne notation encore courante dans d'autres pays : C_n^k).*

4.2 La formule magique

✍ Démonstration exigible — Formule de $\binom{n}{k}$

Calculons le nombre d'arrangements A_n^k de deux façons différentes : 1. D'une part, on sait que le nombre d'arrangements est $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. 2. D'autre part, pour fabriquer un arrangement de k éléments (une liste ordonnée), on peut procéder en deux étapes :

- **Étape 1 :** Choisir les k éléments sans s'occuper de l'ordre. Par définition, il y a $\binom{n}{k}$ façons de le faire.
- **Étape 2 :** Ordonner ces k éléments choisis pour former une liste. D'après le paragraphe précédent, il y a $k!$ façons de permuter ces k éléments.

D'après le principe multiplicatif :

$$A_n^k = \binom{n}{k} \times k!$$

En isolant $\binom{n}{k}$, on obtient le théorème fondamental :

$$\binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemple immédiat : Le nombre de mains de 3 cartes dans un jeu de 10 cartes :

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

On retrouve exactement notre calcul intuitif du vestiaire !

4.3 Propriétés fondamentales des combinaisons

1. **Valeurs remarquables :**

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \text{(un seul ensemble vide)}, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{n} = 1$$

2. **Symétrie des choix :**

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

✍️ **Démonstration — Symétrie**

- **Par le calcul :**

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

- **Par l'esprit combinatoire (magnifique !) :** Choisir k personnes parmi n pour monter dans un bateau, c'est exactement désigner les $n-k$ personnes qui restent sur le quai ! À chaque groupe de k choisis correspond un unique groupe de $n-k$ exclus. Il y a donc exactement autant de façons de faire l'un que l'autre.

4.4 La relation de Pascal

📐 **Théorème — Formule de Pascal**

Pour tous entiers $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

✍️ **Démonstration combinatoire exigible — La méthode du témoin**

Soit E un ensemble à n éléments. Isolons un élément particulier de E, appelons-le **Alice**. Nous voulons choisir un sous-ensemble de k éléments parmi ces n personnes. Il y a $\binom{n}{k}$ façons au total. Classons ces sous-ensembles en deux catégories disjointes :

- **Catégorie 1 : Les comités qui contiennent Alice.** Puisqu'Alice est déjà choisie d'office, il ne reste plus qu'à choisir $k-1$ camarades parmi les $n-1$ personnes restantes. Il y a $\binom{n-1}{k-1}$ façons de le faire.
- **Catégorie 2 : Les comités qui ne contiennent pas Alice.** Alice est écartée. Il faut donc choisir les k membres du comité entièrement parmi les $n-1$ personnes restantes. Il y a $\binom{n-1}{k}$ façons.

Ces deux catégories forment une partition de l'ensemble des comités possibles. Par le principe additif :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

La formule est démontrée sans une seule ligne de fraction d'algèbre !

---

5. Le Triangle de Pascal et le Binôme de Newton

5.1 La construction du triangle

La formule de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ stipule qu'un nombre est la somme de deux nombres de la ligne supérieure : celui situé juste au-dessus, et celui situé juste au-dessus à gauche.

n / k	0	1	2	3	4	5	Somme 2^n
0	1						$1 = 2^0$
1	1	1					$2 = 2^1$
2	1	2	1				$4 = 2^2$
3	1	3	3	1			$8 = 2^3$
4	1	4	6	4	1		$16 = 2^4$
5	1	5	10	10	5	1	$32 = 2^5$

Remarque la colonne de droite : la somme de tous les coefficients de la ligne n vaut toujours 2^n ! Pourquoi ? Parce que faire la somme de tous les $\binom{n}{k}$ pour k allant de 0 à n, c'est compter tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble à n éléments (ceux à 0 élément, puis à 1, puis à 2… jusqu'à n). Or pour chaque élément d'un ensemble, il y a 2 possibilités : soit il fait partie du sous-ensemble, soit il n'en fait pas partie. Pour n éléments, cela donne $2 \times 2 \times \ldots \times 2 = 2^n$ sous-ensembles (l'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$).

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

5.2 Le binôme de Newton

Rappelle-toi tes identités remarquables de collège et de Seconde :

- $(a+b)^1 = a + b$
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Regarde les coefficients :

- Ligne 1 : $1, 1$
- Ligne 2 : $1, 2, 1$
- Ligne 3 : $1, 3, 3, 1$

Ce sont très exactement les lignes du triangle de Pascal !

📐 Théorème fondamental — Formule du Binôme de Newton

Pour tous réels ou complexes a et b, et pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

En développant :

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + \binom{n}{n}b^n$$

✍️ Démonstration combinatoire — Pourquoi cette formule est limpide

Développons le produit de n parenthèses identiques :

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\ldots(a+b)}_{n \text{ facteurs}}$$

Lors de la grande distributivité, pour former chaque terme du résultat, on doit obligatoirement choisir **soit la lettre a, soit la lettre b** dans chacune des n parenthèses. Si l'on choisit k fois la lettre b, on aura obligatoirement choisi la lettre a dans les $n - k$ autres parenthèses. Le monôme résultant est donc :

$$a^{n-k}b^k$$

Combien de fois ce terme $a^{n-k}b^k$ apparaît-il dans le développement ? Exactement autant de fois qu'il y a de façons de choisir les k parenthèses fournissant la lettre b parmi les n parenthèses disponibles ! C'est la définition même de **« k parmi n »**, soit $\binom{n}{k}$. La formule est ainsi démontrée avec une clarté totale.

6. Boîte à outils et pièges classiques

6.1 L'organigramme de décision

Face à un énoncé de dénombrement, pose-toi **toujours** ces deux questions dans cet ordre :

6.2 Les pièges mortels

> **⚠ Attention au Piège !**
>
> ⚠ **Attention, piège ! — Le surcomptage par fausse décomposition** *Exemple :* Dans une classe de 10 garçons et 12 filles, on veut former un groupe de 4 élèves contenant **au moins une fille**.
>
> - *Faux raisonnement tentant :* « Je choisis 1 fille parmi les 12 (12 façons), puis je choisis les 3 autres élèves parmi les 21 élèves restants ($\binom{21}{3}$ façons). Total : $12 \times \binom{21}{3}$. » **C'est faux !** Tu as surcompté les groupes ayant plusieurs filles. Par exemple, si tu as choisi Clara en première fille, puis Sophie parmi les 3 autres, cela produit le même groupe que si tu avais choisi Sophie en première fille et Clara parmi les 3 autres.
> - *La méthode correcte (complémentaire) :* On compte tous les groupes possibles sans contrainte : $\binom{22}{4}$. On soustrait les groupes qui ne contiennent **aucune fille** (c'est-à-dire 4 garçons) : $\binom{10}{4}$. Nombre exact : $\binom{22}{4} - \binom{10}{4} = 7\,315 - 210 = 7\,105$.

> **Découverte & Histoire**
>
> 🔍 **L'histoire vraie — Les dés du Chevalier de Méré (1654)**
>
> Antoine Gombaud, dit le Chevalier de Méré, homme d'esprit et joueur invétéré, s'étonnait auprès de Blaise Pascal : *« En lançant 4 fois un dé à 6 faces, j'ai plus d'une chance sur deux d'obtenir au moins un 6. Mais en lançant 24 fois une paire de deux dés, j'ai moins d'une chance sur deux d'obtenir un double-six. Pourtant,* $4/6 = 24/36$ *! Les mathématiques seraient-elles contradictoires ? »* Pascal prend sa plume et écrit à Pierre de Fermat. Ensemble, par échange de lettres, ils calculent avec le complémentaire : 1. Avec 1 dé en 4 lancers : probabilité de ne jamais avoir de 6 = $(5/6)^4 \approx 0,482$. Donc probabilité d'avoir au moins un 6 = $1 - 0,482 = 0,518 > 1/2$. (Avantageux !) 2. Avec 2 dés en 24 lancers : probabilité de ne jamais avoir de double 6 = $(35/36)^{24} \approx 0,509$. Donc au moins un double 6 = $1 - 0,509 = 0,491 < 1/2$. (Défavorable !) Le Chevalier perdait son argent à cause d'une fraction trompeuse. La théorie des probabilités et du dénombrement moderne venait de naître !

7. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Le digicode d'un immeuble

Le digicode d'une résidence comporte les touches 0 à 9 ainsi que les lettres A, B, C (soit 13 touches au total). Un code d'entrée est composé d'une lettre suivie de 3 chiffres. 1. Combien de codes peut-on créer au total ? 2. Combien de codes si les 3 chiffres doivent être tous distincts ? 3. Combien de codes si le code commence par A et ne contient aucun chiffre pair ?

Solution détaillée : 1. Un code est un 4-uplet (L, c_1, c_2, c_3) appartenant à $\{A, B, C\} \times \{0..9\}^3$. Par le principe multiplicatif : $3 \times 10 \times 10 \times 10 = 3 \times 10^3 = 3\,000$ codes. 2. Pour la lettre : 3 choix. Pour les chiffres distincts, il s'agit d'un arrangement de 3 chiffres parmi 10 : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$. Total : $3 \times 720 = 2\,160$ codes. 3. La lettre est fixée (A : 1 seul choix). Les chiffres impairs sont $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, soit 5 chiffres disponibles. Puisqu'aucune interdiction de répétition n'est mentionnée, chaque chiffre a 5 possibilités : Total : $1 \times 5^3 = 125$ codes.

Exemple 2 : Composition d'un jury d'examen

Dans un lycée, 15 professeurs de sciences et 12 professeurs de lettres sont volontaires pour former un jury de grand oral composé de 4 personnes. 1. Combien de jurys différents peut-on constituer ? 2. Combien de jurys comportant

exactement 2 professeurs de sciences et 2 professeurs de lettres ? 3. Combien de jurys comportant au moins un professeur de chaque discipline ?

Solution détaillée : 1. Un jury est un sous-ensemble de 4 personnes parmi les $15 + 12 = 27$ professeurs. L'ordre ne compte pas :

$$\binom{27}{4} = \frac{27 \times 26 \times 25 \times 24}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 17\,550 \text{ jurys}.$$

2. On choisit indépendamment 2 professeurs de sciences parmi 15, ET 2 professeurs de lettres parmi 12 :

$$\binom{15}{2} \times \binom{12}{2} = \frac{15 \times 14}{2} \times \frac{12 \times 11}{2} = 105 \times 66 = 6\,930 \text{ jurys}.$$

3. Le contraire de « au moins un de chaque discipline » est « jury 100% sciences OU jury 100% lettres ».

- Nombre de jurys 100% sciences : $\binom{15}{4} = \frac{15\times14\times13\times12}{24} = 1\,365$.
- Nombre de jurys 100% lettres : $\binom{12}{4} = \frac{12\times11\times10\times9}{24} = 495$. Ces deux cas étant disjoints, le total des jurys non mixtes est $1\,365 + 495 = 1\,860$. Par soustraction au total général :

$$17\,550 - 1\,860 = 15\,690 \text{ jurys mixtes}.$$

Exemple 3 : Les mains de Poker

Dans un jeu de 52 cartes (4 couleurs : Pique, Cœur, Carreau, Trèfle ; 13 hauteurs de l'As au Roi), une « main » est une combinaison de 5 cartes. Le nombre total de mains est $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$. 1. Dénombrer le nombre de « Carrés » (4 cartes de même hauteur + 1 cinquième carte quelconque). 2. Dénombrer le nombre de « Fulls » (3 cartes d'une même hauteur + 2 cartes d'une autre hauteur).

Solution détaillée : 1. **Carré :**

- Étape 1 : Choisir la hauteur du carré parmi les 13 possibles : 13 choix.
- Étape 2 : Prendre les 4 cartes de cette hauteur : $\binom{4}{4} = 1$ façon.
- Étape 3 : Choisir la 5e carte parmi les 48 cartes restantes de hauteur différente : 48 choix. Total : $13 \times 1 \times 48 = 624$ carrés possibles.

2. **Full :**
   - Étape 1 : Choisir la hauteur du brelan (3 cartes) parmi les 13 hauteurs : 13 choix.
   - Étape 2 : Choisir les 3 couleurs du brelan parmi 4 : $\binom{4}{3} = 4$ façons.
   - Étape 3 : Choisir la hauteur de la paire parmi les 12 hauteurs restantes : 12 choix.
   - Étape 4 : Choisir les 2 couleurs de la paire parmi 4 : $\binom{4}{2} = 6$ façons. Total : $13 \times 4 \times 12 \times 6 = 3\,744$ fulls possibles.

Exemple 4 : Anagrammes et lettres répétées

Combien d'anagrammes distinctes (ayant un sens ou non) peut-on former avec le mot **PARALLELE** ?

Solution détaillée : Le mot contient 9 lettres au total :

- P : 1 fois
- A : 2 fois
- R : 1 fois
- L : 3 fois
- E : 2 fois

Vérification de la somme : $1 + 2 + 1 + 3 + 2 = 9$. Si toutes les lettres étaient dotées d'un indice (ex : A_1, A_2, L_1, L_2, L_3), il y aurait $9! = 362\,880$ permutations. Mais intervertir les deux A entre eux ne modifie pas le mot (il y a 2! permutations neutres pour A). De même, permuter les trois L entre eux donne 3! configurations identiques, et les deux E donnent 2!. D'après le principe des permutations avec répétition (ou choix successif des places) :

$$\text{Nombre d'anagrammes} = \frac{9!}{1! \times 2! \times 1! \times 3! \times 2!} = \frac{362\,880}{1 \times 2 \times 1 \times 6 \times 2} = \frac{362\,880}{24} = 15\,120.$$

(Autre vision équivalente : choisir les 3 places des L parmi 9 ($\binom{9}{3}$), puis les 2 places des A parmi 6 restantes ($\binom{6}{2}$), puis les 2 places des E parmi 4 restantes ($\binom{4}{2}$), etc. Le produit donne exactement 15 120).

Exemple 5 : Déplacements sur un quadrillage

Dans une ville carrée quadrillée, un piéton part du point $A(0,0)$ pour rejoindre le point $B(5,3)$. À chaque intersection, il ne peut se déplacer que vers l'Est (E, d'un pas vers la droite) ou vers le Nord (N, d'un pas vers le haut). Combien de chemins minimaux mènent de A à B ?



Fig. 117. – Chemins sur un quadrillage et coefficients binomiaux

Solution détaillée : Pour aller de $(0,0)$ à $(5,3)$, tout trajet minimal doit comporter exactement 5 déplacements vers l'Est (E) et 3 déplacements vers le Nord (N). La longueur totale de chaque chemin est donc de $5+3=8$ pas. Un trajet est entièrement défini par un mot de 8 lettres composé de 5 lettres E et 3 lettres N (par exemple : $E-E-N-E-N-E-E-N$). Il suffit donc de choisir l'emplacement des 3 déplacements vers le Nord parmi les 8 étapes du trajet :

$$\text{Nombre de chemins} = \binom{8}{3} = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} = 56.$$

(On aurait pu choisir les 5 emplacements vers l'Est : $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$*).*

Exemple 6 : Terme d'un développement du binôme

Dans le développement de $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$, déterminer le terme indépendant de x (le terme constant).

Solution détaillée : Par la formule du binôme de Newton avec $a = 2x^2$ et $b = -\frac{1}{x} = -x^{-1}$:

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^9 = \sum_{k=0}^{9} \binom{9}{k} (2x^2)^{9-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k$$

Isolons les puissances de x dans le terme général :

$$T_k = \binom{9}{k} 2^{9-k} (x^2)^{9-k} (-1)^k x^{-k} = \binom{9}{k} 2^{9-k} (-1)^k \cdot x^{18-2k-k} = \binom{9}{k} 2^{9-k} (-1)^k \cdot x^{18-3k}$$

Le terme est indépendant de x lorsque l'exposant de x est nul :

$$18 - 3k = 0 \Leftrightarrow 3k = 18 \Leftrightarrow k = 6.$$

Puisque $k = 6$ est bien un entier compris entre 0 et 9, ce terme existe. Sa valeur est :

$$T_6 = \binom{9}{6} 2^{9-6} (-1)^6 = \binom{9}{3} \times 2^3 \times 1 = \frac{9\times 8\times 7}{6} \times 8 = 84 \times 8 = 672.$$

Le terme constant vaut **672**.

Ce qu'il faut retenir

1. **Principes de base :**
   - Réunion d'ensembles disjoints : $|A \cup B| = |A| + |B|$.

- Complémentaire : $|A| = |E| - |\overline{A}|$ (penser systématiquement au contraire pour *« au moins un »*).
- Produit cartésien : $|A \times B| = |A| \times |B|$.

2. **Dénombrement avec ordre :**
   - Avec répétition (k-uplet) : n^k.
   - Sans répétition (k-uplet distincts / arrangements) : $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)...(n-k+1)$.
   - Permutation de n éléments : $n! = n \times (n-1) \times ... \times 1$, avec $0! = 1$.
3. **Dénombrement sans ordre :**
   - Combinaisons de k parmi n : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
   - Symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
   - Relation de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
4. **Sommes et puissances :**
   - Somme d'une ligne du triangle de Pascal : $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.
   - Binôme de Newton : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 53.1 Calculer à la main : $5!$, $\frac{8!}{6!}$, $\binom{7}{2}$, $\binom{9}{9}$, et $\binom{10}{7}$.

Exercice 53.2 Un mot de passe informatique doit comporter 8 caractères choisis parmi les 26 lettres minuscules de l'alphabet. 1. Combien de mots de passe peut-on former si la répétition est autorisée ? 2. Combien si toutes les lettres doivent être différentes ?

Exercice 53.3 Une course réunit 12 chevaux au départ. Combien y a-t-il de tiercés possibles : 1. Dans l'ordre exact ? 2. Dans le désordre (les trois chevaux qui montent sur le podium sans précision de rang) ?

Exercice 53.4 Démontrer par le calcul que $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Que représente cette quantité si n personnes se serrent toutes la main une fois ?

Exercice 53.5 Développer à l'aide de la formule du binôme : 1. $(x+2)^4$ 2. $(2x-1)^3$

Exercice 53.6 Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot **MATHS** ? Et avec le mot **LIVRE** ?

Exercice 53.7 Une urne contient 6 boules rouges, 4 vertes et 2 jaunes. On tire simultanément 3 boules. Combien y a-t-il de tirages possibles au total ?

Niveau (Réflexion et méthodes classiques)

Exercice 53.8 On lance 5 dés équilibrés à 6 faces (comme au Yahtzee). 1. Combien de lancers différents peut-on obtenir au total ? 2. Combien de lancers ne comportent aucun 6 ? 3. En déduire le nombre de lancers contenant au moins un 6.

Exercice 53.9 Combien de nombres entiers compris entre 1000 et 9999 (inclus) : 1. Ont tous leurs chiffres distincts ? 2. Sont des nombres pairs ayant tous leurs chiffres distincts ?

Exercice 53.10 Un club d'échecs compte 14 membres : 8 adultes et 6 jeunes. On doit désigner une équipe de 5 joueurs. 1. De combien de façons peut-on composer cette équipe ? 2. Combien d'équipes contiennent exactement 3 adultes et 2 jeunes ? 3. Combien d'équipes contiennent au moins un adulte et au moins un jeune ?

Exercice 53.11 Anagrammes avec doublons : Combien d'anagrammes distinctes possède le mot **ANANAS** ?

Exercice 53.12 Un polygone convexe possède n sommets ($n \geq 4$). Combien de diagonales possède ce polygone ? *(Indication : une diagonale est un segment reliant deux sommets non consécutifs).*

Exercice 53.13 Déterminer le coefficient de x^5 dans le développement de $(3x-2)^8$.

Exercice 53.14 Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - ... + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

(Indication : appliquer le binôme de Newton à $(1-1)^n$).

Exercice 53.15 Le problème des anniversaires. Dans une classe de 30 élèves, on suppose que chaque élève est né un jour parmi les 365 jours de l'année (on ignore les années bissextiles), de façon indépendante. 1. Combien y a-t-il de répartitions d'anniversaires possibles pour les 30 élèves ? 2. Combien de répartitions où les 30 élèves ont tous des dates d'anniversaire distinctes ? 3. En déduire l'expression de la probabilité qu'au moins deux élèves aient leur anniversaire le même jour.

Niveau (Approfondissements et défis)

Exercice 53.16 La formule du comité et du président : 1. Démontrer algébriquement que pour tous entiers $1 \leq k \leq n$:

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$$

2. Donner une interprétation combinatoire élégante de cette formule en considérant le choix d'un comité de k personnes parmi n avec la désignation d'un président au sein du comité.

Exercice 53.17 Calculer la somme :

$$S = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = 1\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \ldots + n\binom{n}{n}$$

(Indication : utiliser le résultat de l'exercice 16 ou dériver la fonction $f(x) = (1+x)^n$).

Exercice 53.18 Le principe des bâtons et des étoiles (Stars and Bars). On veut distribuer 10 bonbons identiques à 3 enfants (Alice, Bob et Chloé). 1. Combien de distributions possibles y a-t-il si chaque enfant peut recevoir 0, 1 ou plusieurs bonbons ? 2. Combien de distributions si chaque enfant doit obligatoirement recevoir au moins un bonbon ?

Exercice 53.19 Formule de Vandermonde. En développant de deux façons l'égalité polynomiale $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m(1+x)^n$, démontrer la relation :

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k}\binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Donner également une justification combinatoire de cette formule.

Exercice 53.20 Somme des carrés des coefficients binomiaux. En utilisant la formule de Vandermonde (exercice 19) avec $m = n$ et $p = n$, démontrer que :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Exercice 53.21 Les dérangements (problème des chapeaux). n personnes déposent leur manteau au vestiaire. À la sortie, le vestiaire distribue au hasard un manteau à chacun. Un dérangement est une permutation où personne ne récupère son propre manteau. Montrer par le principe d'inclusion-exclusion que le nombre de dérangements D_n vaut :

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

Exercice 53.22 Les chemins de Dyck et les nombres de Catalan. On considère des chemins sur une grille menant de $(0,0)$ à (n,n) formés de déplacements $(+1,0)$ et $(0,+1)$, sans jamais franchir la diagonale $y = x$ (c'est-à-dire restant toujours dans le demi-plan $y \leq x$). Montrer par le principe de réflexion de Désiré André que le nombre de tels chemins est donné par le nombre de Catalan :

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

Solutions

Solution 53.1 - $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. - $\frac{8!}{6!} = 8 \times 7 = 56$. - $\binom{7}{2} = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$. - $\binom{9}{9} = 1$. - $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$.

Solution 53.2 1. $26^8 = 208\,827\,064\,576$. 2. $A_{26}^{8} = 26 \times 25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21 \times 20 \times 19 = 62\,990\,928\,000$.

Solution 53.3 1. Tiercé dans l'ordre : $A_{12}^{3} = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$. 2. Tiercé dans le désordre : $\binom{12}{3} = \frac{1\,320}{6} = 220$.

Solution 53.4 $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$. Une poignée de main implique 2 personnes distinctes sans notion d'ordre. Entre n personnes, il y a donc $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ poignées de main échangées.

Solution 53.5 1. $(x+2)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3(2) + \binom{4}{2}x^2(2^2) + \binom{4}{3}x(2^3) + \binom{4}{4}(2^4) = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$. 2. $(2x-1)^3 = (2x)^3 - 3(2x)^2(1) + 3(2x)(1^2) - 1^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$.

Solution 53.6 - MATHS : 5 lettres distinctes, donc $5! = 120$ anagrammes. - LIVRE : 5 lettres distinctes, donc $5! = 120$ anagrammes.

Solution 53.7 Total des boules : $6 + 4 + 2 = 12$. Tirage simultané de 3 boules : $\binom{12}{3} = \frac{12\times11\times10}{6} = 220$ tirages.

Solution 53.8 1. $6^5 = 7\,776$ lancers. 2. Pour chaque dé, 5 valeurs possibles excluant le 6 : $5^5 = 3\,125$ lancers. 3. Par passage au complémentaire : $7\,776 - 3\,125 = 4\,651$ lancers comportent au moins un 6.

Solution 53.9 Un nombre à 4 chiffres s'écrit $c_1c_2c_3c_4$ avec $c_1 \in \{1..9\}$ (9 choix) et $c_2, c_3, c_4 \in \{0..9\}$. 1. Chiffres distincts :

- Pour c_1 : 9 choix (de 1 à 9).
- Pour c_2 : 9 choix (de 0 à 9 sauf c_1).
- Pour c_3 : 8 choix.
- Pour c_4 : 7 choix. Total : $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4\,536$ nombres.

2. Nombres pairs à chiffres distincts ($c_4 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$) :
   - Cas 1 : $c_4 = 0$ (1 choix). Alors c_1 a 9 choix (de 1 à 9), c_2 a 8 choix, c_3 a 7 choix. Soit $1 \times 9 \times 8 \times 7 = 504$ nombres.
   - Cas 2 : $c_4 \in \{2, 4, 6, 8\}$ (4 choix). Alors c_1 ne peut être ni 0 ni c_4, donc il a $10 - 2 = 8$ choix. Ensuite c_2 a 8 choix (parmi les restants incluant 0), et c_3 a 7 choix. Soit $4 \times 8 \times 8 \times 7 = 1\,792$ nombres. Total : $504 + 1\,792 = 2\,296$ nombres pairs.

Solution 53.10 1. Équipes sans contrainte : $\binom{14}{5} = \frac{14\times13\times12\times11\times10}{120} = 2\,002$. 2. 3 adultes et 2 jeunes : $\binom{8}{3} \times \binom{6}{2} = 56 \times 15 = 840$. 3. Contraire : équipe uniquement d'adultes ($\binom{8}{5} = 56$) ou uniquement de jeunes ($\binom{6}{5} = 6$). Total mixtes : $2\,002 - (56 + 6) = 1\,940$ équipes.

Solution 53.11 Le mot ANANAS a 6 lettres avec 3 A, 2 N et 1 S. Nombre d'anagrammes = $\frac{6!}{3!\times2!\times1!} = \frac{720}{6\times2} = 60$.

Solution 53.12 Il y a $\binom{n}{2}$ segments reliant deux sommets quelconques. Parmi ces segments, n sont les côtés du polygone. Le nombre de diagonales est donc :

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Solution 53.13 Dans $(3x-2)^8 = \sum_{k=0}^{8}\binom{8}{k}(3x)^k(-2)^{8-k}$, le terme en x^5 correspond à $k = 5$: $\binom{8}{5}(3x)^5(-2)^3 = 56 \times 243x^5 \times (-8) = -108\,864x^5$. Le coefficient est $\mathbf{-108\,864}$.

Solution 53.14 D'après le binôme de Newton, $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$. Pour $x = -1$ et $n \geq 1$:

$$(1 + (-1))^n = 0^n = 0 = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k$$

Solution 53.15 1. Pour chaque élève, 365 dates possibles : 365^{30}. 2. Si toutes les dates sont distinctes : arrangement $A_{365}^{30} = 365 \times 364 \times ... \times 336$. 3. Probabilité que deux élèves au moins partagent leur anniversaire :

$$P = 1 - \frac{A_{365}^{30}}{365^{30}} \approx 1 - 0,2937 = 0,7063 \quad (\approx 70,6\,\%!)$$

Dès 23 personnes, cette probabilité dépasse déjà 50 % !

Solution 53.16 1. Algébriquement :

$$k\binom{n}{k} = k\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n\frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n\binom{n-1}{k-1}.$$

2. Interprétation : On veut former un comité de k personnes parmi n avec un président.

- Méthode A : on choisit d'abord les k membres du comité ($\binom{n}{k}$ façons), puis on choisit le président parmi ces k membres (k façons). Total : $k\binom{n}{k}$.
- Méthode B : on choisit d'abord le président parmi les n candidats (n façons), puis on choisit les $k-1$ membres restants parmi les $n-1$ personnes disponibles ($\binom{n-1}{k-1}$ façons). Total : $n\binom{n-1}{k-1}$. Les deux méthodes dénombrant la même situation, l'égalité est démontrée.

Solution 53.17 En utilisant la relation précédente $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$:

$$S = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n \cdot 2^{n-1}.$$

Solution 53.18 1. Distribuer 10 bonbons à 3 enfants équivaut à placer 10 étoiles et 2 séparateurs (bâtons) parmi $10+2=12$ emplacements : Nombre de façons = $\binom{10+3-1}{3-1} = \binom{12}{2} = 66$. 2. Si chaque enfant doit recevoir au moins un bonbon, on donne d'abord 1 bonbon à chacun (reste 7 bonbons). On distribue les 7 bonbons restants entre les 3 enfants sans contrainte : $\binom{7+3-1}{2} = \binom{9}{2} = 36$.

Solution 53.19 Dans le produit $(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}$, le coefficient de x^p à droite est $\binom{m+n}{p}$. À gauche, un terme en x^p provient du produit d'un terme $\binom{m}{k}x^k$ du premier facteur par un terme $\binom{n}{p-k}x^{p-k}$ du second facteur, pour k allant de 0 à p. La somme de ces produits donne $\sum_{k=0}^{p}\binom{m}{k}\binom{n}{p-k}$. *Justification combinatoire :* Pour choisir p personnes dans un groupe de m hommes et n femmes, on peut choisir k hommes et $p-k$ femmes, pour tout $k \in \{0, ..., p\}$.

Solution 53.20 Dans la formule de Vandermonde avec $m=n$ et $p=n$:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

Or par symétrie, $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$. Donc :

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Solution 53.21 Soit A_i l'ensemble des permutations laissant la i-ème personne avec son propre manteau. On cherche $D_n = n! - |\bigcup_{i=1}^{n} A_i|$. Par le principe d'inclusion-exclusion :

$$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{i}|A_i| - \sum_{i<j}|A_i \cap A_j| + ... + (-1)^{n-1}|A_1 \cap ... \cap A_n|$$

L'intersection de k ensembles A_i correspond aux permutations fixant au moins k éléments précis, soit $(n-k)!$ permutations. Il y a $\binom{n}{k}$ telles intersections. Le terme d'ordre k vaut donc $\binom{n}{k}(n-k)! = \frac{n!}{k!}$. D'où $D_n = n! - \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{n!}{k!} = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$. *(Remarque : quand $n \to \infty$, $D_n/n! \to e^{-1} \approx 36,8\,\%$).*

Solution 53.22 Le nombre total de chemins de $(0,0)$ à (n,n) est $\binom{2n}{n}$. Un chemin qui traverse la droite $y=x$ touche au moins une fois la droite $y=x+1$. Considérons le premier point de contact P avec cette droite. En effectuant une symétrie axiale par rapport à $y=x+1$ de toute la fin du chemin après P, le point d'arrivée (n,n) est envoyé sur le point $(n-1,n+1)$. Cette correspondance est une bijection entre les chemins qui traversent la diagonale et l'ensemble des chemins allant de $(0,0)$ à $(n-1,n+1)$. Le nombre de chemins interdits est donc $\binom{2n}{n-1}$. Le nombre de chemins de Dyck est ainsi :

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \binom{2n}{n} - \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

La question qui ouvre la suite

Nous venons d'apprendre à dénombrer le nombre de façons de choisir k succès parmi n essais : c'est le coefficient binomial $\binom{n}{k}$. Mais que se passe-t-il lorsque chaque tentative individuelle est gouvernée par le hasard, avec une probabilité p de réussir et $1-p$ d'échouer ? Si nous lançons une pièce mille fois, combien de fois la face « Pile » va-t-elle apparaître ? Peut-on être certain que la fréquence se stabilisera autour de $50\,\%$? C'est le saut vertigineux du dénombrement vers la loi binomiale et les grands théorèmes limites : bienvenue dans **le Chapitre 54 et les Mille Lancers de la Pièce**.

CHAPITRE 54 : Les Mille Lancers de la Pièce

> « Si vous lancez une pièce dix fois, le hasard peut vous faire la farce de vous donner dix Piles d'affilée. Mais lancez-la un million de fois : le désordre s'annule, les caprices s'éteignent, et de l'anarchie des lancers émerge une régularité de cristal. La loi des grands nombres n'est pas une contrainte magique imposée à la pièce : c'est la victoire mathématique inévitable de la multitude sur le singulier. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment modéliser la répétition d'expériences aléatoires identiques et indépendantes par le **schéma de Bernoulli**.
- La construction rigoureuse de la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$ et la justification combinatoire de la formule $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
- Les démonstrations exigibles au baccalauréat de l'**espérance** $E(X) = np$ et de la **variance** $V(X) = np(1-p)$ par la décomposition en somme de variables de Bernoulli indépendantes.
- L'**inégalité de Markov** et l'**inégalité de Bienaymé-Tchebychev**, qui bornent la dispersion de n'importe quelle variable aléatoire.
- L'**inégalité de concentration** et la démonstration de la **loi faible des grands nombres** : pourquoi la fréquence observée converge infailliblement vers la probabilité théorique.
- Un script **Python** complet de simulation de 10 000 lancers pour observer visuellement le resserrement autour de la moyenne.

---

1. Le problème : le casino, le sondeur et l'assurance

1.1 La pièce du joueur

Imagine que tu joues à Pile ou Face avec un inconnu dans un train. Tu paries 1 euro sur Face. Au premier lancer : Pile. Tu perds 1 €. Au deuxième lancer : Pile. Tu perds 2 €. Au troisième : Pile. Tu commences à douter. Au dixième lancer consécutif, la pièce affiche encore Pile ! L'inconnu te sourit et dit : *« C'est le hasard, mon ami. Au prochain lancer, Face a même plus de chances de sortir pour compenser ! »* Deux erreurs fatales se cachent dans cette phrase : 1. **L'illusion du joueur (Gambler's fallacy) :** La pièce n'a aucune mémoire de ses lancers antérieurs. À chaque lancer, la probabilité d'avoir Face reste strictement égale à $\frac{1}{2}$. 2. **Le doute légitime :** Obtenir 10 Piles consécutifs avec une pièce équilibrée a une probabilité de $\left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024} \approx 0,00098$, soit moins d'une chance sur mille. La pièce est très probablement pipée !

1.2 Le sondeur et l'assureur

Comment un institut de sondage peut-il connaître l'opinion de 45 millions d'électeurs en interrogeant seulement 1 000 personnes avec une marge d'erreur inférieure à 3 % ? Comment une compagnie d'assurance peut-elle garantir le remboursement des dégâts causés par les incendies alors qu'elle ignore totalement quelle maison va brûler cette année ? Leur secret est identique : **individuellement, le résultat d'un tirage est imprévisible ; collectivement, la moyenne d'un grand nombre de tirages devient d'une certitude quasi absolue.**

Pour passer du caprice de l'essai unique à la certitude de la masse, les mathématiciens ont forgé deux outils monumentaux : la **loi binomiale** et le **théorème des grands nombres**.

---

2. De l'épreuve de Bernoulli à la loi binomiale

2.1 L'épreuve de Bernoulli

Le physicien et mathématicien suisse **Jacques (Jacob) Bernoulli** (1655–1705) s'intéresse à l'expérience aléatoire la plus élémentaire qui soit : celle qui n'a que **deux issues possibles**.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Épreuve de Bernoulli** Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre $p \in]0;1[$ est une expérience aléatoire ne comportant que deux issues contraires :

- L'une appelée conventionnellement **Succès** (notée S), avec la probabilité $P(S) = p$.
- L'autre appelée conventionnellement **Échec** (notée E ou $\overline{S}$), avec la probabilité $P(E) = 1 - p$ (souvent notée q).

La variable aléatoire associée X qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec suit une **loi de Bernoulli** de paramètre p, notée $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Tableau de la loi de Bernoulli : | k | 0 | 1 | |—|—|—| | $P(X = k)$ | $1 - p$ | p |

Calculons immédiatement ses caractéristiques :

- **Espérance :**

$$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$$

- **Variance :** D'après la formule de Koenig-Huygens ($V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$) : Comme X ne prend que les valeurs 0 et 1, on a $X^2 = X$, donc $E(X^2) = E(X) = p$.

$$V(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

- **Écart-type :**

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1-p)}$$

2.2 Le schéma de Bernoulli

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Schéma de Bernoulli** On appelle **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et **indépendantes**, de même paramètre de succès p.

Que signifie l'indépendance ? Le résultat d'une épreuve n'influence en aucun cas les probabilités des épreuves suivantes. Par exemple, des lancers successifs d'une pièce, ou des tirages successifs de boules dans une urne **avec remise**. Si les tirages sont effectués *sans remise*, les épreuves ne sont pas indépendantes : ce n'est pas un schéma de Bernoulli !

2.3 L'arbre pondéré et la loi binomiale

Représentons un schéma de Bernoulli à $n = 3$ essais sur un arbre pondéré :



Fig. 118. – Arbre pondéré du schéma de Bernoulli à 3 épreuves indépendantes

Considérons la variable aléatoire X qui compte le **nombre total de succès** obtenus au bout des n épreuves.

- X peut prendre n'importe quelle valeur entière comprise entre 0 et n.
- Combien vaut la probabilité d'obtenir exactement 2 succès pour $n = 3$? Regardons les chemins menant à 2 succès :
  - $S - S - E$: probabilité $p \times p \times (1-p) = p^2(1-p)$
  - $S - E - S$: probabilité $p \times (1-p) \times p = p^2(1-p)$
  - $E - S - S$: probabilité $(1-p) \times p \times p = p^2(1-p)$ Chaque chemin comportant 2 succès et 1 échec a exactement la même probabilité $p^2(1-p)$. Combien y a-t-il de tels chemins ? Exactement 3 chemins. D'où $P(X=2) = 3 \times p^2(1-p)$. Et que vaut ce nombre 3 ? C'est le nombre de façons de choisir l'emplacement des 2 succès parmi les 3 épreuves, c'est-à-dire $\binom{3}{2} = 3$!

📐 Théorème fondamental — Loi binomiale

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de paramètre p. On dit que X suit la **loi binomiale de paramètres n et p**, notée :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Pour tout entier $k \in \{0, 1, 2, ..., n\}$, la probabilité d'obtenir exactement k succès est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Vérification de la cohérence : La somme de toutes les probabilités doit valoir 1 :

$$\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1.$$

C'est la formule du binôme de Newton du Chapitre 53 ! C'est précisément pour cela que cette loi s'appelle la **loi binomiale**.

3. Espérance et Variance : Les Démonstrations Exigibles

3.1 Somme de variables aléatoires indépendantes

Soient $X_1, X_2, ..., X_n$ les n variables de Bernoulli associées aux n épreuves :

$$X_i = \begin{cases} 1 \text{ si la } \ i \text{ -ième épreuve est un succès} \\ 0 \text{ si c'est un échec} \end{cases}$$

Le nombre total de succès X est tout simplement la somme de ces variables :

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Rappelons deux propriétés générales fondamentales vues en Première : 1. **Linéarité de l'espérance :** Pour toutes variables aléatoires X et Y (qu'elles soient indépendantes ou non) et tout réel a :

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{et} \quad E(aX) = aE(X)$$

2. **Additivité de la variance pour des variables indépendantes :** Si X et Y sont deux variables aléatoires **indépendantes** :

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$$

(Attention : si a est une constante réelle, $V(aX) = a^2V(X)$).

3.2 Démonstration de l'espérance de la loi binomiale

✍ Démonstration exigible — Espérance de la loi binomiale

Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$. On décompose X sous la forme $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$, où les X_i sont n variables de Bernoulli identiques de paramètre p. Pour chaque $i \in \{1, ..., n\}$, on a $E(X_i) = p$. Par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \underbrace{p + p + ... + p}_{n \text{ termes}} = np$$

$$\mathbf{E(X) = np}$$

Sens intuitif : Si tu lances 100 fois une pièce équilibrée ($p = 0,5$), tu t'attends en moyenne à obtenir $100 \times 0,5 = 50$ Piles. Si tu tires 60 fois un dé et que tu gagnes sur un 6 ($p = 1/6$), tu t'attends en moyenne à gagner $60 \times \frac{1}{6} = 10$ fois.

3.3 Démonstration de la variance et de l'écart-type

✍ Démonstration exigible — Variance de la loi binomiale

Puisque les épreuves sont mutuellement indépendantes dans un schéma de Bernoulli, les variables aléatoires $X_1, X_2, ..., X_n$ sont indépendantes. Par additivité de la variance pour des variables indépendantes :

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i)$$

Or pour chaque variable de Bernoulli X_i, on a calculé que $V(X_i) = p(1-p)$. D'où :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} p(1-p) = \underbrace{p(1-p) + ... + p(1-p)}_{n \text{ termes}} = np(1-p)$$

$$\mathbf{V(X) = np(1-p)}$$

L'écart-type est par conséquent :

$$\boldsymbol{\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}}$$

Remarque cruciale sur les ordres de grandeur : - L'espérance $E(X)$ croît proportionnellement à n (en ordre de grandeur n). - L'écart-type $\sigma(X)$ croît seulement comme $\sqrt{n}$.

C'est cette asymétrie entre n et $\sqrt{n}$ qui explique tout le miracle de la stabilisation statistique !

4. Dispersion et Concentration : De Markov à Bienaymé-Tchebychev

Comment mesurer la probabilité qu'une variable aléatoire s'éloigne beaucoup de sa moyenne ?

4.1 L'inégalité de Markov

Le mathématicien russe **Andreï Markov** (1856–1922) a établi une borne universelle pour les variables positives.

📐 Théorème — Inégalité de Markov

Soit Y une variable aléatoire prenant des valeurs positives ou nulles ($Y \geq 0$). Pour tout réel strictement positif $a > 0$:

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$$

✍️ Démonstration au programme — Inégalité de Markov

Soit Y une variable aléatoire discrète prenant les valeurs positives $y_1, y_2, ..., y_m \geq 0$. L'espérance s'écrit :

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{m} y_i P(Y = y_i)$$

Découpons cette somme en deux parties : les valeurs strictement inférieures à a, et celles supérieures ou égales à a :

$$E(Y) = \sum_{y_i < a} y_i P(Y = y_i) + \sum_{y_i \geq a} y_i P(Y = y_i)$$

Puisque toutes les valeurs y_i et les probabilités sont positives ou nulles, la première somme est ≥ 0. Donc :

$$E(Y) \geq \sum_{y_i \geq a} y_i P(Y = y_i)$$

Dans cette seconde somme, chaque terme y_i vérifie $y_i \geq a$. On peut donc minorer chaque y_i par a :

$$E(Y) \geq \sum_{y_i \geq a} a P(Y = y_i) = a \sum_{y_i \geq a} P(Y = y_i) = a P(Y \geq a)$$

Comme $a > 0$, en divisant par a, il vient immédiatement :

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$$

Exemple frappant : Si le revenu moyen d'un pays est de 2 000 € par mois, quelle proportion de la population peut gagner au moins 10 000 € ? Ici $Y \geq 0$, $E(Y) = 2\,000$ et $a = 10\,000$. $P(Y \geq 10\,000) \leq \frac{2\,000}{10\,000} = \frac{1}{5} = 20\,\%$. Il est mathématiquement impossible que plus de 20 % des habitants gagnent plus de 5 fois le salaire moyen !

4.2 L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Le mathématicien français **Irénée-Jules Bienaymé** (1853) et son collègue russe **Pafnouti Tchebychev** (1867) ont eu l'idée géniale d'appliquer l'inégalité de Markov au carré de l'écart à la moyenne : $Y = (X - E(X))^2$.

📐 Théorème fondamental — Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire admettant une espérance $E(X)$ et une variance $V(X)$. Pour tout réel $\varepsilon > 0$ (epsilon) :

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

✍️ Démonstration exigible — Bienaymé-Tchebychev

Soit $\varepsilon > 0$. Remarquons l'équivalence fondamentale entre les événements :

$$|X - E(X)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow (X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2$$

Posons la variable aléatoire $Y = (X - E(X))^2$.

- Y est une variable aléatoire toujours positive ou nulle ($Y \geq 0$).
- Son espérance est par définition la variance de X : $E(Y) = E((X - E(X))^2) = V(X)$.

Appliquons l'inégalité de Markov à la variable positive Y avec le réel $a = \varepsilon^2 > 0$:

$$P(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(Y)}{\varepsilon^2}$$

En remplaçant Y par sa définition et $E(Y)$ par $V(X)$:

$$P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Ce qui donne exactement :

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Signification : La probabilité que la variable X s'écarte de son espérance d'au moins ε est plafonnée par un terme qui dépend directement de la variance et décroît très vite (comme l'inverse du carré de la distance ε^2).

---

5. La Loi Faible des Grands Nombres

5.1 La moyenne empirique d'un échantillon

Considérons n variables aléatoires indépendantes $X_1, X_2, ..., X_n$ ayant **la même loi**, la même espérance $\mu = E(X_1)$ et la même variance $\sigma^2 = V(X_1)$. On appelle **moyenne empirique** la variable aléatoire :

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Calculons l'espérance et la variance de cette moyenne :

- **Espérance de M_n :**

$$E(M_n) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu$$

  La moyenne empirique est **sans biais** : en moyenne, elle vise exactement la valeur théorique μ.

- **Variance de M_n :** Par indépendance des variables X_i et en sortant le facteur $\frac{1}{n}$ au carré :

$$V(M_n) = V\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} V(X_i) = \frac{1}{n^2} \times n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Regarde bien cette fraction :

$$V(M_n) = \frac{V(X_1)}{n}$$

Quand la taille de l'échantillon n devient géante, **la variance de la moyenne s'écrase vers zéro** !

5.2 L'inégalité de concentration

📐 Théorème — Inégalité de concentration

Pour tout réel $\varepsilon > 0$:

$$P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2}$$

Démonstration : Il suffit d'appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à la variable M_n :

$$P(|M_n - E(M_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(M_n)}{\varepsilon^2}$$

En remplaçant $E(M_n) = \mu$ et $V(M_n) = \frac{V(X_1)}{n}$, on obtient la formule.

5.3 Démonstration de la Loi Faible des Grands Nombres

✍️ Démonstration exigible — Loi faible des grands nombres

Soit $\varepsilon > 0$, fixé aussi petit que l'on veut (par exemple $\varepsilon = 0,001$). L'inégalité de concentration nous garantit que :

$$0 \leq P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2}$$

Lorsque n tend vers $+\infty$, le numérateur $V(X_1)$ et ε^2 restent des constantes fixes. Donc :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2} = 0$$

Par le théorème des gendarmes (théorème d'encadrement) :

$$\boxed{\lim_{\mathbf{n \to +\infty}} \mathbf{P}(|\mathbf{M_n - \mu}| \geq \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}}$$

Ou, de manière équivalente pour l'événement contraire :

$$\boxed{\lim_{\mathbf{n \to +\infty}} \mathbf{P}(|\mathbf{M_n - \mu}| < \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{1}}$$

Traduction philosophique et pratique : Quelle que soit la marge d'erreur $\varepsilon > 0$, aussi minuscule soit-elle, dès que l'échantillon n est suffisamment grand, la probabilité que la moyenne des observations soit dans l'intervalle $]\mu - \varepsilon ; \mu + \varepsilon[$ tend vers 100 %. Dans le cas particulier de lancers d'une pièce où $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, $M_n = \frac{X}{n} = F_n$ est la **fréquence observée** de succès. La fréquence observée d'un événement converge donc mathématiquement vers sa probabilité théorique p !

---

6. Simulation Python : 10 000 lancers sous les yeux

Pour éprouver ce théorème, écrivons un programme Python qui simule $N = 10\,000$ lancers d'une pièce équilibrée ($p = 0,5$) et enregistre l'évolution de la fréquence de Pile au fur et à mesure :

```python
import random

def simulation_lancers(n):
    succes = 0
    historique_frequences = []

    for i in range(1, n + 1):
        # 1 = Pile (succès), 0 = Face (échec)
        tirage = random.choice([0, 1])
        succes += tirage
        frequence = succes / i
        historique_frequences.append((i, frequence))

    return historique_frequences

# Exemple d'exécution
resultats = simulation_lancers(10000)

# Affichage de quelques étapes clés
jalons = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000]
print(f"{'Lancers (n)':<12} | {'Fréquence Pile':<15} | {'Écart à 0.5':<12}")
print("-" * 45)
for jalon in jalons:
    freq = resultats[jalon - 1][1]
    ecart = abs(freq - 0.5)
    print(f"{jalon:<12} | {freq:<15.4f} | {ecart:<12.4f}")
```

Exemple typique de sortie console :

Lancers (n)	Fréquence Pile	Écart à 0.5
10	0.7000	+0.2000
50	0.4400	+0.0600
100	0.5300	+0.0300
500	0.4880	+0.0120
1 000	0.5040	+0.0040
5 000	0.4982	+0.0018
10 000	0.5007	+0.0007

Au début (10 lancers), la fréquence oscille sauvagement (de 0,30 à 0,70). Vers 1 000 lancers, elle reste enfermée à moins de 1 % de 0,5. À 10 000 lancers, la précision atteint le millième ! Le tourbillon aléatoire s'est cristallisé.

Découverte & Histoire

🔍 **L'histoire vraie — La Planche de Galton et la courbe en cloche** En 1877, le savant britannique Francis Galton imagine une machine physique fascinante pour matérialiser la convergence de la loi binomiale : **le quincunx** (ou **planche de Galton**). Des billes d'acier tombent une à une à travers un réseau triangulaire de clous. À chaque clou rencontré, la bille a exactement une chance sur deux de dévier à droite (S) ou à gauche (E). Au bas de la planche, les billes s'accumulent dans des colonnes verticales : le tas central s'élève majestueusement tandis que les extrémités s'amenuisent, dessinant avec une régularité physique stupéfiante la courbe en cloche de Gauss.



Fig. 119. – La Planche de Galton : matérialisation physique de la convergence du triangle de Pascal vers la courbe en cloche de Gauss

---

7. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Contrôle de qualité industriel

Une usine fabrique des ampoules LED. La probabilité qu'une ampoule soit défectueuse est $p = 0,02$. On prélève au hasard un lot de $n = 100$ ampoules. La production est suffisamment massive pour assimiler ce tirage à un tirage avec remise. Soit X le nombre d'ampoules défectueuses dans le lot. 1. Justifier la loi suivie par X et donner ses paramètres. 2. Calculer l'espérance et l'écart-type de X. 3. Calculer la probabilité d'avoir exactement 2 ampoules défectueuses. 4. Calculer la probabilité d'avoir au moins une ampoule défectueuse.

Solution détaillée : 1. L'expérience consiste en la répétition de $n = 100$ épreuves identiques (tester une ampoule) à deux issues :

- Succès S : « l'ampoule est défectueuse », de probabilité $p = 0,02$.
- Échec $\overline{S}$: « l'ampoule fonctionne », de probabilité $1 - p = 0,98$. Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les épreuves sont indépendantes. La variable aléatoire X compte le nombre total de succès. Donc X suit la **loi binomiale** de paramètres $n = 100$ et $p = 0,02$: $X \sim \mathcal{B}(100; 0,02)$.

2. • Espérance : $E(X) = np = 100 \times 0,02 = 2$. En moyenne, un lot de 100 ampoules compte 2 ampoules défectueuses.
   - Variance : $V(X) = np(1-p) = 100 \times 0,02 \times 0,98 = 1,96$.
   - Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{1,96} = 1,4$.
3. Probabilité d'avoir exactement 2 défectueuses :

$$P(X = 2) = \binom{100}{2} (0,02)^2 (0,98)^{98}$$

Or $\binom{100}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4\,950$. $(0,02)^2 = 0,0004$. $(0,98)^{98} \approx 0,1380$.

$$P(X = 2) = 4\,950 \times 0,0004 \times 0,1380 \approx 0,2734 \quad (\approx 27,3\,\%).$$

4. « Au moins une défectueuse » correspond à $X \geq 1$. L'événement contraire est « aucune défectueuse », soit $X = 0$.

$$P(X = 0) = \binom{100}{0} (0,02)^0 (0,98)^{100} = 1 \times 1 \times (0,98)^{100} \approx 0,1326.$$

D'où :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,98)^{100} \approx 1 - 0,1326 = 0,8674 \quad (\approx 86,7\,\%).$$

Exemple 2 : QCM au hasard

Un candidat se présente à un examen sans avoir révisé. Le test est un questionnaire à choix multiples (QCM) de 10 questions indépendantes. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Le candidat coche une case au hasard pour chaque question. Pour être reçu, il faut obtenir au moins 6 bonnes réponses. Quelle est la probabilité que le candidat réussisse l'examen ?

Solution détaillée : Soit X le nombre de réponses exactes. Les 10 questions sont indépendantes avec $p = \frac{1}{4} = 0,25$. Donc $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$. Le candidat réussit si $X \geq 6$.

$$P(X \geq 6) = P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$$

Calculons chaque terme :

- $P(X = 6) = \binom{10}{6}(0,25)^6(0,75)^4 = 210 \times \frac{1}{4096} \times \frac{81}{256} = \frac{17\,010}{1\,048\,576} \approx 0,01622$
- $P(X = 7) = \binom{10}{7}(0,25)^7(0,75)^3 = 120 \times \frac{1}{16384} \times \frac{27}{64} = \frac{3\,240}{1\,048\,576} \approx 0,00309$
- $P(X = 8) = \binom{10}{8}(0,25)^8(0,75)^2 = 45 \times \frac{1}{65536} \times \frac{9}{16} = \frac{405}{1\,048\,576} \approx 0,000386$
- $P(X = 9) = \binom{10}{9}(0,25)^9(0,75)^1 = 10 \times \frac{3}{1\,048\,576} \approx 0,000029$
- $P(X = 10) = \binom{10}{10}(0,25)^{10}(0,75)^0 = \frac{1}{1\,048\,576} \approx 0,000001$

En sommant ces probabilités :

$$P(X \geq 6) \approx 0,01622 + 0,00309 + 0,00039 + 0,00003 + 0,000001 = 0,01973 \approx 1,97\,\%.$$

Le candidat a moins de 2 % de chances d'être admis au pur hasard.

Exemple 3 : Surréservation d'une compagnie aérienne (Overbooking)

Un avion dispose de 200 places. Une compagnie aérienne sait par expérience que 5 % des passagers ayant acheté un billet ne se présentent pas à l'embarquement ($p_{\text{présence}} = 0,95$). La compagnie vend $n = 205$ billets. 1. Quelle est la probabilité que tous les passagers qui se présentent aient un siège ? 2. Quelle est la probabilité que la compagnie se retrouve en situation de surréservation critique (au moins un passager sans siège) ?

Solution détaillée : 1. Soit Y le nombre de passagers qui se présentent à l'embarquement parmi les 205 acheteurs. En supposant les comportements des passagers indépendants, $Y \sim \mathcal{B}(205; 0,95)$. Tous les passagers qui se présentent ont un siège si et seulement si $Y \leq 200$. La probabilité contraire est $P(Y > 200) = P(Y = 201) + P(Y = 202) + P(Y = 203) + P(Y = 204) + P(Y = 205)$. Calculons ces 5 termes :

- $P(Y = 205) = (0,95)^{205} \approx 0,000025$

- $P(Y = 204) = 205 \times (0,95)^{204} \times 0,05 \approx 0,000270$
- $P(Y = 203) = \binom{205}{2}(0,95)^{203}(0,05)^2 = 20\,910 \times (0,95)^{203} \times 0,0025 \approx 0,00144$
- $P(Y = 202) = \binom{205}{3}(0,95)^{202}(0,05)^3 \approx 0,0051$
- $P(Y = 201) = \binom{205}{4}(0,95)^{201}(0,05)^4 \approx 0,0133$ Somme des cas critiques :

$$P(Y > 200) \approx 0,0133 + 0,0051 + 0,0014 + 0,0003 + 0,0000 = 0,0201 \approx 2,01\,\%.$$

2. La probabilité d'un problème de surréservation est d'environ $2,0\,\%$. La probabilité que tout se passe bien est donc d'environ $1 - 0,0201 = 0,9799$, soit près de $98\,\%$.

Exemple 4 : Dimensionnement d'échantillon par Bienaymé-Tchebychev

On lance une pièce de monnaie équilibrée de paramètre $p = 0,5$. On note $F_n = \frac{X}{n}$ la fréquence observée de Pile sur n lancers. On souhaite que la probabilité que la fréquence s'écarte de 0,5 de plus de 0,02 soit inférieure à 0,05 (soit au plus 5 % de risque d'erreur supérieure à 2 centièmes). Déterminer, à l'aide de l'inégalité de concentration, un nombre de lancers n garantissant cette précision.

Solution détaillée : Ici, $X_1 \sim \mathcal{B}(0,5)$, donc $\mu = 0,5$ et $V(X_1) = p(1-p) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$. La marge d'erreur tolérée est $\varepsilon = 0,02$. D'après l'inégalité de concentration appliquée à $M_n = F_n$:

$$P(|F_n - 0,5| \geq 0,02) \leq \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2} = \frac{0,25}{n \times (0,02)^2} = \frac{0,25}{n \times 0,0004} = \frac{625}{n}$$

Nous voulons que ce risque soit majoré par $0,05 = \frac{1}{20}$:

$$\frac{625}{n} \leq 0,05 \Leftrightarrow n \geq \frac{625}{0,05} = 12\,500.$$

Il suffit donc de réaliser $12\,500$ lancers pour être absolument certain, sans aucune hypothèse supplémentaire, que le risque d'écart supérieur à 0,02 ne dépasse pas 5 %. *(Remarque : Bienaymé-Tchebychev étant universelle, cette borne est très prudente. Avec la loi normale du supérieur, environ 2 500 lancers suffiraient).*

Exemple 5 : Test de dépistage médical en population

Un test de dépistage rapide a une probabilité de faux positif de $1\,\%$ ($p = 0,01$). On teste un groupe de 500 personnes saines. Soit X le nombre de faux positifs observés. 1. Déterminer $E(X)$ et $V(X)$. 2. Donner une borne supérieure de $P(|X - 5| \geq 4)$ à l'aide de Bienaymé-Tchebychev.

Solution détaillée : 1. $X \sim \mathcal{B}(500; 0,01)$.

- $E(X) = np = 500 \times 0,01 = 5$.
- $V(X) = np(1-p) = 500 \times 0,01 \times 0,99 = 4,95$.

2. L'espérance étant $E(X) = 5$, l'expression $|X - 5| \geq 4$ correspond à un écart $\varepsilon = 4$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|X - 5| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{4,95}{16} \approx 0,3094.$$

La probabilité d'avoir moins de 1 faux positif ou au moins 9 faux positifs est donc garantie inférieure à $31\,\%$.

Exemple 6 : Somme de deux variables binomiales indépendantes

Deux chaînes de fabrication indépendantes A et B produisent des pièces.

- La chaîne A produit 50 pièces par heure, avec une probabilité de défaut de $0,03$. Soit X_A le nombre de pièces défectueuses de la chaîne A : $X_A \sim \mathcal{B}(50; 0,03)$.
- La chaîne B produit 70 pièces par heure, avec une probabilité de défaut de $0,03$. Soit X_B le nombre de pièces défectueuses de la chaîne B : $X_B \sim \mathcal{B}(70; 0,03)$.

Soit $S = X_A + X_B$ le nombre total de pièces défectueuses produites en une heure par l'atelier. 1. Déterminer la loi de S. 2. Calculer $E(S)$ et $V(S)$.

Solution détaillée : 1. Chaque pièce de la chaîne A subit une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,03$. Il y en a 50 indépendantes. Chaque pièce de la chaîne B subit la même épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,03$. Il y en a 70 indépendantes. Puisque les deux chaînes sont indépendantes et que **le paramètre de succès p est identique**, la somme $S = X_A + X_B$ représente le nombre total de succès lors de $50 + 70 = 120$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $0,03$. Par conséquent :

$$S \sim \mathcal{B}(120; 0,03)$$

(Attention capitale : cette propriété de stabilité de la loi binomiale n'est vraie que si le paramètre p est le même pour les deux variables !) 2. - $E(S) = np = 120 \times 0,03 = 3,6$.

• $V(S) = np(1-p) = 120 \times 0,03 \times 0,97 = 3,492$.

Ce qu'il faut retenir

1. **Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$:**
   - 2 issues : Succès ($X=1$, probabilité p), Échec ($X=0$, probabilité $1-p$).
   - $E(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$.
2. **Loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$:**
   - Répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.
   - Formule : $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
   - Espérance : $E(X) = np$.
   - Variance : $V(X) = np(1-p)$; Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.
3. **Inégalités universelles :**
   - **Markov :** Si $Y \geq 0$ et $a > 0$, alors $P(Y \geq a) \leq \frac{E(Y)}{a}$.
   - **Bienaymé-Tchebychev :** Pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$.
   - **Concentration :** Pour la moyenne empirique M_n, $P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X_1)}{n\varepsilon^2}$.
4. **Loi faible des grands nombres :**
   - $\lim_{n \to +\infty} P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$.
   - La fréquence expérimentale converge infailliblement vers la probabilité théorique lorsque le nombre d'essais tend vers l'infini.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 54.1 Soit $X \sim \mathcal{B}(6; 0,3)$. 1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$. 2. Calculer la probabilité exacte $P(X=2)$. 3. Exprimer $P(X \geq 1)$ et calculer sa valeur arrondie à 10^{-4}.

Exercice 54.2 On lance 8 fois de suite une pièce équilibrée. Soit X le nombre de faces « Pile » obtenues. 1. Quelle est la loi suivie par X ? 2. Calculer $P(X=4)$.

Exercice 54.3 Un archer tire 5 flèches sur une cible. À chaque tir, la probabilité d'atteindre le centre est $p = 0,7$. On suppose les tirs indépendants. Calculer la probabilité que l'archer atteigne le centre : 1. Exactement 5 fois. 2. Au moins une fois.

Exercice 54.4 Une variable aléatoire positive $Y \geq 0$ vérifie $E(Y) = 12$. À l'aide de l'inégalité de Markov, majorer la probabilité $P(Y \geq 60)$.

Exercice 54.5 Une variable aléatoire X a pour espérance $E(X) = 50$ et pour variance $V(X) = 8$. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, majorer la probabilité $P(|X - 50| \geq 6)$.

Exercice 54.6 Vrai ou Faux ? Justifier. 1. Si on lance 100 fois une pièce, la probabilité d'avoir exactement 50 Piles est égale à 0,5. 2. Si $X \sim \mathcal{B}(10; 0,4)$, alors $P(X \leq 9) = 1 - (0,4)^{10}$. 3. Pour toute variable aléatoire, $P(|X - E(X)| \geq 3\sigma) \leq \frac{1}{9}$.

Exercice 54.7 Une urne contient 3 boules blanches et 7 boules noires. On effectue 4 tirages successifs **avec remise**. Soit X le nombre de boules blanches obtenues. Donner la loi de X, son espérance et la probabilité d'avoir exactement 1 boule blanche.

Niveau (Réflexion et calculs de baccalauréat)

Exercice 54.8 Un traitement médical guérit une maladie dans $80\,\%$ des cas. On applique ce traitement à un groupe de 20 malades indépendants. Soit X le nombre de guérisons. 1. Calculer la probabilité qu'exactement 16 malades guérissent. 2. Calculer la probabilité qu'au moins 18 malades guérissent.

Exercice 54.9 On lance n fois un dé équilibré à 6 faces. On note A l'événement : « obtenir au moins un 6 ». Combien de fois au minimum faut-il lancer le dé pour que la probabilité d'obtenir au moins un 6 soit supérieure ou égale à 0,99 ?

Exercice 54.10 Inégalité de concentration pour un sondage. On interroge n personnes choisies au hasard pour connaître la proportion p d'électeurs favorables à un projet. On note F_n la fréquence observée dans l'échantillon. 1. Rappeler pourquoi $V(X_1) = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0;1]$. 2. En déduire que $P(|F_n - p| \geq 0,05) \leq \frac{100}{n}$. 3. Quelle taille d'échantillon n permet de garantir que la fréquence observée ne s'écarte pas de plus de 0,05 de la vraie proportion avec un risque inférieur à 1 % ?

Exercice 54.11 Mode de la loi binomiale. Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$. 1. Montrer que le rapport $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}$ vaut $\frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}$. 2. En déduire pour quelle(s) valeur(s) de k la probabilité $P(X=k)$ est maximale.

Exercice 54.12 Un serveur informatique traite 1 000 requêtes par minute. La durée de traitement de chaque requête est une variable aléatoire indépendante d'espérance $\mu = 40$ ms et d'écart-type $\sigma = 15$ ms. Majorer la probabilité que la durée moyenne des 1 000 requêtes s'écarte de 40 ms de plus de 2 ms.

Exercice 54.13 Deux variables $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1,p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2,p)$ sont indépendantes. Démontrer algébriquement, en utilisant la formule de Vandermonde du Chapitre 53, que $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1+n_2,p)$.

Exercice 54.14 Loi géométrique tronquée (temps du premier succès). On répète de manière indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p. Soit T le rang du premier succès. 1. Pour tout entier $k \geq 1$, déterminer $P(T=k)$. 2. Calculer $P(T > k)$ de manière directe et combinatoire. 3. Vérifier que $\sum_{k=1}^{+\infty} P(T=k) = 1$.

Exercice 54.15 Fluctuation de l'écart absolu. Soit $X \sim \mathcal{B}(n; 0,5)$. Démontrer que $P(|X - 0,5n| \geq a\sqrt{n}) \leq \frac{1}{4a^2}$. En déduire l'ordre de grandeur des fluctuations autour de la moyenne.

Niveau (Approfondissements et concours)

Exercice 54.16 Démonstration directe de l'espérance sans décomposition. Retrouver la formule $E(X) = np$ pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ par le calcul direct de la somme :

$$E(X) = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

(Indication : utiliser la formule du comité $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ vue au Chapitre 53).

Exercice 54.17 Démonstration directe de la variance par calcul de somme. 1. Calculer de même la quantité $E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. 2. En déduire la valeur de $E(X^2)$, puis retrouver $V(X) = np(1-p)$.

Exercice 54.18 Règle de succession de Laplace. On a tiré n boules d'une urne avec remise, et obtenu k succès. Quelle est la probabilité que le prochain tirage soit un succès si la composition initiale de l'urne était totalement inconnue ? Montrer que l'estimation bayésienne uniforme mène à la formule de Laplace :

$$P(S_{n+1}) = \frac{k+1}{n+2}$$

Comparer avec l'estimation naïve $\frac{k}{n}$ pour $k=0$ et $k=n$.

Exercice 54.19 Inégalité de Cantelli (Bienaymé-Tchebychev unilatérale). Soit X une variable aléatoire d'espérance 0 et de variance σ^2. Démontrer que pour tout réel $a > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

(Indication : pour tout $t > 0$, considérer la variable $(X+t)^2$ et optimiser le choix de t).

Exercice 54.20 L'aiguille de Buffon et Monte-Carlo. Un plan est strié de lignes parallèles distantes d'une largeur D. On y jette au hasard une aiguille de longueur $L \leq D$. 1. Sachant que la probabilité d'intersection est $p = \frac{2L}{\pi D}$, expliquer comment estimer la constante π par simulation informatique. 2. Si l'on réalise n lancers indépendants, déterminer à l'aide de l'inégalité de concentration le nombre de lancers nécessaires pour obtenir une précision de 0,01 sur π avec un niveau de confiance garanti.

Exercice 54.21 Paradoxe du vote et théorème du jury de Condorcet. Un jury de n jurés indépendants (n impair, $n = 2m+1$) doit trancher par vote majoritaire entre coupable et non coupable. Chaque juré a une probabilité individuelle $p > 0,5$ de prendre la bonne décision. 1. Exprimer la probabilité P_n que la majorité du jury prenne la bonne décision. 2. Démontrer que $P_n > p$ et que $\lim_{n\to+\infty} P_n = 1$. Interpréter ce résultat pour la démocratie et les jurys d'assises.

Exercice 54.22 Convergence presque sûre et loi forte des grands nombres (Aperçu). Expliquer la différence conceptuelle entre la loi faible des grands nombres (qui affirme la convergence en probabilité $\lim P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$) et la loi forte d'Émile Borel et Kolmogorov (qui affirme que la trajectoire des fréquences converge vers μ avec probabilité 1).

Solutions

Solution 54.1 1. $E(X) = np = 6 \times 0,3 = 1,8$. $V(X) = np(1-p) = 6 \times 0,3 \times 0,7 = 1,26$. 2. $P(X=2) = \binom{6}{2}(0,3)^2(0,7)^4 = 15 \times 0,09 \times 0,2401 = 0,3241$. 3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \binom{6}{0}(0,3)^0(0,7)^6 = 1 - (0,7)^6 = 1 - 0,117649 = 0,8824$.

Solution 54.2 1. Répétition de 8 épreuves de Bernoulli indépendantes avec $p = 0,5$. Donc $X \sim \mathcal{B}(8; 0,5)$. 2. $P(X = 4) = \binom{8}{4}(0,5)^4(0,5)^4 = 70 \times (0,5)^8 = \frac{70}{256} = \frac{35}{128} \approx 0,2734$.

Solution 54.3 $X \sim \mathcal{B}(5; 0,7)$. 1. $P(X=5) = (0,7)^5 = 0,16807$. 2. $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - (0,3)^5 = 1 - 0,00243 = 0,99757$.

Solution 54.4 Par l'inégalité de Markov : $P(Y \geq 60) \leq \frac{E(Y)}{60} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5} = 0,20$.

Solution 54.5 Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - 50| \geq 6) \leq \frac{V(X)}{6^2} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0,222$.

Solution 54.6 1. **Faux.** Pour $n = 100$ et $p = 0,5$, $P(X = 50) = \binom{100}{50}(0,5)^{100} \approx 0,0796$ (environ 8 %). La valeur moyenne est 50, mais la probabilité d'y tomber pile est dispersée sur les valeurs voisines. 2. **Faux.** $P(X \leq 9) = 1 - P(X = 10) = 1 - \binom{10}{10}(0,4)^{10}(0,6)^0 = 1 - (0,4)^{10}$. Donc l'affirmation est **Vraie** ! 3. **Vrai.** Pour $\varepsilon = 3\sigma$, $P(|X - E(X)| \geq 3\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$.

Solution 54.7 Tirage avec remise : $p = \frac{3}{10} = 0,3$. $n = 4$ épreuves indépendantes. $X \sim \mathcal{B}(4; 0,3)$. $E(X) = 4 \times 0,3 = 1,2$. $P(X=1) = \binom{4}{1}(0,3)^1(0,7)^3 = 4 \times 0,3 \times 0,343 = 0,4116$.

Solution 54.8 $X \sim \mathcal{B}(20; 0,8)$. 1. $P(X=16) = \binom{20}{16}(0,8)^{16}(0,2)^4 = 4\,845 \times (0,8)^{16} \times (0,2)^4 \approx 0,2182$. 2. $P(X \geq 18) = P(X=18) + P(X=19) + P(X=20)$.

- $P(X=18) = \binom{20}{18}(0,8)^{18}(0,2)^2 = 190 \times (0,8)^{18} \times 0,04 \approx 0,1369$
- $P(X=19) = 20 \times (0,8)^{19} \times 0,2 \approx 0,0576$
- $P(X=20) = (0,8)^{20} \approx 0,0115$ Total : $P(X \geq 18) \approx 0,1369 + 0,0576 + 0,0115 = 0,2060 \quad (\approx 20,6\,\%)$.

Solution 54.9 La probabilité de n'obtenir aucun 6 en n lancers est $(5/6)^n$. On veut $P(A) = 1 - (5/6)^n \geq 0,99 \Leftrightarrow (5/6)^n \leq 0,01$. En appliquant le logarithme népérien ($\ln(5/6) < 0$, l'inégalité change de sens) : $n \ln(5/6) \leq \ln(0,01) \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(5/6)} \approx \frac{-4,60517}{-0,18232} \approx 25,26$. Il faut au minimum **26 lancers**.

Solution 54.10 1. Pour la fonction $f(p) = p(1-p) = p - p^2$, sa dérivée $f'(p) = 1 - 2p$ s'annule en $p = 0,5$, où elle atteint son maximum $f(0,5) = 0,25 = \frac{1}{4}$. 2. Par l'inégalité de concentration avec $\varepsilon = 0,05$: $P(|F_n - p| \geq 0,05) \leq \frac{V(X_1)}{n(0,05)^2} \leq \frac{0,25}{n \times 0,0025} = \frac{100}{n}$. 3. On veut $\frac{100}{n} \leq 0,01 \Leftrightarrow n \geq \frac{100}{0,01} = 10\,000$. Un échantillon de 10 000 personnes garantit ce résultat.

Solution 54.11 1. $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}p^{k+1}(1-p)^{n-k-1}}{\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}} = \frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}$. 2. Le rapport est ≥ 1 tant que $(n-k)p \geq (k+1)(1-p) \Leftrightarrow np - kp \geq k - kp + 1 - p \Leftrightarrow np + p - 1 \geq k \Leftrightarrow k \leq (n+1)p - 1$. La suite des probabilités est donc d'abord croissante, puis décroissante. Le mode (maximum) est atteint pour l'entier $k = \lfloor (n+1)p \rfloor$.

Solution 54.12 Pour $n = 1000$ requêtes, la durée moyenne M_n a pour espérance $\mu = 40$ et pour variance $V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{15^2}{1000} = \frac{225}{1000} = 0,225$. Par Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 2$: $P(|M_n - 40| \geq 2) \leq \frac{V(M_n)}{2^2} = \frac{0,225}{4} = 0,05625$ (moins de $5,6\,\%$).

Solution 54.13 Pour tout $k \in \{0, \ldots, n_1 + n_2\}$, l'événement $(X_1 + X_2 = k)$ est l'union disjointe des événements $(X_1 = j \text{ et } X_2 = k - j)$ pour $j \in \{0, \ldots, k\}$. Par indépendance :

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{j=0}^{k} \binom{n_1}{j} p^j (1-p)^{n_1 - j} \binom{n_2}{k-j} p^{k-j} (1-p)^{n_2 - (k-j)} = p^k (1-p)^{n_1 + n_2 - k} \sum_{j=0}^{k} \binom{n_1}{j}\binom{n_2}{k-j}$$

D'après la formule de Vandermonde, la somme vaut $\binom{n_1+n_2}{k}$. On reconnaît immédiatement la formule d'une loi $\mathcal{B}(n_1+n_2,p)$.

Solution 54.14 1. $T=k$ signifie $k-1$ échecs consécutifs suivis d'un succès : $P(T=k)=(1-p)^{k-1}p$. 2. $T>k$ signifie que les k premières épreuves ont toutes été des échecs : $P(T>k)=(1-p)^k$. 3. $\sum_{k=1}^{+\infty}p(1-p)^{k-1}=p\sum_{j=0}^{+\infty}(1-p)^j=p\frac{1}{1-(1-p)}=\frac{p}{p}=1$.

Solution 54.15 Pour $X\sim\mathcal{B}(n;0,5)$, $E(X)=0,5n$ et $V(X)=0,25n$. Appliquons Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon=a\sqrt{n}$: $P(|X-0,5n|\geq a\sqrt{n})\leq\frac{V(X)}{(a\sqrt{n})^2}=\frac{0,25n}{a^2n}=\frac{1}{4a^2}$. L'écart typique entre le nombre de succès et sa moyenne est donc de l'ordre de grandeur de $\sqrt{n}$.

Solution 54.16 $E(X)=\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. Or $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$.

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}n\binom{n-1}{k-1}p\cdot p^{k-1}(1-p)^{(n-1)-(k-1)}=np\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}p^j(1-p)^{n-1-j}=np(p+(1-p))^{n-1}=np.$$

Solution 54.17 1. $k(k-1)\binom{n}{k}=k(k-1)\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n!}{(k-2)!(n-k)!}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$. En sommant pour $k\geq 2$: $E(X(X-1))=n(n-1)p^2\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j}p^j(1-p)^{n-2-j}=n(n-1)p^2$. 2. $E(X^2)=E(X(X-1))+E(X)=n(n-1)p^2+np=n^2p^2-np^2+np$. $V(X)=E(X^2)-(E(X))^2=(n^2p^2-np^2+np)-(np)^2=np(1-p)$.

Solution 54.18 Sous une loi a priori uniforme sur le paramètre inconnu $p\in[0,1]$, la probabilité conditionnelle s'écrit à l'aide de la fonction Bêta : $P(S_{n+1}\mid k\ \text{ succès sur }\ n)=\frac{\int_0^1 p\cdot p^k(1-p)^{n-k}dp}{\int_0^1 p^k(1-p)^{n-k}dp}=\frac{B(k+2,n-k+1)}{B(k+1,n-k+1)}=\frac{k+1}{n+2}$. Pour $k=0$ (aucun succès sur 10 essais), l'estimation naïve donne 0, alors que Laplace donne $\frac{1}{12}\approx 8,3\,\%$, évitant l'arrogance d'affirmer l'impossibilité d'un événement jamais encore observé.

Solution 54.19 Pour tout $t>0$, l'événement $X\geq a$ équivaut à $X+t\geq a+t$, ce qui implique $(X+t)^2\geq(a+t)^2$. Par Markov sur $(X+t)^2\geq 0$: $P(X\geq a)\leq\frac{E((X+t)^2)}{(a+t)^2}=\frac{E(X^2)+2tE(X)+t^2}{(a+t)^2}=\frac{\sigma^2+t^2}{(a+t)^2}$. En minimisant cette fonction par rapport à $t>0$, la dérivée s'annule pour $t=\frac{\sigma^2}{a}$. En substituant cette valeur optimale, on obtient exactement $P(X\geq a)\leq\frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2}$.

Solution 54.20 1. Si on lance n aiguilles et qu'on compte X intersections, la fréquence $F_n=\frac{X}{n}$ converge vers $p=\frac{2L}{\pi D}$. Une estimation de π est donc $\hat{\pi}_n=\frac{2L}{D\cdot F_n}$. 2. Par l'inégalité de concentration, comme $V(X_1)\leq 1/4$, on majore la variance de la fréquence par $\frac{1}{4n}$. Pour obtenir une précision donnée sur p, on résout $\frac{1}{4n\varepsilon^2}\leq\alpha$, ce qui donne un nombre fini de lancers n garantissant le résultat.

Solution 54.21 1. La majorité est atteinte dès que $k\geq m+1=\frac{n+1}{2}$. Donc $P_n=\sum_{k=m+1}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. 2. D'après la loi des grands nombres, lorsque $n\to+\infty$, la fréquence de votes corrects converge vers $p>0,5$. La probabilité que la majorité vote correctement tend donc vers 1. Ce théorème fonde la justification mathématique de la délibération collective : un grand groupe d'individus faillibles mais moyennement éclairés ($p>0,5$) prend une décision quasi parfaite à la majorité.

Solution 54.22 La loi faible indique que pour une taille d'échantillon n fixée arbitrairement grande, la probabilité d'un écart ponctuel est infime. La loi forte garantit un résultat infiniment plus puissant : avec une probabilité égale à 1, la suite infinie entière des moyennes $(M_n)_{n\geq 1}$ converge vers μ, ce qui interdit toute résurgence infinie de déviations.

La question qui ouvre la suite

Nous venons de voir comment les lois statistiques gouvernent le monde réel des lancers de pièces et des mesures d'échantillons. Mais que se passe-t-il lorsque l'algèbre elle-même se heurte à un mur absolu ? Rappelle-toi l'équation $x^2=-1$: aucun nombre réel, aucun décompte de cailloux, aucune probabilité ne peut avoir un carré négatif. Et pourtant, au XVI$^{\text{e}}$ siècle, en tentant de résoudre de simples équations du troisième degré dont les solutions étaient d'évidents nombres entiers, des savants italiens ont été forcés d'inventer un nombre fantôme. Un nombre capable de faire pivoter le monde d'un quart de tour à angle droit. Bienvenue dans le monde fascinant des nombres complexes : tourne la page pour découvrir **le Chapitre 55 et le Tourbillon à Angle Droit**.

CHAPITRE 55 : Le Tourbillon à Angle Droit

> « Pendant des siècles, on a répété aux écoliers que la racine carrée de moins un était un monstre impossible, une chimère d'alchimiste. Mais regarde la girouette sur le toit : quand le vent tourne de quatre-vingt-dix degrés, le monde ne s'effondre pas, il s'ouvre. Ce que l'algèbre croyait interdit sur la ligne droite, la géométrie du plan le réalise dans la lumière. Les nombres complexes ne sont pas imaginaires : ils sont la respiration du plan. »

Ce que tu vas découvrir

- L'histoire vraie de la Renaissance italienne : comment Jérôme Cardan et Rafael Bombelli ont été contraints d'inventer $\sqrt{-1}$ pour trouver des solutions pourtant bien réelles.
- L'illumination d'Argand et de Gauss : multiplier par i, c'est tout simplement **pivoter d'un quart de tour (90°)**.
- La **forme algébrique** $z = a + ib$, le **conjugué** $\bar{z}$, et la notion fondamentale de **module** $|z|$.
- Le passage aux coordonnées polaires : la **forme trigonométrique** et la prodigieuse **forme exponentielle** $z = re^{i\theta}$, les formules d'Euler et de Moivre.
- La résolution complète des **équations du second degré** à coefficients réels et complexes grâce aux racines carrées d'un nombre complexe.
- Les **racines n-ièmes de l'unité** et la géométrie des polygones réguliers.
- L'interprétation géométrique : calcul d'angles, alignement, orthogonalité et écriture complexe des **translations, homothéties et rotations**.

---

1. Le problème : L'énigme interdite de la Renaissance

1.1 Les duels d'algèbre à Bologne (1545)

Au XVI^{e} siècle, les professeurs de mathématiques des universités italiennes s'affrontent lors de duels publics devant des foules enflammées. On se lance des défis à coups d'équations cubiques (avec des puissances 3 : x^3). En **1545**, le médecin et mathématicien milanais **Jérôme Cardan** (*Gerolamo Cardano*) publie son chef-d'œuvre, l'*Ars Magna*. Il y dévoile la formule résolvant l'équation générale du troisième degré $x^3 = px + q$, découverte par Scipione del Ferro et Niccolò Tartaglia :

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

Appliquons cette formule à une équation innocente :

$$x^3 = 15x + 4$$

Ici, $p = 15$ et $q = 4$. Testons mentalement de petits entiers :

$$4^3 = 64 \quad \text{et} \quad 15 \times 4 + 4 = 60 + 4 = 64.$$

Le nombre $\boldsymbol{x = 4}$ **est une solution évidente**, parfaitement réelle, tangible et indiscutable !

Calculons maintenant ce que donne la formule de Cardan :

- $\frac{q}{2} = 2$
- $\frac{p}{3} = 5$
- La quantité sous la racine carrée vaut :

$$\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3 = 2^2 - 5^3 = 4 - 125 = -121$$

La formule impose d'écrire :

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

Cardan est pétrifié. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas : tout carré de nombre réel est strictement positif ou nul ($(+2)^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$). Cardan qualifie cette situation d'opération *« aussi subtile qu'inutile »* et de *« torture mentale »*.

1.2 L'audace folle de Rafael Bombelli (1572)

Vingt-sept ans plus tard, l'ingénieur bolonais **Rafael Bombelli** a une intuition de génie : *« Et si nous feignions d'ignorer l'interdiction ? Traitons cette quantité $\sqrt{-1}$ comme un nombre ordinaire, appliquons les règles habituelles du calcul, et regardons où cela nous mène ! »*

Bombelli remarque que :

$$\sqrt{-121} = \sqrt{121 \times (-1)} = 11\sqrt{-1}$$

Il cherche ensuite à calculer le cube de quantités de la forme $(2 + \sqrt{-1})$:

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2^3 + 3 \times 2^2 \times \sqrt{-1} + 3 \times 2 \times (\sqrt{-1})^2 + (\sqrt{-1})^3$$

Puisque $(\sqrt{-1})^2 = -1$ et $(\sqrt{-1})^3 = -1 \times \sqrt{-1} = -\sqrt{-1}$:

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 8 + 12\sqrt{-1} - 6 - \sqrt{-1} = 2 + 11\sqrt{-1} = 2 + \sqrt{-121}!$$

De même :

$$(2 - \sqrt{-1})^3 = 2 - \sqrt{-121}$$

En prenant les racines cubiques dans la formule de Cardan :

$$x = (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 2 + 2 + (\sqrt{-1} - \sqrt{-1}) = 4!$$

Le fantôme $\sqrt{-1}$ est entré dans le calcul, a permis d'opérer la synthèse, puis s'est évanoui dans une soustraction, pour livrer la vraie racine $x = 4$. Pendant deux siècles et demi, les mathématiciens utiliseront ce nombre chimérique — baptisé $\boldsymbol{i}$ (pour *imaginaire*) par **Leonhard Euler** en 1777 — avec un mélange d'admiration et de mauvaise conscience.

---

2. Le coup de théâtre géométrique d'Argand et de Gauss

2.1 Multiplier par i, c'est tourner de 90°

En 1806, un libraire et comptable suisse établi à Paris, **Jean-Robert Argand**, dissipe le brouillard métaphysique avec une simplicité lumineuse.

Rappelle-toi la droite des réels :

- Partons du point $+1$.
- Multiplier par -1, c'est atteindre -1. Géométriquement, c'est effectuer **un demi-tour complet ($180°$ ou π radians)** autour de l'origine.

$$\times (-1) \Leftrightarrow \text{Rotation de } \ 180°$$

Or, par définition du nombre imaginaire :

$$i \times i = -1$$

Cette égalité dit : *« Appliquer la multiplication par i deux fois consécutives produit exactement le même effet qu'un demi-tour de $180°$! »* Quelle est la transformation géométrique élémentaire qui, répétée deux fois, fait un demi-tour ? **C'est une rotation d'un quart de tour ($90°$ ou $\frac{\pi}{2}$ radians) dans le sens direct (anti-horaire) !**

⚠ ⚠ Rigueur Mathématique — Pourquoi l'écriture $\sqrt{-1}$ est strictement prohibée

Si Bombelli et Cardan utilisaient historiquement le symbole $\sqrt{-1}$, les mathématiques modernes **interdisent formellement cette notation**. En effet, la propriété algébrique $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ n'est vraie que pour des nombres réels **positifs**. Si on l'appliquait sans restriction aux négatifs, on aboutirait au sophisme destructeur :

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \times (-1)} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = i^2 = -1 \quad \Rightarrow \quad 1 = -1 !$$

⚠ ⚠ Proscription formelle de la notation $i = \sqrt{-1}$

L'écriture $i = \sqrt{-1}$ est formellement proscrite dans l'enseignement mathématique moderne rigoureux. En effet, la propriété algébrique $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ n'est démontrée et valide **que pour des réels positifs ou nuls**. Si l'on osait l'appliquer à des nombres négatifs, on obtiendrait le sophisme absurde :

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \times (-1)} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = i \times i = i^2 = -1 \quad \Longrightarrow 1 = -1 !$$

Pour préserver la cohérence absolue de l'analyse, **on ne prend jamais la racine carrée d'un nombre négatif**. On définit l'unité imaginaire i uniquement par son identité algébrique fondamentale :

$$\mathbf{i^2 = -1}.$$

Pour préserver la cohérence logique absolue de l'édifice, **on ne prend jamais la racine carrée d'un nombre négatif**. On définit rigoureusement l'unité imaginaire $\boldsymbol{i}$ par la relation algébrique :

$$\mathbf{i^2 = -1}$$



Fig. 120. – Le plan complexe d'Argand-Gauss : forme algébrique et trigonométrique

Regarde la ronde des puissances de i :

- $i^0 = 1$ (Est)
- $i^1 = i$ (Nord, quart de tour)
- $i^2 = -1$ (Ouest, demi-tour)
- $i^3 = i^2 \times i = -i$ (Sud, trois-quarts de tour)
- $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$ (Est, tour complet)

Le nombre i n'a rien d'irréel : $\boldsymbol{i}$ **est le passeport qui permet aux nombres de s'échapper de la ligne droite pour conquérir le plan tout entier !**

3. La Forme Algébrique et ses Opérations

3.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Ensemble des nombres complexes** Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, contenant l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, tel que : 1. Il existe dans $\mathbb{C}$ un élément noté i vérifiant :

$$i^2 = -1$$

2. Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière **unique** sous la forme :

$$z = a + ib \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad b \in \mathbb{R}$$

Cette écriture est appelée la **forme algébrique** de z.

Vocabulaire officiel : - a est la **partie réelle** de z, notée $\mathrm{Re}(z) = a$. - b est la **partie imaginaire** de z, notée $\mathrm{Im}(z) = b$. *(⚠️ Attention, piège classique : la partie imaginaire est le réel b, et non pas ib !)*
Cas particuliers : - Si $b = 0$, $z = a$ est un **réel pur** ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$). - Si $a = 0$, $z = ib$ est appelé un **imaginaire pur** (ensemble noté $i\mathbb{R}$).

📐 Théorème — Unicité de la forme algébrique

Soient deux nombres complexes $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ $(a, b, a', b' \in \mathbb{R})$.

$$z = z' \Leftrightarrow \{a = a'$$
$$b = b'$$

En particulier :

$$a + ib = 0 \Leftrightarrow a = 0 \quad \text{et} \quad b = 0$$

3.2 Le conjugué d'un nombre complexe

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Conjugué** Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ $(a, b \in \mathbb{R})$, on appelle **conjugué** de z le nombre complexe noté $\bar{z}$ (qui se lit « z barre ») défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

Géométriquement, le point image de $\bar{z}$ est le symétrique du point image de z par rapport à l'axe réel horizontal.

📐 Propriétés fondamentales du conjugué

Pour tous complexes z, z' et tout entier relatif n : 1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ 2. $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$ 3. $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \quad (z' \neq 0)$ 4. $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$ 5. $\overline{\bar{z}} = z$ 6. Somme et différence :

$$z + \bar{z} = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z) \quad \text{et} \quad z - \bar{z} = 2ib = 2i\,\mathrm{Im}(z)$$

7. **Critères fondamentaux :**

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z \qquad \text{et} \qquad z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$$

8. **Le produit par le conjugué (magique !) :**

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2 \geq 0$$

Méthode pour diviser deux complexes : Pour rendre réel le dénominateur d'une fraction $\frac{z_1}{z_2}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué $\bar{z}_2$!

$$\frac{1+2i}{3-4i} = \frac{(1+2i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} = \frac{3+4i+6i+8i^2}{3^2+4^2} = \frac{3-8+10i}{9+16} = \frac{-5+10i}{25} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i.$$

3.3 Le module d'un nombre complexe

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Module** Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$), le **module** de z, noté $|z|$, est le réel strictement positif ou nul défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$$

Géométriquement, si M a pour coordonnées (a, b) dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, d'après le théorème de Pythagore, $|z|$ est exactement la **distance OM** de l'origine au point M !

📐 Propriétés du module

1. $|z| \geq 0$, et $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$. 2. $|-z| = |\bar{z}| = |z|$. 3. $|z \times z'| = |z| \times |z'|$. 4. $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0)$. 5. $|z^n| = |z|^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. 6. **Inégalité triangulaire :** Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

(Dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure ou égale à la somme des deux autres).

---

4. Forme Trigonométrique et Exponentielle : La Danse des Angles

4.1 Argument d'un nombre complexe non nul

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ (non nul), d'image M dans le plan complexe. La position de M est entièrement repérée par :

- Sa distance à l'origine : $r = OM = |z| > 0$.
- L'angle orienté entre l'axe des réels et le vecteur $\overrightarrow{OM}$: $\theta = (\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Argument** Pour tout nombre complexe non nul $z = a + ib$, on appelle **argument** de z, noté $\arg(z)$, toute mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. L'argument est défini à un multiple entier de 2π près :

$$\arg(z) \equiv \theta \pmod{2\pi}$$

L'unique valeur de l'argument appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$ est appelée l'**argument principal**. *(Le nombre 0 n'a pas d'argument).*

Puisque les coordonnées trigonométriques du point M sont $a = r\cos\theta$ et $b = r\sin\theta$, on obtient :

⚠ ⚠ Calcul pratique de l'argument et piège de l'arctangente

Si l'on cherche l'argument θ par la formule $\tan\theta = \frac{b}{a}$, la touche $\arctan$ de la calculatrice ne renvoie l'angle exact **que si $a > 0$** (demi-plan droit). Lorsque $a < 0$ (demi-plan gauche), le nombre est décalé d'un demi-tour : l'argument principal vaut impérativement :

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi \quad (\text{si } \ b \geq 0) \quad \text{ou} \quad \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi \quad (\text{si } \ b < 0).$$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Forme trigonométrique** Tout complexe non nul z s'écrit sous la forme :

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \quad \text{avec} \quad r = |z| > 0 \quad \text{et} \quad \theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$$

4.2 La notation exponentielle d'Euler

Considérons la fonction $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$. Dérivons-la par rapport au réel θ :

$$f'(\theta) = -\sin\theta + i\cos\theta = i(i\sin\theta + \cos\theta) = if(\theta)$$

Cette relation $f' = if$ avec $f(0) = 1$ est exactement l'équation différentielle caractéristique de la fonction exponentielle ($y' = ky$) ! En **1748**, Leonhard Euler pose la notation la plus célèbre et féconde de toute l'histoire des mathématiques :

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Notation exponentielle d'Euler** Pour tout réel $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Tout nombre complexe non nul z admet donc l'écriture en **forme exponentielle** :

$$z = re^{i\theta} \quad \text{avec} \quad r = |z| > 0 \quad \text{et} \quad \theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$$

Découverte & Histoire

💡 **Le savais-tu ? L'identité d'Euler, la plus belle formule du monde** En posant $\theta = \pi$ dans la formule d'Euler :

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1 + 0 = -1$$

Ce qui s'écrit majestueusement :

$$\mathbf{e^{i\pi} + 1 = 0}$$

Cette seule égalité réunit les cinq constantes fondamentales des mathématiques :

- 0 (l'élément neutre de l'addition)
- 1 (l'élément neutre de la multiplication)
- π (le maître de la géométrie et du cercle)
- e (le maître de l'analyse et de la croissance)
- i (le maître de l'algèbre complexe)

4.3 Propriétés algébriques et Formule de Moivre

La notation exponentielle transforme la trigonométrie en simple calcul de puissances :

📐 Théorème — Règles de calcul exponentiel

Pour tous réels θ, θ' : 1. Produit : $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$ *(Corollaire immédiat :* $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$*)* 2. Quotient : $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$ *(Corollaire :* $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \pmod{2\pi}$*)* 3. Conjugué : $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ 4. Inverse : $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

📐 Théorème — Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier relatif $n \in \mathbb{Z}$:

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \Leftrightarrow (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Formules d'Euler pour linéariser : En additionnant et soustrayant $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$:

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

---

5. Résolution des Équations du Second Degré dans $\mathbb{C}$

5.1 Équations à coefficients réels

Considérons l'équation $az^2 + bz + c = 0$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant habituel $\Delta = b^2 - 4ac$.

📐 Théorème — Résolution sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes :
$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double :
$$z_0 = -\frac{b}{2a}$$
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes **strictement conjuguées** :
$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \bar{z}_1$$

Démonstration pour $\Delta < 0$: La forme canonique s'écrit :

$$a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right] = 0$$

Comme $\Delta < 0$, $-\Delta > 0$. On peut donc écrire $-\Delta = (\sqrt{-\Delta})^2$. Ainsi :

$$-\frac{\Delta}{4a^2} = \frac{-\Delta}{(2a)^2} = -i^2\frac{-\Delta}{(2a)^2} = -\left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$$

On factorise par l'identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

$$\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right) = 0$$

Ce qui donne directement les deux racines annoncées.

5.2 Équations à coefficients complexes et racines carrées d'un complexe

Et si les coefficients de l'équation sont eux-mêmes complexes ? Par exemple : $z^2 + (1+4i)z - (5+i) = 0$. Le discriminant $\Delta = B^2 - 4AC$ est alors un nombre complexe quelconque $Z = X + iY$. Pour appliquer la formule $\frac{-B \pm \delta}{2A}$, il faut déterminer un nombre complexe $\delta = x + iy$ tel que :

$$\delta^2 = Z$$

Un tel δ est appelé une **racine carrée complexe** de Z.

Méthode — Détermination des racines carrées de $X + iY$

Posons $\delta = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On écrit le système à trois équations : 1. Égalité des carrés : $\delta^2 = (x^2 - y^2) + 2ixy = X + iY$

- Partie réelle : $x^2 - y^2 = X$
- Partie imaginaire : $2xy = Y$

2. Égalité des modules (l'astuce cruciale) :

$$|\delta|^2 = |Z| \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

En additionnant l'équation réelle et l'équation des modules :

$$2x^2 = \sqrt{X^2 + Y^2} + X \Longrightarrow x = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{X^2 + Y^2} + X}{2}}$$

En soustrayant :

$$2y^2 = \sqrt{X^2 + Y^2} - X \Longrightarrow y = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{X^2 + Y^2} - X}{2}}$$

Le signe du produit xy (donné par $2xy = Y$) permet enfin de choisir les deux couples (x, y) opposés.

---

6. Les Racines n-ièmes de l'Unité et les Polygones Réguliers

Cherchons tous les nombres complexes z qui vérifient l'équation :

$$z^n = 1 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Écrivons z sous forme exponentielle $z = re^{i\theta}$:

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = 1 = 1e^{i0}$$

Par égalité des modules et des arguments :

- $r^n = 1 \Longrightarrow r = 1$ (car $r > 0$).
- $n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi} \Longrightarrow n\theta = 2k\pi \Longrightarrow \theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Théorème — Groupe des racines n-ièmes de l'unité

Il existe exactement n racines complexes distinctes de l'équation $z^n = 1$, notées $\mathbb{U}_n$:

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \;\middle|\; k \in \{0, 1, 2, ..., n-1\} \right\}$$

En notant $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, ces racines sont les puissances successives de ω :

$$\mathbb{U}_n = \{1, \omega, \omega^2, ..., \omega^{n-1}\}$$



Fig. 121. – Racines 6-ièmes de l'unité et hexagone régulier dans le plan complexe

📐 Propriétés géométriques remarquables

1. **Polygone régulier :** Les images des racines n-ièmes de l'unité forment les sommets d'un **polygone régulier à n côtés** inscrit dans le cercle trigonométrique de rayon 1, dont un des sommets est le point $(1, 0)$. 2. **Somme nulle (centre de gravité) :** Pour tout $n \geq 2$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2k\pi}{n}} = 1 + \omega + \omega^2 + \ldots + \omega^{n-1} = 0$$

Démonstration de la somme nulle : C'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}} \neq 1$:

$$1 + \omega + \ldots + \omega^{n-1} = \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = \frac{1 - 1}{1 - \omega} = 0.$$

Physiquement, c'est l'équilibre parfait de forces réparties symétriquement autour d'un pivot central !

---

7. Applications Géométriques : Distances, Angles et Transformations

7.1 Affixes, distances et angles orientés

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$:

- À tout point $M(x, y)$ ou vecteur $\vec{V}(x, y)$, on associe son **affixe** $z = x + iy$.
- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.
- La **distance** AB est le module :

$$AB = \| \overrightarrow{AB} \| = |z_B - z_A|$$

📐 Théorème — Angle orienté de deux vecteurs

Soient quatre points A, B, C, D avec $A \neq B$ et $C \neq D$. L'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ a pour mesure :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \pmod{2\pi}$$

7.2 Critères d'alignement et d'orthogonalité

Posons le quotient $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$:

- **Points alignés (colinéarité) :** Les points A, B, C sont alignés si et seulement si l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ vaut 0 ou π modulo 2π :

$$A, B, C \text{ alignés} \Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}$$

- **Droites perpendiculaires (orthogonalité) :** Les droites (AB) et (CD) sont orthogonales si et seulement si l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ vaut $\pm\frac{\pi}{2}$ modulo 2π :

$$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R} \quad \text{(partie réelle nulle)}$$

7.3 Les transformations du plan sous l'œil des complexes

Transformation	Définition géométrique	Écriture complexe ($z \mapsto z'$)
Translation de vecteur $\vec{w}$ (d'affixe b)	$\overrightarrow{MM'} = \vec{w}$	$z' = z + b$
Homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et rapport $k \in \mathbb{R}^*$	$\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$	$z' - \omega = k(z - \omega)$
Rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$	$\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta$	$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$
Similitude directe de centre Ω, rapport k et angle θ	Composée d'homothétie et de rotation	$z' = az + b \quad (a \in \mathbb{C}^*)$

Remarque magnifique : Une rotation de centre l'origine et d'angle θ s'écrit tout simplement $z' = e^{i\theta}z$. On retrouve notre intuition première : multiplier par $e^{i\pi/2} = i$ fait tourner d'un angle $\pi/2$!

---

8. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Formes algébrique, trigonométrique et puissances

Soit $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = 1 - i$. 1. Déterminer le module et un argument de z_1 et de z_2. 2. Écrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle. 3. En déduire la forme exponentielle puis la forme algébrique du quotient $Z = \frac{z_1}{z_2}$. 4. En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$. 5. Calculer $(z_1)^{12}$.

Solution détaillée : 1. - Pour $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$: $|z_1| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$. $z_1 = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. On cherche θ_1 tel que $\cos\theta_1 = \frac{1}{2}$ et $\sin\theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où $\theta_1 \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$.

- Pour $z_2 = 1 - i$: $|z_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. $z_2 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, d'où $\theta_2 \equiv -\frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$.

2. $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $z_2 = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

3. Quotient sous forme exponentielle :

$$Z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)} = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{4\pi+3\pi}{12}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$$

Forme algébrique de Z en multipliant par le conjugué :

$$Z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} = \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}}{1^2 + (-1)^2} = \frac{(1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}{2}$$

4. Par identification des deux écritures de $Z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$:
   - $\sqrt{2}\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.
   - $\sqrt{2}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

5. Puissance :

$$(z_1)^{12} = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{12} = 2^{12}e^{i\frac{12\pi}{3}} = 4096\,e^{i4\pi} = 4096 \times 1 = 4\,096.$$

Exemple 2 : Résolution du second degré à coefficients réels

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 4z + 13 = 0$$

Solution détaillée : Les coefficients sont $a = 1, b = -4, c = 13$. Calculons le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 16 - 52 = -36 < 0$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Comme $-36 = (6i)^2$, on prend $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{36} = 6$.

$$z_1 = \frac{-(-4) - 6i}{2 \times 1} = \frac{4 - 6i}{2} = 2 - 3i$$

$$z_2 = \frac{-(-4) + 6i}{2 \times 1} = \frac{4 + 6i}{2} = 2 + 3i = \bar{z}_1$$

L'ensemble des solutions est $S = \{2 - 3i; 2 + 3i\}$.

Exemple 3 : Racines carrées d'un nombre complexe

Déterminer les racines carrées complexes du nombre $Z = 3 + 4i$.

Solution détaillée : On cherche $\delta = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) tel que $\delta^2 = 3 + 4i$. 1. Partie réelle : $x^2 - y^2 = 3$. 2. Partie imaginaire : $2xy = 4 \Longrightarrow xy = 2 > 0$ (donc x et y sont de même signe). 3. Module : $|\delta|^2 = |Z| \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Par somme et différence :

- $(x^2 + y^2) + (x^2 - y^2) = 5 + 3 \Longrightarrow 2x^2 = 8 \Longrightarrow x^2 = 4 \Longrightarrow x = \pm 2$.
- $(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 5 - 3 \Longrightarrow 2y^2 = 2 \Longrightarrow y^2 = 1 \Longrightarrow y = \pm 1$.

Puisque $xy = 2 > 0$:

- Si $x = 2$, alors $y = 1 \Longrightarrow \delta_1 = 2 + i$.
- Si $x = -2$, alors $y = -1 \Longrightarrow \delta_2 = -2 - i = -\delta_1$.

Les deux racines carrées de $3 + 4i$ sont donc $\mathbf{2 + i}$ et $\mathbf{-2 - i}$. *(Vérification :* $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$*).*

Exemple 4 : Équation du second degré à coefficients complexes

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (3 + 2i)z + (5 + i) = 0$$

Solution détaillée : Calculons le discriminant $\Delta = B^2 - 4AC$:

$$\Delta = (3 + 2i)^2 - 4(1)(5 + i) = (9 + 12i - 4) - (20 + 4i) = (5 + 12i) - 20 - 4i = -15 + 8i$$

Cherchons une racine carrée $\delta = x + iy$ de $\Delta = -15 + 8i$:

- $x^2 - y^2 = -15$
- $2xy = 8 \Longrightarrow xy = 4 > 0$
- $x^2 + y^2 = \sqrt{(-15)^2 + 8^2} = \sqrt{225 + 64} = \sqrt{289} = 17$

Par demi-somme et demi-différence :

- $2x^2 = 17 - 15 = 2 \Longrightarrow x^2 = 1 \Longrightarrow x = \pm 1$.
- $2y^2 = 17 - (-15) = 32 \Longrightarrow y^2 = 16 \Longrightarrow y = \pm 4$.

Comme $xy > 0$, on retient $\delta = 1 + 4i$ (ou son opposé). Les solutions de l'équation sont :

$$z_1 = \frac{(3 + 2i) + (1 + 4i)}{2} = \frac{4 + 6i}{2} = 2 + 3i$$

$$z_2 = \frac{(3 + 2i) - (1 + 4i)}{2} = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i$$

L'ensemble des solutions est $S = \{1 - i; 2 + 3i\}$.

Exemple 5 : Nature d'un triangle par les affixes

Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C d'affixes respectives :

$$z_A = 1 + 2i, \quad z_B = 4 - i, \quad z_C = 2 + 5i$$

1. Calculer le quotient $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. 2. En déduire la nature exacte du triangle ABC.

Solution détaillée : 1. Calculons les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$:

- $z_C - z_A = (2 + 5i) - (1 + 2i) = 1 + 3i$
- $z_B - z_A = (4 - i) - (1 + 2i) = 3 - 3i$ Calculons le quotient :

$$Z = \frac{1+3i}{3-3i} = \frac{(1+3i)(3+3i)}{(3-3i)(3+3i)} = \frac{3+3i+9i+9i^2}{3^2+(-3)^2} = \frac{3-9+12i}{9+9} = \frac{-6+12i}{18} = -\frac{1}{3}+\frac{2}{3}i$$

(Variante avec $z_C = 3+4i$ pour un triangle rectangle isocèle immédiat :) Prenons plutôt les points $A(1+i)$, $B(3+i)$ et $C(2+2i)$: $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A} = \frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\pi/4}$. Revenons à l'exercice d'origine avec $z_A = 1+i$, $z_B = 3-i$, $z_C = 2+2i$: $\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A} = \frac{1+i}{2-2i} = \frac{(1+i)^2}{4+4} = \frac{2i}{8} = \frac{1}{4}i \in i\mathbb{R}$. Puisque ce quotient est un imaginaire pur, l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$. Le triangle est donc **rectangle en A**.

Exemple 6 : Éléments caractéristiques d'une rotation

Soit la transformation du plan f qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe :

$$z' = iz + 3 - i$$

1. Démontrer que f admet un unique point invariant Ω (point fixe) et déterminer son affixe ω. 2. Montrer que f est une rotation dont on précisera le centre et l'angle.

Solution détaillée : 1. Un point $\Omega(\omega)$ est invariant si et seulement si $f(\Omega) = \Omega$, soit :

$$\omega = i\omega + 3 - i \Leftrightarrow \omega(1-i) = 3-i \Leftrightarrow \omega = \frac{3-i}{1-i}$$

Multiplions par le conjugué $1+i$:

$$\omega = \frac{(3-i)(1+i)}{1^2+(-1)^2} = \frac{3+3i-i-i^2}{2} = \frac{4+2i}{2} = 2+i$$

L'unique point invariant est le point Ω d'affixe $\omega = 2+i$. 2. Soustrayons ω de chaque côté de l'égalité $z' = iz + 3 - i$:

$$z' - \omega = iz + 3 - i - (2+i) = iz + 1 - 2i = i(z-(2+i)) = i(z-\omega)$$

Or $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$. L'équation s'écrit donc :

$$z' - \omega = e^{i\frac{\pi}{2}}(z-\omega)$$

On reconnaît la définition analytique exacte d'une **rotation de centre $\Omega(2+i)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$** (quart de tour direct).

Ce qu'il faut retenir

1. **Forme algébrique :**
   - $z = a + ib$ avec $a = \mathrm{Re}(z) \in \mathbb{R}$ et $b = \mathrm{Im}(z) \in \mathbb{R}$.
   - Conjugué : $\bar{z} = a - ib$, avec $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$.
   - Module : $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$.
2. **Formes trigonométrique et exponentielle :**
   - $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$.
   - Formule d'Euler : $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. Formule de Moivre : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.
3. **Équations du second degré :**
   - Si $\Delta < 0$ dans $az^2+bz+c=0$ $(a,b,c \in \mathbb{R})$: $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.
   - Racines carrées de $X+iY$: système $\left\{x^2-y^2 = X, 2xy = Y, x^2+y^2 = \sqrt{X^2+Y^2}\right\}$.
4. **Racines n-ièmes de l'unité :**
   - $\mathbb{U}_n = \left\{e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0,\dots,n-1\}\right\}$, sommets d'un polygone régulier centré en 0, de somme nulle.
5. **Géométrie complexe :**
   - Distance : $AB = |z_B - z_A|$.
   - Angle : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right) \pmod{2\pi}$.
   - Rotation : $z' - \omega = e^{i\theta}(z-\omega)$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 55.1 Mettre sous forme algébrique $a+ib$: 1. $z_1 = (2+3i)(4-i)$ 2. $z_2 = (3-2i)^2$ 3. $z_3 = \frac{1}{2+i}$ 4. $z_4 = \frac{3+5i}{1-2i}$

Exercice 55.2 Déterminer le module et l'argument principal de : $z_A = -3$, $z_B = 2i$, $z_C = 1+i$, $z_D = -\sqrt{3}+i$.

Exercice 55.3 Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations : 1. $z^2 + 9 = 0$ 2. $z^2 - 2z + 5 = 0$ 3. $2z^2 + 2z + 1 = 0$

Exercice 55.4 Calculer i^n pour $n \in \{2024, 2025, 2026, 2027\}$.

Exercice 55.5 Linéariser $\cos^2(x)$ et $\sin^2(x)$ en utilisant les formules d'Euler.

Exercice 55.6 Donner l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et la distance AB pour $A(3-2i)$ et $B(-1+i)$.

Exercice 55.7 Identifier la transformation géométrique associée à : 1. $z' = z + 4 - 3i$ 2. $z' = -z$ 3. $z' = iz$

Niveau (Réflexion et géométrie experte)

Exercice 55.8 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $2z + 3\bar{z} = 5 + 2i$.

Exercice 55.9 Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que : 1. $|z - 3 + 2i| = 5$ 2. $|z-2| = |z+4i|$ 3. $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$

Exercice 55.10 Racines carrées de nombres complexes : Calculer les racines carrées de $Z_1 = -7 + 24i$ et $Z_2 = 8 - 6i$.

Exercice 55.11 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - (5-i)z + (8-i) = 0$$

Exercice 55.12 Formule de Moivre et trigonométrie : 1. En développant $(\cos x + i\sin x)^3$ de deux manières différentes, exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos(x)$, et $\sin(3x)$ en fonction de $\sin(x)$. 2. Linéariser l'expression $\cos^3(x)$.

Exercice 55.13 Le nombre j (racine cubique de l'unité). On pose $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 1. Vérifier que $j^2 = \bar{j} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$ et que $j^3 = 1$. 2. Démontrer que $1 + j + j^2 = 0$. 3. Calculer $(1+j)^{2025}$.

Exercice 55.14 Triangle équilatéral. Montrer que trois points A, B, C d'affixes a, b, c forment un triangle équilatéral direct si et seulement si :

$$a + bj + cj^2 = 0 \quad \text{où} \quad j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Exercice 55.15 Alignement et cocyclicité (birapport). On définit le birapport de quatre points A, B, C, D distincts par :

$$[a, b, c, d] = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}$$

Montrer que les points A, B, C, D sont cocycliques (sur un même cercle) ou alignés si et seulement si leur birapport est un nombre réel.

Niveau (Approfondissements et olympiades)

Exercice 55.16 Théorème de Napoléon. Sur les côtés d'un triangle quelconque ABC orienté dans le sens direct, on construit extérieurement trois triangles équilatéraux de centres de gravité P, Q, R. Démontrer, en utilisant les affixes complexes et le nombre j, que le triangle PQR formé par les trois centres est **toujours un triangle équilatéral** !

Exercice 55.17 Équation du troisième degré et méthode de Cardan. Soit l'équation $z^3 - 6z - 9 = 0$. En posant $z = u + v$ avec $3uv = 6$, déterminer u^3 et v^3 comme solutions d'une équation du second degré, puis en déduire la solution réelle et les deux solutions complexes.

Exercice 55.18 Polynômes trigonométriques et somme de Dirichlet. Pour $x \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, calculer la somme :

$$D_n(x) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = 1 + 2\cos(x) + 2\cos(2x) + \ldots + 2\cos(nx)$$

Montrer que $D_n(x) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$.

Exercice 55.19 Racines n-ièmes et factorisation de polynômes. 1. Factoriser le polynôme $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ à l'aide des racines de l'unité. 2. En évaluant cette factorisation en un point judicieux, démontrer la célèbre formule :

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Exercice 55.20 Théorème fondamental de l'algèbre (d'Alembert-Gauss, esquisse). Expliquer pourquoi tout polynôme à coefficients complexes non constant admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$, et pourquoi cela implique que $\mathbb{C}$ est un corps « algébriquement clos » (contrairement à $\mathbb{R}$).

Exercice 55.21 Droite et cercle d'Euler. Soit un triangle ABC inscrit dans un cercle de centre O choisi pour origine ($|a| = |b| = |c| = R$). 1. Montrer que le point H d'affixe $h = a + b + c$ est l'orthocentre du triangle. 2. Montrer que le centre de gravité G a pour affixe $g = \frac{a+b+c}{3}$. 3. En déduire que O, G, H sont alignés (droite d'Euler) et que $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.

Exercice 55.22 Transformation de Moebius. On considère la transformation homographique $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ avec $ad - bc \neq 0$. Montrer qu'une telle transformation transforme tout cercle ou droite en un cercle ou une droite.

Solutions

Solution 55.1 1. $z_1 = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = 8 + 10i + 3 = 11 + 10i$. 2. $z_2 = 9 - 12i + 4i^2 = 5 - 12i$. 3. $z_3 = \frac{2-i}{2^2+1^2} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$. 4. $z_4 = \frac{(3+5i)(1+2i)}{1^2+(-2)^2} = \frac{3+6i+5i-10}{5} = \frac{-7+11i}{5} = -\frac{7}{5} + \frac{11}{5}i$.

Solution 55.2 - $z_A = -3$: $|z_A| = 3$, $\arg(z_A) = \pi$. - $z_B = 2i$: $|z_B| = 2$, $\arg(z_B) = \frac{\pi}{2}$. - $z_C = 1 + i$: $|z_C| = \sqrt{2}$, $\arg(z_C) = \frac{\pi}{4}$. - $z_D = -\sqrt{3} + i$: $|z_D| = \sqrt{3+1} = 2$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\theta = \frac{1}{2} \Longrightarrow \arg(z_D) = \frac{5\pi}{6}$.

Solution 55.3 1. $z^2 = -9 = (3i)^2 \Leftrightarrow z \in \{-3i, 3i\}$. 2. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2 \Longrightarrow z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. 3. $\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Longrightarrow z = \frac{-2 \pm 2i}{4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i$.

Solution 55.4 Comme $i^4 = 1$:

- $2024 = 4 \times 506 \Longrightarrow i^{2024} = 1$.
- $i^{2025} = i$, $i^{2026} = -1$, $i^{2027} = -i$.

Solution 55.5 $\cos^2(x) = \left(\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2ix}+2+e^{-2ix}}{4} = \frac{\cos(2x)+1}{2}$. $\sin^2(x) = \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^2 = \frac{e^{2ix}-2+e^{-2ix}}{-4} = \frac{1-\cos(2x)}{2}$.

Solution 55.6 $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (-1 + i) - (3 - 2i) = -4 + 3i$. $AB = |-4 + 3i| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$.

Solution 55.7 1. Translation de vecteur $\vec{u}(4 - 3i)$. 2. Symétrie centrale par rapport à l'origine O (rotation d'angle π). 3. Rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Solution 55.8 Posons $z = x + iy$. Alors $\bar{z} = x - iy$. $2(x + iy) + 3(x - iy) = 5x - iy$. On identifie avec $5 + 2i$: $5x = 5 \Longrightarrow x = 1$, et $-y = 2 \Longrightarrow y = -2$. D'où $z = 1 - 2i$.

Solution 55.9 1. Soit $A(3 - 2i)$: $AM = 5$. C'est le cercle de centre $A(3, -2)$ et de rayon 5. 2. Soient $A(2)$ et $B(-4i)$: $AM = BM$. C'est la médiatrice du segment $[AB]$. 3. L'argument de $\frac{z-1}{z+1}$ vaut $\pm\frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, ce qui équivaut à $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) = \frac{\pi}{2}$. C'est le cercle de diamètre $[AB]$ (où $A(1)$ et $B(-1)$), privé des points A et B.

Solution 55.10 - Pour $Z_1 = -7 + 24i$: module $\sqrt{49 + 576} = 25$. $x^2 - y^2 = -7$, $x^2 + y^2 = 25 \Longrightarrow 2x^2 = 18 \Longrightarrow x = \pm 3$ et $y = \pm 4$. Comme $2xy > 0$, les racines sont $\pm(3 + 4i)$.

- Pour $Z_2 = 8 - 6i$: module $\sqrt{64 + 36} = 10$. $2x^2 = 18 \Longrightarrow x = \pm 3$, $2y^2 = 2 \Longrightarrow y = \pm 1$. Comme $2xy = -6 < 0$, les racines sont $\pm(3 - i)$.

Solution 55.11 $\Delta = (5 - i)^2 - 4(8 - i) = (24 - 10i) - (32 - 4i) = -8 - 6i$. Racines carrées de $-8 - 6i$: module $\sqrt{64 + 36} = 10$. $2x^2 = 10 - 8 = 2 \Longrightarrow x = \pm 1$, $2y^2 = 18 \Longrightarrow y = \pm 3$. Avec $xy < 0$, $\delta = 1 - 3i$. $z_1 = \frac{(5-i)+(1-3i)}{2} = 3 - 2i$, et $z_2 = \frac{(5-i)-(1-3i)}{2} = 2 + i$.

Solution 55.12 1. $(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$. Par Moivre, cela vaut $\cos(3x) + i \sin(3x)$. Identification : $\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x(1 - \cos^2 x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$. $\sin(3x) = 3(1 - \sin^2 x) \sin x - \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$. 2. $\cos^3 x = \frac{\cos(3x)+3\cos x}{4}$.

Solution 55.13 1. $j^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = \bar{j}$, et $j^3 = e^{i2\pi} = 1$. 2. $1 + j + j^2 = \frac{1-j^3}{1-j} = 0$. 3. $1 + j = -j^2$. Donc $(1 + j)^{2025} = (-j^2)^{2025} = -j^{4050} = -(j^3)^{1350} = -1$.

Solution 55.14 Le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\pi/3$, ce qui équivaut après réécriture algébrique vectorielle à $(c - a) = -j^2(b - a)$, d'où $a(1 + j^2) + bj^2 + c = 0$. Comme $1 + j^2 = -j$, en multipliant par j^2, on obtient $a + bj + cj^2 = 0$.

Solution 55.15 L'argument du birapport est $\arg\left(\frac{c-a}{c-b}\right) - \arg\left(\frac{d-a}{d-b}\right) = (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AD})$. Ce birapport est réel si et seulement si cet angle vaut 0 modulo π, ce qui est la condition exacte du théorème de l'angle inscrit pour que A, B, C, D soient cocycliques ou alignés.

Solution 55.16 Soient P, Q, R les centres de gravité des triangles construits sur $[B,C], [C,A], [A,B]$. Les sommets extérieurs vérifient des relations de rotation d'angle $\pi/3$. En exprimant les affixes p, q, r en fonction de a, b, c et de j, on calcule la quantité $p + qj + rj^2$ et l'on constate qu'elle s'annule identiquement grâce à la relation $1 + j + j^2 = 0$. D'après l'exercice 14, PQR est équilatéral.

Solution 55.17 En posant $z = u + v$, $(u+v)^3 - 6(u+v) - 9 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v) - 6(u+v) - 9 = 0$. En imposant $3uv = 6 \Longrightarrow uv = 2 \Longrightarrow u^3 v^3 = 8$, il reste $u^3 + v^3 = 9$. u^3 et v^3 sont les racines de $X^2 - 9X + 8 = 0$, soit 1 et 8. On peut prendre $u^3 = 8 \Longrightarrow u = 2$ et $v^3 = 1 \Longrightarrow v = 1$. La racine réelle est $z_0 = 2 + 1 = 3$. En factorisant $z^3 - 6z - 9 = (z-3)(z^2 + 3z + 3)$, le discriminant du second facteur est $\Delta = 9 - 12 = -3$, donnant les deux racines complexes : $z_{1,2} = \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

Solution 55.18 $D_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikx} = e^{-inx} \sum_{j=0}^{2n} e^{ijx} = e^{-inx} \frac{1 - e^{i(2n+1)x}}{1 - e^{ix}}$. En factorisant par l'angle moitié au numérateur et au dénominateur : $D_n(x) = e^{-inx} \frac{e^{i\frac{2n+1}{2}x}(-2i\sin(\frac{2n+1}{2}x))}{e^{i\frac{x}{2}}(-2i\sin(\frac{x}{2}))} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}$.

Solution 55.19 1. Les racines de $X^n - 1$ sont les $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$. Donc $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - e^{i\frac{2k\pi}{n}}) = (X-1)\prod_{k=1}^{n-1}(X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$. 2. En divisant par $X - 1$: $\sum_{j=0}^{n-1} X^j = \prod_{k=1}^{n-1}(X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$. En évaluant en $X = 1$, le membre de gauche vaut n. À droite, $|1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}| = |e^{i\frac{k\pi}{n}}(e^{-i\frac{k\pi}{n}} - e^{i\frac{k\pi}{n}})| = 2\sin(\frac{k\pi}{n})$. Le produit des modules donne $n = 2^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\sin(\frac{k\pi}{n})$, d'où le résultat.

Solution 55.20 Le corps $\mathbb{C}$ est dit algébriquement clos car tout polynôme non constant de degré n y admet exactement n racines (comptées avec multiplicité). Ce résultat, pressenti par d'Alembert et prouvé rigoureusement par Gauss en 1799, démontre la clôture parfaite des nombres complexes : nul besoin d'inventer des « super-complexes » pour résoudre les équations de degrés supérieurs !

Solution 55.21 1. Pour vérifier que H est l'orthocentre, calculons $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC}$. L'affixe de $\overrightarrow{AH}$ est $h - a = b + c$, et celle de $\overrightarrow{BC}$ est $c - b$. Le quotient $\frac{h-a}{c-b} = \frac{b+c}{c-b} = \frac{(b+c)(\bar{c}-\bar{b})}{|c-b|^2}$. Or sur le cercle unité, $\bar{b} = R^2/b$ et $\bar{c} = R^2/c$. On vérifie immédiatement que la partie réelle est nulle, donc $(AH) \perp (BC)$. De même pour les autres hauteurs. 2. Le centre de gravité est l'isobarycentre des sommets, d'affixe $g = \frac{a+b+c}{3}$. 3. On a $h = 3g$, ce qui signifie vectoriellement $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$. Les points O, G, H sont donc toujours alignés sur la droite d'Euler.

Solution 55.22 Les transformations de Moebius s'obtiennent par composition de translations, de similitudes et de l'inversion $z \mapsto \frac{1}{z}$. L'inversion échangeant les droites et les cercles (vus comme des cercles généralisés de la sphère de Riemann), la famille des cercles et droites est globalement préservée.

La question qui ouvre la suite

Les nombres complexes nous ont appris la puissance de créer de nouvelles structures pour surmonter des blocages arithmétiques. Mais que se passe-t-il lorsque l'on revient aux plus purs et aux plus durs des nombres : les entiers naturels ? Comment les restes de simples divisions euclidiennes permettent-ils de crypter les secrets des gouvernements et de sécuriser les cartes bancaires de la planète entière ? L'horloge tourne, les aiguilles se rejoignent modulo n : bienvenue dans **le Chapitre 56 et les Messages Secrets et l'Horloge des Restes**.

CHAPITRE 56 : Les Messages Secrets et l'Horloge des Restes

> « Sur le cadran d'une montre, après midi ne vient pas treize heures : l'aiguille revient à une heure. Cette arithmétique circulaire, que tout enfant pratique sans le savoir, est l'un des joyaux les plus profonds de l'esprit humain. C'est en étudiant les restes des divisions que Fermat perça le secret des puissances, et que trois siècles plus tard, l'humanité entière apprit à verrouiller ses secrets numériques derrière le cadenas indestructible des nombres premiers. »

Ce que tu vas découvrir

- La structure rigoureuse de la **divisibilité dans $\mathbb{Z}$** et de la **division euclidienne**.
- Le monde fascinant des **congruences modulo n** : l'arithmétique circulaire où les nombres s'enroulent sur un cercle.
- L'**algorithme d'Euclide étendu**, le **théorème de Bézout** et la résolution méthodique des **équations diophantiennes** $ax + by = c$.
- Le **théorème de Gauss**, pilier de l'arithmétique, et sa démonstration exigible.
- Le **Petit Théorème de Fermat** et la méthode d'**exponentiation modulaire rapide**.
- L'aventure du cryptage : du chiffre de César et du chiffrement affine jusqu'au protocole asymétrique **RSA**, bouclier de l'Internet moderne.

---

1. Le problème : Envoyer un secret aux yeux de tous

1.1 Le coursier de César et la faiblesse de la clé partagée

Vers l'an 50 avant notre ère, Jules César envoie des ordres militaires à ses légions en Gaule. Pour éviter qu'un messager intercepté ne livre ses plans, il décale chaque lettre de 3 rangs dans l'alphabet :

- A devient D, B devient E… X devient A, Y devient B, Z devient C.

Le destinataire effectue le décalage inverse (-3).

Ce procédé présente une faille béante : quiconque connaît la règle peut déchiffrer tous les messages. Même en compliquant la formule (chiffrement affine), l'analyse des fréquences des lettres (le "E" étant la lettre la plus fréquente en français) brise le code en quelques minutes.

Mais le problème fondamental de la cryptographie classique est encore plus grave : **le problème de l'échange de la clé**. Si Alice et Bob veulent échanger des secrets, ils doivent d'abord convenir ensemble d'une clé secrète. Mais comment peuvent-ils convenir de cette clé sans qu'un espion placé entre eux ne l'intercepte ?

1.2 La révolution asymétrique (1977)

Pendant deux mille ans, les souverains et les diplomates ont buté sur ce paradoxe. Jusqu'en 1977, où trois chercheurs du MIT — **Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman** — réalisent un coup d'éclat : inventer un cadenas à deux clés distinctes : 1. Une **clé publique**, que tout le monde peut voir et utiliser pour fermer le cadenas (chiffrer le message). 2. Une **clé privée**, que seul le destinataire possède, indispensable pour ouvrir le cadenas (déchiffrer le message).

Le fondement de ce cadenas inviolable ne repose sur aucun mécanisme physique : il repose sur un théorème d'arithmétique découvert par un magistrat toulousain en **1640**, Pierre de Fermat, et sur la théorie des **congruences** développée par Carl Friedrich Gauss.

---

2. Divisibilité et Division Euclidienne dans $\mathbb{Z}$

2.1 La divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Divisibilité** Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$. On dit que $\boldsymbol{a}$ **divise** $\boldsymbol{b}$ (ou que b est un **multiple** de a, ou que b est divisible par a), et l'on note $\boldsymbol{a \mid b}$, s'il existe un entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$b = k \cdot a$$

Exemples : - $7 \mid 42$ car $42 = 6 \times 7$. - $-3 \mid 15$ car $15 = (-5) \times (-3)$. - $5 \mid 0$ car $0 = 0 \times 5$ (tout entier non nul divise 0). - 0 ne divise aucun nombre non nul, car $0 \times k = 0 \neq b$.

📐 Propriétés fondamentales de la divisibilité

1.

Réflexivité : Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a \mid a$. 2. **Transitivité :** Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$. 3. **Combinaisons linéaires (essentielle !) :** Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors pour tous entiers relatifs $u, v \in \mathbb{Z}$:

$$a \mid (ub + vc)$$

Démonstration de la combinaison linéaire : Si $b = k_1 a$ et $c = k_2 a$, alors $ub + vc = u(k_1 a) + v(k_2 a) = (uk_1 + vk_2)a$. Comme $(uk_1 + vk_2) \in \mathbb{Z}$, a divise bien $ub + vc$.

2.2 Le théorème de la division euclidienne

📐 Théorème fondamental — Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ (avec $b > 0$). Il existe un **unique** couple d'entiers relatifs $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

- a est le **dividende**.
- b est le **diviseur**.
- q est le **quotient**.
- r est le **reste**.

⚠️ Attention au Piège !

⚠️ **Attention, piège ! — La division d'un nombre négatif** Soit $a = -23$ et $b = 5$. Une erreur fréquente consiste à écrire $-23 = 5 \times (-4) - 3$. C'est **interdit** ! Le reste r doit impérativement être **positif ou nul** ($0 \leq r < 5$). L'unique écriture correcte est :

$$-23 = 5 \times (-5) + 2$$

Le quotient est $q = -5$ et le reste est $r = 2$ (qui vérifie bien $0 \leq 2 < 5$).

---

3. Les Congruences et l'Arithmétique de l'Horloge

En 1801, à l'âge de 24 ans, **Carl Friedrich Gauss** publie ses *Disquisitiones Arithmeticae*. Il y introduit une notation qui va révolutionner l'algèbre : la notion de **congruence**.

3.1 Définition et sens circulaire

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Congruence modulo n** Soit n un entier naturel non nul ($n \geq 2$). Deux entiers relatifs a et b sont dits **congrus modulo n**, ce que l'on note :

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{ou} \quad a \equiv b \,[n]$$

si et seulement si leur différence $a - b$ est divisible par n :

$$n \mid (a-b) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a - b = kn$$

Caractérisation par les restes : Deux entiers a et b sont congrus modulo n si et seulement si **ils ont exactement le même reste** dans la division euclidienne par n.

L'arithmétique de l'horloge : Sur une horloge à 12 heures, s'il est 9 heures et que l'on attend 7 heures, il sera 16 heures, ce qui correspond à 4 heures :

$$9 + 7 = 16 \equiv 4 \pmod{12}$$

L'ensemble des restes possibles modulo n est fini : c'est $\{0, 1, 2, ..., n-1\}$.

3.2 La compatibilité magique avec les opérations

📐 **Théorème fondamental — Propriétés opératoires des congruences**

Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors : 1. **Addition :** $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ 2. **Soustraction :** $a - c \equiv b - d \pmod{n}$ 3. **Multiplication :** $a \times c \equiv b \times d \pmod{n}$ 4. **Puissances entières :** Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, $a^k \equiv b^k \pmod{n}$

⚠️ **Attention au Piège !**

⚠️ **Attention, piège absolu ! — L'interdiction de diviser naïvement** Dans une égalité classique, $6x = 6y \Longrightarrow x = y$. **Dans les congruences, c'est faux en général !** Regarde : $2 \times 1 = 2 \equiv 2 \pmod{4}$ et $2 \times 3 = 6 \equiv 2 \pmod{4}$. Donc $2 \times 1 \equiv 2 \times 3 \pmod{4}$. Pourtant, $1 \not\equiv 3 \pmod{4}$! On ne peut pas « simplifier par 2 ». On ne peut diviser par c dans $ac \equiv bc \pmod{n}$ que si **c est premier avec n** ($\text{PGCD}(c, n) = 1$) !

---

4. PGCD, Algorithme d'Euclide et Théorème de Bézout

4.1 L'algorithme d'Euclide

Le Plus Grand Commun Diviseur de deux entiers a et b non tous deux nuls est noté $\text{PGCD}(a, b)$ ou $a \wedge b$. Euclide (-300) a établi que si $a = bq + r$, alors :

$$\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$$

Le PGCD est le **dernier reste non nul** de la suite des divisions euclidiennes.

Exemple : Calculons $\text{PGCD}(126, 48)$ *:* 1. $126 = 48 \times 2 + 30$ 2. $48 = 30 \times 1 + 18$ 3. $30 = 18 \times 1 + 12$ 4. $18 = 12 \times 1 + 6$ 5. $12 = 6 \times 2 + 0$ Le dernier reste non nul est 6. Donc $\text{PGCD}(126, 48) = 6$.

4.2 L'algorithme d'Euclide étendu et les coefficients de Bézout

En remontant les lignes de l'algorithme d'Euclide à l'envers, on peut toujours exprimer le PGCD comme une **combinaison linéaire** des deux entiers de départ ! Reprenons l'exemple :

- Ligne 4 : $6 = 18 - 12 \times 1$
- Ligne 3 : or $12 = 30 - 18 \times 1$, donc :

$$6 = 18 - (30 - 18 \times 1) = 2 \times 18 - 1 \times 30$$

- Ligne 2 : or $18 = 48 - 30 \times 1$, donc :

$$6 = 2 \times (48 - 30) - 1 \times 30 = 2 \times 48 - 3 \times 30$$

- Ligne 1 : or $30 = 126 - 48 \times 2$, donc :

$$6 = 2 \times 48 - 3 \times (126 - 48 \times 2) = 2 \times 48 - 3 \times 126 + 6 \times 48 = -3 \times 126 + 8 \times 48$$

Nous avons trouvé deux entiers $u = -3$ et $v = 8$ tels que :

$$126 \times (-3) + 48 \times 8 = 6$$

4.3 Le Théorème de Bézout

📐 Théorème fondamental de Bézout (1767)

Deux entiers relatifs non nuls a et b sont **premiers entre eux** ($\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$) si et seulement s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que :

$$\mathbf{au + bv = 1}$$

Sens réciproque immédiat : Si $au + bv = 1$, tout diviseur commun d de a et b divise la combinaison linéaire $au + bv = 1$. Donc $d \mid 1$, d'où $d = \pm 1$. Le PGCD vaut donc 1.

4.4 Résolution des équations diophantiennes $ax + by = c$

Une **équation diophantienne** (en l'honneur de Diophante d'Alexandrie) est une équation dont on cherche les solutions (x, y) uniquement dans l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}^2$.

🧭 Méthode — Résolution de $ax + by = c$

1.

Condition d'existence : Poser $d = \mathrm{PGCD}(a, b)$. L'équation admet des solutions entières si et seulement si $\boldsymbol{d}$ **divise** $\boldsymbol{c}$. 2. **Simplification :** On divise toute l'équation par d pour obtenir $a'x + b'y = c'$ avec $\mathrm{PGCD}(a', b') = 1$. 3. **Solution particulière :** On trouve une solution particulière (x_0, y_0) à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu. 4. **Soustraction membre à membre :** $a'x + b'y = c'$ et $a'x_0 + b'y_0 = c'$. Par soustraction : $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0) = b'(y_0 - y)$. 5. **Théorème de Gauss :** Comme a' divise $b'(y_0 - y)$ et $\mathrm{PGCD}(a', b') = 1$, a' divise $(y_0 - y)$. On en déduit l'ensemble de toutes les solutions (x, y) indexées par un entier $k \in \mathbb{Z}$.

---

5. Le Théorème de Gauss

⚠️ ⚠️ L'impératif absolu de la primalité entre eux

Ne jamais oublier la condition $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$! Si a et b ne sont pas premiers entre eux, le théorème de Gauss est totalement faux. Exemple classique : 6 divise le produit $4 \times 3 = 12$, mais 6 ne divise ni 4 ni 3, précisément parce que $\mathrm{PGCD}(6, 4) = 2 \neq 1$.

📐 Théorème fondamental de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si $\boldsymbol{a}$ **divise le produit** $\boldsymbol{bc}$ et si $\mathbf{PGCD}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \mathbf{1}$, alors :

$$\mathbf{a \ \ divise \ \ c}$$

✍️ Démonstration exigible — Théorème de Gauss

Supposons que $a \mid bc$ et que $\text{PGCD}(a, b) = 1$. Puisque a et b sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe deux entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$au + bv = 1$$

Multiplions les deux membres de cette égalité par l'entier c :

$$acu + bcv = c$$

Analysons les deux termes de gauche :

- Le premier terme acu est évidemment un multiple de a (il contient le facteur a).
- Le second terme contient bc. Or par hypothèse, $a \mid bc$, donc il existe un entier k tel que $bc = ka$. Le second terme s'écrit donc $(ka)v = a(kv)$, qui est aussi un multiple de a.

On peut donc factoriser par a dans le membre de gauche :

$$a(cu + kv) = c$$

Comme $(cu + kv) \in \mathbb{Z}$, cette égalité prouve rigoureusement que a divise c.

Corollaire (unicité de la décomposition en facteurs premiers) : Si un nombre premier p divise un produit $x_1 x_2 ... x_m$, alors p divise nécessairement au moins l'un des facteurs x_i.

---

6. Le Petit Théorème de Fermat et l'Exponentiation Rapide

6.1 Le Petit Théorème de Fermat (1640)

📐 Théorème — Petit Théorème de Fermat

Soit p un nombre premier. 1. Pour tout entier relatif a non divisible par p ($\text{PGCD}(a, p) = 1$) :

$$\mathbf{a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}}$$

2. Pour tout entier relatif $a \in \mathbb{Z}$ (sans aucune restriction) :

$$\mathbf{a^{p} \equiv a \pmod{p}}$$

✍️ Démonstration classique par les restes

Soit p premier et a un entier non divisible par p. Considérons les $p-1$ multiples successifs : $a, 2a, 3a, ..., (p-1)a$. Montrons que leurs restes modulo p sont tous distincts et non nuls : Si $k_1 a \equiv k_2 a \pmod{p}$ avec $1 \leq k_2 \leq k_1 \leq p-1$, alors $p \mid (k_1 - k_2)a$. Comme $\text{PGCD}(a, p) = 1$, d'après le théorème de Gauss, $p \mid (k_1 - k_2)$. Or $0 \leq k_1 - k_2 < p$, ce qui impose $k_1 - k_2 = 0 \Leftrightarrow k_1 = k_2$. Les restes des nombres $\{a, 2a, ..., (p-1)a\}$ modulo p sont donc exactement les entiers $\{1, 2, ..., p-1\}$ dans un ordre mélangé ! Faisons le produit de ces $p-1$ congruences :

$$a \times 2a \times 3a \times ... \times (p-1)a \equiv 1 \times 2 \times ... \times (p-1) \pmod{p}$$

En factorisant a dans chaque terme :

$$a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

Puisque p est premier, aucun des facteurs de $(p-1)!$ n'est divisible par p, donc $\text{PGCD}((p-1)!, p) = 1$. D'après le théorème de Gauss (ou par multiplication par l'inverse modulaire de $(p-1)!$), on peut simplifier par $(p-1)!$:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

6.2 L'algorithme d'exponentiation modulaire rapide

Comment calculer une puissance astronomique comme $7^{100} \pmod{13}$ sans calculer un nombre à 85 chiffres ? On utilise la décomposition binaire de l'exposant (méthode dite *Square-and-Multiply*) : L'exposant 100 s'écrit en binaire : $100 = 64 + 32 + 4$. On calcule les carrés successifs modulo 13 :

- $7^1 \equiv 7 \pmod{13}$
- $7^2 = 49 = 3 \times 13 + 10 \equiv -3 \pmod{13}$
- $7^4 \equiv (-3)^2 = 9 \equiv -4 \pmod{13}$
- $7^8 \equiv (-4)^2 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$
- $7^{16} \equiv 3^2 = 9 \equiv -4 \pmod{13}$
- $7^{32} \equiv (-4)^2 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$
- $7^{64} \equiv 3^2 = 9 \equiv -4 \pmod{13}$

Il ne reste plus qu'à multiplier les puissances utiles :

$$7^{100} = 7^{64} \times 7^{32} \times 7^4 \equiv (-4) \times 3 \times (-4) = 48 \equiv 9 \pmod{13}.$$

Le calcul a pris 7 petites multiplications de nombres inférieurs à 50 au lieu de 99 multiplications géantes !

---

7. Applications à la Cryptographie : De César au RSA

7.1 Le chiffrement affine

On associe à chaque lettre de l'alphabet un nombre de 0 à 25 (A=0, B=1, …, Z=25). La fonction de codage est :

$$y \equiv ax + b \pmod{26}$$

Pour que ce chiffrement soit **déchiffrable de façon unique**, deux lettres distinctes doivent obligatoirement donner deux codes distincts :

$$ax_1 + b \equiv ax_2 + b \pmod{26} \Leftrightarrow a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{26}$$

Cela n'impose $x_1 = x_2$ que si $\boldsymbol{a}$ **est premier avec 26** : $\mathrm{PGCD}(a, 26) = 1$. Puisque $26 = 2 \times 13$, a ne doit être divisible ni par 2, ni par 13. Pour déchiffrer, on cherche l'**inverse modulaire** de a modulo 26, c'est-à-dire l'entier a' tel que $aa' \equiv 1 \pmod{26}$ (fourni par l'algorithme de Bézout). La fonction de décodage est alors :

$$x \equiv a'(y - b) \pmod{26}$$

> ⚠ ⚠ **Piège classique de cryptographie — Le module de calcul de la clé secrète**
>
> Ne confondez jamais le module public $n = p \times q$ et le module de génération des clés $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$!
> - Les messages chiffrés et déchiffrés évoluent **modulo $\boldsymbol{n}$** : $C \equiv M^e \pmod{n}$ et $M \equiv C^d \pmod{n}$.
> - En revanche, l'exposant secret d est calculé comme l'inverse de la clé publique e **modulo $\boldsymbol{\varphi(n)}$** :
>
> $$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \quad \text{(et absolument pas modulo } \ n\ \text{ !)}$$
>
> Calculer l'inverse modulaire modulo n au lieu de modulo $\varphi(n)$ ruinerait intégralement l'algorithme : l'élévation à la puissance d ne déchiffrerait jamais le message.

7.2 Le principe du chiffrement asymétrique RSA

Voici le joyau absolu de la sécurité informatique moderne :



Fig. 122. – Cryptographie asymétrique RSA : échange de clé publique et déchiffrement

✍ Démonstration mathématique — Pourquoi le RSA déchiffre toujours exactement

Par construction, d est l'inverse de e modulo $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Il existe donc un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$e \cdot d = 1 + k(p-1)(q-1)$$

Bob calcule $C^d \pmod{n}$. Or $C \equiv M^e \pmod{n}$, donc :

$$C^d \equiv (M^e)^d = M^{ed} = M^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$$

Montrons que cette quantité est congrue à M modulo p et modulo q :

- **Modulo p :**
  - Si p divise M, alors $M \equiv 0 \pmod{p}$, donc $M^{ed} \equiv 0 \equiv M \pmod{p}$.
  - Si p ne divise pas M, par le Petit Théorème de Fermat, $M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Alors :

    $$M^{ed} = M \times \left(M^{p-1}\right)^{k(q-1)} \equiv M \times 1^{k(q-1)} = M \pmod{p}$$

    Dans tous les cas, $M^{ed} \equiv M \pmod{p} \Leftrightarrow p \mid (M^{ed} - M)$.
- **Modulo q :** Par un raisonnement rigoureusement symétrique, $q \mid (M^{ed} - M)$.

Puisque p et q sont deux nombres premiers distincts, ils sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss (ou par produit des diviseurs premiers), leur produit $n = pq$ divise $(M^{ed} - M)$:

$$M^{ed} \equiv M \pmod{n}$$

Le message d'origine réapparaît intact !

Pourquoi est-il impossible de tricher ? Pour trouver la clé privée d, un espion doit calculer l'inverse de e modulo $(p-1)(q-1)$. Pour cela, il a impérativement besoin de connaître p et q. Or l'espion ne connaît que le nombre public $n = p \times q$. Si p et q ont chacun 300 chiffres décimaux, le produit n compte 600 chiffres. Décomposer un tel nombre en facteurs premiers nécessiterait des milliards d'années de calcul pour tous les superordinateurs de la Terre réunis !

---

8. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Résolution d'une congruence linéaire

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence :

$$5x \equiv 3 \pmod{14}$$

Solution détaillée : Pour résoudre cette équation, nous devons trouver un inverse de 5 modulo 14. Cherchons une relation de Bézout entre 5 et 14 :

$$14 = 5 \times 2 + 4 \Longrightarrow 4 = 14 - 5 \times 2$$

$$5 = 4 \times 1 + 1 \Longrightarrow 1 = 5 - 4 \times 1 = 5 - (14 - 5 \times 2) = 5 \times 3 - 14 \times 1$$

On a donc $5 \times 3 - 14 \times 1 = 1$, ce qui signifie que :

$$5 \times 3 \equiv 1 \pmod{14}$$

L'inverse de 5 modulo 14 est donc **3**. Multiplions les deux membres de la congruence initiale par 3 :

$$3 \times (5x) \equiv 3 \times 3 \pmod{14}$$

$$(3 \times 5)x \equiv 9 \pmod{14}$$

$$1 \cdot x \equiv 9 \pmod{14} \Leftrightarrow x \equiv 9 \pmod{14}$$

L'ensemble des solutions est l'ensemble des entiers de la forme :

$$x = 14k + 9 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(Vérification : pour $x = 9$, $5 \times 9 = 45 = 14 \times 3 + 3 \equiv 3 \pmod{14}$).

Exemple 2 : Résolution d'une équation diophantienne

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation :

$$47x + 29y = 1$$

Solution détaillée : 1. **Algorithme d'Euclide pour 47 et 29 :**

- $47 = 29 \times 1 + 18$
- $29 = 18 \times 1 + 11$
- $18 = 11 \times 1 + 7$
- $11 = 7 \times 1 + 4$
- $7 = 4 \times 1 + 3$
- $4 = 3 \times 1 + 1$
- $3 = 1 \times 3 + 0$ Le dernier reste non nul est 1, donc $\mathrm{PGCD}(47, 29) = 1$. L'équation admet des solutions.

2. **Remontée de l'algorithme :**
   - $1 = 4 - 3 \times 1$
   - $1 = 4 - (7 - 4) = 2 \times 4 - 7$
   - $1 = 2 \times (11 - 7) - 7 = 2 \times 11 - 3 \times 7$
   - $1 = 2 \times 11 - 3 \times (18 - 11) = 5 \times 11 - 3 \times 18$
   - $1 = 5 \times (29 - 18) - 3 \times 18 = 5 \times 29 - 8 \times 18$
   - $1 = 5 \times 29 - 8 \times (47 - 29) = 13 \times 29 - 8 \times 47 = 47 \times (-8) + 29 \times 13$ Une solution particulière est donc $(x_0, y_0) = (-8, 13)$.
3. **Résolution générale :**

   $$47x + 29y = 1 \quad \text{et} \quad 47(-8) + 29(13) = 1$$

   Par soustraction :

   $$47(x - (-8)) + 29(y - 13) = 0 \Leftrightarrow 47(x + 8) = 29(13 - y)$$

   Puisque 47 divise $29(13 - y)$ et $\mathrm{PGCD}(47, 29) = 1$, d'après le théorème de Gauss, 47 divise $(13 - y)$. Il existe donc un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

   $$13 - y = 47k \Leftrightarrow y = 13 - 47k$$

   En remplaçant dans l'égalité :

   $$47(x + 8) = 29(47k) \Leftrightarrow x + 8 = 29k \Leftrightarrow x = -8 + 29k$$

   L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ est :

   $$S = \{(-8 + 29k\,;\, 13 - 47k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Exemple 3 : Déchiffrement d'un code affine

Un message a été crypté avec le chiffrement affine $y \equiv 7x + 5 \pmod{26}$. On intercepte la lettre chiffrée **V** (qui correspond au rang 21). Retrouver la lettre d'origine x.

Solution détaillée : 1. L'équation à résoudre est $7x + 5 \equiv 21 \pmod{26} \Leftrightarrow 7x \equiv 16 \pmod{26}$. 2. Cherchons l'inverse de 7 modulo 26 : $26 = 7 \times 3 + 5$ $7 = 5 \times 1 + 2$ $5 = 2 \times 2 + 1 \Longrightarrow 1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 3(26 - 7 \times 3) - 2 \times 7 = 3 \times 26 - 11 \times 7$. Donc $-11 \times 7 \equiv 1 \pmod{26}$. Or $-11 \equiv 26 - 11 = 15 \pmod{26}$. Vérifions : $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$. L'inverse de 7 modulo 26 est donc **15**. 3. Multiplions l'équation $7x \equiv 16 \pmod{26}$ par 15 :

$$x \equiv 15 \times 16 \pmod{26}$$

$15 \times 16 = 240$. Effectuons la division euclidienne de 240 par 26 : $240 = 26 \times 9 + 6$. Donc $x \equiv 6 \pmod{26}$. 4. Le rang 6 correspond à la lettre : $0 \to A, 1 \to B, 2 \to C, 3 \to D, 4 \to E, 5 \to F, 6 \to \mathbf{G}$. La lettre d'origine était un **G**.

Exemple 4 : Calcul de reste avec le Petit Théorème de Fermat

Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 17.

Solution détaillée : 1. Le diviseur est $p = 17$, qui est un nombre premier. 2. L'entier $a = 3$ n'est pas divisible par 17 ($\text{PGCD}(3, 17) = 1$). 3. D'après le Petit Théorème de Fermat :

$$3^{17-1} = 3^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$

4. Effectuons la division euclidienne de la puissance 2026 par 16 :

$$2026 = 16 \times 126 + 10$$

5. Décomposons la puissance :

$$3^{2026} = 3^{16 \times 126 + 10} = (3^{16})^{126} \times 3^{10} \equiv 1^{126} \times 3^{10} \equiv 3^{10} \pmod{17}$$

6. Calculons $3^{10} \pmod{17}$ par carrés successifs :

- $3^2 = 9$
- $3^4 = 9^2 = 81 = 17 \times 4 + 13 \equiv -4 \pmod{17}$
- $3^8 \equiv (-4)^2 = 16 \equiv -1 \pmod{17}$
- $3^{10} = 3^8 \times 3^2 \equiv (-1) \times 9 = -9 \equiv 17 - 9 = 8 \pmod{17}$.

Le reste de la division de 3^{2026} par 17 est donc **8**.

Exemple 5 : Un exemple miniature complet du RSA

Bob prépare ses clés RSA : 1. Il choisit $p = 5$ et $q = 11$. 2. Calculer le module n et la valeur de l'indicatrice $\varphi(n)$. 3. Bob choisit la clé publique $e = 3$. Vérifier que ce choix est valide. 4. Calculer la clé privée secrète d. 5. Alice veut envoyer le message secret $M = 9$. Chiffrer ce message pour obtenir C. 6. Montrer comment Bob déchiffre C pour retrouver M.

Solution détaillée : 1. $n = p \times q = 5 \times 11 = 55$. 2. $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 4 \times 10 = 40$. 3. $e = 3$. Comme $40 = 3 \times 13 + 1$, $\text{PGCD}(3, 40) = 1$. Le choix $e = 3$ est parfaitement valide. 4. On cherche d tel que $3d \equiv 1 \pmod{40}$. Or $3 \times 13 = 39 = 40 - 1 \equiv -1 \pmod{40}$, donc $3 \times (-13) \equiv 1 \pmod{40}$. Comme $-13 \equiv 40 - 13 = 27 \pmod{40}$, on a $d = 27$. *(Vérification :* $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1 \equiv 1$*).* La clé privée de Bob est $\boldsymbol{d = 27}$. 5. **Chiffrement par Alice :** $C \equiv M^e \pmod{n} \Leftrightarrow C \equiv 9^3 \pmod{55}$. $9^3 = 729$. Division de 729 par 55 : $729 = 55 \times 13 + 14$. Le message chiffré envoyé sur le réseau est $\boldsymbol{C = 14}$. 6. **Déchiffrement par Bob :** Bob calcule $M \equiv C^d = 14^{27} \pmod{55}$. Décomposons l'exposant 27 en binaire : $27 = 16 + 8 + 2 + 1$. Calculons les puissances de 14 modulo 55 :

- $14^1 \equiv 14$
- $14^2 = 196 = 55 \times 3 + 31 \equiv 31 \equiv -24 \pmod{55}$
- $14^4 \equiv (-24)^2 = 576 = 55 \times 10 + 26 \equiv 26 \pmod{55}$
- $14^8 \equiv 26^2 = 676 = 55 \times 12 + 16 \equiv 16 \pmod{55}$
- $14^{16} \equiv 16^2 = 256 = 55 \times 4 + 36 \equiv 36 \equiv -19 \pmod{55}$ Multiplions : $14^{27} = 14^{16} \times 14^8 \times 14^2 \times 14 \equiv (-19) \times 16 \times 31 \times 14 \pmod{55}$.
- $(-19) \times 16 = -304 = 55 \times (-6) + 26 \equiv 26$
- $31 \times 14 = 434 = 55 \times 7 + 49 \equiv -6$
- $26 \times (-6) = -156 = 55 \times (-3) + 9 \equiv 9 \pmod{55}$. Bob retrouve exactement $\boldsymbol{M = 9}$!

Exemple 6 : Critères de divisibilité par les congruences

Démontrer à l'aide des congruences qu'un nombre entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Solution détaillée : Soit un entier naturel N dont l'écriture décimale est $a_k a_{k-1} ... a_1 a_0$:

$$N = \sum_{j=0}^{k} a_j 10^j = a_0 + a_1 10 + a_2 10^2 + ... + a_k 10^k$$

Remarquons que :

$$10 = 9 + 1 \equiv 1 \pmod 9$$

D'après les propriétés de compatibilité des congruences avec les puissances : Pour tout entier $j \geq 0$, $10^j \equiv 1^j \equiv 1 \pmod 9$. En multipliant par chaque chiffre a_j et en sommant :

$$N = \sum_{j=0}^{k} a_j 10^j \equiv \sum_{j=0}^{k} a_j (1) \equiv \sum_{j=0}^{k} a_j \pmod 9$$

Le nombre N et la somme de ses chiffres ont donc exactement le même reste modulo 9. Par conséquent, $9 \mid N$ si et seulement si 9 divise la somme de ses chiffres décimaux.

Ce qu'il faut retenir

1. **Divisibilité et Division :**
   - $a \mid b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, b = ka$.
   - Combinaisons linéaires : si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid (ub + vc)$.
   - Division euclidienne : $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.
2. **Congruences :**
   - $a \equiv b \pmod n \Leftrightarrow n \mid (a - b)$ (même reste par n).
   - Compatible avec addition, soustraction, multiplication et puissances.
   - On ne peut simplifier $ac \equiv bc \pmod n$ par c que si $\text{PGCD}(c, n) = 1$.
3. **Bézout et Gauss :**
   - $\text{PGCD}(a, b) = 1 \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = 1$ (Bézout).
   - Si $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$ (Gauss).
4. **Fermat et RSA :**
   - Petit théorème de Fermat : si p premier et $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.
   - RSA : clé publique (n, e) avec $n = pq$, clé privée $d \equiv e^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.
   - $C \equiv M^e \pmod n \Longrightarrow M \equiv C^d \pmod n$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 56.1 Effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$: 1. De 157 par 11. 2. De -75 par 8. 3. De -140 par 12.

Exercice 56.2 Vrai ou Faux ? Justifier. 1. Si $a \equiv 3 \pmod 5$, alors $a^2 \equiv 4 \pmod 5$. 2. Si $a \equiv 2 \pmod 6$, alors a est un nombre pair. 3. Si $3x \equiv 3y \pmod 7$, alors $x \equiv y \pmod 7$.

Exercice 56.3 Calculer le $\text{PGCD}(323, 187)$ par l'algorithme d'Euclide. Les nombres sont-ils premiers entre eux ?

Exercice 56.4 Trouver un couple d'entiers relatifs (u, v) solution de l'identité de Bézout :

$$17u + 11v = 1$$

Exercice 56.5 Calculer le reste de la division euclidienne de 2^{100} par 7.

Exercice 56.6 Une pendule à 12 heures indique 8 heures. Quelle heure indiquera-t-elle dans 1 500 heures ?

Exercice 56.7 Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $3x \equiv 1 \pmod{10}$.

Niveau (Réflexion et équations de baccalauréat)

Exercice 56.8 Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation diophantienne :

$$13x - 7y = 1$$

En déduire toutes les solutions vérifiant $0 \leq x \leq 50$.

Exercice 56.9 Chiffrement affine. On utilise le chiffrement $y \equiv 5x + 7 \pmod{26}$. 1. Vérifier que ce codage est réversible. 2. Coder le mot **BAC**. 3. Trouver la fonction de déchiffrement et décoder la lettre **R** (rang 17).

Exercice 56.10 Déterminer le chiffre des unités de 7^{2025} dans son écriture décimale classique. *(Indication : chercher le reste modulo 10).*

Exercice 56.11 Démontrer que pour tout entier naturel n, l'entier $A_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.

Exercice 56.12 Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que la fraction $\frac{2n+1}{3n+1}$ est irréductible pour tout entier n.

Exercice 56.13 Les voleurs de noix de coco. Trois naufragés ramassent un tas de noix de coco. Pendant la nuit, le premier se réveille, partage le tas en 3 parts égales, constate qu'il reste 1 noix qu'il donne à un singe, et cache sa part. Le deuxième et le troisième font successivement de même. Traduire ce problème par un système de congruences et trouver le nombre minimal de noix initiales.

Exercice 56.14 Théorème des restes chinois (Cas particulier). Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système de congruences :

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Exercice 56.15 Nombres de Mersenne et Fermat. Soit p un nombre premier impair. On considère le nombre de Mersenne $M_p = 2^p - 1$. Soit q un diviseur premier de M_p. Démontrer que $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

Niveau (Approfondissements et concours)

Exercice 56.16 Démonstration du Théorème de Wilson. Démontrer qu'un entier $p \geq 2$ est premier si et seulement si :

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

(Indication : regrouper chaque élément de $\{2, \dots, p-2\}$ avec son inverse modulaire distinct).

Exercice 56.17 L'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$. 1. Pour p premier, justifier que $\varphi(p) = p - 1$ et $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. 2. Démontrer le théorème d'Euler généralisant Fermat : si $\mathrm{PGCD}(a, n) = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Exercice 56.18 Le test de primalité de Miller-Rabin. Expliquer le principe du test probabiliste de Miller-Rabin fondé sur le théorème de Fermat et les racines carrées de 1 modulo p. Pourquoi permet-il de tester des nombres de 500 chiffres en une fraction de seconde ?

Exercice 56.19 Attaque de Wiener sur le chiffrement RSA. Montrer que si l'exposant secret d est choisi trop petit ($d < \frac{1}{3}n^{1/4}$), la clé privée peut être retrouvée rapidement à partir de la clé publique (n, e) en utilisant le développement en fractions continues de $\frac{e}{n}$.

Exercice 56.20 L'ordre d'un élément dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Soit p un nombre premier et a un entier non divisible par p. On appelle ordre de a modulo p le plus petit entier non nul k tel que $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. Démontrer que k divise obligatoirement $p - 1$.

Exercice 56.21 Résidus quadratiques et symbole de Legendre. Soit p un nombre premier impair. Un entier a non multiple de p est un carré modulo p s'il existe x tel que $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Démontrer le critère d'Euler :

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \begin{cases} +1 \pmod{p} \text{ si } \ a \ \text{ est un carré} \\ -1 \pmod{p} \text{ si } \ a \ \text{ n'est pas un carré} \end{cases}$$

Exercice 56.22 Le problème du logarithme discret et l'échange de clés de Diffie-Hellman. Expliquer le protocole d'échange de clés de Diffie-Hellman fondé sur la fonction puissance $g^a \pmod{p}$. Pourquoi est-il simple de calculer $g^a \pmod{p}$ mais presque impossible de retrouver a connaissant g^a ?

Solutions

Solution 56.1 1. $157 = 11 \times 14 + 3$ ($q = 14, r = 3$). 2. $-75 = 8 \times (-10) + 5$ ($q = -10, r = 5$). 3. $-140 = 12 \times (-12) + 4$ ($q = -12, r = 4$).

Solution 56.2 1. **Vrai.** $a \equiv 3 \pmod{5} \Longrightarrow a^2 \equiv 3^2 = 9 \equiv 4 \pmod{5}$. 2. **Vrai.** $a = 6k + 2 = 2(3k + 1)$, qui est divisible par 2. 3. **Vrai.** Comme $\mathrm{PGCD}(3, 7) = 1$, on peut diviser par 3 par le théorème de Gauss.

Solution 56.3 $323 = 187 \times 1 + 136$. $187 = 136 \times 1 + 51$. $136 = 51 \times 2 + 34$. $51 = 34 \times 1 + 17$. $34 = 17 \times 2 + 0$. $\text{PGCD}(323, 187) = 17 \neq 1$. Ils ne sont pas premiers entre eux.

Solution 56.4 $17 = 11 \times 1 + 6 \Longrightarrow 6 = 17 - 11$. $11 = 6 \times 1 + 5 \Longrightarrow 5 = 11 - 6 = 11 - (17 - 11) = 2 \times 11 - 17$. $6 = 5 \times 1 + 1 \Longrightarrow 1 = 6 - 5 = (17 - 11) - (2 \times 11 - 17) = 2 \times 17 - 3 \times 11$. Un couple solution est $(u, v) = (2, -3)$.

Solution 56.5 Modulo 7, $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$. Division de 100 par 3 : $100 = 3 \times 33 + 1$. $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2^1 \equiv 1^{33} \times 2 = 2 \pmod 7$. Le reste est 2.

Solution 56.6 On cherche $8 + 1500 \pmod{12}$. $1500 = 12 \times 125 + 0 \equiv 0 \pmod{12}$. La pendule indiquera donc de nouveau **8 heures** pile.

Solution 56.7 On cherche l'inverse de 3 modulo 10. Comme $3 \times 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$, l'inverse est 7. $3x \equiv 1 \Longrightarrow 7 \times 3x \equiv 7 \times 1 \Longrightarrow x \equiv 7 \pmod{10}$. $S = \{10k + 7 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Solution 56.8 $13(1) - 7(2) = 13 - 14 = -1 \Longrightarrow 13(-1) - 7(-2) = 1$. Solution particulière : $(-1, -2)$. $13(x + 1) = 7(y + 2)$. Comme $\text{PGCD}(13, 7) = 1$, par Gauss : $x + 1 = 7k \Longrightarrow x = 7k - 1$ et $y = 13k - 2$. Pour $0 \leq x \leq 50$: $0 \leq 7k - 1 \leq 50 \Longrightarrow 1 \leq 7k \leq 51 \Longrightarrow k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. 7 couples solutions.

Solution 56.9 1. $\text{PGCD}(5, 26) = 1$ car $26 = 2 \times 13$, donc le codage est bijectif. 2. B(1) : $5(1) + 7 = 12 \to$ M. A(0) : $5(0) + 7 = 7 \to$ H. C(2) : $5(2) + 7 = 17 \to$ R. BAC devient **MHR**. 3. Inverse de 5 modulo 26 : $5 \times 21 = 105 = 4 \times 26 + 1$, donc $5^{-1} \equiv 21$. $x \equiv 21(y - 7) \pmod{26}$. Pour R ($y = 17$) : $x \equiv 21(17 - 7) = 210 = 26 \times 8 + 2 \equiv 2 \pmod{26}$. Le rang 2 correspond à **C**.

Solution 56.10 Cherchons $7^{2025} \pmod{10}$. $7^1 \equiv 7$, $7^2 = 49 \equiv 9 \equiv -1$, $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$. $2025 = 4 \times 506 + 1$. $7^{2025} = (7^4)^{506} \times 7^1 \equiv 1 \times 7 = 7 \pmod{10}$. Le chiffre des unités est **7**.

Solution 56.11 $3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n = 3 \times 9^n \equiv 3 \times 2^n \pmod 7$ (car $9 \equiv 2$). $2^{n+2} = 2^2 \times 2^n = 4 \times 2^n \pmod 7$. Somme : $A_n \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 \pmod 7$. Donc $7 \mid A_n$.

Solution 56.12 Soit d un diviseur commun du numérateur et du dénominateur. $d \mid (2n + 1)$ et $d \mid (3n + 1)$. Alors d divise la combinaison linéaire $3(2n + 1) - 2(3n + 1) = 6n + 3 - 6n - 2 = 1$. Comme $d \mid 1$, on a $d = 1$. Les deux entiers sont toujours premiers entre eux, la fraction est irréductible.

Solution 56.13 Soit N le nombre de noix. Chaque étape retire 1 noix et prend un tiers, laissant $2/3(N - 1)$. Après 3 étapes, les divisions successives mènent à la congruence $8N \equiv 17 \pmod{27} \Longrightarrow N \equiv 25 \pmod{27}$. Le plus petit nombre positif non nul possible est $N = 25$ (ou 79 si le partage final du matin est non nul).

Solution 56.14 $x = 5k + 2$. En injectant dans la seconde : $5k + 2 \equiv 3 \pmod 7 \Leftrightarrow 5k \equiv 1 \pmod 7$. L'inverse de 5 modulo 7 est 3 ($5 \times 3 = 15 \equiv 1$). Donc $k \equiv 3 \pmod 7 \Longrightarrow k = 7m + 3$. D'où $x = 5(7m + 3) + 2 = 35m + 17$. Les solutions sont $x \equiv 17 \pmod{35}$.

Solution 56.15 Si $q \mid (2^p - 1)$, alors $2^p \equiv 1 \pmod q$. L'ordre de 2 modulo q divise le nombre premier p, donc l'ordre vaut p. D'après Fermat, $2^{q-1} \equiv 1 \pmod q$, donc l'ordre p divise $q - 1$, ce qui signifie $q - 1 = kp \Longrightarrow q \equiv 1 \pmod p$. Comme q est impair (M_p étant impair), $q - 1$ est pair, donc k est pair ($k = 2m$). D'où $q = 2mp + 1 \equiv 1 \pmod{2p}$.

Solution 56.16 Si p est premier, chaque élément $x \in \{2, ..., p - 2\}$ possède un unique inverse modulaire distinct de lui-même (car $x^2 \equiv 1 \Longrightarrow x = \pm 1$). Tous ces termes se neutralisent deux à deux dans le produit $(p - 1)!$, ne laissant que $1 \times (p - 1) \equiv -1 \pmod p$. La réciproque découle du fait que si p est composé, un diviseur strict $d < p$ diviserait $(p - 1)!$ et ne pourrait diviser $(p - 1)! + 1$.

Solution 56.17 1. Pour p^k, les entiers non premiers avec p^k sont les multiples de p, soit p^{k-1} entiers. Donc $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. 2. En considérant les entiers premiers avec n et en multipliant par a, le produit des éléments se conserve par bijectivité de la multiplication dans le groupe des inversibles $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, ce qui donne $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$.

Solution 56.18 Si n est premier, pour $n - 1 = 2^s d$, la suite des élévations au carré à partir de a^d doit terminer par 1, et la dernière valeur différente de 1 doit être -1. Si une autre valeur apparaît, n est certainement composé. Ce test polynomial rapide est la clé de voûte de la génération des grands nombres premiers pour la cryptographie.

Solution 56.19 Si $ed - k\varphi(n) = 1$, alors $\left|\frac{e}{n} - \frac{k}{d}\right| \leq \frac{1}{2d^2}$. D'après le théorème de Legendre sur les fractions continues, $\frac{k}{d}$ est nécessairement l'une des réduites de l'approximation de $\frac{e}{n}$, ce qui permet à un attaquant de calculer d en un temps quasi instantané.

Solution 56.20 Soit k l'ordre de a. Effectuons la division euclidienne de $p - 1$ par k : $p - 1 = kq + r$ avec $0 \leq r < k$. Alors $a^{p-1} = (a^k)^q \times a^r \equiv 1^q \times a^r \equiv a^r \pmod p$. Or d'après Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, donc $a^r \equiv 1 \pmod p$.

Comme k est le plus petit entier strictement positif vérifiant cette propriété et que $r < k$, on a obligatoirement $r = 0$. Donc k divise $p - 1$.

Solution 56.21 D'après Fermat, $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Donc $a^{\frac{p-1}{2}}$ est solution de $X^2 \equiv 1 \pmod{p}$, d'où $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Si $a = x^2$, alors $a^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} \equiv 1$. Le polynôme $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$ de degré $\frac{p-1}{2}$ ayant au plus $\frac{p-1}{2}$ racines, les carrés en sont les seules racines.

Solution 56.22 Alice choisit a secret, envoie $A = g^a \pmod{p}$. Bob choisit b secret, envoie $B = g^b \pmod{p}$. La clé commune est $K = B^a = A^b = g^{ab} \pmod{p}$. Un espion qui intercepte g^a et g^b ne peut pas calculer g^{ab} sans résoudre le problème du logarithme discret, réputé intraitable pour de grands modules premiers.

La question qui ouvre la suite

Nous venons de voir comment les équations arithmétiques permettent de chiffrer des flux d'informations et de relier des variables entières. Mais que se passe-t-il lorsque les flux à transformer ne sont plus de simples nombres isolés, mais des tableaux entiers de données, des réseaux d'interconnexions et des états probabilistes en perpétuelle transition ? Comment modéliser l'évolution d'une population, le classement des pages web par Google ou les états d'une machine de Turing ? Pour orchestrer ces flux multidimensionnels, les mathématiciens ont forgé un outil spectaculaire : les matrices et les graphes. Tourne la page pour découvrir **le Chapitre 57 et le Métier Jacquard Revisité : Matrices et Graphes**.

CHAPITRE 57 : Le Métier Jacquard Revisité : Matrices et Graphes

> « En 1801 à Lyon, Joseph Marie Jacquard perfore des cartons pour commander les fils de soie de son métier à tisser : une grille de trous orchestre la montée et la descente des navettes pour faire émerger des motifs d'une infinie complexité. Les matrices sont les cartons Jacquard de l'algèbre moderne : des grilles de nombres capables de déformer l'espace, de compter les trajectoires d'un réseau et de prédire l'équilibre futur des flux du monde. »

Ce que tu vas découvrir

- Comment une **matrice** encapsule un tableau d'opérations et transforme des vecteurs par le produit ligne $\times$ colonne.
- Pourquoi la multiplication des matrices est associative mais **non commutative** ($AB \neq BA$), et comment fonctionne la matrice identité I_n.
- Le calcul de l'**inverse d'une matrice 2×2** grâce au déterminant et la résolution instantanée de systèmes linéaires $AX = B$.
- La modélisation des réseaux par les **graphes** et la **matrice d'adjacence**.
- Le théorème fondamental qui démontre pourquoi la puissance k-ième d'une matrice d'adjacence M^k compte exactement le **nombre de chemins de longueur k**.
- Les **chaînes de Markov** et les graphes probabilistes : calcul de l'**état stable** et les fondements de l'algorithme PageRank de Google.

---

1. Le problème : Les réseaux du monde et les tableaux de commande

1.1 Le vol des compagnies aériennes

Considérons une petite compagnie aérienne desservant quatre villes : Paris (P), Londres (L), Madrid (M) et Rome (R). Les liaisons directes quotidiennes sont les suivantes :

- De Paris vers Londres, Madrid et Rome.
- De Londres vers Paris et Madrid.
- De Madrid vers Paris et Rome.
- De Rome vers Paris uniquement.

Si un voyageur veut partir de Londres pour aller à Rome, il n'existe aucun vol direct. Mais peut-il s'y rendre avec **exactement une escale** (un trajet en deux vols) ? Et avec deux escales ? Combien y a-t-il d'itinéraires possibles ?

Si l'on cherche à la main, on s'égare rapidement dans l'arborescence des bifurcations. Mais si l'on consigne ces liaisons dans une **grille binaire** (1 s'il y a un vol, 0 sinon), et qu'on multiplie cette grille par elle-même, un miracle se produit : **le calcul matriciel dénombre instantanément l'ensemble de tous les chemins possibles sur n'importe quel réseau !**

1.2 La météo et les prédictions à long terme

Dans une région côtière, on observe le temps jour après jour.

- S'il fait beau aujourd'hui, il y a 80 % de chances qu'il fasse beau demain, et 20 % de chances qu'il pleuve.
- S'il pleut aujourd'hui, il y a 40 % de chances qu'il fasse beau demain, et 60 % de chances qu'il pleuve.

Quel temps fera-t-il dans une semaine ? Dans un an ? Existe-t-il un climat moyen d'équilibre (par exemple 65 % de beaux jours et 35 % de jours pluvieux) vers lequel le système converge inévitablement, quel que soit le temps qu'il fait aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous devons croiser la théorie des probabilités avec l'algèbre des matrices : c'est la théorie des **chaînes de Markov**.

---

2. L'Objet Matrice et ses Opérations

2.1 Définition d'une matrice

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Matrice** Soient n et p deux entiers naturels non nuls. Une **matrice** de dimension (ou taille) $n \times p$ (lire « n lignes, p colonnes ») à coefficients réels est un tableau rectangulaire de nombres disposés en n lignes et p colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} = (a_{i,j})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}}$$

Le coefficient $a_{i,j}$ est situé à l'intersection de la i-ième ligne et de la j-ième colonne. L'ensemble des matrices de taille $n \times p$ à coefficients réels est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Vocabulaire : - Si $n = p$, la matrice est dite **carrée** d'ordre n. L'ensemble est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. - Si $n = 1$, c'est une **matrice ligne** : $(x_1\ x_2\ \dots\ x_p)$. - Si $p = 1$, c'est une **matrice colonne** : $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. - La **matrice nulle** (notée $0_{n,p}$) a tous ses coefficients nuls.

2.2 Addition et multiplication par un nombre réel

- **Addition :** Si A et B ont la **même dimension** $n \times p$, la somme $A + B$ s'obtient en additionnant les coefficients correspondants :
$$(A + B)_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$
- **Multiplication par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$:** On multiplie chaque case par λ :
$$(\lambda A)_{i,j} = \lambda a_{i,j}$$

2.3 Le produit matriciel : Ligne par Colonne

La multiplication de deux matrices n'est **pas** une multiplication case par case ! Elle traduit la composition de transformations linéaires.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Produit matriciel** Soit A une matrice de taille $n \times \mathbf{k}$ et B une matrice de taille $\mathbf{k} \times p$. *(Le nombre de colonnes de A doit impérativement être égal au nombre de lignes de B !)* Le produit $C = A \times B$ est une matrice de taille $n \times p$ dont le terme général $c_{i,j}$ est le produit scalaire de la **i-ième ligne de A** par la **j-ième colonne de B** :

$$c_{i,j} = \sum_{m=1}^{k} a_{i,m} \cdot b_{m,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \dots + a_{i,k}b_{k,j}$$



Fig. 123. – Principe du produit matriciel ligne par colonne

Exemple fondamental en dimension 2×2 *:*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + bz & ay + bt \\ cx + dz & cy + dt \end{pmatrix}$$

2.4 Propriétés et pièges de la multiplication matricielle

⚠ Attention au Piège !

⚠ **Attention, piège ! — Non-commutativité en général** Pour deux matrices carrées A et B, en général :

$$\mathbf{AB \neq BA}$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ alors que $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$! Elles ne commutent pas. Par conséquent, les identités remarquables comme $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ sont **fausses** pour les matrices (on a $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$).

⚠ ⚠ Deuxième piège — Diviseurs de zéro

Pour des réels, $ab = 0 \Longrightarrow a = 0 \quad \text{ou} \quad b = 0$. **C'est faux pour les matrices !** Prenons $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2$$

Le produit de deux matrices non nulles peut être la matrice nulle !

2.5 Matrice identité et puissances

La **matrice identité** d'ordre n, notée I_n, comporte des 1 sur sa diagonale principale et des 0 partout ailleurs :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour toute matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$A \times I_n = I_n \times A = A$$

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, on définit la puissance A^k par $A^0 = I_n$ et $A^k = \underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{k \text{ facteurs}}$.

3. Matrice Inverse et Systèmes Linéaires

3.1 Définition de l'inversibilité

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Matrice inversible** Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite **inversible** s'il existe une matrice carrée $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$AB = BA = I_n$$

Si une telle matrice existe, elle est unique. On l'appelle la **matrice inverse** de A et on la note $\boldsymbol{A^{-1}}$.

(⚠️ Il n'existe pas de « division » matricielle $\frac{B}{A}$! On multiplie par l'inverse A^{-1}, en veillant scrupuleusement à multiplier à gauche ou à droite).

3.2 Inversion des matrices de taille 2×2

📐 **Théorème — Inverse d'une matrice 2×2**

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On appelle **déterminant** de A le nombre réel :

$$\det(A) = ad - bc$$

1. La matrice A est **inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$**. 2. Si $\det(A) \neq 0$, son inverse est donnée par la formule :

$$\mathbf{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$$

Démonstration immédiate par vérification directe :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ba \\ cd - dc & -cb + da \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) I_2$$

En divisant par le réel non nul $ad - bc$, on obtient rigoureusement I_2.

3.3 Résolution de systèmes linéaires par inversion de matrice

Considérons un système de deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = \alpha \\ cx + dy = \beta \end{cases}$$

Ce système s'écrit sous forme d'une unique équation matricielle :

$$AX = B \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, la matrice A est inversible. En multipliant **à gauche par $\boldsymbol{A^{-1}}$** :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \Leftrightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \Leftrightarrow I_2 X = A^{-1}B$$

D'où l'unique solution :

$$\mathbf{X = A^{-1}B}$$

---

4. Graphes et Matrice d'Adjacence

4.1 Vocabulaire des graphes

Un **graphe** $G = (V, E)$ est constitué :

- D'un ensemble de **sommets** (ou nœuds, *vertices*) notés $\{1, 2, \ldots, n\}$.

- D'un ensemble d'**arêtes** (liaisons bidirectionnelles dans un graphe non orienté) ou d'**arcs** (flèches orientées d'un sommet vers un autre dans un graphe orienté).
- Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes qui lui sont connectées.
- Une **chaîne** (ou un chemin) de longueur k est une suite de k arêtes consécutives reliant un sommet de départ à un sommet d'arrivée.

4.2 La matrice d'adjacence

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Matrice d'adjacence** Soit G un graphe d'ordre n dont les sommets sont numérotés de 1 à n. La **matrice d'adjacence** de G est la matrice carrée $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont le coefficient à la ligne i et colonne j vaut :

$$m_{i,j} = \text{nombre d'arêtes (ou d'arcs) allant du sommet } \ i \ \text{ au sommet } \ j$$

(Dans un graphe simple non orienté, $m_{i,j} \in \{0,1\}$ et M est symétrique : $m_{i,j} = m_{j,i}$).



Fig. 124. – Graphe orienté à 3 sommets et matrice d'adjacence associée

4.3 Le théorème fondamental des chemins de longueur k

📐 **Théorème fondamental — Puissances de la matrice d'adjacence**

Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe à n sommets. Pour tout entier naturel $k \geq 1$, le coefficient situé à la i-ième ligne et la j-ième colonne de la matrice M^k est égal au **nombre de chemins de longueur k reliant le sommet i au sommet j**.

✍️ Démonstration exigible par récurrence

Notons $c_{i,j}^{(k)}$ le coefficient (i,j) de la matrice M^k, et $N_{i,j}^{(k)}$ le nombre de chemins de longueur k allant de i à j. Démontrons par récurrence sur $k \geq 1$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: « Pour tous i, j, $c_{i,j}^{(k)} = N_{i,j}^{(k)}$ ».

- **Initialisation ($k = 1$) :** $M^1 = M$. Par définition de la matrice d'adjacence, $c_{i,j}^{(1)} = m_{i,j}$ est exactement le nombre d'arêtes directes reliant i à j, c'est-à-dire le nombre de chemins de longueur 1. $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
- **Hérédité :** Supposons la propriété vraie au rang $k \geq 1$: pour tous sommets i et m, $c_{i,m}^{(k)} = N_{i,m}^{(k)}$. Considérons un chemin de longueur $k+1$ allant de i à j. Ce chemin est formé d'un chemin de longueur k allant de i à un certain sommet intermédiaire m, suivi d'une arête directe de m vers j (de longueur 1). D'après le principe additif et le principe multiplicatif du Chapitre 53, le nombre total de tels chemins est la somme sur tous les sommets intermédiaires possibles $m \in \{1, ..., n\}$:

  $$N_{i,j}^{(k+1)} = \sum_{m=1}^{n} N_{i,m}^{(k)} \times m_{m,j}$$

  Par hypothèse de récurrence, $N_{i,m}^{(k)} = c_{i,m}^{(k)}$. Donc :

  $$N_{i,j}^{(k+1)} = \sum_{m=1}^{n} c_{i,m}^{(k)} \cdot m_{m,j}$$

  Or cette somme est précisément la formule du produit matriciel de la ligne i de M^k par la colonne j de M ! C'est exactement le coefficient (i,j) de la matrice $M^k \times M = M^{k+1}$. Donc $N_{i,j}^{(k+1)} = c_{i,j}^{(k+1)}$. L'hérédité est prouvée.
- **Conclusion :** Par récurrence, la propriété est vraie pour tout $k \geq 1$.

---

5. Chaînes de Markov et Graphes Probabilistes

5.1 Graphes probabilistes et matrice de transition

Un système aléatoire évolue au cours du temps entre k états possibles (par exemple : États $E_1, E_2, ..., E_k$). À chaque unité de temps (étape n), le système passe d'un état à un autre selon des probabilités fixées.

Définition Fondamentale

📐 **Définition — Matrice de transition** La **matrice de transition** T d'un graphe probabiliste à k états est la matrice carrée $k \times k$ dont le coefficient $t_{i,j}$ est la probabilité conditionnelle de passer à l'état j sachant qu'on est à l'état i :

$$t_{i,j} = P_{(E_i)}(E_j)$$

Propriété stochastique : Sur chaque ligne de T, la somme des coefficients vaut 1 :

$$\sum_{j=1}^{k} t_{i,j} = 1 \quad \text{(car la somme des probabilités issues d'un sommet vaut 1)}$$

5.2 Évolution de la distribution probabiliste

On note P_n la **matrice ligne** des probabilités à l'étape n :

$$P_n = \begin{pmatrix} p_n^{(1)} & p_n^{(2)} & \dots & p_n^{(k)} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^{k} p_n^{(i)} = 1$$

📐 Théorème — Formule de récurrence matricielle

D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathbf{P_{n+1}} = \mathbf{P_n} \times \mathbf{T}$$

Par récurrence immédiate, pour tout entier naturel n :

$$\mathbf{P_n} = \mathbf{P_0} \times \mathbf{T^n}$$



Fig. 125. – Graphe probabiliste à 2 états et matrice de transition

Pour ce graphe, la matrice de transition est :

$$T = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$$

(Vérification des lignes : $0,8 + 0,2 = 1$ *et* $0,4 + 0,6 = 1$*).*

5.3 L'État Stable (Distribution Stationnaire)

Que devient P_n lorsque le nombre d'étapes n devient très grand ?

Définition Fondamentale

📐 **Définition & Théorème — État stable** Un vecteur ligne de probabilité $P = (x \;\; y)$ (ou $(x \;\; y \;\; z)$) est appelé un **état stable** (ou distribution stationnaire) de la chaîne de Markov s'il vérifie :

$$\mathbf{P} = \mathbf{P} \times \mathbf{T} \quad \text{avec} \quad \sum x_i = 1 \quad \text{et} \quad x_i \geq 0$$

Si tous les coefficients de la matrice de transition T (ou d'une de ses puissances) sont strictement positifs (graphe connexe et apériodique), alors : Quel que soit l'état initial P_0, la suite des distributions (P_n) converge vers cet unique état stable :

$$\lim_{\mathbf{n} \to +\infty} \mathbf{P_n} = \mathbf{P}$$

Méthode de calcul pour 2 états : Posons $P = (x \;\; y)$ avec $x + y = 1 \Longrightarrow y = 1 - x$. L'équation $P = PT$ donne :

$$(x \;\; y) \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} = (x \;\; y)$$

Ce qui équivaut au système :

$$\{0,8x + 0,4y = x$$

$$0,2x + 0,6y = y \Leftrightarrow -0,2x + 0,4y = 0 \Leftrightarrow 0,4y = 0,2x \Leftrightarrow x = 2y$$

Comme $x + y = 1$:

$$2y + y = 1 \Leftrightarrow 3y = 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x = \frac{2}{3}$$

L'état stable est donc $P = (\frac{2}{3} \ \frac{1}{3})$. À long terme, il fera beau deux tiers du temps ($\approx 66,7\,\%$) et il pleuvra un tiers du temps ($\approx 33,3\,\%$), quelle que soit la météo initiale !

---

6. Le PageRank de Google : Un réseau géant de matrices

En 1998, deux doctorants de Stanford, **Larry Page et Sergey Brin**, fondent le moteur de recherche **Google**. Leur coup de génie s'appelle le **PageRank**. Internet est modélisé comme un graphe géant orienté où chaque page web est un sommet et chaque lien hypertexte est un arc. Un internaute virtuel navigue au hasard :

- Depuis une page ayant k liens sortants, il choisit l'un d'eux avec probabilité $\frac{1}{k}$.
- Avec une petite probabilité $\alpha \approx 0,15$, il s'ennuie et saute vers une page quelconque du Web au hasard.

Cette promenade aléatoire est une chaîne de Markov sur une matrice de taille plusieurs milliards par plusieurs milliards ! L'état stable de cette matrice attribue à chaque page web une probabilité d'occupation : **les pages les plus importantes sont celles dont la composante dans l'état stable est la plus élevée**. C'est une simple équation $P = PT$ qui a fondé l'empire technologique le plus puissant du XXIe siècle !

---

7. Exemples résolus pas à pas

Exemple 1 : Calcul de produit matriciel et non-commutativité

Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$. 1. Calculer $A \times B$. 2. Calculer $B \times A$. 3. Que constate-t-on ?

Solution détaillée : 1. Calcul de $A \times B$:

- Ligne 1, Col 1 : $1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 - 2 = 0$
- Ligne 1, Col 2 : $1 \times 0 + 2 \times 4 = 8$
- Ligne 2, Col 1 : $3 \times 2 + (-1) \times (-1) = 6 + 1 = 7$
- Ligne 2, Col 2 : $3 \times 0 + (-1) \times 4 = -4$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}$$

2. Calcul de $B \times A$:
   - Ligne 1, Col 1 : $2 \times 1 + 0 \times 3 = 2$
   - Ligne 1, Col 2 : $2 \times 2 + 0 \times (-1) = 4$
   - Ligne 2, Col 1 : $(-1) \times 1 + 4 \times 3 = -1 + 12 = 11$
   - Ligne 2, Col 2 : $(-1) \times 2 + 4 \times (-1) = -2 - 4 = -6$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 11 & -6 \end{pmatrix}$$

3. On constate que $AB \neq BA$. La multiplication matricielle n'est pas commutative.

Exemple 2 : Inversion et résolution de système

On considère le système :

$$\begin{cases} 3x + 5y = 11 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

1. Écrire le système sous forme matricielle $AX = B$. 2. Calculer $\det(A)$ et en déduire A^{-1}. 3. Résoudre le système par le calcul $X = A^{-1}B$.

Solution détaillée : 1. Forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$. 2. Calcul du déterminant :

$$\det(A) = 3 \times 4 - 5 \times 2 = 12 - 10 = 2 \neq 0$$

Comme $\det(A) \neq 0$, A est inversible. D'après la formule de l'inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2,5 \\ -1 & 1,5 \end{pmatrix}$$

3. Résolution :

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \times 11 + (-5) \times 8 \\ (-2) \times 11 + 3 \times 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 44 - 40 \\ -22 + 24 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La solution unique est donc $\boldsymbol{x = 2}$ **et** $\boldsymbol{y = 1}$. *(Vérification :* $3(2) + 5(1) = 6 + 5 = 11$ *et* $2(2) + 4(1) = 4 + 4 = 8$*).*

Exemple 3 : Dénombrement de chemins sur un graphe

Soit un graphe à 3 sommets S_1, S_2, S_3 dont la matrice d'adjacence est :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(C'est le triangle complet K_3 où chaque sommet est relié aux deux autres). 1. Calculer M^2. 2. En déduire le nombre de chemins de longueur 2 reliant S_1 à lui-même, et reliant S_1 à S_2. 3. Calculer M^3 et déterminer le nombre de chemins de longueur 3 reliant S_1 à S_2.

Solution détaillée : 1. Calcul de M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1+1 & 0+0+1 & 0+1+0 \\ 0+0+1 & 1+0+1 & 1+0+0 \\ 0+1+0 & 1+0+0 & 1+1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. - Le coefficient $(1,1)$ de M^2 vaut 2 : il y a **2 chemins de longueur 2** reliant S_1 à S_1 (ce sont les allers-retours $S_1 \to S_2 \to S_1$ et $S_1 \to S_3 \to S_1$).

• Le coefficient $(1,2)$ de M^2 vaut 1 : il y a **1 seul chemin de longueur 2** reliant S_1 à S_2 (c'est $S_1 \to S_3 \to S_2$).

3. Calcul de $M^3 = M^2 \times M$:

$$M^3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1+1 & 2+0+1 & 2+1+0 \\ 0+2+1 & 1+0+1 & 1+2+0 \\ 0+1+2 & 1+0+2 & 1+1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Le coefficient $(1,2)$ de M^3 est égal à **3** : il existe exactement 3 chemins de longueur 3 reliant S_1 à S_2 ($S_1 \to S_2 \to S_1 \to S_2$, $S_1 \to S_2 \to S_3 \to S_2$, et $S_1 \to S_3 \to S_1 \to S_2$).

Exemple 4 : Chaîne de Markov à 3 états (Abonnements téléphoniques)

Trois opérateurs téléphoniques A, B et C se partagent un marché. Chaque année :

• L'opérateur A conserve 70 % de ses clients, en perd 20 % vers B et 10 % vers C.
• L'opérateur B conserve 60 % de ses clients, en perd 20 % vers A et 20 % vers C.
• L'opérateur C conserve 80 % de ses clients, en perd 10 % vers A et 10 % vers B.

1. Écrire la matrice de transition T.
2. Si les parts de marché initiales sont $P_0 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}3 & 0{,}2 \end{pmatrix}$, calculer les parts au bout d'un an P_1.
3. Déterminer l'état stable $P = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}$ du marché.

Solution détaillée : 1. Matrice de transition :

$$T = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}$$

(Chaque ligne somme bien à 1). 2. Parts au bout d'un an :

$$P_1 = P_0 \times T = (0,5 \;\; 0,3 \;\; 0,2)\begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,8 \end{pmatrix}$$

- Pour A : $0,5 \times 0,7 + 0,3 \times 0,2 + 0,2 \times 0,1 = 0,35 + 0,06 + 0,02 = 0,43$ (43 %)
- Pour B : $0,5 \times 0,2 + 0,3 \times 0,6 + 0,2 \times 0,1 = 0,10 + 0,18 + 0,02 = 0,30$ (30 %)
- Pour C : $0,5 \times 0,1 + 0,3 \times 0,2 + 0,2 \times 0,8 = 0,05 + 0,06 + 0,16 = 0,27$ (27 %)

$$P_1 = (0,43 \;\; 0,30 \;\; 0,27)$$

3. L'état stable vérifie $P = PT$ et $x + y + z = 1$:

$$\{0,7x + 0,2y + 0,1z = x \Leftrightarrow -0,3x + 0,2y + 0,1z = 0 \quad (L_1)$$
$$0,2x + 0,6y + 0,1z = y \Leftrightarrow 0,2x - 0,4y + 0,1z = 0 \quad (L_2)$$
$$x + y + z = 1 \quad (L_3)$$

Soustrayons (L_2) de (L_1) :

$$(-0,3x - 0,2x) + (0,2y - (-0,4y)) + (0,1z - 0,1z) = 0 \Leftrightarrow -0,5x + 0,6y = 0 \Leftrightarrow x = \frac{6}{5}y = 1,2y$$

Remplaçons x dans (L_1) pour trouver z :

$$-0,3(1,2y) + 0,2y + 0,1z = 0 \Leftrightarrow -0,36y + 0,2y + 0,1z = 0 \Leftrightarrow 0,1z = 0,16y \Leftrightarrow z = 1,6y$$

Utilisons la condition $x + y + z = 1$:

$$1,2y + y + 1,6y = 1 \Leftrightarrow 3,8y = 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{3,8} = \frac{10}{38} = \frac{5}{19} \approx 0,2632$$

Puis :

- $x = 1,2 \times \frac{5}{19} = \frac{6}{19} \approx 0,3158$
- $z = 1,6 \times \frac{5}{19} = \frac{8}{19} \approx 0,4211$ L'état stable est :

$$P = \left(\tfrac{6}{19} \;\; \tfrac{5}{19} \;\; \tfrac{8}{19}\right) \approx (31,6\,\% \;\; 26,3\,\% \;\; 42,1\,\%)$$

À long terme, l'opérateur C dominera le marché avec plus de 42 % des parts.

Exemple 5 : Puissance n-ième par diagonalisation (Cas simple)

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On donne $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et son inverse $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. 1. Calculer la matrice $D = P^{-1}AP$ et vérifier qu'elle est diagonale. 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer D^n. 3. En déduire l'expression explicite de A^n en fonction de n.

Solution détaillée : 1. Calculons d'abord AP :

$$AP = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8-2 & 4-2 \\ 2+1 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons $D = P^{-1}(AP)$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-3 & 2-2 \\ -6+6 & -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

D est bien une matrice diagonale. 2. Pour une matrice diagonale, les puissances s'appliquent directement sur les termes diagonaux :

$$D^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

3. Puisque $D = P^{-1}AP$, en multipliant par P à gauche et P^{-1} à droite, on a $A = PDP^{-1}$. Par télescopage : $A^n = (PDP^{-1})(PDP^{-1})...(PDP^{-1}) = PD^nP^{-1}$. Calculons le produit :

$$PD^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 3^n & 2^n \\ 3^n & 2^n \end{pmatrix}$$

Puis $(PD^n)P^{-1}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2\cdot 3^n & 2^n \\ 3^n & 2^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 3^n - 2^n & -2\cdot 3^n + 2\cdot 2^n \\ 3^n - 2^n & -3^n + 2\cdot 2^n \end{pmatrix}$$

(Vérification pour $n = 1$: $A^1 = \begin{pmatrix} 6-2 & -6+4 \\ 3-2 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A$). Formule exacte pour tout n !

Exemple 6 : La marche aléatoire sur un triangle

Une puce saute aléatoirement entre les sommets d'un triangle A, B, C. À chaque saut, elle quitte son sommet actuel et choisit l'un des deux autres sommets avec équiprobabilité ($p = 0,5$). Si la puce part du sommet A au temps $n = 0$, quelle est la probabilité qu'elle se trouve à nouveau en A après n sauts ?

Solution détaillée : La matrice de transition est :

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$$

Soit a_n la probabilité d'être en A à l'étape n. Par symétrie évidente entre B et C, la probabilité d'être en B est égale à celle d'être en C, soit $b_n = c_n$. Comme $a_n + b_n + c_n = 1$, on a $a_n + 2b_n = 1 \Longrightarrow b_n = \frac{1-a_n}{2}$. D'après la première colonne de la matrice de transition :

$$a_{n+1} = 0 \cdot a_n + 0,5 b_n + 0,5 c_n = 0,5(b_n + c_n) = 0,5(2b_n) = b_n = \frac{1 - a_n}{2} = -\frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2}$$

Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique ! Recherche du point fixe : $\ell = -\frac{1}{2}\ell + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{3}{2}\ell = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \ell = \frac{1}{3}$. Posons $u_n = a_n - \frac{1}{3}$. Alors $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n$. La suite (u_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = a_0 - \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ (puisque la puce part de A, $a_0 = 1$). Donc :

$$u_n = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n \Longrightarrow a_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

- Pour $n = 0$: $a_0 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.
- Pour $n = 1$: $a_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ (elle a sauté en B ou C).
- Pour $n = 2$: $a_2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
- Quand $n \to +\infty$: $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \to 0$, donc $a_n \to \frac{1}{3}$. La puce passe un tiers de son temps sur chaque sommet.

Ce qu'il faut retenir

1. **Calcul matriciel :**
   - Produit $A \times B$: dimension $(n \times k) \times (k \times p) \to (n \times p)$. Ligne par colonne.
   - Non commutatif en général : $AB \neq BA$.
   - Diviseurs de zéro : $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.
2. **Inversion et systèmes :**
   - Matrice 2×2 : $\det(A) = ad - bc \neq 0 \Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
   - Résolution de système : $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$.
3. **Graphes et matrice d'adjacence :**
   - Matrice d'adjacence M : $m_{i,j}$ = nombre d'arêtes reliant i à j.
   - **Théorème des chemins :** Le terme (i, j) de M^k est le nombre exact de chemins de longueur k allant de i à j.
4. **Chaînes de Markov :**
   - Matrice de transition T : somme de chaque ligne égale à 1.
   - Évolution : $P_{n+1} = P_n \times T$ et $P_n = P_0 \times T^n$.
   - État stable : unique vecteur vérifiant $P = P \times T$ avec $\sum p_i = 1$.

Exercices

Niveau (Applications directes)

Exercice 57.1 Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer $2A - 3B$, $A \times B$, et $B \times A$.

Exercice 57.2 Calculer le déterminant et l'inverse (si elle existe) des matrices suivantes : $M_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Exercice 57.3 Résoudre sous forme matricielle le système :

$$\begin{cases} 4x + 3y = 25 \\ 2x + 5y = 23 \end{cases}$$

Exercice 57.4 On considère un graphe non orienté à 4 sommets $\{A, B, C, D\}$ dont les arêtes sont $[A,B], [A,C], [B,C], [C,D]$. 1. Dessiner le graphe. 2. Écrire sa matrice d'adjacence M. 3. Quel est le degré du sommet C ?

Exercice 57.5 Une matrice de transition est donnée par $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix}$. Si $P_0 = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}$, calculer P_1 et P_2.

Exercice 57.6 Déterminer l'état stable $P = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$ associé à la matrice de transition $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix}$ de l'exercice 5.

Exercice 57.7 Calculer A^2 et A^3 pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Conjecturer A^n.

Niveau (Réflexion et graphes probabilistes)

Exercice 57.8 Puissances d'une matrice nilpotente. Soit la matrice $N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 1. Calculer N^2 et N^3. 2. En déduire N^k pour tout $k \geq 3$. 3. Soit $A = I_3 + N$. En utilisant la formule du binôme de Newton (justifier son emploi), calculer A^n pour tout entier $n \geq 2$.

Exercice 57.9 Graphe et connexité. Soit un graphe d'ordre 4 de matrice d'adjacence M. On calcule $S = M + M^2 + M^3$. Démontrer que le graphe est connexe si et seulement si tous les coefficients non diagonaux de la matrice S sont strictement positifs.

Exercice 57.10 Le modèle proie-prédateur matriciel (Modèle de Leslie). Une population d'oiseaux est divisée en deux classes d'âge : les juvéniles J_n et les adultes A_n. Chaque année :

- Les adultes donnent naissance en moyenne à 2 juvéniles.
- 30 % des juvéniles survivent et deviennent adultes l'année suivante.
- 50 % des adultes survivent.

1. Écrire le système d'évolution sous forme matricielle $\begin{pmatrix} J_{n+1} \\ A_{n+1} \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} J_n \\ A_n \end{pmatrix}$.
2. Si la population initiale est de 100 juvéniles et 50 adultes, calculer la population à $n = 1$ et $n = 2$.

Exercice 57.11 Équation matricielle $A^2 - 4A + 3I = 0$. Soit une matrice carrée A vérifiant la relation $A^2 - 4A + 3I = 0$. 1. Démontrer que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et de I. 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux réels a_n et b_n tels que $A^n = a_n A + b_n I$.

Exercice 57.12 Chaîne de Markov à 3 états : la propagation d'une rumeur. Dans un village, un individu apprend une information. À chaque étape, il peut la transmettre à son voisin. Les états sont : E_1 (Ignorant), E_2 (Croyant), E_3 (Sceptique/Immunisé). Matrice de transition :

$$T = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,4 & 0,1 \\ 0 & 0,6 & 0,4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Quel est le statut de l'état E_3 (état absorbant) ? 2. Calculer T^2 et T^3. 3. Que devient la population à long terme ?

Exercice 57.13 Matrice stochastique et valeur propre 1. Soit T une matrice stochastique carrée d'ordre n (somme des coefficients de chaque ligne égale à 1). Soit U le vecteur colonne dont toutes les coordonnées valent 1. 1. Calculer le produit matriciel $T \times U$. 2. Que peut-on en déduire sur le système $(T - I_n)X = 0$? 3. Pourquoi cela prouve-t-il qu'il existe toujours au moins un état stable non nul ?

Exercice 57.14 Inverse d'une matrice 3×3 par la méthode de Gauss-Jordan. Inverser la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ en résolvant le système $AX = Y$.

Exercice 57.15 Nombre d'arbres couvrants (Théorème de Kirchhoff, aperçu). Pour un graphe simple, on définit la matrice Laplacienne $L = D - M$, où D est la matrice diagonale des degrés et M la matrice d'adjacence. Calculer L pour un triangle K_3 et calculer l'un de ses cofacteurs. Comparer avec le nombre d'arbres couvrants possibles.

Niveau (Approfondissements et concours)

Exercice 57.16 Théorème de Cayley-Hamilton en dimension 2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On pose sa trace $\mathrm{Tr}(A) = a + d$ et son déterminant $\det(A) = ad - bc$. Démontrer par le calcul direct l'identité fondamentale de Cayley-Hamilton :

$$A^2 - \mathrm{Tr}(A) \cdot A + \det(A) \cdot I_2 = 0_2$$

Exercice 57.17 Suites récurrentes d'ordre 2 et puissances de matrices (Fibonacci). Soit la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. 1. Déterminer une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$. 2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$:

$$A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$$

3. En calculant $\det(A^n)$ de deux manières différentes, démontrer la célèbre **identité de Cassini** :

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$$

Exercice 57.18 Convergence de la matrice de transition et projecteur spectral. Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $a, b \in]0, 1[$. 1. Montrer que T admet pour valeurs propres $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 1 - a - b$. 2. Démontrer que $T^n = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$. 3. En déduire la limite $\lim_{n \to +\infty} T^n$ et retrouver l'état stable quelle que soit la distribution initiale.

Exercice 57.19 Théorème de Perron-Frobenius (Énoncé et sens géométrique). Pour une matrice à coefficients strictement positifs, expliquer la signification du théorème de Perron-Frobenius : existence d'une plus grande valeur propre réelle positive dominante et unicité du vecteur propre associé positif (l'état stable).

Exercice 57.20 L'algorithme PageRank avec facteur d'amortissement (Damping Factor). Écrire la matrice Google d'un mini-web à 3 pages où la page 1 pointe vers 2 et 3, la page 2 pointe vers 3, et la page 3 pointe vers 1. Intégrer le facteur de téléportation $\alpha = 0,85$ et calculer le classement PageRank des 3 pages.

Exercice 57.21 Matrices de Hadamard et codes correcteurs d'erreurs. Une matrice de Hadamard H_n est une matrice carrée de taille n dont les coefficients sont dans $\{-1, +1\}$ et telle que $H_n H_n^T = nI_n$. Construire H_2 et H_4 par le produit de Kronecker et expliquer leur rôle dans la transmission des signaux des sondes spatiales Mariner et Voyager.

Exercice 57.22 Graphes eulériens et hamiltoniens. Démontrer le théorème d'Euler : un graphe connexe admet un cycle eulérien (un parcours fermé passant par chaque arête une fois et une seule) si et seulement si tous ses sommets sont de degré pair.

Solutions

Solution 57.1 $2A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 15 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -17 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}$. $A \times B = \begin{pmatrix} 2(0)-1(1) & 2(5)-1(-2) \\ 3(0)+4(1) & 3(5)+4(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$. $B \times A = \begin{pmatrix} 0(2)+5(3) & 0(-1)+5(4) \\ 1(2)-2(3) & 1(-1)-2(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ -4 & -9 \end{pmatrix}$.

Solution 57.2 - $\det(M_1) = 5(1) - 2(2) = 1 \neq 0 \Longrightarrow M_1^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$. - $\det(M_2) = 3(4) - (-6)(-2) = 12 - 12 = 0$. M_2 n'est pas inversible. - $\det(M_3) = \cos^2\theta - (-\sin^2\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \neq 0$. $M_3^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = M_3(-\theta)$ (la rotation inverse !).

Solution 57.3 $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 20 - 6 = 14 \neq 0$. $A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. $X = A^{-1}B = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 125-69 \\ -50+92 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 56 \\ 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Solution : $x = 4$ et $y = 3$.

Solution 57.4 1. Graphe en diamant avec une arête pendant vers D. 2. Ordre des sommets A, B, C, D :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Le degré de C est la somme de la ligne 3 : $1 + 1 + 0 + 1 = 3$.

Solution 57.5 $P_1 = P_0 T = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}54+0{,}12 & 0{,}06+0{,}28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}66 & 0{,}34 \end{pmatrix}$. $P_2 = P_1 T = \begin{pmatrix} 0{,}66 & 0{,}34 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}594+0{,}102 & 0{,}066+0{,}238 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}696 & 0{,}304 \end{pmatrix}$.

Solution 57.6 $P = PT \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$ avec $x + y = 1$. $0{,}9x + 0{,}3y = x \Leftrightarrow 0{,}3y = 0{,}1x \Leftrightarrow x = 3y$. $3y + y = 1 \Leftrightarrow 4y = 1 \Leftrightarrow y = 0{,}25$ et $x = 0{,}75$. État stable : $P = \begin{pmatrix} 0{,}75 & 0{,}25 \end{pmatrix}$.

Solution 57.7 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Par récurrence immédiate : $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution 57.8 1. $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = 0_3$. 2. Pour $k \geq 3$, $N^k = 0_3$. 3. Comme I_3 et N commutent ($I_3N = NI_3 = N$), la formule du binôme s'applique : $A^n = (I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} I_3^{n-k} N^k = \binom{n}{0} I_3 + \binom{n}{1} N + \binom{n}{2} N^2 + 0 = I_3 + nN + \frac{n(n-1)}{2} N^2$. $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n & n+3n(n-1) \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n & 3n^2 - 2n \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution 57.9 Dans un graphe à 4 sommets, si deux sommets distincts i et j sont connectés, ils peuvent l'être par un chemin de longueur 1, 2 ou au maximum 3 (sans boucle). Le coefficient (i, j) de $S = M + M^2 + M^3$ est la somme des chemins de longueur 1, 2 et 3 reliant i à j. Il est strictement positif pour tout couple (i, j) avec $i \neq j$ si et seulement si tout sommet peut rejoindre n'importe quel autre, ce qui est la définition même de la connexité.

Solution 57.10 1. $\begin{cases} J_{n+1} = 2A_n \\ A_{n+1} = 0{,}3J_n + 0{,}5A_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} J_{n+1} \\ A_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} J_n \\ A_n \end{pmatrix}$. 2. Pour $n = 0$, $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$. $X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 55 \end{pmatrix}$. $X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 100 \\ 55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 \\ 57{,}5 \end{pmatrix}$.

Solution 57.11 1. $A^2 - 4A = -3I \Leftrightarrow A(A - 4I) = -3I \Leftrightarrow A \times \left[-\frac{1}{3}(A - 4I)\right] = I$. Donc A est inversible et $A^{-1} = -\frac{1}{3}A + \frac{4}{3}I$. 2. Par division euclidienne du polynôme X^n par $X^2 - 4X + 3 = (X - 1)(X - 3)$: $X^n = (X^2 - 4X + 3)Q(X) + a_nX + b_n$. En évaluant en A, $A^n = a_nA + b_nI$.

Solution 57.12 1. La ligne 3 est $(0\ 0\ 1)$: une fois dans l'état E_3 (sceptique), la probabilité d'y rester est 1. C'est un état absorbant définitif. 2. Par calcul de puissances, les deux premières lignes ont des termes vers E_3 qui croissent à chaque étape. 3. À long terme, $\lim_{n \to +\infty} T^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Toute la population finit inexorablement dans l'état sceptique/immunisé E_3.

Solution 57.13 1. Le coefficient i de $T \times U$ est la somme des termes de la ligne i de T, qui vaut 1 par définition d'une matrice stochastique. Donc $T \times U = U = 1 \cdot U$. 2. Cela signifie $(T - I_n)U = 0$. Le système admet une solution non nulle ($U \neq 0$), donc $\det(T - I_n) = 0$. 3. Comme $\det(T^T - I_n) = \det(T - I_n) = 0$, il existe aussi un vecteur ligne non nul P tel que $P(T - I_n) = 0 \Leftrightarrow PT = P$. En normalisant pour que $\sum p_i = 1$, on obtient un état stable.

Solution 57.14 Résolution de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Par élimination : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1$, on trouve $z = a + b - \frac{1}{2}(c - 4a - ...)$. On obtient $A^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Solution 57.15 Pour le triangle K_3, chaque sommet est de degré 2 : $D = 2I_3$. $L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Le cofacteur obtenu en rayant la 1re ligne et la 1re colonne est $\det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3$. D'après le théorème de Kirchhoff, il y a exactement 3 arbres couvrants (les 3 façons de retirer une arête pour obtenir un arbre), ce qui concorde parfaitement.

Solution 57.16 $\mathrm{Tr}(A) = a + d$ et $\det(A) = ad - bc$. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ca+dc & cb+d^2 \end{pmatrix}$. $(a + d)A = \begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ca+cd & ad+d^2 \end{pmatrix}$. $A^2 - (a + d)A = \begin{pmatrix} bc-ad & 0 \\ 0 & bc-ad \end{pmatrix} = -(ad - bc)I_2 = -\det(A)I_2$. D'où $A^2 - \mathrm{Tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0_2$.

Solution 57.17 1. Comme $F_{n+1} = 1 \cdot F_n + 1 \cdot F_{n-1}$ et $F_n = 1 \cdot F_n + 0 \cdot F_{n-1}$, la matrice est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 2. Pour $n = 1$: $A^1 = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Hérédité immédiate en multipliant par A et en utilisant la relation de récurrence de Fibonacci. 3. $\det(A) = 1(0) - 1(1) = -1$. Donc $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. D'autre part, $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$. L'égalité donne l'identité de Cassini.

Solution 57.18 1. Polynôme caractéristique $\det(T - \lambda I) = (\lambda - 1)(\lambda - (1 - a - b))$. Les racines sont 1 et $1 - a - b$. 2. En diagonalisant $T = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-a-b \end{pmatrix}$, le calcul de PD^nP^{-1} donne exactement la décomposition demandée. 3. Comme $|1 - a - b| < 1$, $(1 - a - b)^n \to 0$. La limite vaut $\frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$. Pour tout $P_0 = (x\ 1 - x)$, $P_0 \lim T^n = \left(\frac{b}{a+b} \quad \frac{a}{a+b}\right)$, qui est l'état stable universel.

Solution 57.19 Le théorème garantit que pour toute matrice à coefficients strictement positifs, la valeur propre de plus grand module est réelle, strictement positive, simple, et son vecteur propre peut être choisi à coordonnées strictement

positives. Cela signifie qu'aucun phénomène chaotique oscillant ne peut empêcher la convergence : le système atteint toujours un équilibre global stable et prévisible.

Solution 57.20 Matrice brute de liens : $H = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Matrice de Google : $G = 0,85H + 0,15 \times \frac{1}{3}J$, où J est la matrice remplie de 1. La résolution de $P = PG$ donne l'importance relative de chaque page, la page 3 étant la plus citée et obtenant le rang le plus élevé.

Solution 57.21 $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. $H_4 = \begin{pmatrix} H_2 & H_2 \\ H_2 & -H_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Ces matrices orthogonales permettent d'émettre des codes à distance maximale : même si le signal spatial subit de fortes interférences, le récepteur terrestre retrouve le message par simple corrélation matricielle.

Solution 57.22 À chaque passage dans un sommet, un cycle emprunte une arête entrante et une arête sortante, consommant 2 arêtes incidentes. Chaque sommet doit donc comporter un nombre pair d'arêtes. La réciproque s'obtient par l'algorithme de Fleury ou la décomposition en cycles disjoints.

La question qui ouvre la suite

Nous voici parvenus au terme des structures de notre parcours. Depuis le tout premier caillou que tu as ramassé sur le sol à six ans pour apprendre à compter, jusqu'aux matrices de transition qui ordonnent les milliards de pages du cyberespace mondial, quel chemin extraordinaire as-tu parcouru ! Pourquoi ces symboles inventés par l'esprit humain s'ajustent-ils avec une telle perfection au tissu de la réalité physique ? Comment toutes les branches des mathématiques — arithmétique, géométrie, analyse, probabilités — se rejoignent-elles en un seul et même fleuve ? Il est temps de contempler le panorama dans toute sa splendeur : tourne l'ultime page et entre dans **le Chapitre 58 et la Fin du Voyage**.

CHAPITRE 58 : La Fin du Voyage

> « Le livre de la nature est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. » — *Galilée,* L'Essayeur *(1623)*
>
> « Le miracle de l'adéquation du langage des mathématiques à la formulation des lois de la physique est un cadeau merveilleux que nous ne comprenons ni ne méritons. » — *Eugène Wigner,* La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles *(1960)*

Ce que tu vas découvrir

- La **grande rétrospective des 57 étapes** : comment une ligne continue et ininterrompue relie le premier caillou de la préhistoire aux structures algébriques les plus vertigineuses.
- Le secret de l'**incarnation et de la survie** : pourquoi aucune formule n'est tombée du ciel, mais provient d'un geste musculaire du corps face à une crise du monde réel.
- Les **trois grands ponts unificateurs** qui soudent les mathématiques en un seul édifice : Algèbre & Géométrie, Discret & Continu, Local & Global.
- L'énigme philosophique d'Eugène Wigner : pourquoi les abstractions nées dans l'esprit humain décrivent-elles l'Univers avec une telle perfection prédictive ?
- L'horizon du supérieur : les portes ouvertes vers les **espaces vectoriels abstraits**, la **topologie**, l'**analyse complexe**, la **théorie de la mesure** et les **variétés différentielles**.
- 22 exercices de haute synthèse et de défi pour couronner ton parcours et franchir le seuil de l'Université et des Classes Préparatoires.

---

1. La Grande Rétrospective : De six à dix-huit ans

Arrête-toi un instant. Pose tes stylos, recule ta chaise, et contemple le paysage. Il y a douze ans, tu entrais dans ce livre. Tu avais six ans. Tu regardais tes dix doigts et tu ramassais des cailloux sur le chemin. Aujourd'hui, tu manipules des matrices de transition, tu intègres des équations différentielles, tu navigues dans le plan complexe avec $e^{i\pi} + 1 = 0$, et tu démontres la convergence de variables aléatoires par Bienaymé-Tchebychev.

Regarde la pyramide que ton esprit a gravie marche après marche :

📐 Règle Fondamentale — Synthèse de l'Édifice Mathématique et Cap sur le Supérieur

- VOLUME VI : L'ÂGE DU FLUX ET DE LA VITESSE (17-18 ans / Terminale & Spécialité)
- Récurrence, Limites de suites & fonctions, Continuité & TVI, Convexité,
- Logarithme & Exponentielle, Trigonométrie, Intégration & Primitives,
- Équations différentielles, Géométrie vectorielle 3D, Dénombrement,
- Loi binomiale & Grands Nombres, Nombres Complexes, Arithmétique modulaire & RSA,
- Matrices & Graphes de Markov.
- VOLUME V : L'ÂGE DE LA FLÈCHE ET DE LA BOUSSOLE (15-16 ans / Seconde & Première)
- Vecteurs du plan, Droites cartésiennes, Fonctions de référence & Variations,
- Trinôme du second degré & Paraboles, Suites arithmétiques & géométriques,
- Cercle trigonométrique & Radians, Produit scalaire, Taux de variation & Dérivées,
- Statistiques descriptives & Probabilités conditionnelles.
- VOLUME IV : L'ÂGE DE LA RIGUEUR ET DU MODÈLE (13-14 ans / Quatrième & Troisième)
- Théorème de Thalès & Homothéties, Théorème de Pythagore & Racines carrées,
- Calcul littéral & Identités remarquables, Équations & Inéquations,
- Fonctions affines & linéaires, Notion de Probabilité & Fréquence.
- VOLUME III : L'ÂGE DES FORMES ET DE LA MESURE (11-12 ans / Sixième & Cinquième)
- Angles & Triangles, Symétries axiale & centrale, Périmètres & Aires,
- Fractions opératoires, Nombres relatifs & Règle des signes, Proportionnalité.
- VOLUME II : L'ÂGE DU PARTAGE ET DE LA BALANCE (8-10 ans / CE2 - CM2)
- Les quatre opérations posées, La division euclidienne et les restes,
- Le partage des tartes et l'invention des fractions, Le compas et la règle.
- VOLUME I : L'ÂGE DU GESTE ET DU COMPTAGE (6-7 ans / CP - CE1)
- Les dix doigts, Le caillou dans la poche du berger (calculus), Le groupement par dix,
- La droite graduée des pas en avant et des pas en arrière.

Pas un seul saut arbitraire. Pas un seul dogme d'autorité. Jamais personne ne t'a dit : *« Apprends cette formule par cœur parce que c'est au programme »*. Chaque symbole est né d'un problème que les outils précédents ne savaient pas résoudre.

---

2. Le Fil Rouge : L'Incarnation et la Survie

Pourquoi l'humanité a-t-elle inventé les mathématiques ? Non point pour tourmenter les écoliers, mais pour **survivre**.

1. **Le Caillou (*Calculus*) et le Troupeau (Vol. I) :** Le berger néolithique n'a pas besoin de savoir nommer les nombres jusqu'à 300. Il lui suffit de mettre un caillou dans sa bourse en cuir chaque fois qu'une brebis sort de l'enclos le matin, et d'en retirer un chaque fois qu'une brebis rentre le soir. S'il reste des cailloux dans la bourse au crépuscule, les loups rôdent. Le calcul est né d'une bijection corporelle entre des pierres et des animaux.
2. **La Corde à Nœuds des Arpenteurs du Nil (Vol. III) :** Chaque été, la crue du Nil efface les bornes des champs en Égypte. Pour lever l'impôt et nourrir les villes, les arpenteurs doivent redessiner des rectangles parfaits sur la boue séchée. Ils nouent une corde à 13 nœuds équidistants ($3 + 4 + 5 = 12$ intervalles) et forment un triangle rectangle : Pythagore n'était pas un théorème de tableau noir, c'était le garant de la paix fiscale et de la survie agricole.
3. **La Caravelle et le Logarithme (Vol. VI, Chap. 48) :** En pleine mer, le navigateur qui calcule sa position aux étoiles doit multiplier des nombres à 8 chiffres pour corriger sa dérive. Une seule erreur de retenue jette le navire contre les récifs. En inventant le logarithme qui transforme les multiplications en additions ($\ln(ab) = \ln a + \ln b$), John Napier n'a pas seulement inventé une fonction : il a sauvé la vie de milliers d'équipages et doublé l'espérance de vie des astronomes.
4. **Le Canon de Galilée et la Dérivée de Leibniz (Vol. V & VI) :** Comment viser une cible mouvante ? La vitesse d'un boulet n'est pas constante : la gravité le tire vers le bas, l'air le freine. Pour calculer ce qui change à chaque

milliseconde, il a fallu inventer le taux d'accroissement infinitésimal $\frac{dy}{dx}$: le calcul différentiel est né de la physique du mouvement.

5. **Le Secret des Réseaux et le Cadenas RSA (Vol. VI, Chap. 56) :** Dans un monde où chaque transaction bancaire, chaque dossier médical et chaque vote circule sous forme d'ondes électromagnétiques invisibles dans l'air, comment empêcher le vol et le chaos ? En enfermant les données derrière le produit de deux nombres premiers géants que seul le propriétaire peut factoriser.

Chaque équation que tu as apprise porte la sueur, l'ingéniosité et l'urgence de générations d'êtres humains qui ont refusé de subir le monde et ont choisi de le comprendre.

---

3. Les Trois Grands Ponts Unificateurs

Au début, les mathématiques semblent découpées en tiroirs étanches : d'un côté la géométrie avec ses règles et ses compas ; de l'autre l'algèbre avec ses lettres x et y ; ailleurs l'analyse avec ses limites et ses intégrales ; et enfin les probabilités avec leurs dés et leurs cartes. Mais au fur et à mesure que l'esprit mûrit, les cloisons s'effondrent. Les mathématiques ne sont pas un archipel d'îles isolées : elles sont un **continent unique traversé par de gigantesques ponts**.

> **Règle Fondamentale — Synthèse de l'Édifice Mathématique et Cap sur le Supérieur**
>
> • LES MATHÉMATIQUES
> • PONT 1 : ALGÈBRE] [PONT 2 : DISCRET] [PONT 3 : LOCAL]
> • ET ET ET
> • GÉOMÉTRIE] [CONTINU] [GLOBAL]
> • Descartes : Repère (x,y) Suites (u_n) f(x) Dérivée f'(x) : la pente
> • Gauss/Argand : i = 90° Dénombrement Intégrale en un point infiniment précis.
> • Produit scalaire u·v Marche aléatoire Gauss Intégrale ∫ f(x)dx : la somme
> • Matrices = Transformations Bernoulli Loi Normale globale de tout le paysage.
> • Théorème Fondamental :
> • F(b) - F(a) = ∫ f(t)dt !

Pont 1 : Algèbre et Géométrie

- En 1637, **René Descartes** associe à chaque point de l'espace un couple de coordonnées (x, y). Soudain, une droite devient une équation $ax + by + c = 0$, et un cercle devient $x^2 + y^2 = R^2$. Résoudre un problème géométrique se ramène à résoudre un système algébrique !
- En 1806, **Argand** démontre que le nombre imaginaire i est une rotation d'un quart de tour : l'algèbre des nombres complexes gouverne les similitudes et les rotations planes.
- Les **matrices** ne sont rien d'autre que les déformations linéaires de l'espace : étirer, tourner, projeter, cisailler.

Pont 2 : Le Discret et le Continu

- Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une fonction définie sur les entiers isolés (le monde discret des cailloux). Une fonction $f(x)$ est définie sur un intervalle continu de réels (le monde du temps et de la ligne sans coupure).
- La passerelle ? La **limite**. Quand le pas de discrétisation tend vers 0, la somme finie de rectangles devient une intégrale continue $\int_a^b f(x)dx$ (Riemann).
- Quand le nombre de tirages à Pile ou Face tend vers l'infini, la loi binomiale discontinue s'adoucit et épouse la courbe en cloche parfaite de la loi normale continue (Moivre-Laplace).

Pont 3 : Le Local et le Global

C'est le plus vertigineux de tous les ponts :

- La **dérivée** $f'(x)$ est un concept purement **local** : elle ne regarde que ce qui se passe dans un voisinage infiniment petit autour du point x (la vitesse instantanée du compteur à cet instant précis).
- L'**intégrale** $\int_a^b f(t)dt$ est un concept purement **global** : elle additionne la totalité des aires sur tout un intervalle $[a; b]$ (la distance totale parcourue depuis le départ jusqu'à l'arrivée).

- Et quel est le miracle qui relie ces deux mondes ? Le **Théorème Fondamental de l'Analyse** (Chapitre 50) :

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$$

  Pour connaître la variation globale d'un phénomène entre le début et la fin de l'Univers, il suffit d'intégrer toutes ses variations locales infinitésimales !

---

4. L'Énigme d'Eugène Wigner : Pourquoi les maths fonctionnent-elles si bien ?

En 1960, le prix Nobel de physique **Eugène Wigner** publie un essai célèbre intitulé : « *La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles* ». Wigner y pose une question troublante : Pourquoi des concepts créés par des mathématiciens pour des raisons purement esthétiques, sans aucune application en vue, se révèlent-ils des décennies ou des siècles plus tard être la description exacte des lois fondamentales du cosmos ?

- Quand **Apollonius de Perge** étudie les sections d'un cône par un plan (ellipses, paraboles, hyperboles) en l'an −200 à Alexandrie, c'est par pure curiosité géométrique. Dix-huit siècles plus tard, **Johannes Kepler** découvre que les planètes du système solaire n'ont pas d'autre trajectoire que des ellipses parfaites dont le Soleil occupe un foyer !
- Quand **Bernhard Riemann** invente en 1854 la géométrie des espaces courbes à plusieurs dimensions par pur défi mathématique, nul ne soupçonne son utilité. Soixante ans plus tard, **Albert Einstein** s'en empare pour formuler la Relativité Générale : la gravitation n'est pas une force mystérieuse, c'est la courbure riemannienne de l'espace-temps déformé par la masse des étoiles !
- Quand **Paul Dirac** écrit en 1928 l'équation quantique de l'électron, l'algèbre impose l'existence de solutions d'énergie négative. Au lieu de rejeter ces solutions comme des anomalies de calcul, Dirac fait confiance à la cohérence mathématique et postule l'existence d'une particule miroir de même masse mais de charge opposée : le positron. Quatre ans plus tard, Carl Anderson découvre l'antimatière dans une chambre à brouillard !

Le monde réel n'est pas seulement descriptible par les mathématiques : **les mathématiques semblent être la charpente secrète de la réalité.**

---

5. L'Horizon du Supérieur : Ce qui t'attend maintenant

Ce livre s'achève aux portes du baccalauréat et de la maturité. Mais ce que tu as appris n'est pas le sommet de la montagne : **c'est le camp de base**. Voici les cinq grands continents que tu exploreras dès l'an prochain dans l'enseignement supérieur (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, Universités de Sciences, Écoles d'Ingénieurs) :

> **Règle Fondamentale — Synthèse de l'Édifice Mathématique et Cap sur le Supérieur**
>
> - L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
> - ALGÈBRE LINÉAIRE] [TOPOLOGIE] [ANALYSE COMPLEXE]
> - Espaces vectoriels de Ouverts, fermés, Dériver des fonctions
> - dimension quelconque ou continuité abstraite, de variable complexe :
> - infinie (Hilbert, Banach). compacité, complétude. le miracle de Cauchy.
> - Produit hermitien, Dépasser la notion de Résidus, prolongement
> - réduction d'endomorphismes distance usuelle. analytique, hypothèse
> - valeurs propres). de Riemann.
> - THÉORIE DE LA MESURE] [GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE]
> - ET PROBABILITÉS CONTINUES Courbure des surfaces,
> - Intégrale de Lebesgue, tribus, variétés riemanniennes,
> - théorème de convergence dominée, formes différentielles,
> - convergence presque sûre, martingales. calcul tensoriel de la Relativité.

1. **L'Algèbre Linéaire Abstraite :** En Terminale, tu as manipulé des vecteurs à 2 ou 3 coordonnées. Dans le supérieur, tu découvriras les **espaces vectoriels** généraux. Les fonctions, les suites, les polynômes, les signaux sonores sont tous des vecteurs ! On peut additionner deux fonctions, les multiplier par un scalaire, et calculer leur dimension (qui peut être infinie, comme dans les espaces de Hilbert de la mécanique quantique).
2. **La Topologie Générale :** Qu'est-ce que la continuité quand il n'y a plus de repère ni d'axe des réels ? La topologie définit la proximité, la compacité et la connexité à l'aide de simples collections de sous-ensembles appelés les « ouverts ». C'est l'art d'étudier les propriétés qui ne changent pas quand on étire ou déforme un objet sans le déchirer.
3. **L'Analyse Complexe (Fonctions Holomorphes) :** Que se passe-t-il si l'on dérive une fonction non plus d'une variable réelle, mais d'une variable complexe $z \in \mathbb{C}$? Un prodige absolu : si une fonction complexe est dérivable une seule fois, elle est automatiquement indéfiniment dérivable et développable en série entière ! C'est la magie des intégrales de contour d'Augustin-Louis Cauchy et du théorème des résidus.
4. **La Théorie de la Mesure et de l'Intégration de Lebesgue :** L'intégrale de Riemann a ses limites : certaines fonctions oscillant trop vite ne sont pas intégrables. Au début du XX^{e} siècle, Henri Lebesgue réinvente l'intégrale en découpant non plus l'axe des abscisses, mais l'axe des ordonnées. Cette intégrale fonde la théorie moderne des probabilités continues d'Andreï Kolmogorov.
5. **La Logique Fondamentale et l'Incomplétude de Gödel (1931) :** Peut-on tout démontrer en mathématiques ? En 1931, à 25 ans, Kurt Gödel démontre son retentissant **théorème d'incomplétude** : dans tout système logique formel cohérent capable de faire de l'arithmétique, il existe des énoncés vrais que le système est incapable de démontrer par lui-même. Les mathématiques ne sont pas une prison fermée : elles sont un territoire infini, inépuisable et à jamais ouvert à l'exploration.

---

6. Le Message Final

Tu n'es plus le même être qu'au début de ce voyage. Tu as appris la plus précieuse des vertus de l'esprit : **l'esprit critique et l'amour de la vérité démontrée**. Face à un problème complexe, tu as appris à :

- Ne pas te laisser impressionner par le vocabulaire ou la taille des données.
- Chercher le cas particulier le plus simple pour comprendre le geste.
- Poser des définitions nettes et refuser le flou des mots trompeurs.
- Vérifier pas à pas la chaîne des implications logiques.
- Contempler la beauté d'une solution simple et élégante.

Ce pouvoir ne sert pas seulement à réussir des concours d'ingénieurs ou de médecine. Il sert à **rester un être humain libre**. Celui qui comprend les mathématiques ne peut être manipulé ni par les slogans des démagogues, ni par les statistiques fallacieuses, ni par les faux prophètes du prêt-à-penser.

Le livre se referme ici. Mais pour toi, le grand voyage de la pensée ne fait que commencer. Va, cherche, doute, démontre, et émerveille-toi.

Ce qu'il faut retenir du Lycée

1. **La Dérivée $f'(a)$:** Pente de la tangente, taux de variation instantané. Elle gouverne les variations, les extremums et la convexité.
2. **L'Intégrale $\int_a^b f(x)dx$:** Aire sous la courbe, somme continue. Liée à la dérivée par le Théorème Fondamental : $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$.
3. **L'Exponentielle e^x et le Logarithme $\ln x$:** La fonction égale à sa propre dérivée ($y' = y$) et sa réciproque. Elles dominent les croissances du vivant et les échelles physiques.
4. **Les Vecteurs et le Produit Scalaire :** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \| \vec{u} \| \| \vec{v} \| \cos\theta = xx' + yy' + zz'$. L'outil roi de l'orthogonalité et des projections.

5. **Les Nombres Complexes $\mathbb{C}$:** $z = a + ib = re^{i\theta}$, avec $i^2 = -1$. La fusion parfaite de l'algèbre et de la rotation plane.
6. **Le Dénombrement et les Probabilités :** $\binom{n}{k}$, la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, et la Loi des Grands Nombres : le hasard individuel s'efface devant la certitude de la masse.
7. **L'Arithmétique et les Matrices :** Congruences modulo n, algorithme de Bézout, graphes et chaînes de Markov $P_{n+1} = P_n \times T$.

Exercices de Synthèse et Défis Olympiques

Ces 22 exercices embrassent l'ensemble des connaissances acquises et ouvrent directement sur les méthodes du supérieur.

Niveau (Maîtrise des fondamentaux)

Exercice 58.1 Soit la fonction $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer sa dérivée $f'(x)$, dresser son tableau de variations complet avec limites, et déterminer les coordonnées de son maximum absolu.

Exercice 58.2 Calculer l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

Exercice 58.3 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ et écrire les solutions sous forme exponentielle.

Exercice 58.4 Calculer la somme des entiers de 1 à n : $S_n = 1 + 2 + ... + n$, puis la somme de leurs cubes $C_n = 1^3 + 2^3 + ... + n^3$. Démontrer par récurrence que $C_n = (S_n)^2$.

Exercice 58.5 On tire au hasard 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement un As ?

Exercice 58.6 Déterminer l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et résoudre le système $\begin{cases} 7x + 3y = 17 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$.

Exercice 58.7 Calculer le reste de la division de 5^{2026} par 11 en utilisant le Petit Théorème de Fermat.

Niveau (Problèmes de synthèse baccalauréat et concours)

Exercice 58.8 La constante d'Euler-Mascheroni γ. Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}$ la série harmonique. 1. En comparant $\frac{1}{k}$ avec $\int_k^{k+1} \frac{1}{t} dt$ et $\int_{k-1}^{k} \frac{1}{t} dt$, démontrer que :

$$\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln(n)$$

2. En déduire la limite $\lim_{n \to +\infty} H_n$. 3. On pose $u_n = H_n - \ln(n)$. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0. En déduire qu'elle converge vers une constante finie $\gamma \approx 0,5772$ (la constante d'Euler).

Exercice 58.9 Intégrales de Wallis et formule de Stirling. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$: $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt$. 1. Calculer W_0 et W_1. 2. Par une intégration par parties, établir la relation de récurrence :

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

3. Démontrer que la suite (W_n) est strictement décroissante et que $\lim_{n \to +\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$. 4. En déduire la formule du produit infini de John Wallis :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2 \times 4 \times 6 \times ... \times 2n}{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-1)} \right)^2 = \pi$$

Exercice 58.10 La formule sommatoire de Poisson et séries de Fourier (Aperçu). Calculer l'intégrale $\int_0^{\pi} x \cos(nx) dx$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ par intégration par parties.

Exercice 58.11 Résolution de l'équation différentielle logistique. Soit l'équation différentielle de Verhulst modélisant une population saturée :

$$y' = ay(1 - \frac{y}{K}) \quad (a > 0, K > 0)$$

En posant le changement de variable $z = \frac{1}{y}$, résoudre cette équation et tracer l'allure de la courbe sigmoïde obtenue.

Exercice 58.12 Les nombres de Mersenne et la perfection d'Euclide. Un entier N est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts (par exemple $6 = 1 + 2 + 3$). Démontrer le théorème d'Euclide : si $2^p - 1$ est un nombre premier, alors l'entier $N = 2^{p-1}(2^p - 1)$ est un nombre parfait pair.

Exercice 58.13 Le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Un casino propose un jeu : on lance une pièce équilibrée jusqu'à l'apparition du premier Pile. Si Pile sort au k-ième lancer, le joueur gagne 2^k euros. 1. Calculer l'espérance de gain mathématique théorique de ce jeu. 2. Combien serais-tu prêt à payer pour faire une partie ? Discuter le paradoxe.

Exercice 58.14 Déterminant de Vandermonde. Calculer le déterminant d'ordre 3 :

$$V(a,b,c) = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$$

Montrer qu'il vaut $(b-a)(c-a)(c-b)$. Pourquoi ce déterminant garantit-il l'unicité du polynôme d'interpolation passant par 3 points distincts ?

Exercice 58.15 Le théorème de d'Alembert-Gauss par l'absurde. Expliquer pourquoi la fonction module d'un polynôme $P(z)$ doit nécessairement atteindre sa borne inférieure sur le plan complexe et pourquoi cette borne ne peut être strictement positive.

Niveau (Grands défis préparatoires au supérieur)

Exercice 58.16 La somme de Bâle $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Considérons le polynôme $P_m(X) = \sum_{k=0}^{m} \binom{2m+1}{2k+1} (-1)^k X^{m-k}$. En utilisant les racines de la fonction cotangente, établir la célèbre relation d'Euler démontrant que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + ... = \frac{\pi^2}{6}$$

Exercice 58.17 Le Théorème Spectral et décomposition en valeurs propres. Démontrer que toute matrice symétrique réelle 2×2 admet deux valeurs propres réelles et peut être diagonalisée dans une base orthonormée de vecteurs propres.

Exercice 58.18 L'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour tous réels $x_1, ..., x_n$ et $y_1, ..., y_n$, démontrer en étudiant le signe du trinôme du second degré $P(t) = \sum_{i=1}^{n} (x_i t + y_i)^2$ que :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2 \right)$$

En déduire l'inégalité intégrale de Cauchy-Schwarz : $\left(\int_a^b f(t)g(t)dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(t)^2 dt \right) \left(\int_a^b g(t)^2 dt \right)$.

Exercice 58.19 Le Théorème du Point Fixe de Banach (Théorème des contractions). Soit $f : [a;b] \to [a;b]$ une fonction k-contractante (il existe $k \in]0;1[$ tel que $|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$ pour tous x, y). Démontrer que f admet un **unique point fixe** $\alpha \in [a;b]$, et que pour tout $u_0 \in [a;b]$, la suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers α avec une vitesse géométrique majorée par $|u_n - \alpha| \leq \frac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0|$.

Exercice 58.20 Théorème Central Limite (Aperçu conceptuel). Expliquer pourquoi la somme d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes d'effets petits et cumulés tend toujours vers une loi normale gaussienne, et pourquoi cette cloche universelle apparaît aussi bien dans la taille des êtres vivants, les erreurs de mesure astronomiques, le bruit thermique d'une résistance électrique et les fluctuations boursières.

Exercice 58.21 La formule d'Euler pour les polyèdres convexes : $S - A + F = 2$. Vérifier cette formule pour les 5 solides de Platon (Tétraèdre, Cube, Octaèdre, Dodécaèdre, Icosaèdre). Esquisser la preuve par projection planaire et contraction d'arêtes. Pourquoi ce nombre 2 est-il le premier invariant topologique (la caractéristique d'Euler de la sphère) ?

Exercice 58.22 Le problème ouvert de Syracuse (Collatz). Soit la suite définie par $u_{n+1} = \frac{u_n}{2}$ si u_n est pair, et $u_{n+1} = 3u_n + 1$ si u_n est impair. 1. Tester la suite pour $u_0 = 7$. 2. Pourquoi cette conjecture d'une simplicité enfantine résiste-t-elle à tous les mathématiciens et aux ordinateurs les plus puissants depuis 1937 ? Méditer sur les limites de notre savoir.

Solutions Détaillées

Solution 58.1 $f'(x) = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = x(2-x)e^{-x}$. Puisque $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x(2-x)$: négatif sur $]-\infty;0[$, positif sur $]0;2[$, négatif sur $]2;+\infty[$. Limites : en $-\infty$, $\lim x^2 e^{-x} = +\infty$. En $+\infty$, par croissance comparée, $\lim x^2 e^{-x} = 0$. Le maximum absolu est atteint en $x=2$, avec $f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,5413$.

Solution 58.2 On reconnaît la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) = x^2+1 > 0$ et $u'(x) = 2x$. $I = [\ln(x^2+1)]_0^1 = \ln(1^2+1) - \ln(0^2+1) = \ln(2) - \ln(1) = \ln 2$.

Solution 58.3 $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4(1)(4) = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$. $z_1 = \frac{2\sqrt{3}-2i}{2} = \sqrt{3} - i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$. $z_2 = \frac{2\sqrt{3}+2i}{2} = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

Solution 58.4 On sait que $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. On veut prouver $\mathcal{P}(n) : C_n = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

- Pour $n = 1$: $C_1 = 1^3 = 1$ et $\frac{1^2 \times 2^2}{4} = 1$. Vrai.
- Hérédité : $C_{n+1} = C_n + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2\left[\frac{n^2}{4} + n + 1\right] = (n+1)^2\left[\frac{n^2+4n+4}{4}\right] = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$. $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Solution 58.5 Nombre total de mains : $\binom{32}{5} = 201\,376$. Pour avoir exactement 1 As : on choisit 1 As parmi 4 ($\binom{4}{1} = 4$) et 4 cartes parmi les 28 cartes qui ne sont pas des As ($\binom{28}{4} = 20\,475$). Total favorables : $4 \times 20\,475 = 81\,900$. Probabilité : $P = \frac{81\,900}{201\,376} \approx 0,4067$ (environ $40,7\,\%$).

Solution 58.6 $\det(A) = 7(1) - 3(2) = 1 \neq 0$. $A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$. Le système s'écrit $A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 17 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17-15 \\ -34+35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. D'où $x = 2, y = 1$.

Solution 58.7 11 est premier, $\text{PGCD}(5, 11) = 1$. Par Fermat, $5^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. $2026 = 10 \times 202 + 6$. $5^{2026} = (5^{10})^{202} \times 5^6 \equiv 1 \times 5^6 \pmod{11}$. $5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11}$. $5^6 = (5^2)^3 \equiv 3^3 = 27 = 11 \times 2 + 5 \equiv 5 \pmod{11}$. Le reste est **5**.

Solution 58.8 1. Pour $t \in [k; k+1]$, $\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}$. Par intégration sur $[k; k+1]$ de longueur 1 : $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t}dt \leq \frac{1}{k}$. En sommant de $k = 1$ à n, on obtient les inégalités encadrant H_n. 2. Comme $\lim_{n\to+\infty} \ln(n+1) = +\infty$, par comparaison, $\lim_{n\to+\infty} H_n = +\infty$. 3. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{1}{t}dt \leq 0$ d'après l'inégalité précédente. La suite est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers un réel $\gamma \in [0; 1]$.

Solution 58.9 1. $W_0 = \int_0^{\pi/2} 1dt = \frac{\pi}{2}$. $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin t dt = [-\cos t]_0^{\pi/2} = 1$. 2. $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1}(t)\sin(t)dt$. Par IPP avec $u = \sin^{n-1} t$ et $v' = \sin t$: $W_n = [-\cos t \sin^{n-1} t]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \cos^2(t)\sin^{n-2}(t)dt = 0 + (n-1)\int_0^{\pi/2}(1 - \sin^2 t)\sin^{n-2} t dt = (n-1)W_{n-2} - (n-1)W_n$. D'où $nW_n = (n-1)W_{n-2} \Longrightarrow W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$. 3. Sur $[0; \pi/2]$, $0 \leq \sin t \leq 1 \Longrightarrow \sin^{n+1} t \leq \sin^n t$. Donc $W_{n+1} \leq W_n$. De plus, $\frac{W_{n+1}}{W_n} \geq \frac{W_{n+2}}{W_n} = \frac{n+1}{n+2} \to 1$. Par encadrement, $\lim \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$. 4. En explicitant W_{2n} et W_{2n+1} par cascade de récurrence, le quotient mène au produit infini de Wallis égal à π.

Solution 58.10 Par IPP : $u(x) = x \Longrightarrow u'(x) = 1$, et $v'(x) = \cos(nx) \Longrightarrow v(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$. $\int_0^\pi x\cos(nx)dx = \left[x\frac{\sin(nx)}{n}\right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(nx)}{n}dx = 0 - \left[-\frac{\cos(nx)}{n^2}\right]_0^\pi = \frac{\cos(n\pi) - \cos(0)}{n^2} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$. Cette intégrale vaut $-\frac{2}{n^2}$ si n est impair, et 0 si n est pair.

Solution 58.11 $y' = ay - \frac{a}{K}y^2$. En divisant par y^2 : $\frac{y'}{y^2} = \frac{a}{y} - \frac{a}{K}$. Comme $z = \frac{1}{y}$, $z' = -\frac{y'}{y^2}$. L'équation devient $-z' = az - \frac{a}{K} \Leftrightarrow z' + az = \frac{a}{K}$. C'est une équation différentielle linéaire du 1er ordre ! Solution homogène : $z_H = Ce^{-at}$. Solution particulière : $z_P = \frac{1}{K}$. Donc $z(t) = \frac{1}{K} + Ce^{-at}$, d'où $y(t) = \frac{K}{1 + CKe^{-at}}$. C'est la fonction logistique sigmoïde universelle de croissance saturée.

Solution 58.12 Soit $N = 2^{p-1}M_p$ avec $M_p = 2^p - 1$ premier. Puisque M_p est premier et impair, les diviseurs de N sont de la forme 2^k (pour $0 \leq k \leq p-1$) et $2^k M_p$ (pour $0 \leq k \leq p-1$). La somme de tous les diviseurs de N est : $\sigma(N) = \left(\sum_{k=0}^{p-1} 2^k\right)(1 + M_p) = (2^p - 1)(1 + 2^p - 1) = (2^p - 1)2^p = 2 \times [2^{p-1}(2^p - 1)] = 2N$. La somme de tous les diviseurs valant $2N$, la somme des diviseurs stricts vaut $2N - N = N$. Le nombre est parfait.

Solution 58.13 1. La variable aléatoire X prend la valeur 2^k avec la probabilité $(1/2)^k$. $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} 2^k\left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=1}^{+\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + ... = +\infty$. 2. L'espérance est infinie, pourtant personne ne paierait 1 000 euros pour jouer, car la probabilité de gagner plus de 16 euros n'est que de $\frac{1}{16} \approx 6\,\%$. Ce paradoxe a conduit Daniel Bernoulli (1738) à inventer la notion d'**utilité marginale** logarithmique de l'argent.

Solution 58.14 En effectuant les opérations sur les colonnes $C_3 \leftarrow C_3 - aC_2$ et $C_2 \leftarrow C_2 - aC_1$, la première ligne devient $(1\,0\,0)$, ce qui permet de factoriser immédiatement $(b-a)$ et $(c-a)$, laissant $(c-b)$. Si les trois points sont d'abscisses distinctes, ce déterminant est non nul, ce qui prouve que la matrice du système des coefficients du polynôme $P(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ est inversible : il existe une parabole unique passant par 3 points non alignés verticalement.

Solution 58.15 Si $P(z)$ n'a pas de racine, $|P(z)| > 0$ partout. Comme $|P(z)| \to +\infty$ quand $|z| \to +\infty$, le minimum global $m > 0$ est atteint en un point z_0. Mais en écrivant le développement local $P(z_0 + h) = P(z_0) + ch^k + ...$, en choisissant l'argument de h de façon à opposer ch^k à $P(z_0)$, on trouve un point où le module est strictement inférieur à m, contredisant le fait que m soit un minimum (lemme de d'Alembert). Donc $m = 0$, et P admet une racine.

Solution 58.16 En exprimant $\sin((2m+1)x)$ à l'aide de la formule de Moivre et en factorisant par $\sin^{2m+1}(x)$, les racines du polynôme sont les $\cot^2\left(\frac{k\pi}{2m+1}\right)$ pour $k = 1, \dots, m$. La somme des racines est donnée par les relations coefficients-racines : $\sum_{k=1}^{m} \cot^2\left(\frac{k\pi}{2m+1}\right) = \frac{m(2m-1)}{3}$. En utilisant l'encadrement $\cot^2\theta < \frac{1}{\theta^2} < 1 + \cot^2\theta$ et en faisant tendre $m \to +\infty$, le théorème des gendarmes livre majestueusement la valeur $\frac{\pi^2}{6}$.

Solution 58.17 Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Son discriminant caractéristique est $\Delta = (a+c)^2 - 4(ac - b^2) = (a-c)^2 + 4b^2$. Puisque $(a-c)^2 \geq 0$ et $4b^2 \geq 0$, Δ est toujours positif ou nul ! Les valeurs propres sont toujours réelles. Si $b \neq 0$, $\Delta > 0$ et les deux valeurs propres sont distinctes, avec des vecteurs propres orthogonaux ($\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$).

Solution 58.18 Pour tout réel t, $P(t) = \sum_{i=1}^{n} (x_i t + y_i)^2 \geq 0$ comme somme de carrés. En développant : $P(t) = (\sum x_i^2)t^2 + 2(\sum x_i y_i)t + (\sum y_i^2) \geq 0$. Ce trinôme du second degré en t garde un signe constant positif ou nul. Son discriminant réduit Δ' est donc obligatoirement négatif ou nul : $\Delta' = (\sum x_i y_i)^2 - (\sum x_i^2)(\sum y_i^2) \leq 0$, d'où l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'extension continue aux intégrales découle du passage à la limite des sommes de Riemann.

Solution 58.19 Par récurrence, $|u_{n+1} - u_n| \leq k^n |u_1 - u_0|$. Pour $p \geq 1$, $|u_{n+p} - u_n| \leq \sum_{j=n}^{n+p-1} |u_{j+1} - u_j| \leq |u_1 - u_0| \sum_{j=n}^{+\infty} k^j = \frac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0|$. La suite est de Cauchy dans un intervalle fermé complet, donc elle converge vers un unique point fixe α. Ce théorème fonde la méthode de résolution numérique des équations différentielles et des équations intégrales.

Solution 58.20 D'après le Théorème Central Limite (TCL), si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont des variables indépendantes de même loi d'espérance μ et de variance σ^2, alors la variable centrée réduite $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers la loi normale standard $\mathcal{N}(0,1)$. La courbe en cloche est l'attracteur universel de tout phénomène macroscopique résultant d'une multitude d'infimes chocs microscopiques indépendants.

Solution 58.21 Pour le tétraèdre : $S = 4, A = 6, F = 4 \Longrightarrow 4 - 6 + 4 = 2$. Pour le cube : $S = 8, A = 12, F = 6 \Longrightarrow 8 - 12 + 6 = 2$. Pour l'octaèdre : $S = 6, A = 12, F = 8 \Longrightarrow 2$. Pour le dodécaèdre : $S = 20, A = 30, F = 12 \Longrightarrow 2$. Pour l'icosaèdre : $S = 12, A = 30, F = 20 \Longrightarrow 2$. Cette quantité $\chi = S - A + F$ est invariante par déformation homéomorphe de la surface : pour un tore (bouée), elle vaut 0. C'est l'acte de naissance de la topologie algébrique avec Henri Poincaré.

Solution 58.22 Pour $u_0 = 7$: $7 \to 22 \to 11 \to 34 \to 17 \to 52 \to 26 \to 13 \to 40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$ (boucle $1 \to 4 \to 2 \to 1$). Cette conjecture, testée par ordinateur jusqu'à des nombres colossaux ($> 10^{20}$), résiste à toute preuve formelle. Comme le disait Paul Erdős : *« Les mathématiques ne sont peut-être pas encore mûres pour de tels problèmes »*. Elle rappelle avec humilité que même armés des plus puissants théorèmes, nous restons des explorateurs au bord d'un océan de mystères.

Épilogue

Tu es arrivé au bout de ce livre. La graine plantée il y a douze ans est devenue un arbre vigoureux, aux racines plongées dans le geste du corps et aux branches dressées vers l'infini. Prends un moment pour mesurer ce que tu as accompli. Et souviens-toi toujours : Les mathématiques ne sont pas un ensemble de règles à obéir. Elles sont **la plus haute forme de poésie de la pensée pure, et le plus grand chant de liberté de l'esprit humain.** Bon voyage vers tes nouvelles découvertes !

CONCLUSION GÉNÉRALE & ÉPILOGUE : L'ÉDIFICE DU NOMBRE ET LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT



Fig. 126. – L'Arbre des Savoirs Mathématiques : de l'expérience sensorielle à la théorie moderne

Tu as franchi cinquante-huit étapes, depuis le premier caillou serré dans la main du jeune berger de la savane jusqu'aux espaces de dimension infinie, aux nombres complexes, aux intégrales de Riemann et aux marches aléatoires de Markov. Ce voyage t'a révélé une vérité fondamentale que peu de manuels scolaires osent formuler : **les mathématiques ne sont pas un ensemble de règles arbitraires inventées pour tester ou piéger les écoliers.** Elles sont la mémoire vivante de tous les problèmes que l'humanité a dû surmonter pour s'orienter sur les océans, bâtir des cathédrales, prévoir les éclipses, soigner les épidémies et sonder le cosmos.

Les Trois Enseignements Fondamentaux

1. **L'Ancrage Sensori-Moteur : Reviens toujours à la main et au dessin.** Quand un problème mathématique semble hermétique, ne reste jamais paralysé devant des lettres muettes. Trace un schéma, donne des couleurs aux grandeurs comme l'enseignait Oliver Byrne, fais bouger les figures, matérialise l'égalité sur une balance d'Al-Khwarizmi. La pensée mathématique s'enracine dans le corps et le geste avant de s'élever dans l'abstraction pure.
2. **L'Automatisation Opératoire : La technique libère l'esprit.** Pourquoi posons-nous les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions selon des algorithmes rigoureux ? Pourquoi apprenons-nous par cœur les tables et les règles opératoires ? Pour libérer notre mémoire de travail. L'outil mécanique n'est pas un asservissement, mais un instrument d'émancipation : en confiant l'exécution machinale à la main, nous libérons toute la puissance de notre esprit pour l'intuition, la stratégie et la poésie de la démonstration.
3. **Le Courage des Cas Limites et la Vigilance Critique.** Les plus grands bonds en avant des mathématiques sont nés du refus d'éluder les paradoxes : que se passe-t-il si la grandeur s'annule, si l'ensemble est vide, si le dénominateur

vaut zéro, si le processus tend vers l'infini ? Ne fuis jamais les cas limites : ce sont eux qui éprouvent la solidité de tes théories et qui séparent la conjecture fragile de la certitude inébranlable.

L'Envoi au Lecteur

Les mathématiques t'ont transmis le plus précieux de tous les trésors : **la liberté de l'esprit critique.** Elles t'ont appris à ne jamais te soumettre à un argument d'autorité, à exiger la preuve rigoureuse, et à reconnaître loyalement la vérité dès qu'elle s'impose par la force de la logique.

Le grand livre du monde est désormais ouvert devant tes yeux. Tu en connais la langue. Va de l'avant, explore, questionne sans crainte, et garde toujours vivante en toi la curiosité du premier caillou.

ANNEXE A : FORMULAIRE & VALEURS REMARQUABLES DE RÉFÉRENCE

I. Table Exacte des Lignes Trigonométriques Remarquables

Angle en Degrés (°)	Radians (rad)	$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\tan(x)$
0°	0	1	0	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	0	1	*Non défini*
120°	$2\frac{\pi}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\sqrt{3}$
135°	$3\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
150°	$5\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
180°	π	-1	0	0

II. Formules Trigonométriques d'Addition et de Duplication

Formules d'Addition

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$$

$$\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$$

Formules de Duplication

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$$

$$\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1$$

$$\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$$

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$

$$\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1$$

$$\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1-\tan^2(a)} \quad \left[a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}\right]$$

III. Table Universelle des Dérivées Usuelles & Opérations

Fonction $f(x)$	**Dérivée $f'(x)$**	**Domaine de Validité / Règle**
k (constante)	0	$x \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \in \mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \in]0,;+\infty[$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$ (l'unique fonction égale à sa dérivée avec $f(0)=1$)
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$x \in]0,;+\infty[$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$x \in \mathbb{R}$
$(u+v)'$	$u'+v'$	Linéarité de la dérivation
$(u \cdot v)'$	$u'v+uv'$	Règle du produit de Leibniz
$\left(\frac{u}{v}\right)'$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	Règle du quotient ($v \neq 0$)
$(e^u)'$	$u'e^u$	Composition exponentielle
$(\ln u)'$	$\frac{u'}{u}$	Composition logarithmique ($u>0$)

ANNEXE B : TABLE UNIVERSELLE DES NOTATIONS & SYMBOLES

Symbole	Nom & Lecture	Signification Didactique & Exemple
$\mathbb{N}$	Entiers naturels	Ensemble des entiers positifs ou nuls : $\{0, 1, 2, 3, ...\}$
$\mathbb{Z}$	Entiers relatifs	Entiers positifs et négatifs : $\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$
$\mathbb{D}$	Nombres décimaux	Nombres s'écrivant avec un nombre fini de chiffres après la virgule : $\frac{a}{10^n}$
$\mathbb{Q}$	Nombres rationnels	Fractions de deux entiers relatifs : $\frac{p}{q}$ avec $q \neq 0$
$\mathbb{R}$	Nombres réels	Tous les points de la droite continue (inclut $\sqrt{2}, \pi, e$)
$\mathbb{C}$	Nombres complexes	Nombres de la forme $z = a + ib$ où $i^2 = -1$
$\in$ / $\notin$	Appartient / N'appartient pas	Relie un élément à un ensemble : $3 \in \mathbb{N}$, mais $-2 \notin \mathbb{N}$
$\subset$	Inclus dans	Relie deux ensembles : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
$\cap$	Intersection	$A \cap B$: ensemble des éléments communs à A et à B (ET logique)
$\cup$	Réunion / Union	$A \cup B$: ensemble des éléments appartenant à A ou à B (OU logique)
$\varnothing$	Ensemble vide	L'ensemble qui ne contient aucun élément
$\forall$	Pour tout / Quel que soit	Quantificateur universel : $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
$\exists$	Il existe	Quantificateur existentiel : $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$
$\Longrightarrow$ / $\Longleftrightarrow$	Implique / Équivaut à	Déduction logique et équivalence bilatérale stricte
(u) / $\overrightarrow{AB}$	Vecteur	Déplacement orienté caractérisé par une direction, un sens et une norme
$\|(u)\|$	Norme d'un vecteur	Longueur géométrique du segment orienté représenté par (u)
$(u) \cdot (v)$	Produit scalaire	Mesure de projection géométrique : $\|(u)\|\|(v)\| \cos(\theta)$
$\lim_{x \to a}$	Limite	Comportement local d'une fonction à l'approche de la borne a ou de l'∞
$f'(x)$	Dérivée première	Taux d'accroissement instantané et pente de la droite tangente
$\int_a^b f(t)dt$	Intégrale définie	Mesure d'aire signée sous la courbe de f entre les bornes a et b
$\sum_{i=1}^{n}$	Somme discrète	Addition séquentielle des termes : $x_1 + x_2 + ... + x_n$
$\binom{n}{k}$	Combinaison	Nombre de façons de choisir k éléments parmi n sans ordre : $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

ANNEXE C : INDEX DES SOURCES PHOTOGRAPHIQUES ET PATRIMONIALES

Conformément aux principes de diffusion libre sous licence **Creative Commons (CC BY-SA 4.0)** et au respect des sources historiques, l'ensemble des photographies d'ouverture de volume et des documents patrimoniaux insérés dans l'ouvrage provient de la médiathèque patrimoniale **Wikimedia Commons** et de collections d'archives publiques.

I. Grandes Planches de Frontispice (Les Mathématiques dans la Nature)

Emplacement	Sujet & Espèce	Phénomène Mathématique	Auteur & Licence	Source Wikimedia Commons
Frontispice Vol. I (Pleine page gauche)	**Alvéoles d'abeilles** *(Apis mellifera)*	Pavage hexagonal compact du plan, conjecture du nid d'abeille (Hales 1999), optimisation isopérimétrique.	Waugsberg CC BY-SA 3.0	Wikimedia Commons `File:Bienenwabe_mit_Eiern_5.jpg`
Frontispice Vol. II (Pleine page gauche)	**Coupe de Nautile** *(Nautilus pompilius)*	Spirale logarithmique ($r = ae^{b\theta}$), croissance gnomonique invariante par homothétie, proportions continues.	Chris 73 CC BY-SA 3.0	Wikimedia Commons `File:NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg`
Frontispice Vol. III (Pleine page gauche)	**Capitule de Tournesol** *(Helianthus annuus)*	Phyllotaxie, spirales de Fibonacci croisées (34/55), divergence selon l'angle d'or ($137\{,\}5077^\circ$).	Anna Benczur CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons `File:Fibonacci_spiral.jpg`
Frontispice Vol. IV (Pleine page gauche)	**Chou Romanesco** *(Brassica oleracea)*	Autosimilarité fractale stricte, invariance d'échelle, récursivité géométrique et spirales logarithmiques imbriquées.	Ivar Leidus (Iifar) CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons `File:Romanesco_broccoli.jpg`
Frontispice Vol. V (Pleine page gauche)	**Toile d'araignée perlée** *(Araneus diadematus)*	Équilibre vectoriel concourant, décomposition trigonométrique des forces et courbure caténaire (chaînette $y = a\cosh(\frac{x}{a})$).	Luc Viatour CC BY-SA 3.0	Wikimedia Commons `File:Spider_web_Luc_Viatour.jpg`
Frontispice Vol. VI (Pleine page gauche)	**Cône textile** *(Conus textile)*	Morphogenèse par réaction-diffusion (équations de Turing 1952), automates cellulaires (règle 30) et motif fractal de Sierpinski.	Reinhold Möller (Ermell) CC BY-SA 4.0	Wikimedia Commons `File:Textil-Kegelschnecke.jpg`

II. Documents Historiques & Archéologiques dans le Corps du Texte

Chapitre	Document & Sujet	Portée Pédagogique	Origine & Licence	Source Wikimedia Commons
Chapitre 1 (Vol. I)	**L'Os d'Ishango** (20 000 av. J.-C.)	Premières encoches de dénombrement par paquets, correspondance un-pour-un.	IRSNB Bruxelles Domaine public	Wikimedia Commons `File:Ishango_bone.jpg`
Chapitre 4 (Vol. I)	**La Pascaline** (Blaise Pascal, 1642)	Premier train d'engrenages opératoires réalisant le report automatique de la retenue décimale.	David Monniaux CC BY-SA 3.0	Musée des Arts & Métiers `File:Arts_et_Metiers_Pascaline.jpg`
Chapitre 10 (Vol. II)	**Papyrus Rhind** (1550 av. J.-C.)	Tables de partage et décomposition des grandeurs en fractions unitaires égyptiennes.	British Museum Domaine public	British Museum `File:Rhind_Mathematical_Papyrus.jpg`
Chapitre 19 (Vol. III)	**Les Éléments d'Euclide** (Oliver Byrne, 1847)	Planche originale en quadrichromie démontrant le Théorème de Pythagore par la couleur pure.	Oliver Byrne Domaine public	Bibliothèque patrimoniale `File:Byrne_1847_Pythagoras.jpg`
Chapitre 54 (Vol. VI)	**La Planche de Galton** (Francis Galton, 1877)	Matérialisation mécanique du théorème central limite : convergence du triangle de Pascal vers la loi Normale.	Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0	Sciences physiques `File:Galton_board.png`

Note éditoriale sur les droits de réutilisation : Toutes les images ci-dessus sont réutilisables selon les termes de leurs licences respectives (Domaine public, CC BY-SA 3.0 et CC BY-SA 4.0). Pour toute reproduction, adaptation ou diffusion, veuillez créditer les auteurs d'origine et mentionner les liens Wikimedia Commons conformément aux obligations légales de partage dans les mêmes conditions.

INDEX THÉMATIQUE DÉTAILLÉ

Concept Clé	Localisation	Signification Pédagogique & Didactique
Abaque / Boulier	Vol. I, Ch. 4	Matérialisation du groupement décimal et transitivité de la retenue
Aire du rectangle / disque	Vol. II, Ch. 12 & 16	Mesure du pavage 2D et quadrature circulaire par Archimède
Algorithme d'Euclide	Vol. IV, Ch. 29	Recherche du PGCD par soustractions puis divisions successives
Angle (aigu, droit, obtus)	Vol. III, Ch. 15	Mesure de l'ouverture d'un secteur angulaire indépendamment des longueurs
Arbre pondéré	Vol. V, Ch. 42	Représentation des probabilités conditionnelles et formule de Bayes
Asymptote (horizontale, verticale)	Vol. VI, Ch. 45	Comportement aux bornes infinies ou valeurs interdites
Balance d'Al-Khwarizmi	Vol. IV, Ch. 22	Équivalence des opérations bilatérales pour la résolution d'équations
Base dix (décimale)	Vol. I, Ch. 2	Groupement par paquets de dix fondé sur la morphologie des deux mains
Bijection (un-pour-un)	Vol. I, Ch. 1	Correspondance terme à terme du sac de cailloux préhistorique
Cercle trigonométrique	Vol. V, Ch. 37	Enroulement de la droite réelle sur le cercle unité et projections
Dérivée et Tangente	Vol. V, Ch. 39	Passage de la sécante moyenne à la tangente instantanée
Équation différentielle	Vol. VI, Ch. 51	Loi physique d'évolution où la vitesse dépend de l'état présent ($y' = ay$)
Exponentielle (e^x)	Vol. V, Ch. 40	Fonction unique égale à sa propre dérivée avec $f(0) = 1$
Fractions (partage et quotient)	Vol. II, Ch. 10	Fraction comme opérateur de découpage puis comme nombre rationnel
Intégrale de Riemann	Vol. VI, Ch. 50	Limite des sommes de tranches rectangulaires pour le calcul d'aires
Logarithme népérien	Vol. VI, Ch. 48	Fonction réciproque de l'exponentielle transformant les produits en sommes
Loi Normale (Gauss)	Vol. VI, Ch. 54	Distribution en cloche universelle issue du théorème central limite
Matrices et Graphes	Vol. VI, Ch. 57	Tableaux d'opérations multilignes et marches aléatoires de Markov
Multiplication posée	Vol. I, Ch. 5	Algorithme à deux étages avec décalage du zéro de dizaine
Nombres complexes	Vol. VI, Ch. 55	Plan d'Argand-Gauss et nombre imaginaire $i^2 = -1$ comme rotation de 90°
Nombres négatifs / relatifs	Vol. II, Ch. 14	Symétrie axiale autour de zéro pour les dettes et températures froides

Concept Clé	Localisation	Signification Pédagogique & Didactique
Pythagore (Théorème de)	Vol. III, Ch. 19	Conservation de l'aire des carrés sur les côtés de l'angle droit ($a^2 + b^2 = c^2$)
Récurrence (Principe de)	Vol. VI, Ch. 43	Transmission héréditaire de la vérité mathématique (effet domino)
Subitizing	Vol. I, Ch. 1	Reconnaissance visuelle instantanée des collections jusqu'à 3 ou 4 objets
Thalès (Théorème de)	Vol. III, Ch. 17	Conservation des rapports de proportionnalité par projection parallèle
Valeurs Intermédiaires (TVI)	Vol. VI, Ch. 46	Théorème topologique assurant qu'une fonction continue traverse toutes les valeurs

BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE & DIDACTIQUE ANNOTÉE

I. Les Textes Fondateurs de l'Histoire des Mathématiques

- **Euclide d'Alexandrie** (vers 300 av. J.-C.), **Les Éléments**. Traduction et commentaires de B. Vitrac, Éditions PUF. *L'ouvrage séminal qui a instauré la méthode axiomatique déductive et la rigueur géométrique.*
- **Al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa** (vers 820), **Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala** (L'Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison). *L'acte de naissance de l'algèbre comme science autonome des opérations d'équilibre bilatéral.*
- **Descartes, René** (1637), **La Géométrie**. Appendice au **Discours de la Méthode**. *L'unification de l'algèbre et de la géométrie par l'invention du repère de coordonnées cartésiennes.*
- **Byrne, Oliver** (1847), **The First Six Books of the Elements of Euclid in which Coloured Diagrams and Symbols are used instead of Letters for the Greater Ease of Learners**, William Pickering, Londres. *Le chef-d'œuvre de la sémiotique visuelle mathématique qui a inspiré la palette graphique du présent livre.*
- **Euler, Leonhard** (1748), **Introductio in analysin infinitorum**. *Le texte qui a fondé l'analyse moderne, la théorie des fonctions, la notation de la base e et l'identité $e^{i\pi} + 1 = 0$.*
- **Gauss, Carl Friedrich** (1801), **Disquisitiones Arithmeticae**. *La refondation monumentale de la théorie des nombres, de l'arithmétique modulaire et des congruences.*

II. Didactique, Sciences Cognitives & Cognition Incarnée

- **Lakoff, George & Núñez, Rafael** (2000), **Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being**, Basic Books. *L'ouvrage séminal de la cognition mathématique incarnée. Il démontre comment les concepts les plus abstraits (l'infini actuel, les limites, les nombres complexes) sont construits à partir de métaphores conceptuelles ancrées dans le corps, le geste et la manipulation motrice.*
- **Dehaene, Stanislas** (2010), **La Bosse des maths : Quinze ans après**, Éditions Odile Jacob. *Les fondements neurocognitifs du sens du nombre, du subitizing et du recyclage neuronal.*
- **Brousseau, Guy** (1998), **Théorie des situations didactiques**, La Pensée Sauvage. *Analyse de la dévolution, du contrat didactique et de l'obstacle épistémologique.*
- **Charnay, Roland & Mante, Michel** (2019), **Cap Maths : Apprentissages mathématiques**, Hatier. *Méthodologie fondamentale du passage de la manipulation concrète à l'abstraction opératoire.*
- **Polya, George** (1945), **How to Solve It** (Comment poser et résoudre un problème), Princeton University Press. *Le grand classique de l'heuristique mathématique : observer, décomposer, généraliser et vérifier les cas limites.*
- **Sweller, John** (2011), **Cognitive Load Theory**, Springer. *Théorie de la charge cognitive : équilibre indispensable entre mémoire de travail et mémoire à long terme.*

SILVÈRE MARTIN-MICHIELLOT & ANTIGRAVITY

LA VOIE DU NOMBRE

Une Odyssée Constructive, du Premier Caillou au Baccalauréat

> *« Et si la force et la beauté des mathématiques naissaient simplement de l'éveil des yeux et du geste des mains ? »*

Comment réconcilier durablement l'esprit humain avec la clarté et la puissance des mathématiques ? Pourquoi tant d'enfants et d'adolescents décrochent-ils face à des symboles abstraits dont on a oublié de leur raconter l'origine vivante ?

LA VOIE DU NOMBRE relève ce défi à travers cinquante-huit chapitres reliés comme les maillons d'une même chaîne ininterrompue, guidant pas à pas l'élève depuis l'éveil du regard et les premiers cailloux jusqu'aux sommets de l'enseignement secondaire. Chaque concept y naît d'un geste concret de la main avant de s'élever dans la pure rigueur logique.

1. Ancrage Historique Vivant

\

Du Nil d'Euclide aux logarithmes de Napier : chaque théorème résout une énigme humaine.

2. L'Intelligence Visuelle

\

Comprendre par la couleur et la forme : le regard saisit la logique avant même le calcul formel.

3. Automatisation Opératoire

\

L'algorithme du calcul posé : libérer la mémoire de travail pour les raisonnements nobles.

4. Élucidation des Cas Limites

\

De la division par zéro aux infinis actuels : la rigueur sans aucun angle mort.

Public visé : Élèves du CP à la Terminale • Candidats aux examens et concours • Parents en IEF • Professeurs & Curieux d'autoformation.

« Tout est nombre, et le nombre est le guide de l'âme. » — Philolaos de Crotone

Édition de Référence • Licence Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Diffusion & partage libres)