Hôpital Paris Saint-Joseph

PANSE BÊTE SAU



SERVICE DES URGENCES

ANNEE 2025

REDACTION : L. CAUSSE - IPA - SERVICE DES URGENCES / G. SILVETTI - IDE REFERENT - SERVICE DES URGENCES

SOMMAIRE

POUR TOUTES LES PLAIES	3	POSE DE BANDES	13
LAVAGE DES PLAIES	4	BRULURE	14
PLAIE HEMORRAGIQUE	5	1er DEGRE	15
PLAIE BOURGEONNANTE	7	2ème DEGRE SUPERFICIEL	16
PLAIE INFECTEE	9	2ème DEGRE PROFOND	17
PLAIE NECROSANTE	11	3ème DEGRE	19



POUR TOUTES LES PLAIES

- Port de gants et de lunettes de protection
- Photo de la plaie (à joindre au dossier DxCare du patient) si besoin
- Lavage eau courante et savon, rinçage eau courante puis séchage.
- Ecouvillon Eswab® post lavage sur plaie infectée
- Rappel : la pose de bandes de compression veineuse type Rosidal® sont sur prescription d'un médecin vasculaire







LAVAGE D'UNE PLAIE

1




Nettoyer la plaie à l'eau courante

2



Savonner avec un savon doux (pH neutre)

3



Sécher « en tamponnant »

4



Ecouvillonner la plaie si besoin

HEMORRAGIQUE

PLAIE HEMORRAGIQUE

LA PLAIE



J'AI BESOIN







JE FAIS

1. ALGOSTERIL *(ne pas humidifier)*
2. PSMT AMERICAIN
3. BANDE
4. TENSOPLAST (EN X)



BOURGEONNANTE

PLAIE BOURGEONNANTE

LA PLAIE



J'AI BESOIN

1



2



3



JE FAIS

1. JELONET
   (ne pas poser sur peau saine)
2. COMPRESSES SECHES
   (non stériles)
3. BANDE

INFECTEE

PLAIE INFECTEE

LA PLAIE



J'AI BESOIN



JE FAIS

1. ECOUVILLON
   (obligatoire pour les plaies infectées)
2. BIATAIN
   (ne pas humidifier)
3. PSMT AMERICAIN
   (si exsudat important)
4. BANDE

Une plaie infectée est une plaie purulente, exsudat important

NECROSANTE

PLAIE NECROSANTE

LA PLAIE



J'AI BESOIN

1



2




3



JE FAIS

1. TAMPONNER BETADINE DERMIQUE
2. BIATAIN
3. COMPRESSES SECHES ET BANDE

POSE DE BANDE



BRÛLURES

1er DEGRE

LA PLAIE



=

Érythème ; Douleur ; Phlyctène (+/-)

J'AI BESOIN



Ou toute autre crème hydratante puis bépenthen au long court

JE FAIS

Règle des 3 - 15

Rincer avec eau tempérée à 15°C

Distance d'environ 15cm

Minimum 15 min

2ème DEGRE SUPERFICIEL
AVEC SURFACE CORPORELLE BRULÉE < 10%

LA PLAIE



=

Érythème ; Douleur intense ;
Phlyctène à fond rose et uniforme

J'AI BESOIN



JE FAIS

1. Règle des 3-15
2. Chlorhexidine aqueuse 0,5%
3. Excision des phlyctènes
   (avec compresse imbibée de NaCl + Pince)
4. Séchage délicat
5. Peu étendu et propre : **Vaseline** + **Jelonet**
   Contaminée : **Flammazine** + **Jelonet**
   Exsudat important : **Alginate**
6. Compresse stérile
7. Bande *(ne pas compresser !)*

2ème DEGRE INTERMEDIARE/PROFOND

LA PLAIE



=

Érythème ; Douleur faible ;
Phlyctène à fond inhomogène ; Chute des phanères

J'AI BESOIN



JE FAIS

1. Règle des 3-15
2. Chlorhexidine aqueuse 0,5%
3. Excision des phlyctènes
   (avec compresse imbibée de NaCl + Pince)
4. Séchage délicat
5. Peu étendu et propre : **Vaseline** + **Jelonet**
   Contaminée : **Flammazine** + **Jelonet**
   Exsudat important : **Alginate**
6. Compresse stérile
7. Bande *(ne pas compresser !)*

BRULURE A RISQUE

LA PLAIE



=

Surface corporelle brulés :
2ème & 3ème degré > 10%
3ème degré > 3%
Circonférentiel ; OGE ; Face ; Mains ; Pieds ; Périnée

J'AI BESOIN



JE FAIS

1. Avis Centre de Traitement des Brûlés
2. Emballer dans un champ stérile
3. **Si signe de choc :**
   NE PAS REFROIDIR
   =
   Couverture chauffante

   Si pas de signe de choc :
   Refroidir la zone

3ème DEGRE

LA PLAIE



Douleur +/- ; Pas de phlyctène ;
Carbonisation ; Peau cartonnée

J'AI BESOIN



JE FAIS

1

Si pas de signe de choc :
Refroidir la zone

Si signe de choc :
NE PAS REFROIDIR
=
Couverture chauffante

2

Si SCB* < 3%

Si SCB* > 3%

Avis CTB

Idem que 2ème degré

Emballer dans un champ stérile