

## CAPÍTULO 3. NÚMEROS RACIONAIS

## SUMÁRIO

1. O conjunto de números racionais	1
2. Corpos	3

## 1. O CONJUNTO DE NÚMEROS RACIONAIS

Números racionais são intuitivamente quocientes de números inteiros  $\frac{m}{n}$ , onde  $m, n \in \mathbb{Z}$  e  $n \neq 0$ .

Observe que Os quocientes  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{4}{6}$ ,  $\frac{-6}{-9}$  etc representam o mesmo número racional.

Vamos formalizar este conceito.

Primeiro, dado um conjunto  $X$  e uma relação de equivalência  $\sim$  em  $X$ , se  $x \in X$  denotamos por

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}$$

o conjunto de todos os elementos de  $X$  equivalentes a  $x$ , ou seja, a classe de equivalência de  $x$ .

Observe que todo elemento de  $X$  pertence à sua própria classe de equivalência:

$$x \sim x, \text{ então } x \in [x]$$

Além disso, se  $x \sim y$  então  $y \sim x$  e  $[x] = [y]$ .

Denotamos por  $X/\sim$  o conjunto de todas as classes de equivalência (o conjunto quociente), ou seja,

$$X/\sim := \{[x] : x \in X\}.$$

No produto cartesiano

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\},$$

definimos a relação

$$(m, n) \sim (m', n') \text{ se } m \cdot n' = n \cdot m'$$

Por exemplo:

$$(2, 3) \sim (4, 6) \text{ porque } 2 \times 6 = 3 \times 4$$

$$(4, 6) \sim (-6, -9) \text{ porque } 4 \times (-9) = 6 \times (-6).$$

Acontece que  $\sim$  é uma relação de equivalência em  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ .

Denotamos o conjunto de classes de equivalência

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim \text{ por } \mathbb{Q},$$

e o chamamos do conjunto dos números racionais.

Denotamos a classe de equivalência  $[(m, n)] \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  por  $\frac{m}{n}$ .

Assim, um número racional é uma relação de equivalência de pares de números inteiros  $(m, n)$  que são proporcionais.

**Exemplo 1.1.**  $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$  porque  $2 \times 6 = 3 \times 4$ .

Similarmente,  $\frac{4}{6} = \frac{-6}{-9}$  porque  $4 \times (-9) = 6 \times (-6)$ .

Definimos as operações algébricas entre números racionais como seguinte.

■ **Adição.**

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{m \cdot q + n \cdot p}{n \cdot q}.$$

A adição é bem definida, no sentido que se  $(m, n) \sim (m', n')$  e  $(p, q) \sim (p', q')$  então

$$(m \cdot q + n \cdot p, n \cdot q) \sim (m' \cdot q' + n' \cdot p', n' \cdot q').$$

■ **Multiplicação.**

$$\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} = \frac{m \cdot p}{n \cdot q}.$$

A multiplicação é bem definida, no sentido que se  $(m, n) \sim (m', n')$  e  $(p, q) \sim (p', q')$  então

$$(m \cdot p, n \cdot q) \sim (m' \cdot p', n' \cdot q').$$

De fato,

$$(m, n) \sim (m', n') \Rightarrow m \cdot n' = n \cdot m'$$

$$(p, q) \sim (p', q') \Rightarrow p \cdot q' = q \cdot p'$$

Multiplicando as duas identidades acima, tem-se

$$(m \cdot n') \cdot (p \cdot q') = (n \cdot m') \cdot (q \cdot p')$$

Usando as propriedades básicas das operações com números inteiros, concluímos que

$$(m \cdot p) \cdot (n' \cdot q') = (n \cdot q) \cdot (m' \cdot p'),$$

mostrando que  $(m \cdot p, n \cdot q) \sim (m' \cdot p', n' \cdot q')$ .

A adição e multiplicação de números racionais satisfazem as propriedades conhecidas (comutatividade, associatividade, elemento neutro e inverso, distributividade), então  $\mathbb{Q}$  é um *corpo*.

Além disso, definimos

$$\frac{m}{n} \geq 0 \text{ se } m \cdot n \geq 0,$$

e

$$\frac{m}{n} \leq \frac{p}{q} \text{ se } \frac{p}{q} - \frac{m}{n} \geq 0.$$

Então “ $\leq$ ” é uma relação de ordem total em  $\mathbb{Q}$  compatível com as operações algébricas, tornando  $\mathbb{Q}$  um *corpo ordenado*.

**Lema 1.2.**  $\mathbb{Q}$  é um conjunto enumerável infinito.

*Demonstração.* Como  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Z}^*$  são enumeráveis, o produto cartesiano  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  também é enumerável.

Dado um número racional  $r$ , seja  $\frac{m}{n}$  sua representação como quociente tal que  $n > 0$  e  $m, n$  não têm nenhum divisor em comum.

Por exemplo, para o número  $-\frac{9}{6}$  escolhemos a representação  $-\frac{3}{2}$ .

A função  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  dada por  $f(r) = (m, n)$ , onde  $\frac{m}{n}$  é a representação de  $r$  descrita acima, é claramente injetiva.

Como  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$  é enumerável, por um teorema anterior,  $\mathbb{Q}$  também é.  $\square$

## 2. CORPOS

Um conjunto não vazio  $K$ , munido de duas operações binárias  $+$  e  $\cdot$ , chamadas de adição e multiplicação, é um corpo se as seguintes propriedades (ou axiomas) são satisfeitas:

Axiomas da adição:

1) Associatividade: para todo  $x, y, z \in K$ ,

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

2) Comutatividade: para todo  $x, y \in K$ ,

$$x + y = y + x$$

3) Elemento neutro: existe um elemento  $0 \in K$  tal que

$$x + 0 = x \quad \text{para todo } x \in K$$

4) Elemento inverso (ou simétrico): para todo  $x \in K$  existe um elemento  $-x \in K$  tal que

$$x + (-x) = 0$$

Axiomas da multiplicação:

5) Associatividade: para todo  $x, y, z \in K$ ,

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

6) Comutatividade: para todo  $x, y \in K$ ,

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

7) Elemento neutro: existe um elemento  $1 \in K$  tal que

$$x \cdot 1 = x \quad \text{para todo } x \in K.$$

8) Inverso multiplicativo: para todo  $x \in K$  existe um elemento  $x^{-1} \in K$  tal que

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

9) Axioma da distributividade: para todo  $x, y, z \in K$ ,

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

**Observação.** Os elementos neutros para adição e multiplicação são únicos.

De fato, se  $x + 0 = x$  e  $x + 0' = x$  para todo  $x \in K$ , então

$$0' + 0 = 0'$$

e

$$0 + 0' = 0$$

Mas  $0' + 0 = 0 + 0'$ , logo  $0' = 0$ .

Similarmente para multiplicação.

**Observação.**  $x \cdot 0 = 0$  para todo  $x \in K$ .

De fato,  $0 + 0 = 0$ , então para todo  $x \in K$ ,

$$x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0$$

logo

$$x \cdot 0 + x \cdot 0 = x \cdot 0$$

Somando  $-x \cdot 0$  nos dois lados,

$$(-x \cdot 0 + x \cdot 0) + x \cdot 0 = -x \cdot 0 + x \cdot 0$$

$$\Rightarrow 0 + x \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow x \cdot 0 = 0$$

**Observação.** O inverso aditivo e multiplicativo são únicos.

De fato, se  $x + y = 0$  e  $x + z = 0$ , então

$$z + (x + y) = z + 0$$

$$\Rightarrow (z + x) + y = z$$

$$\Rightarrow (x + z) + y = z$$

$$\Rightarrow 0 + y = z$$

$$\Rightarrow y = z.$$

Similarmente para produto.

**Observação.** Se  $x \cdot y = 0$  então  $x = 0$  ou  $y = 0$ .

De fato, se  $x \neq 0$ , então  $x$  tem um inverso multiplicativo  $x^{-1}$ . Logo

$$x \cdot y = 0 \Rightarrow x^{-1} \cdot (x \cdot y) = x^{-1} \cdot 0$$

$$\Rightarrow (x^{-1} \cdot x) \cdot y = 0$$

$$\Rightarrow 1 \cdot y = 0$$

$$\Rightarrow y = 0$$