

사상체질의학 1주차

수업 ppt 내용 검은글씨 / 교수님 설명 회색글씨

01 병증론 개론

소양인, 소음인 전에 병증론 개론 먼저

사상체질의학의 병증

- 水穀之氣(수곡지기), 氣液之氣(기액지기)의 순환과 대사에 기인
- 수곡지기의 대사 : 脾와 腎의 納과 出 기능에 의해 이루어짐
- 기액지기의 대사 : 肺와 肝의 呼와 吸에 의해 이루어짐
脾와 腎 - 水穀을 담당 / 肺와 肝 - 氣液을 담당
- 소음인과 소양인의 병증 : 脾와 腎의 기능편차에 의하여
→ 水穀之氣(수곡지기) 대사의 升降不利(승강불리)에 기인
- 태음인과 태양인의 병증 : 肺와 肝의 기능편차에 의하여
→ 氣液之氣(기액지기) 대사의 緩束不利(완속불리)에 기인
전면부 : 리증 / 후면부 : 표증
- 升降緩束(승강완속) : 保命之主(보명지주)의 유지와 변화
보명지주를 승강완속하는 것이 병의 치료 방향

사상체질의학의 치료조건

- 臟氣와 처방藥氣의 상태 비교
- 臟氣 : 과거의 素證에 바탕한 臟腑의 면역력 상태,
즉 현재 臟腑의 升降緩束의 能不상태 폐(국) 비(국) 간(국) 신(국)
- 藥氣 : 처방구성에 의하여 발현되는 藥力(升降緩束之力)
- 치료 조건
藥氣가 제대로 발휘되기 위한 臟氣의 조건(자신의 면역력상태 즉, 保命之主 상태를 의미하며, 동시에 現證에 대하여 藥力이 적당한가 또는 과, 부족한가를 의미
素證(소증)과 現證(현증)의 상태를 감안하여 결정

cf. 소증: 태어날 때부터 갖고 있는 증상 → 치료할지 말지 애매한 상태. 병의 전 단계
- 보하고 사하는 것이 별로 없음 → 승강완속을 도와주는 방식으로 처방이 쓰임
- 사상체질에서는 소증과 현증을 같이 파악해서 치료방법을 세움
(교수님은 현증보다는 소증에 더 집중해서 치료한다고 하심)

사상체질의학의 치료 ★

체질	보명지주	치료방법	주요약물	주요처방
소음인	양난지기	승양익기 리음강기	인삼, 부자	팔물군자탕 보중익기탕 백하오이중탕 관계부자이중탕
소양인	음청지기	표음강기 리양승기	지황, 석고	형방패독산 형방지황탕 양격산화탕 독활지황탕
태음인	호산지기	폐양승기 청간조열	맥문동, 갈근	마황발표탕 태음조위탕 갈근해기탕 열다한소탕
태양인	흡취지기	계심애, 원진노 원진노, 단후미	오가피, 미후등	오가피장척탕 미후등식장탕


- 각 체질인들이 생활할 수 있는 생명력 : 보명지주
- 사상체질의 음/양은 방향성을 의미함 → 음(하강) / 양(상승)

**** 각 체질별 치료방법이나 보명지주는 꼭 알아두라고 하심**

소음인	소음인은 신대비소하니 항상 차가움 → 따뜻한 양난지기가 보명지주가 됨 → 따뜻한 약(인삼, 부자) 用 * 승양익기 : 뒷부분의 따뜻해질 올려줌 / 리음강기 : 앞부분의 양난지기를 내려줌
소양인	소양인은 비대신소하니 열이 많음 → 차가운 음청지기가 보명지주가 됨 → 차가운 약인 지황, 석고를 씌 * 표음강기 : 뒷부분의 차가운걸 내려줌 / 리양승기 : 앞부분의 음청지기를 올려줌
태음인	태음인은 중심으로 계속 에너지나 영양분을 모으고 저장하려고 함 → 외부로 배출하는 호산지기가 보명지주가 됨 + 소음, 소양인은 한열이 있지만 태음, 태양인은 한열이 없음 → 그러나 태음인은 계속 저장하려는 성질이 있기 때문에 고이면서 열(간열병)이 생김 → 이걸 꺼주려면 차가운 약을 쓰면 안되고, 창문을 열어 환기(순환)시켜주는 약(ex. 맥문동, 갈근)을 써야함
태양인	태양인은 항상 과하게 에너지를 돌리기 때문에 저장하지 못하고 계속 배출함 → 흡취지기가 보명지주가 됨 + 태양인은 애(衰)노(怒)에 대해 생각을 많이 해서 병이 생긴다고 보았으니 이걸 줄이는게 치법 + 태양인은 갑자기 무릎에 힘이 풀리고 주저앉는 병이 생김 → 본인이 가진 에너지, 영양소를 다 배출했기 때문

사상체질의학의 병인병기


- 성정, 외부의 자극 → 사장의 변화 → 승강완속의 변화 → 보명지주 변화 → 기능장애 → 체질병증




- 애노희락이라는 성정, 스트레스에 의해서도 병이 생김 → 보명지주를 조절해서 치료함

사상체질의학의 진료알고리즘 & 치료과정





- 소증과 현증은 체질진단과 체질병증진단에 둘 다 활용됨



- 순증 : 보명지주가 손상 안됨 / 역증 : 보명지주가 손상됨
- Ex) 물을 공급하는 파이프에 빗대어 설명하심
- 파이프 압력은 똑같은데 관이 막힘 → 순증
- 파이프 압력 자체가 떨어져 물 공급 자체가 원활 x → 역증



치료 평가와 예후 판단

- 太陽人 小便旺多(소변왕다)則完實而無病
- 太陰人 汗液通暢(한액통창)則完實而無病
- 少陽人 大便善通(대변선통)則完實而無病
- 少陰人 飲食善化(음식선화)則完實而無病

- 치료 병증의 개선
- 체질별 건강지표 개선

- 완실무병 : 보명지주가 살아있는지 판단
 - 태양인 : 소변 / 태음인 : 땀 / 소양인 : 대변 / 소음인 : 음식
 → 각 체질별로 이것들이 잘 되면 약을 더 쓸 필요가 없겠구나

통합적 진료 과정



한의학에 대한 기준점을 제시

- 세 가지 변증을 다 써서 정확도를 높이도록 해야 함

사상체질병증 구분도표 ★

		소음인	소양인	태음인	태양인
表病	順逆	鬱狂證 울광증	少陽傷風證 소양상풍증	背飢表病證(胃脘寒病) 배추표병증(위완한병)	解飢證 해역증
		亡陽證 망양증	亡陰證 망음증	胃脘寒證(胃脘寒肺燥病) 위완한증(위완한폐조병)	解飢兼噎膈 해역겸열격
裡病	順逆	太陰證 태음증	胸膈熱證 흉격열증	燥熱證(肝熱病) 조열증(간열병)	噎膈證 열격증
		少陰證 소음증	陰虛午熱證 음허오열증	陰血耗竭證(肝熱肺燥病) 음혈모갈증(간열폐조병)	噎膈兼解飢 열격겸해역

** 꼭 알아두기! 시험에 1문제정도 낼 수 있다고 하심

- 각 체질별 병증의 자세한 내용은 뒤에 또 나옴
- 태음인 병증명은 괄호랑 괄호 없는 것 둘 다 알아두어야 함
- 여기서 음양(망양증, 망음증)은 보명지주를 의미함
- 음허오열증 : 아예 열도 없고 음도 없어진 위험한 상태
- 해역(다리가 무기력)이 심해지다보면 열격(삼키지 못함)이 생김 → 반대도 마찬가지

사상체질병증 구분 및 처방 ★

소음인		
腎受熱表熱病 신수열표열병	升陽益氣 승양익기	
	鬱狂證 울광증 (發熱 惡寒 無汗) 천궁계지탕 / 궁귀향소산 십전대보탕 / 파두+팔물군자탕 (下焦蓄血 胃家實) 독삼팔물군자탕	亡陽證 망양증 (發熱 惡寒 有汗) 황기계지탕 보중익기탕 (脾弱) 승양익기탕 황기계지부자탕 인삼계지부자탕 승양익기부자탕 인삼관계부자탕 인삼오수유탕 (太陽病厥陰)
胃受寒裡寒病 위수한리한병	裡陰降氣 리음강기	
	太陰證 태음증 (口中和 不渴 無身體痛) 백하오이중탕 / 백하오부자이중탕 곽향정기산 / 향사양위탕 적백하오관중탕 / 인진굴피탕 십이미관중탕 / 인삼진피탕 파두여의단	少陰證 소음증 (口中不和 口渴 身體痛) 관계부자이중탕 오수유부자이중탕 독삼부자이중탕

- 표증 : 양난지기를 위로 올려주는 치료법 사용
- 리증 : 양난지기를 아래로 내려주는 치료법 사용

- 울광증 : 초기 감기라고 생각. 땀이 없는게 특징적
- 파두+팔물군자탕 : 파두로 소음인의 막힌걸 뚫어주고, 그 다음에 팔물군자탕으로 보해줌
- 망양증 : 울광증과 유사, but 땀이 남 → 양난지기가 땀으로 도망
- 태양병궤음 : 표병에서 시작해서 한증도 같이 나타남

- 태음증 : 입은 괘찮음 / 소음증 : 입이 텅텅함
- 소음증 : 리증이면서 역증 → 굉장히 위험한 상태 → 관계, 부자로 강하게 한기를 제거

소양인		
脾受寒表寒病 비수한표한병	表陰降氣 표음강기	
	少陽傷風證소양상풍증 (口苦咽乾 目眩 耳聾 結胸 寒熱往來) 형방패독산 / 형방사백산 형방도적산 / 감수+형방도적산 감수천일환	亡陰證 망음증 활석고삼탕 형방지황탕 (身寒 腹痛 泄瀉) 저령차전자탕 형방사백산 (身熱 頭痛 泄瀉)
胃受熱裡熱病 위수열리열병	裡陽升氣 리양승기	
	胸膈熱證 흉격열증 양격산화탕 (上消) 인동등지골피탕 (中消) 지황백호탕 양독백호탕 (三陽合病 裡熱便閉)	陰虛午熱證 음허오열증 숙지황고삼탕 (下消) 독활지황탕 십이미지황탕 (表裡陰陽俱虛 中風 嘔吐 吐血)

- 표증 : 음청지기를 아래로 내려주는 치료법 사용
- 리증 : 음청지기를 위로 올려주는 치료법 사용
- 소양상풍증 中 결흉 : 초기 감기에서 더 진행된 상태
- 감수 : 소양인의 뚫어주는 약

망음증 中

- 활석고삼탕, 형방지황탕 → 신한, 복통
- 저령차전자탕, 형방사백산 → 신열, 두통
- 형방사백산 : 열을 소변으로 배출 + 설사를 소변으로 배출해줌
- 활석고삼탕 : 소양인의 복통 처방. 설사보단 복통에 초점

- 상소, 중소 : 당뇨라고 생각하면 됨
- 지황백호탕 : 열이 굉장히 심한 경우에 불을 끄는 약
- 음허오열증 : 다 태운 상태
- 하소 : 당뇨말기 → 숙지황고삼탕
- 십이미지황탕 : 약재가 12개나 들어감 → 병이 마지막까지 가서 죽기 직전인 상태라 소양인에게 필요한 약재를 다 때려넣음

태음인		
胃脘受寒表寒病 위완수한표한병	肺陽升氣 폐양승기	
	背頰表病證 배추표병증 마항발표탕(背佳眞表病) 마항정천탕(哮喘) 웅담산 한다열소탕(寒厥) 조이폐원탕(病解後)	胃脘寒證 위완한증 태음조위탕 조위승청탕 보폐원탕 녹용대보탕
肝受熱裡熱病 간수열리열병	淸肝燥熱 청간조열	
	燥熱證 조열증 갈근해기탕 (陽明經病 陽毒發斑) 갈근승기탕 조각대항탕	陰血耗竭證 음혈모갈증 열다한소탕 청폐사간탕 청심연자탕 녹용대보탕 (陰血耗竭表證多) 공진흑원단 (陰血耗竭裡證多)

- 태음인은 바다 : 바닷물이 흐르도록 해야하는데 막히면 병 생김
- 폐양승기 : 폐를 온적인 적정온도로 맞추는 치료법
- 조열증 : 간이 작용을 너무 많이해서 열이 생김
- 공진흑원단 : 태음인의 창고 자체가 무너지는 경우에 사용

태양인		
外感腰脊病 외감요척병	戒深哀 遠嗔怒계심애 원진노	
	解俵證해역증 오가피장척탕	解俵兼噎膈해역겸열격 오가피장척탕
內觸小腸病 내촉소장병	遠嗔怒斷厚味 원진노단후미	
	噎膈證열격증 미후등식장탕	噎膈兼解俵열격겸해역 미후등식장탕

- 태양인은 애(哀)노(怒)를 조심하는 것이 치료법

사상인 병증별 증후 비교표 ★

** 여기에 나온 증상들은 색깔 위주로 잘 봐두기

1) 소음인

	表裡	病證	寒熱	汗	大便	小便	脈	飲食 渴	諸症狀
少陰人	腎受熱 表熱病 身熱 煩惱 (心煩)	鬱狂(初)	惡寒發熱	無汗			浮		四時瘟疫頭痛
		鬱狂(中)	惡熱	無汗	便秘	自利	微而沈	口燥嘔	如狂小腹硬滿
		鬱狂(末)	惡熱潮熱	無汗 澀然微汗出	便秘		弦澀		狂言微喘直視
		亡陽(初)	惡寒發熱	自汗					素裡煩汗多者
		亡陽(中)	惡熱	自汗	便秘	清利			脾弱
		亡陽(末)	(惡寒)發熱	汗多	便秘	赤澀			
		太陽厥陰	手足厥冷				微欲絕		小腹煩滿囊縮

- 표증 : 신열, 번뇌

- 울광과 망양의 대표적인 차이 : 땀

→ but 울광 말기에 땀이 조금 나긴함 → 구분이 애매할때는 보명지주의 소증을 봐야 함
→ 평상시에 땀을 약간 흘렸다고 하면 망양, 아예 땀을 안흘렸다고 하면 울광 말기

- 땀이 조금씩 나는 사람 → 원래 보명지주를 조금씩 흘리는 사람

→ 병이 걸려서 못먹으면 보명지주가 샌걸 채워주지 못하므로 역증(망양)으로 가기 쉬움

- 초-중-말의 구분 : 오한이 있냐 없냐

- 망양 말증은 땀을 많이 흘림

- 태양병결음은 손발이 차가워짐

	表裡	病證	寒熱	汗	大便	小便	脈	飲食 渴	諸症狀
少陰人	胃受寒裡寒病 身寒 腹滿 自利	太陰證			下痢清穀	不快		口中和 無口渴	無身體痛
		(痞滿)		汗後	下痢後				心下痞硬胃弱
		(浮腫)			泄瀉			渴後	浮腫
		(黃疸)		頭汗出		不利	微弱		發黃
		少陰證	手足寒		自利青水		微細	口中不和 口渴	但欲寐身體痛
		(藏厥)	手足厥冷		惑泄瀉		微	吐利	心煩欲寐
		(陰盛格陽)	身冷		自利黑水		沈細利疾	不飲水	躁面青黑

- 리증 : 신한, 복만, 자리
- 태음증에서 비만-황달-부종 순으로 병이 심해짐
- 비만 : 소화가 안되기 시작 → 한이 위까지 침범
- 황달 : 체해서 누렇게 뜨는걸 말함 → 체할정도로 소화가 안된다
- 부종 : 그게 더 심해지면 붓게 됨
- 청곡-청수-흑수 순으로 대변 양상이 나타남

2) 소양인

	表裡	病證	寒熱	汗	大便	小便	脈	飲食 渴	諸症狀
少陽人	脾受寒表寒病 身寒 身體痛	少陽傷風證	惡寒發熱	無汗澀			浮緊	口苦咽乾	煩躁
		亡陰	畏寒	手足掌心	泄瀉				素表寒下多者
		(熱多寒少)	身熱		泄瀉			引飲	頭痛
		(寒多熱少)	身寒		泄瀉後秘		弦細		腹痛
	胃受熱裡熱病 身熱 胸煩 悶燥 大便燥	胸膈熱證	熱多寒少	發汗	便秘	數而少			
		(上中消)	熱氣上騰	發汗		數而少		渴	胸中煩躁
		(裡熱便閉)	惡寒發熱	自汗	便閉	不利	微弱浮		如瘧
		陰虛午熱	背寒	微汗		如膏油		飲水	嘔頭面眩

- 표증 : 신한, 신체통 → 초기 감기라고 생각하면 됨
- 망음증 : 가장 큰 특징은 설사
- 소음인의 보명지주는 땀으로 도망 / 소양인은 설사로 도망
- 한다열소, 열다한소 구분 : 신한 신열 / 복통 두통

- 리증 : 변비, 변폐가 생김
- 소양인이 변비가 있다 → 병이 굉장히 심한 상태
- 당뇨(소갈) : 양격산화탕, 인동등, 숙지황이 잘 들음
- 갈증, 소변 → 당뇨 증상들
- 음허오열증 : 등이 차가워짐

→ 열이 많은데도 태울게 다 태워지면서 불도 없어지고 재료도 없어지면서 추위를 느낌

- 소변에 기름이 땀 → 당뇨 하소증

3) 태음인

	表裡	病證	寒熱	汗	大便	小便	脈	飲食 渴	諸症狀
太陰人	胃脘受寒 表寒病 身寒無汗	背頰表病證	寒多熱少	無汗	滑感燥				頭痛骨節皆痛
		胃脘寒證		無汗	泄瀉	惑多			素怔忡氣短 (결해, 효천)
	肝受熱 裡熱病 身熱有汗	燥熱證	熱多寒少	潮汗	便秘惑泄	澁		渴	咽嗑乾燥消渴
		陰血耗竭證							虛弱者

- 폐국이 기능을 잘 못하기 때문에 피부에서 땀을 배출하는 기능이 약해짐

→ 무한이 나타남 → 치료법은 열어주고 땀 내주기

- 역증은 보명지주에 타격을 주는 항심들을 많이 가지고 있는 사람들에게서 잘 나타남

→ 배추표병인 사람은 정충이 별로 없음 + 위완한증인 사람은 정충이 나타남

- 리증 : 신열, 유한 → 계속 저장하니까 열이 커지면서 변비, 갈증

4) 태양인

	表裡	病證	寒熱	汗	大便	小便	脈	飲食 渴	諸症狀
太陽人	外感 腰脊病 小便不多不數	解仰證	不寒不熱				尺脈緩澁		無身體疼痛
	內觸 小腸病 大便澁	噎膈證			如羊屎			水飲可行	食物難入

- 해역증 : 하지무력증 → 한열과 관계없이 다리만 무력해짐

- 열격증 : 언하장애 → 별다른 증상 없이 잘 삼키지 못함

체질별 병증에 대한 오해

1. 태음인한테 나는 땀은 무조건 좋다?

- 체질을 막론하고 땀이 나는 양상이 중요하며 汗多證은 태음인에게도 병증임.
- 태음인은 肺小하여 呼散之氣가 보명지주
- 예후에 있어서 폐의 위치인 가슴에서 汗液通暢이 되는지가 중요한 포인트
- 무조건 땀이 많이 난다고 좋은 것 아님
- 太陰人 理熱證으로 汗多證이 있을 수 있음
- 太陰人 理熱證 亦有汗多而 小便赤澁者 宜察之 不可誤藥

2. 평소 손발이 차고 설사를 잘 하면 소음인이 많다?

- 소양인 亡陰證이 있음
- 少陽人 雖則熱勝 然 陽盛格陰 敗陰內遁則 畏寒而泄下也 此之謂 亡陰病也
- 陽盛格陰於下則 陰爲陽壅 不能下降於膀胱 上逆背脊而 內遁膈裡故 腸胃畏寒而泄下也
- 畏寒而泄下者 非陰盛也
- 此所謂內炭外冰 陰將亡之兆也

- 망음증 : 열 때문에 음이 도망가서 손발이 차고 설사함

- 망음증 소양인은 소음인 같음 + 율광증 소음인은 소양인 같음

→ 구분 주의

3. 소음인은 소화가 안되어 설사를 하는 것이 문제지 변비는 큰 문제가 아니다?

- 소음인은 脾小하여 陽暖之氣가 보명지주
- 예후에 있어서 소화 상태, 복통이나 설사 등이 중요한 포인트가 됨
- 腎受熱表熱病的 鬱狂證의 상태가 되면 변비가 될 수 있으니 대수롭지 않게 봐서는 안됨
- 陽明病 胃家實 不更衣者 鬱狂之中證也

02 소음인 병증론 개론

처방이 안 듣는다 했을 때 그 체질인의 경증험위, 표리, 순역을 먼저 다시 확인해보고 그 다음에 다른 체질인으로 넘어가야 함

소음인의 심욕

- 2-2 人趨心慾 棄義而偷逸者 名曰 懦人

소음인의 낙성, 희정

- 2-10 少陰人 樂性深確而 喜情促急
- 3-7 少陰之性氣 恒欲處而不欲出.
- 3-9 少陰之情氣 恒欲爲雌而 不欲爲雄

- 성 : 남을 관찰할 때 나타남 / 정 : 내가 직접 관계있는 것

천기와 인사

- 3-11 少陰人 雖至愚 其性 坦坦然猶撫循也 雖至不肖 人之能否 亦知之也.
- 3-13 少陰人 謹於黨與故 恒有黨與親熟人 擇交之喜心 此心出於秉彝之敬心也 莫非至善而 輕於交遇 故 每爲生疎交遇人 所誣而 偏喜傷臟 以其慮患之心 不周故也.
- 3-16 少陰之臆 宜戒矜心 少陰之臆 若無矜心 絕世之經綸 必在於此也.
- 3-17 少陰之頭 宜戒奪心 少陰之頭 若無奪心 大人之識見 必在於此也.

소음인 성질재간

- 17-3 少陰人性質 長於端重而 材幹能於黨與.

소음인 항심

- 17-13 少陰人 恒有不安定之心 不安定之心寧靜則 脾氣卽活也

소음인 체형기상

- 17-2 少陰人 體形氣像 膀胱之坐勢 盛壯而 胸襟之包勢 孤弱

- 방광 : 둔부를 의미 → 둔부 부위가 발달. 가슴 부위는 작음

신대비소자가 소음인이다

- 人稟臟理에 有四不同이니
- 肺大而肝小者 名曰太陽人이오
- 肝大而肺小者 名曰太陰人이오
- 脾大而腎小者 名曰少陽人이오
- 腎大而脾小者 名曰少陰人이라 (사단론 2-1)

- 소음인이 신대비소한게 아니라 신대비소인 사람을 소음인이라고 분류한 것임

신대? 비소?

- 肺大 呼散之氣太過也 肝小 吸聚之氣不足也
- 肝大 吸聚之氣太過也 肺小 呼散之氣不足也
- 脾大 納積之氣太過也 腎小 出放之氣不足也
- 腎大 出放之氣太過也 脾小 納積之氣不足也
- 출방지기가 태과하고 납적지기가 부족한 것이다.

- 출방지기 : 내보내는 기 = 신대 / 납적지기 : 쌓아지는 기 = 비소

수곡의 온열량한기

- 水穀之都數 停畜於胃而 薰蒸爲熱氣 消導於小腸而 平淡爲涼氣
- 熱氣之輕清者 上升於胃脘而爲溫氣 涼氣之質重者 下降於大腸而爲寒氣 (4-2 장부론, 교 645p)
- 수곡은 위에서 정축되면 훈증하여 열기가 되고, 소장에서 소도되어 평담한 량기가 된다.
- 열기 중 경정한 것은 위완으로 상승하여 온기가 되고, 량기 중 질중한 것은 대장으로 하강하여 한기가 된다.

- 비국(위)에서는 열기 / 간국(소장)에서는 량기

- 폐국(위완)에서는 온기 / 신국(대장)에서는 한기

수곡 熱氣 寒氣의 대사 및 비지당, 신지당 - 水穀熱氣의 순환

- 水穀熱氣 自胃而化膏 入于臆間兩乳爲膏海 / 膏海者 膏之所舍也
- 膏海之清氣 出于目而爲氣 入于背脊而爲膜海 / 膜海者 氣之所舍也
- 膜海之膜汁 清者 內歸于脾 濁滓 外歸于筋 故
- 胃與兩乳目背脊筋 皆脾之黨也. (4-5 장부론 교. 645p)
- 수곡의 열기는 위에서 고(膏)로 화하여 젖가슴 사이로 들어가 고해(膏海)가 되니 고해란 고가 모여 있는 곳이다.
- 고해의 청기는 눈으로 나와서 기가 되고 척추골로 들어가 막해(膜海)가 될 것이니 막해란 기가 모여 있는 곳이다.
- 막해의 막즙(膜汁)이 청한 것은 안으로脾로 돌아가고 탁재는 밖으로 근(筋)으로 돌아가는 까닭에 위·양유·배려·근은 모두 비의 무리들이다

- 비국이 작기 때문에 위, 양유, 눈, 배려, 근이 다 아플 수 있음

水穀寒氣의 순환

- 水穀寒氣 自大腸而化液 入于前陰毛際之內爲液海 / 液海者 液之所舍也
- 液海之清氣 出于口而爲精 入于膀胱而爲精海 / 精海者 精之所舍也
- 精海之精汁 清者 內歸于腎 濁滓 外歸于骨 故 大腸與前陰口膀胱骨 皆腎之黨也 (4-7, 장부론 교.646)
- 수곡의 한기는 대장에서 액(液)으로 화하여 전음부 모제(毛際) 안으로 들어가 액해(液海)가 되니 액해란 액이 모여 있는 곳이다.
- 액해의 청기는 입으로 나와서 정(精)이 되고 방광으로 들어가 정해(精海)가 되니 정해란 정이 모여 있는 곳이다.
- 정해의 정즙(精汁)이 청한 것은 안으로 신(腎)으로 돌아가고 탁재는 밖으로 골(骨)로 돌아가는 까닭에 대장·전음·입·방광·골은 다 신의 무리이다.

- 신국에 문제가 생기면 대장, 전음, 입, 방광, 골이 다 아플 수 있음

수곡기액의 대사

수곡지기 대사 (상하로 수곡 한열의 승강 조절) * 소화-배설기계

- 비 : 수곡을 받아들이는(납적) 기능 (열) - 식욕&소화
- 신 : 수곡을 내보내는(출방) 기능 (한) - 배변

기액지기 대사 (표리로 기액 호흡의 완속 조절) * 호흡-순환기계

- 폐 : 기액을 내뿜는(호산) 기능 (온) - 땀
- 간 : 기액을 모으는(흡취) 기능 (량) - 소변

소음인 신대비소 : 배변 기능 과항진 >> 식욕&소화 기능 저하

소양인 비대신소 : 식욕&소화 기능 과항진 >> 배변 기능 저하

태음인 간대폐소 : 소변, 배변(소장) 기능 과항진 >> 땀 기능 저하

태양인 폐대간소 : 땀 기능 과항진 >> 소변, 배변(소장) 기능 저하

肺以呼 肝以吸 肝肺者 呼吸氣液之門戶也

脾以納 腎以出 腎脾者 出納水穀之府庫也

- 위에서 작용을 하고 비에서 컨트롤, 지휘함
- 대장에서 작용을 하고 신에서 컨트롤, 지휘함
- 소음, 소양인은 수곡의 한열에 관련된 생리병리를 갖고 있음

陽熱之氣 陰寒之氣


- 水穀 納於胃而脾衛之 出於大腸而腎衛之 脾腎者 出納水穀之府庫而 迭爲補瀉者也 (15-8 태양인 내측소장병론, 교 722p)
- 少陽人 大腸出 '水穀陰寒之氣' 不足則 胃中納 '水穀陽熱之氣' 必盛也 (15-8 태양인 내측소장병론, 교 722p)
- 少陰人 胃中納 '水穀陽熱之氣(양열지기)' 不足則 大腸出 '水穀陰寒之氣(음한지기)' 必盛也 (15-8에 근거하여 유추함)
- cf) 소음인은 소양인과 반대로 少陰人 胃中納'水穀陽熱之氣'不足則 大腸出'水穀陰寒之氣' 必盛也 라고 유추한 것
- 수곡은 위에 들어가서 비의 보호를 받고 대장에 나가서는 신의 보호를 받으니 비 와 신이라는 것은 수곡이 나가고 들어오는 창고로서 교대로 보태고 빠지는 것이다.
- 소양인은 대장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒)한 기가 부족하기 때문에 위중(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 반드시 성하다.
- 소음인은 위중(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 부족하기 때문에 대 장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒) 기가 반드시 성하다.

- 소음인의 보명지주 = 양열지기(=양난지기)

保命之主 (생명을 유지시켜 주는 힘)

- 陽暖之氣 양난지기 (陽熱之氣 양열지기)
- 腎大 出放之氣太過也 脾小 納積之氣不足也
- 少陰人 以陽暖之氣 爲保命之主 故 腎胃爲本 而 膀胱大腸爲標也 (동무유고, 갑오구본)
- 소음인은 양난지기가 보명지주이다. 따라서 배려와 위가 본이고 방광 대장은 표다.
- 사상체질의학에서 보명지주는 사상인의 생리, 병리, 약물, 방제를 설명하는데 중요한 개념이다.
- 소음인은 신대비소하여 수곡의 한기가 많고, 수곡의 열기가 적은 몸을 천품으로 태어난다. 이러한 소음인에서는 생명력을 유지시켜주는 것이 바로 脾元을 근원으로 하는 陽暖之氣라는 保命之主이다.
- 陽暖之氣는 腎局에서 수곡의 한기가 더 커지지 않도록 제어하고,脾局에서 수곡의 열기를 채워주는 역할을 한다.
- 사상인 모두 保命之主를 중심으로 병증약리가 설명되어지므로 반드시 기억해야 할 개념이다.

소음인 보명지주(保命之主) 순환 작용



1. 脾에서 생성된 陽暖之氣는 1. 脾氣라고도 하며, 胃를 保衛하여 膏海를 옹호시키는 작용과 胃氣로 하여금 수곡을 熏蒸시켜 消化를 도와 수곡열기를 생성함
2. 胃에서 작용하는 陽暖之氣는 2. 胃氣라고도 하며, 胃를 도와 수곡의 受納을 도와주고 大腸으로 降陰하여 大腸局의 수곡한기가 과도해지지 않도록 조절함
3. 大腸에서 작용하는 陽暖大腸之氣는 3. 溫氣라고도 하며, 大腸을 도와 수곡의 出放을 도와주고, 口와 膀胱의 수곡한기가 과도해지지 않도록 조절함
4. 膀胱에서 작용하는 陽暖之氣는 4. 陽氣라고도 하며, 膀胱의 기능을 도와 骨, 足の 기능을 유지하고 背脊로 上升하여 外寒을 견딜 수 있도록 조절함
5. 背脊에서 작용하는 陽暖之氣는 5. 衛氣라고도 하며, 背脊에서 外寒을 막아주고 脾를 도와 陽暖之氣가 유지될 수 있도록 함

- 리병 : 대장으로 위기가 하강하지 못해 병이 됨

- 표병 : 배려로 상승하는 양기가 상승하지 못해 병이 됨

표리병 발생기전의 性氣와 情氣

性氣, 情氣의 개념

- 天稟으로서 臟局大小를 형성하는 性, 情의 개념과, 心慾으로서 표리병을 발생시키는 性氣, 情氣의 개념은 구분이 필요하다.
- 애노희락의 性氣는 存心養性을 통한 知에 해당하며 順動하는 속성을 가지고, 인체 의 前四海에 작용한다.
- **과도한 性氣**는 順動하여 前四海에 작용하고 後四海에 영향을 미쳐 **表病**을 일으킨다.
- 애노희락의 情氣는 修身立命을 통한 行에 해당되며 逆動하는 속성을 가지고, 인체의 後四海에 작용한다.
- **과도한 情氣**는 逆動하여 前四海에 작용하고 後四海에 영향을 미쳐 **裏病**을 일으킨다.

- 성기-순동-표병 / 정기-역동-리병

- 성기 : 이목비구에 작용. 큰 장기를 더 크게. 표병

- 정기 : 폐비간신에 작용. 작은 장기를 더 작게. 리병

性氣	情氣
知	行
腹裏에 작용	背表에 작용
順動, 큰 장기를 더욱 커지게 함	逆動, 작은 장기를 더욱 작게 함
表病(太過)	裏病(太過)

사상체질의학 2주차

*** 박스안-> 원문 / 설명: 교수님 설명

性情氣와 四臟氣의 관계->(원문 알아두라고 하셨음.)

- 哀氣 直升 怒氣 橫升 喜氣 放降 樂氣 陷降
- 肺氣 直而伸 脾氣 栗而包 肝氣 寬而緩 腎氣 溫而畜
- 哀怒之氣 上升 喜樂之氣 下降
- 上升之氣 過多 則下焦傷 下降之氣 過多 則上焦

(말의 그림 참고)애노희락 / 폐비간신의 순서를 생각하고

- 哀-> 直升 (곧게 올라감) , 怒-> 橫升(옆으로 올라감) . 喜-> 放降(퍼지며 내려감) , 樂-> 陷降(치지면서 내려감)
- 폐의 기운은 곧으면서 퍼는 것이고 비의 기운은 굽으면서 싸는 것이며 간의 기운은 너그로우며 완만한 것이고 신의 기운은 온화하면서 쌓이는 것이다.
- 애기와 노기는 상승하고 희기와 낙기는 하강하니 (* 애노 = 상승 / 희락 = 하강) 상승하는 기운이 과다하면 하초가 상하고 하강하는기가 과다하면 상초를 상하게한다.

- 哀怒之氣 順動 則發越而上騰 喜樂之氣 順動 則緩安而下墜 哀怒之氣 陽也 順動則 順而上升 喜樂之氣 陰也 順動則順而下降
- 哀怒之氣 逆動 則暴發而竝於上也 喜樂之氣 逆動 則浪發而竝於下也上升之氣 逆動 而竝於上 則肝腎傷 下降之氣 逆動而竝於下 則脾肺傷


•애노의 기운이 순조롭게 움직이면 왕성하게 위로 올라가고 희락의 기운이 순조

롭게 움직이면 부드럽게 아래로 떨어진다.

애기와 노기는 양(陽)이니 순조롭게 움직이면 순하게 위로 올라가고 * 애노 =양 / 희락 = 음 희기와 낙기는 음(陰)이니 순조롭게 움직이면 순하게 아래로 내려간다.

•애노의 기운이 불순하게 움직이면 갑자기 일어나 위에서 합쳐지고 희락의 기운이 불순하게 움직이면 멋대로 일어나 아래에서 합쳐진다.

상승하는 기운이 불순하게 움직여 위에서 합쳐지면 간과 신이 상하고 하강하는 기운이 불순하게 움직여 아래에서 합쳐지면, 비와 폐가 상한다.



설명)

결국 감정,스트레스가 몸에 영향을 미칠 수 있다는 것에대한 설명임.

애노희락의 순동하지않고 과도하게 역동한다면 주변것들도 데리고 간다.

애노가 양이고 상승하는 것이므로 과도하게 역동한다면 간,신기가 하강해야하는데 이것들도 데리고 올라가서 상하게 되고 희락은 음이고 하강하는것이므로 과도하게 역동한다면 폐,비기가 상승해야하는데 데리고 내려가 상하게 된다.

소음인의 性情氣

•少陰人 樂性深確 而喜情促急

•樂性 深確者 少陰之口 察於地方 而樂衆人之相保也樂性 非他 味也

•喜情 促急者 少陰之肝 行於黨與 而喜別人之助己也喜情 非他 喜也

해설)

소음인은 락성(樂性)은 심확(深確)하지만 희정(喜情)은 촉급한 것이니

락성이 심확하다는 것은 소음인의 입이 지방(地方)을 살필 때 못 사람이 서로 보호해줄을 즐겁게 여기는 것이니 락성이란 다름 아니라 맛보는 것이다.

희정이 촉급하다는 것은 소음의 간(肝)이 당여(黨與)에 관여할 때 남이 자기를 돕는 것을 기뻐하는 것이니 희정이란 다름 아니라 기뻐하는 것이다. 확충론 3-1

설명)

저번학기 내용이 섞여서 저번학기내용 첨부)

성(性)은 관찰이고 정(情)은 내가 관련된 것이기 때문에 성은 느리게 나오고 정은 바로나온다.(촉급)

따라서 교수님 설명으로는 락성은 남을 관찰하며 다른사람들끼리 서로 보호해주는 것을 바라보며 흐뭇해하는 느낌이며

희정은 당여(당여(黨與) : 태어나면서 맺어지는 혈연 및 지연 관계에 있는 이들과 더불어 지내는 활동 / 익숙한 사람(親熟人)과의 인간관계), 즉 가족이나 혈연 관계에서는 서로 돕는 것을 기뻐하는 것(나를 포함하여)

->소음인은 당여는 잘하지만 교우는 잘 못하기 때문에 친구관계에서(당여가 아닌

관계에서) 도움받기를 좋아하고 자기가 도움을 주기는 싫어한다. 혹은 도움받지 못하면 섭섭해한다.

소음인 성정기와 사장기의 관계


->소음인은 신대비소, 위의 그림을 보면 비기는 상승해야하고 신기는 하강함.

소음인의 성인락성과 정인 희정은 하강함.

1. 락성은 성이므로 순동(큰장기를 더 크게)하고 표병이됨. 락성이 하강하는 신기를 더 크게 하강시켜 향진되고 표병이된다.
2. 희정은 정이므로 역동(작은 장기를 더 작게)하고 리병이됨. 비기의 상승을 저해하여 비기가 저하됨->리병.

소음인 표병)

소음인 表病




우선 전사해,후사해부분이 저번학기 부분이라 관련 써머리 내용첨부하겠습니다.

- 온열량한이 있고, 위완/위/소장/대장을 거쳐서 수곡이 배설됨. 각각을 진/고/유/액으로 본다. (이 4가지 → 전사해)
- 이게 청시후미로 변해 이목비구로 가고 신기혈정이 된다.
- 이 신기혈정이 이/막/혈/정이 된다. (이 4가지 → 후사해)
- 각각 두뇌/배려/요척/방광에 해당하는데, 탁한 것 피모근육골이 되고 청한 것은 애노희락이 되어 폐비간신으로 간다.
- 전사해, 후사해는 정신적인 것을 물질적으로 대입하여 보는 관점을 반영 설명)

우선 표병이니까 락성을 생각해야한다! 위의 기전대로 락성에 의해 신국이 항진되게 되며 이에 따라 신국에 해당되는 미,구,정,정해,방광,골은 항진되게 되고 비국에 해당되는 목,기,막해,배려,근은 저해되게 됨. 따라서 통증도 근육통으로 온다. (즉, 기전적으로 원인이 신이 커져서 생기는 것이므로 -> 순동-> 표병)

소음인 리병)



리병이니까 희정-역동-비를 더 작게!를 생각.

큰장기가 더 커지는 것보다 작은장기가 더 작아지는 것이 영향이 더 크며 비,고해,위,열기가 저하되게 된다.

또한 교수님께서 스트레스를 많이 받는 소음인은 리병이 될 가능성이 더 크며 따라서 리병이와서 열기가 부족해지면 추위를 더 많이 느낀다. 따라서 처방도 신기의 항진 저해쪽 보다는 비기를 보충해주는 보기제 위주로 쓴다.

소음인	신대	신당 강 수곡한기 다	락성기	표병	目背膂
	비소	비당 약 수곡열기 소	희정기	리병	脾胃

소음인 병증분류)

1. [표리] 表裏 辨證 (대분류) -> 표병: 배표부위(背膂(비국), 膀胱(신국) 인체의 후면부) / 리병: 복리 부위(胃(비국), 大腸(신국) 인체의 전면부)->腎受熱表熱病(표병) / 胃受寒裏寒病(리병)
2. [순역] 順逆 辨證 (중분류) -> 순증: 보명지주가 건재 / 역증: 보명지주의 손상
3. [경중험위] 輕重險危 辨證 (소분류) -> 각표,리병의 위험도 분류(위증이 제일 위험한단계)
4. [현증] 現證 辨證 (세분류) -> 현증: 현재증상 / 소증: 평상시 갖고있던 증상.

소음인 표증의 분류표)

대분류	신수열표 열병(표병)			
중분류	울광병		망양병	
소분류	울광병경증	울광병중증	망양병험증	망양병위증
세분류	-울광병초증	-울광병중증 -울광병말증 -태양병궤음증	-망양병초증 -망양병중증	-망양병말증.

소음인 표리병 구분

-腎受熱表熱病은 腎大로 인하여 腎陰(寒)이 왕성하면 그에 따라 膀胱에서 升陽作用을 하지 못하고 울체됨으로 인하여 발생하고, 鬱狂證과 亡陽證으로 구별되며 각각 初證, 中證, 末證으로 나누어서 설명

- 胃受寒裏寒病은 少陰人이 脾小한 특징을 지니므로 항상 脾陽(熱)이 부족하여陰化되기 쉽고 大腸으로 下降하지 못하며 升陽하는 기운까지 부족하여 생긴陰實之氣의 輕重에 의해 病證이 구분되는데, 腹痛과 泄瀉를 기본 증상으로 太陰證과 少陰證으로 구분

-표병은 신기 왕성->방광(신국)에서 하강이 왕성->승양작용의 저해->이로인해 방광에서 배려로가지 못하고 방광에 울체->열->身熱,煩惱의 증상

-표병과 리병을 구분할 때 열/한이 구분 기준이 되므로 설사가 있느냐(소음인 리병에서 한에 의해 설사가 생김) 가슴이 답답한가(열이 뭉쳐서)를 본다. ->표열이 없으면서 腹滿自利, 身寒이 나타난다.

순서를 좀 편집하겠습니다.)

사전개념)


소음인->신대비소 -> 약한장기인 비 즉 따뜻하고 상승하는 기운인 陽暖之氣(양난지기)가 保命之主라는 것을 바탕으로 升降概念을 운용한다.

- 1) 표병의경우 신의 항진으로 인해 생성된 陰化된 기운을 어떻게 陽化시키느냐에 주안점을 두고 升陽益氣(승양익기)를 治法
- 2) 리병의 경우 비의 저하로 인해 생긴 陰實之氣를 풀어주는 방법으로 裏陰降氣 (리음강기)를 治法

1.1 소음인 신수열표열병의 기전

증상	대표적으로 表熱로 身熱, 煩惱(心煩)등
기전	腎局의 陽氣가 腎局의 寒邪에 가리워져 억눌리게 되어 脾局의 陽氣로 상승, 연접하지 못하고 膀胱으로 밀려나가 鬱縮되어 발생
의미	腎受熱表熱病 : 腎局에 腎陽困熱로 인해 背表에 熱證(身熱, 煩惱)이 발생하는 증상

소음인 腎受熱表熱病 기전



참조 : 소음인 병리론에 관한 고찰, 황민우, 고병희, 사상체질의학원론, 2009.21(2):27-41

설명)

1.표병! 이니까 소음인의 성기인 락성기의 항진->신국(위의 그림에서는 파란색, 그중에서도 특히 구,방광)의 水穀寒氣가 항진-> 한사로 작용->표부의 양기 손상.

2.이에 따라 방광에서 배려로 상승해야할 양난지기(보명지주)가 과도해진 한기로 인해 상승하지 못한다.

3. 이 양기가 방광에 울축되어 **腎陽困熱** (신양곤열) ->열이 생긴다. ->따라서 배표 부위를 따라(뒷부분, 엉덩이) 열감이 느껴진다.

또한 신국의 양기의 순환이 안되므로 대장의 온기(양난지기)가 약해진다. 또한 순환이 안되므로 방광과같이 대장에 쌓이면서 **外熱包裹冷**이 형성되고 **大腸怕寒**이 생김 이로 인해 **대장 부위를 중심으로 小腹硬滿** 등의 증상이 외부적으로 발현됨

->소변에는 크게 문제가 발생하지 않는다.(대장문제인 **小腹硬滿**)

4. 이렇게 방광의 본질은 한기이지만 겉부분에 열기가 쌓이게 되고 열기가 쌓이다가 더 쌓일 곳이 없으면 **땀으로 도망가게됨**.

->이는 **보명지주인 양난지기가 빠져나가는 것이므로 역증에 해당한다.(망양증)**

5.이러다가 양난지기가 거의다 빠져나가게 되면 온기가 사라져 오한을 못느끼게 됨. (망양증 위증)

신수열표열병)


鬱狂證

- 初證은 太陽病 表證이 아직 있으면서 안절부절하는 증세
- 中證은 陽明胃家實로 大便秘 不通되는 것이며,
- 末證은 陽明病에 潮熱이 오르고 헛소리를 하며 숨을 헐떡이고 눈을 똑바로 뜨는 증세를 말한다.

亡陽證

- 初證은 太陽病에 發熱, 惡寒, **自汗**이 있는 것
- 中證은 亡陽病에 惡寒은 없고 도리어 惡熱이 있으면서 自汗이 있는 것
- 末證은 陽明病에 發熱이 있고 땀이 많이 나는 것을 말한다

울광증과 망양증의 공통,차이점)



상을 받는 상태

차이점 2. **한출의 여부**로 감별한다.

울광은 무한, 열증위주 / 망양은 유한

->한출 구분기준은 신축본의 개념.

차이점 3. **오한을 느끼느냐?** (양난지기가 방광을 둘러싸고있을 때에는 내몸의 온도보다 밖의 온도가 낮으니 오한을 느끼겠지만 양난지기가 땀으로 빠져나간다면 더 이상 오한을 느끼지 않는 상황이라는 것!

->이는 갑오본의 구분기준 (갑오본이 신축본보다 초기의 개념. (현재는 신축본으로))

공통점)

1.울광과 망양모두 **표병이고 표열로인한 증후**를 공통으로 가진다. -> 원인이 둘다 **腎陽困熱**이라는 것.

표열 증상: 身熱 (發熱, 자각적 열감) 心煩 (胸悶, 煩燥) 痛症 (腹痛 제외한 두면 및 항강부 통증, 腰背痛 四肢節痛)

기전에서 설명한 대장파한은 표증에서 신양곤열과는 다르게 필수적인 병리현상

은 아니고 신양곤열로 인해 복리 부분인 대장부위까지 영향을 미치는 경우에만 나타나는 혹증.

울광병)

참고) 울광과 망양의 대분류 기준을 처음에 한출로 잡고 갔지만 수업을 끝까지 들으니 이 말은 **처음부터** 보명지주를 손상시켰냐!와 동의어로 보입니다. 즉 울광병 말증의 땀이 나는 증상은 **처음에는 보명지주가 손상되지 않은 상태에서** 병이 진행된 울광병 환자가 점점 병이 진행되어 땀이 나는 것이고 망양증은 **처음부터 보명지주가 손상된 상태!**를 의미합니다.

따라서 울광병은 비가 손상된 것이 아닌(보명지주:비의 양난지기) 비가 군주라면 행동대장에 해당하는 **위의 손상된 상태**라고 설명하셨습니다!(胃家實)

울광병 증상:

울광병			
울광병 경증	울광병 중증		
울광병 초증	울광병 중증	울광병 말증	태양병 궤음증
공통증상: 1. 身熱 신열 / 2. 煩惱(其人如狂) 번뇌 (기인여광) / 3. 無汗 무한 4. 痛證			
1. 惡寒 오한 2. 痛症: 頭痛, 身痛 통증: 두통, 신통 3. 或 小腹硬滿 혹 소복경만	1. 不惡寒 但惡熱 불오한 단오열 2. 煩躁 번조 3. 大便秘燥 대변비조 4. 胃家實 不更衣,	1. 不惡寒 但惡熱 불오한 단오열 2. 煩躁 번조 3. 大便秘燥 대변비조 4. 潮熱 조열 5. 澀然微汗出 점연미한출 胃竭之候	1. 惡寒 오한 2. 手足厥冷 수족궤냉 3. 小腹痛 소복통 4. 囊縮 낭축 5. 舌卷 설권

-> 각각의 증상을 잘 알아두어야 한다고 하셨습니다

Point)

- 경증과 중증의 분류기준(태양병제외) -> 초증에는 발열 오한 동시에 / 중증 말증에는 발열, 불오한. -> 오한을 느끼느냐!
- 중증부터의 대변비조 ~> 소화기계의 장애까지 나타나는 시기 . 불갱의는 대변불통을 의미합니다.
- 말증의 점연미한출 -> 찝찝한 땀이 조금씩 나는 것.
- 태양병 궤음증의 대표증상은 손발이 차갑다는 것!

울광증의 치법)

: 益氣升陽 (升補, 和解), 溫胃

병리적 출발점이 신국의 양기가 상승하여 비국에 연접하지 못한 것이므로 익기이 승양이 치법이 된다.

⑤ 처방 :

- ㉠ 울광병 초증
발열오한이 무한자: 계지탕, 천궁계지탕, 향소산, 궁귀향소산, 곽향정기산(6-5)
신양곤열(기인여광): 승보지: 천궁계지탕, 황기계지탕, 팔물군자탕 (6-11)
대장파한(소복경만): 화해지: 곽향정기산, 향사양위탕 (6-11)
- ㉡ 울광병 중증
신양곤열: 팔물군자탕
대장파한: 곽향정기산 (6-16)
- ㉢ 울광병 말증
파두 전립, 독삼팔물군자탕, 선 파두 후 팔물군자탕 (6-20)

-> 외워라! 반드시 알고 있어야 한다 함.

설명)

1.계지,천궁은 승기하는 약재를 쓴 것.

2.황기계지탕은 망양증의 처방도됨. 황기,인삼 같은 보기제를 망양증에 더 쓰는 3. 이유는 비기 자체를 보해야 하기 때문이다.!

3.대장파한 화해->곽향정기, 향사평위산 -> 리병은 아니지만 리병의 증상들이 나타나기 시작하니 써준다.

4.울광병말증의 파두는 한성사하제인 대황과 반대되는 개념이다. 열성사하제로써 들어갔으며 독삼팔물탕의 독은 위급한 상황이기 때문에 약재를 때려박았다는 것. 인삼을 많이 가감했다는 뜻이다.

울광 및 망양 기본처방 비교

	해표승양		보기승양			보혈승양				리기화습	
	계지	생강	황기	감초	대조	하수오	당귀	천궁	백작약	진피	창출
천궁계지탕	3	1		1	1			1	2	1	1
황기계지탕	3	1	3	1	1	1	1		2		

울광의 기본 처방인 천궁계지탕과 망양의 기본처방인 황기계지탕을 비교한 것

교수님 설명으로 소음인에서 보기하는 대표약이 황기, 백하수오라서 망양증에 더 들어간 것이다!

원문)

•鬱狂證 都是 身熱 自汗不出也 (6-35)

•太陽病 表證因在而 其人如狂者 鬱狂之初證也 陽明病 胃家實 不更衣者 鬱狂之中證也 陽明病 潮熱 狂言 微喘直視者 鬱狂之末證也 (6-35)

울광증(鬱狂證)은 모두 신열이 있고 땀이 나오지 않는 것이다.

태양병 표증이 아직 남아 있어서 그 사람이 미친 자와 같은 것은 울광증 초증이요, 양명병에 胃家가 실(實)하게 되고 대변을 보고자 하여도 불통되는 자는 울광증 중증이고, 양명병에 해질 무렵이 되면 고열이 나타나서 헛소리를 하고 약간 헐떡거리며 눈동자를 곧추세우는 자는 울광증 말증이 된 것이다

->각각의 증상이 울광증의 어디에 해당되는지를 나타낸 원문. 반드시 잘 알아두어야하며(교수님이 잘 알아두라함.) 18 기출이였습니다.

- 發熱惡寒者 爲太陽病 發熱不惡寒者 爲陽明病

- 太陽陽明之發熱形證 一也 而惡寒不惡寒之間 相去遠甚 而陽氣之進退強弱 泰山之比丘陵也 (8-1)

발열하며 오한하는 증은 태양병이고, 발열하면서 오한이 없으면 양명병이다.

태양병과 양명병의 발열상태는 같으나 오한·불오한(不惡寒)하는 거리가 심히 멀기 때문에 양기(陽氣)의 진퇴(進退)가 태산과 언덕에 비하는 것과 같다.

오한, 불오한의 차이가 양기에 의해서 오는 것이며 그 간극이 크다는 뜻.

- 胃家實病 其始焉 汗不出 不惡寒 但惡熱而 其病垂危則 濇然 微汗出 潮熱也

濇然 微汗出 潮熱者 表寒振發之力 永竭故也 胃竭之候也(6-38)

- 少陰人胃家實病 少陽人結胸病

正邪陰陽 相敵 而相格 故日久 而後危證始見也(9-36)

위가실병은 처음 시작할 때에는 땀이 나지 않고 오한증도 없다. 다만 열이 심하다가 거의 죽게 되면 끈끈하게 땀이 약간 나고 열이 조수(潮水)처럼 올랐다 내렸다 하는 것이니 위와 같이 되는 것은 한사(寒邪)를 겉으로 떨쳐 내보내는 힘이 아주 고갈되었기 때문에 나타나는 것이므로 위기(胃氣)가 아주 말라버린 증후인 것이다. (6-38)

소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기(正氣)와 사기(邪氣), 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타난다. (9-36)

->위가실병->울광증 중증, 말증에 해당. 하지만 조열, 즈연미한출을 통해 울광 말말증이라고판 하였다는 것.

망양증) (14 기출 (소음인 망양증의 주증상과 의미))

감별기준)

① 發熱, 汗出이 기준 ② 初證, 末證과 中證은 惡寒으로 감별 ③ 汗出과 더불어 小便의 多少를 살필 것.

전에도 언급하였지만 망양은 보명지주가 손상이 처음부터 일어난 상태!->협증에서 시작해서 위증으로간다.(경-중-협-위)

소변->망양말증에서 보명지주가 거의 사라지면 **소변에까지 문제가 발생!**

망양병		
망양병 협증		망양병 위증
망양병 초증	망양병 중증	망양병 말증
1. 身熱 신열 / 2. 煩惱(其人如狂) 번뇌 (기인여광) / 3. 汗自出 한자출		
1. 惡寒 오한 2. 痛症 통증 3. 或 小腹硬滿 혹 소복경만	1. 不惡寒 但惡熱 불오한 단오열 2. 大便秘燥 대변비조 3. 煩躁 번조	1. 惡熱 惡寒 오열 오한 2. 大便秘燥 대변비조 3. 煩躁發狂 번조발광 4. 汗多 한다 5. 小便赤澀 소변적삽

④ 증상

㉠ 망양병초증: 發熱 惡寒 汗自出 : 發熱과 惡寒이 동시 나타남

㉡ 망양병중증: 不惡寒 反惡熱 汗自出 : 惡熱, 不惡寒의 증상이 생김
津液漸竭 脾之潤氣 漸約되어 나타나는 증

㉢ 망양병말증: 發熱 汗多, 小便赤澀, 惡寒 : 發熱, 汗多의 증상이 생김
裡熱撐支之勢 已窮한 병. 脾絕之候 나타나는 증

->증상을 잘 알아둘 것!(18기출) 공통증상은 신열,번뇌(기인여광),자한출

오한의 비교 울광: 초증, 태양병궤음증 / 망양: 초증,말증

치법과 처방

⑤ 치법 : 益氣升陽, 建脾 (부자, 관계)

⑥ 처방

㉠ 망양병초증

신양곤열: 황기계지탕 (6-5)

소복경만: 곽향정기산, 향사양위탕 (6-11)

㉡ 망양병중증 : 승양익기탕, 보중익기탕

㉢ 망양병말증 : 황기계지부자탕, 인삼계지부자탕, 승양익기부자탕,
인삼관계부자탕

->망양병말증의 부자탕 세트4개는 시험에 자주낸다고 언급!

설명)

망양증에서는 갈데까지 갔기 때문에 처방에 관계, 부자, 인삼을 많이 쓴다.

나머지는 울광에서 설명했음!

원문)

•亡陽證 都是 身熱 自汗出也 (6-35)

•少陰人 亡陽病 少陽人 亡陰病 正邪陰陽 不敵而相格 故 初證已爲險證 繼而因爲危證矣 (9-36)

•亡陽者 陽不上升而 反爲下降則 亡陽也 (9-32)

망양증은 모두 신열이 있고 땀이 저절로 많이 흘러나오는 것이다.(6-35)

소음인의 망양병이나 소양인의 망음병은 정기와 사기, 음과 양이 적수가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 초증이 벌써 함증이 계속되고 그로 인하여 위증이 되는 것이다 (9-36)

망양은 양이 위로 올라가지 못하고 도리어 아래로 내려가게 되어 망양이라 한다.(9-32)

•太陽病 發熱 惡寒 汗自出者 亡陽之初證也 陽明病 不惡寒 反惡熱 汗自出者 亡陽之中證也 陽明病 發熱 汗多者 亡陽之末證也 (9-35)

태양병에 발열하고 오한증을 일으키며 땀이 저절로 흘러나오는 자는 망양증 초증이고,

양명병에 오한은 없고 오히려 오열(惡熱)하며 땀이 저절로 흘러나오는 것은 망양증 중증이고,

양명병에 발열하고 땀이 몹시 많이 흘러나오는 자는 망양증 말증이 된 것이다

->이제마가 정의한 망양증 초,중,말증. 시험에 자주내니 원문그대로 알자!

1. 중증만 오한이 없다 2.중증을 넘어가면서 점점 비기가 약해진다. 3.말증에는 **한**다가 가장 큰 특징이고 **소변적삽** 또한 특징 ->점점 양난지기가 없어지는 것.

비절지후는 양명병 / 위절지후는 율광병!

•亡陽病證 非但觀於汗也 必觀於小便多少也 若 小便清利 而自汗出 則 脾約病也 此險證也 小便赤澀 而自汗出 則 陽明病 發熱汗多也 此 危證也. 然 少陽人裏熱證 太陰人表熱證 亦有汗多而 小便赤澀者 宜察之不可誤藥 (6-37)

망양병증은 비단 땀만을 볼 것이 아니라 반드시 소변이 많고 적은 것도 보아야 한다.

만일 소변이 맑고 많으면서 땀이 저절로 나오면脾約病이 되는 것이니 이는 함증이다. 소변이 붉고 깔깔하게 나오면서 저절로 땀이 나게 되면 양명병에 발열다한증이니 이는 위증이다. 그러나 소양인 리열증(裡熱證)과 태음인 표열병(表熱病)에도 또한 땀이 많이 나오면서 오줌이 붉고 깔깔한 자가 있으니 판단하여 함부로 약을 잘못 써서는 안 된다.

->태음인의 표열병이 아닌 리열증으로 바뀌어야함.(태음인의 표열증은 갑오본의 시각이고 신축본의 시점에서는 간수열리열병임.)

결국 양명병 (초)중증(함증)과 말증(위증)을 구분하는 근거가 **소변적삽**이라는 것!

망양병의 기전)

•亡陽者 陽不上升 而反爲下降 則亡陽也 陰盛格陽於上則 陽爲陰抑 不能上升於胸膈 下陷大腸而 外遁膀胱 故 背表煩熱而 汗出也 煩熱而 汗出者 非陽盛也 此 所謂 內氷外炭 陽將亡之兆也 (9-32)

망양이라는 것은 양이 위로 올라가지 못하고 도리어 아래로 내려가게 되어 망양이라 한다.

음이 성하여 위에서 양과 다투면 양이 음에게 억눌리게 되어 흉격(胸膈)에 올라가지 못하고 아래로 대장에 빠져 밖으로 방광에 도망하니 등의 겉에 번열하면서 땀이 난다. 번열하면서 땀이 나는 것은 양이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 얼음 같고 밖은 숯불 같다는 것이니 양이 장차 없어지려는 징조이다.

음이 올라가야되는 양을 때리면서 양이 억눌리면서 상승하지 못하게 됨. ->흉격에서 대장 방광으로 간다고 얘기하지만 교수님 생각에는 잘못 설명했다고 생각함. **흉격은 리고 대장도 리임. 이게 아니라 표부분인 두뇌 배려 방광으로 바뀌어**

야한다고 생각하심. 방광에서 배려로 상승을 해야하는데 못해서 뭉치면서 밖으로 땀으로 도망가는 것이 망양증.

기전상으로 변열이 있는이유가 양이 성한 것이 아니기 때문에 찬약을 쓰면 안됨. 內氷外炭의 상황이기 때문!. (안에는 차갑고 겉에만 뜨거움.)

脾約病 其始焉 汗自出 不惡寒而 其病垂危則 發熱汗多而 惡寒也 發熱汗多而惡寒者 裡熱撐支之勢 已窮故也 脾絕之候也 (6-38)

비약병(脾約病)은 시초에 신열이 있고 땀이 저절로 나오나 오한증은 없다가 (중증)

그 병으로 거의 죽게 되면 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것이다. (말증) 이렇게 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것은 리열(裡熱)을 지탱해 내는 세력이 이미 다하였기 때문에 비기(脾氣)가 끊어지는 증후인 것이다.

비약병->망양증 중증을 의미하고 위 원문은 이 중증이 더 심해지면서 말증이 되어가는 과정을 이야기함.

•少陰人 胃家實病 少陽人 結胸病 正邪陰陽 相敵而相格 故 日久而後 危證始見也 • 少陰人 亡陽病 少陽人 亡陰病 正邪陰陽 不敵而相格 故 初證 已爲險證 繼而因爲 危證 矣(9-36)

소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기와 사기, 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타난다.

소음인의 망양병이나 소양인의 망음병은 정기와 사기, 음과 양이 적수가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 초증이 벌써 험증(險證)이 계속되고 그로 인하여 위증(危證)이 되는 것이다.

->위가실의 병과(울광증) 망양증의 차이를 이야기함. 망양증은 처음부터 보명지주가 상처입기 때문에 바로 험증에서 시작해서 위증이된다.

태양병 꺾음증)

•울광병이 순증, 망양병이 역증이면, 태양병꺾음증은 일종의 變證

•울광증으로 시작을 해서 제대로 치료하지 않거나 오래 냅두어서 한증(수족꺾냉)이 생기게 되는것이다. 처음에 복통,설사가 없는 상태에서 시작하였기 때문에 리증이 아닌 표증으로 분류를 한 것!

•증상에 리증의 증상들이 있지만 리증이 아니다! 리병의 증상들이 표증에서도 나타날 뿐 표증임!

증상	手足厥冷(수족꺾냉), 小腹痛(소복통), 煩滿(번만), 囊縮(낭축), 舌卷(설권)
기전	發熱, 惡寒, 汗自出의 表熱證 이 있는 상태에서 병이 풀리지 않고 오랫동안 안 풀다가 변증이 생긴 것 처음에 발열, 오한 등의 表熱證만 있고 복통, 하리라는 裏寒證은 없다가 시간이 지난 뒤에 手足厥冷, 少腹滿등의 裏寒證이 겹하여 나타난 상태
치법	升陽益氣(승양익기), 溫胃(온위)
처방	인삼오수유탕, 독삼팔물군자탕 (6-47) 대장파한(복만, 복통 심한 경우): 파도 (6-47) 울광병 단계에서 미리 팔물군자탕으로 예방.

->태양병꺾음증도 표증이기 때문에 승양익기의 치법이며 울광에서 발전했기 때문에 온위이다!

처방에서 인삼오수유탕에서는 인삼을 써준게 오수유보다 포인트이고 애초에 태음병꺾음증까지 안가게 울광단계에서 팔물군자탕을 제때에 쓰는게 중요

•太陽傷風 惡寒發熱 汗自出之證 正邪相持日久 當解不解而變爲此證 (6-47)
(소음인의) 태양상풍증에 오한·발열하며 땀이 저절로 나는 증이니 정기와 사기가 여러 날을 서로 대치함으로써 마땅히 풀릴 것이 풀리지 못하고 변하여 이와 같은 증이 된 것이다.

이문장에서 망양이 아닌 울광기원이라고 판단! -> 망양은 애초에 보명지주가 상

한상태에서 시작한 것이기 때문에 정기와 사기가 대치할 수 없음. (정기가 발림!)

->약물까지 쓰라고는 안하시는데 처방명은 꼭 알아야함.



->열증은 동일하나 갑오본은 1차로 오한->2차로 한출로 구분을 하였으나 신축본에서는 1차로는 한출 2차로는 오한으로 구분을 하였다.

-> 오한은 양기가 싸우냐 못싸우냐로 구분한것인데 보명지주가 더 중요한 개념이라는 이제마의 인식변화 후 신축본에서 한출로 1차 구분기준이 변화.

신수열 표열병 처방표)

신수열표열병			
울광증	초증	천궁계지탕	경
		궁귀향소산	
	대장파한	곽향정기산	
	중증: 신경증	향부자팔물탕	
태양병궤음증	중증, 말증	팔물군자탕	중
		인삼오수유탕	
망양증	초증	황기계지탕	힘
		송양익기탕	
	중증	보중익기탕	
	말증	황기계지부자탕	
		인삼계지부자탕	
		송양익기부자탕	
		인삼관계부자탕	
			위

『東醫壽世保元·辛丑本』의 鬱狂證, 亡陽證 처방

	川芎 枝湯	西歸 養血湯	香附子 八物湯	八物 子湯	兩手 八物湯	東垣 枝湯	升陽 益氣湯	補中 益氣湯	黃芪 桂枝子湯	升陽 益氣子湯	人參 桂枝子湯	人參 黃芪子湯
人參				2	10		2	3		2	4	5
黃芪				1	1	2	2	3	3	2	2	3
白芍藥			1			1	1			1		
白朮			1	1	1			1				
蒼朮	1	1										
甘草	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
當歸		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
川芎	1	1	1	1	1							
官桂							1			1		3
桂枝	3					3	2		3	2	3	
陳皮	1	1	1	1	1			1				
芍藥	2		2	1	1	2	2		2	2	2	2
香附子		2	2									
藿香								0.5				
蘇葉		1						0.5				
附子									1	1	1	1
蔥白		5莖										
生薑	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片	3片
大棗	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚

weight unit : 1=3.75g

->창출,진피를 울광증에 사용하는 이유는 순환을 통해 상승시켜준다는 의미이며 천궁,계지도한 같은 의미.

->망양증에는 비기를 보해주는게 더 중요하다고 생각해서 인삼, 황기를 많이 사용한다.



장중경과 이제마)

->이부분은 증상들을 위주로 잘 알아둘 것. 論曰로 시작하는 부분이 이제마가 쓴 것이므로 잘 보기. (이제마가 설명을 위해 장중경의 말을 인용한 부분들)

1)신수열표열병 조문들

- 6-1 張仲景 傷寒論曰 發熱 惡寒 脈浮者 屬表 卽太陽證也.
- 6-2 太陽傷風脈 陽浮而陰弱 陽浮者 熱自發 陰弱者 汗自出 藹藹惡寒 淅淅惡風 翕翕發熱 鼻鳴 乾嘔 桂枝湯主之.
- 장중경 《상한론》에서 말하기를 열이 오르고 오한이 있으며 맥이 부(浮)하면 이는 표병에 속하였으니, 태양증이다
- 태양병에 상풍(傷風)으로 된 맥은 양맥(陽脈)이 부(浮)하고 음맥(陰脈)이 약(弱)하다. 양맥이 부하면 열이 저절로 나고, 음맥이 약하면 땀이 저절로 난다. 오슬오슬 춥고 오싹오싹 바람이 싫으며 후끈후끈 열이 오르고 코에서 싹싹 소리가 나고 마른 구역이 나면 주로 계지탕을 쓴다

양부자 열자발: 울광증 의미 / 음약자 한자출: 망양증의미.

위의 태양증이 소음인에게서 나타나면 신수열표열병이다.

- 6-3 危亦林 得效方曰 四時瘟疫 當用 香蘇散.
 - 6-4 龔信 醫鑑曰 傷寒 頭痛 身疼 不分表裏證 當用 藿香正氣散
- 위역림의 《득효방》에서 말하기를 사시온역에는 향소산을 써야 한다.
공신의 《의감》에서 말하기를 상한(傷寒)에 머리가 아프고 몸이 쑤시나 표증인지 리증인지 분별하기 어려울 때에는 곽향정기산을 쓰라 하였다.

표증증상이 있는데 리증인지 분별하기 어려울 때 -> 대장파한을 의미한다. ->곽향정기산 사용

6-5 論曰 張仲景所論 太陽傷風 發熱惡寒者 卽 少陰人 腎受熱表熱病也 此證 發熱惡寒而無汗者 當用 桂枝湯 川芎桂枝湯 香蘇散 芎歸香蘇散 藿香正氣散

發熱惡寒而有汗者 此亡陽初證也 必不可輕易視之 先用 黃耆桂枝湯 補中益氣湯 升陽益氣湯 三日連服而汗不止 病不愈則 當用 桂枝附子湯 人蔘桂枝附子湯 升陽益氣附子湯.

나는 논하기를 장중경이 말한 태양상풍증에 열이 나고 오한이 있다고 한 것은 곧 소음인의 신(腎)에 열을 받아 밖에 열이 나는 병이니

이 증후에 발열하며 오한이 나고 땀이 없으면(울광증) 계지탕 · 천궁계지탕 · 향소산 · 궁귀향소산 · 곽향정기산 같은 것을 써야하고 / 오한발열이 있으면서 땀이 나면 망양증 초증이므로 절대로 가볍게 보아 넘겨서는 안 된다. 황기계지탕 · 보중익기탕 · 승양익기탕을 3일간 계속 먹어도 땀이 그치지 않고 (망양 말증)병이 풀리지 않으면 계지부자탕 · 인삼계지부자탕 · 승양익기부자탕을 써야 한다.

중요한부분)

발열오한이무한자: 울광증을 의미 / 유한: 망양증(초) / 한불지: (말)

2)울광증 초증

울광 초증 처방)

처방	구성								
계지탕	계지3		작약2		감초1				강3 초2
천궁 계지탕	계지3		작약2		감초1	천궁1	창출1	진피1	강3 초2
향소산		향부자 3		소엽 2.5	감초1		창출1	진피 1.5	총백2 강3
궁귀 향소산		향부자 2		소엽1	감초1	천궁1	창출1	진피1	당귀1 총백5 강3 초2
곽향 정기산		곽향 1.5		소엽1	감초 0.5		창출0 .5	진피 0.5	반하 진피 청피 대북피 계피 건강 익자인 0.5 강3 초2

• 6-6 張仲景曰 太陽病 脈浮緊 發熱無汗而衄者 自愈也.

• 6-7 太陽病 六七日 表證因在 脈微而沈 反不結胸 其人如狂者 以熱在下焦 小腹當滿 小便自利者 下血乃愈 抵當湯主之.

장중경이 말하기를 태양병에 맥이 浮하고 緊하며 열이 나고 땀이 없이 코피가 나면 병이 저절로 낫는다고 하였다.

장중경이 말하기를 태양병이 6, 7일 되었는데도 표증이 남아 있고 맥이 微하면서 沈하되 도리어 결흉이 되지 않고, 그 사람이 미친 것 같은 것은 열이 하초에 있기 때문이다.

비록 아랫배가 가득할지라도 소변이 순조로운 자는 하혈(下血)을 시키면 곧 낫는 것이다. 여기에 주로 저당탕을 쓴다

6-6)이제마의 디스전 맥부긴 , 발열, 무한자 ->울광증 ->코피는 순환이 된다는 의미이고 순환이 되어서 치료가 된것인데 장중경이 이걸보고 혈증이라고 생각해서 파혈약을 이때 많이써서 부작용이 많았다~

6-7) 이부분도 똑같이 소복만인데 소변 순조로움->울광증의 증상임. 하혈x

• 6-8 太陽病 身黃發狂 小腹硬滿 小便自利者 血證 宜抵當湯. 傷寒 小腹滿 應小便不利 今反利者 以有血也.

• 6-9 太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下者 自愈 但小腹急結者 宜攻之 宜桃仁承氣湯

태양증에 몸이 노랑고 발광하면서 아랫배가 단단히 붓고 소변이 잘 나오는 것은 혈증이니 마땅히 저당탕을 쓴다. 상한에 아랫배가 가득하면 응당 소변이 잘 나오지 않을 것인데 지금 도리어 소변이 순조로운 것은 혈이 있기 때문이다.

태양병이 풀리지 않고 열이 방광에 맺혀 있어 미친 사람 같으면서 스스로 하혈하는 증은 병이 저절로 낫는 것이나, 아랫배가 급히 맺히는 증에는 마땅히 공격해야 하니 도인승기탕을 써야 한다.

->6-9까지 장중경 디스.

6-10 太陽病外證 未除而 數下之 遂下利不止, 心下痞硬 表裏不解 人蔘桂枝湯主之
태양병 외증(外證)이 아직 다 풀리지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설사가 그치지 아니하며 명치끝이 막히고 단단히 굳어진다. 이것은 표증과 리증이 다 풀리지 않은 것이니 주로 인삼계지탕을 쓴다

論曰 此證 其人如狂者 腎陽困熱也 / 小腹硬滿者 大腸怕寒也 二證俱見 當先其急.

腎陽困熱則 當用 川芎桂枝湯 黃芪桂枝湯 八物君子湯 升補之.

大腸怕寒則 當用 藿香正氣散 香砂養胃湯 和解之.

若外熱包裡冷而 毒氣重結於內 或將有養虎遺患之弊則 當用 巴豆丹 下利一二度

因以 藿香正氣散 八物君子湯 和解而峻補之. (6-11)

나는 논하기를 이와 같은 증세에 환자가 미친 것 같은 것은 신양(腎陽)이 열을 받았기 때문에 곤궁에 빠진 상태이고 아랫배가 단단하면서 가득하다는 것은 대장이 한기를 받고 벌벌 떠는 상태이다.

이렇게 두 가지 증세가 함께 나타날 때는 마땅히 그 급한 증부터 먼저 치료하는 법이다. 만일 신양이 곤열(困熱)한 것이 더 급하면 우선 천궁계지탕, 황기계지탕, 팔물군자탕을 써서 승보(升補)를 하고,

만일 대장이 한기를 받고 벌벌 떠는 것이 급하면 마땅히 곽향정기산, 향사양위탕을 써서 화해(和解)케 하고,

만일 외열이 裏冷을 에워싸고 있으면 內에 독기가 거둡 맺혀서 혹 장차 호랑이를 길러 화를 당하는 폐단이 있는 것인즉 마땅히 파두단을 써서 설사를 1, 2차 시키고 곧 곽향정기산, 팔물군자탕으로서 화해시키는 한편 크게 보하는 약을 써주어야 한다.

->논왈->이제마말이므로 중요

6-10, 6-11은 이제마가 옳다고 생각하는 증상에 따른 처방들을 언급한 것.

- 1) 張仲景所論 下焦血證 卽 少陰人 脾局陽氣 爲寒邪所掩抑而 腎局陽氣 爲邪所拒 不能直升 連接於脾局 鬱縮膀胱之證也.
 - 2) 其人如狂者 其人難言也 如見鬼狀者 恍惚譫語也. 太陽病表證因在者 身熱煩惱而 惡寒之證間有之也
 - 3) 太陽病外證除者 身熱煩惱而 惡寒之證都無之也
 - 4) 此證 益氣而升陽則 得其上策也 破血而解熱則 出於下計也. 太陽病 外證未除而 數下之 逐下利不止云云者 亦可見 古人之於此證 用承氣湯則 下利不止故 遂變其方而 用 抵當桃仁湯 耳.
 - 5) 太陽病 外證 未除則 陽氣其力 雖有鬱抑 猶能振寒而 與寒邪相爭於表也若 外證 盡除則 陽氣其力 不能振寒而 遂爲窮困縮伏之勢也
 - 6) 攻下之藥 何甚好藥而 必待陽氣窮困縮伏之時而 應用邪. 人蔘桂枝湯 不亦晚乎.
- 1) 장중경이 말한 하초혈은, 즉 소음인이脾局의 양기가 한사에 억눌린 바가 되어서腎局의 양기가 그 한사의 저항을 받아 위로 곧장 올라가 비국과 연접하지 못하고 방광에 울축(鬱蓄)되는 증세이다.
 - 2) 또 그 사람이 미친 것 같다는 것은 그 사람이 횡설수설하는 것이요, 귀신을 보았다는 것은 헛것을 보고 중얼거리는 것이다. 태양병 표증이 아직 있다는 것은 신열(身熱)로 몹시 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한이 간간이 있는 것이다.
 - 3) 그러나 태양병에 외증이 없는 자는 신열로 괴로워하며 정신이 혼미하고 오한이 간간이 있는 증세는 전혀 없는 것이다.
 - 4) 이런 증후에 기운을 돋우며 양기를 끌어올리면 상책을 얻었다고 할 것이요, 파혈(破血)을 하면서 열을 푸는 것은 졸렬한 계책에서 나온 것이다. 태양병 외증이 아직 다 제거되지 않았는데 자주 설사를 시키면 결국 설

사가 그치지 않는다고 운운한 것은 역시 옛 사람들이 이런 증세에 승기탕을 쓰면 설사가 그치지 않았기 때문에 그 처방을 고쳐서 저당도인탕을 썼을 따름이었던 것이다.

- 5) 태양병에 외증이 모두 제거되지 않았을 때에는 양기의 힘이 비록 울체되어 막히긴 하였으나 오히려 한(寒)을 떨치고 겉[表]에서 한사(寒邪)와 서로 싸울 수가 있지만 만일 외증이 다 없어졌다면 양기의 힘이 한을 떨치지 못하고 곤궁에 빠져 위축되어 엎드려진 형세이다. (=포기한 상태다)
- 6) 공하(攻下)하는 약이 얼마나 좋은 약이길래 반드시 양기가 곤궁에 빠져서 위축되어 엎드려질 때까지 기다려 약을 써야 하는 것인가? 그렇다면 인삼계지탕이 또한 늦지 않겠는가?

-
- 1) 장중경의 하초혈증과 소음인의 울광증.
 - 2) 울광증 초증의 증상.->표증이 있는 상태
 - 3) 태양병의 표증이 완전히 제거된 상태 ->표증이 있고 없고를 오한으로 구분했으며 이는 울광병의 초증과 중,말증의 구분이 될 수 있음.
 - 4) 이러한 증상에 파혈약을 쓰고나 해열약을 쓰면 안된다
 - 5) 태양병에서 외증이 있는 것과 없는 것의 차이점!
-외증이 있을 때: 양기가 눌리긴 했지만 한사와 싸울 수 있어서 오한.
-외증이 없을 때 : 양기가 한사를 떨칠 능력이 없으며 엎드린상태.
 - 6) 공하약 X

울광증 중증)

• 6-13 張仲景曰 婦人 傷寒 發熱 經水適來適斷 晝日明了 夜則譫語 如見鬼狀此爲 熱入血室 無犯胃氣及上二焦 必自愈.

• 6-14 陽明病 口燥 嗽水 不欲嚥 此必衄 不可下. (嗽水: 양치질)

• 장중경 왠 부인 상한에 발열하고 경수(經水)가 적래적단(適來適斷)하며 낮에는 정신이 맑았다가 밤이 되면 헛소리를 하기를 귀신 같은 것이 보인다고 하는 것은 열이 자궁에 들어 있기 때문이다. 그러나 위기(胃氣)와 상초·중초를 범하지 않았으면 반드시 저절로 낫는다.

• 양명병에 입이 말라서 양치질을 하고도 그 물을 넘기고자 하지 않는 것은 반드시 코피가 터지려는 징조이다. 설사를 시켜서는 안 된다

->6-13) 포인트는 소음인표증 같은 증상이 나타나는 상황에서 **위기**를 보전해야 한다고 함-> 울광증으로 보고있음.

->6-14) 설사를 시키지말라한 부분-> 울광증으로 보고있음을 알 수 있으며 따라서 **양명병을 울광증 중증에 대입**할 수 있음.

• 6-15 陽明病 不能食 攻其熱 必噎, 傷寒嘔多 雖有陽明 不可攻 胃家實 不大便 若表未解 及有半表者 先以桂枝柴胡 和解 乃可下也.

양명병의 음식을 먹지 못하는 증에 열을 공격하면 반드시 딸꾹질을 하는 것이고 상한에 구역기(嘔逆氣)가 많은 증에는 비록 양명증이 있어도 공격하는 약을 써서는 안 된다. 양명병 위가실(胃家實)증으로 대변을 보지 못하는데 만일 표증이 풀리지 않았거나 표증이 반쯤 풀렸을 경우에는 먼저 계지, 시호를 써서 화해(和解)시킨 후에 설사를 시켜야 한다.

->계지와 시호를 써서 화해를 하라하고 설사시키라고 했는데 이러면 안됨.

차라리 곽향,향사,팔물군자를 써서 따뜻하게 해줘야한다.

• 6-16 論曰 右諸證 當用 藿香正氣散 香砂養胃湯 八物君子湯.

위의 모든 증세에는 곽향정기산, 향사양위탕, 팔물군자탕을 써야 한다.

위증상들의 치법을 결론냄. (논왈->이제마의 생각)

울광증 말증)

• 6-17 張仲景曰 陽明之爲病 **胃家實**也. 問曰 緣何得陽明. 答曰 太陽病 發汗 若下 若利小便者 此**亡津液** 胃中乾燥 因轉屬陽明**不更衣 內實 大便難者** 此名陽明病也

• 6-18 傷寒 轉屬陽明 其人 **濇然微汗出**也.

• 장중경이 말하기를 양명병이 되면 위가실(胃家實)로 되는 것이다. 묻기를 '어떠한 까닭으로 양명병을 얻게 되는가?'

대답하기를 태양병이 되었을 때 땀을 너무 많이 내었거나 설사를 많이 하였거나 이뇨를 많이 시키면 진액이 없어져서 위중(胃中)이 건조하게 되어 양명병으로 전속(轉屬)하게 되면 내실(內實)하여 대변이 통하기 어려운 증을 양명증이라고 한다.

• 상한에 양명병으로 전속(轉屬)하면 그 사람은 땀이 축축하게 난다.

->위에서 본 소음인 울광증 말증의 증상들!

• 6-19 傷寒 若吐 若下後 不解 不大便 五六日 至十餘日 日晡所發潮熱 **不惡寒 狂言 如見鬼狀 若劇者 發則 不識人 循衣摸床 惕而不安 微喘直視 脈弦者生 脈澀者死.**

상한에 만일 토하고 하리(下利)를 한 후에도 병이 풀리지 않고 대변을 5, 6일 내지 10여 일을 보지 못하면서 해 질 무렵에 발열하며 **오한이 없으면서 미친 소리를 하고 귀신 같은 것이 보인다고 한다.**

몹시 심한 자는 발열하면서 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬으며 불안해 하고 약간 숨이 가빠지면서 눈동자를 곧추세운다. 이렇게 된 증에는 맥이 현(弦)한 사람은 살고 맥이 습(澀)한 사람은 죽는 것이다.

빨간색: 율광증 중증을 의미 / 파란색 : 율광증 말증을 의미.

• 6-20 論曰 秦漢時 醫方治法 大便秘燥者 有大黃治法 無巴豆治法 故 張仲景 亦用大黃大承氣湯 治 少陰人 太陽病轉屬陽明 其人 澀然微汗出 胃中燥煩實 不大便 五六日 至十餘日 日晡發潮熱 不惡寒 狂言 如見鬼狀之時而 用之則神效 若劇者 發則不識人 循衣摸床 惕而不安 微喘直視 用之於此則 脈弦者生 脈澀者死 蓋 此方 治少陰人 太陽病轉屬陽明 不大便 五六日 日晡發潮熱者 可用而其他則 不可用也

나는 논하기를 진, 한 때에는 의방치법에 대변이 비조(秘燥)한 자에게는 대황으로 치료하는 방법은 있어도 파두로서 치료하는 방법은 없었기 때문에 장중경도 대황대승기탕으로 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 병증을 치료하는 것이다.

그 환자의 병증은 끈끈하게 땀이 나와서 위중(胃中)이燥煩實하여 대변을 5, 6일 내지 10여 일을 보지 못하고 매일 해질 무렵이면 조열(潮熱)을 발하며 오한증은 없고 미친 소리를 하면서 귀신 같은 것이 보인다고 할 때 대승기탕을 쓰면 신효(神效)하다 하고, 병증이 몹시 심한 자는 사람을 알아보지 못하고 옷을 어루만지며 침상을 더듬고 두려워하면서 불안해 하고 약간 숨이 차고 눈동자를 곧추세우는 것이다. 이렇게 되어 있는 병증에는 대승기탕을 쓰는데 맥이 현(弦)한 자는 살고 맥이 삽(澀)한 자는 죽는다고 하였으니 대개 이 처방은 소음인의 태양병이 양명병으로 전속하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵이면 조열(潮熱)이 나는 경우에는 쓸 수 있으나 그 외에는 쓸 수 없는 것이다

- ➔ 증언미한출, 위중변조실 불대변~의 증상들 때문에 대황대승기탕을 쓴 것인데 이 시대에 따뜻한 사하약인 파두를 안썼기 때문이라고 하네요.
- ➔ 대황대승기탕을 썼을 때 사는사람은 아직 보명지주가 그래도 남아있어서 막힌걸 뚫어주면 다시 보명지주를 순환시킬 수 있는 사람은 살고 아니면 죽는다
- ➔ 따라서 율광증 초,중증정도의 사람만 살았을 것! 말증이 시작하면 대승기탕을 써도 죽는다!

위에서 언급했듯이 이번주차에는 표병 위주로 내용을 나갔어서 소음인 리병 부분을 마지막으로 옮겼습니다. 초반에 간단히 하였고 담주에 리병 나갈것으로 예상됩니다!

소음인 리병)

胃受寒裏寒病(위수한리한병)

- 少陰人이脾小한 특징을 지니므로 항상脾陽이不足하여陰化되기 쉽고大腸으로下降하지 못하며升陽하는기운까지不足하여생긴陰實之氣의輕重에의해病證이구분

- 腹痛과泄瀉를기본증상으로太陰證(태음증)과少陰證(소음증)으로구분

위수한리한병은비양이대장으로하강해야하는데하강하지못해서생기는병.

설사는비가악해져대장의한기를조절하지못하게되어나오는것

소음인	이름	원인	병기	분류/증상
표병	신수열표열병	신대	방광에서승양x	1) 율광증: 땀x 2) 망양증: 땀o
리병	위수한리한병	비소	대장으로하강x	1) 태음증: 구갈x 2) 소음증: 구갈o

1) 太陰證 (태음증)

- “口中有和 無口渴 (갈증x) 而有腹痛 自利者”라 정의
- 太陰證의泄瀉: 大腸의寒氣를胃속의溫氣가추출하는泄瀉
- 順證(순증)概念

즉 대장의 한기가 위국까지 침범을 해서 설사가 발생! 한기가 올라가다가 위에서 이것을 쫓아내면서 설사가 나타남. ->온위강음의 치법

2) 少陰證 (소음증)

- “口中不和 有口渴 (갈증o) 而有腹痛 自利者”라 정의
- 少陰證의 泄瀉: 大腸의 寒氣가 胃 속의 溫氣를 逼迫(핍박)하는 泄瀉
- 太陰證에 비해 逆證(역증)概念이고 表裏俱病(표리구병)
->온기가 한기를 피해서, 도망쳐서 나오는 설사! 따라서 매우 안좋은 설사이며 열성의 설사가 나타난다.(보명지주가 빠져나가는 상황) -> 건비강음의 치법

표리검병과 표리구병)

- 表裏兼病(표리검병): 병인의 출발점이 표병에서 시작했으나, 오랫동안 해소되지 않아 복리부위까지 보명지주의 순환이 이루어지지 않은 경우 -> 울광증의 대장파한이 해당된다!

- 表裏俱病(표리구병): 시간의 차이가 없이 표병의 발생기전과 리병의 발생기전에

동시에 문제가 생겨 표, 리 모두 병든 것

⇒ 즉 표리검병과 표리구병은 먼저 병이 발생하고 시간이 지남에 따라 병발하는 개념인지(表裏兼病) 시간 차이가 없이 동시에 표리에 병이 드는 것인지(表裏俱病)의 차이점이 있으며, 두 개념 모두 전변의 개념이 아님

->위에서도 설명을 했었는데 대장파한의 경우 리증의 증상!은 나타나지만 병인이 리에 있지않고 표에서 시작된 것이므로 표리 검병이다.

사상체질의학 3주차

수업 ppt 내용 검은글씨 / 교수님 설명 회색글씨

01 소음인 신수열표열병론

지난주에 이어 올광증 말증 조문 6-20부터 진도 나감

올광증 말증 (6-20 ~ 6-26)

(6-20)

- 仲景 知此方 有可用不可用之時候 故 亦能昭詳 少陰人 太陽陽明病證候也.
- 蓋 仲景 一心精力 都在於深得 大承氣湯 可用時候 故 不可用之時候 亦昭詳知之也.
- 仲景 太陽陽明病 藥方中 有桂枝湯 人蔘桂枝湯 得其彷彿而
- 大承氣湯則 置人死生於茫無津涯之中.
- 必求大承氣湯 可用之時候而 待其不大便五六日 日晡發潮熱 狂言時 是豈美法也哉.
- 蓋 少陰人病候 ㉠自汗不出 則脾不弱也 / ㉡大便秘燥 則胃實也
- 少陰人 太陽陽明病 ㉠自汗不出 脾不弱者 輕病也 / ㉡大便雖硬 用藥則 易愈也.
- 장중경이 이 처방을 쓰고 못 쓰는 때와 증후를 잘 알기 때문에 또한 소음인의 태양병이 양명병으로 전속된 증후도 잘 알 수 있었다.
- 대개 중경의 一心精力이 대승기탕을 쓸 수 있는 시기와 증후를 찾아내는 데 있기 때문에 또한 써서는 안 되는 시기와 증후도 소상히 잘 알았던 것이다.
- 장중경의 《상한론》 태양양명병증 처방 중에 오직 계지탕, 인삼계지탕이 그 효력이 근사한 처방이지만
- 대승기탕은 사람의 생사를 아득히 끝없는 바닷가에 내버려두고,
- 반드시 대승기탕을 쓸 때와 증후를 구하고자 하여 대변을 5, 6일 보지 못하고 해질 무렵에 조열(潮熱)이 나타나고 헛소리할 때를 기다리고 있다면 이것이 어찌 좋은 치료법이라고 하겠는가?
- 대체로 소음인의 병증에는 ㉠땀이 저절로 나지 않으면 비(脾)가 약하지 않은 것이고
- ㉡대변이 비조(秘燥)하면 위가실증(胃家實證)이 된다.
- 소음인의 태양증이 양명병으로 전속되었어도 ㉠저절로 땀이 나지 않으면 비가 약한 것이 아니고 오히려 경병(輕病)이다. ㉡대변이 비록 딱딱해도 약을 쓰면 잘 낫기 때문이다.

㉠ : 올광 초증 / ㉡ : 올광 중/말증

- 대승기탕은 소음인에게 쓰면 소음인을 죽이는 것임
- 脾弱 : 망양증 / 胃家實 : 올광증
- 올광증 : 비(컨트롤러)는 아직 튼튼한데, 위(행동대장)이 문제
- 올광증은 경증 아니면 중증 → 대승기탕으로 설사시켜도 괜찮기는 함
→ but, 올광 말증 정도만 가도 대승기탕 쓰면 죽음
∴ 결론 : 소음인한테 대승기탕 쓰지마라

(6-20)

- 故 大黃 枳實 厚朴 芒硝之藥 亦能成功於此時而 劇者 猶有半生半死.
- 若用 八物君子湯 升陽益氣湯(八物湯) 與巴豆丹則 雖劇者 亦無 脈弦者生 脈濇者死 之理也.
- 又 太陽病 表證 因在時 何不早用溫補升陽之藥與巴豆 預圖其病而
- 必待 陽明病 日晡發潮熱 狂言時 用承氣湯 使人半生半死耶.
- 그렇기 때문에 대황·지실·후박·망초같은 약도 또한 성공하는 것이 이때이지만 그러나 병이 극심하여 반생반사(半生半死)하게 되어 있는 때라도 팔물군자탕·승양익기탕(승양팔물탕인데, 익기탕으로 잘못 쓴 것 같음)을 파두와 함께 쓰면 비록 극심한 자라도 또한 맥이 현한 사람은 살고 맥이 삽한 사람은 죽어야 할 이치가 없다.
- 또 태양병의 표증이 그대로 있을 때 어찌하여 일찍부터 온보승양(溫補升陽)하는 약과 파두를 함께 써서 미리 그 병을 다스리지 않고서
- 꼭 양명병으로 전속되어서 해질무렵이 되면 조열이 나고 헛소리 할 때를 기다려 대승기탕을 써서 사람으로 하여금 반생반사하게 하는가

- 대승기탕, 소승기탕보다 파두를 써서 예방을 하자
- 온보승기하는 약이나 파두를 사용해라

(6-21)

- 許叔微 本事方曰 一人 病 傷寒
- 大便秘利 日晡發潮熱 手循衣縫 兩手撮空 直視喘急, 諸醫皆走 此誠惡候.
- 仲景 雖有證 而 無法 但云 脈弦者生 脈濇者死.
- 謾且救之 與小承氣湯一服而 大便秘利 諸疾漸退 脈且微弦 半月愈.
- 허숙미의 《본사방》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데
- 대변이 나오지 않고 해질 무렵 조열이 나면서 손으로 옷깃을 어루만지고 꿇매는 형용을 하며 두 손으로 허공을 저어 잡고자 하고 눈동자가 곧추서고 몹시 숨이 차하는 증세에 의사들이 모두 달아나버리니 실로 나쁜 상태이다.
- 장중경의 방(方)에 비록 그 증세는 있어도 치법은 없고 단지 말하기를 맥현자(脈弦者)는 살고 맥삽자(脈濇者)는 죽는다고 한 것뿐이다.
- 이때 속는 셈치고 소승기탕 한 첩을 달여 먹이니 대변이 통하고 모든 증세가 점점 물러가고 맥도 또한 미현(微弦)해지더니 15일 만에 나왔다.

- 밑줄 : 올광 말증의 증상

- 올광 말증 : 승기탕쓰면 절반은 죽으니까 의사들이 도망간 것임. 우리는 도망가지 말고
→ 팔물군자탕 or 독삼팔물군자탕을 쓰자

(6-22)

- 王好古 海藏書曰 一人 傷寒 發狂欲走 脈虛數 用柴胡湯 反劇 以 麥耨歸朮陳皮甘草 煎湯一服 狂定 再服 安睡而愈.
- 왕호고의 《해장서》에 말하기를 한 사람이 상한병을 앓는데 발광을 하면서 밖으로 달아나고자 하며 맥은 허삭(虛數)하여 시호탕을 썼더니 병이 도리어 심해졌다.
- 곧 인삼, 황기, 당귀, 백출, 진피, 감초 등속을 한 첩 달여서 먹이니 발광병(發狂病)이 멎고 또 한 첩을 먹이니 편안히 잠이 들면서 나왔다.

- 상한병 발광질주하는데에는 온보약을 쓰는 것이 좋음

- 발광질주 ㄴ 기인여광

(6-23)

- 醫學綱目曰 嘗治 循衣摸床者 數人 皆用 大補氣血之劑
- 惟一人 兼瞬振脈代 遂於補劑中 略加桂 亦振止脈和而愈.
- 의학강목》에 말하기를 이전에 손으로 옷깃을 어루만지거나 침상을 더듬는 환자 몇 사람을 치료한 경험이 있었다. 모두 氣血을 대보(大補)하는 약을 썼더니
- 그 중 한 사람만이 눈꺼풀에 경련이 일어나고 대맥(代脈)이 나오는 증을 겸하는 것이다. 그리하여 보제(補劑) 중에 계지, 관계를 가하여 다스렸더니 또한 눈의 경련이 멎고 맥이 화(和)하여지고 대맥이 없어지면서 나왔다

- 마찬가지로 발광질주하는데에는 보기하는 약을 쓰는 것이 좋음

(6-24)

- 成無己 明理論曰 潮熱屬陽明 必於日晡時發者 乃爲潮熱也.
- 陽明之爲病 胃家實也 胃實則譫語 手足濇然汗出者 此大便已硬也
- 譫語有潮熱 承氣湯下之 熱不潮者 勿服.
- 성무기의 《명리론》에 말하기를 조열은 양명증에 속하는 것이니 반드시 해질 무렵 열이 나는 것을 조열이라 한다.
- 양명병이라고 하는 것은 胃家가 實해지는 것이다. 위가가 실하게 되면 헛소리를 하고 손발에서 끈끈하게 땀이 흐르는 데 이것은 대변이 이미 굳어 있는 것이다.
- 조열이 있고 헛소리를 하면 승기탕으로 하리시키고 조열이 없으면 승기탕을 쓰면 안 된다.

- (6-24) 조문은 조열이라는 올광 말증 증상을 가져오려고 한거임. 승기탕은 쓰면 안됨

(6-25)

- 朱震亨 丹溪心法曰 傷寒 壞證 昏沈垂死 一切危急之證
- 好人夢一兩 水煎一服盡 汗自鼻梁上出 涓涓如水.
- 주진형의 《단계심법》에 말하기를 상한 괴증에 정신이 혼미하여 거의 죽게 된 경우와 일체 위급한 병증에는 좋은 인삼 1냥을 물에 달여 단번에 먹게 하면 땀이 콧등에서 물방울 흐르듯 떨어진다. (혼심수사 ㄴ 기인여광)

- 인중에 땀이 남 : 소음인의 병이 풀리는 첫번째 증상

(6-26)

- 論曰 右論 皆 以張仲景 **大承氣湯** 始作俑而 可用 不可用 時候難知 故 紛紜多惑 始知 張仲景之不可信也.
- 張仲景 **大承氣湯** 元是 殺人之藥而 非活人之藥則 **大承氣湯** 不必舉論 此 **胃家實病 不更衣發狂證** 當用 **巴豆**全粒 或用 **獨蔘八物君子湯**
- 或 先用 **巴豆** 後用 **八物君子湯** 以壓之.
- 나는 논하기를 위에서 말한 모든 사람의 논술한 바가 모두 장중경의 대승기탕을 대상으로 하였으나 이를 쓸 수 있는 시후(時候)와 쓰지 못하는 시후를 잘 알기 어려워
- 여러 가지로 의혹이 분분하다가 비로소 장중경의 이론을 믿을 수 없음을 깨달았다.
- 장중경의 대승기탕은 원래 소음인에게 살인하는 약이고 사람을 살리는 약이 아니므로 대승기탕을 말할 필요도 없는 것이다.
- 이렇게 위가실(胃家實)하여 대변을 보지 못하고 발광을 하는 증에는 마땅히 파두를 한 알 쓰거나 또는 독삼팔물탕을 쓰는 것이고
- 또는 먼저 파두를 쓰고 후에 팔물군자탕을 써서 병을 눌러야 한다.

- 파두 : 대변비조가 있는 소음인에게 쓸 수 있는 사하제

→ 차가운게 쌓여서 대변이 쌓여있을 때 그걸 파해줌

- 독삼팔물군자탕 : 인삼을 10돈정도 올려서 씹

→ 뜨거운걸 확 올려서 치료

- 위가실, 발광할 때는 파두, 독삼팔물군자탕을 미리써서 예방하자

- 보통 율광증은 뭉쳐있다고 봐서 깨는 약(ex. 대승기탕)을 썼는데, 이제마는 뭉쳐있는게 아니라 순환이 안되는 것이라 보고 보하는 약(ex. 팔물군자탕)을 써야한다고 함

망양증 (6-27 ~ 6-31)

여기서부터 양명병 → 증상이 더 심해지긴 했지만, 아직은 표병 + 양난지기는 손상됨

(6-27)

- 張仲景 曰 陽明病 外證 身熱 汗自出 不惡寒 反惡熱.
- 장중경이 말하기를 양명병 외증은 신열(身熱)이 나고 땀이 저절로 나면서 오한증은 없고 도리어 열을 싫어한다.

- 여기서부터는 증상 위주로 보기

(6-28)

- 傷寒 陽明病 自汗出 小便數則 津液內竭 大便必難 其脾爲約 麻仁丸主之.
- 상한 양명병에 땀이 저절로 나고 소변이 잦으면 진액이 안에서 마르기 때문에 대변을 보기가 어렵게 되는 것이다. 그것은脾가 약(約)해진 것이다. 주로 마인환을 쓴다.

- 이제마는 소음인은 안이 차갑기 때문에 온보해줘야 하지, 발한시키는 약이나 하법을 쓰면 부작용이 생긴다고 말하기 위해 (6-28) 조문을 인용한거임

(6-29)

- 陽明病 自汗出 小便自利者 此爲津液內竭 大便雖硬 不可攻之 宜用蜜導法 通之.
- 양명병증에 땀이 저절로 나면서 소변이 잦은 것은 진액이 안에서 말랐기 때문이다. 비록 대변이 굳어 있을지라도 공격하는 약을 써서는 안 되고 마땅히 밀도법을 써서 통변하게 해야 한다.

- 밀도법 : 관장

(6-30)

- 陽明病 發熱汗多者 急下之 宜大承氣湯.
- 양명병에 발열하면서 땀이 몹시 흐르면 급히 설사를 시켜야 한다. 마땅히 대승기탕을 쓴다.

- 증상을 보여주려고 조문 가져온거지, 대승기탕은 쓰면 안됨

- 汗多 : 망양 말증 증상

(6-31)

- 李梴 醫學入門曰 汗多不止 謂之亡陽 如心痞胸煩 面青膚瞬者 難治
- 色黃手足溫者 可治.
- 凡 汗漏不止 眞陽脫亡 故 謂之亡陽 其身必冷 多成痺寒 四肢拘急 桂枝附子湯 主之.
- 이천의 《의학입문》에 말하기를 땀이 많이 나고 그치지 않는 것을 망양증이라고 하니 가슴이 답답하고 심하를 꼭 틀어막는 것같고 얼굴빛이 푸르고 살이 떨어지는 증은 치료하기 어려운 것이고, 면색이 누렇고 수족이 따뜻한 자는 치료할 수 있다.
- 무릇 땀이 몹시 흐르고 그치지 않으면 眞陽이 빠져 나가기에 이를 망양증이라고 한다.
- 그 몸이 반드시 차고 대개는 비한(痺寒)이 되어 사지가 굳고 까부라진다. 주로 계지부자탕을 써야 한다.

- 전해질이 완전히 빠져나간 상태라고 볼 수 있음. 탈수에 해당함
- 면청 : 비기가 완전히 없어진 사람 → 치료 불가능
- 면황 : 비기의 온기가 아직 있는 사람 → 치료 가능
- 계지부자탕 사용함

망양증 치험례 (6-32)

- 嘗治 少陰人 11勢兒 汗多 亡陽病
- ㉠此兒 勞心焦思 素證 有時以泄瀉爲憂而 每飯時 汗流滿面矣
- ㉡忽 1日 頭痛 發熱 汗自出 大便秘燥
- ㉢以此兒 素證泄瀉爲憂 故
 - 頭痛 身熱 便秘 汗出之熱證 以其反於泄瀉 寒證而
 - 曾不關心 尋常治之 以黃耆 桂枝 白芍藥等屬 發表矣
- ㉣至于4-5日 頭痛發熱 不愈
- 일찍이 소음인 11세 된 아이가 한다망양병(汗多亡陽病)을 앓는 것을 치료한 일이 있다.
- ㉤이 아이는 평소에도 노심초사하는 편이며 때때로 설사하는 것이 걱정이었으며, 밥을 먹을 때마다 온 얼굴에 구슬 같은 땀을 흘린다.
- ㉥그러다가 하루는 갑자기 두통·발열하면서 땀이 저절로 흐르고 대변도 굳어서 불통하게 되었다.
- ㉦이 아이의 평소 설사증을 걱정했기 때문에 두통·신열·변비·한출 등의 열증(熱證)은 한증(寒證)인 설사와 반대되므로 관심을 두지 않고 예사로 치료하여 황기, 계지, 백작약으로 발표(發表)만 해주었더니
- ㉧4,5일이 되었어도 두통·발열이 낫지 않는 것이다

㉠ : 소증 / ㉡ : 현증 / ㉢: 치료 / ㉣ : 결과

- 설사 : 리병 → 소증은 리병에 가까움
- 설사의 리증만을 생각하고 두통, 발열, 한출, 변비를 가볍게 보고 그냥 발표만 시켰는데 낫지 않음
- 망양증으로 진단했어야 하는데, 리한증으로 잘못 판단해서 치료를 못한 실수를 기록함

- 6日 平明 察其證候則 大便燥結 已四五日 小便赤澁二三匙而 一晝夜間 小便度數 不過二三次
- 不惡寒而發熱 汗出度數則 一晝夜間二三四次 不均而
- 人中則或有時有汗 或有時無汗 汗流滿面滿體 其證可惡.
- 始覺 汗多亡陽 證候 真是危證也
- 急用巴豆一粒 仍煎黃耆桂枝附子湯 用附子一錢 連服二貼 以壓之
- 至于未刻 大便通 小便稍清而稍多.
- 6일이 되던 날 아침에야 그 병세를 자세히 살펴보니 대변이 굳어서 못 본지가 이미 4,5일이 되었고 또 소변 빛이 붉고 깔깔하여서 잘 나오지 않아 한 번에 두세 숟갈 밖에 되지 않는데다가 소변을 보는 횟수도 하루 동안에 두세 번 밖에 되지 않았다.
- 오한증은 없으면서 발열을 하며 땀이 흘러나오는 횟수는 하루에 2,3,4차로서 불규칙하였다.
- 인중에는 혹 땀이 있는 때도 있고 또는 땀이 없는 때도 있었다. 그리고 땀이 얼굴과 온몸에 줄줄 흐르고 있으니 그 병이 과연 나쁜 것이라
- 비로소 한다망양병(汗多亡陽病)의 증후란 것을 깨닫고 보니 진실로 위급한 병증인 것이다.
- 급히 파두 한 알을 거각(去殼)하여 먹이고 거듭 황기계지부자탕을 쓰는데 부자를 1돈을 넣고 달여서 2첩을 연복(連服)케 하여 병을 눌러놓았더니
- 오후 1시부터 3시 사이에 대변이 통하고 소변도 약간 맑아지고 양도 조금 많아졌다.

- 6일째 증상을 통해 신수열표열병임을 알게 됨

- 不惡寒而發熱 : 망양 중증

- 소음인의 땀 : 인중에서 나는 경우는 양난지기가 겉에서 싸우려고 하는 것이라고 생각하면 되고, 다른 곳에서 땀이 나는 경우는 자신의 양난지기가 도망간다고 생각하면 됨

- 파두 : 차가운게 뭉쳤을 때 깨주는 약(얼음을 깬다고 생각하면 됨)

- 其翌日 卽 得病七日也 以小兒附子太過之慮故 以黃耆桂枝附子湯一貼 分兩日服矣
- 兩日後 其兒 亡陽證 又作 不惡寒 發熱汗多而 小便赤澁 大便秘結如前
- 面色帶青 間有乾咳
- 病勢比前太甚 其日 卽 得病九日也 時則 巳時未刻也.
- 急用巴豆一粒 仍煎人蔘桂枝附子湯 用人蔘5錢 附子2錢 連二貼 以壓之
- 至于日晡 大便始通 小便稍多而色赤則 一也
- 又用人蔘桂枝附子湯 人蔘5錢 附子2錢 一貼服矣
- 至于二更夜 其兒 側臥而頭不能舉 自吐痰一二匙而 乾咳仍止.
- 그 다음날은 병을 얻은 지 7일이 되는 날이다. 그 동안에 소아에게 부자를 너무 과하게 쓰지 않았는가 걱정이 되므로 황기계지부자탕 1첩을 2일간 나누어 먹게 하였더니
- 이를 후 그 아이의 망양증이 다시 발작하여 오한증은 없이 발열하면서 땀을 몹시 흘리고, 소변은 빛이 붉고 깔깔하며 대변은 굳어서 전변과 같이 통하지 않고 온 얼굴에 푸른빛을 띠고 간간히 마른기침을 하였다.
- 병세가 전변에 비하여 극히 심하게 된 것이다. 그 날은 그 아이가 병을 얻은 지 9일이 되는 날이고 시간은 상오 11시경이었다.
- 그리하여 급히 파두 한 알을 거각하여 먹이고 이번에는 인삼계지부자탕을 써야 되겠기에 인삼 5돈, 부자 2돈을 물에 달여서 2첩을 연복시켜서 병을 눌러놓았더니
- 해질 무렵 되어서 대변을 비로소 통하고 소변은 조금 많아졌으나 빛깔이 붉은 것은 전과 같았다.
- 또다시 인삼계지부자탕에 인삼 5돈, 부자 2돈을 물에 달여서 1첩을 먹이니
- 그날밤 10시쯤 되어서 그 아이가 모로 눕기는 하나 머리를 들지는 못하고 저절로 가래를 한두 숟갈쯤 토하더니 기침도 곧 멎었다.

- 부자의 부작용이 걱정되어 황기계지부자탕 양을 반으로 줄였더니, 망양증이 다시 시작하고 더 심해짐

→ 다시 파두를 쓰고, 이번엔 증상이 더 심해졌으니 황기대신 인삼계지부자탕을 씀

- 其翌日 又用人蔘桂枝附子湯 人蔘五錢附子二錢 三貼
食粥二三匙 每用藥後則 身清冷 無汗 小便稍多而大便必通.
- 又翌日 用此方二貼 食粥半碗
- 又翌日 用此方二貼 食粥半碗有餘
身清冷 自起坐 房室中 此日 卽得病12日也.
- 此三日內 身清冷 無汗 大便通 小便清而多者 連用附子二錢 日二三貼之故也.
- 至于13日 又起步門庭而 舉頭 不能仰面 慙前小兒 附子 太過之慮
用黃耆桂枝附子湯 用附子一錢 每日二貼服
- 至于7-8日 頭面稍得仰舉而 面部浮腫 又每日二貼服
- 至于7-8日 頭面又得仰舉而 面部浮腫 亦減.
- 其後 用此方 每日二貼服
- 自得病初 至於病解 前後一月餘 用附子 凡8量矣.
- 그 다음날 또다시 인삼계지부자탕을 인삼 5돈, 부자 2돈 하여 3첩을 썼더니 죽을 두세 술갈을 먹고 매번 약을 먹은 후에는 몸이 식고 땀이 없어졌다. 소변도 조금씩 많아지면서 대변도 잘 통하였다.
- 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 쓰니 죽을 반 사발이나 먹었다.
- 또 그 다음날에도 이 처방으로 2첩을 썼더니 죽을 반 사발도 더 먹었다. 몸이 식으면서 방 안에서 스스로 일어나 앉았다. 바로 이날은 병이 생긴지 12일이 되는 날이다. 이렇게 3일 동안에 몸이 맑고 개운해지면서 땀이 없어지고 대변이 잘 통하고 소변이 맑으면서 많아지게 된 것은 부자 2돈을 넣고 하루에 두세 첩씩 연 3일 동안에 계속 썼기 때문에 그와 같은 좋은 효과를 본 것이다.
- 13일이 되는 날에는 또 일어나서 문 밖에 나가 걷기도 하나 힘이 없어서 머리와 얼굴을 잘 들지 못한다. 이것은 소아에게 부자를 너무 과하게 쓴 때문으로 생각되어 황기계지부자탕에 부자를 1돈씩 넣고 매일 2첩을 복용케 하여
- 7, 8일이 되자 머리와 얼굴은 조금은 들기는 하지만 얼굴이 부었다. 또 매일 2첩씩
- 7, 8일을 썼더니 얼굴을 더욱 잘 들고 얼굴에 부종도 내렸다. 그 후에도 이 처방대로 매일 2첩씩 썼다. 이 한다면양병이 생긴 날로부터 병이 다 낫기까지 1개월이 조금 지났는데 그 동안 부자를 쓴 분량이 모두 8냥이었다

- 소음인 망양증에는 확실하게 부자를 써서 좋게 해줘야함
- 인삼 : 소음인의 양난지기를 도와줌
- 황기 : 인삼의 작용을 보조
- 부자 : 신국의 한기를 몰아내는 역할

→ 망양은 한기가 넘치기 때문에 한기를 줄이지 않는 이상 잘 낫지 않음.

→ 따라서, 부자를 꼭 쓰게 됨

치험례: 6-32 Progress note

Day	Subjective	Objective			Assessment	Plan
		식사	대소변	기타		
素證	勞心無思		有時以泄瀉	每飯時 汗流滿面		
0	頭痛 發熱 汗自出		大便秘燥		曾不關心尋常治之	
1						發表
4-5	頭痛 發熱 不愈					c 황기 계지 백작 등속
6	不惡寒發熱 汗出度數一日間 2-4次不勻 汗流滿面滿體		大便秘結 4-5일 小便赤澁 2-3匙(一日間 度數 2-3次)	人中或有時有汗 有時無汗	惡證 汗多亡陽證 危證	1. 파두 1粒 2. 황기계지부자탕 2첩 連服 (부자1돈)
			(至于未刻pm1-3) 大便通 小便稍清而稍多			
7-8					附子太過之慮	황기계지부자탕 1/2첩
	不惡寒 發熱汗多		(巳時末刻am11) 小便赤澁 大便秘結	面色帶青 乾咳	亡陽證 又作 病勢 比前太甚	1. 파두 1粒 2. 인삼계지부자탕 2첩 連服 (인삼5돈, 부자2돈)
9			(日晡夜初) 大便始通 小便稍多而色赤			인삼계지부자탕 1첩
				至于二更夜(pm10) 其兒側臥 頭不能舉 自吐痰一二匙 乾咳仍止		

참조 : 우석대학교 오승유

Day	Subjective	Objective			Assessment	Plan
		식사	대소변	기타		
10		食粥2-3匙	每用藥後則 身清涼無汗 小便稍多而 大便必通			인삼계지부자탕 3첩
11		食粥半碗				
12		食粥半碗有餘		身清涼 自起坐房室中		인삼계지부자탕 2첩
13				起步門庭 舉頭 不能仰面	慙前小兒附子太過之慮	
14						
20-21				頭面稍得仰舉 面部浮腫		황기계지부자탕 2첩 (부자 1돈)
28-29				頭面又得仰舉 面部浮腫 亦減		

장중경과 이제마의 양명병 (6-33 ~ 6-34)

(6-33)

- 張仲景曰 陽明病 有三病 太陽陽明者 脾約是也
正陽陽明者 胃家實是也
少陽陽明者 發汗利小便 胃中燥煩實 大便難是也.
- 장중경이 말하기를 양명병에는 세 가지 병이 있으니
- 태양양명(太陽陽明)이라 함은 비약(脾約)이 이것이고
- 정양양명(正陽陽明)이라 함은 위가실(胃家實)이고
- 소양양명(少陽陽明)이라 함은 땀을 많이 내거나 리소변을 많이 해서 胃中이 조변(燥煩)하고 내실(內實)이 되어 대변불통이 된 것이다.

(6-34)

- 論曰 張仲景所論 陽明三病 一曰 脾約者 自汗出 小便利之證也
二曰 胃家實者 不更衣 大便難之證也
三曰 發汗利小便 胃中燥煩實者 此亦胃家實也
其實 非三病也 二病而已.
- 仲景意 脾約云者 津液漸竭 脾之潤氣 漸約之謂也
- 胃家實云者 津液已竭 胃之全局 燥實之謂也.
- 中古戰國秦漢之時 醫家 單方經驗 其來已久 汗吐下三法 始爲盛行
- 太陽病 表證因在者
- 或以麻黃湯 發汗/ 或以猪苓湯利小便/ 或以承氣湯下之
- 承氣湯 下之則 下利不止之證 作矣
- 麻黃湯 猪苓湯 發汗 利小便則 胃中燥煩實 大便難之證 作矣
- 仲景 有見於此 故 以脾約之自汗出 自利小便者
脾之潤氣 漸約 亦將爲胃燥實之張本矣
- 然 脾約 自脾約也
- 胃家實 自胃家實也
- 寧有 其病 先自脾約而後 至於胃家實之理耶.
- 나는 논하기를 장중경이 말한 바 양명병의 세 가지 병에
- 첫째, 비약(脾約)이라 함은 땀이 저절로 나고 소변을 많이 보는 증이고,
- 둘째, 위가실(胃家實)이라 한 것은 대변을 보고자 하여도 굳어서 나오지 않는 증이고,
- 셋째, 발한과 소변을 너무 많이 시켜서 胃中이 말라서 實하게 된다는 것은 이것 또한 위가실이다.

- 그 실상인즉 양명병이 세 가지 증이 아니고 두 가지 증일 따름이다.
- 장중경이 비약(脾約)이라고 말한 뜻은 진액이 점점 말라 비장(脾臟)의 윤기마저 점점 약(約)해지는 것을 말하는 것이고,
- 위가실이라 말한 것은 진액이 이미 말라서 위의 전체가 조실(燥實)하게 된 것을 말하는 것이다.
- 옛날 중국 전국, 진한시대에는 의가들의 단방경험이 이미 오래 전부터 전해져 왔고 汗吐下의 3법이 성행하기 시작하였다.
- 태양병 표증이 그대로 있는 사람을
- 또는 마황탕(麻黃湯)으로 발표(發表)시키고 /또는 저령탕을 써서 리소변시키고 /또는 승기탕을 써서 설사를 시켰다.
- 승기탕을 써서 설사를 시키면 설사가 멎지 않는 증이 생기고
- 마황탕, 저령탕을 써서 발한과 리소변시키면 胃中이 燥煩實하고 대변이 불통하는 증이 생긴다.
- 중경이 이렇게 되는 것을 보았기 때문에 비약(脾約)으로 땀이 저절로 나오고 소변이 잘 나오는 것은 비장의 윤기가 점점 약(約)해져 또한 장차 위가 조실(燥實)하게 되는 근원이 된다고 하였으나
- 비약(脾約)은 본래가 비약이고
- 위가실(胃家實)은 본래가 위가실이다.
- 정녕 그 병이 먼저 비가 약해지고 후에 얼마 있다가 위가실이 될 이치가 있겠는가?

장중경 : 울광이 심해지면 망양이 되고 망양이 나아지면 울광이 됨

이제마 : 비약과 위가실은 아예 다른 것 → 양난지기 손상 없이 시작하는 것은 울광, 손상 없이 시작하는 것은 망양 → 시작 자체가 아예 다르다고 봄

Cf. 비약 : 비가 손상된 것 / 위가실 : 비는 ok. 위가 손상된 것

양명병		
장중경 (6-33)	이제마 (6-34)	
1. 비약	1. 비약(한출, 소변리)	→망양증 중/말
2. 위가실	2. 위가실	→울광증 중/말
3. 發汗利小便 胃中燥煩實 발한리소변 위중조변실	(불갱의, 대변난, 발한소변리, 위중조변실)	

울광증 망양증 비교 (6-35) ★

- 胃家實 脾約 二病 如陰證之太陰少陰病 虛實證狀 顯然不同
- 自太陽病 表證 因在時 已爲 兩路分岐 元不相合.

- 太陽病表證 因在而 其人如狂者 鬱狂之初證也
- 陽明病 胃家實 不更衣者 鬱狂之中證也
- 陽明病 潮熱 狂言 微喘 直視者 鬱狂之末證也
- 太陽病 發熱惡寒 汗自出者 亡陽之初證也
- 陽明病 不惡寒 反惡熱 汗自出者 亡陽之中證也
- 陽明病 發熱汗多者 亡陽之末證也

- 蓋 鬱狂證 都是 身熱 自汗不出也
- 亡陽證 都是 身熱 自汗出也.

** 조문 빨간부분 시험에 자주 나옴! 이제마가 딱 정의해놓은 부분임

- 위가실과 비약의 두 가지 병은 음증의 태음병, 소음병과 같아서 허실 증상이 현저히 다르다. 태양병 표증이 있을 때부터 두 길이 이미 나뉘어져 있기 때문에 원래 서로 합할 도리가 없는 것이다.
- 태양병 표증이 아직 남아 있어서 그 사람이 미친 자와 같은 것은 울광증 초증이요,
- 양명병에 胃家가 實하게 되고 대변을 보고자 하여도 불통되는 자는 울광증 중증이고,
- 양명병에 해질 무렵이 되면 고열이 나타나서 헛소리를 하고 약간 헛떡거리며 눈동자를 곧추세우는 자는 울광증 말증이 된 것이다.
- 태양병에 발열하고 오한증을 일으키면서 땀이 저절로 흘러나오는 자는 망양증 초증,
- 양명병에 오한은 없고 오히려 오열(惡熱)하며 땀이 저절로 흘러나오는 것은 망양증 중증,
- 양명병에 발열하고 땀이 몹시 많이 흘러나오는 자는 망양증 말증이 된 것이다.
- 울광증은 모두 신열이 있고 땀이 나오지 않는 것이고
- 망양증은 모두 신열이 있고 땀이 저절로 많이 흘러나오는 것이다.

- 망양 : 시작 자체가 양난지기 손상부터 시작
- 울광 : 양난지기는 괜찮고 순환에서만 문제가 생겨서 시작

- 自太陽病 表證 因在時 已爲 兩路分岐 元不相合.

: 태양병 표증은 완전히 분리된 상태로 시작하므로 나중에 합쳐질 수 없다

→ 울광증이 망양증으로 갈 수 없다는 뜻

- 울광증도 마지막에 치유 되려할 때 땀을 흘림

- 망양증에서도 마지막에 땀 흘리다흘리다 안나오는 사람이 있음

→ 이럴때는 단순히 땀의 유무만 보고 판단 x + 소증으로 판단

음증 양증과 경중험위 (6-36)

- 陰證 口中和而 有腹痛泄瀉者 太陰病也
- 口中不和而 有腹痛泄瀉者 少陰病也
- 陽證 自汗不出而 有頭痛身熱者 太陽陽明病 鬱狂證也
- 自汗出而 有頭痛身熱者 太陽陽明病 亡陽證也.
- 陰證之太陰病 陽證之鬱狂病 有輕證重證也
- 陰證之少陰病 陽證之亡陽病 有險證危證也
- 亡陽少陰病 自初痛 已爲險證 繼而爲危證也.
- 음증에 입 안이 부드러우면서 복통·설사하는 것은 태음증이고
- 입 안이 부드럽지 못하고 복통·설사를 하는 것은 소음증이다.
- 양증에 땀이 나오지 않고 두통·신열이 있는 것은 태양양명병 율광증이고
- 땀이 저절로 나면서 두통·신열이 있는 것은 태양양명병 망양증이다.
- 음증의 태음증과 양증의 율광증은 경증, 중증이 있고,
- 음증의 소음증과 양증의 망양증은 험증, 위증이 있다.
- 망양증과 소음증은 병이 시작되면서부터 험증이 되고 계속하여 위증이 되는 것이다.

- 음증 : 리한증 / 양증 : 표열증

- 음증에서 태음병 / 소음병 구분기준 : 구중화 / 구중불화

- 양증에서 율광병 / 망양병 구분기준 : 자한출 / 자한불출

	보명지주o	보명지주x
음증(리한증)	태음병	소음병
양증(표열증)	율광병	망양병
분류	↓ 경, 중	↓ 험, 위

망양증에서 소변지표 (6-37)

- 亡陽病證 非但 觀於汗也 必 觀於小便多少也
- 若 小便清利而 自汗出則 脾約病也 此險證也
- 小便赤澀而 自汗出則 陽明病 發熱汗多也 此危證也.
- 然 少陽人裏熱證 太陰人表熱(肝熱證) 亦有汗多而 小便赤澀者 宜察之 不可誤藥.
- 망양병증은 비단 땀만을 볼 것이 아니라 반드시 소변이 많고 적은 것도 보아야 한다.
- 만일 소변이 맑고 많으면서 땀이 저절로 나오면 비약병이 되는 것이니 이는 험증이다.
- 소변이 붉고 갈갈하게 나오면서 저절로 땀이 나게 되면 양명병에 발열다한증이니 이는 위증이다.
- 그러나 소양인 리열병증과 태음인 표열병에도 또한 땀이 많이 나오면서 오줌이 붉고 갈갈한 자가 있으니 판단하여 함부로 약을 잘못 써서는 안 된다.

- 망양증에서는 땀뿐만 아니라 소변의 양과 색을 봐야함

- 소변청리 + 한출 : 험증 (망양증 초증)

- 소변적삼 + 한출 : 위증 (망양증 말증)

위갈지후와 비갈지후 (6-38)

- 胃家實病 其始焉 汗不出 不惡寒 但惡熱 而 其病垂危則 澀然微汗出潮熱也
澀然微汗出潮熱者 表寒振發之力 永竭故也 胃竭之候也
- 脾約病 其始焉 身熱 汗自出 不惡寒 而 若其病垂危則 發熱汗多而惡寒也
發熱汗多而惡寒者 裏熱撐支之勢 已窮故也 脾絕之候也.
- 위가실병은 처음 시작할 때에는 땀이 나지 않고 오한증도 없다. (울광 증증) / 다만 열이 심하다가 거의 죽게 되면 끈끈하게 땀이 약간 나고 열이 조수(潮水)처럼 올랐다 내렸다 하는 것이니 위와 같이 되는 것은 한사(寒邪)를 겉으로 멀쳐 내보내는 힘이 아주 고갈되었기 때문에 나타나는 것이므로 위기(胃氣)가 아주 말라버린 증후인 것이다. (울광 말증)
- 비약병은 시초에 신열이 있고 땀이 저절로 나오나 오한증은 없다가 (망양증증) / 그 병으로 거의 죽게 되면 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것이다. (망양 말증)
- 이렇게 발열하고 땀을 많이 흘리면서 오한증을 일으키는 것은 리열(裡熱)을 지탱해 내는 세력이 이미 다하였기 때문에 비기(脾氣)가 끊어지는 증후인 것이다.

- 위갈지후 : 울광 말증 / 비갈지후 : 망양 말증

- 울광 : 위가 망가짐 / 망양 : 비까지 망가짐(중양 통제까지 깨짐)

- 위가실(=울광 증증, 말증) : 말증에 조열, 땀이 날 수 있음

- 비약병(=망양 증증, 말증) : 말증 증상에 발열한다, 오한이 있음

장중경의 췌음증 (6-39 ~ 6-42)

- 仲景曰 厥陰證 手足厥冷 小腹痛 煩滿 囊縮 脈微欲絕 宜當歸四逆湯. (6-39)
- 凡 厥者 陰陽氣 不相順接 便爲厥 厥者 手足逆冷 是也. (6-40)
- 傷寒 六七日 尺寸脈微緩者 厥陰受病也 其證 小腹煩滿而囊縮 宜用承氣湯 下之. (6-41)
- 六七日 脈至皆大 煩而口噤 不能言 躁擾者 必欲解也. (6-42)
- 장중경이 말하기를 췌음증은 수족이 냉해지고 아랫배가 아프며 가슴이 답답하고 음낭이 쪼그라들고 맥이 가늘어서 끊어지려고 하는 것이니 마땅히 당귀사역탕을 써야 한다. (6-39)
- 장중경이 말하기를 대개 췌(厥)은 음기와 양기가 서로 순합하지 못하고 한편으로 기울어져 췌이 되는 것이니, 췌한다고 하는 것은 수족으로부터 거슬러 냉해지는 것이다. (6-40)
- 상한병이 6,7일이 되어서 촌척맥이 미완(微緩)하면 췌음경에 병이 든 것이다. 그 증세는 소복이 번만하면서 음낭이 쪼그라드는 것이니 마땅히 승기탕으로 설사시키는 것이다. (6-41)
- 상한병이 6,7일이 되어 맥이 크게 뛰고 번민(煩悶)하면서 입이 굳어져서 말은 못 하는데 떠들고 소란을 피우는 자는 병이 반드시 풀리고자 하는 것이다. (6-42)

- 수족궤냉이 가장 특징적인 증상

- 각각의 증상들만 보면 됨 + 제일 중요한 것은 수족궤냉

- (6-41) 조문은 증상만 보기. 승기탕은 쓰면 안됨

- 결론 : 췌음증, 수족궤냉, 소복통 등의 증상 있는데 소음인

→ 태양병 췌음증

주광의 귤음증 (6-43 ~ 6-45)

(6-43)

- 朱肱 活人書曰 厥者 手足逆冷 是也.
手足指頭微寒者 謂之清 此疾爲輕
- 陰厥者 初得病 便四肢厥冷 脈沈微而不數 足多攣.
- 주광의 《활인서》에 말하기를 귤(厥)은 수족이 역랭(逆冷)하는 것이다.
- 수족지두(手足指頭)가 약간 찬 것을 청(淸)이라 하는데 이 병은 경증이고
- 음귤증은 병을 처음 얻을 때부터 오로지 사지가 귤랭하고 맥은 침하고 미약하며 또 빠르지 않다. 흔히 다리에 경련을 일으키는 예가 많다.

- 태양병 귤음증은 경중험위 중 경증

- 초기에는 표열병이었다가 그게 다 풀어지지 않고 시간이 지나면 리한증이 생김

(6-44)

- 傷寒六七日 煩滿囊縮 尺寸俱微緩者 足厥陰經受病也
- 其脈 微浮爲 欲愈 / 不浮爲 難愈
- 脈浮緩者 必囊不縮 / 外證必發熱惡寒 爲欲愈 宜桂麻各半湯.
- 若 尺寸 俱沈短者 必囊縮 毒氣入腹 宜承氣湯下之 速用承氣湯 可保五生一死.
- 六七日 脈微浮者 否極泰來 水升火降 寒熱作而 大汗解矣.
- 상한병이 6,7일에 번만낭축하고 촌척맥이 모두 微緩한 것은 족귤음경에 병을 받은 것이다.
- 그 맥이 약간 부(浮)하면 병이 낫고자 하는 것이고/ 浮脈이 없으면 난치인 것이다.
- 맥이 浮緩하면 반드시 낭축(囊縮)하지 않고/ 외증에 오한·발열이 있으면 병이 낫고자 하는 것이다. 마땅히 계마각반탕을 쓴다.
- 만일 촌척맥이 모두 침단(沉短)하면 반드시 낭축하는 것이고 독기가 복중(腹中)으로 들어가는 것이니 마땅히 승기탕을 써서 설사를 시켜야 한다. 승기탕을 빨리 서둘러서 쓰면 5명은 살고 1명 정도 죽는 것을 보장할 수 있는 것이다.
- 상한병이 6,7일에 맥이 약간이라도 浮脈이 있는 자는 꼭 막혔다가 극에 이르면 태평해지는 것처럼 水氣는 상승하고 火氣는 하강하여 한열이 생기면서 땀을 흘린 후 병이 풀리는 것이다.

- 계마반각탕을 쓴거 보니 땀은 없겠구나 → 그럼 울광증

+ 大汗解矣 : 땀이 나고 병이 풀어짐

→ 소음인 귤음증은 울광에서 비롯되었구나를 알 수 있음

(6-45)

- 諸手足厥冷 皆屬厥陰 不可汗下
- 然 有須汗須下者 謂手足雖逆冷 時有溫時 手足掌心必煖 非正厥逆 當消息之.
- 모든 수족역랭은 다 귤음경에 속하는 것이니 땀을 내거나 설사를 시켜서는 안 된다.
- 그러나 잠깐 땀을 내거나 설사를 시켜야 할 자가 있으니 비록 수족이 역랭하다 할지라도 때로 따뜻한 때도 있어서 손바닥과 발바닥이 따뜻한 것이니 그것은 완전한 귤역(厥逆)이 아니다. 마땅히 짐작하여 볼 것이다.

- 소음인은 수족귤냉이 생기면 중간중간에 따뜻해지지 않음

이천의 귤음증 (6-46)

(6-46)

- 李梴曰 舌券厥逆 冷過肘膝 小腹絞痛 三味蓼萸湯 四順湯主之
囊縮 手足乍冷乍溫 煩滿者 大承氣湯主之.
- 이천이 말하기를 혀가 말리고 사지가 귤역(厥逆)하여 한랭한 기가 팔꿈치와 무릎을 지나며 아랫배가 급하게 잡아 트는 것과 같이 아프면 삼미삼유탕, 사순탕을 주로 쓰고,
- 수족이 잠깐 차졌다 잠깐 더워졌다 하면서 속에는 번열(煩熱)이 팍 차서 번민(煩悶)하는 자에게는 대승기탕을 주로 쓴다.

Cf. 삼미삼유탕 : 오수유3 인삼2 강4 조2 / 사순이중탕 : 인삼 백출 건강 감초 2

- 삼미삼유탕, 사순탕 이 처방들 알려주려고 가져온 조문

→ 소음인 귤음증에는 따뜻한 약 써야함

태양병궤음증 (6-47 ~ 6-48)

(6-47)

- 論曰 張仲景所論 厥陰病 初無腹痛下利等證而
- 六七日 猝然而厥 手足遽冷則 此非陰證之類也
- 乃 少陰人 太陽 傷風 惡寒發熱 汗自出之證
- 正邪相持日久 當解不解而 變爲此證也
- 此證 當謂之 太陽病 厥陰證也.
- 此證 不必用 當歸四逆湯 桂麻各半湯 而
- 當用 蓼莢湯 人蓼吳茱萸湯 獨蓼八物湯
- 不當用 大承氣湯而 當用 巴豆.
- 나는 논하기를 장중경이 말한 궤음병은 처음에는 복통·설사 같은 증상이 없다가
- 6,7일이 되면 갑작스럽게 궤증을 일으키고 손발이 껄랑해진다면 이는 음증의 종류가 아니고
- 곧 소음인의 태양상풍증에 오한·발열하며 땀이 저절로 나는 증이니
- 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 여러 날을 서로 대치함으로써 마땅히 풀릴 것이 풀리지 못하고 변하여 이와 같은 증이 된 것이다.
- 이 병증은 태양병궤음증이라 말하는 것이 마땅하다.
- 이와 같은 증에는 당귀사역탕, 계마각반탕 등의 약은 필요가 없는 것이고
- 마땅히 삼유탕, 인삼오수유탕, 독삼팔물탕의 처방을 써야 한다.
- 그리고 대승기탕을 써서는 안 되고 마땅히 파두를 써야 한다.

- 태양병궤음증 : 표열증이 있는데 꼭 놔두거나 잘못 치료해서 리증같은 증상들이 생긴것.

리증이 아님

- 삼유탕, 인삼오수유탕, 독삼팔물탕 + 막힌 것을 뚫으려면 파두

- 리증 증상을 나타내지만, 리증으로 보면 안됨

(6-48)

- 凡 少陰人 外感病 6, 7日 不得汗解而死者 皆死於厥陰也
- 4, 5日 觀其病勢 用黃耆桂枝湯 八物君子湯 3,4,5貼 豫防可也.
- 무릇 소음인 외감병에 6,7일이 되어 땀을 내지 못하고 죽는 것은 다 궤음에 가서 죽는 것이니
- 4,5일에 그 병세를 자세히 관찰하고 황기계지탕, 팔물군자탕을 3,4,5첩을 써서 미리 예방하여 주면 되는 것이다

- 결론 : 초기에 그냥 율광증일 때 확실하게 치료하는 것이 좋음

수족냉증 처방

- 삼미삼유탕 : 오수유3 인삼2 강4 조2
- 인삼오수유탕 : 인삼10 오수유 생강 3 백작약 당귀 관계 1
- 독삼팔물탕 : 인삼10 황기 백출 작약 당귀 천궁 진피 감초 1 강3 조2

- 따뜻한 약들 위주로 사용된 것을 알 수 있음

태양병궤음증 범주 - 토회증 (6-49 ~ 6-51)

- 朱肱 曰 厥陰病 消渴 氣上衝心 心中疼熱 飢不欲食 食則吐蛔. (6-49)
- 龔信 曰 傷寒 有吐蛔者 雖有大熱 忌下 涼藥犯之 必死.
- 蓋 胃中有寒則 蛔不安所而上膈 大凶之兆也 急用 理中湯. (6-50)
- 論曰 此證 當用 理中湯 日三四服 又連日服
- 或 理中湯 加陳皮 官桂 白何首烏. (6-51)
- 주공이 말하기를 궤음병 소갈(消渴)은 기운이 위로 심장(心臟)까지 치받쳐서 심중(心中)이 뜨겁고 아프며 배가 고파도 먹지 않으며 만일 먹으면 회충을 토한다. (6-49)
- 공신이 말하기를 상한병에 회충을 토하는 증은 비록 대열이 있어도 찬 약으로 설사시켜서는 안 된다. 만일 이것을 어기면 반드시 죽는다. 대개 胃中에 냉한기(冷寒氣)가 있으면 회충이 있을 바를 찾지 못하여 흥격으로 올라가는 것이니 대단히 흉한 징조이다. 급히 이중탕을 써야 한다. (6-50)
- 나는 논하기를 이러한 토회증(吐蛔證)에는 반드시 이중탕을 1일에 3,4첩을 써야 하고 매일 복용시켜야 한다. 또는 이중탕에 진피·관계·백하수오를 가하여 쓰면 더욱 좋다. (6-51)

- 토회증 : 겉에는 열이 있고 안에는 차가운 상태

- 소음인이니까 차가운 약이나 하법은 쓰지말고, 표증에서 시작해서 리증까지 생긴 것이므로 이중탕 써라

중병 험증의 용약법 (6-52)

- 重病 危證 藥不3-4服則 藥力不壯也
- 又 不連日服則 病加於少愈也 或病愈而不決也.
- 連日服者 或日再服 或日一服 或日三服 或二三日連日服
或五六日連日服 或數十日連日服
- 觀其病勢 圖之.
- 중병(重病)과 위증(危證)에는 약을 하루에 3,4첩씩 쓰지 않으면 약력이 충분치 못하고, 또 약을 연일 복용하지 않으면 병이 조금 나아다가 더하기도 하고 또는 병이 나아어도 완쾌되지 못하는 것이다.
- 연일 복용이라 함은 혹은 1일에 2번 또는 1일에 1번 또는 1일에 3번씩, 또는 2,3일간 연복(連服)하고 또는 5,6일간 연복하고 또는 수십 일간 계속하여 복용하는 것이다.
- 그 병의 병세를 잘 헤아려서 다스려야 한다.

- 중증, 위증에는 초반에 충분한 양을 써서 확실하게 잡아야 함

태양병 궤음증이 율광증에서 변증된다는 설 ★

** 6가지 시험에 나올 수 있으니 알아두라고 하심

① 태양병 궤음증은 처음에 발열 오한이 있고 복통 하리는 없었는데, 이후에 복통 하리가 생기는 변증(變證)으로 발전되었다. 처음에 복통 하리 증상이 없으면서 생겼으므로 위수한 리한병이 아니라 신수열표열병이다.

② 태양병 궤음증은 율광증처럼 上熱 煩滿 口乾 등의 열증이 위주인 상태에서 手足厥冷, 小腹滿 등의 리한증상이 겹하여 나타나는 상태로 표리겸병(表裏兼病) 이라고 부른다.

③ 발열오한에 자한이 있으면 망양초증의 증세로 생각할 수도 있지만 태양병 궤음증에서 병의 경과를 설명할 때 땀이 나면서 증세가 풀리는 것으로 보아, 망양 초증의 것으로 해석하기에는 다소 무리가 있다.

- 六七日 脈微浮者 否極泰來 水升火降 寒熱作而 大汗解矣 (6-44)
- 상한병이 6,7일에 맥이 약간이라도 浮脈이 있는 자는 꼭 막혔다가 극에 이르면 태평

해지는 것처럼 水氣는 상승하고 火氣는 하강하여 한열이 생기면서 땀을 흘린 후 병이 풀리는 것이다.

④ 땀이 나면서 병이 완전히 풀려야 하는데, 반 정도 풀리고 반 정도 안 풀린 상태로 있는 것이 궤음증으로 진행되는 과정이라고 설명하는 것은 율광증이 완전히 풀리지 못하고 변증(變證)이 되어 궤음증으로 나타나는 것으로 판단할 수 있다.

- 惡寒汗出 則病必盡解也 而惡寒汗, 而其病 半解半不解者 厥陰之漸也 (8-6)
- 추위 떨고서 땀이 나면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 오한하고 땀이 나고서도 그 병이 반만 풀리고 반은 풀리지 않는 것은 점차 궤음병(厥陰病)으로 전변(轉變)하려는 중이다.

⑤ 궤음증에 쓰인 처방을 보면 황기계지탕을 제외하고는 팔물군자탕이나 독삼팔물탕 그리고 인삼오수유탕과 삼유탕 등도 율광증에 사용되는 처방의 범주임을 처방구성으로부터 볼 수 있으므로 태음병궤음증을 율광증에서 출발한 변증(變證)으로 보았다고 생각할 수 있다.

⑥ 태양병궤음병을 正邪相格日久 當解不解而 變爲此證으로 말하고 있으므로,

- 少陰人 亡陽病 少陽人 亡陰病
- 正邪陰陽 不敵而相格 故 初證已爲險證 繼而因爲危證矣(9-36)
- :소음인의 망양병이나 소양인의 망음병은 정기와 사기, 음과 양이 적수가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 초증이 벌써 험증(險證)이 계속되고 그로 인하여 위증(危證)이 되는 것이다
- 少陰人 胃家實病 少陽人 結胸病
- 正邪陰陽 相敵 而相格 故日久 而後危證始見也(9-36)
- :소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기(正氣)와 사기(邪氣), 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타난다.
- 소음인 위가실병에서 변증(變證)된 것을 알 수 있다.

∴ 태양병궤음증은 율광증에서 시작됨


소음인 울광병 진단기준

순위	임상 표현
1	자각적인 열감 이 있다.
2	가슴이 답답하다.
3	대변 이 굳어져 배변 이 어렵다.
4	두통, 항강통, 요배통, 사지저절통 등이 있다.
5	두면부, 안, 이, 비, 인후, 구설 등에 열증 (홍, 중, 열, 통)이 나타난다.
6	피부에 열증 (홍, 중, 열, 통, 발진, 소양 등)이 나타난다.
7	자한 이 없다.
8	발열이 있다.
9	아랫배가 쉽게 뭉치거나 팽만감이 있다.

소음인 망양병 진단기준

순위	임상 표현
1	자한이 있다 (날씨가 덥거나 운동을 하지 않아도 땀이 난다).
2	자한 에 전신탈력감 또는 현훈이 동반된다.
3	자각적인 열감 이 있다.
4	자한을 많이 흘리면 소변량이 줄고 색이 짙어진다.
5	불안하거나 긴장되었을 때 팔다리나 전신에 힘이 빠지는 것을 느낀다.
6	불안하거나 초조한 마음을 자주 느낀다.
7	잠이 들기 어렵거나 중간에 자주 깬다.
8	가슴이 답답하다.
9	두통, 항강통, 요배통, 사지저절통 등이 있다.
10	두면부, 안, 이, 비, 인후, 구설 등에 열증(홍, 증, 열, 통)이 나타난다.

소음인 표증 처방

* **울광증**

- 팔물군자탕을 가장 많이 씀
- 초기감기 : 천궁계지탕을 많이 사용
- 향사양위탕, 곽향정기산 : 율광증이지만 리증 증상이 생길 때 사용할 수 있음
(ex. 대장파한)

* 망양주
오오오

- 황기계지탕-승양익기탕-보중익기탕 순으로 사용함


**** 여기 나온 처방들은 꼭 알아두기!**

02 소음인 위수한리한병

위수한리한병

- 증상 : 대표적으로 裏寒으로 身寒, 腹滿, 自利 등
- 기전 : 胃中溫氣가 약화되고 상대적으로 강한 大腸局의 寒邪로 인해 팽박받게 되어 발생
- 의미 : 胃氣虛弱으로 인해 腹裏에 寒證(身寒, 泄瀉)이 발생하는 증상

소음인 위수한리한병 기전




- 복리부분에 한증이 생기는 것
- 대장에만 한기가 뭉치면 태음증 / 비까지 손상되면 소음증
(수업 ppt 자세한 설명은 옆 페이지)

- ① 喜情氣의 축급으로 脾胃의 陽煖之氣의 손상이 생김. 이로 인하여 脾局의 水穀熱氣가 약해지고, 腎局의 水穀寒氣가 과도해짐.
 - ② 위에서 대장으로 작용하는 胃氣가 과도해진 신국의 수곡한기로 인하여 내려가지 못함.
 - ③ 胃氣가 대장에 작용하지 못하여 대장에 수곡한기가 과도해져 痼冷積滯가 발생함. 이로 인하여 腹滿을 중심으로한 寒症이 외부로 나타난다.
 - ④ 胃弱한 태음증의 경우는 과대해진 신국의 수곡한기가 胃부위를 압박하는 것이다.
 - ⑤ 脾弱한 소음증의 경우는 과대해진 신국의 수곡한기가 胃와 脾까지 압박하는 것이다.
- 태음증 : 위약하고, 비약까지는 아닌 상태인 순증
소음증 : 위약하고 비약한 상태인 역증

- 회정기의 축급 : 스트레스, 감정적인 문제 등
- 고냉적체 : 냉기가 너무 많아서 대장에 적체된 것
- 태음증 : 위만 약함 → 순증
- 소음증 : 위도 약하고 비도 약함 → 역증

신수열표열증 vs 위수한리한병



- 위수한리한병의 공통증상 : 리한, 복만자리, 신한
- 복만, 자리가 가장 큰 특징

태음병 vs 소음병



- (소음병) 심번, 신체통 : 표열 증상
- 소음병은 리증이지만 표증의 양상도 가지고 있음
- 표리구병(표, 리가 동시에 병든 것)

태음병과 소음병

[공통점]

- 증상 : 泄瀉(설사) (혹은 연변)
- 모두 裏寒(리한)을 공통된 증후로 가진다.
- 모두 胃氣虛弱(위기허약) 즉 胃中溫氣의 약화로부터 시작된 裏寒의 증후를 공통으로 가진다.

[차이점]

① 보명지주인 양난지기의 손상여부

- 태음병 : 脾局陽氣가 乾材한 順證(순증)
- 소음병 : 脾局陽氣가 損傷된 逆證(역증)

② 중심 병증

- 태음병 : 裏寒(리한)이 중심이 되는 병증
- 소음병 : 表裏俱病으로 裏寒(리한)에 表熱(표열)을 겸한 병증.
胃氣虛弱(위기허약)에 脾局陽氣(비국양기)의 손상을 겸하여 表熱(표열)의 병리가 가동

③ 증상 차이점

- 太陰病 : 無口渴(무구갈), 口中和(구중화)
- 少陰病 : 口渴(구갈), 口中不和(구중불화), 心煩(심번), 身體痛(신체통) 表熱(표열) 동반
- 甚時 裏寒과 表熱 모두 甚 → 手足厥冷, 心煩躁

- 소음병 시작할 때 위에서도 못내려가고, 방광에서도 올라가지 못함
- 표리가 다 문제
- 굉장히 위험한 상태. 순환 자체에 문제

태음병

** 각각의 특징적인 증상들 잘 봐주세요

태음병				
태음병경증		태음병중증		
태음병자리증	태음병비만증	태음병황달증	태음병부종증	태음병음독증
1.자리自利 / 2.복만服滿 / 3.무구갈 구중화無口渴 口中和 / 4.신한身寒				
1.자리심自利甚 2.복통腹痛 3.구嘔 4.식불하食不下	1.심하비만 心下痞滿	1.위황萎黃	1.부종浮腫 2.복창腹脹 3.소변불리 小便不利	1.면청피부자반 面靑皮膚紫斑 2.신통여피장 身痛如被杖 3.사지궤냉四肢厥冷

- 태음병 공통증상 : 자리, 복만, 무구갈 구중화, 신한

- 자리증 : 묽은 변을 봄 + 구역

- 비만증 : 명치 아래가 답답함

- 황달증 : 소화를 잘 못 시켰을 때, 체했을 때 누렇게 뜨는 황달

- 부종 : 소화를 못 시키면서 점점 생기는 부종 + 창만, 소변불리

- 음독증 : 피부에 반점들이 생김 + 통증

→ 태양병궤음증과 비슷

→ 태음병에서 시작했지만, 점점 표증 증상도 생긴 것

- 소음병 : 표증과 리증이 동시에 생기는 것

- 태음병음독증 : 리증에서 시작해서 나중에 표증 증상도 같이 겸함

→ ** 차이 꼭 알아두기!

태음병 자리증

증상	-輕證(경증) -食積이 泄瀉를 통해 풀려나가는 단계 -위국의 온기가 대장국의 한기를 쫓아내는 설사 -리병의 공통증상 : 腹滿 自利 -태음병의 공통증상: 無口渴, 口中和, 身寒 -태음병 자리증의 증상: 腹痛(복통), 嘔吐(구토), 食不下(식불하)
치법	溫胃降陰 (온위강음)
처방	백하오이중탕, 백하오부자이중탕
	곽향정기산, 향사양위탕, 강출관중탕 (7-11) 태음증 하리청곡

- 위국이 아직 살아있어 대장에 한기가 많긴 하지만 쫓아낼 수 있는 상태
→ 차가운 한기가 나가는 설사를 함

- 자리증만 가지고 있는 증상 : 복통, 구토, 식불하

- 온위강음 : 아직 양난지기가 있으니, 위를 보하면서 내리는 치법

- 태음증은 백하오 / 소음증은 인삼, 부자 주로 사용

Cf. 인삼이 없을 때 백하오를 쓸 수 있지만, 인삼이 청월기능(=승양익기)이 더 좋음

→ 인삼이 2돈 들어가는 처방(보명지주가 매우 손상된 경우)에서는 백하오로 대체 x

- 곽향정기산, 향사양위탕, 강출관중탕 : 하리청곡 설사가 심해질 때

태음병 비만증

증상	- 輕證(경증) - 食積이 泄瀉를 통해 풀려나가지 못하고 心下에 강하게 痞滿을 형성하게 되는 단계 - 대장국의 한사로 인해 위국의 온기가 찝박 받아 그 기능이 저해되어 발생하는 위국의 병증 - 리병의 공통증상 : 腹滿 自利 / - 태음병의 공통증상: 無口渴, 口中和, 身寒 - 태음병 비만증의 증상: 心下痞滿(심하비만) 心下 부위의 그득하고 답답함
치법	溫胃降陰 (온위강음)
처방	곽향정기산, 향사양위탕, 향사육군자탕, 강출관중탕 (7-11)(7-12)
	계지반하생강탕(비만)
	적백하오관중탕(비만, 황달, 부종), 삼물백산(파두), 파두단 (7-52) (한실결흉, 수결흉)

- 심하비만 : 답답함, but 뭉쳐서 만져지는 것은 아님

→ 소화기 안 되면서 답답함을 느낌

(소음인은 병증이 대부분 소화기 계통의 문제라고 생각하면 됨)

- 적백하오관중탕 : 태음병 비만, 황달, 부종에 모두 사용

→ 태음병 만병통치약 같지만, 사실 십이미관중탕을 더 많이 사용

- 향사양위탕 목적 : 승양익기(울광증) / 온위강음(태음병)

태음병 황달증

증상	- 重證(중증) - 면색 및 피부색의 색택 변화를 초래하는 단계 - 대장국의 한사로 인해 위국의 온기가 찝박받아 그 기능이 저하된 상태에서, 위국에서의 수곡이 제대로 처리되지 못하는 것이 심해져 그 병리적 산물이 전신적으로 파급되어 발생 - 리병의 공통증상 : 腹滿 自利 / -태음병의 공통증상: 無口渴, 口中和, 身寒 -태음병 황달증의 증상: 黃疸(황달), 面色 및 皮膚色의 色澤변화
치법	溫胃降陰(온위강음)
처방	인진굴피탕, 인진사역탕, 적백하오관중탕(비만, 황달, 부종) (7-49)(7-67)

- 사실 이제마는 황달증 치료해본 적이 거의 없음!

→ 적백하오관중탕은 소음인이니까 그냥 넣어놓음

→ 인진굴피탕, 인진사역탕은 앞선 시대에도 썼었으니까 그냥 넣어놓음

태음병 부종증

증상	-重證(중증) -복부부터 시작하여 사지말단에 浮腫形證이 초래되는 단계 -下利를 통해 풀려나가지 못하고 점점 胃氣 허약이 심화되어 웅색해지고 병정이 깊어짐 -대장국의 한사로 인해 위국의 온기가 뭍박받아 그 기능이 저하된 상태에서, 위국에서의 수곡이 제대로 처리되지 못하는 것이 심화되어 전신적인 수액대사에 장애를 초래하여 발생 -리병의 공통증상 : 腹滿 自利 / -태음병의 공통증상: 無口渴, 口中和, 身寒 -태음병 부종증의 증상: 腹脹(복창), 浮腫(부종)
치법	溫胃降陰(온위강음)
처방	십이미관중탕, 적백하오관중탕(비만,황달,부종) 인삼백하오관중탕, 당귀백하오관중탕 궁귀충소이중탕(갑오본 시각) (8-12)

- 십이미관중탕 많이 사용함
- 온위강음 : 여기서 '강음'은 음기를 내려준다는 뜻이 아니라, → 양난지기를 내려준다는 방향성을 의미함

부종지속



- 대장의 하기가 침범해 위국이 약해졌기 때문에 소화력이 떨어짐
- 체기가 있으니까 비만, 체했으니까 황달, 심해지면 부종까지
- '비만-황달-부종' 순으로 심해짐
- 이 세가지는 모두 부종이 될 수 있으므로 부종지속이라고 함
- 적백하오관중탕 : 비만, 황달, 부종에 다 사용할 수 있음

태음병 음독증

증상	- 重證(중증) - 태음병 경증에서 제대로 치료되지 못하여 병기가 지연되어 중증으로 넘어가는 단계 - 소음인 태음병 초기 단계의 병증이 제대로 치료되지 못하고, 병기가 오래 지속되어 발생 - 리병의 공통증상 : 腹滿 自利 / - 태음병의 공통증상: 無口渴, 口中和, 身寒 - 태음병 음독증의 증상: 四肢厥冷(사지궤냉), 面青皮膚紫癰(면청피부자반), 身痛如被杖(신통여피장) - 腹痛 이외의 범발적인 痛證 (咽痛, 鄭聲, 頭痛, 頭汗, 眼睛內痛, 身痛), 面脣指甲青黑(면순지갑청흑), 靜謐而臥(정권이와) 등 陰寒이 극심해지는 증상 (7-14)
치법	溫胃降陰(온위강음)
처방	-인삼계피탕, 인삼진피탕 (7-15) (7-17) -선 파두여의단, 후 온위화해지약(강출관중탕) (7-17)(7-35)

- 표증 증상도 같이 나옴 → 소음병과 구분 주의!
- 특징적인 증상 : 반점
- 진피탕 : 소아음독에 사용(약력이 완만) / 계피탕 : 좀 더 일반적
- 파두여의단, 강출관중탕 : 비만, 황달, 자리가 있을 때 이걸 미리 써서 예방을 하라는 뜻
- 어쩔 수 없이 음독증에 오면 인삼계피탕, 인삼진피탕을 써라

소음병

소음병			
소음병협증		소음병위증	
소음병자리증	소음병하리청수증	소음병장궤증	소음병음성격양증
1.자리自利 / 2.복만服滿 / 3.구갈口渴 구중불화口中不和 4.수족한手足寒 / 5.심번心煩 / 6.신체통身體痛 골절통骨節痛<표열증상>			
1.자리심自利甚 2.복통腹痛	1.하리청수下利靑水 하얀 물설사 2.복통腹痛	1.조무잡정躁無暫定 2.궤厥	1.번조煩躁 2.궤厥 번보다 심한 '조' 3.불능음수不能飲水

- 자리증 : 묽은 설사를 함
- 하리청수증 : 맑은 물을 설사함 → 더 심해짐
- 장궤증 : 조증이 생김. 안절부절 못하고 궤증도 생김
- 음성격양증 : 음이 너무나 상해서 양난지기까지 소멸한 상태
(촛불이 꺼지려고 하면 갑자기 불이 커지는 그런 상태. 양난지기가 소멸하기 전에 불타오르고 가는 상태)

- 장궤이나 음성격양까지 가면 사실 굉장히 위급한 상태
- 음성격양증 : 열이 없기 때문에 물을 먹으려는게 없음(불능음수)

소음병 자리증

증상	-險證(험증) -대장국의 한사로 인해 위국의 온기가 손상되고, 비국양기 또한 손상된 상태에서, 강성해진 대장국의 한사로 인해 발생하는 대장국의 병증 -리병의 공통증상 : 腹滿 自利 -소음병의 공통증상: 口渴, 口中不和, 手足寒, 心煩, 身體痛, 骨節痛을 동반하는 腹滿, 泄瀉 -소음병자리증의 증상: 自利甚(자리심), 腹痛(복통)
치법	健脾降陰(건비강음)
처방	관계부자이중탕 (7-11, 7-22) 소음병 초증이라도 마황을 써서 발한을 시키면 안 된다. (7-29)

- 비국까지도 손상된 상태. 자리가 심해지고 복통도 있음
- 건비강음 : 건비가 특징. 태음병은 위만 봤는데, 소음은 비까지
- 소음병 자체는 험증, 위증으로 가는 위중한 상태 → 마황 사용 x
(소음인의 고냉적체를 뚫을 때에는 마황 대신 파두 사용)

- 관계부자이중탕 : 부자는 신국의 한기를 몰아내는 매우 뜨거운 약

소음병 하리청수증

증상	-險證(험증) -대장국의 한사로 인해 위국의 온기가 손상되고, 비국양기 또한 손상된 상태에서, 대장국의 강성해진 한사로 인해 발생하는 설사가 극도로 심해져 발생한다. -리병의 공통증상 : 腹滿 自利 -소음병의 공통증상: 口渴, 口中不和, 手足寒, 心煩, 身體痛, 骨節痛을 동반하는 腹滿, 泄瀉 -소음병하리청수증: 下利清水(하리청수), 腹痛(복통), 便閉(변폐) 하리청수가 진행하여 便閉가 나타날 수 있다 (7-35)
치법	健脾降陰(건비강음)
처방	- 파두, 관계부자이중탕 (7-35) 소음병의 하리청수-변폐 -下利清水 진행되어 便閉: 선 파두 후 강출관중탕 (7-35) 태음병의 하리청수-변폐

- 자리증 : 찌꺼기 조금 있음 / 하리청수증 : 아예 맑은 물설사
- 내보낼 수 있는걸 다 내보내고 난 다음이니깐 변폐가 생김
- 울광의 대변비조로 인해 생긴건지, 소음병 하리청수로 인한건지 구별하는 것이 중요함!
- 마찬가지로 파두 사용
- 소음병 대표 처방 : 관계부자이중탕 → 무조건 따뜻하게 하면서 내려주는 것을 써야함
- 태음병 하리청수증 : 선 파두 후 강출관중탕
- 소음병 하리청수증 : 선 파두 후 관계부자이중탕

소음병 장궤증

증상	-危證(위증) -소음병에서 險證의 단계에서 심화된 危證 단계로서, 장궤증이나 음성격양증은 매우 위급한 증상이므로 미리 병의 추이를 관찰하면서 한계상황이 오지 않도록 주의해야 한다. -마치 신수열표열병처럼 열증이 두드러진다. -리병의 공통증상 : 腹滿 自利 -소음병의 공통증상: 口渴, 口中不和, 手足寒, 心煩, 身體痛, 骨節痛을 동반하는 腹滿, 泄瀉 -장궤증의 증상: 躁無暫定(조무잠정), 厥證(궤증) (7-37,7-38,7-39) 가슴 속이 달아오르면서 답답하고 편치 않아 손발을 버둥거리는 증상 조바심으로 겉으로 드러나는 모습도 안정되지 않는 증상 주관적 혹은 객관적으로 수족궤냉이나, 범위가 전신까지 넓은 냉증
치법	健脾降陰(건비강음)
처방	관계부자이중탕, 오수유부자이중탕, 삼유탕, 사역탕 (7-39)

- 마치 신수열표열병처럼 열증이 두드러짐
- 특징적인 증상 : 조증이 심해지면서 궤증도 생김
- 장궤증은 위급한 상황

음성격양증

증상	- 危證(위증) - 장궤증과 매우 유사하여 증상이 대동소이하다. - 다만 한사가 위국까지 침범하여 매우 위중한 상태로 변화되어 물을 마실 수 없는 상태까지 도달하게 된다. - 리병의 공통증상 : 腹滿 自利 - 소음병의 공통증상: 口渴, 口中不和, 手足寒, 心煩, 身體痛, 骨節痛을 동반하는 腹滿, 泄瀉 - 음성격양증의 증상: 煩燥(번조), 厥證(궤증), 不能飲水(불냉음수) (7-40, 7-41, 7-42)
치법	健脾降陰(건비강음)
처방	관계부자이중탕, 오수유부자이중탕, 삼유탕, 사역탕, 벽력산 (7-43)

- 음성격양증도 장궤증과 유사함, but 차이점

→ 장궤 : 목을 축이기는 함 / 음성격양 : 물을 아예 마시지 않음

- 소음인은 燥증이 매우 안 좋음 → 음성격양이 장궤보다 더 심각

- 여기까지 오기 전에 하리청수할 때 관계부자이중탕 쓰는 것 추천

- 벽력산 : 대장의 한기가 멎쳐있는 것을 팽하고 깨는 약

→ 이 다음에 관계부자이중탕, 오수유부자이중탕을 사용함

위와 비

- 비는 수곡이 위에 들어가는 것을 도와준다.
- 비는 위에 직접적으로 양난지기를 전달한다.
- 비는 위가 정상적인 기능을 하도록 도와주고 유지한다.

- 태음병은 위약하고 비기는 괜찮기 때문에 온위강음 : 치법상 위병
- 소음병은 위약하고 비기도 약하기 때문에 건비강음 : 치법상 비병

- 율광병, 태음병은 위기만 약해져 있으므로 경중증
- 망양병, 소음병은 위기뿐 아니라 비기도 약해져 있으므로 험위증

- 실질적인 행동대장 : 위 / 컨트롤러 : 비

- 소음병 : 비병 / 태음병 : 위병

소음인 태음병과 소음병의 설사 비교 ★

** 시험에 많이 나온다고 강조하심 → 같은 설사라도 차이가 있음!

- 太陰證과 少陰證은 모두 少陰人의 胃氣가 허약하여 泄瀉하는 증세
- 소음병의 泄瀉를 대수롭지 않게 다스리면 반드시 죽음을 면치 못할 것이다.

태음병 설사	소음병 설사
重證(중증) 중에서도 平證(평증)	危證(위증) 중에서도 險證(험증)
大腸(대장)의 泄瀉	胃中(위중)의 泄瀉
溫氣가 冷氣를 쫓아내는 泄瀉	冷氣가 溫氣를 핍박하는 泄瀉

* 태음병 설사

- 중증이지만 그나마 괜찮고 / 대장에 의한 설사 / 비국이 아직 적군을 몰아낼 수 있는 힘(=온기)이 있어서 온기가 냉기를 몰아내는 것

- 위의 열기가 대장의 커진 한기를 쫓아내기 위해 by 비의 명령

→ 양난지기가 한기를 쫓아내서 나는 설사. 대장의 설사

* 소음병 설사

- 위증에서도 험증 / 위중에 의한 설사 / 대장의 한기가 위까지 올라온 것 / 아군이 본토를 버리고 도망가면서 나오는 설사

- 한기가 위까지 덮침. 비기도 당하고 있는 상태라 위기에 있던 열이 위로 올라가게 되는 데 받을 만큼 받으면 더 이상 위로 올라갈 곳도 없으니까 밖으로 나가게 됨

→ 위의 열기가 도망가면서 나오는 설사

- 소음병은 양난지기 자체가 도망가는 설사니까 굉장히 위험함

태음병 음독증과 소음병

- 두 병증은 한증과 열증이 모두 나타난다.

태음병 음독증	표리겸병 表裏兼病	태음증에서 출발해서 오랫동안 풀어지지 못한 상태에서 背表의 陽氣에도 문제가 생겨나타나는 緩病(완병)
소음병	표리구병 表裏俱病	表裏가 모두 약한 상태이기 때문에 병이 시작할 때 表寒症, 表熱症이 동시에 나타나는 急病(급병)

- 태양병 꺾음증도 표리겸병이자 완병

소음인 위수한리한병 갑오본 신축본의 편제 비교

甲午本		
少陰人 內觸胃病論	太陰病	張仲景 太陰病
		瀉心湯證
		傷寒發黃
		水結胸·寒實結胸
		黃疸
		陰毒證
	少陰病	張仲景 少陰病
		臟厥·陰盛陽隔
		乾霍亂關格病 治驗例
		藏結
少陰人 腎胃病論尾泛論		

辛丑本			
張仲景 太陰病	太陰病	泄瀉를 중심으로 하는 病證	
瀉心湯證			
陰毒證			
乾霍亂關格病 治驗例			
張仲景 少陰病	少陰病		痞滿을 중심으로 하는 病證
臟厥·陰盛陽隔			
傷寒發黃	太陰病		
水結胸·寒實結胸			
藏結			
黃疸(浮腫)			

- 갑오본 : 태음병 / 소음병으로 나누었고 + 장결을 따로 봄
- 신축본 : 설사와 비만 중심으로 나눔 → 위수한리한병은 설사가 중요하다는 관점

태음병 vs 소음병 ★

** 표 잘 알아두기! 강조하심

	태음병	소음병
증	無口渴 口中和 무구갈 구중화	有口渴 口中不和 유구갈 구중불화
심증	心不煩 심불번	心煩 심번
표증	無身體痛 骨節痛 表證 무신체통 골절통 표증	有身體痛 骨節痛 表證 유신체통 골절통 표증
표리병	裏病 表不病 리병 표불병(표증x)	表裏俱病 표리구병
경증험위	重證 中 平證 중증 중 평증	危證 中 險證 위증 중 험증
병기	溫氣逐冷氣之泄瀉 온기가 냉기를 쫓아 내는 설사 胃中溫氣猶勝大腸寒氣而下降 :위중의 온기가 오히려 대장의 한기를 이기고서 내려가는 것	冷氣逼溫氣之泄瀉 냉기가 온기를 핍박 하는 설사 大腸寒氣必勝胃中溫氣而上升 :대장한기가 반드시 胃中의 온기를 이기고 위로 올라가는 것이다.
병변부위	大腸之泄瀉 대장의 설사	胃中之泄瀉 위중의 설사
변증	變證 多 변증 많음	變證 少 변증 적음
치법	溫胃降陰 온위강음 곽향정기산 향사양위탕	健脾降陰 건비강음 관계부자이중탕

- 태음병은 리병은 있지만, 표병 증상은 없음. 소음병은 표리구병

위수한리한병 처방표 ★


위수한리한병		
태음병자리증	백하오이중탕, (백하오부자이중탕)	경
태음병비만증	곽향정기산, 계지반하생강탕, 향사양위탕, 향사육군자탕, 적백하오관중탕, 강출관중탕	
태음병황달증	인진굴피탕, 인진사역탕, 적백하오관중탕	
태음병부중증	십이미관중탕, 적백하오관중탕	
태음병음독증	인삼진피탕(소아), 인삼계피탕(성인)	
소음병자리증	관계부자이중탕	중
소음병하리청수증	파두(하리청수변폐), 관계부자이중탕	
소음병장결증	관계부자이중탕, 오수유부자이중탕	
소음병음성격양증	관계부자이중탕, 오수유부자이중탕	
		위

- 적백하오관중탕 : 비만, 황달, 부중 모두 사용 가능
- 실제 임상에서는 십이미관중탕을 많이 사용함
- 소음병에는 관계부자이중탕 많이 사용함

- 하리청수만 있을 때 : 파두 사용 x, 관계부자이중탕만 사용
- 여기에 변폐까지 있을 때 : 파두쓰고, 관계부자이중탕 사용

소음인 처방 정리 ★

** 처방 이름은 꼭 알아두기! 시험에 많이 나옴



- 곽향정기산, 향사양위탕은 리증 증상에 활용할 수 있음
- 태음증에서는 이중탕이 가장 중요
- 처방의 관계를 잘 알아두기

최린에게

- 일이 잘 되어 기뻐하거나, 일이 실패하여 기쁘지 아니하거나, 자주 기뻐하거나, 자주 기뻐하지 않거나 한다면 이는 모두 양기(陽氣)가 희심(喜心) 때문에 소모될 것이다
- 일이란 될 수 있고, 안 될 수도 있는데 항상 잘 될 것이라고만 생각하면, 바로 이것이 지나친 기쁨(浪喜)인 것이다. 따라서 너무 기뻐하면 마음이 상하게 되니, 기뻐하는 마음을 반드시 경계하여야 한다.

- 최린은 대표적인 소음인

→ 희정기 조심하라고 한걸 보면 소음인이라는 것을 알 수 있음

태음병 (7-1 ~ 7-5)

- 張仲景 曰 太陰之證 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛 (7-1)
- 腹滿時痛 吐利不渴者 爲太陰 宜 四逆湯 理中湯 腹滿不減 減不足言 宜 大承氣湯 (7-2)
- 傷寒 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也 當溫之 宜用 四逆湯 (7-3)
- 太陰證 腹痛自利不渴 宜 理中湯 理中丸 四順理中湯丸 亦主之 (7-4)
- 論曰 右證 當用 理中湯 四順理中湯 四逆湯而
- 古方 草朮 藥力不具備
- 此證 當用 白何烏理中湯 白何烏附子理中湯
- 腹滿不減 減不足言者 有痼冷積滯也 當用 巴豆 而不當用大承氣湯. (7-5)
- 장중경이 말하기를 태음증은 배가 더부룩하면서 토하고 먹은 것이 소화가 되지 않고 설사가 더욱 심하며 복통이 때때로 일어난다.(7-1)
- 복만하고 때때로 아프면서 토하고 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음이 된 것이다. 사역탕 · 이중탕을 쓰고 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 덜하다고 할 수 없는 것은 대승기탕을 쓴다.(7-2)
- 상한에 설사를 하면서도 갈증이 없는 것은 태음증에 속한다. 그것은 장(臟)에 한기가 있기 때문이니 마땅히 속을 따뜻하게 해 주어야 할 것이니 사역탕을 써야 한다.(7-3)
- 태음증은 복통 · 설사를 하면서도 갈증이 없는 것이다. 마땅히 이중탕 · 이중환을 쓰고 사순이중탕과 환(丸)도 주로 쓴다.(7-4)
- 나는 논하기를 이러한 증에 마땅히 이중탕 · 사순이중탕 · 사역탕을 써야 한다고 했지만, 고방이 초창기의 처방이기에 약력이 갖추어지지 못하므로 이러한 증에는 마땅히 백하오이중탕, 백하오부자이중탕을 써야 한다. 배가 더부룩한 것이 꺼지지 않거나 꺼졌어도 뱃속이 답답하다고 말하는 자는 고랭적체(痼冷積滯)가 되어 있는 것이니 마땅히 파두를 써야 하며 대승기탕을 써서는 안 된다. (7-5)

- 증상 위주로 원문 보기

- 소음인은 따뜻한 약재를 써야함

- 고랭적체 : 비국이 작아져서 한기가 눈치 안보고 한기가 딱딱하게 뭉치게 되는 것

→ 이때 대승기탕 쓰지말고, 파두를 써야함

태음병의 처방

처방	구성							기타
이중탕	인삼2	백출2	건강2					자감초1
백하오이중탕	백하오2	백출2	건강2	백작약2	계지2	진피1		자감초1
백하오부자이중탕	백하오2	백출2	건강2	백작약2	계지2	진피1	포부자1	자감초1

태음병 비만 (장중경) (7-6 ~ 7-10)

- 張仲景 曰 病發於陰而 反下之 因作痞。 / 傷寒 嘔而發熱者 若心下滿而不痛 此爲痞 半夏瀉心湯主之 胃虛氣逆者 亦主之。(7-6)
- 下後 下利日數十行 穀不化 腹雷鳴 心下痞硬 乾嘔心煩 此乃結熱 / 乃胃中虛 客氣上逆故也 甘草瀉心湯主之。(7-7)
- 太陰證 下利清穀 若 發汗則 必脹滿 / 發汗後 腹脹滿 用 厚朴半夏湯。(7-8)
- 解後 胃不和 心下痞硬 脇下有水氣 腹中雷鳴 下利者 生薑瀉心湯主之。(7-9)
- 傷寒 下利 心下痞硬 服瀉心湯後 以他藥下之 利不止 與理中湯
- 利益甚 赤石脂禹餘糧湯主之。(7-10)
- 장중경(張仲景)이 말하기를 병이 음증(陰證)으로 발(發)한 것을 도리어 설사를 시키면 이로 인하여 비증(痞症)을 일으킨다. 상한에 발열하고 구역(嘔逆)하면서 가슴이 팍 막혀 답답해하면서도 통증이 없다면 이는 비증이 된 것이다. 주로 반하사심탕(半夏瀉心湯)을 쓰고 또 위(胃)가 허(虛)하여 기역(氣逆)하는 데도 또한 반하사심탕을 주로 쓴다.(7-6)
- 설사를 시킨 후에 설사를 하루에 수십 번씩 하는데 곡물(穀物)이 소화되지 않은 그대로 배설되며 배에서는 천둥소리가 울리며 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 마른 구역질을 하면서 가슴이 답답한 것은 열이 맺힌 것이다. 곧 위중(胃中)이 허(虛)하여 객기(客氣)가 거슬러 올라오기 때문이다. 감초사심탕(甘草瀉心湯)을 주로 쓴다.(7-7)
- 태음증(太陰證)에 음식물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 증에 만일 발한(發汗)을 시키면 반드시 배가 창만(脹滿)해진다. 발한 후에 배가 창만해진 데는 마땅히 후박반하탕(厚朴半夏湯)을 써야 한다.(7-8)
- 땀을 내고 난 후에 위(胃)가 편안하지 못하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하며 옆구리에 수기(水氣)가 있고 배에서 천둥소리가 나며 설사를 하는 증에는 생강사심탕(生薑瀉心湯)을 주로 쓴다.(7-9)
- 상한에 하리(下利)를 하고 명치 밑이 더부룩하고 단단하게 뭉치는 병증에 사심탕(瀉心湯)을 복용시키고 후에 다른 약방(藥方)으로 설사시켰더니 설사가 그치지 않으므로 이내 이중탕(理中湯)을 썼으나 설사가 더욱 심하다. 이렇게 될 때에는 적석지우여량탕(赤石脂禹餘糧湯)을 주로 써야 한다.(7-10)

- 사심탕류에는 황금, 황련처럼 차가운 약도 들어감

→ 이제마는 황금, 황련 등 찬 약이 소음인에게 필요없다고 함

- 결론 : 한기 때문에 병이 생긴거니까 찬 약은 다 빼자 by 이제마

- 설사가 그치지 않으면 이중탕 사용

→ 설사가 더 심해지면 적석지우여량탕 사용
(다 흡착시키면서 내려보내는 약)

처방	구성							
반하사심탕	인삼1.5	반하2	건강1	감초1.5	황금1.5	황련0.5		강3조2
감초사심탕	인삼1	반하1	건강1.5	감초2	황금1.5			대조3
생강사심탕	인삼1.5	반하2	건강1.5	감초1	황금0.5	황련1	생강2	대조3
후박반하탕	인삼1.5	반하1.5		감초0.75			후박3	생강7

태음병 비만 (이제마) (7-11 ~ 7-12)

- 論曰 病發於陰而 反下之云者 病發於胃弱 當用 藿香正氣散 而 反用大黃下之之謂也.
- 麻黃大黃 自是太陰人藥 非少陰人藥則
- 少陰人病 無論表裏 麻黃大黃 汗下 元非可論.
- 少陰人病 下利清穀者 積滯自解也
- 太陰證 下利清穀者 當用 藿香正氣散 香砂養胃湯 薑朮寬中湯 溫胃而降陰
- 少陰證 下利清穀者 當用 官桂附子理中湯 建脾而降陰 (7-11)
- 藿香正氣散 香砂六君子湯 寬中湯 蘇合元 皆 張仲景 瀉心湯之變劑也
- 此 所謂 靑於藍者 出於藍. 噫 靑雖自靑 若非其藍 靑何得 (7-12)
- 나는 논하기를 병이 음증에서 발생한 것을 도리어 하리 시켰다고 말한 것은 곧 위가 약하여 병이 생긴 것이다. 마땅히 곽향정기산을 써야 할 것인데 도리어 대황으로 하리를 시켰다는 것을 말하는 것이다. 마황과 대황은 본시 태음인의 약이고 소음인의 약이 아니다.
- 소음인의 병에는 표증, 리증을 막론하고 마황·대황으로 땀을 내거나 하리를 시킨다는 것은 원래 말할 필요가 없는 것이다.
- 소음인 병에 곡물이 삭지 않고 그대로 설사를 하는 것은 적체가 스스로 풀리는 것이다.
- 태음증에 음식이 삭지 않은 것을瀉하면 곽향정기산·향사양위탕 또는 강출관중탕 같은 것을 써서 위를 덥히고 음기를 내리게(溫胃降陰) 해야 하고
- 소음증에 음식이 삭지 않은 것을瀉하면 관계부자이중탕으로 건비강음 해야 할 것이다.(7-11)
- 곽향정기산(藿香正氣散)·향사육군자탕(香砂六君子湯)·관중탕(寬中湯)·소합원(蘇合元)은 모두 장중경 사심탕(瀉心湯)의 변제(變劑)이니 이것이 이른바 청출어람이다. 청(靑)이 비록 푸르나 그 남초(藍草)가 아니었으면 어찌 푸른 것을 얻었겠는가?(7-12)

- 태음병은 위약에 의해 생긴 것 → 곽향정기산 써야지, 대황은 x
→ 마황, 대황은 소음인 약이 아니라 태음인 약
→ 지금 안이 차가운데 차가운 약으로 사하시키면 안됨

- 태음증의 하리청곡과 소음증의 하리청곡은 천지차이
→ 소음증 : 도망가는 것 / 태음증 : 맞서 싸우는 것

- (7-12) 조문 : 장중경을 너무 까니까 갑자기 장중경 칭송하는 내용

태음병 소음병의 처방

처방	구성							
곽향정기산	곽향1.5 소엽1	창출 백출		계피	건강	진피 청피	감초	반하 대복피 익지인 강3조2
향사양위탕	인삼1	백출1	작약1		건강1	진피1	감초1	반하 황부자 사인 산사 백두 강3조2
강출관중탕	백하오1 적하오1	백출1			건강1 량강1	진피1 청피1		향부자 익지인1 조2
백하오이중탕	백하오2	백출2	작약2	계지2	건강2	진피1	감초1	
백하오부자이중탕	백하오2	백출2	작약2	계지2	건강2	진피1	감초1	부자1
관계부자이중탕	인삼3	백출2	작약1	관계2	건강2	진피1	감초1	부자1-2
오수유부자이중탕	인삼2	백출2	작약1	관계2	건강2	진피1	감초1	부자1-2 오수유 소 회향 파고지

- 인삼 : 비를 도와줌 / 백하오 : 따뜻하게 해주는게 더 큼. 온보
→ 백하오 써야할 곳에 인삼 사용 ok
→ but 비기가 완전히 손상되어서 인삼을 써야할 곳에는 백하오를 쓸 수 없음

태음병 음독증 (7-13 ~ 7-15)

- 張仲景曰 傷寒 陰毒之病 面青 身痛如被杖 五日可治 七日不治 (7-13)
- 李挺曰 三陰病深 必變爲陰毒
- 其證 四肢厥冷 吐利不渴 靜謐而臥 甚則 咽痛鄭聲 可以頭痛頭汗
- 眼睛內痛 不欲見光 面脣指甲青黑 身如被杖
- 又此證 面青白黑 四肢厥冷 多睡. (7-14)
- 論曰 右證 當用 人蔘桂枝湯 人蔘附子理中湯. (7-15)
- 장중경이 말하기를 상한 음독병은 얼굴빛이 푸르고 온몸이 몽둥이로 얻어맞은 것처럼 쑤시며 아프다. 이러한 병증은 5일이 된 것은 치료할 수 있지만 7일이 된 것은 치료할 수 없다. (7-13)
- 이천이 말하기를 삼음병이 심해지면 반드시 음독(陰毒)으로 변하게 된다.
- 그 증상은 수족이 껄랭하며 토하고 설사를 하여도 갈증이 나지 않고 몸을 구부리고 조용히 누워서 잠자기를 좋아하고 극히 심하면 인통(咽痛)이 있으며 헛소리를 하고 여기에 두통과 머리에서 땀이 흐르는 증을 일으키며 눈동자가 아파서 햇빛을 싫어하며 얼굴·입술·손톱이 푸르고 검으며 몸에는 몽둥이로 얻어맞은 것처럼 되어 있다.
- 또 이 증세에는 면색이 청백흑(靑白黑)하며 사지가 껄랭하고 잠을 많이 자는 것이 특징이다. (7-14)
- 위의 증세에는 마땅히 인삼계피탕·인삼부자이중탕을 써야 한다.(7-15)

- 신체통 : 표증 / 토리 : 리증

태음병 음독증 직중음경 (7-16)

- 張仲景 曰 傷寒直中陰經 初來 無頭痛 無身熱 無渴
- 怕寒踡臥 沈重欲眠 脣青厥冷 脈微而欲絕 或脈伏 宜四逆湯
- 四逆者 四肢逆冷也. (7-16)
- 장중경 왈 상한병에 음경을 직중한 것은 처음부터 두통, 신열, 갈증과 같은 증세는 없고 추위하며 구부리고 누워서 침중(沈重)한 모양으로 거름 잠에 빠지고자 하며 입술이 파랗고 사지가 차가워지며 맥이 가늘어서 끊어지려고 하고 혹 맥이 숨어서 나타나지 않는다. 마땅히 사역탕을 써야한다. 사역(四逆)이란 것은 사지가 차갑다는 것이다.(7-16)

- 직중음경 : 복리부분으로 직접 들어간다.

- 초기에는 표증 증상이 없음

→ 처음에는 태음병에서 시작하지만, 나중에는 표증 증상까지 동반하게 됨

→ 표증 증상이 있다고 표증이라고 진단하면 안되고,

→ 태음병 음독증이라고 진단하고 여기에 표증 개별 증상이 나타난다고 봐야함

태음병 음독증 직중음경 건곽란관격 치험례1 (7-17)

- 論曰 嘗治 少陰人 直中陰經 乾霍亂 關格之病
- 時屬中伏節候 少陰人 一人 面部氣色 或青或白 如彈丸圈 4-5點成團
起居如常而 坐於房室中 倚壁 一身 委靡無力而 但欲寐
- 問 其這間原委則 曰 數日前 下利清水1-2行 仍爲便閉
今爲 兩晝夜 別無他故云
- 問 所飲食則 曰 食麥飯云 / 急用 巴豆如意丹
- 一半時刻 其汗 自人中穴出而 達于面上 下利1-2度
- 時當日暮 觀其下利則 清水中 雜穢物而出
- 終夜 下利 10餘行
- 翌日 平明至日暮 又 10餘行 下利 而 清穀麥粒 皆如黃豆大
- 其病 爲 食滯 故
- 連3日 絕不穀食 日所食 但進好熟冷 1-2碗
- 至第3日 平明 病人 面色則 無不顯明而 一身皆冷 頭頸墜下 去地2-3寸而 不能仰舉
- 病證更重 計出無聊
- 仔細點檢 病人一身則 手足膀胱腰腹 皆如冰冷, 臍下全腹 堅硬如石而
胸腹上中脘 熱氣熏騰 炙手可熱 最爲可觀.
- 至第5日平朝 一發吐清沫而 清沫中 雜米穀一朶而出
自此 病勢大減 因進米飲 聯服數碗
- 其翌日 因爲粥食 此病 在窮村故 未暇溫胃和解之藥 (7-17)

	소증 내용은 없음
소증 현증	얼굴 창백하며 얼룩덜룩한 반점, 벽에 기대 앉으려 하고 점차 눕고자 함 곽란 : 토하고 대소변폐 / 건곽란: 토설이 없는 곽란 / 회복중 清水 설사
진단	평소 胃弱의 상태에서 식체로 인해 급증으로 음독증(건곽란관격)이 발생한 것
치방	파두여의단 (강출관중탕을 이어서 써야 하나, 궁촌이라, 온위화해지약을 쓰지 못하였다.) 인중의 땀, 얼굴의 땀(양난지기의 회복) / 설사 하루 10여회 다음날 역시 10여회 설사 중 보리알이 콩만큼 붙어 있던 것을 확인 -> 회복을 돕기 위해 3일간 유동식(송농) 시행
경과	얼굴색 회복했으나, 몸이 차고 목을 가누지 못함 몸이 여전히 얼음처럼 차고 특히 하복부가 돌처럼 단단한데, 상복부는 매우 뜨거움 구토 후 증상이 호전되고 미음과 죽으로 식사를 회복

- 건곽란 : 실질적으로 토하는게 아니고 헛구역질만
- 소음인이 차가운 보리밥을 먹어서 하리청수가 발생
→ 파두로 뚫어줌
- 인중에 땀이 남 = 소음인의 1차적인 회복단계 암시

- 원인이 식체라고 생각하고 송농을 먹게 함
→ but, 파두를 쓰고 온위화해지약(강출관중탕)을 써야했음

태음병 음독증 직중음경 건곽란관격 치험례2 (7-17)

- 其後 又有 少陰人 一人 曰 下利 數次 而 仍下清水 全腹浮腫
- 初用桂附薑陳理中湯 倍加人蔘 官桂 各2錢 附子2錢 或1錢
- 日4服 數日後則日3服 至10餘日
- 遂下利清穀 連3日 3-40行而 浮腫大 (7-17)

소증 현증	소증내용 없음 下利 數次 而 仍下清水 全腹浮腫	계부곽진이중탕 : 관계부자이중탕+곽향 진피 인삼진피탕 : 인삼10 생강 사인 진피 조2
진단	소음인 아이가 음독증(건곽란관격)이 발생	
치방	갑오본에서는 건곽란관격병을 소음증으로 분류했기 때문에 부자가 들어간 계부곽진이중탕을 사용. 신축본 시각에서는 온위이강음하는 태음병음독증 처방(인삼계피탕, 인삼진피탕)으로 변경 가능	
경과	형태가 있는 설사를 3일간 3-40회 했지만 부종은 해소됨(전해질의 균형이 조정) -> 약을 준 뒤 청수가 청곡으로 변하면서 부종이 풀어진 것은 고냉적체가 해소되는 과정	

- 청수보다는 좀 더 나은 것이 청곡
- 갑오본에서는 소음증으로 분류했기 때문에 관계나 부자가 들어간 처방을 씀
- 신축본에서는 십이미관중탕을 쓰는게 가장 적합
- + 인삼계피탕, 인삼진피탕도 괜찮음

태음병 음독증 직중음경 건곽란관격 치험례3 (7-17)

- 又 少陰人 小兒一人 下利清水 面色青黯 氣陷如睡
用 獨蔘湯 加生薑2錢 陳皮 砂仁 各1錢 日3,4服
數日後 下利 10餘行 大汗解 (7-17)

소증 현증 소증 내용 없음

下利清水 面色青黯 氣陷如睡

진단 한증이 극심하여 얼굴색이 푸르고 어두우며 기운이 없는 상태
->하리를 해도 고냉적체가 풀리지 않는 병리적 상태

치방 獨蔘湯 加生薑2錢 陳皮 砂仁 各1錢 (인삼진피탕)

인삼진피탕 : 인삼10 생강 사인 진피 조2

경과 下利 10餘行 大汗解

- 하리, 땀이 나면서 병이 해결됨

◆관격 block and repulsion (disease)

- a diseased state characterized by urinary stoppage and vomiting. WHO 한의학 표준용어집 (2007):169
- 소변을 보지 못하면서 구토가 동시에 나타나는 병증. =관격병(關格病), 관격증(關格證). 대한한의학회 표준한의학용어집 2.1 (2021).

◆소음인 태음병 건곽란관격병증(少陰人 太陰病 乾藿亂關格病證)

- [체질] 소음인 태음병에서 구토, 설사의 동반없이 복통, 복창, 사지궤랭 등의 증상이 급격하게 나타나는 병증. 위중 온기가 급격하게 손상되어 발생한다. 대한한의학회 표준한의학용어집 2.1 (2021).

- 한번 읽어보라고만 하고 넘어가심

태음병 음독증 직중음경 건곽란관격 (7-17) ★

**이거는 꼭 알아두기! 강조하심

- 蓋 少陰人 藿亂關格病 得人中汗者 始免危也

食滯大下者 次免危也

自然能吐者 快免危也

- 禁進粥食 但進好熟冷 或米飲者 扶正抑邪之良方也
- 宿滯之彌留者 得好熟冷 乘熱溫進 則 消化 無異於飲食 雖絕食 2,3,4日 不必爲慮. (7-17)
- 대체로 소음인은 관란(攢亂), 관격병(關格病)에 인중에서 땀이 나면 비로소 위험을 면하게 된 것이고,
- 식체(食滯)가 뚫려서 크게 설사를 하면 다음으로 위험을 면한 것이고,
- 저절로 토하는 것은 꽤히 위험을 면하게 되는 것이다.
- 소음인의 병증이 위와 같을 때에는 밥이나 죽을 가까이하는 것을 금하고 다만 좋은 송능이나 미음을 먹게 하는 것이 正氣를 붙들어 주고 邪氣를 억누르는 좋은 방법이 된다.
- 체증(滯症)이 오래되어서 병이 위중할 때에는 좋은 송능을 따뜻하게 하여 마시게 하면 소화가 잘되고 영양이 되기 때문에 다른 음식을 먹는 것과 다르지 아니하니 비록 절식을 2,3,4일쯤 할지라도 걱정할 필요가 없는 것이다. (7-17)

- 소음인이 태음병 음독증 낫는 과정을 설명하는 조문

- 인중에 땀이 나면 병이 그나마 1차로 풀리는 것을 의미

→ 다른 곳의 땀은 의미 없음

- 식체대하, 자연능토가 생길 경우에는 조금 더 회복된 단계

<소음인의 회복 단계를 쓰시오>

답 : 人中汗 → 食滯大下 → 自然能吐

(인중한 → 식체대하 → 자연능토)

** 이거 시험에 나올 듯. 엄청 강조하심

사상체질의학 4주차

- ㄱ ㅎ ㅈ

01

소음인 위수한리한병

소음병

▶張仲景曰 少陰病 脈微細 但欲寐.(7-18)

▶傷寒 欲吐不吐 心煩 但欲寐 五六日 自利而渴者 屬少陰, 小便色白 宜四逆湯.(7-19)

▶少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯主之.(7-20)

▶下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表 溫裏 宜四逆湯 攻表 宜桂枝湯.(7-21)

▶論曰 右證 當用 官桂附子理中湯.(7-22)

장중경(張仲景)이 말하기를 소음병(少陰病)은 맥이 미세(微細)하고 다만 잠만 자려고 하는 것이다.(7-18)

상한에 토하고자 하여도 토하지 못하고 가슴이 답답하면서 잠만 자려 하다가 5,6일에 이르러 설사를 하면서 갈증이 있으면 소음에 속하니 소변 색이 흰 것은 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 한다.(7-19)

소음병에 전신이 아프면서 수족(手足)이 한랭(寒冷)하고 골절(骨節)이 쑤시고 맥이 침(沈)하면 부자탕(附子湯)을 써야 한다.(7-20)

설사를 하고 복창만(腹脹滿)하면서 신체가 쑤시고 아프다고 하면 그 속(裏)을 먼저 따뜻하게 하고서야 그 겉(表)을 다스려야 한다. 온리(溫裏)를 하려면 마땅히 사역탕(四逆湯)을 써야 하고 겉을 다스리려면 마땅히 계지탕(桂枝湯)을 써야 한다.(7-21)

나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다.(7-22)

-(7-18): 맥이 미세하면서 잠만자려고 하는게 특징!

-(7-19) 토하지 못하고 심번, 잠만자고 설사,갈증있는건 소음병. 사역탕을 쓰는건 따뜻한 약을 쓴 처방이 있다는 것을 보여주기 위해 가져온 것.(소음인은 안이 차갑기 때문에)

-(7-20): 신체통, 골절통은 표증의 특징 → 소음병은 표증의 증상도 나타남: 표리구병이다!

-(7-21): 하리, 복창만, 신체등통 → 사역탕 / 온리→사역탕&공표→계지탕

-(7-22): 이제마왈: 관계부자이중탕 쓰는게 젤 좋다! (따뜻한 약 몽땅 넣은게 좋다~ 소음인은 차가우니까)

▶張仲景曰 少陰病 始得之 反發熱 脈沈者 麻黃附子細辛湯主之.(7-23)

▶少陰病 一二日 口中和 背惡寒 宜附子.(7-24)

▶少陰病 二三日 用麻黃附子甘草湯 微發之 以二三日 無證 故 微發汗也 無證 謂無吐利厥證也.(7-25)

▶下利 脈沈而遲 其人 面小赤 身有微汗 下利清穀 必鬱冒汗出而解

病人 必微厥 所以然者 其面戴陽 下虛故也.(7-26)

▶少陰病 脈細沈數 病爲在裏 不可發汗

少陰病 但厥無汗而 強發之 必動其血

或從口鼻 或從目出 是爲下厥上渴 難治.(7-27)

장중경(張仲景)이 말하기를 소음병이 처음 시작할 때 도리어 열이 나고 맥이 침(沈)한 것은 마황부자세신탕(麻黃附子細辛湯)을 주로 쓴다.(7-23)

소음병 1,2일에 입안이 부드럽고 등이 오싹오싹하면 마땅히 부자탕(附子湯)을 써야 한다.(7-24)

소음병이 2,3일이 될 때에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)을 써서 약간 땀을 내게 한다. 2,3일이 되었어도 증상이 없기 때문에 약간 발한(發汗)을 시키는 것이다. 증상이 없다 함은 토하거나 설사를 하거나 수족이 꺄랭(厥冷)하는 증세가 없다는 것이다.(7-25)

설사를 하고 맥이 침지(沈遲)하며 그 사람의 얼굴이 약간 붉으면서 몸에서 땀이 약간 나고 청곡(淸穀)을 설사하면 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 풀리나 환자가 반드시 약간 꺄랭하였을 것이니 그 이유는 얼굴에 양(陽)이 떠 있고 하초(下焦)는 허(虛)해졌기 때문인 것이다.(7-26)

소음병에 맥이 세침삭(細沉數)하면 병이 속(裏)에 있는 것이니 발한(發汗)을 시켜서는 안 된다. 소음병에 다만 꺄랭(厥冷)만 있고 땀이 없는 증상을 강제로 발한을 시키면 그 피가 동(動)하여

서 입·코 또는 눈에서 출혈한다. 이렇게 되는 것은 하초(下焦)는 꺠랭(厥冷)해지고 상초(上焦)는 피가 고갈된 것이니 난치인 것이다.⁽⁷⁻²⁷⁾

- (7-23) 장중경왓: 발열, 맥침 → 마황부자세신탕. 마황? 발열 때문 (땀이 안나는 경우에 해열을 위해 사용)

⇒ 이러면 부작용이 생긴다는 꺠 알려주려고 이 문장을 가져온 것

- (7-24) 배오한: 표열증상

- (7-25) 장중경: 꺠은 증상인데 그 안에서 또 증상을 자세히 살펴야 함 (조건이 많음)

⇒ 이제마: 그렇게 증상 안에서 또 증상을 세세히 살필 필요 없음. 소음인이면 따뜻하게

- (7-26) 뭉쳐있으니가 汗出하면 풀어진다. 열증의 증상에 땀을 냈더니 낫는 경우가 있어서 마황을 씀

⇒ 일부가 發汗이 통한 것이지 소음인한테 꺠럼 안된다. 이런 증상은 허증이므로 發汗하면 안된다는 꺠 알려주기 위해 이 문장을 가져옴

- (7-27) 맥이 침삭한 경우 리증이 존재하는데 이때 發汗하면 안된다는 부작용의 경우.

⇒ 꺠증이 있고 한이 없을 때 강하게 발한시키면 혈이 동하여서, 하초는 꺠증 상초는 갈증이 생겨서 고치기 어려움

태음병 소음병 비교

▶論曰 張仲景所論 太陰病 少陰病 俱是少陰人 胃氣虛弱泄瀉之證而

太陰病泄瀉 重證中平證也 / 少陰病泄瀉 危證中險證也.

人 但見泄瀉 同是一證而 易於尋常做圖 少陰病泄瀉 尋常做圖 則必不免死.

蓋 太陰病泄瀉 大腸之泄瀉也 / 少陰病泄瀉 胃中之泄瀉也

太陰病泄瀉 溫氣逐冷氣之泄瀉也 / 少陰病泄瀉 冷氣逼溫氣之泄瀉也.⁽⁷⁻²⁸⁾

▶少陰病 欲自愈則 面小赤 身有微汗 必鬱冒汗出而解 故

古人 有見於此 少陰病 但厥無汗者 亦以麻黃 強發汗 欲其自愈而 反動其血

從口鼻出 故 於是乎 始爲戒懼

凡 少陰病 不敢輕易用麻黃而

少陰病 始得之 1,2日 2,3日 初證 以麻黃附子甘草湯 微發之也.

然 麻黃 爲少陰病 害藥則 雖2,3日 初證 必不可用麻黃發之也

此證 當用官桂附子理中湯 或以 桂枝易官桂.⁽⁷⁻²⁹⁾

나는 논하기를 장중경(張仲景)이 논한 바의 태음병과 소음병은 모두 소음인의 위기(胃氣)가 허약하여 설사하는 증세이다. 태음병의 설사는 중증(重證) 중에서도 평증(平證)이지만 소음병의 설사는 위증(危證) 중에서도 험증(險證)인 것이다. 사람들이 다만 설사만을 보고서 동일한 것으로 여겨 대수롭지 않게 취급한다. 소음병의 설사를 대수롭지 않게 취급한다면 반드시 죽음을 면치 못할 것이다. 태음병 설사는 대장(大腸)의 설사이고 소음병 설사는 위중(胃中)의 설사이다. 태음병 설사는 온기(溫氣)가 냉기(冷氣)를 쫓아내는 설사이고, 소음병 설사는 냉기가 온기를 꺠박하는 설사인 것이다.⁽⁷⁻²⁸⁾

소음병이 저절로 낫고자 하면 얼굴빛이 조금 붉어지고 몸에는 약간 땀이 있고 반드시 울모(鬱冒)하다가 땀이 나면서 병이 풀린다. 그러므로 옛 사람들이 이것을 보고 소음병에 다만 꺠증(厥證)만 있고 땀이 나지 않는 경우에도 마황(麻黃)을 써서 억지로 발한을 시켜 병이 저절로 낫게 하려다 도리어 그 혈(血)을 동하게 하여 입과 코로부터 출혈을 하는 까닭에 이제서야 비로소 삼가고 두려워한 것이다. 모든 소음병에 마황을 감히 손쉽게 써서는 안 된다. 소음병이 시작된 지 1,2일이 되었거나 2,3일이 된 초증에 마황부자감초탕(麻黃付子甘草湯)으로 약간 땀을 내게 하였으나 그러나 마황은 본디 소음병에 해로운 약인즉 비록 2,3일이 되는 초증이라도 마황을 써서 발한을 시키면 안 되는 것이다. 마땅히 관계부자이중탕(官桂付子理中湯)을 써야 한다. 혹 관계(官桂)·계지(桂枝)로 대신 바꾸기도 한다.⁽⁷⁻²⁹⁾

- (7-28) 태음병과 소음병 설사를 구분해서 바라보아야함! 태음병설사는 위기가 한기를 쫓아내면서 한기가 나오는 설사이고

소음병 설사는 위기가 힘을 잃고 얼굴로 도망가거나(면소적) 설사로 도망가는 것!

- (7-29)무한꺠증일 때 마황 써서 강하게 발한. 이러면 나중에 혈이 동하면서 더욱 안 좋아짐 (마황쓰면안됨)

관계/계지: 온보⇒관계부자이중탕 / 해표⇒계지부자이중탕 (좀 더 표쪽이 계지(관계말고))

태음병 소음병비교 *14기출(태음병/소음병 병리-온기,냉기)

▶少陰病 初證 因爲險證 繼而爲危證

此病 初證 早不辨證而措置則 危境也. 凡 腹痛自利 無口渴 口中和者 爲太陰病 腹痛自利而 有口渴 口中不和者 爲少陰病 少陰病 有身體痛骨節痛表證 此則 表裏俱病而 大腸寒氣 必勝胃中溫氣而 上升也 太陰病 無身體痛骨節痛表證 此則 裏病表不病而 胃中溫氣 猶勝大腸寒氣而 下降也. (7-30)				
소음병은 초기 증상에 이어 험증이 되고 이어서 위증이 되는 것이니 이 병은 초증에 일찍 병증을 잘 관찰하여 조치하지 않으면 나중에 위험한 처지에 빠지는 것이다. 복통이 있으면서 하리를 하며 구갈이 없고 구중(口中)이 부드러우면 태음병이고 복통·자리하면서 구갈이 있고 구중이 갈갈하면 소음병이다. 소음병에 신체와 골절이 아픈 표증이 있는 것은, 즉 표리가 다 병이 된 것으로써 대장한기가 반드시 胃中の 온기를 이기고 위로 올라가는 것이다. 태음병에는 신체통과 골절통과 같은 표증이 없는데 이것은 속이 병든 것이고 겉은 병든 것이 아니니 위중의 온기가 오히려 대장의 한기를 이기고서 내려가는 것이다. (7-30)				
태음병	무구갈 구중화	신체통,골절통 x	리병 only	위중온기 하강 위중온기>대장한기
소음병	유구갈 구중불화	신체통,골절통 o	표리구병	대장한기 상승 위중온기<대장한기

- 신체통,골절통: 표증 증상

★ 소음병과 태음병의 하리청수 오른쪽 소음병 처방 관련

-소음병의 하리청수: 파두, 관계부자이중탕
-태음병의 하리청수: 下利清水 진행되면 바로 便閉가 생김: 선 파두 후 강출관중탕

소음병 증상

▶張仲景曰 少陰病 自利純青水 心下痛 口燥乾者 宜大承氣湯.(7-31)
▶朱肱曰 少陰病 口燥咽乾而渴 宜急下之 非若陽明 宜下而可緩也.(7-32)
▶李杲 東垣書曰 少陰證 口中辯 口中和者 當溫 / 口中乾燥者 當下
少陰證 下利辯 色不青者 當溫 / 色青者 當下 (7-33)
▶李梴曰 舌乾口燥 或下利清水 譫語便閉 宜小承氣湯 / 脣青 四肢厥冷 指甲青黑 宜薑附湯.(7-34)
장중경(張仲景)이 말하기를 소음병에 순전히 푸른빛 물설사를 하고 명치 밑이 아프며 입 안이 바짝 마르는 자에게는 마땅히 태승기탕(大承氣湯)을 쓴다.(7-31) 주굉(朱肱)이 말하기를 소음병에 <u>입과 목 안이 마르고</u> 갈증이 있으면 급히 설사를 시켜야 한다. 비록 양명병이 아니더라도 마땅히 설사를 시키는데 완하제(緩下劑)를 써야 한다.(7-32) 이고(李杲)가 《동원서(東垣書)》에 말하기를 소음증은 구중(口中)을 보고서 판단해야 할 것이니 입 안이 부드러운 자는 마땅히 온약(溫藥)을 써야 하고 입 안이 말라서 물기가 없는 자는 마땅히 하리를 시켜야 한다. 또 소음증은 하리를 보고서 판단해야 하는 것이니 대변 색이 푸르지 않으면 마땅히 온(溫)한 약을 써야 하고, 대변이 청색(靑色)이면 마땅히 설사를 시켜야 한다.(7-33) 이천(李梴)이 말하기를 혀가 마르고 입 안에 물기가 없으며 또는 맑은 물 설사를 하다가 변이 막히고 헛소리를 하거든 마땅히 소승기탕(小承氣湯)을 쓰고 입술이 푸르고 사지가 꺾랭(厥冷)하면서 손톱이 청흑(靑黑)하면 마땅히 강부탕(薑附湯)을 써야 한다.(7-34)

- (7-31) **하법(대승기탕) 쓰지 말라고** 이 문장 가져옴 / 구건조: 구중불화와 비슷

- (7-32) 구조, 인건하면 하법 써라: 하법을 썼다가 부작용이 생기니까 계속 조건이 더 붙는 것
⇒ 이제마는 한법, 하법 쓰지 말라고 하기 위해 이 문장 가져옴

- (7-33) 따뜻한 약을 쓰라고 얘기 나옴

- (7-34) 순청, 사지꺾랭, 지갑청흑 → 강부탕: 뜨거운 약써라

⇒ 약한 하법(소승기탕), 뜨거운약 써라: 점점 하법 쓰지말고 **온법 쓰라는 얘기가** 나옴

소음병 처방

▶ 論曰 下利青水者 欲下之則 當用 巴豆 / 欲溫之則 當用 官桂附子理中湯. 下利青水 仍爲便閉者 先用 巴豆 / 後用 薑朮寬中湯.(7-35)
내가 논하기를 푸른 물 설사를 하는 것을 하리 시키고자 한다면 마땅히 <u>파두(巴豆)</u>를 써야 하고 따뜻하게 하고자 한다면 마땅히 <u>관계부자이중탕(官桂付子理中湯)</u>을 써야 한다. 또 맑은 물 설사를 하고 이내 대변이 막히면 먼저 파두를 쓰고 후에 강출관중탕(薑朮寬中湯)을 써야 한다.(7-35)

- 하법 쓰고 싶으면 **따뜻한** 사하제인 **파두**를 써라 (소승기/대승기 쓰지 말고)
- 태음병에는 하리**청수**가 아니라 하리**청곡**이다! 구분하기.

소음병 치험례 ★18기출

▶ 嘗見 少陰人 10歲兒 思慮耗氣 每有憂愁 1,2日 則 必腹痛泄瀉 1,2日 用白何烏理中湯 2,3,4貼 或甚則 附子理中湯 1,2貼則 泄瀉必愈矣 忽一日 此兒 心有憂愁 氣度不平 數日故 豫治次 用白何烏理中湯 2貼則 泄瀉因作 下利青水 連用6貼 青水不止 急用附子理中湯 6貼 青水變爲黑水 又2貼 黑水泄瀉 亦愈 又2,3貼調理 以此觀之則 下利青水者 病人 有藹亂關格而後 成此證也 此證 當用巴豆 破積滯痼冷 自是無疑. 此兒 10歲 冬12月 有下利青水病 11歲 春2月 又得亡陽病(7-36)
정리하면,

소증 현증	소증 : 평소 생각이 많고 걱정이 많으며, 그럴 경우 복통, 설사를 한다. 기왕력 P/H : 걱정이 많고 복통, 설사를 할 때 백하오이중탕이나 부자이중탕 처방으로 치료 현증: 걱정과 스트레스로 복통 설사 발생
진단	1차 진단 : 이전 경험으로 쉽게 판단하고 그래도 투약 2차 진단 : 소음병 하리청수 (2차진단을 내리고 깨달은것; 객관관격이 된 후에 설사가 발생할수도있다)
처방	1차 처방 : 백하오이중탕 (태음병으로 오인하여 잘못된 처방) 2차 처방 : 부자이중탕 (올바른 처방) 백하오이중탕 처방 후 하리청수가 심해짐 부자이중탕 처방 후 하리청수가 흑수로 바뀌면서 호전
경과	그 후에 11살 봄 2월에 망양증 발병

소음증 장결(藏厥) ★14기출(장결의 주요증상 한자로)

▶ 朱肱曰 <u>躁無暫定</u> 而厥者 爲藏厥 (7-37) ▶ 李梴曰 藏厥者 <u>發躁無休息時 發熱</u> 7,8日 脈微 膚冷而躁 或吐或瀉 無時暫安者 乃厥陰眞藏氣絕 故曰 藏厥 仲景 無治法而四逆湯 冷飲救之 / 又 少陰病 厥而吐利發躁者 亦不治而 三味蓼莢湯救之. (7-38) ▶ 論曰 少陰人 <u>喜好不定而計窮力屈</u>則 心煩躁也 少陰病 傷寒 欲吐不吐 心煩但欲寐者 此非計窮力屈之病乎. 蓋 <u>喜好者 所慾也</u> 何故 至於計窮力屈而 得此少陰病乎 何不早用‘<u>君子寬平心</u>’乎. 然 初證 傷寒 欲吐不吐 心煩 但欲寐者 早用藥則 猶可免死也 其病 至於躁無暫定而厥則 勢在極危也豈 不可憐乎.
--

此證 當用 蓼莢湯 四逆湯 官桂附子理中湯 吳茱萸附子理中湯. (7-39)

주광 왈 躁證으로 잠시도 가만히 있지 못하고 사지가 곁랭한 것은 장결(藏厥)이 된 것이다.(7-37)

이천이 말하기를 장결은 조증을 일으켜 잠시라도 멎는 때가 없는 것이니, 발열한지 7,8일에 맥이 미약해지고 피부는 차면서 조증이 발작하며, 또는 토하고 또는 설사가 나서 잠시도 안정을 이룰 수가 없는 것은 곧 곁음의 진장(眞藏)의 기운이 끊어진 것이다. 그러므로 장결이라 이름했다.

중경도 치법이 없어서 사역탕을 차게 마심으로써 구해 보고자 하였다.

소음병에 사지곁랭하고 토하고 설사를 하면서 조바심을 하는 증에도 또한 치법이 없으니 삼미삼유탕으로 구해 보라고 하였다 (7-38)

나는 논하기를 소음인이 기뻐하고 좋아하는 것이 일정치 않아 계교와 힘이 다하게 되면 가슴이 번조하게 된다.

소음병 상한에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자는 이는 계교가 궁하고 힘에 부쳐서 생긴 병이 아니겠는가?

대개 희호(喜好)라 함은 욕심내는 바이니 어찌하여 계교와 힘이 다한 후에 이르러 이런 소음병을 얻었는가?

어찌하여 일찍부터 군자의 너그럽고 평온한 마음씨를 쓰지 못하였는가?

그러나 상한 초증에 토하려고 하여도 토하지 못하며 가슴이 답답하고 다만 잠만 자려 하는 자에는 일찍부터 약을 쓰면 오히려 죽음을 면할 수 있지만,

그러나 그 병이 조증이 되어 잠시도 안정을 이루지 못하고 수족이 곁랭하기에 이르러선 병세가 극히 위험한 지경에 놓여 있으니 어찌 가련하지 않겠는가?

이 병증에는 마땅히 삼유탕, 사역탕, 관계부자이중탕, 오수유부자이중탕을 써야 한다. (7-39)

-장결은 躁無暫定 7-37 = 發躁無休息時 發熱 7-38 = 조증이 휴지기 없이 계속 생기는 것

→삼미삼유탕 (by 이천)

✓ 장결이 생기는 이유 7-39

-희호부정(喜好不定): 희정기라고 할 수 있는 스트레스, 불안정지심이 생긴 것

-계궁력굴(計窮力屈): 계책이 다 되어 아무것도 못하게 되는 상황

-喜好者 所慾也: 희호는 자기 몸만 챙기는 것, 자기가 능력이 안 되는데 남한테 받기만을 바라는 것이기 때문에 욕심이라고 했다.

-군자관편심(君子寬平心) 있으면 병 안 걸릴텐데 왜 욕심부리냐며 안타까워함

: 소음증 장결처럼 심한 병은 마음적인 스트레스에 의해 더 심해짐

⇒ 마음을 같이 안정을 시키면서 약을 써야 나올 수 있음!

소음병 음성격양

▶朱肱曰 病人 身冷 脈沈細而疾 煩躁而不飲水者 陰盛隔陽也

若飲水者 非此證也

厥陰病 渴欲飲水者 小小與之 愈. (7-40)

▶成無己曰 煩 謂心中鬱煩也 /躁 謂氣外熱躁也

但煩不躁 及先煩後躁者 皆可治 / 但躁不煩 及先躁後煩者 皆不可治.

先躁後煩 謂怫怫然更作躁悶 此 陰盛隔陽也.

雖大躁 欲於泥水中臥 但水不得入口 是也

此 氣欲絕而爭 譬如燈將滅而暴明. (7-41)

▶李梴曰 傷寒 陰盛隔陽

其證 身冷反躁 欲投井中 脣青面黑 渴欲飲水復吐

大便自利黑水 六脈 沈細而疾 或無脈

陰盛隔陽 大虛證也 宜 霹靂散

又曰 厥逆煩躁者 不治(7-42)

▶論曰 此證 當用 官桂附子理中湯 吳茱萸附子理中湯 或用霹靂散. (7-43)

▶藏厥 與 陰盛隔陽 病情 大同小異 俱在極危 如存一髮 措手難及

若 論 此病之可治

上策 莫如此證 未成之前 早用 官桂附子理中湯 吳茱萸附子理中湯.(7-44)

주굉(朱肱)이 말하기를 환자의 몸이 차고 맥이 침세(沉細)하고 빠르며 번조를 하면서도 물을 마시지 못하는 것은 음성격양증이다. 만일 물을 마시는 자는 이증이 아니다. 걸음병(厥陰病)에는 목이 말라서 물을 마시고자 하는 자에게는 조금씩 먹게 하면 병이 낫는다.(7-40)

성무기(成無己)가 말하기를 번(煩)은 가슴 속이 답답하고 갑갑한 것을 말하는 것이고 조(躁)는 기운이 밖으로 나와 더워서 손발을 흔드는 것을 말하는 것이다. 번증만 있고 조증은 없는 것과 선번후조(先煩後躁)하는 증은 다 치료할 수 있지만 조증만 있고 번증은 없는 것과 선조후번(先躁後煩)하는 증은 다 치료할 수 없다. 이것은 마치 벌떡 성을 낸 후 다시 답답하여 괴로워하는(=怫怫然更作躁悶) 심정과 같으니 이는 음성격양(陰盛隔陽)이 된 것이다. 비록 조증이 크게 심하여서 진흙탕 물에라도 들어가 눕고자 하면서도 물을 입으로 넘기지도 못하는 것이 바로 이것이다. 이는 진기가 끊어지려고 하여 투쟁하는 것이니 비유하면 등잔불이 거의 꺼지려고 할 때 불안간 반짝 밝아졌다가 꺼지는 것과 같은 것이다.(7-41)

이천(李梴)이 말하기를 상한에 음성격양(陰盛隔陽)은 그 증세가 몸은 얼음같이 차가운데 도리어 번조가 심해서 우물이라도 뛰어들려고 하고 입술은 검푸르며 얼굴빛은 검으며 목이 몹시 말라서 물을 마시고는 도로 토하며 설사를 하되 빛이 검다. 육맥(六脈)이 침세(沉細)하면서 빠르며 또는 맥이 없어진다. 이것은 음성격양의 대허증(大虛證)이다. 마땅히 벽력산(霹靂散)을 써야 하고 또 말하기를 걸음하면서 번조하면 불치하는 것이다.(7-42)

나(=이제마)는 논하기를 위의 병증에 관계부자이중탕(官桂附子理中湯) · 오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 마땅히 써야 하고 또는 벽력산(霹靂散)을 쓴다.(7-43)

장궤와 음성격양은 병정(病情)이 대동소이하여 모두 지극히 위극한 증세이다. 진기가 마치 머리카락 한 올이 남아 있는 것이라 너무 급하여 손을 댈 틈이 없게 된 것이다. 만일에 이 병을 다스리는 데 제일 좋은 대책을 말한다면 이와 같이 막심한 병증이 생기기 전에 일찍부터 관계부자이중탕(官桂付子理中湯) · 오수유부자이중탕(吳茱萸付子理中湯)을 써야 한다.(7-44)

- (7-40) 주굉왈음성격양은 장궤보다 더 심해진 상태: 번도 있고 조도 생기는. 물도 못 먹는 상태

- (7-41) 성무기왈 갑자기 화를 내고 나서 걱정하는 것이 음성격양

비유하자면 촛불이 꺼지려고 하기 직전에 잠깐 밝아지는 것과 같다.(양난지기가 말라가는 상황이다.)

- (7-42) 이천왈 음성격양증은 대허증 (위국의 열기가 없으므로) ⇒ 벽력산을 써라

- (7-43) 이제마왈 대허증이므로 뜨거운 약인 관계/오수유부자이중탕, 벽력산 써야 함

- (7-44) 장궤이나 음성격양이 거의 똑같다

-벽력산: 뽕뚫어주는 마지막 폭탄느낌(부자에 차,꿀을 넣은 처방임)

논문소개)

소음인 오수유부자이중탕을 이용한 저혈압 및 사지궤냉을 동반한 고령의 극심한 식욕부진 환자 치험 1례)

->주소증이 식욕이 매우 저하되어있고 자주 소변을 보고 물을 마시고 싶지 않으며 찬물은 더욱 좋아하지 않으며 몸이 찬(사지궤냉) 사람에게 소음인이라고 판단하고 오수유부자이중탕을 사용.

소음인 설사

►凡 觀少陰人病 泄瀉初證者 當觀於心煩與不煩也

心煩則 口渴而 口中不和也 / 心不煩則 口不渴而 口中和也.

觀少陰人病 危證者 當觀於躁之有定無定也

欲觀躁之有定無定則 必占 心之範圍 有定無定也

心之範圍 綽綽者 心之有定而躁之有定也 / 心之範圍 耿耿者 心之無定而躁之無定也.

心雖耿耿忽忽 猶有一半時刻 綽綽卓卓則 其病可治

可治者 用薑附而可效也.(7-45)

►凡 少陰人 泄瀉 日 3度 重於 1,2度也

4,5度 重於 2,3度也而

日 4度 泄瀉則 太重也

泄瀉 1日 輕於 2日也

2日 輕於 3,4日也而

連3日 泄瀉則 太重也.

少陰人 平人 1月間 或泄瀉2,3次則 不可謂輕病人也

1日間 乾便3,4度則 不可謂輕病人也.

下利清穀者 雖日數十行 口中必不燥乾而冷氣外解也

下利清水者 腹中 必有青水也若下利黃水則 非清水而又必雜穢物也.(7-46)

무릇 소음인의 병에 설사를 처음 할 때에 마땅히 잘 살펴보아야 할 것은 **심번증이 있나 없나를 꼭 살펴야 하는데 심번증이 있으면 입이 말라서 구중(口中)이 불화(不和)하고 심번증이 없으면 입이 마르지 않고 구중이 부드러운 것이다.** 또 소음인병의 위증(危證)에 있어서는 마땅히 조증(躁證)이 안정한가 안정되지 못한가를 잘 살펴야 한다. 조증이 안정한가 안정되지 못한가를 살펴보려면 반드시 마음의 범위가 안정되어 있나 안정하지 못한가를 알아보아야 한다. **마음의 범위가 침착하고 여유가 있는 자는** 그 마음도 안정되고 조증도 안정되어 있는 것이고, **마음의 범위가 편안치 못한 자는** 그 마음도 안정되지 못하고 조증도 안정되지 못한 것이다. 비록 마음이 편안하지 못하여 감짝감짝 놀랄지라도 오히려 그 마음을 잠시동안 만이라도 침착하고 여유롭게 한다면 그 병을 치료할 수 있는 것이다. 치료 가능한 것은 건강(乾薑)·부자(附子)를 쓰면 효과를 보는 것이다.(7-45)

무릇 소음인이 설사하는 데 1일에 3회 한다면 1,2회보다는 중하고 1일에 4,5회 한다면 2,3회보다 중하다. 설사를 1일 4회 한다면 매우 중한 것이다. 설사를 하루 하는 것은 2일 하는 것보다 경(輕)하고 2일간 하는 것은 3,4일간보다는 경하다. 설사를 3일간 계속하는 것은 태중(太重)한 것이다. 소음인으로서 보통 건강한 사람이 1개월간에 설사를 2,3차 한다면 경증 환자라 볼 수 없고 또 하루에 굳은 대변이라도 3,4회 본다면 경증 환자라 볼 수 없다. 청곡(淸穀) 설사를 하는 것은 비록 1일에 수십 번을 하더라도 반드시 구중이 건조하지 않고 냉기가 밖으로 풀리는 것이다. 청수(淸水) 설사하는 것은 복중에 반드시 청수가 있는 것이고, 황수(黃水) 설사를 한다면 이것은 청수가 아니고 반드시 찌꺼기가 섞여 있는 것이다.(7-46)

- (7-45) 심번→구갈 구중불화 / 심불번→구갈x, 구중화: 구갈, 구중화 여부로 심번의 유무 판단
- 마음의 여유가 있는지 없는지를 통해 → 조증을 판단
- (7-46) 설사의 횟수가 중요함
- 하리청곡(수일 번조가 없으면 풀어짐)→하리황수(찌꺼기)→하리청수 순으로 악화되는 것

태음병 부증지속: 황달

▶張仲景曰 傷寒 七八日 身黃如梔子色 小便不利 腹微滿 屬太陰 宜茵陳蒿湯

傷寒 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃.(7-47)

▶李梴曰 天行疫癘 亦能發黃 謂之瘟黃 殺人最急 宜瘴疸丸.(7-48)

▶論曰 右證 當用 茵陳橘皮湯 茵陳附子湯 茵陳四逆湯 瘴疸丸 或用 巴豆丹.(7-49)

장중경(張仲景)이 말하기를 상한 7,8일에 몸이 치자색 같이 노랗고 소변이 나오지 않으며 복부가 약간 부르면 태음증에 속하는 것이니 마땅히 인진호탕(茵陳蒿湯)을 써야 한다. 상한에 다만 머리에서 땀이 나고 다른 곳은 나지 않으며 목둘레에 까지만 땀이 나고 소변이 잘 나오지 않으면 반드시 몸에 황달이 발생하는 것이다.(7-47)

이천(李梴)이 말하기를 유행하는 역려(疫癘)에서도 황달이 되는 경우가 있는데 이것을 온황(瘟黃)이라 한다. 사람을 죽게 하는 것이 가장 급하니 마땅히 장달환(瘴疸丸)을 써야 한다.(7-48)

나는 논하기를 위와 같은 황달병에는 마땅히 인진굴피탕(茵陳橘皮湯)·인진부자탕(茵陳付子湯)·인진사역탕(茵陳四逆湯)·장달환(瘴疸丸)·파두단(巴豆丹)을 쓴다.(7-49)

- (7-47) 장중경알황달에 인진을 많이 사용

- (7-48) 이천왕온황 > 장달환

여기서 황달은 식체했을 때 얼굴이 누렇게 뜨는 위황도 같이 생각한 것.(담즙정체는 경험x)

태음병 부증지속: 황달 처방

처방	구성
茵陳蒿湯인진호탕	인진 10 대황 5 치자 2
茵陳橘皮湯인진굴피탕	인진 10 진피 백출 반하 생강 1
茵陳附子湯인진부자탕	인진 10 부자포 감초 1
茵陳四逆湯인진사역탕	인진 10 부자포 건강포 감초
瘴疸丸장달환	인진 치자 대황 망초 10 행인 6 상산 별갑 파두상 4 두시 2 (제환)
巴豆丹파두단	파두

태음병 부증지속: 수결흉, 한실결흉★18기출

▶醫學綱目曰 但結胸 無大熱者 此爲水結

但頭汗出 名曰水結胸 小半夏湯主.(7-50) ▶ 龔信曰 寒實結胸 無熱證者 宜三物白散(7-51) ▶ 論曰 右證 當用 桂枝半夏生薑湯 赤白何烏寬中湯 三物白散 或用 巴豆丹.(7-52)
《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 다만 결흉증(結胸證)만 있고 대열(大熱)이 없는 것은 수기(水氣)가 맺힌 것이다. 머리에서만 땀이 흐르는 것을 이름하여 수결흉(水結胸)이라 한다. 소반하탕(小半夏湯)을 쓴다.(7-50) 공신(龔信)이 말하기를 한기(寒氣)가 실(實)하여 결흉하고 열이 없는 증에는 마땅히 삼물백산(三物白散)을 쓴다.(7-51) 나는 논하기를 위와 같은 증에는 마땅히 계지반하생강탕(桂枝半夏生薑湯) · 적백하오관중탕(赤白何烏寬中湯) · 삼물백산(三物白散) 또는 파두단(巴豆丹)을 쓴다.(7-52)
- (7-52) 수결흉, 한실결흉(결흉이 맺혔는데 열이 없는 경우): 계지반하생강탕, 적백하오관중, 삼물백산, 파두단을 씀
★ 태음증 부종지속: 장결 ★14,18기출(장결)
▶ 少陽人病 心下結硬者 名曰結胸病 其病 可治也 少陰人病 心下結硬者 名曰藏結病 其病 不治也. 醫學綱目 醫鑑所論 水結胸 寒實結胸證藥 俱是少陰人太陰病而與張仲景 茵陳蒿湯證 相類則 此病 想必非眞結硬於心下而 卽痞滿於心下者也. 張仲景 瀉心湯證 傷寒下利 心下痞硬 汗解後 心下痞硬云者 亦皆痞滿於心下 或臍上近處 結硬也而 非眞結硬於心下者也 若少陰人病而 心下右邊結硬則 不治 (7-53) ▶ 張仲景 曰 病 有結胸 有藏結 其狀如何. 曰 按之痛 寸脈浮 關脈沈 名曰結胸也 何謂藏結

曰 如結胸狀 飲食如故 時時下利 寸脈浮 關脈細小沈緊 名曰藏結 舌上白胎滑者 難治. 病人胸中 素有痞 連在臍傍 引入小腹 入陰筋者 此名藏結 死. (7-54)
소양인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 결흉이라 하는데 그 병은 치료할 수가 있고, 소음인의 병에 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 것을 장결이라고 하는데 그 병은 불치의 병이다. 《의학강목》과 《의감》에서 논한 바의 수결흉(水結胸)과 한실결흉(寒實結胸)의 약물은 모두 소음인의 태음병에 쓰는 약물로서 장중경의 인진호탕과 서로 같은 류에 속하므로 이것은 반드시 명치 밑이 진짜로 단단한 것이 아니고 더부룩하면서 가득한 것이라고 생각된다. 장중경의 사심탕증에서 상한에 설사를 하고서 심하가 비경(痞硬)하거나 땀을 많이 내고서 심하가 비경한다고 운운한 것은 모두 심하가 비만(痞滿)하였거나, 또는 제상(臍上) 부근에 경결이 된 것이겠고 진짜로 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉친 장결병은 아니다. 만일 소음인의 병에 명치 밑이 오른쪽으로 단단하게 굳어 뭉친 장결병이라면 그것은 불치인 것이다.(7-53) 장중경이 말하기를 병에 결흉과 장결이 있으니 그 증상이 어떻게 다른가? 대답하기를 누르면 아프고 촌맥이 부(浮)하고 관맥이 침(沈)한 것을 결흉병이라 한다. 장결증은 어떠한가? 대답하기를 결흉병 증상과 비슷하고 음식은 여전하고 때때로 설사하며 촌맥이 부하고 관맥이 세소침긴(細小沈緊)한 것을 장결병이라고 한다. 위와 같을 때 설상에 백태가 끼고 뽕질뽕질하면 난치하고 환자가 평소에 가슴 속이 답답한 증상이 있고 이것이 배꼽 아래로 내려와서 아랫배로 들어가서 당기고 음근(陰根)에까지 들어가는 것을 장결병이라고 한다. 이것은 죽는 병이다. (7-54)

- 장결은 오늘날의 **간암, 간경화**에 해당함

cf. 수결흉, 한실결흉은 답답함만 느끼는 것, 만져지지 않음 / 장결은 실제로 무언가가 잡히는 것

7-53. 결흉vs.장결

- └소양인병 심하결경: 결흉병이고 치료가능
- └소음인병 심하결경: 장결이고 치료불가 (*心下右邊結硬 = 장결)

7-54.

- 장결: 간암, 간경화 걸리면 처음엔 똑같이 먹다가(飮食如故) 점차 복수가 차면서 황달기 생기고 나중에 식욕부진이 생기게 된다.
- 소유비(素有痞): 평상시에 비만이 있다
- └ 태음병 장결: 소화에는 문제 없음. 음식은 평상시와 같고, 설사하고, 만져보면 딱딱하게 만져지고, 복수차는.. -ex) 간경화, 간암 등
- └ 태음병 비만: 식사량 적어지고, 식욕부진..

결흉 (結胸)	답답한 느낌 (痞滿)	소양인 심하결경	안지통 촌맥부 관맥침
장결 (藏結)	실제로 뭉침	소음인 심하결경	음식여고 시시하리 촌맥부 관맥세소침긴

태음증 부증지속: 장결 ★18기출

▶朱肱曰 藏結 狀如結胸 飮食如故 時時下利 而舌上白胎。
歌曰 飮食如常 時時下利 更加舌上白胎時 連臍腹痛 引陰筋 此疾 元來 死 不醫(7-55)
▶論曰 嘗見 少陰人 一人 心下右邊結硬 百藥無效
與巴豆如意丹 反極 搖頭動風 有頃而止 數月後死
其後 又有 少陰人 一人 有此證者 用巴豆丹
面上身上有汗而 獨上脘 人中穴 左右邊 無汗 此人 一周年後 亦死。
凡 少陰人 心下結硬 有此證者 目睹 4,5人
或半年 或一年 針灸醫藥 無不周至而 個個無回生之望

此卽 藏結病而 少陰人病也. (7-56)
주굉(朱肱)이 말하기를 장결은 그 증상이 결흉과 거의 같고 **음식은 보통 때와 같으면서 때때로 설사하고 설상에 백태가 낀다.** 이를 노래로 하면 음식은 예나 다름없고 때로 설사를 하니 다시금 혀에 백태가 끼는구나. **배꼽 아래 아픈 것이 음근까지 당기니,** 아! 이 병은 애당초 죽고 마는 병인가 보다.(7-55)
나는 논하기를 일찍이 소음인 한 사람이 명치 밑 오른쪽에 단단하게 굳어 뭉친 것이 있어서 백약을 써도 효과가 없다. 그리하여 파두여의단(巴豆如意丹)을 주었더니 도리어 병이 심하여 머리를 흔들며 풍증을 일으키다가 잠깐 그치더니 몇 달 후에 죽은 것이다. 또 그 후에 소음인 한 사람이 이와 같은 병증이 있어 파두단(巴豆丹)을 썼더니 얼굴과 몸에서는 땀이 나고 있으나 **유효독히 윗입술 인중혈(人中穴) 좌우 쪽에서는 땀이 나지 아니하더니** 이 사람은 1년 후에 죽은 것이다. 무릇 소음인이 명치 밑이 단단하게 굳어 뭉쳐 있는 환자 4-5명을 실제로 보았으나 혹 6개월간 혹 1년간 침구(針灸) 의약(醫藥)을 두루 써보지 않은 것이 없었으나 낱낱이 회생할 희망이 없었으니 이는 곧 장결병으로 소음인의 병인 것이다.(7-56)

- 소음인 나올 때: 인중혈에 땀날 때 낫는다 ⇒ 인중에 땀 안나니까 치료하기 어렵다

결흉 chest bind
• a diseased state attributable to accumulation of pathogens (such as heat or cold in combination with retained fluid or phlegm or stagnant food) in the chest and abdomen, often manifested by local rigidity, fullness and tenderness, also the same as chest constriction : WHO 표준용어집 (2007):166
• 가슴이 긴통하면서 번조하고(心緊痛而煩), 물이나 미음을 먹지 못하며, 몸을 뒤로 젖힐 수 있으나 앞으로 숙이지는 못하여 뻣뻣함이 유경상(柔瘕狀)과 같은 병증. =결흉증(結胸證). 대한한의학회 표준한의학용어집 2.1 (2021).

장결 Intestinal obstruction
• Characterized by paroxysmal abdominal colic, abdominal bloating, absence of bowel sounds, flatus, and constipation. Often occurs when abdominal surgery, tumour compression or carcinoma toxins obstruct the flow of intestinal qi. : WHO 표준용어집

(2007):166

• ① 결흉증과 유사한 병증. 발열 번조증이 없고, 환자가 음식은 여상(如常)하면서 때로 설사하고, 맥상은 촌맥(寸脈)이 부(浮)하고, 관맥(關脈)은 세소침긴(細小沈緊)하며, 설태가 백활(白滑)한 병증이다. • ② 병인(病人)의 협하(脇下)에 평소 적취(積聚) 비괴(痞塊)가 있어서, 그것이 제방(臍傍)까지 연(連)하여, 동통하며 땅기는 것이 소복(小腹)에까지 미치는 병증. 대한한의학회 표준한의학용어집 2.1 (2021).

태음증 부증지속: 황달

▶張仲景 曰 黃疸之病 當以18日 爲期

10日以上 宜差 反劇 爲難治.

發於陰部 其人必嘔

發於陽部 其人振寒而發熱.⁽⁷⁻⁵⁷⁾

▶黃疸 小便黃赤色者 爲濕熱 當作濕熱治

小便色白 不可除熱者 無熱也

若有虛寒證 當作虛勞治.⁽⁷⁻⁵⁸⁾

▶腹脹滿 面萎黃 躁不得睡.⁽⁷⁻⁵⁹⁾

▶黃家 日晡時 當發熱 反惡寒 此爲女勞得之

膀胱急 小腹滿 一身盡黃 額上黑 足下熱 因作黑疸.

腹脹如水狀 大便黑 或時漉 此女勞之病 非水也 腹脹者 難治.⁽⁷⁻⁶⁰⁾

▶朱肱曰 陰黃 煩躁 喘嘔不渴 宜用茵陳橘皮湯

一人 傷寒 發黃 脈微弱 身冷 次第用藥 至茵陳四逆湯 大效

一人 傷寒 發黃 脈沈細遲無力 次第用藥 至茵陳附子湯 大效⁽⁷⁻⁶¹⁾

▶醫學綱目曰 濕家之黃 色暗不明 一身不痛

熱家之黃 如橘子 一身盡痛⁽⁷⁻⁶²⁾

▶王好古曰 凡病 當汗而不汗

當利小便而不利 亦生⁽⁷⁻⁶³⁾

▶朱震亨曰 黃疸 因食積者 下其食積

其餘 但利小便

小便利白 其黃自退⁽⁷⁻⁶⁴⁾

▶李梴曰 黃疸 10日以上 入腹 喘滿煩渴 面黑者 死.⁽⁷⁻⁶⁵⁾

▶王叔和 脈經曰 黃家 寸口脈 近掌無脈 口鼻冷 黑色 病不可治.⁽⁷⁻⁶⁶⁾

장중경(張仲景)이 말하기를 황달병은 마땅히 18일로서 기간을 잡는 것이니 10일 이상이면 차도가 있어야 하는데 도리어 병이 더욱 심한 것은 다스리기 어려운 것이다. **병이 음부(陰部)에서 발(發)하면** 그 사람이 반드시 구역을 하고 병이 양부(陽部)에서 발생을 하면 그 사람이 추워서 떨며 발열을 하는 것이다. ⁽⁷⁻⁵⁷⁾

각종 황달병에 **소변색이 노랗고 붉으면 이는 습열(濕熱)로 된 것이니 마땅히 습열로 다스려야 하고, 소변이 맑아서 열을 제(除)해서는 안 될 것은 열이 없는 것이다.** 만일 허한증(虛寒證)이 있으면 마땅히 허로증(虛勞證)으로 다스려야 한다.⁽⁷⁻⁵⁸⁾

배가 부르고 얼굴이 누렇게 여위면 조바심이 나서 잠을 이루지 못하는 것이다.⁽⁷⁻⁵⁹⁾

대개 황달병들은 오후 4시쯤 마땅히 발열하는 것인데 도리어 오한이 있는 것은 여로(女勞)를 얻은 것이다. 방광이 아프고 아랫배가 부르며 온몸이 다 누렇게 되어도 이마는 검은빛을 띠고 발바닥에서 발열하면 흑달(黑疸)이 되는 것이다. 배가 부른 것이 마치 물이 찬 것 같고 대변이 검고 흑 때로는 묽으면 이것은 여로(女勞)로 병이 된 것이고 물이 차서 있는 것은 아니다. 배가 부른 증은 치료하기 어렵다.⁽⁷⁻⁶⁰⁾

주굉(朱肱)이 말하기를 음증(陰證)으로 된 황달증은 마음이 답답하여 조바심하며 숨이 차며 구역이 나서 입 안이 마르지 않는다. 마땅히 인진굴피탕(茵陳橘皮湯)을 써야 한다. 한 사람이 상한병에 황달이 발하여 맥(脈)이 미약(微弱)하고 몸이 냉한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진사역탕(茵陳四逆湯)을 쓰고 크게 효과를 보았다. 또 한 사람이 상한병에 황달이 되었는데 맥이 침세무력(沈細無力)한 것이다. 차례로 약을 쓰다가 인진부자탕(茵陳附子湯)을 쓰고 대효를 본 것이다.⁽⁷⁻⁶¹⁾

《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 습(濕)으로 된 황달은 색이 어둡고 밝지 못하여 온몸이 아

프지 아니하고

열로 된 황달증은 피부가 굴뚝같이 노랗고 온몸이 쭈시고 아프다.(7-62)

왕호고(王好古)가 말하기를 모든 병에 있어서 마땅히 땀을 내야 할 것을 땀을 못 내거나 소변을 잘 나가게 해야 할 것을 이뇨(利尿)시키지 못하면 또한 황달이 발생하게 되는 것이다.(7-63)

주진형(朱震亨)이 말하기를 황달병이 식적(食積)으로 인한 것은 식적을 내려야 하고 그 밖의 황달병에는 다만 소변을 잘 나오게 하면 된다. 소변이 잘 나오고 색이 맑으면 그 황달이 스스로 물러가는 것이다.(7-64)

이천(李梴)이 말하기를 황달이 10일을 넘어서 배로 들어가면 숨이 차고 번갈하며 얼굴빛이 검어지는 자는 죽는다.(7-65)

왕숙화(王淑和)의 《맥경(脈經)》에 말하기를 황달병은 촌구맥(寸口脈)이 손바닥 쪽에서부터 없어지고 입과 코에서 냉기(冷氣)가 나오고 얼굴빛이 검어진 것은 모두 치료할 수 없다.(7-66)

- (7-57) 황달은 10일 넘기면 치료 어렵다/ 음부에서 발생하는게 소음인황달 특징적.

- (7-58) **열이 없고 소변백색인 황달**을 소음인의 황달이라고 얘기

- (7-60) 흑달은 소음인의 황달이 아니다!라는 것을 말하고자 이문장을 가져옴

⇒ **흑달은 소음인과 관계없는 황달임**

- (7-61) 인진굴피탕 / 인진사역탕 / 인진부자탕

- (7-62) 신체통(표증)이 없으므로 태음병

⇒ **습가지황이 태음병에 속하는 황달 / 열가지황은 소음인의 황달이 아님**

- (7-64) 식적은 리소변하여 풀어주면 된다

- (7-65) 황달 10일 안에 치료 가능 / 10일 넘어가면 치료 어렵다

- (7-66) 황달 촌구맥이 없어지면서&입,코에서 냉기 나오고&면흑색 ⇒ 불치

★ **태음증 부종지속(浮腫之屬): 황달(黃疸) ★14,18기출(약재, 적백하오관중탕)**

▶ 論曰 陰黃 卽少陰人病也 當用朱氏茵陳橘皮湯 茵陳四逆湯

女勞之黃 熱家之黃 利小便之黃 想或非少陰人病而

余所經驗 未嘗一遇黃疸而治之故 未得仔細裏許

然 肥滿 黃疸 浮腫 同出一證 而 有輕重

若欲 利小便 則 乾薑 良薑 陳皮 青皮 香附子 益智仁 能利少陰人小便

荊芥 防風 羌活 獨活 茯苓 澤瀉 能利少陽人小便.(7-67)

나는 논하기를 **음황(陰黃)**은 곧 소음인의 병이다. 주씨인진굴피탕, 인진사역탕을 써야 하고 **여로의 황달과 열가의 황달과 리소변을 시켜야 할 황달증은 흑 소음인 병이 아닌 것으로 생각된다.**

내가 황달 치료를 한 번도 해본 경험이 없어서 그 내막은 자세히 말하지 못하나

비만 · 황달 · 부종은 같은 병인에서 생긴 증으로 다만 경증, 중증이 있을 따름이다.

건강, 양강, 청피, 진피, 향부자, 익지인은 소음인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이고

형개, 방풍, 강활, 독활, 복령, 택사는 소양인의 소변을 잘 나오게 하는 약재들이다.(7-67)

- **소음인 병은 다 음황(陰黃)이다!**

- 태음증비만, 태음증황달, 태음증부종증은 다 태음증부종에 속한다.(浮腫之屬)

:비만 → 황달 → 부종으로 점점 심해지는 것

★ 체질별 리소변 약재 알아두기

┌소음인: 건강, 양강, 진피, 청피, 향부자, 익지인 <6가지>

└소양인: 형개, 방풍, 강활, 독활, 복령, 택사 <6가지>

***적백하오관중탕**: 소음인 6개 약재 + 백하수오/적하수오/대조 ⇒ 태음병 부종지속 병증 3가지에 모두

사용 가능

소음인 범론&처방

[소음인 범론]

1. 소음인 범론

2. 소음인 병증

3. 태양병, 양명병의 한출과

태음병, 소음병의 하리

4. 소음인 2길증과 2급증

5. 소음인 6대증

6. 소음인 병증비교

7. 태양병, 태음병의 변증이 다양한 이유

7.1. 소음인 병증변화

8. 복약법/용약법

9. 소음인 기타병증

10. 독극약

11. 소음인 중기병 침법

[소음인 처방]

1. 장중경 상한론중 소음인병 경험설방약 이십

삼방

2. 송원명 삼대의가 저술중 소음인병 경험행용

요약 십삼방

3. 파두약 육방 (온백원, 장달환, 삼릉소적환, 비

방화체환, 삼물백산, 여의단)

4. 신정 소음인병 응용요약 이십사방

5. 용약법

1. 소음인 범론

- 소음인 범론은 표리병증을 일목요연하게 설명하는 내용이지만,

아직 **표리병증으로 정립이 되지 않은** 단편적인 임상경험내용 수록

- 소음인 범론은 갑오본 내용이 개초되지 않은 상태로 남아 있으므로,

갑오본적 병증 인식의 관점에서 봐야함

-> 신축본에 대입해서 생각해야한다!

2. 소음인 병증

▶ 論曰 發熱惡寒者 爲太陽病/發熱不惡寒者 爲陽明病

太陽陽明之 發熱形證一也而 / 惡寒不惡寒之間 相去遠甚而 陽氣之進退強弱 泰山之比岡陵也

自利而不渴者 爲太陰病 / 自利而渴者 爲少陰病

太陰少陰之 自利形證一也而 / 渴不渴之間 相去遠甚而 冷氣之聚散輕重 雲夢之比滌澤也.

是故 藿香正氣散 香砂養胃湯之證勢 平地駿馬之病勢也

獨蔘八物湯 桂附理中湯之證勢 太行短筇之病勢也.

若使一天下 少陰人稟賦者 自知

其病之陽明少陰證 如太行之險路 得之可畏 救之不易

攝信療病 戒懼謹慎之道 有若大路然 而不迷 則其庶幾乎. (8-1)

나는 논하기를 **발열오한**하는 증은 **태양병(太陽病)**이고, **태양병은 율광증으로**

발열하면서 **오한이 없으면 양명병(陽明病)**이다. **양명병은 망양증으로** 생각

태양병과 양명병의 발열상태는 같으나

오한, 불오한하는 거리가 심히 멀기에 양기의 진퇴가 태산과 언덕에 비하는 것과 같다.

설사를 하면서 구갈(口渴)하지 않는 증은 **태음병(太陰病)**이고

자리(自利)하면서 구갈하는 병은 **소음병(少陰病)**이다.

태음병과 소음병은 설사하는 증상은 같고

구갈하고 구갈하지 않는 사이가 서로 심히 멀어서 냉기의 취산(聚散)·경중(輕重)은 큰 호수와 작은 못을 비교하는 것과 같다.

그렇기때문에 광항정기산, 향사양위탕을 쓰는 증세는 준마가 평지를 달리는 격이고, 독삼팔물탕, 계부이중탕을 쓰는 병세는 짧은 지팡이를 짚고 크고 높고 험한 산을 넘어가는 형세와 같은 것이다.

만일 온 세상에 소음인으로 태어난 자로 하여금

양명병과 소음병이 마치 태행산(太行山)의 험한 산길을 가는 사람과 같아서 그 병을 얻으면 과연 두려운 것이고 참으로 구명하기가 쉽지 않은 것을 알게 한다면

몸을 섭양하고 병을 치료하는 일에 경계하고 삼가 조심함에 마치 넓은 길을 걷는 것같이 하여 미혹하지 않게 해야 하지 않겠는가

-태양병은 울광증, 양명병은 망양증으로 생각

-태양병, 양명병은 발열이 공통증상, 오한의 유무로 구분 <갑오본적 시각>

-갑오본:오한/신축본:땀(한출)로 분류 ⇒ 이걸 갑오본 시각이므로 오한으로 구분한다

-태음병, 소음병은 설사가 공통증상, 구갈의 유무로 구분

-계부이중탕=관계부자이중탕

-양명병과 소음병이 마치 태행산의~: 양명병(망양병)과 소음병은 심각한 병이라는 뜻

3. 태양병, 양명병의 한출과 태음병, 소음병의 하리

▶太陽病汗出 熱氣卻寒氣之汗出也

陽明病汗出 寒氣犯熱氣之汗出也

太陰病下利 溫氣逐冷氣之下利也

少陰病下利 冷氣逼溫氣之下利也 (8-2)

태양병(=울광증)에 땀이 나는 것은 열기가 한사(寒邪)를 물리치는 땀이고

양명병(=망양증)에 땀이 나는 것은 한사가 열기에 침범하는 땀이다.

태음증 하리는 온기가 냉기를 몰아내는 하리이고

소음증 하리는 냉기가 온기를 핍박하는 하리인 것이다.

4. 소음인 2길증과 2급증 ★14기출(이급증)

▶少陰人病 有二吉證 人中汗一吉證也 能飲水一吉證也 (8-3)

▶少陰人病 有二急證 發熱汗多一急證也 下利清水一急證也 (8-4)

소음인 병에 두 길증(吉證)이 있다. 하나는 인중(人中)에서 땀이 나는 것이요, 또 하나는 물을 능히 마시는 것이다.

소음인 병에 두 급증(急證)이 있다. 하나는 발열하면서 땀이 너무 많이 흐르는 것이요, 또 하나는 맑은 물 설사를 하는 것이다.

- 소음인의 좋은 증상 두 개, 안 좋은 증상 두 개

(8-3) 좋은 증상: 인중 땀 & 물 마심

- 보명지주인 양기가 그나마 살아있기 때문에 물을 마실 수 있는 것.

보명지주 없으면 속이 차서 물을 못마심

- 약 줬더니 인중 땀, 물 마심 가능해졌다면 병이 나아감을 알 수 있다.

(8-4) 안 좋은 증상: 발열한다 & 하리청수

- 발열한다는 망양증 말증 증세. 양난지기가 심하게 없어진다는 것

- 하리청수는 소음증 증상. 비기가 완전히 없어져서 나오는 것

소음인	吉證(좋은증상)	1.人中汗(인중에 땀) 2.能飲水(물을 마실 수 있음)
	急證(안좋은증상)	1.發熱汗多(열나고 땀이 많이 남) 2.下利清水(맑은 물설사)

+) 추가설명

-울광증 막판에 땀이 날 수가 있는데 이를 망양증으로 오해하면 안된다

-태음증, 울광증은 땀, 설사로 풀릴수 있으나 망양증, 소음증은 땀, 설사로 인해 더 심해진다

5. 소음인 6대증 ★14기출(6대증)

6대증	병증	병인	용약
소음병 양명병(망양병)	通滯下利而病益甚 통체하리이병익심 發熱汗出而病益甚 발열한출이병익심	邪犯正之病 사범정지병	急用藥 급용약
태음병음독증	腹痛下利而其病半解不解 복통하리이기병반해불해	正邪相傾之病 정사상경지병	預用藥 예용약
태양병결음증	惡寒汗出而其病半解不解 오한한출이기병반해불해		
태음병황달증	食滯六日不能化下 식체육일불능화하	正邪壅錮之病 정사옹고지병	大用藥 대용약
태양병위가실증 (울광증)	發熱六日不得汗解 발열육일불득한해		

- 소음병, 망양병: 급하게 약을 쓴다

- 태음병음독증, 태양병결음증: 예방 차원의 약을 쓴다.

- 태음병황달증은 태음증 / 태양병위가실증은 울광증으로 볼 수 있다.

→ 꼭 막혀있는 상태이기에 뚫으려면 대용량의 약을 써야 한다.

소음인 6대증

▶少陰人病有六大證 一曰少陰病 / 二曰陽明病 / 三曰太陰病陰毒證也 四曰太陽病厥陰證也 / 五曰太陰病黃疸證也 / 六曰太陽病胃家實證也 (8-5)
소음인 병에 6대증이 있으니

첫째로 소음병(少陰病), 둘째로 양명병(陽明病), 셋째로 태음병음독증(太陰病陰毒證), 넷째로 태양병결음증(太陽病厥陰證), 다섯째로 태음병황달증(太陰病黃疸證), 여섯째로 태양병위가실증(太陽病胃家實證)이다.

-소음병은 표리구병(시작부터 표증, 리증 같이)

-태음병음독증, 태양병결음증은 둘다 표리겸병: 결음증은 표증에서 시작해서 나중에 리증까지 생김,

음독증은 리증에서 시작해서 나중에 표증까지 생김

-태음병황달증은 태음증으로 생각 / -태양병위가실은 울광증 중증, 말증을 의미

소음인 6대증 용약법

▶發熱汗出則 病必解也而 發熱汗出而病益甚者 陽明病也

通滯下利則 病必解也而 通滯下利而病益甚者 少陰病也

陽明少陰 以邪犯正之病 不可不~~急用藥~~也

惡寒汗出則 病必盡解也而 惡寒汗出而

其病 半解半不解者 厥陰之漸也

腹痛下利則 病必盡解也而 腹痛下利而

其病 半解半不解者 陰毒之漸也

厥陰陰毒 正邪相傾之病 不可不~~預用藥~~也.

發熱一汗 而病即解者 太陽之輕病也

食滯一下 而病即解者 太陰之輕病也

太陽太陰之輕病 不用藥而亦自愈也

發熱三日 不得汗解者 太陽之尤病也

食滯三日 不能化下者 太陰之尤病也

太陽太陰之尤病 已不可謂輕證而 用藥二三貼亦自愈也

發熱六日 不得汗解 食滯六日 不能化下者

太陽太陰之胃家實黃疸 正邪壅錮之病 不可不~~大用藥~~也. (8-6)

발열하고 땀이 나면 병이 반드시 풀려야 하는데 발열하고 땀이 나고서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 양명병=망양병이고

체한 것이 풀리면서 설사를 하면 병이 반드시 풀려야 하는데 체기(滯氣)가 풀리고 설사를 하고
서도 병이 더욱 심하게 되는 것은 **소음병**인 것이다.

양명병과 소음병은 사기(邪氣)가 정기(正氣)를 범(犯)하는 병이기 때문에 **급하게 약**을 쓰지 않
을 도리가 없다.

추위 떨고서 땀이 나면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 오한하고 땀이 나고서도

그 병이 **반만 풀리고 반은 풀리지 않는 것은 점차 결음병(厥陰病)으로 전변(轉變)**하려는 증이
다.

복통에 설사를 하면 병이 반드시 다 풀려야 하는데 복통에 하리(下利)를 하고서도

그 병이 **반만 풀리고 반은 풀리지 않는다면 점차 음독병(陰毒病)으로 전변**하려는 증이다. 결음
병과 음독증은 **정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 힘을 기울이는 병이니 불가불 미리 약을 써서
정기를 도와주어야 한다.**

발열하고 땀이 한 번 나고 병이 풀리는 것은 **태양의 경병(輕病)=울광증**이고

식체에 한 번 설사를 하고서 병이 풀리는 것은 **태음의 경병(輕病)=태음병황달증**이다.

태양과 태음의 **경병(輕病)은 약을 쓰지 않고서도 저절로 낫는 것이다.**

발열 3일에 땀이 나지 않아 병이 풀리지 않는 것은 태양의 심한 병증이고

식체 3일에 소화가 되지 않아 내려가지 않는 것은 태음의 심한 병증이다.

태양병(=울광증)과 태음병의 심한 병증을 이미 경증이라고 말할 수 없으므로 약을 2-3첩을 쓰
면 또한 스스로 낫는다.

발열이 있은 지 6일이 되어서도 땀이 나지 않고 열이 풀리지 않는 증과 식체 6일에 소화가 안
되어 내리지 않는 증은 **태양병 · 태음병의 위가실황달병**이다. 위가실황달병은 정기와 사기가
꼭 막힌 병이기 때문에 약을 **크게 쓰지 않을 도리가 없는=대용량 써라** 병증이다.

- 급용약(시간): 양명소음에서 사기가 정을 침범하기 때문에 급하게 써야함

- 예용약(시간): 결음이나 음독은 정사가 서로 기대어 겨루고 있기 때문에

(어느쪽으로든 기울어질 수 있는 상황) 미리 약을 써야함

- 대용약(용량): 태양병위가실, 태음병황달은 약의 용량을 많이 써야함

- 소음인이라고 해서 무조건 땀이 안 나는게 아님.

땀이 나면서 병이 나아지는 경우가 있고, 심해지는 경우가 있다.

울광증이면 땀이 나면서 풀어지고, 망양증이면 땀이 나면 날수록 더 심해

- 설사해서 나오면 태음증, 심해지면 소음증

- **태음태양 경병은 굳이 약을 많이 안써도 자연치유 될 수 있다**

- 약의 오남용에 대해 경계

6. 소음인 병증비교

▶ 太陽太陰之病六七日 或成危證 或成重證而 十日內 必有險證

陽明少陰之病 自始發 已爲重證而 二三日內 亦致險證

是故 陽明少陰之病 不可不察於始發也

太陽太陰之病 不可不察於四五日間也 (6-7)

태양병(=울광증)과 태음병은 6-7일에는 **혹 위증(危證)**이 되거나 **혹 중증(重證)**을 일으켜 10일
내에는 반드시 **험증(險證)**이 되는 것이고

양명병(=망양증)과 소음병은 처음부터 중증이 되므로 2-3일 내에 또한 **험증**을 일으키는 것이
다. 그렇기 때문에 양명병과 소음병은 불가불 병이 시발(始發)할 때부터 잘 살펴야 하고
태양병과 태음증은 불가불 4-5일 내에 증세를 잘 살펴야 한다.

-망양증, 소음병이 더 심각한 병이다

7. 태양병, 태음병의 변증이 다양한 이유

▶ 太陽太陰之病 病勢緩而 能曠日持久 故 變證多也

陽明少陰之病 病勢急而 不能曠日持久 故 變證少也.

蓋 陽明少陰病 過1日而至2日則 不可不用藥也

太陽太陰病 過4日而至5日則 不可不用藥也

太陽太陰之厥陰陰毒 皆六七日之死境也 尤不可不謹也. (8-9)

태양병과 태음증은 병세가 느리므로 능히 여러 날을 이끌어 갈 수 있기때문에 변증(變證)이 많
이 생기고

양명병 · 소음병은 병세가 급하므로 여러 날을 끌어갈 수 없기때문에 변증이 적다.

대개 양명병과 소음병은 1일이 지나고 2일이 되면 불가불 약을 써야 하며

태양병과 태음병은 4일이 지나 5일이 되면 불가불 약을 써야 한다.
태양·태음에서 궤음(厥陰)과 음독(陰毒)이 된 것은 모두 6-7일이 되면 죽음에 이르게 되므로 더욱 삼가지 않을 수가 없는 것이다.
★시험에 많이
Q. 태양병, 태음병의 변증이 다양한 이유? A. 병세가 완만하기 때문이다.

7.1. 소음인 병증변화

표병		리병	
태양병	양명병	태음병	소음병
六七日危證, 重證 十日內 險證	自始發 重證 二三日內 險證	六七日危證, 重證 十日內 險證	自始發 重證 二三日內 險證
4日, 5日 不可不用藥	1日, 2日 不可不用藥	4日, 5日 不可不用藥	1日, 2日 不可不用藥
病勢緩, 變證多	病勢急, 變證少	病勢緩, 變證多	病勢急, 變證少

- 태양병, 태음병은 병세가 완만하기 때문에 변증이 많이 생김

8. 복약법/용약법

8.1. 복약법

▶陽明太陽之危者 獨蓼八物湯 補中益氣湯 可以解之而 病勢危時 若非(日3,4服而又連日服)則 難解也 少陰太陰之危者 獨蓼附子理中湯 桂附藿陳理中湯 可以解之而 病勢危時若非(日3,4服而又連日服)則 難解也. 病勢極危時 日4服 病勢半危時 日3服 病勢不減則 日2服 病勢少減則 2日3服而 1日則1服 1日則2服 病勢大減則 日1服 病勢又大減則 間2,3,4,5日1服 (8-9)

양명병과 태양병의 위급한 자에게는 독삼팔물탕, 보중익기탕이라야 병을 풀 수가 있고 병세가 위급할 때에는 만일에 1일에 3-4첩을 탕복하지 않거나 또 연 일복(連日服)하지 않으면 난치하고, 소음병과 태음병의 위급한 자는 독삼부자이중탕, 계부곽진이중탕 등이라야 가히 풀릴 수가 있 고 병세가 위급할 때에는 매일 3-4첩을 탕복(湯服)하지 아니하거나 또는 연일 복용하지 아니 하면 난치한다. 또 병세가 극히 위급할 때에는 1일에 4첩을 탕복해야 하고 또 병세가 반 정도로 위급할 때에 는 1일에 3첩을 복용한다. 그리고 다음부터는 병세가 더 감(減)해지지 않더라도 1일에 2첩을 복용하고 또 병세가 조금 감 해지면 2일간에 3첩을 쓰거나 1일에 1첩을 쓰기도 하고 1일에 2첩을 쓰기도 한다. 병세가 크게 덜하게 되면 1일에 1첩을 쓰고 또 병세가 더욱 크게 덜하게 되면 2일간에 1첩을 쓰든지 3일간에 1첩, 4일 간에 1첩, 5일간에 1첩을 쓰기도 한다.
--

- 처음에 어정쩡하게 약쓰면 더 병세가 커지므로, 초기에 약을 많이 써서 병세를 잡아야함
- 먹다가 괜찮아진다고 중간에 약 끊지 말라는 소리
- 병세에 따라서 하루에 몇 포 정도 먹으면 되는지 상세히 기술
- 독삼부자이중탕은 신축본때 백하오이중탕으로 바뀜.

8.2. 용약법

▶蓋 有病者 可以服藥 無病者 不可以服藥 重病 可以重藥 輕病 不可以重藥 若 輕病好用重藥 無病者好服藥 臟氣脆弱 益招病矣 (8-9) ▶膏粱 雖則助味 常食則損味 羊裘 雖則禦寒 常着則攝寒 膏粱羊裘 猶不可以常食常着 況藥乎. 若論常服藥之有害則 反爲百倍於全不服藥之無利也. 蓋 有病者 明知其證則 必不可不服藥 無病者 雖明知其證 必不可服藥 歷觀於世之服鴉片煙 水銀 山參 鹿茸者 屢服則無不促壽者
--

以此占之則 可知 (8-10)
그리고 병이 있는 사람은 약을 써야 하지만 병이 없는 사람이 약을 복용하는 것은 옳지 않다. 중병에는 중한 약을 써야 하고 경병자에게는 중한 약을 써서는 안 된다. 만일에 병이 가벼운데 중한 약 쓰기를 좋아하거나 또 병이 없는 자가 약을 먹기를 좋아하면 내장의 기가 연약하게 되며 더욱 병을 불러오게 한다. 고량진미(膏粱珍味)가 비록 입맛에는 좋으나 늘 먹으면 도리어 입맛을 잃는 것이니 양피나 양털 의복이 비록 추위를 잘 막지만 늘 입으면 추위를 타게 된다. 기름진 음식이나 양털 옷도 항상 먹고 입으면 오히려 좋지 않은데 하물며 약이야 이보다 더하지 않겠는가? 만일 늘상 약을 먹는 해로움을 논한다면 전혀 약을 먹지 않는 것보다 도리어 백배나 이롭지 못한 것이다. 대개 병이 있는 사람은 그 병증을 밝게 안다면 반드시 약을 먹어야 하고 병이 없는 사람은 비록 병세를 밝게 안다고 할지라도 반드시 약을 먹을 필요는 없다. 지나간 역사와 현세를 살펴보건대 아편을 피우거나 수은(水銀)·산삼(山蔘)·녹용(鹿茸) 같은 것을 자주 먹으면 목숨을 재촉하는 경우가 없지 않으니 이것을 가지고 미루어 보아도 가히 알 수 있을 것이다.

- 병이 있음 약 쓰고, 병이 없으면 약 쓰지 말아라
- 고량진미, 좋은 의복도 늘상하는 것도 안 좋은데 하물며 약을 어떻겠냐.
- ⇒ 약을 남용하지 말아라. 하지만 병이 있을때 약을 복용: 확실하게, 충분한 약을 사용해야

9. 소음인 기타병증

[토혈, 인후병] ★18기출(토혈)

▶少陰人 吐血 當用獨蔘八物湯 咽喉痛 當用獨蔘官桂理中湯 (8-11) ▶嘗見 少陰人 咽喉痛 經年不愈 有醫 教以服金蛇酒 即效 金蛇酒 卽金色黃章蛇釀酒者也 (釀: 술을 빚다) (8-15)
소음인 토혈(吐血)에 마땅히 독삼팔물탕을 사용한다. 소음인 인후통(咽喉痛)에 마땅히 독삼관계이중탕을 사용한다. 일찍이 소음인이 인후통(咽喉痛)이 1년이 지나도록 낫지 않는 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기를

금사주(金蛇酒)를 먹여보라고 하여 먹었더니 낫는 것이다. 금사주는 금색 같은 누런 점들이 있는 뱀으로 술을 빚은 것이다.

★ 시험에 많이(부자탕씨리즈는 이번에 꼭 시험에 낸다고 했음!)

병증	갑오본 시각	신축본 시각
토혈	독삼팔물탕	황기계지부자탕, 인삼계지부자탕 승양익기부자탕, 인삼관계부자탕
인후통	독삼관계이중탕	관계부자이중탕, 금사주

*토혈: 독삼팔물탕은 울광증 말증약 / 토혈은 망양증에 해당.

⇒ 따라서 독삼팔물탕보다는 망양증 약인 부자탕 시리즈 4개를 쓰는 것이 맞음

[식소-부종] ★14기출 (적백하오관중탕의 기원 처방)

▶嘗見 少陰人 飲食倍常 口味甚甘 不過一月 其人 浮腫而死 少陰人 食消卽 浮腫之屬而 危證也. 不可不急治 當用芎歸^蘇理中湯. (8-12)
일찍이 소음인이 입맛이 달아서 음식을 평상시보다 배를 더 먹더니 불과 1개월 내에 부종이 생겨서 죽는 것을 보았다. 소음인 식소(食消)는 부종에 속한 것으로서 매우 위험한 병세이다. 불가불 급히 치료를 해야 한다. 마땅히 궁귀총소이중탕을 사용한다.

- 식소는 부종지속이고 위증
- 식소는 신축본 관점에서 태음증황달에 속함 → 적백하오관중탕 쓰면 됨
- 이 조문의 궁귀총소이중탕은 갑오본적 시각의 약
- 따라서 적백하오관중탕의 기원이 되는 갑오본 처방명: 궁귀총소이중탕
- 식소부종은 요즘으로 따지면 당뇨 같은 증상.

★ 시험에 많이

병증	갑오본 시각	신축본 시각
식소	궁귀총소이중탕	적백하오관중탕

+)추가 설명

*인후통: 인후통은 표증이고 표열증이다. 이때, 표열증은 울광증과 소음증에 생김.

→ 인후통이 울광증에서 생겼으면 울광증 약, 소음증에서 생겼으면 소음증약 쓰면 됨

⇒ 여기서는 소음증에서 비롯된 인후통이라 신축본 관점에서 **관계부자이중탕**이 맞다.

[부중, 허로]

▶ 嘗見 少陰人浮腫 簞肝一部 切片作膾 一服盡 連用五部 其病卽效 又有 少陰人 服簞肝一部 眼力倍常 眞氣湧出 少陽人 虛勞病 服簞肝一部 其人 吐血而。 (8-13) ▶ 嘗見 少陰人浮腫 有醫 教以服海鹽自然汁 日半匙 4,5日服 浮腫大減 一月服 永爲完健 病不再。 (8-14)
일찍이 소음인 부종병에 <u>노루의 간</u> 일부를 썰어서 회로 만들어 한 번에 다 먹고 계속하여 5번을 하니 그 병이 곧 나았고, 소음인 한 사람이 노루의 간 일부를 먹고 시력이 배로 좋아지고 원기가 솟구쳐 나왔다. 그러나 소양인이 허로병에 노루의 간 일부를 먹더니 피를 토하며 죽은 것을 보았다. (8-13) 일찍이 소음인의 부종병에 어떤 의사가 <u>소금에서 흘러내린 즈=간수</u> 를 1일에 반 손갈씩 먹여 보라고 가르쳐 주기에 4,5일 먹었더니 부종이 크게 줄어 1개월간을 먹고 오래도록 완건하여 병이 재발하지 않는 것을 보았다. (8-14)

[이질]

▶ 嘗見 少陰人 痢疾 有醫 教以服項赤蛇煎湯 卽效 項赤蛇 去頭斷尾 納二疊細囊中 藥缸內 別設橫木 懸空掛之 用水五碗 煎取一碗服。 二疊細囊 懸空掛煎者 恐犯蛇骨故也 蛇骨有毒 (8-16) ▶ 嘗見 少陰人 痢疾 有醫 教以大蒜三顆 清蜜半匙 同煎 三日服 卽效。 (8-17)
일찍이 소음인의 이질병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 <u>목이 붉은 뱀</u> 을 달여서 먹으라고 하여

달여서 먹고 낫는 것을 보았다. 항적사의 머리와 꼬리는 잘라버리고 명주 베 두 겹 주머니에 넣어서 약 항아리 안에 나무를 가로 걸쳐놓고 거기에 매달아 놓은 뒤에 물을 다섯 사발 붓고 달여서 한 사발이 되면 이를 복용한다. 두 겹 명주 주머니에 넣고 허공에 달아 달이는 것은 뱀의 뼈가 범할까 두렵기 때문이다. 뱀의 뼈는 독이 있다. (8-16) 내가 본 바에 의하면 소음인 이질에 어떤 의사가 큰 마늘 3통과 꿀 반 손갈을 함께 달여서 3일간 먹이라고 가르쳐 주었는데 곧 효과를 보았다. (8-17)
--

曰 뱀은 오늘날 쓸 수 없을듯함

[유방누창, 창상]

▶ 嘗見 少陰人 乳房近脇 有漏瘡 歷七八月 瘡口不合 惡汁常流 有醫 教以山參 熊膽末 各一分 傅之卽效 又少陰人 一人 滿身有瘡 以人蔘末 塗傅 (8-18)
내가 본 바에 의하면 일찍이 소음인의 유방 근처 늑골 밑에 누창(漏瘡)이 나서 7, 8개월이 되도록 창구가 아물지 않으며 악즙(惡汁)이 늘 흘러내리는 것이다. 어떤 의사가 가르쳐 주기를 산삼말(山蔘末) · 웅담말(熊膽末) 각 1분(分)을 붙이라고 하여 붙였더니 곧 효과를 보았다. 소음인 한 사람이 전신에 창(瘡)이 생긴 것을 인삼말(人蔘末)을 바르고 즉시 효과를 보았다.
-산삼말, 인삼말, 웅담말 사용

[유방내용]

▶ 嘗見 少陰人 乳房近脇 發內癰 有醫 教以火針取膿 醫曰 內癰外證 惡寒發熱 似傷寒而 有痛處也 察其痛處 明知有膿則 不可不用火針 (8-19)
내가 본 바에 의하면 소음인의 유방 근처에 내용(內癰)이 발생한 것을 어떤 의사가 가르쳐 주기를 화침(火針)으로 고름을 뽑아내도록 하였는데 또 말하기를 내용의 외증(外證)이 오한 · 발열하는 것이 마치 상한병과 비슷하지만 일정한 곳에 압통점이 있는 것이니 그 아픈 곳을 잘 살

펴서 고름이 들어 있는 것을 밝게 안다면 불가불 화침을 써야 하는 것이다.

-화침으로 농을 빼면 낫는다

[배웅]

▶ 嘗見 少陰人 背癰 有醫 教以火刀裂瘡
醫曰 火刀裂瘡 宜早也
若疑訝而緩不及事則 全背堅硬 悔之無及. (8-20)
내가 본 바에 의하면 소음인의 등창에 어떤 의사가 화도(火刀)로 그 종창을 절개하라고 가르쳐 주었다. 의사가 말하기를 화도로 등창을 쥘 것은 가급적 빨리해야 하며, 만일 의심스럽게 여겨서 때를 놓치면 등 전체가 단단하게 굳어질 것이니 후회해도 소용이 없는 것이다

-화도로 종창을 절개

[반신불수]

▶ 嘗見 少陰人 半身不遂病 有醫 教以服鐵液水 得效. (8-21)
내가 본 바에 의하면 소음인의 반신불수병에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 담금질한 물을 먹으라고 하여 매일 먹고 효험이 있는 것을 보았다.

-철액을 사용

⇒ 앞선 치험례에서 인삼, 산삼, 화침, 철액수 등을 사용

⇒ 모두 열기를 보태준다는 의미

[소아복학]

▶ 嘗見 少陰人小兒 腹癰病 有醫 教以瘡病將發之早朝
用火煨金頂砒 極細末六厘 生甘草湯 調下卽效
醫曰 砒藥 必金頂砒然後 可用而 又火煨然後可用也
必不可過六厘而 又不可不及六厘也
過六厘則 藥毒太過也 不及六厘 則瘡不愈也.

此藥 屢試屢驗而 有一服愈後 瘡又再發者 又用之則 其病 益甚而.

▶ 蓋 此藥 可以一服 不可再服云.

聽醫言而究其理則 一服愈而瘡不再發者 蓋少陰人兒也

一服愈而瘡又再發者 蓋非少陰人兒也

惟 少陰人兒 腹瘡病難治者 用此藥 尋常瘡 不必用(此不祥之藥).

少陰人 尋常間日瘡 惡寒時 用川芎桂枝湯 二三貼則 亦無不愈

又 腹中實滿而大便硬 瘡發者 亦可用巴 (8-22)

내가 본 바에 의하면 소음인 아이의 복학병(腹瘡病)에 어떤 의사가 가르쳐 주기를 학질(瘡病)이 발(發)하는 이른 아침에 화하(火煨)한 금정비(金頂砒)를 쓰되 극히 세말(細末)하여 6리(厘)를 생감초 달인 물에 같이 복용하라 하니 곧 효과가 있었다. 의사가 말하기를 비약(砒藥)은 반드시 금정비(金頂砒)를 만들어서 써야 하고 또 화하(火煨)해야만 쓸 수가 있다고 한다. 그리고 먹는 분량은 1회에 6리(厘)가 넘어서도 안 되고 6리가 못 되어도 안 된다. 그것은 6리가 넘으면 약독이 두렵기 때문이고 모자라면 학질이 낫지 않는 것이다. 이 약은 여러 번 시험하고 자주 치험한 바가 있는 것으로 한 번 복용한 후 잠깐 학질이 나왔다가 또 재발하는 자가 있으니 이러한 자에게 또 한 번 쓰면 그 병이 더욱 심하고 위태롭게 된다.

대개 이 약은 한 번만 쓸 것이고 다시 한 번 복용할 수 없다고 말하는 의사의 말을 듣고 그 이치를 궁리하여 본즉 한 번 복용한 후 병이 낫고 학질이 다시 재발하지 않는 자는 모두 소음인 아이이고 복용한 후 학질이 나왔다가 또다시 재발하는 자는 모두 소음인 아이가 아닌 것이다. 오직 소음인 아이 복학병의 난치자(難治者)에 한하여 이 약을 쓸 것이고 보통 학질에는 이런 상서롭지 못한 약을 쓸 필요가 없는 것이다. 보통 하루 걸러 나타나는 소음인의 학질에는 오한증을 일으킬 때 천궁계지탕(川芎桂枝湯) 2-3첩을 쓰면 낫지 않는 것이 없고 배 속에 가득 차서 대변이 굳으면 학질을 발하는 자라도 마땅히 파두(巴豆)를 써야 한다.

- 화하금정비 = 비소 (요즘엔 사용할수 없음)

⇒ 소음인 아이에게 굳이 독극이 있는 약물(=비소)을 쓰지 말고, 천궁계지탕(울광증으로 본 것) 쓰면 나올 수 있다

10. 독극약

▶百藥 莫非善藥而 惟少陰人信砒藥 太陰人瓜蒂藥 最爲惡藥也 何哉.

少陰人信砒藥 百病 用之皆殆而 祇有治瘧之一能者

亦有名無實 不無危慮

萬不如 桂枝 人蔘 白芍藥3,4服之治瘧則 此非天下萬害無用之藥乎.

太陰人瓜蒂藥 百病 用之皆殆而 祇有治痰涎壅塞之一能者

亦有名無實 不無危慮

萬不如 桔梗 麥門冬 五味子3服之治痰涎壅塞則

此非天下萬害無用之藥乎.

此二藥 外治可用 內服不可用. (8-23)

백약(百藥)이 모두 좋지 않은 약이 없지만 오직 소음인의 신비약(信砒藥)과 태음인의 과체약(瓜蒂藥)은 가장 유해한 약이라고 할 수 있다.

왜냐하면 소음인의 신석과 비상을 백병(百病)에 써보면 모두 위태롭고 마침내 한 가지 학질(瘡病)만을 다스리는 성능이 있으니

역시 유명무실한 것이라 생각되며 그리고 더욱이 약독(藥毒)이 항상 위태로워서 걱정이 없는 것이 아니니

만일에 계지, 인삼, 백작약등으로 3,4첩 연복하여 학질을 치료하는 것만 같지 못하니 이것이 세상에 만 번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가?

태음인의 과체약은 백병에 써 보아도 모두가 그 독이 위태로웠고 다만 담연(痰涎)이 응색(壅塞)된 증만을 다스리는 성능이 있으나

또한 유명무실하고 더욱 약독이 위태로워 늘 걱정이 없지 않는 것이다.

만일에 길경, 맥문동, 오미자 등으로 3,4첩을 복용하여 담연이 응색함을 치료하는 것만 같지 못하니

이것이 세상에 만번 해롭고 소용이 없는 약이 아니겠는가.

이 두 가지 약은 외치(外治)에 쓸 수 있는 것이고 내복에는 쓰지 못할 약이다.

- 소음인의 신비약, 태음인의 과체약: 내복으로 사용하지 말고 외치로만 사용하라

11. 소음인 중기병 침법 ★14기출(합곡혈)

▶嘗見 少陰人 中氣病 舌券不語有醫 針合谷穴而其效如神

其他諸病之藥 不能速效者 針能速效者 有之

蓋針穴亦有太少陰陽四象人 應用之穴而 必有升降緩速之妙

繫是不可不察 敬俟後之謹厚而好活人者. (8-24)

내가 본 바에 의하면 소음인이 중기병(中氣病)에 혀가 굳어서 말을 못하였다. 한 의사가 합곡혈(合谷穴)에 침을 놓으니 그 효능이 신기하였고

그것 외에 또다른 여러 가지 병이 약으로 속효를 보지 못하는 것을 침으로 능히 속효를 보는 자가 있으니

대개 침혈도 역시 태양인 · 소양인 · 태음인 · 소음인의 사상인에 응용하는 혈로서 반드시 승강완속(升降緩束)의 묘리가 있는 것이다.

그런즉 이것은 불가불 잘 살펴야한 즉 삼가 후세의 근후(勤厚)하고 활인(活人)하기 좋아하는 사람이 나타나기를 기다리고자 한다.

- 중기병: 스트레스, 히스테리성 실신

-유일하게 침 혈자리에 대해 말함: 합곡혈

- 승강완속(升降緩束)

⇒승강: 소음/소양에 관련한 원리 vs 완속: 태양/태음에 관련한 원리

완(緩): 내보내는 것. 중심에서 멀어지면서 퍼뜨리는 것.

속(速): 중심으로 가져오는 것. 모으는 것.

[소음인 처방]

약재를 일일이 말하진 않으셨고 간단한 설명정도 하시고 넘어가심.(빨간색이 언급부분)

1. 장중경 상한론중 소음인병 경험설방약23방

桂枝湯(계지탕)	理中湯(이중탕)	薑附湯(강부탕)
四順理中湯(사순이중탕)	人蔘桂枝湯(인삼계지탕)	四逆湯(사역탕)
厚朴半夏湯(후박반하탕)	半夏散(반하산)	赤石脂禹餘糧湯
附子湯(부자탕)	麻黃附子細辛湯	(적석지우여량탕)
當歸四逆湯(당귀사역탕)	(마황부자세신탕)	麻黃附子甘草湯
甘草瀉心湯(감초사심탕)	半夏瀉心湯(반하사심탕)	(마황부자감초탕)
桃仁承氣湯(도인승기탕)	茵陳蒿湯(인진호탕)	生薑瀉心湯(생강사심탕)
大承氣湯(대승기탕)	麻仁丸(마인환)	抵當湯(저당탕)
	小承氣湯(소승기탕)	蜜導法(밀도법)

-한번 보시길 바랍니다~ 이려고 넘어가심

2. 송원명 삼대의가 저술중 소음인병 경험행용요약 13방

1.十全大補湯 십전대보탕
人蔘·白朮·白芍藥·炙甘草·黃耆·肉桂·當歸·川芎·白茯苓·熟地黃 各一錢, 薑 三片, 棗 二枚. ○此方 出於王好古海藏書中 治虛勞. ○今考更定 此方 當去 白茯苓 熟地黃 當用 砂仁 陳皮
인삼·백출·백작약·자감초·황기·육계·당귀·천궁·백복령·숙지황 각1돈, 강 3쪽, 조 2개. 이 처방은 왕호고의 <해장서> 중에 나온다. 허로를 치료한다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 백복령·숙지황을 빼야 하고, 사인·진피를 써야 한다→소음인 십전대보탕이됨.
소음인 십전대보탕

:인삼2 황기 백출 백작약 당귀 천궁 진피 감초 강3조2(=팔물군자탕)

+ 백하수오 관계

2. 補中益氣湯 보중익기탕

黃耆 一錢五分, 炙甘草·人蔘·白朮 各一錢, 當歸·陳皮 各七分, 升麻·柴胡 各三分, 薑 三片, 棗 二枚.

○ 此方 出於李杲東垣書中 治勞倦虛弱 身熱而煩 自汗倦怠 → 소음인 망양병 증증

○ 今考更定 黃芪 當用 3錢而 當去 升麻 柴胡 當用 藿香 蘇葉.

황기 1돈5푼, 자감초·인삼·백출 각1돈, 당귀·진피 각7푼, 승마·시호 각3푼, 강 3쪽, 조 2개.

이 처방은 이고의 <동원서> 중에 나온다. 노권으로 허약해져 몸에 열이 나고 답답하며 식은 땀을 흘리며 기운없어 하는 것을 치료한다. (망양증에 사용.)

지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 황기는 3돈을 써야 하고, 승마와 시호는 빼야 하면 곽향 소엽을 써야 한다.

소음인 보중익기탕

:인삼3 황기3 백출 당귀 진피 감초 곽향 소엽1 강3

3. 香砂六君子湯 향사육군자탕

香附子·白朮·白茯苓·半夏·陳皮·厚朴·白豆蔻 各一錢, 人蔘·甘草·木香·縮砂·益智仁 各五分, 薑 三片, 棗 二枚.

○ 此方 出於龔信醫鑑書中 治不思飲食 食不下 食後倒飽 → 식욕x, 소화x

○ 今考更定 此方 當去 白茯苓 當用 白何首烏

향부자·백출·백복령·반하·진피·후박·백두구 각1돈, 인삼·감초·목향·축사·익지인 각5푼, 강 3쪽, 조 2개.

이 처방은 공신의 <의감> 중에 나온다. 음식 먹을 생각을 하지 않고, 먹은 것이 내려가지 않으며, 먹고난 후에는 배가 불러 꺼지지 않는 것을 치료한다.

지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 백복령은 빼야 하고, 백하수오를 써야

한다.
4. 木香順氣散 목향순기산
烏藥 · 香付子 · 青皮 · 陳皮 · 厚朴 · 枳殼 · 半夏 各一錢, 木香 · 縮砂 各五分, 桂皮 · 乾薑 · 炙甘草 各三分, 薑 3片, 棗 2枚. ○ 此方 出於龔信萬病回春書中 治中氣病 中氣者 與人相爭 暴怒 氣逆而 暈倒也 先以薑湯救之 甦後用此藥 → 중기병, 히스테리성 실신에 사용 소: 깨어나다
약 · 향부자 · 청피 · 진피 · 후박 · 지각 · 반하 각1돈, 목향 · 축사 각5푼, 계피 · 건강 · 자감초 각3푼, 강 3쪽, 조 2개. 이 처방은 공신의〈만병회춘〉중에 나온다. 중기병을 치료한다. 중기는 다른 사람과 서로 다투다가 격렬하게 화를 내어 기운이 거슬러 올라가 어지러워 쓰러지는 것이다. 먼저 생강 달인 것을 써서 구하고, 깨어난 후에 이 약을 쓴다. ✓정신적 불안정: 목향순기산, 향부자팔물탕을 많이 사용
5. 蘇合香元 소합향원
白朮 · 木香 · 沈香 · 麝香 · 丁香 · 安息香 · 白檀香 · 訶子皮 · 香付子 · 華撥 · 犀角 · 朱砂各二兩, 朱砂半爲衣 蘇合油 入安息香膏內 乳香 龍腦 各1兩. 右細末 用安息香膏竝煉蜜 搜和千搗 每一兩 分作40丸 每取 2~3丸 井華水 或溫水下 수화천도: 잘섞어서 1000번을 찌는다 ○ 此方 出於局方 治一切氣疾 中氣 上氣 氣逆 氣鬱 氣痛 ○ 許叔微本事方曰 凡人 暴喜傷陽 暴怒傷陰 憂愁拂意 氣多厥逆 當用此藥 若藥作中風治 多致殺人 불의: 뜻에 거스르다, 내키지 않다 ○ 危亦林得效方曰 中風 脈浮身溫 口多痰涎 中氣 脈沈身涼 口無痰涎 → 소음인 중기병, 히스테리성 실신 ○ 今考更定 此方 當去 麝香 犀角 朱砂 龍腦 乳香 當用 藿香 茴香 桂皮 五靈脂 玄胡索
백출 · 목향 · 침향 · 사향 · 정향 · 안식향 · 백단향 · 가지피 · 향부자 · 필발 · 서각 · 주사 각2냥, 주사(반은 곁에 입힌다), 소합유(안식향으로 만든 고약에 넣는다), 유향 · 용뇌 각1냥. 이 약들을 곱게 가루내어 안식향으로 만든 고약과 졸인 꿀로 반죽하여 수없이 찌워서 1냥으로

나누어 40알을 만든 후, 매번 2~3알씩 정화수나 따뜻한 물로 먹는다. 이 처방은 〈국방〉에 나온다. 모든 기질과 중기, 상기, 기억, 기울, 기통을 치료한다. 허숙미가 〈본사방〉에서 말하기를 "사람이 갑자기 기빠하면 양을 상하고, 갑자기 화를 내면 음을 상한다. 근심으로 마음이 답답해지면 대부분의 기가 꺾여하니, 이 약을 써야 하나, 만약 중풍으로 여기고 치료하면 많은 경우에 사람을 죽이게 된다"라고 하였다. 위역림이〈득효방〉에 말하기를 "중풍은 맥이 부하고 몸이 따뜻하며 입에 침가래가 많이 나온다. 중기는 맥이 침하고 몸이 차며 입에 침가래는 없다"라고 하였다. ⇒ 중기와 중풍은 다르다 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 사향 · 서각 · 주사 · 용뇌 · 유향을 빼야 하고, 광향 · 회향 · 계피 · 오령지 · 현호석을 써야 한다

6. 藿香正氣散 광향정기산
藿香 1錢 5分, 紫蘇葉 1錢, 厚朴 大腹皮 白朮 陳皮 半夏 甘草 桔梗 白芷 白茯苓 各5分 薑 3片, 棗 2枚 ○ 此方 出於龔信醫鑑書中 治傷寒 → 태음증, 율광증에 사용. 표증, 리증 모두 사용 가능. (율광증에선 대장파한 있을 때) 둘 중 확실하지 않을 때 사용 가능 ○ 今考更定 此方 當去 桔梗 白芷 白茯苓 當用 桂皮 乾薑 益智仁
광향 1돈5푼, 자소엽 1돈, 후박 · 대복피 · 백출 · 진피 · 반하 · 감초 · 길경 · 백지 · 백복령 각5푼, 생강 3쪽, 대추 2개. 이 처방은 공신의 〈의감〉중에 나온다. 상한을 치료한다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 길경 · 백지 · 백복령을 빼야 하고, 계피 · 건강 · 익지인을 써야 한다.

7. 香蘇散 향소산
香附子 3錢, 紫蘇葉 2錢 5分, 陳皮 1錢 5分, 蒼朮 甘草 各 1錢, 薑 3片, 蔥白 2莖 ○ 此方 出於危亦林得效方書中 治四時瘟疫 → 사시온역, 전염병

○ 局方曰 昔有一老人 授此方 與一人 令其合施 城中大疫 服此皆愈
향부자 3돈, 자소엽 2돈5푼, 진피 1돈5푼, 창출 · 감초 각1돈, 생강 3쪽, 총백 2뿌리 이 처방은 위역림의 <득효방> 중에 나온다. 사시의 온역을 치료한다. <국방>에 말하기를 “옛날에 한 노인이 있었는데, 이 처방을 한 사람에게 주었고 그로 하여금 보시하게 하였는데, 성 안에 역병이 크게 돌았을 때 이 약을 먹고 모두 나았다.
8.桂枝附子湯 계지부자탕
附子炮 桂枝 各3錢, 白芍藥 2錢, 甘草炙 1錢, 薑 3片, 棗 2枚 ○ 此方 出於李梴醫學入門書中 治汗漏不止 四肢拘急 難以屈伸 → 땀 그치지 않고, 사지가 구부러져서 펴지지 않을때(망양증 말증정도)
포부자 · 계지 각3돈, 백작약 2돈, 자감초 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개 이 처방은 이천의 <의학입문> 중에 나온다. 땀을 줄줄 흘려 멈추지를 않고, 사지가 당겨 구부리 고 펴기가 어려운 것을 치료한다. ✓ 부자가 들어감: 인삼 쓸 때보다 더 심각할 때
9.茵陳四逆湯 인진사역탕
茵陳 一兩, 炮付子 · 炮乾薑 · 炙甘草 各一錢. ○ 治陰黃病 冷汗不止 → 황달&찬땀이 그치지 않음
인진 1냥, 포부자 · 포건강 · 자감초 각1돈. 음황병으로 찬 땀이 멈추지 않는 것을 치료한다. - 인진⇒황달에 사용. 인진 시리즈 3개(from 주광의 활인서)는 모두 황달에 쓰는데, 각각 쓰임이 좀 다름 간의 문제로 인한 황달 ⇒ 인진진피탕, 인진사역탕 식적으로 인해 황달(간에 문제x) = 위황 ⇒ 적백하오관중탕
10.茵陳附子湯 인진부자탕
茵陳 一兩, 付子炮 · 炙甘草 各一錢. ○ 治陰黃病 身冷→ 황달&몸이 차가움
인진1냥, 포부자 · 자감초 각1냥.

음황병으로 몸이 찬 것을 치료한다.
11.茵陳橘皮湯 인진귤피탕
茵陳 一兩, 陳皮 · 白朮 · 半夏 · 生薑 各一錢. ○ 治陰黃病 喘嘔不渴. → 황달&기침, 구토, 구갈x 右三方 出於朱肱活人
인진 1냥, 진피 · 백출 · 반하 · 생강 각1돈. 황병으로 숨이 차고 구역질을 하나 갈증이 없는 것을 치료한다. 이상의 세 가지 처방=인진사역/인진부자/인진귤피은 주광의 <활인서> 중에 나온다.
12.三味蓼莢湯 삼미삼유탕
吳茱萸 三錢, 人蓼 二錢, 薑 四片, 棗 二枚. ○ 治厥陰證 嘔吐涎沫, 少陰證 厥冷煩躁, 陽明證 食穀欲嘔 皆妙 → 췌음증, 소음증 장결, 양명증(=망양증)
오수유 3돈, 인삼 2돈, 생강 4쪽, 대조 2개. 췌음증으로 거품침을 토하거나, 소음증으로 손발이 싸늘하며 답답해서 어쩔 줄 몰라하거나, 양명증으로 음식을 먹으면 토하려고 하는 것을 치료하니 모두 신묘하게 효과가 있다.
인삼오수유탕 인삼 1兩 오수유 생강 각3錢 백작약 당귀 관계 각1錢 -삼미삼유탕 써도 좋지만 업그레이드한 인삼오수유탕 쓰는데 더 좋다!
13.霹靂散 벽력산
附子 1枚 炮過 以冷灰 培半時取出 切半枚 細剉 入臘茶 1錢 水一盞 煎 좌: 저미다 / 납다: 작설차, 녹차 至六分去渣 入熟蜜半匙 放冷服之 須臾躁止 得睡汗出 差 ○ 治陰盛隔陽證, 右二方 出於李梴醫學入門書中 → 음성격양증에 사용: 고냉적체, 막힌 것을 뚫어줌
부자1개를 습지에 써서 구워, 식은 재로 덮어 반시각을 두어 꺼내어 반개로 찌개어 얇게 자른 다. 작설차1돈, 물1잔을 넣고 달여 6푼이 되게 하여 찌꺼기를 제거하고, 졸인 꿀 반 숟가락을 넣고 식혀서 복용한다. 잠시 뒤에 답

답해 어쩔줄 몰라하는 것이 멈추고 자면서 땀이나면 낫는다.

음성격양증을 치료한다. 이상의 두 처방은 이천의〈의학입문〉중에 나온다.

- 소음인 병은 차가워서 생긴 것이므로 찬 약재는 빼고, 따뜻한 약을 더 넣어줌

3. 파두약 육간대청방 (온백원, 장달환, 삼릉소적환, 비방화체환, 삼물백산, 여의단)

->파두6방 시험에 잘내니 알아두라고 하심.

1.溫白元 온백원

川烏炮 二兩五錢, 吳茱萸, 桔梗, 柴胡, 石菖蒲, 紫苑, 黃連, 乾薑炮, 肉桂, 川椒炒, 赤茯苓, 皂角灸, 厚朴, 人蔘, 巴豆霜 各五錢.

右爲末 煉蜜和丸 梧子大 薑湯下 3丸 或 5丸 至7 丸.

연말: 졸인꿀

○ 此方 出於局方 治積聚 癥瘕 黃疸 鼓脹 十種水氣 八種痞塞 五種淋疾 遠年瘧疾.

-> 소음인의 적체가 쌓인 경우에 파두 사용 가능 (막힌 것 뚫음)

○ 龔信醫鑑曰 婦人 腹中積聚 有似懷孕* 羸瘦*困弊* 或歌哭如邪祟* 服此藥 自愈. 久病 服之則 皆瀉出蟲蛇 惡膿之物

*회양: 임신, *리수: 마르고 여임, *곤폐: 곤궁하고 피폐함, *사수: 귀신들린듯함

천오(습지에 싸서 굽는다), 오수유·길경·시호·석창포·자완·황련·건강(습지에 싸서 굽는다)·육계·천초(볶는다)·적복령·조각(굽는다)·후박·인삼·파두상 각 5돈.

이상을 가루 내어 졸인 꿀로 환을 지어 오동나무씨앗 크기로 만들고, 생강 달인 물로 3알을 복용하거나 또는 5알에서 7알까지 먹는다.

이 처방은 〈국방〉중에 나온다. 적취, 정가, 황달, 고창, 10종의 수기, 9종의 심통, 8종의 비색, 5종의 임질, 오래된 학질 등을 치료한다.

공신이 〈의감〉에 말하기를 "부인의 배안에 적취가 있어 임신한 것처럼 보이고, 몸이 여위고 노곤하거나, 혹은 사수처럼 노래를 부르거나 통곡을 할 때 이 약을 먹으면 저절로 낫는다. 오랜 병에 이를 복용하면 벌레나 뱀이나 더러운 고름 같은 것이 설사로 나오게 된다.

2.瘴疽丸 장달환

茵陳, 梔子, 大黃, 芒硝 各1兩, 杏仁 6錢, 常山, 鱉甲, 巴豆霜 各 4錢, 豆豉 2錢.

右爲末 蒸餅和丸 梧子大 每 3丸 或 5丸 溫水送下.

증병, 증편: 떡을 찢

○ 此方 出於危亦林得效方書中 一名 茵陳丸. 治時行瘟疫 及 瘴癘 黃疸 濕熱病.

인진·치자·대황·망초 각1냥, 행인 6돈, 상산·별갑·파두상 각4돈, 두시 2돈.

이상을 가루내어 찢 떡으로 환을 만들기를 오동나무씨앗 크기로 하여, 매번 3알 혹은 5알을 따뜻한 물로 먹는다.

이 처방은 위역림의 〈득효방〉중에 나오니, 인진환이라고도 한다. 시행은역과 장학, 황달, 습열병 등을 치료한다.

3.三稜消積丸 삼릉소적환

三稜, 蓬朮, 神麴 各7錢, 巴豆和皮入米同炒黑去米, 青皮, 陳皮, 茴香 各5錢,

파두를 쌀과 함께 볶아서 쌀을 버림

丁香皮, 益智仁 各3錢. 右爲末 醋糊和丸 梧子大 薑湯下 30-40丸.

초호:식초 섞은풀

○ 此方 出於李杲東垣書中 治生冷物不消滿悶

-> 차거나 생것을 먹고 쌓인 것을 뚫어줌

삼릉·봉출·신곡 각7돈, 파두(겉질째로 쌀과 함께 넣고 겹게 볶은 후 쌀을 제거한다)·청피·진피·회향 각5돈, 정향피·익지인 각3돈.

이 약들을 가루내어 식초를 넣어 쑨 풀로 환을 만들기를 오동나무씨앗 크기로 하여, 생강달인 물에 30-40알씩 먹는다.

이 처방은 이고의 〈동원서〉중에 나온다. 생것이나 찬것에 상하여 소화되지 않고 속이 더부룩하며 답답한 것을 치료한다.

4.祕方化滯丸 비방화체환

三稜, 蓬朮, 荳蔻 各4錢 8分, 半夏麴, 木香, 丁香, 青皮, 陳皮並去白, 黃連 各2錢5分, 巴豆肉醋浸一宿熬乾 6錢.

右爲末 以烏梅末 入麵少許 煮作糊和丸 黍尖大 每服 5-7丸 至 10丸 欲通利則 以熱湯下 欲磨積則陳皮湯下 欲止泄 則飲冷水. ○ 此方 出於朱震亨丹溪心法書中 理一切氣 化一切積 久堅沈痼 磨之自消 暴積乍留 導之立法 奪造化 有通塞之功 調陰陽 有補瀉之妙.
삼릉 · 봉출(같이 잿불에 굽는다) 각4돈8푼, 반하국 · 목향 · 정향 · 청피 · 진피(모두 흰 부분을 제거한다) · 황련 각2돈5푼, 파두육(식초에 하루밤 담갔다가 볶아서 말린다) 6돈. 이 약들을 가루내어 오매가루에 밀가루 약간을 넣고 삶아서 쏘 풀로 환을 만들기를 기장쌀 크기 하여, 매번 5-7알에서 10알까지 먹는다. 잘 통하게 하려면 뜨거운 물로 먹고, 적취를 갈아 없애려면 진피 달인 물로 먹으며, 설사를 막게 하려면 찬물로 먹는다. 이 처방은 주진형의 <단계심법> 중에 나온다. 모든 기를 다스리고 <u>모든 적을 없애니, 오래되고 단단하여 고질적인 것을 이것으로 갈면 저절로 없어지고, 갑자기 쌓여 잠시 머무는 것은 이것으로 이끌어내면 바로 없어진다.</u> 조화를 이루게 하여 <u>막힌 것을 뚫는 효과</u>가 있고, 음양을 조절하여 보하고 사하는 묘미가 있다.
5.三物白散 삼물백산
桔梗 貝母 各3錢, 巴豆去皮心熬研如脂 1錢. 右爲末 和均白湯 和服半錢 弱人減半 或吐 或利 不利 進熱粥一碗 或利不止 進冷粥一碗. → 범론의 한실결흉, 수결흉(=태음병 비만증)에 사용 (열실결흉에는 사용x)
길경 · 패모 각3돈, 파두(껍질을 벗기고 거심하여 볶은 뒤 기름처럼 간다) 1돈. 이 약들을 가루내어 고루 섞어 끓인 물에 반돈씩 먹되 약한 사람은 절반만 먹는다. 혹은 토하거나 설사를 하는데, 설사를 하지 않으면 뜨거운 죽 한 사발을 먹고, 설사가 멎지 않으면 차가운 죽 한 사발을 먹는다.
6.如意丹 여의단
川烏炮 8錢, 檳榔, 人蔘, 柴胡, 吳茱萸, 川椒, 白茯苓, 白薑, 黃連, 紫菀, 厚朴, 肉桂, 當歸, 桔梗, 皂角, 石菖蒲 各5錢, 巴豆霜 2錢 5分. 右爲末 煉蜜和丸 梧子大 朱砂爲衣 每 5丸 或 7丸 溫水下. ○ 專治瘟疫 及 一切鬼祟. 右二方 出於李梴醫學入門書中 → 온역 치료 ○ 論曰 右巴豆六方 卽 古人之各自置方 各自經驗而此六方 同是一巴豆之力

則所用亦無異而 同歸於一也. 蓋 巴豆 少陰人病之必不可不用 而又不可輕用 必不可浪用 而又不可疑用之藥 故 聯錄六方 備述經驗 昭明其理者 欲其用之必中 而不敢輕忽也. → 위 6가지 파두방은 옛사람 경험에 의한 처방. 파두는 소음인 고냉적체에 사용하면 좋음
천오(습지에 굽는다) 8돈, 빈랑 · 인삼 · 시호 · 오수유 · 천초 · 백복령 · 백강 · 황련 · 자완 · 후박 · 육계 · 당귀 · 길경 · 조각 · 석창포 각5돈, 파두상 2돈5푼. 이 약들을 가루내어 졸인 꿀로 환을 만들기를 오동나무씨앗 크기로 하여 주사로 겹을 입혀, 매번 5알 또는 7알을 따뜻한 물로 복용한다. 오로지 온역과 모든 귀수를 치료한다. 이 두 처방은 이천의 <의학입문> 중에 나온다. 논하여 말하기를 이상의 파두가 든 6개의 처방은 옛날 사람들이 각자 만들어 각자 경험한 것이나, 이 6개 처방들은 똑같이 파두의 힘인 것으로 그 쓰임도 다를 바가 없이 한가지이다. 대개 파두는 소음인병에 반드시 쓰지 않을 수 없으며 가볍게 써서도 안 되니, 반드시 경솔하게 써서도 안 되고, 쓰기를 꺼려할 필요도 없다. 그러므로 이 여섯 가지 처방을 줄줄이 기록하여 그 경험을 서술하니, 그 이치를 밝게 아는 자는 이를 사용하되 반드시 효과를 얻을 것이나 경솔하게 써서는 안 될 것이다.

4. 새로 정한 소음인병의 주요 24처방

1. 黃芪桂枝附子湯 황기계지부자탕
桂枝 黃芪 各三錢 白芍藥 二錢 當歸 甘草炙各一錢 附子炮 一錢 或 二錢 薑三片 棗二枚
계지 · 황기 각3돈, 백작약 2돈, 당귀 · 자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈, 생강 3쪽, 대조 2개.
2. 人蔘桂枝附子湯 인삼계지부자탕
人蔘 四錢 桂枝 三錢 白芍藥 黃芪 各二錢 當歸 甘草炙 各一錢 附子炮 一錢 或 二錢 薑三片 棗二枚
인삼 4돈, 계지 3돈, 백작약 · 황기 각2돈, 당귀 · 자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈, 생강 3쪽,

대조 2개.
3. 升陽益氣附子湯 승양익기부자탕
人蔘 桂枝 白芍藥 黃芪 各二錢 白何首烏 官桂 當歸 甘草灸 各一錢 附子炮 一錢 或 二錢 薑三片 棗二枚
인삼 · 계지 · 백작약 · 황기 각2돈, 백하수오 · 관계 · 당귀 · 자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈, 생강 3쪽, 대조 2개.
4. 人蔘官桂附子湯 인삼관계부자탕
人蔘 五錢 或 一兩 官桂 黃芪 各三錢 白芍藥 二錢 當歸 甘草灸 各一錢 附子炮 二錢 或 二錢五分 薑三片 棗二枚
인삼 · 계지 · 백작약 · 황기 각2돈, 백하수오 · 관계 · 당귀 · 자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈, 생강 3쪽, 대조 2개.
○ 右四方 皆亡陽危病藥也. 亡陽病人 小便白而多 危有餘地則 用附子 1錢 日再服 小便赤而少 危無餘地則 用附子 2錢 日二三服 病在將危 用1錢 病在免危 用1錢 病在調理 亦1錢 日再服.
이 네 가지 처방은 모두 망양위병에 쓰는 약이다. 망양병 환자의 <u>소변이 맑고 양이 많으면</u> 위중하지만 여지가 있는 것으로 부자 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다. <u>소변이 붉고 양이 적으면</u> 위중하면서도 여지가 없는 것으로 부자 2돈을 써서 하루에 2-3번 복용시킨다. 병이 장차 위중해지려고 할 때는 1돈을 쓰고 병이 위중한 것을 벗어나도 1돈을 쓰며 병을 조리 할 때도 역시 1돈을 써서 하루에 두 번 복용시킨다. → 망양증 말증 부자탕 시리즈 4개
5. 升陽益氣湯 승양익기탕
人蔘 桂枝 黃芪 白芍藥 各二錢 白何首烏 官桂 當歸 甘草灸 各一錢 薑三片 棗二枚.
인삼 · 계지 · 황기 · 백작약 각2돈, 백하수오 · 관계 · 당귀 · 자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개.

6. 補中益氣湯 보중익기탕
人蔘 黃芪 各三錢 甘草灸 白朮 當歸 陳皮 各一錢 藿香 蘇葉 各三分 或 五分 薑三片 棗二枚.
인삼 · 황기 각 3돈, 자감초 · 백출 · 당귀 · 진피 각 1돈, 곽향 · 소엽 각3푼, 또는 5푼, 생강 3쪽, 대조 2개. 인삼, 황기가 더 많이 증가 ⇒ 보기, 익기: 보명지주를 도와줌
*이동원 보중익기탕의 변방 •승마 시호 (-) 곽향 소엽 (+) •황기 인삼 (++) •소음인의 신수열표열병 망양증, 궤음증
7. 黃芪桂枝湯 황기계지탕
桂枝 三錢 白芍藥 黃芪 各二錢 白何首烏 當歸 甘草灸 各一錢 薑三片 棗二枚.
계지 3돈 · 백작약 · 황기 각 2돈,, 백하수오 · 당귀 · 자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개 → 망양 초증
8. 川芎桂枝湯 천궁계지탕
桂枝 三錢 白芍藥 黃芪 各二錢 白何首烏 當歸 甘草灸 各一錢 薑三片 棗二枚.
계지 3돈, 백작약 2돈, 천궁 · 창출 · 진피 · 자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개. → 울광 초증
9. 芎歸香蘇散 궁귀향소산
香附子 二錢 紫蘇葉 川芎 當歸 蒼朮 陳皮 甘草灸 各一錢 葱白 五莖 薑三片 棗二枚.
향부자 2돈, 자소엽 · 천궁 · 당귀 · 창출 · 진피 · 자감초 각1돈, 총백 5뿌리, 생강 3쪽, 대조 2개. → 울광 초증
10. 藿香正氣散 곽향정기산
藿香 一錢五分 紫蘇葉 一錢 蒼朮 白朮 半夏 陳皮 青皮 大腹皮 桂皮 乾薑 益智仁 甘草灸 各五分 薑三片 棗二枚

곽향 1돈5푼, 자소엽 1돈, 창출·백출·반하·진피·청피·대복피·계피·건강·익지인·자감초 각5푼, 생강 3쪽, 대조 2개. → 표리검증: 표증, 리증에 모두 사용 가능 : 표증(울광병)에서 대장파한 생겼을 때, 리증(태음병) 모두 가능
*공신 곽향정기산의 변방 •길경 백지 복령 후박 (-) / 계피 건강 익지인 창출 청피 (+) •표리검증 : 표병 중 대장파한 울광초증, 리병 태음병 하리청곡
11. 八物君子湯 팔물군자탕
人蔘 二錢 黃芪 白朮 白芍藥 當歸 川芎 陳皮 甘草灸 各一錢 薑三片 棗二枚 ○ 本方 以白何首烏 易人蔘則 名曰 白何首烏君子湯 本方 用蔘芪 各1兩 加白何首烏 官桂 各1錢則 名曰 十全大補湯 本方 用人蔘 1兩 黃芪 1錢則 名曰 獨蔘八物
인삼 2돈, 황기·백출·백작약·당귀·천궁·진피·자감초 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개 → 울광증 중증 본 처방에 백하수오로 인삼을 대체하면 백하오군자탕이라 한다. 본 처방에 인삼과 황기 각 1돈을 쓰고 백하수오와 관계 각1돈을 더한 것을 십전대보탕이라 한다. 본 처방에 인삼 1냥, 황기 1돈을 쓴 것을 독삼팔물탕 →태양병결음증이라 한다.
12. 香附子八物湯 향부자팔물탕
香附子 當歸 白芍藥 各二錢 白朮 白何首烏 川芎 陳皮 甘草灸 各一錢 薑三片 棗二枚 嘗治 婦人思慮傷脾 咽乾舌燥 隱隱有頭痛 神效.
향부자·당귀·백작약 각 2돈, 백출·백하수오·천궁·진피·자감초 각 1돈, 생강 3쪽, 대조 2개. 일찍이 부인이 생각이 너무 많아 비장을 상하여 목이 말고 혀가 건조하며 은은하게 두통이 있는 경우를 치료하여 신묘한 효과가 있었다. → 예민하고 신경성 강한 소음인 여성에게 많이 사용

13. 桂枝半夏生薑湯 계지반하생강탕
生薑 三錢 桂枝 半夏 各二錢 白芍藥 白朮 陳皮 甘草灸 各一錢 ○治虛寒嘔吐 水結胸 等證.
생강 3돈, 계지·반하 각 2돈, 백작약·백출·진피·자감초 각 1돈. 허한하여 구토를 하거나 수결흉 등의 증상을 치료한다. → 태음병 비만증/사심탕의 변방
14. 香砂養胃湯 향사양위탕
人蔘 白朮 白芍藥 甘草灸 半夏 香附子 陳皮 乾薑 山查肉 砂仁 白豆蔻 各一錢 薑三片 棗二枚
인삼·백출·백작약·자감초·반하·향부자·진피·건강·산사육·사인·백두구 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개. → 비위 질환
15. 赤白何烏寬中湯 적백하오관중탕
白何首烏 赤何首烏 良薑 乾薑 青皮 陳皮 香附子 益智仁 各一錢 棗二枚 ○ 治四肢倦怠 小便不快 陽道不興 將有浮腫之漸者 用之. 本方 加 厚朴 枳實 木香 大腹皮 各5分 則又有通氣脈之功力(十二味寬中湯) 雖浮腫已成者 安心靜慮一百日而 日再服則 自無不效之理. 本方 以人蔘 易赤何首烏則 名曰 人蔘白何烏寬中湯 以當歸 易赤何首烏則 名曰 當歸白何烏寬中湯 ○ 古方 有乾薑 良薑 青皮 陳皮 等分 作湯丸 名曰 寬中湯 嘗治 少陰人 小便不快 陽道不興 四體倦怠 無力者 用之 必效 百發百中 又, 寬中丸, 本方, 加五靈脂·益智仁 各一錢, 則治腹痛, 神效.
백하수오·적하수오·건강·량강·청피·진피·향부자·익지인 각1돈, 대조 2개. 사지가 무겁고 늘어지며, 소변이 시원하지 않고, 양도가 일어나지 않고, 장차 부종이 생길 조짐이 있을 때 쓴다. 본 처방에 후박·지실·목향·대복피 각5푼을 더하면 또한 기맥을 통하게 하는 효과가 있다. 본 처방에 인삼으로 적하수오를 대체하면 인삼백하오관중탕이라 하며, 당귀로 적하수오를 대체하면 당귀백하오관중탕이라 한다.

옛 처방으로 건강 · 량강 · 청피 · 진피 등을 같은 분량으로 하여 다리거나 환을 만든 것을 관중탕이라 하는데,
 일찍이 소음인이 소변이 시원하지 않고, 양도가 일어나지 않으며, 사지가 무겁고 늘어져 힘이 없는 경우에 썼는데 반드시 효과가 있는 것이 백발백중이었다.
 또 관중환 본 처방에 오령지 · 익지인 각1돈을 더하면 복통을 치료하는데 신묘한 효과가 있다.
 ★ 적백하오관중탕: 부종지속(비만-황달-부종)에 모두 사용 가능
 cf. 십이미관중탕: 특히 부종이 심한 경우에 사용
 ⇒ 십이미관중탕 = 적백하오 관중탕 + 후박, 지실, 목향, 대복피

16. 蒜蜜湯 산밀탕
 白何首烏 · 白朮 · 白芍藥 · 桂枝 · 茵陳 · 益母草 · 赤石脂 · 罌粟殼 各一錢, 生薑 三片, 大棗 二枚, 大蒜 · 五根 清蜜, 半匙.
 ○ 治痢疾
 백하수오 · 백출 · 백작약 · 계지 · 인진 · 익모초 · 적석지 · **앵속각** 각1돈, 생강 3쪽, 대조 2개, 대산 5뿌리, 청밀 반 숟가락. / 이질을 치료한다. → **이질 치료**

17. 鷄參膏 계삼고
 人蔘 一兩 桂皮 一錢 鷄一首
 濃煎服 或以胡椒 清蜜 助滋味 無妨
 ○ 此方 自古有方 治瘧疾 痢疾 神效. 嘗治久瘧 先用 巴豆 通利大便 後數三日連用 鷄參膏 快效. 桂皮 或以桂心 代用.
 인삼 1냥, 계피 1돈, 닭 1마리.
 진하게 달여서 복용하는데, 혹은 호초, 청밀로 맛을 돋우는 것도 무방하다. 이 처방은 예로부터 있던 처방으로 학질, 이질을 치료하는데 신묘한 효과가 있다. 일찍이 오래된 학질에 먼저 파두를 써서 대변을 보게 하고, 이어 수삼일을 연이어 계삼고를 쓰니 아주 효과가 있었다. 계피는 혹은 계심으로 바꾸어 대신 쓸 수 있다.

→ 음식과 약의 경계: 삼계탕과 똑같다고 보면 됨 (인삼, 계지, 닭을 고아 만든 것)
 → 학질이나 이질을 치료

18. 巴豆丹 파두단 ★
 巴豆 1粒 去殼取粒 溫水吞下 全粒 或半粒 仍煎湯藥
 ○ 以煎藥時刻 巴豆 獨行腸胃間 太半用力 然後 服湯藥則 湯藥 可以與巴豆 同行 通快腸胃 升提其氣也 再煎湯藥 大便通後 又連服之. 巴豆 全粒 下利 半粒 化積
 파두 한 알. 껍질을 제거하고 알갱이를 따뜻한 물로 한 알 또는 반 알을 먹으며, 이어 탕약을 달인다.
 약을 달이는 시각에 파두는 홀로 장위 사이에 작용하며 거의 약력이 쓰여진 후에 탕약을 복용하면 파두와 같이 다니며 장위를 시원하게 통하게 하며 그 기운을 끌어올리게 된다. 다시 약을 달여서 대변이 통한 후에 다시 연이어 복용해야 한다.
 파두 한 알은 설사를 시키고, 반 알은 적을 없앤다.
 - 본격적인 치료 하기 전에, 시간적 여유를 벌게끔함 (수액을 주면서 관찰하는 것과 비슷) 또한 약을 먹기전에 파두를 맥여 약이 잘 흡수되고 통하게 한다.
 ☞ 한알: 지사 / 반알: 쌓인 것을 뚫어줌

19. 人蔘陳皮湯 인삼진피탕
 人蔘 1兩, 生薑 · 砂仁 · 陳皮 各1錢 大棗 二枚
 ○ 本方 以炮乾薑 易生薑 又加桂皮 1錢則 尤有溫胃逐冷之力. 以本方 嘗治 未周年 小兒陰毒慢風 連服數日 病快愈矣 病愈後 更不服藥 再發不治.
 인삼 1냥, 생강 · 사인 · 진피 각1돈, 대조 2개.
 본 처방에 포건강으로 생강을 대체하거나 계피 1돈을 더하면 더욱 위를 덥히고 냉기를 쫓아내는 힘이 있게 된다. 본 처방으로 일찍이 돌이 되지않은 아이의 음독만경풍을 치료한 적이 있는데, 연이어 수 일 동안 복용시켜 병이 흔쾌히 나았으며, 병이 나은 후에 다시 약을 먹이지 않았더니 재발하여 치료할 수 없었다.

-태음병음독증 中 어린이에게 사용 (cf. 인삼계피탕: 성인)

20. 人蔘吳茱萸湯 인삼오수유탕

人蔘 一兩, 吳茱萸 · 生薑 各三錢, 白芍藥 · 當歸 · 官桂 各一錢.

인삼 1냥, 오수유 · 생강 각2돈, 백작약 · 당귀 · 관계 각1돈. → 태양병결음증

21. 官桂附子理中湯 관계부자이중탕

人蔘 三錢, 白朮 · 乾薑炮 · 官桂 各二錢, 白芍藥 · 陳皮 · 炙甘草 各一錢, 附子炮 一錢, 或二錢.

인삼 3돈, 백출 · 포건강 · 관계 각2돈, 백작약 · 진피 · 자감초 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

→ 소음병 초-중기

22. 吳茱萸附子理中湯 오수유부자이중탕

人蔘 白朮 乾薑炮 官桂 各二錢 白芍藥 陳皮 甘草炙 吳茱萸 小茴香 破故紙 各一錢 附子炮 一錢 或二錢

인삼 · 백출 · 포건강 · 관계 각2돈, 백작약 · 진피 · 자감초 · 오수유 · 소회향 · 파고지 각1돈, 포부자 1돈 또는 2돈.

→ 소음병 중-말기

23. 白何烏附子理中湯 백하오부자이중탕

白何首烏 白朮炒 白芍藥微炒 桂枝 乾薑炮 各二錢 陳皮 甘草炙 附子炮 各一錢.

백하수오 · 백출(볶는다) · 백작약(약간 볶는다) · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 · 포부자 각1돈. → 태음병 초증

24. 白何烏理中湯 백하오이중탕

白何首烏 白朮 白芍藥 桂枝 乾薑炮 各二錢 陳皮 甘草炙 各一

○ 有人蔘則 用人蔘 無人蔘則 用白何首烏

白何首烏 與 人蔘 性味相近而 清越之力 不及 溫補之力 過之 不無異同之處

청월: 소리가 맑고 가락이 높다 (승양익기)

險病 危證 人蔘二錢以上 不可全恃 白何首烏代用

古方 經驗不多 藥材生疎 故也

然 此一味 必不可遺棄於補藥中而 古方 何人飲 用白何首烏五錢 治瘧病

-하인음: 백하오5 인삼3 당귀 진피2 강3 (경약전서, 방약합편)

백하수오 · 백출 · 백작약 · 계지 · 포건강 각2돈, 진피 · 자감초 각1돈. → 태음병 초증

인삼이 있으면 인삼을 쓰고, 인삼이 없으면 백하수오를 쓴다.

백하수오와 인삼은 그 성질과 기미가 서로 유사하나, 기운을 맑게 하고 널리 퍼지게 하는 힘은 미치지 못하고, 덥혀서 보하는 힘은 지나치니 같고 다름이 없지는 않다.

험병과 위증에 인삼 2돈 이상을 쓸 때는 백하수오로 모두 대신 쓸 수는 없다.

옛 처방에는 경험이 많지 않으므로 이 약재가 생소했던 것이다.

그러나 이 약만은 보약 중에서 뺄 수 없는 것이니, 옛 처방의 하인음은 백하수오 5돈을 써서 학질을 치료하였다.

인삼이 없을 때 백하오를 대신하여 사용할 수 있음

단, 인삼이 2돈 이상 필요한 처방(보명지주가 매우 손상)에는 백하오를 대신해서 사용할 수 없음 (인삼은 양난지기를 도와주는 작용이 확실하다.)

⇒ 백하오: 인삼하고 비슷하나 청월지력(승양익기)이 부족, 온보지력은 과함

cf. 인삼이 보명지주인 양난지기를 더 많이 도와줌

사상체질의학 5주차

수업 ppt 내용 검은글씨 / 교수님 설명 회색글씨

01 소양인 병증 개론

이번주부터 소양인 파트 시작. 중간고사 시험범위는 소음인, 소양인

소양인의 심욕 (2-2)

- 人趨心慾 棄智而飾私者 名曰 薄人

- 소양인은 정의로운 사람

소양인의 노성, 애정 (3-7, 3-9)

- 少陽之性氣 恒欲舉而不欲措. (3-7)
- 少陽之精氣 恒欲外勝 而不欲內守 (3-9)

- 시작하는 것을 좋아하는데, 마무리를 잘 못 지음
- 바깥일에 관심이 많음
- 지혜가 있고, 사무적인 일을 잘 함

천기와 인사 (3-11 ~ 3-17)

- 少陽人 雖至愚 其性 恢恢然猶式度也 雖至不肖 人之知愚 亦知之也. (3-11)
- 少陽人 重於事務故 恒有出外興事務之哀心 此心 出於秉彝之敬心也 莫非至善 而不謹於居處 / 故 每爲主內做居處人所陷 而偏哀傷臟 以其重外 而輕內故也. (3-14)
- 少陽之腹 宜戒 夸心 少陽之腹 若無夸心 絕世之度量 必在於此也. (3-16)
- 少陽之腰 宜戒 懶心 少陽之腰 若無懶心 大人之才幹 必在於此 (3-17)

- 과심 : 소양인은 원래 능력이 1이어도 10정도의 더 큰 업적이 있다고 자랑함
→ 소양인은 자랑하는 마음이 있음
- 나심 : 소양인은 눈치가 빨라서 마무리를 꼼꼼히 하지 않고 대충함
→ 게으름을 많이 피움

소양인 성질재간 (17-3)

- 少陽人 性質 長於剛武 而材幹 能於事務.

- 공평, 공정을 많이 따짐 → 비평가들이 소양인 경향성이 많음

소양인 항심 (17-12)

- 少陽人 恒有懼心 懼心寧靜 則居之安 資之深 而造於

- 구심 : 소양인은 완벽주의적인 경향이 있음

→ 처음 시작은 잘 하나, 마무리를 못 내고 끝난다면, 다음에 실패한 경험이 있는 똑같은 일을 할 때 굉장히 불안해 함

소양인 체형기상 (17-2)

- 少陽人 體形氣像 胸襟之包勢 盛壯 而膀胱之坐勢 孤弱

- 어깨, 가슴이 넓고 엉덩이, 하체 쪽이 약함

비대신소자가 소양인이다

- 人稟臟理에 有四不同이니
- 肺大而肝小者 名曰太陽人이오
- 肝大而肺小者 名曰太陰人이오
- 脾大而腎小者 名曰少陽人이오
- 腎大而脾小者 名曰少陰人이라

- 비대신소인 사람을 소양인이라고 분류한 것이지, 소양인이 비대신소한 것이 아님

비대? 신소?

- 肺大 呼散之氣太過也 肝小 吸聚之氣不足也
- 肝大 吸聚之氣太過也 肺小 呼散之氣不足也
- **脾大 納積之氣太過也 腎小 出放之氣不足也**
- 腎大 出放之氣太過也 脾小 納積之氣不足也
- 납적지기가 태과하고 출방지기가 부족한 것이다.

- 비대 → 납적지기가 많아짐 → 열기 과다
- 신소 → 출방지기가 부족해짐 → 한기 부족

수곡의 온열량한기

- 水穀之都數 停畜於胃而 薰蒸爲熱氣 消導於小腸而 平淡爲涼氣
- 熱氣之輕清者 上升於胃脘而 爲溫氣 涼氣之質重者 下降於大腸而 爲寒氣
- 수곡은 전부 위에서 정축되면 훈증하여 열기가 되고, 小腸에서 소도되어 평담한 량기가 되고 / 열기 중 경정한 것은 위완으로 상승하여 온기가 되고, 량기 중 질중한 것은 대장으로 하강하여 한기가 된다.

- 소음인에서와 같은 조문 → 소양인과 소음인은 수곡지기 대사에 의해 병이 생김

수곡 기액의 대사

수곡지기 대사 (상하로 수곡 한열의 승강 조절) * 소화-배설기계
 — 비 : 수곡을 받아들이는(납적) 기능 (열) — 식욕&소화
 — 신 : 수곡을 내보내는(출방) 기능 (한) — 배변

기액지기 대사 (표리로 기액 호흡의 완속 조절) * 호흡-순환기계
 — 폐 : 기액을 내뿜는(호산) 기능 (온) — 땀
 — 간 : 기액을 모으는(흡취) 기능 (량) — 소변

소음인 신대비소 : 배변 기능 과항진 >> 식욕&소화 기능 저하
 소양인 비대신소 : 식욕&소화 기능 과항진 >> 배변 기능 저하

태음인 간대폐소 : 소변, 배변(소장) 기능 과항진 >> 땀 기능 저하
 태양인 폐대간소 : 땀 기능 과항진 >> 소변, 배변(소장) 기능 저하

肺以呼 肝以吸 肝肺者 呼吸氣液之門戶也
 脾以納 腎以出 腎脾者 出納水穀之府庫也

- 소양인 : 비대이기 때문에 위장장애가 덜함 + 대신 배변기능이 약함
 → 식욕과 소화기능이 과항진 될 수 있고, 배변기능이 저하될 수 있음

소양인 양열지기, 음한지기

- 水穀 納於胃而脾衛之 出於大腸而腎衛之 脾腎者 出納水穀之府庫而 迭爲補瀉者也
- 少陽人 大腸出 '水穀陰寒之氣' 不足則 胃中納 '水穀陽熱之氣' 必盛也
- 수곡(水穀)은 위에 들어가서 비의 보호를 받고 대장에 나가서는 신의 보호를 받으니 비와 신이라는 것은 수곡이 나가고 들어오는 창고로서 교대로 보태고 빠지는 것이다.
- 소양인은 대장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒)한 기가 부족하기 때문에 위중(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 반드시 성하다.

- 위, 대장 → 행동대장 / 비, 신 → 컨트롤
- 대장의 출이 많아지면 수곡의 음한지기가 부족해지고, 위중의 납이 많기 때문에
 ∴ 수곡의 양열지기가 넘치는 사람이 바로 소양인

보명지주 (생명을 유지시켜 주는 힘)

- 陰清之氣(陰寒之氣)
- 脾大 納積之氣太過也 腎小 出放之氣不足也
- 少陽人 以陰清之氣 爲保命之主 故 膀胱大腸爲本而 腎胃爲標


- 항상 음청지기(=음한지기)가 부족해지는 경향성을 나타냄

→ 따라서, 보명지주가 음청지기(=음한지기)

- 소양인은 열기가 항상 많기 때문에 음청지기를 넣어줌 → 처방에 찬 성질의 약재 多

- 소양인 : 방광, 대장이 本 / 배려, 위가 標

소양인 보명지주(陰清之氣) 순환 작용



- 음청지기가 신에서 만들어지고, 대장으로 보내짐 → 대장에서 위로 상승함

→ 중상초의 열기를 조절해주는 역할을 함 → 목으로 갔다가, 배려로 내려감

→ 배려에서 방광으로 하강하고 다시 신으로 들어가는 순환을 함

- 문제가 생기는 부분 : 대장-위 / 배려-방광 → 여기가 순환이 안돼서 문제가 생김

- 결론 : 중상초에 있는 비국의 열기를 조절해줌

- 소음인 : 배표부에서 상승 + 복리부에서 하강

- 소양인 : 복리부에서 상승 + 배표부에서 하강

→ 배표부에서 순환을 못해서 생기는게 표병 / 복리부에서 순환을 못해서 생기는게 리병

(여기서부터 작년 수업시간 설명)

- 목과 口는 상하의 개념

→ 목, 배려, 비, 위가 하늘처럼 위에 있고, 구, 방광, 신, 대장이 땅처럼 아래에 있음

- 음청지기가 복리(앞쪽)에서 상승, 배표(뒤쪽)에서 하강해야 정상

→ 순환이 잘 안되면 병이 생김

- 표병 : 표음을 강기하는 치법

- 리병 : 청양을 올려주는 치법

- 비수한표한병 : 배려의 열기가 커지면서 방광으로 내려가지 못하도록 보명지주를 잡음

→ 자기 길을 벗어나서 목, 위로 도망감 → 이게 한기가 되고, 소양인이 추위를 느낌

→ 강음, 청리열 시켜야 함

- 복리부분에서 상승하지 못하면 위수열리열증

(수업 ppt 설명)

1. 腎에서 생성된 陰清之氣는 腎氣이며, 대장을 保衛하고 液을 鼓動시키는 液海를 옹호하는 작용과 大腸의 배출을 조절하여 대변선통시켜 水穀寒氣를 유지하는 작용

2. 大腸에서 작용하는 陰清之氣는 2.大腸氣이며, 清陽(裏陽)을 胃로 상승시켜 脾局의 水穀熱氣가 태과하지 않도록 유지하는 작용과 水穀熱氣를 대변으로 배출하여 陰清之氣를 유지시키는 작용

3. 胃에서 작용하는 陰清之氣는 3.凉氣이며, 水穀의 熱氣가 태과하지 못하게 유지시키고, 水穀을 熏蒸하여 소화작용을 하며, 目, 背膂로 작용하여 水穀熱氣가 태과하지 못하도록 유지하는 작용

4. 背膂에서 작용하는 陰清之氣는 4.表陰(清陰)이며, 脾局의 水穀熱氣를 태과하지 못하게 유지시키며, 膀胱으로 하강하여 背表에서 衛外하는 작용을 도와줌

5. 膀胱에서 작용하는 陰清之氣는 5.衛氣이며, 背表를 衛外하는 작용을 함과 동시에 腎을 도와 陰清之氣를 유지할 수 있도록 작용

- 음청지기 = 신기, 대장기, 량기, 표음(청음), 위기


→ 음청지기가 위치별로 다르게 표현된 것이라고 이해하기

소양인의 性情氣

- 少陽人 怒性宏抱 而 哀情促急
- 怒性 宏抱者 少陽之目 察於世會 而怒衆人之相侮也 怒性 非他 視也
- 哀情 促急者 少陽之肺 行於事務 而哀別人之欺己也 哀情 非他 哀也
- 소양인은 **노성(怒性)은 광포**하지만 **애정(哀情)은 촉급**한 것이니,
- 노성**이 광포하다는 것은 소양인의 눈이 세회(世會)를 살필 때 못 사람들이 서로 업신여김을 노엽게 여기는 것이니, 노성이란 다름 아니라 **보는 것**이다.
- 애정**이 촉급하다는 것은 소양의 폐(肺)가 사무(事務)를 처리할 때 남이 자기를 속이는 것을 슬퍼하는 것이니, 애정이란 다름 아니라 **슬퍼하는 것**이다

- 소양인은 노성, 애정으로 인해 병이 생김

소양인 性情氣와 四臟氣의 관계




- 성기 → 순동 / 정기 → 역동

	정상	심한것
性氣	광포	순동
情氣	촉급	역동

- 노성기가 너무 과해지면 순동해서 원래 큰 비기가 더욱 더 커짐 → 병이 생김
- 애정기가 너무 과해지면 역동해서 원래 작은 신기가 더욱 더 작아짐 → 병이 생김
- 비기가 강해지고, 신기는 약해지는 병리
- ∴ 마음적인 부분에서도 병이 온다는 것을 설명해줌


소양인 表病



- 노성 : 6:4(비:신) 였던 것이 7:4, 8:4가 됨 → 표병

- 표병 : 성기가 작용해서 비국이 커지면서 간접적으로 신국과의 균형이 깨짐

소양인 裏病



- 애정 : 바로 신국 자체를 직접적으로 가격 → 6:4(비:신) 였던 것이 6:3, 6:2가 됨
- 표병 vs 리병 : 리병이 더 상태가 안 좋음
- + 리병 중에서도 역증이 더 상태가 안 좋음

소양인 表裏病					
사상인	장국대소	생리	성기 정기	표리병	발병부위
태양인	폐대	폐당 강 수곡온기 다	애성기	표병	鼻 腰脊
	간소	간당 약 수곡량기 소	노정기	리병	肺 小腸
소양인	비대	비당 강 수곡열기 다	노성기	표병	口 膀胱
	신소	신당 약 수곡한기 소	애정기	리병	腎 大腸
태음인	간대	폐당 강 수곡량기 다	희성기	표병	耳 頭腦(腦顱)
	폐소	폐당 약 수곡온기 소	락정기	리병	肺 胃脘
소음인	신대	신당 강 수곡한기 다	락성기	표병	目 背脊
	비소	비당 약 수곡열기 소	희정기	리병	脾 胃

- 계속해서 나온 내용이니까 소양인 부분만 한번 읽어보고 넘어가기

表裏辨證

- 表裏는 사상의학에서 인체의 전면부와 후면부를 구분하는 개념
- 表는 인체의 후면부에 해당되는 背表로 頭腦, 背脊, 腰脊, 膀胱의 부위로 소양인에서는 背脊, 膀胱을 의미
- 裏는 인체의 전면부에 해당되는 腹裏로 胃脘 胃, 小腸, 大腸의 부위로 소양인에서는 胃, 大腸을 의미

- 표(=후면부) : 두뇌, 배려, 요척, 방광 → 소양인에서는 배려, 방광을 의미

- 리(=전면부) : 위완, 위, 소장, 대장 → 소양인에서는 위, 대장을 의미

소양인 병증 분류 ★


- 表裏辨證(대분류) → 표병 : 배표부위 / 리병 : 복리부위
- 順逆辨證(중분류) → 순증 : 보명지주가 건재 / 역증 : 보명지주가 손상
- 輕重險危辨證(소분류) → 각 표병, 리병의 경/중/협/위를 나눔 (위험도 분류)
- 現證辨證(세분류) → 현증 : 현재 증상 / 소증 : 평상시 갖고있던 증상

소양인 병증								
대분류	비수한표한병				위수열리열병			
중분류	소양상풍병		망음병		홍격열병		음허오열병	
소분류	경증	중증	경증	중증	경증	중증	경증	중증
세분류	-소양상풍 병초증	-결홍증	-신열두통 망음증	-신한복통 망음증	-홍격열병 초증	-상소증	-하소증	-음허오열 증
	-소양상풍 병우증	-결홍우증	-신열두통 망음우증	-신한복통 망음우증	-홍격열병 우증	-중소증		-음허오열 우증

** 병증 분류는 꼭 알아두기!

- 망음병 : 음청지기(보명지주)가 설사로 빠져나감 → 소음인 망양증과 유사
- 음허오열병 : 열기가 너무 많아져 위급 → 소음인 음성격양증과 유사
- 상소, 중소 : 당뇨의 초증, 중증에 해당
- 하소 : 당뇨 말기. 음허오열증으로 분류함 → 표리구별(리증에서 시작 + 표증 양상도)

소양인 병증



- 비수한표한병

→ 표 부분에 한증이 나타남

→ 대표적인 증상은 신한 → 표병은 대부분 통증이 있다고 생각하면 됨(초기 감기 양상)

- 위수열리열병

→ 대표적인 증상은 신열(위국의 열을 받아서 리 부분에 열증이 나타나는 것)

→ 열이 많아지니까 흥변민조, 대변조의 양상이 나타남 → 비국에 열이 쌓임

∴ 소양인 : 화병 양상의 번조가 나타남 / 소음인 : 가슴이 답답하고 불안한 번조가 나타남

소양인 병증론 요약

- 少陽人は 전반적으로 중심세력이 上部에 있어 陽化되기 쉬우므로 陰清之氣가 保命之主라는 바탕 위에 昇降概念을 운용한다.
- 대체로 少陰人の 病證이 寒病證이라면 少陽人の 病證은 火와 熱의 病證으로 이해할 수 있다.
- 表病證은 脾大로 말미암아 鬱滯된 表陰을 내려주는 목적으로 表陰降氣 治법
- 裏病證은 腎小에서 기인한 火와 熱을 해결하기 위해 裏陽上升 治법

- 소양인은 화와 열로 인한 병증이라고 생각하면 됨. 소음인은 한으로 인한 병증

- 표음강기 : 표 부위의 음청지기를 내려주는 치법

- 리양상승 : 리 부위의 음청지기를 상승시켜주는 치법

- 금원사대가 보토파는 소음인 / 자음파, 한량파는 소양인의 병증을 나타냄

→ 소양인은 물이 부족하며 전해질 균형이 깨지면서 병이 생긴다고 봄

→ 자음하고 보음해주면서 병을 치료한다고 생각

→ 주단계, 유하간이 만든 처방이 소양인 처방과 비슷함

∴ 소양인은 차가운 약이나 보음제를 많이 씀

02 소양인 비수한표한병

비수한표한병

- 증상 : 身寒, 身體痛
- 기전 : 脾局의 陰氣가 脾局의 熱氣에 의해 방해되어 腎局으로 하강·연접하지 못하고, 背臂에 응취되어 발병한다.
- 의미 : 脾受寒表寒病 : 脾局이 寒氣를 받아서 表局에 寒證(身寒, 身體痛)이 발생하는 병

- 비수한표한병 : 비국에서 한기를 받아 표 부분에 한증이 나타남


- 대표적인 증상 : 신한, 신체통

→ 리병은 통증이 별로 없음. 열이 가슴에 뭉쳤다고 생각하면 됨

→ but 표한병은 신체통이 특징

- 안에는 뜨거운데, 겉에만 차가운 상태 → 춥다고 따뜻한 약을 쓰면 안됨!

비수한표한병 기전



- 간단 설명 : 배려부분에서 내려가야 하는데, 쌓이게 되면서 병이 생김

소양상풍증	소양상풍증 (경증)	陰清之氣가 올라지도 못하고 내려가지도 못하고 오르락내리락하는 상태가 되어 한열왕래 증상이 나타남
	결흉증 (중증)	腹裏(胃)까지 外冷包裹熱하게 된 상태
망음증		少陽人怒極不勝則悲哀動中이라 하여 怒性氣가 극에 달하면 悲哀動中하게 되고, 懼心益多하여, 腎局의 陰清之氣 자체가 약한 腎弱의 상태(역증)에서 병이 출발하게 되며, 表陰(淸陰)이 降陰하지 못하게 되어 背臂, 胃, 大腸까지 外冷包裹熱이 된 상태
	신열두통망음증 (협증)	裏熱이 발생하여 陰清之氣가 손상받음 腎弱의 상태에서 熱多寒少로 熱證이 발생
	신한복통망음증 (위증)	降陰이 이루어지지 않는 상태가 오래되어 陰清之氣가 소진 腎弱의 상태에서 寒多熱少로 寒證이 발생

- ① 怒性氣의 과항진으로 큰 장부인 脾局(目과背臂)의 水穀熱氣가 점점 커져, 口와 膀胱의 陰清之氣를 손상시킴. 이로 인하여 비국의 수곡열기는 더욱 커지고 동시에 방광의 수곡한기는 더욱 약해짐.
- ② 背臂에서 膀胱으로 降陰되어야 할 表陰(淸陰)이 과도해진 수곡열기로 내려가지 못함
- ③ 내려가지 못한 陰氣는 背臂를 둘러싸고 울체됨
- ④ 둘러싸버려서 안은 뜨겁고 겉은 찬 外冷包裹熱(외냉포리열)이 됨

- 노성기가 작용 → 비기 항진 → 목, 배려가 커짐 → 구, 방광이 상함

- (그림 4번) 음청지기가 방광으로 하강하지 못하고, 배려에 응축

→ 내려가지도 올라가지도 못하는 한열왕래 상태 : 소양상풍증

→ 외냉포리열이라 겉에서 추위를 느낌 → 신한, 신체통 → 비수한표한병 공통증상

- (그림 2번) 길이 막힌 음청지기는 목, 위 쪽으로 이탈하여 한사가 됨

→ 배려에 쌓인 것들이 점점 이동해서 胃, 흉격까지 외냉포리열 상태 : 결흉증

- 만약 신국(신, 대장, 구, 방광)이 약해진 상태로 순환에 문제가 생기면 망음증(역증)

- 항상 불안한 마음이 있음 → 수도원(물의 본질. 腎)에서 조금씩 새는 증상이 있음


→ 비수한표한병 생기면 배려에서 신으로 내려오는 것도 적어지고, 새는 것도 더 많아짐

→ 역증의 형태로 병이 나타남

- 리열이 음청지기를 손상시킴 : 신열두통망음증

- 상태가 지속되어 내가 가지고 있는 마지막 무기(음청지기)까지 소진됨 : 신한복통망음증
- 외냉포리열 : 소음인은 안은 차가운데 겉만 뜨거움. 소양인은 반대로 안은 뜨거운데 겉만 차가움 → 겉에 음청지기가 도망가면서 겉만 차가워짐
→ 특히 소양인에게 소음인 약을 쓰게 되면 병이 엄청 심해짐
- 비수한표한병은 물도 잘 안 먹고, 얼굴도 하얗고, 기력도 없고, 소화도 잘 못 시켜서 소음인과 헷갈릴 수 있음 → but 소음인 처방쓰면 큰일남

소양인 병증



- 신한, 신체통은 둘 다 가지고 있음
- 소양상풍증 : 여기에 구고, 인건, 목현, 심번 → 감기 증상에 열증이 더 많아진 상태
- 망음증 : 평소에 구심이 있는 상태. 평소에 설사를 조금씩 하는 상태 → 이런 사람들이 망음증으로 갈 수 있는 확률이 더 높음
- Cf. 구심 : 이전에 해본 일을 제대로 못 끝낼까봐 두려워하는 것

비수한표한병의 공통점

공통증상	身寒(신한), 身體痛(신체통)
- 모두 表寒의 증후를 공통으로 가진다. - 身寒: 惡寒, 畏寒등과 전신, 두면부, 사지, 피부 등의 부분적인 자타각적인 냉감 - 身體痛: 복통을 제외한 두면 및 항강부 통증, 요배통, 사지저절통 등을 포괄	

- 공통증상 : 신한, 신체통

비수한표한병의 차이점

차이점	① 보명지주인 腎局陰清之氣(신국음청지기)의 손상여부가 다름 ┌소양상풍증: 腎局陰氣가 건재한 順證(순증) └망음증: 腎局陰氣가 손상된 逆證(역증) ② 素證現證에서의 泄瀉유무 (平居泄瀉 유무) ③ 性情偏急(健忘)의 유무
소양상풍병(순증)	口苦, 咽乾, 目眩, 心煩 (혀가 마르는 舌乾의 증상도 본 증상의 범주에 포함)
망음병(역증)	泄瀉, 性情偏急(健忘)

- 망음증으로 가는 사람들은 평소에 걱정이 있는 사람들
- 소양상풍증 : 열증의 양상 → 입이 말라감
- 망음증 : 설사하는 것이 가장 큰 특징. 무른 변이라고 생각하면 됨

소양상풍병 ★

** 이 표 잘 봐두기! 시험에 많이 나오고 엄청 강조하심
** 증상을 보고 어떤 병증 분류에 해당하는지 파악하고, 어떤 처방 쓰는지 문제 낼 듯

소양상풍병			
소양상풍병 경증		소양상풍병 중증	
소양상풍병 초증	소양상풍병 우증	결흉증	결흉우증
- 비수한표한병 공통증상: 身寒신한, 身體痛신체통			
- 소양상풍병 공통증상: 口苦구고 咽乾인건 目眩목현 / 心煩심번			
發熱발열		乾嘔, 短氣, 心下痞硬, 水逆 건구, 단기, 심하비경, 수역	
1. 無汗무한 2. 持續發熱지속발열 3. 煩燥번조	1. 寒熱往來한열왕래 2. 胸脇滿흉협만 3. 嘔구 4. 耳聾이롱	1. 澀澀汗出즙즙한출 2. 小便不利소변불리 3. 痺風膝寒비풍슬한	1. 燥渴譫語조갈섬어 2. 大便秘燥대변비조 3. 膈內拒痛手不可近 격내거통수불가근

- 우증 : 한열왕래가 시작함. 이롱이 가장 특징적인 증상
- 결흉증 : 가장 큰 특징이 단기, 수역
- 비풍슬한 : 무릎이나 다리 쪽에 시리는 느낌 → 잘 알아두기. 표한증을 나타내는 증상

소양상풍병 병리와 증상

병리	- 保命之主인 腎局陰氣가 건재한 順證(순증) - 脾局의 陰氣가 하강하지 못하고 凝聚腎間 膠固囚滯한 상태 - 脾局(背脊)에서 腎局(膀胱)으로 하강해야 될 陰氣(陰清之氣)가 과도해진 水穀熱氣로 인하여 내려가지 못하여 陰氣가 背脊에 응취되어 寒證의 현상이 드러난다.
증상	- 口苦(구고), 咽乾(인건), 目眩(목현), 心煩(심번)

소양상풍병의 輕證과 重證의 감별

경증과 중증의 감별점
① 結胸 증상 유무
② 發熱 유무

경증 (소양상풍병)	結胸 없음, 發熱 있음	發熱(발열)
중증 (결흉증)	結胸 있음, 發熱 없음	心下痞硬滿(심하비경만), 乾嘔(건구), 短氣(단기), 水逆(수역)

- 경증 : 초기 감기
- 중증 : 단기(숨참), 수역(먹으면 토함) → 현대의 늑막염이 소양인 결흉증과 유사

소양상풍병 경증 구분

- 輕證(소양상풍병) 구분: 惡寒發熱(오한발열) 양상으로 구분	
초증(初證)	發熱, 無汗(불한출), 煩躁, 脈浮緊
우증(尤證)	口苦, 咽乾, 目眩, 嘔, 胸脇滿(흉협만), 寒熱往來(한열왕래), 頭痛, 腦強, 寒熱往來, 耳聾(이롱), 胸滿(흉만)

- 초증 : 무한이 특징
- 심해지면 嘔 / 가장 심해지면 耳聾
- 배려 부분이 커져 열이 쌓여서 뚫고 내려가지 못하고 걸만 차가움
- 한열왕래나 이롱, 흉만이 생기면 더 심해진 경우구나 → 우증

소양상풍병 중증 구분

- 重證(결흉증) 구분: 大便秘燥(대변비조) 유무	
결흉증(結胸證)	澀澀汗出(즙즙한출), 口渴水逆(구갈수역), 小便不利
결흉우증(結胸尤證)	膈內拒痛手不可近(만지면 아픔), 燥渴譫語(조갈섬어), 大便秘燥(대변비조)

- 결흉이 더 심해지면 대변비조, 조갈섬어가 나타남 → 열증이 더 심해짐

- 결론 : 소양인은 무조건 열이 더 심해진다고 생각하면 됨. 겉에는 한증이지만
- + 소양인은 대변을 잘 봐야함. 소양인이 2-3일 변을 못보는건 병이 굉장히 심한 상태

소양상풍병 치료 ★

병증		치법	처방
경증	초증	清裏熱 降表陰	★형방패독산★
	우증	청리열 강표음	형방패독산, 형방사백산, 형방도적산
중증	결흉증	表陰降氣	형방도적산
	결흉우증	표음강기	감수, 형방도적산

** 형방패독산 매우매우 강조하셨습니다

* 경증

- 소양상풍병 치료 : 순환시키는 약, 강표음 하는 약
- 형방패독산 : 소양인 최고의 처방! → 강표음 하는 약

- 형방패독산, 형방도적산은 청리열도 하지만, 강표음을 하는게 더 큼
→ but 형방사백산은 청리열을 더욱 강조

* 중증

- 음청지기가 배려에만 쌓여있다가 흉격까지도 쌓이게 됨 → 안은 뜨겁지만, 겉은 차가움
 - 형방도적산 쓰고, 더 심해지면 감수 사용 → 감수 : 막힌 것을 뚫어줌
- Cf. 감수 : 소음인의 파두와 비슷한 역할. 막힌 것을 뚫어줌

- 형방도적산 : 결흉증에서 가슴까지 찬 기운이 온 것을 표음강기 해줌
→ 여기서 降氣를 더하려면 복령, 택사를 추가해서 도적강기탕 사용

망음병

망음병			
망음병 협증		망음병 위증	
신열두통망음증	신열두통망음우증	신한복통망음증	신한복통망음우증
- 비수한표한병 공통증상: 身寒신한, 身體痛신체통			
- 망음병 공통증상: 性情偏急證성정편급증(健忘건망), 平居泄瀉평거설사			
頭痛두통		腹痛복통	
口渴구갈, 心煩심번, 小便赤소변적		畏寒외한, 手足冷수족냉, 小便頻數소변빈삭	
1. 泄瀉설사	1. 煩躁번조 2. 小小滑利便소소활리변 3. 或 便閉혹 변폐	1. 腹痛爲主복통위주 2. 或 泄瀉혹 설사	1. 身寒 深化 痞滿 신한 심화 비만 2. 小小滑利便 소소활리변 3. 或 便閉혹 변폐

- 소양상풍증, 결흉증은 열기가 하도 많으니까 한기가 어디 한쪽으로 도망가있는 상태
→ 설사로 도망가버리는 상태가 바로 망음증
→ 도망가면서 열이 더욱 더 치성하는 상태가 됨 → 신열두통 → 형방사백산을 가장 多用

- 망음병 위증 : 위열 자체도 약해지는 상태

→ 겉에 도망간 음청지지만 남게 되어 복통, 신한이 더욱 심해지고 설사가 나타남

- 망음병 협증 : 위열이 강한 상태

- 망음병 위증 : 위열 자체도 없어지고, 음청지기도 없어지면서 나오는 설사

- 평소에 묽은 변을 자주 봄 → 망음병 소양인의 경향성이 있음

- 신열두통망음우증 : 신열두통망음증보다 열증이 심해짐

- 신한복통망음우증 : 소양인의 열기 자체도 쪼그라들고, 음청지기도 쪼그라든 상태

망음병의 병리와 증상

병리	- 保命之主인 腎局陰氣가 손상된 逆證(역증) - 脾局의 陰氣가 하강하지 못하고, 腎局陰氣도 손상된 상황
증상	- 身寒(신한), 身體痛(신체통) + 平居泄瀉(평소설사), 性情偏急성정편급(健忘健망) * 平居 = 평상시

- 망음병 : 수돗물을 공급해주는 공급원이 손상되면서 거기에 더해 순환도 안되는 상태
- 증상 : 평소에 묽은 변을 보는 경우, 마음의 문제가 있는 경우에 망음증으로 잘 넘어감

망음병의 險證과 危證의 감별

험증과 위증의 감별점
① 身熱頭痛(신열두통), 身寒腹痛(신한복통)으로 구분
② 脾局熱氣(비국열기)가 잔존해 있는지와 腎局陰氣(신국음기) 손상 정도에 따라 구분

험증 (신열두통망음)	脾局熱氣가 아직 왕성	頭痛, 口渴, 心煩, 小便赤 두통, 구갈, 심번, 소변적
위증 (신한복통망음)	脾局熱氣가 약화된 동시에 腎局陰氣의 손상이 더욱 심화	腹痛, 畏寒, 手足冷, 小便頻數 복통, 외한, 수족냉, 소변빈삭

- 신열두통망음증 : 두통, 설사
- 신한복통망음증 : 두통이 없으며 복통, 설사
- 비수한표한병의 공통증상이 신한 → 그러면 신열두통망음의 신열은 무엇?
→ 기본적으로는 신한이지만, 약간의 미적지근한 열을 가짐
- 비국의 열기가 그나마 조금은 있는 것 : 험증
- 열기 자체가 태울 것이 없어서 열기도 다 사라져버린 것 : 위증

망음병 험증 구분

- 險證 구분: 泄瀉 유무, 少少滑利便, 便閉 유무	
신열두통망음증	泄瀉(설사)가 위주
신열두통망음우증	煩燥(번조), 少少滑利便(소소활리변), 便閉(변폐) : 脾局熱氣가 더욱 강성한 결과 전신적인 身熱이 위주

- 소양인 두통 : 열이 많아서 생기겠구나 / 소음인 두통 : 한이 많아서 생기겠구나
- 우증 : 증상이 더 심해지고, 변폐까지 생김 → 소양인이 변을 못보면 매우 위험한 상태
Cf. 소소활리변, 변폐 : 변을 조금씩 보면서 변폐가 일어남

망음병 위증 구분

- 危證 구분: 腹痛泄瀉 유무, 少少滑利便, 便閉유무	
신한복통망음증	腹痛(복통) 위주, 혹 泄瀉(설사)
신한복통망음우증	身寒深化(신한심화), 心下痞滿(심하비만), 少少滑利便(소소활리변), 便閉(변폐) : 腎局陰氣 더욱 약화되어 전신적인 身寒 위주

- 우증 : 신한이 더 심해지고, 심하비만, 변폐까지 옴

망음병 치료 ★

병증		치법	처방
험증	신열두통망음증	表陰降氣 표음강기	저령차전자탕 열<설사
	신열두통망음 우증		형방사백산 열>설사
위증	신한복통망음증		활석고삼탕 복통>설사
	신한복통망음 우증		형방지황탕 소양인의 보약

- 표음강기 : 순환이 안되어서 생기는 병이므로 내려줘서 순환하게 만들어줌
- 역증 : 보명지주가 손상 된거니까 순환만 시켜줄게 아니라 보명지주의 손상을 봐줘야함

- 저령차전자탕 : 설사가 더욱 심할 때 / 형방사백산 : 열이 더욱 심할 때
- 활석고삼탕 : 소양인 복통이 심할 때 / 형방지황탕 : 복통뿐만 아니라 설사도 심할 때
- 저령차전자탕, 형방사백산 : 열성 설사 / 활석고삼탕, 형방지황탕 : 한성 설사

- 사상체질은 보약이라는 개념이 없지만, 소양인의 허약자에게 형방지황탕을 多用

조문 차례

- 9-1, 2 비수한표한병
- 9-3~8 소양상풍증우증
- 9-9~11 소양인의 땀, 통증
- 9-12~17 결흉증, 결흉우증
- 9-18 감수와 석고
- 9-19 소음인 소복경만 소양인 심하결흉
- 9-20~22 망음병
- 9-23~28 신열두통망음병
- 9-29~30 신한복통망음병
- 9-31~38 망음병과 망양병 비교
- 9-39~45 섬어증, 치험례

비수한표한병(소양상풍병초증) (9-1 ~ 9-2)

(9-1)

- 張仲景曰 太陽病 脈浮緊 發熱惡寒 身痛 不汗出 而煩躁者 大靑龍湯主之
- 장중경(張仲景)이 말하기를 태양병에 맥이 부(浮)하고 긴(緊)하며 열이 나고 추위를 싫어하며 몸이 아프고 땀이 나지 않으면서 번조(煩燥)하면 대청룡탕(大靑龍湯)을 쓴다고 하였다.

(9-2)

- 論曰 發熱惡寒 脈浮緊 身痛不汗出而煩躁者 卽 少陽人 脾受寒表寒病也
- 此證 不當用 大靑龍湯 當用 荊防敗毒散
- 나는 논하기를 열이 나고 추위를 싫어하며 맥이 부하고 긴하며 몸이 아프며 땀이 나지 않으면서 번조한 것은 곧 소양인의 비(脾)가 찬 것을 받아 걸이 찬 병이니 이 증에는 대청룡탕(大靑龍湯)은 쓰지 말고 형방패독산(荊防敗毒散)을 써야 한다.

- (9-2) 조문에서 이제마가 비수한표한병 정의를 함

- 소양상풍병 초증 : 형방패독산

소양상풍병우증 (9-3 ~ 9-7)

- 張仲景曰 少陽之爲病 口苦 咽乾 目眩. (9-3)
- 眩而口苦 舌乾者 屬少陽. (9-4)
- 口苦 耳聾 胸滿者 少陽傷風證也. (9-5)
- 口苦咽乾 目眩耳聾 胸脇滿 或往來寒熱而嘔 屬少陽 忌吐下 宜小柴胡湯和之. (9-6)
- 論曰 此證 不當用 小柴胡湯 當用 荊防敗毒散 荊防導赤散 荊防瀉白散. (9-7)
- 장중경(張仲景)이 말하기를 소양(少陽)의 병이 되면 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈앞이 어릿어릿하다.
- 눈앞이 어릿어릿하고 입이 쓰며 혀가 마르는 것은 소양(少陽)에 속한다.
- 입이 쓰고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것은 소양상풍증(少陽傷風證)이다.
- 입이 쓰고 목 안이 마르고 눈이 어릿어릿하고 귀가 먹고 가슴과 옆구리가 그득하며 또는 추웠다 더웠다 하며 구역질하는 것은 소양에 속하니 토법(吐法)과 하법(下法)은 경계해야 하고 소시호탕(小柴胡湯)으로 화해시켜야 한다고 하였다.
- 나는 말하기를 이와 같은 증에는 소시호탕(小柴胡湯)을 써서는 안 되고 형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 한다.

- 소양상풍증이 더 심해진 경우를 설명함

- 이론 : 소양상풍병 우증의 대표적인 증상

- (9-7) 조문에서 이제마가 말하길 소시호탕으로 화해시키지 말고, 소양인이라는걸 안다면 → 차갑게 해주고, 강기시켜주면 나오니까 형방패독산, 형방도적산, 형방사백산을 쓰면 됨

형방패독산, 형방도적산, 형방사백산

처방	적응	내용
형방패독산	治頭痛 寒熱往來 두통 한열왕래	- 表陰降氣가 되지 않아서 나타나는 증상 중 가장 輕한 증상 - 表陰降氣가 안 되고 꼭 막히면 惡寒, 풀리면 發熱
형방도적산	治頭痛 胸膈煩熱 두통 흉격번열	- 外冷包裹熱(외냉포리열)이 더 심해진 증상 - 寒多熱少(한다열소), 胸膈煩熱, 乾嘔
형방사백산	治頭痛 膀胱滲躁 두통 방광경조	- 腎局의 陰清之氣가 약해져 胃熱이 심해진 증상 - 熱多寒少(열다한소)

- 패독-도적-사백으로 갈수록 표음강기력이 강해짐

- 형방패독산 : 표음강기가 안되는 초기

- 형방도적산 : 외냉포리열이 더 심해진 증상

- 형방사백산 : 열이 있고 설사할 때. 심해졌을 때 많이 사용 / 매운 음식 먹고 설사할 때

소양인 표병처방 비교

처방	구성							
형방패독산	생지황 1	복령			차전자	지골피	시호 전호	강.독.형.방.
형방도적산	생지황 3				목통2	현삼 과루인 1.5	전호	강.독.형.방.
형방사백산	생지황 3	복령2	택사2	석고 지모				강.독.형.방.

- 형방패독산 : 초기

- 형방도적산, 형방사백산 : 생지황을 높여서 표음강기를 잘하게 함

- 형방도적산 : 현삼, 과루인, 전호 → 염증 치료

- 형방사백산 : 석고, 지모, 택사, 복령 → 열이 있고 설사

- 강.독.형.방 : 이소변하면서 열을 빼줌 → 강활, 독활, 형개, 방풍

소양상풍병우증 (9-8, 9-11)

- 張仲景 所論 少陽病 口苦咽乾 胸脇滿 或往來寒熱之證
 卽 少陽人 腎局陰氣 爲熱邪所陷而
 脾局陰氣 爲熱邪所壅 不能下降 連接於腎局而 凝聚膈間 膠固囚滯之病也.
 此證 嘔者 外寒包裡熱而 挾疾上逆也
 寒熱往來者 脾局陰氣 欲降未降而或降故 寒熱或往或來也
 口苦 咽乾 目眩 耳聾者 陰氣囚滯膈間 欲降未降故 但寒無熱而 至於耳聾也
 口苦咽乾 目眩者 例證也 耳聾者 重證也
 胸脇滿者 結胸之漸也 脇滿者 猶輕也 胸滿者 重證也.
- 古人之於此證 用汗吐下三法則 其病 輒生 論語壞證 病益危險 故
 仲景 變通之而 用小柴胡湯 清痰燥痰 溫冷相雜 平均和解 欲其病 不轉變而 自愈
 此法 以汗吐下三法 論之則 可謂近善而巧矣
 然 此小柴胡湯 亦非平均和解 病不轉變之藥則 從古斯今 得此病者 真是寒心矣.
 耳聾胸滿 傷風之病 豈可以小柴胡湯 擬之乎.
 噫 後來 龔信所製 荊防敗毒散 豈非 少陽人 表寒病 三神山 不死藥 乎.
 此證 清裏熱而降表陰則 痰飲自散而 結胸之證 豫防不成也
 清痰而燥痰則 無益於陰降痰散 延拖結胸 將成而或別生奇證也. (9-8)
- 少陽人 頭痛腦強 寒熱往來 耳聾胸滿 尤甚之病. (9-11)
- 장중경(張仲景)이 말하기를 소양병에 입이 쓰고 목 안이 마르며 가슴과 옆구리가 그득하며, 또는 추웠다 더웠다 하는 증은 곧 소양인의 신국(腎局)의 음기(陰氣)가 열사(熱邪)에 빠지는 바가 되고, 비국(脾局)의 음기(陰氣)는 열사(熱邪)에 막히는 바가 되어 아래로 내려가서 신국에 연결하지 못하게 되어 등골 사이에 엉기어 모여(=배려에 뭉침) 아교(阿膠)와 같이 굳어지면 갇혀서 막힌 병이다. 이 증에 구역이 나는 것은 바깥 찬 기운이 속의 열을 싸서 병을 끼고 위로 올라가기 때문이며, 한열(寒熱)이 왕래(往來)하는 것은 비국의 음기가 내려가려 하나 내려가지 못하다가 더러 내려가는 까닭에 한열이 왔다 갔다 하는 것이고, 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿하며 귀가 먹는 것은 음기가 등골 사이에 막혀서 갇히게 되어 내려가지 못하는 까닭에 다만 숨기만 하고 열이 없어서 귀가 먹게 되는 것이다. 입이 쓰고 목 안이 마르며 눈이 어릿어릿한 것은 예사로운 증상이나 귀가 먹는 것은 중한 증상이다. 가슴과 옆구리가 그득한 것은 결흉(結胸)으로 진행되는 징조이나 옆구리가 그득한 것은 오히려 가벼운 것이고 가슴이 그득한 것은 중한 증상이다.
- 옛 사람들이 이 증에 한(汗)·토(吐)·하(下)의 삼법(三法)을 쓰면 번번이 헛소리하는 괴증(壞證)이 생겨서 병이 더욱 위험하게 되는 까닭에 중경(仲景)이 이것을 변통하여

소시호탕(小柴胡湯)을 이용하 여 담(痰)을 맑게 하고 담을 마르게 하고 찬 약과 더운 약을 섞어서 골고루 화해시킴으로써 그 병의 전변(轉變)을 막아 스스로 낫도록 만들 고자 하는 것이다. 이러한 법을 한(汗)·토(吐)·하(下)의 삼법으로 논한다면 잘되었다 고 할 만하나 이 소시호탕(小柴胡湯) 역시 골고루 화해시켜 병의 전변(轉變)을 막는 약은 아니니 옛날부터 지금까지 이러한 병을 얻은 자는 진실로 한심하다. 귀가 먹고 가슴이 그득한 상풍병(傷風病)이 어찌 소시호탕(小柴胡湯)으로 치료할 수 있겠는가? 아! 후세에 와서 공신(龔信)이 창제한 **형방패독산(荊防敗毒散)이 어찌 소양인의 표한 병(表寒病)의 삼신산불사약(三神山不死藥)이 아니겠는가?** 이 증은 이열(裏熱)을 맑게 하고 표음(表陰)을 내리면 담음(痰飲)이 저절로 흩어지며 결흉(結胸)의 증도 예방하여 생기지 못하게 할 것이다. 담을 맑게 하거나 말리면 음을 내리고 담을 흩어지게 하는 데 이익이 없고 공연히 병을 끌어오다가 장차 결흉(結胸)이 될 것이며, 또는 다른 괴 상한 증이 생기게 된다.

- 소양인이 머리가 아프고 뒤통수가 뻐뻐하며 추웠다 더웠다 하고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것이 더욱 심한 증이다.

- 소양인 : 내려가야 하는데 내려가지 못하고 배려에 쌓임
 → 열기 때문에 한기가 도망 다니다가 병이 걸린다고 생각하면 됨
- 소음인 : 올라가야 하는데 올라가지 못하고 방광에 쌓임

- 구고, 인건, 목현 : 경증 / 홍협만, 이릉 : 중증

- 소양상풍병에 소시호탕 쓰면 안되고, 형방패독산 써야함
 Cf. 이제마가 형방패독산 극찬함

- (9-11) 조문이 바로 소양인 소양상풍병 우증 증상. 여기에 형방시리즈 3개 중 하나 쓰기

소양인 땀 (9-9 ~ 9-10)

- 朱肱曰 凡發汗 腰以上 雖淋漓而 腰以下 至足微潤則 病終不解. (9-9)
- 論曰 少陽人病 無論表裏病 手足掌心有汗則 病解 手足掌心不汗則 雖全體皆汗而 病不解. (9-10)
- 주공(朱肱)이 말하기를 무릇 땀을 내는데 허리 이상에서는 비록 땀이 줄줄 흐르더라도 허리 아래와 발까지가 약간 축축하면 병이 결국 풀리지 않는다.
- 나는 논하기를 소양인의 병의 표병(表病)과 이병(裏病)을 막론하고 **손·발바닥에 땀이 있으면 병이 풀리고** 손바닥과 발바닥에 땀이 없으면 비록 전체에 모두 땀이 있다 하여도 병이 풀리지 못한다.

- 소양인의 손, 발바닥에서 땀 → 병이 풀린다고 봄
- 소양인 : 손, 발바닥 / 소음인 : 인중

<병이 낫는 땀>

- 소양인 : 手足掌心不汗(수족장심한)
- 소음인 : 人中汗(인중한)

소양인 통증 (9-11)

- 少陽人 傷寒病 有再痛三痛 發汗而愈者
此病 非再三感風寒而 再痛發汗 三痛發汗也.
- 少陽人 頭痛腦強 寒熱往來 耳聾胸滿 尤甚之病
元來如此 表邪深結 至於三痛然後 方解也
無論初痛再痛三痛 用荊防敗毒散 或荊防導赤散 荊防瀉白散
每日2貼式 至病解而用之 病解後 又用10餘貼 如此則 自無後病而完健.
- 소양인의 상한병(傷寒病)이 재통(再痛)하거나 삼통(三痛)하여 땀을 내고 낫는 경우가 있는데 이 병은 두 번, 세 번 풍한(風寒)에 감촉되어 재통에 땀을 내고 삼통에 땀을 내는 것이 아니다.
- 소양인이 머리가 아프고 뒤통수가 뻐뻐하며 추웠다 더웠다 하고 귀가 먹고 가슴이 그득한 것이 더욱 심한 증은 원래 이러한 것이니, 표사(表邪)가 깊이 맺혀서 삼통에 이른 연후에야 바야흐로 풀리는 것이다. 초통(初痛)·재통(再痛)·삼통(三痛)을 막론하고 **형방패독산(荊防敗毒散)이나 형방도적산(荊防導赤散)이나 형방사백산(荊防瀉白散)**을 매일 두 첩씩 쓰되 병이 풀릴 때까지 쓰며 병이 풀린 후에도 10여 첩을 더 쓸 것이니, 이렇게 하면 저절로 뒤탈이 없고 완전히 건강해질 것이다.

- 왜 약을 먹는데도 아파요? → 깊게 들어간 병이므로 통증이 한 번, 두 번, 세 번 음
- 두통항강 한열왕래 이롱홍만 → 소양상풍병우증 → 형방패독산, 형방도적산, 형방사백산

결흉증 (9-12 ~ 9-15)

- 張仲景曰 少陽證 澀澀汗出 心下痞硬滿 引脅下痛 乾嘔短氣 不惡寒 表解裏未和也 宜十棗湯 若合下不下 令人脹滿 遍身浮腫. (9-12)
- 渴欲飲水 水入即吐 名曰水逆 五苓散主之. (9-14)
- 杜壬曰 裏未和者 蓋痰與燥氣 壅於中焦故 頭痛 乾嘔 汗出 痰隔也 非十棗湯 不治. (9-15)
- 張仲景(張仲景)이 말하기를 소양증(少陽證)에 축축하게 땀이 나고 명치 아래가 더부룩하고 땀땀하고 그득하고 옆구리가 당기며 아래까지 아프고 헛구역이 나고 숨을 짧게 쉬되 추위를 싫어하지 않는 것은 밖은 풀렸으나 속은 풀리지 못한 것이니 십조탕(十棗湯)이 좋다. 만일 하법(下法)을 써야 하는데 하법(下法)을 쓰지 않으면 그 사람은 창만(脹滿)이 생기고 온몸에 부종(浮腫)이 생기게 된다.
- 갈증이 나서 물을 마시고자 하나 물이 들어가면 곧 토하는 것을 수역(水逆)이라 하는데 오령산(五苓散)을 주로 쓴다.
- 두임(杜壬)이 말하기를 속이 아직 풀리지 않은 것은 대개 담(痰)과 조(燥)한 기운이 중초(中焦)에 막힌 것이다. 그러므로 머리가 아프고 헛구역을 하고 땀이 나는 것은 담이 막힌 것이니 십조탕(十棗湯)이 아니면 치료하지 못한다.

- 결흉증 : 소양상풍증 중증

- 短氣(단기) : 특징적인 증상

- 소양인이 결흉증에 걸리면 부종이 생길 수도 있음

- 水逆(수역) : 물을 먹고자 하는데 토하는 것 → 이제마는 이럴 때 감수를 씀

- 감수 : 소음인의 파두와 유사 → 막힌 것을 뚫음

결흉우증 (9-13 ~ 9-17)

- 傷寒 表未解 醫反下之 膈內拒痛 手不可近 心下滿而硬痛 此爲結胸 宜大陷胸湯. (9-13)
- 龔信曰 心下硬痛 手不可近 燥渴譫語 大便實 脈沈實有力 爲大結胸 大陷胸湯下之 反加煩躁者 死. 小結胸 正在心下 按之則痛 宜小陷胸湯. (9-16)
- 상한(傷寒)에 표증(表證)이 풀리지 않았는데 의사가 잘못하여 하법(下法)을 쓰면 흉격(胸膈) 안이 막히어 아파서 손을 댈 수 없으며 명치 아래가 그득하고 땀땀하며 아픈 것은 결흉(結胸)이 된 것으로 대함흉탕(大陷胸湯)이 좋다.
- 공신(龔信)이 말하기를 명치 아래가 땀땀하고 아파서 손을 가까이 대지 못하고 조갈(燥渴)증이 나고 헛소리를 하며 변비가 심하고 맥이 침(沈)하며 실(實)하고 힘이 있는 것을 대결흉(大結胸)이라 하는데 대함흉탕(大陷胸湯)으로 설사시켜야 한다. 이때 도리어 번조(煩燥)증이 더하게 되면 죽는다. 소결흉(小結胸)은 바로 명치 아래에 있어서 누르면 아픈 것이니 소함흉탕(小陷胸湯)이 마땅하다.

- 수역, 대결흉, 소결흉 → 소양인 결흉증에 속하는 증상

- '대함흉탕으로 설사시켜서 도리어 번조가 생기면 죽는다'

→ 이제마 : 이럴바에 소양인 처방 쓰는게 좋겠다. 처방은 버리고 감수만 행거감

- 論曰 右張仲景 所論三證 皆結胸病 而 膈內拒痛 手不可近 燥渴譫語者 結胸之最尤甚證也 飲水水入即吐 心下痞硬滿 乾嘔短氣者 次證也. 凡 結胸病 皆藥湯入口 輒還吐 惟 甘遂末入口 口涎含下 因以溫水 漱口而下則 藥不還吐. 嘗治結胸 用甘遂散 溫水調下 5次輒還吐 至6次 不還吐而下利一度 其翌日 又水還吐 又用甘遂 一次快通利而病愈.
- 凡結胸 無非險證 當先用甘遂 仍煎荊防導赤散 以壓之 乾嘔短氣而藥不還吐者 不用甘遂 但用荊防導赤散 加茯苓 澤瀉 各1錢 2,3服 又連日服而亦病愈. 燥渴譫語者 尤極險證也 急用甘遂 仍煎地黃白虎湯 3,4貼 以壓之 又 連日服地黃白虎湯. 張仲景曰 傷寒表未解 醫反下之云者 以大承氣湯下之之謂也 非十棗陷胸下之之謂也. 然 十棗陷胸 不如單用甘遂 或用甘遂天一丸 結胸 甘遂末 例用3分 大結胸 用5分. 龔信所論 燥渴譫語煩躁死者 若十棗湯下後 因以譫語證 治之 連用白虎湯

則 煩躁者 必無不治之理. (9-17)

- 나는 논하기를 위의 장중경(張仲景)이 말한 세 가지 증은 모두 결흉병(結胸病)인데 흉격 안이 막히고 아파서 손을 댈 수 없고 입이 마르고 갈증이 나며 헛소리하는 것은 결흉(結胸)의 가장 심한 증상이고 물을 마시고 싶어 하나 물을 마시면 곧 토하고 명치 아래가 뚫뚫하고 그득하며 헛구역이 나고 숨이 찬 것은 그 다음 가는 증상이다. 대개 결흉병(結胸病)은 약을 먹으면 곧 토하는데 오직 감수(甘遂) 가루를 입에 넣어 침으로 삼키고 따뜻한 물로 양치질하여 넘기면 약을 도로 토하지 않는다. 일찍이 결흉을 치료하는데 감수산(甘遂散)을 따뜻한 물에 먹었더니 다섯 번은 도로 토하고 여섯 번째에 이르러 다시 토하지 않고 설사를 한 차례 했다. 이튿날 또 물을 마시면 토하여 다시 감수(甘遂)를 사용하니 바로 설사를 하고 병이 나왔다.
- 무릇 결흉은 **험증(險證)**이 아닌 것이 없으니 마땅히 먼저 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 형방도적산(荊防導赤散)을 달여 먹여서 병을 눌러야 한다. 헛구역질하고 숨이 차나 약을 다시 토하지 않는 경우에는 감수(甘遂)를 쓰지 말고 단지 형방도적산(荊防導赤散)에 백복령(白茯苓)과 택사(澤瀉)=도적강기탕 각각 1돈을 더 넣어서 쓰는데 2,3회 먹되 또 연일(連日) 먹으면 역시 병이 낫는다. **조갈(燥渴)하고 헛소리하는 것은 더욱 심한 험증(險證)이니 급히 감수(甘遂)를 쓰고 이어서 지황백호탕(地黃白虎湯) 3,4첩으로 누르고 또 연일 지황백호탕(地黃白虎湯)을 먹는다.**
- 장중경(張仲景)이 말하길 상한(傷寒)에 표증(表證)이 아직 풀리지 않았는데 의사가 도리어 설사시킨다 고 한 것은 승기탕(承氣湯)으로 설사시킨 것을 이르는 것이며 십조탕(十棗湯)이나 함홍탕(陷胷湯)을 이르는 것은 아니다. 그러나 십조탕(十棗湯)과 함홍탕(陷胷湯)도 감수(甘遂) 한 가지만 사용하거나 또는 감수천일환(甘遂天一丸)을 쓰는 것만 못하다.
- 결흉(結胸)에 감수(甘遂) 가루를 보통 3푼(分)을 쓰고 대결흉(大結胸)에는 5푼(分)을 쓴다. 공신(龔信)이 말한 바 조갈(燥渴)하고 헛소리를 하며 번조(煩躁)하여 죽을 지경인 경우에도 만일 십조탕(十棗湯)으로 설사시킨 후에 헛소리하는 증을 다스리고 연이어 백호탕(白虎湯)을 사용하면 번조(煩躁)한 것도 반드시 치료하지 못할 수 없다.

- 약을 먹을 때 토하면(=수역) 감수 사용해라

- 수역이 생기면 감수를 먼저 사용한 뒤, 형방도적산으로 눌러줘야 함

→ 토하지 않으면 감수 안 쓰고, 그냥 형방도적산만 쓰면 됨 → 토하면 감수 쓰는 것

- 건구, 단기, 토 x → 감수 쓰지말고 형방도적산 + 백복령, 택사 → 도적강기탕

- 조갈섬어 : 더 심해진 상태 → 감수 쓰고 지황백호탕

감수와 석고 (9-18) ★

• 甘遂 表寒病 破水結之藥也

石膏 裏熱病 通大便之藥也

表病可用甘遂而 不可用石膏

裏病可用石膏而 不可用甘遂.

然 揚手擲足 引飲泄瀉證 用石膏

痺風膝寒 大便不通證 用甘遂.

- 감수(甘遂)는 표한(表寒)병에 물이 막힌 것을 헤치는 약이고, 석고는 이열(裏熱)병에 대변을 통하게 하는 약이다. 표병에는 감수(甘遂)를 쓸 수 있으나 석고는 쓸 수 없고, 이병에는 석고를 쓸 수 있으나 감수(甘遂)는 쓸 수 없다. 그러나 손발을 내젓고 물을 들이키고 설사를 하는 증에는 석고를 써야 하고, 팔·다리가 저리고 무릎이 시리고 대변이 막힌 증에는 감수를 써야 한다.

- 감수 : 소음인의 파두와 똑 같은 역할을 함 → 소양인의 막힌걸 뚫어주는 역할

** 이 부분 시험에 자주 냄. 이번 시험에서도 낼 예정

- 揚手擲足 引飲泄瀉證 : 설사하는데 왜 석고를 썼을까?

→ 양수척족 하는 것은 리열이 더 많아서 생기는 것. 이럴 때는 석고를 써서 리열 끄기

- 痺風膝寒 大便不通證 : 비풍슬한은 결흉증(표한증)의 대표증상

→ 표한증에서 나타나는 증상으로써 대변불통이 나옴 → 따라서, 감수를 사용

∴ 한 가지 증상만 보고 표증, 리증 판단하지 말고, 전체적인 증상들의 양상을 보고 판단

소음인 소복경만과 소양인 심하결흉 (9-19)

- 少陰人 傷寒病 有小腹硬滿之證
少陽人 傷寒病 有心下結胸之證
此二證 俱是表氣陰陽 虛弱 正邪相爭 累日不決之中 裏氣亦秘澁不和而 變生此證也.
- 소음인의 상한(傷寒)병에 아랫배가 똥똥하고 그득한 증이 있고,
소양인의 상한(傷寒)병에 멍치 아래에 결흉(結胸)증이 있으니,
이 두 가지 증은 다 같이 표기(表氣)의 음양이 허약하여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 다투어 여러 날 쾌유되지 못하는 증에 속의 기운 역시 비삽(秘澁)하고 고르지 못하여 이와 같은 증세로 변한 것이다.

- 소복경만 = 대장파한 : 표증에서 시작하여 리증의 증상까지 겹치게 되면서 생기는 것
- 결흉도 마찬가지로 표증에서 시작해서 놔두었더니 나중에 리증까지 생기는 것

소양상풍병 구분 ★

소양상풍병			
경증		중증	
소양상풍병초증	소양상풍병우증	결흉증	결흉우증
身寒, 身體痛 신한, 신체통			
口苦 咽乾 目眩 / 心煩 구고 인건 목현 / 심번			
發熱 발열		乾嘔, 短氣, 心下硬滿, 水逆 건구, 단기, 심하경만, 수역	
無汗무한 持續發熱지속발열 煩躁번조	寒熱往來한열왕래 胸脇滿脅협만 嘔구 耳聾이롱	澀澀汗出습습한출 小便不利소변불리 痺風膝寒비풍슬한	燥渴譫語조갈섬어 大便秘燥대변비조 膈內拒痛 手不可 격내거통 수불가
형방패독산	형방패독산 형방도적산 형방사백산	형방도적산 (도적강기탕)	감수 형방도적산 (도적강기탕)

** 어떠한 증상이 나오면 어떤 처방을 쓸 것인가를 쓰는게 시험 문제로 나올 예정

- 표음강기력 : 형방패독산 < 형방도적산 < 형방사백산
- 도적강기탕 = 형방도적산 + 백복령, 택사
- 결흉우증에서 '조갈섬어' : 위열이 더욱 더 치성해진 상태
- 지황백호탕을 먼저 써서 급한 열을 내리고, 그 다음에 형방도적산을 씀

망음병 (9-20 ~ 9-22)

- 李子建 傷寒十勸論曰 **傷寒腹痛** 亦有**熱證** 不可輕服溫煖藥.
又曰 傷寒自利 當觀陰陽證 不可例服 溫煖及止瀉藥. (9-20)
- 朱震亨曰 傷寒陽證 身熱脈數 煩渴引飲 大便自利 宜柴苓湯. (9-21)
- 盤龍山老人論曰 少陽人 身熱頭痛泄瀉 當用猪苓車前子湯 荊防瀉白散
身寒腹痛泄瀉 當用滑石苦蓼湯 荊防地黃湯 此病 名謂之亡陰病 (9-22)
- 이자건(李子建)의 《상한십권(傷寒十勸)》에 말하기를 상한(傷寒)에 배가 아픈 것에 열증도 역시 있으니 가벼이 온난한 약을 복용해서는 안 된다. 또 말하기를 상한(傷寒)에 저절로 설사가 나는 것은 마땅히 음증인지 양증인지 보아야 할 것이니 예사로이 온난한 약이나 설사를 막는 약을 복용해서는 안 된다.
- 주진형(朱震亨)이 말하기를 상한(傷寒)의 양증에 몸에서 열이 나고 맥이 삭(數)하며 조갈(煩渴)하여 물을 찾으며 대변이 저절로 설사하는 경우에는 시령탕(柴苓湯)이 마땅하다.
- 반룡산(盤龍山) 노인=이제마이 말하기를 소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사=신열두통망음증하는 경우에는 당연히 저령차전자탕(猪苓車前子湯)이나 형방사백산(荊防瀉白散)을 쓸 것이며 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우=신한복통망음증에는 마땅히 활석고삼탕(滑石苦蓼湯)이나 형방지황탕(荊防地黃湯)을 써야 한다. 이러한 병을 망음병(亡陰病)이라 한다.

- 복통은 보통 냉통만 있다고 하는데, 열증인 복통이 있다는 조문을 가져옴

→ 소양인 열증 복통에 온난한 약을 쓰면 안됨!

- 소양인은 열이 많아서 병이 생긴다고 강조

→ 이제마는 열증에 의해 설사할 수 있다는 것을 강조함!

- 결론 : 소양인은 열로 인해 두통도 생기고, 설사도 생긴

- 신열두통망음증 → 저령차전자탕, 형방사백산

→ 저령차전자탕 : 설사>열 / 형방사백산 : 열>설사

- 신한복통망음증 → 활석고삼탕, 형방지황탕

→ 활석고삼탕 : 복통이 심할 때 / 형방지황탕 : 소양인의 보약. 기력 저하&표한증

망음증 처방 비교

처방	구성							
형방사백산	생지황3	복령2	택사2			석고	지모	강독형방
저령차전자탕		복령2	택사2	차전자1.5	저령1.5	석고	지모	강독형방
활석고삼탕		복령2	택사2			활석2 고삼2	황련 황백	강독형방
형방지황탕	숙지황3	복령2	택사2	차전자		산수유2		강독형방
황련청장탕(이질)	생지황4	복령2	택사2	차전자	저령	목통2	황련	강.방.

- 생지황 : 청열 작용 → 대장에 작용하여 청열

- 숙지황 : 보음 작용 → 보명지주를 만들어내는 신을 도움

- 형방사백산 : 생지황(청리열) + 복령, 택사(강표음)

- 저령차전자탕 : 소변으로 배출시키면서 설사를 멎게 함

- 활석고삼탕 : 활석, 고삼, 황련, 황백(복통)

- 형방지황탕 : 숙지황(음청지기를 도와주는데 좀더 초점이 맞춰짐) → 소양인 허약한 경우

- 황련청장탕 : 소양인 이질에 사용

∴ 열도 빼주고, 설사도 빼주는 처방들

신열두통망음병 (9-23 ~ 9-28)

- 少陽人 身熱頭痛泄瀉 1,2日 或3,4日而 泄瀉無故自止
身熱頭痛不愈 大便反秘者 此 危證也 距諺語不遠. (距 : 떨어질 거) (9-23)
- 泄瀉後 大便 一晝夜間 艱辛1次滑利 或3,4,5次 小小滑利 身熱頭痛 因存者 此 便秘之兆也
諺語前有此證則 諺語當在數日
諺語後有此證則 動風必在咫尺. (9-24)
- 소양인의 몸에 열이 나고 머리가 아프며 설사가 있다가 1,2일 또는 3,4일 후에 설사가 이유 없이 그치나 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 낫지 않으며 대변이 도리어 막히는 것은 이것은 위증(危證)이니 머지않아 헛소리를 하게 된다.
- 설사한 후에 1주야간(晝夜間)에 간신히 한 번 활변(滑便)을 보거나 또는 3, 4, 5회 조금씩 활변(滑便)을 보고 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 그대로 있는 것은 변비가 될 징조다.
- 헛소리하기 전에 이러한 증상이 있으면 헛소리를 며칠 사이에 반드시 할 것이고,
- 헛소리한 후에 이러한 증상이 있으면 반드시 금방 풍이 일어날 것이다.
- 발광 → 섬어 → 동풍
- 표한증에서 대변비조 : 열이 더 심해진 것
- 少陽人 忽然有吐者 必生奇證也 當用荊防敗毒散 以觀動靜而
身熱頭痛泄瀉者 用石膏無疑
身寒腹痛泄瀉者 用黃連 苦蔘無疑. (9-25)
- 嘗見 少陽人兒 生未一周年
忽先一吐而後泄瀉 身熱頭痛 揚手擲足 轉輒其身 引飲泄瀉 4,5,6次 無度數者
用荊防瀉白散 日3貼 兩日6貼然後 泄瀉方止 身熱頭痛 清淨 又5,6貼而安. (9-26)
- 소양인이 갑자기 토하는 것은 반드시 괴상한 증상이 생길 것이니 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓴 후 그 동정을 살펴서 몸에 열이 있고 머리가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 석고를 써야 하고, 몸이 차고 배가 아프며 설사하는 경우에는 의심의 여지없이 황련과 고삼을 써야 한다.
- 일찍이 돌이 채 안된 소양인 아이가 갑자기 한 번 토한 다음 설사를 하고 몸에 열이 있고 머리가 아프며 손발을 내젓고 몸을 엎치락뒤치락하며 물을 많이 마시고 설사를 4,5,6회 하여 횟수를 알 수 없는 것을 형방사백산(荊防瀉白散)을 하루에 3첩, 이틀에 6첩을 쓰고서야 설사가 그치고 몸에 열이 나고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어졌다. 다시 5,6첩을 더 쓰고 안정이 되었다.

- 형방패독산 : 소양인에게 어떠한 문제가 생기면 시간을 벌 수 있음
- 양수척족 : 형방사백산에 석고를 가미해서 사용 가능

- 설사, 신열두통, 양수척족, 인음설사 : 신열두통설사 → 형방사백산
- 신열두통설사 : 석고 → 저령차전자탕 or 형방사백산
- 신한복통설사 : 황련, 고삼 → 활석고삼탕 or 형방지황탕

<소양인 표증, 리증에서 각각 가장 좋은 처방>

- 소양인 표증 : 형방패독산
- 소양인 리증 : 지황백호탕

- 少陽人 身熱頭痛 揚手擲足 引飲者 此 險證也
雖泄瀉 必用石膏. 無論泄瀉有無 當用荊防瀉白散 加黃連 瓜蔞 各1錢 或地黃白虎湯. (9-27)
- 凡 少陽人 有身熱頭痛則 已非輕證而 兼有泄瀉則 危險證也
必用荊防瀉白散 日2,3服 又連日服 身熱頭痛 清淨然後 可免危險. (9-28)
- 소양인이 몸에 열이 나고 머리가 아프며 손발을 내젓고 물을 많이 마시는 것은 이것은 위험한 증상이니 비록 설사를 하여도 반드시 석고를 사용해야 하니 설사가 있고 없음을 막론하고 마땅히 형방사백산(荊防瀉白散)에 황련과 과루인을 각각 1돈(錢)을 더 넣고 쓰든지 아니면 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 한다.
- 무릇 소양인이 몸에 열이 있고 머리가 아프면 이미 가벼운 증상이 아닌데 겸하여 설사를 하는 것은 위험한 증상이니 반드시 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하는데 하루에 2,3회 복용하고 또한 연일 복용하여 몸에 열이 있고 머리가 아픈 것이 깨끗이 없어진 뒤라야 비로소 위험을 면할 수 있다.

- 양수척족, 인음 : 위열이 치성할 때 나오는 대표적인 증상 → 험증 → 석고 써라
- 설사는 표증의 양상이지만, 위열이 치성한 상태이기 때문에 석고를 써서 열을 꺼줘야함 → 위열을 꺼주는 석고를 먼저 쓰고, 그 다음에 형방사백산 같은 처방을 사용

신한복통망음병 (9-29 ~ 9-30)

- 少陽人 身寒腹痛泄瀉 一晝夜間 3,4,5,次者 當用滑石苦蔘湯
身寒腹痛 2,3晝夜間 無泄瀉 或艱辛1次泄瀉者 當用滑石苦蔘湯
或用熟地黃苦蔘湯. (9-29)
- 嘗見 少陽人 恒有(소증)腹痛患者 用六味地黃湯 60貼而 病愈
又見 少陽人 10餘年 腹痛患者 1次起痛則 或5,6個月 或3,4個月 1,2個月 叫苦者
每起痛臨時 急用滑石苦蔘湯 10餘貼
不痛時 平心靜慮 恒戒哀心(=애정)怒心(=노성) 如此延拖(끌다) 1周年而病愈
又見 少陽人 少年兒 恒有滯證痞滿 間有腹痛腰痛 又有口眼喎斜 初證者
用獨活地黃湯 一百日內 200貼服 使之平心靜慮 恒戒哀心怒心 一百日而 身健病愈.
(9-30)
- 소양인이 몸이 차고 배가 아프며 하루 밤낮 동안 설사를 3, 4, 5회 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕을 써야 하고 몸이 차고 배가 아프나 2,3일 밤낮을 설사를 하지 않거나 또는 간신히 1번 설사를 하는 경우는 마땅히 활석고삼탕을 쓰거나 또는 숙지황고삼탕을 써야 한다.
- 일찍이 한 소양인이 항상 배가 아파서 고통 받는 사람을 본 일이 있는데 육미지황탕 60첩을 쓰고 병이 나왔다. / 또 10여 년 동안 복통으로 고생하는 소양인을 본 일이 있는데 한 번 아프기 시작하면 5-6개월 또는 3-4개월, 1-2개월 동안 고통을 호소하였는데 매번 아프기 시작할 때마다 급히 활석고삼탕 10여 첩을 쓰고 / 아프지 않을 때에는 마음을 편안케 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 화내는 마음을 경계하였다. 그렇게 하기를 1년을 하였더니 병이 나왔다.
- 또 소양인 소년이 항상 체증(滯症)이 있어 배가 더부룩하고 그득하며 간혹 배가 아프고 허리가 아팠으며, 또 구안와사(口眼喎斜) 초기 증상이 있는 것을 보았는데 독활지황탕(獨活地黃湯)을 100일 안에 200첩을 먹이고 마음을 편안히 하고 생각을 안정시키고 항상 슬퍼하는 마음과 노여워하는 마음을 경계하게 하였더니 100일 이 되어 몸이 건강해지고 병이 나왔다.

- 숙지황고삼탕 : 소양인 리증약 → 당뇨 말기에 사용하는 약 → 이게 표증에 왜 나왔나?
→ 하소증에도 이런 증상들이 나오기 때문
→ 그럼 이걸 어떻게 구분하지? → 현증만 보지 말고 소증을 봐야함

∴ 망음에 의해 생긴 경우는 활석고삼탕, 리열에 의한 음허오열은 숙지황고삼탕 사용

- 역증은 항상 마음가짐도 봐줘야 함
- 독활지황탕 : 역증 마지막에 쓰는약 → 요통(신체통. 표병) + 리병의 양상도 → 표리구병
→ 이럴 때 독활지황탕 쓰고 + 마음가짐도 조절해야함

사상체질의학 6주차

- 7 학 기

수업 ppt 내용 검은글씨 / 중요부분 색o

01 소양인 표병

망음병과 망양병 비교

▶ 古醫 有言頭無冷痛 腹無熱痛 此言非也. 何謂然耶.

少陰人 元來冷勝則 其頭痛 亦自非熱痛而 即冷痛也

少陽人 元來熱勝則 其腹痛 亦自非冷痛而 即熱痛也

古醫 又言汗多亡陽 下多亡陰 此言是也. 何謂然耶.

少陰人 雖則冷勝 然 陰盛格陽 敗陽外遁則 煩熱而汗多也 此之謂亡陽病也

少陽人 雖則熱勝 然 陽盛格陰 敗陰內遁則 畏寒而泄下也 此之謂亡陰病也.

亡陽亡陰病 非用藥 必死也 不急治 必死也 (9-31)

옛 의사들이 머리는 차서 아픈 경우는 없고 배는 더워서 아픈 경우는 없다고 하였는데 이 말은 틀린 말이다.

어째서 그런가 하니 소음인은 원래 찬 기운이 많기 때문에 머리 아픈 것도 역시 더워서 아픈 것이 아니고 차서 아픈 것이며,

소양인은 원래 더운 기운이 많기 때문에 배가 아픈 것도 역시 차서 아픈 것이 아니라 더워서 아픈 것이다.

옛 의사들이 또한 말하기를 땀을 많이 흘리면 망양이 되고, 설사를 많이 하면 망음이 된 다 하였는데 이 말은 맞는 말이다.

어째서 그런가 하니 소음인은 비록 찬 기운이 많다고 하나 그러나 음(陰)이 성(盛)하여 양(陽)과 다투어 패(敗)한 양(陽)이 밖으로 달아나게 되니 번열(煩熱)이 나며 땀을 많이 흘리게 된다. 이것을 일컬어 망양병(亡陽病)이라 한다.

소양인은 비록 더운 기운이 많으나 그러나 양이 성하여 음과 다투어 패한 음이 안으로 도 망가니 찬 것을 두려워하고 설사를 많이 하게 되는데 이것을 일컬어 망음병(亡陰病)이라 한다.

망양병(亡陽病)과 망음병(亡陰病)은 약을 쓰지 않으면 반드시 죽고 급히 치료하지 않으면 반드시 죽는다.

(9-31) 두통은 냉통이 없고, 복통을 열통이 없다는 건 틀린말

- 소음인 - 냉이 이겨서 - 두통 ⇒ 열통이 아닌 냉통

- 소양인 - 열이 이겨서 - 복통 ⇒ 냉통이 아닌 열통

- 이제마는 처방 자체의 조화로움보단, 사람에 맞추어 처방 (소음인에게 따뜻한걸 가득, 소양인 은 찬걸 가득)

- 소음인 망양증: 보명지주가 寒이 많아서 땀으로 도망감

- 소양인 망음증: 보명지주가 熱이 많아서 설사로 도망감

⇒ 망음, 망양은 약 안쓰면 죽는다. 보명지주가 도망가고 약해진 상태이므로

▶ 亡陽者 陽不上升 而反爲下降則 亡陽也

亡陰者 陰不下降 而反爲上升則 亡陰也.

陰盛格陽於上則 陽爲陰抑 不能上升於胸膈(→배려) 下陷大腸(→방광)而 外遁膀胱 故 背表 煩熱而汗出也

煩熱而汗出者 非陽盛也 此所謂 內水外炭 陽將亡之兆也. = 소음인 망양증 설명

陽盛格陰於下則 陰爲陽壅 不能下降於膀胱 上逆背膻而 內遁膈裏

故 陽胃 畏寒而泄下也

畏寒而泄下者 非陰盛也 此所謂 內炭外水 陰將亡之兆也. = 소양인 망음증 설명 (9-32)

망양(亡陽)이라는 것은 양이 위로 올라가지 못하고 도리어 아래로 내려가게 되어 망양(亡陽)이라 하고, 망음(亡陰)이라는 것은 음이 아래로 내려가지 못하고 도리어 위로 올라가게 되어 망음(亡陰)이라 한다.

음이 성하여 위에서 양과 다투면 양이 음에게 억눌리게 되어 흉격에 올라가지 못하고 아래로 대장에 빠져 밖으로 태장에 도망하니 등의 겉에 번열하면서 땀이 난다.

번열하면서 땀이 나는 것은 양이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 얼음 같고 밖은

솥불 같다는 것이니 양이 장차 없어지려는 징조이다. = **소음인 망양증 설명**
 양이 성하여 아래에서 음과 다투면 음이 양에게 막힘을 받아 **방광**으로 내려가지 못하고 위로 **배려**로 거슬러 올라가서 흉격 속으로 도망하니 장위(腸胃)가 찬 것을 싫어하고 설사를 한다. 찬 것을 두려워하고 설사하는 것은 음이 성한 것이 아니고 이것은 이른바 안은 솥불 같고 밖은 얼음 같다는 것이니 음이 장차 없어지려는 징조이다. = **소양인 망음증 설명**

(9-32) - 망양은 양이 상승하지 못하고 하강해서 망양 / - 망음은 음이 하강하지 못하고 상승해서 망음

- 소음인 망양증 설명

: 음성격양, 양이 음에 억눌리면서 **흉격**으로 상승하지 못하고 **대장**으로 내려감으로 외쪽 방광으로 돌아가면서 배표 부위 번열과 한출

✓ **의문: 소음인 망양증 기전에서 흉격과 대장으로 설명하고 있음**

⇒ 소음인 망양증: 표증이므로, 배려하고 방광에 대해 얘기를 해야함.

⇒ but 흉격과 대장은 복리 부분. 리부분으로 표증을 얘기? 좀 이상함!

⇒ **배려로 상승 못하고, 방광으로 내려가면서 나타난다고 설명하는게 맞는듯!**

- 소양인 망음증 설명

: 양성격음, 양이 성해서 음을 때리면 음이 양에게 폐쇄되면서

방광으로 내려가지 못하고 **배려**로 올라가면서 흉격으로 옮겨가면서 **장위** 외한하면서 설사 대장의 곁으로 돌아가서 설사를한다. 즉 리열자체는 심해진 상태. (차가운게 곁에만 둘러싼 형태)

-> 열기 때문에 한기가 도망가서 **어디에 뭉쳤냐**에 따라 상풍증이나 결흉증이나가 나뉜다.

교수님말: 소양인은 방광, 배려로 제대로 설명하고 있음.. 소음인에서 흉격과 대장으로 설명한 건 좀 이상함 / 망음, 망양의기전을 설명한 조문 잘기억할 것! **이부분 중간고사에 낸다.**

병이 풀리는 땀

▶ 少陰人病 1日 發汗 陽氣上升 人中穴 先汗則 病必愈也而
 2日3日 汗不止 病不愈則 陽不上升而 亡陽無疑也

少陽人病 1日滑利 陰氣下降 手足掌心 先汗則 病必愈也而

2日3日 泄不止 病不愈則 陰不下降而 亡陰無疑也.

凡 亡陽亡陰證 明知醫理者 得病前 可以預執證也

得病1,2日 明白易見也

至于3日則 雖愚者 執證 亦明若觀火矣

用藥 必無過2,3日矣 4日則晚矣 5日則臨危 (9-33)

소음인의 병에 첫날 땀을 내는데 양기(陽氣)가 위로 올라가 인중혈(人中穴)에서 먼저 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 땀이 멈추지 않고 병이 낫지 않는 것은 양이 위로 올라가지 못하는 것이니 망양(亡陽)임을 의심할 필요가 없다.

소양인의 병에 첫날 설사를 시켜서 음기(陰氣)가 아래로 내려가 손바닥과 발바닥에서 땀이 나면 병이 반드시 나을 것이나 2,3일이 지나도 설사가 그치지 않고 병이 낫지 않는 것은 음이 아래로 내려가지 못하는 것이니 망음(亡陰)임을 의심할 필요가 없다.

무릇 망양증(亡陽證)과 망음증(亡陰證)은 의학의 이치를 명확히 아는 경우라야 병들기 전에 미리 증을 파악하여 예방할 수 있고 병든 지 1,2일이 지나면 명백하게 쉽게 알 수 있다.

3일이 되면 비록 우둔한 사람이라도 증세를 알아내는 것이 역시 불을 보는 것처럼 환할 것이다. 약을 씹에 있어서는 반드시 2,3일을 넘기지 말아야 할 것이다. 4일이면 늦을 것이고 5일이면 위태로울 것이다.

★ 병이 낫는 땀: 소음인vs소양인 (+태음인)

- 소음인: 인중汗
- 소양인: 수족장심汗
- 태음인: 흉격汗 (같이 설명하셨으니까 알아두는게 좋을 듯)

- 소음인: 2-3일 땀이 그치지 않는 건 망양으로 갈 수 있음
- 소양인: 2-3일 설사가 그치지 않는 건 망음으로 갈 수 있음
- 망음, 망양은 잘알아서 예의주시해야 함
- 병이 되고 1-2일 쉽게 알 수 있음

- 3일 때도 어리석은 사람이라도 알 수 있음
- 약을 쓸 때 2,3일 안에 써라. 4일이면 늦고, 5일이면 위험

▶ 少陰人 平居(소증) 裏煩汗多者 得病則 必成亡陽也

少陽人 平居(소증) 表寒下多者 得病則 必成亡陰也

亡陽亡陰人 平居 豫治補陰補陽 可也

不可至於亡陽亡陰 得病臨危然後 救病也. (9-34)

▶ 少陰人 病愈之汗 人中先汗而 1次發汗 胸膈壯快而活潑

亡陽之汗 人中 或汗或不汗 屢次發汗 胸膈悶躁而 下陷也.

少陽人 病愈之泄 手足掌心先汗而 1次滑泄 表氣清寧而 精神爽明

亡陰之泄 手足掌心不汗 屢次泄利 表氣潮寒而 精神鬱冒. (9-35)

소음인으로 평상시에 속이 답답하고 땀이 많은 경우에 병이 생기면 반드시 망양(亡陽)이 되고,

소양인으로 평상시 겉이 차고 설사를 많이 하는 경우에 병이 생기면 반드시 망음(亡陰)이 된다.

망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 되는 사람은 평상시 음을 보하거나 양을 보하여 미리 치료하는 것이 마땅하고 망양(亡陽)이나 망음(亡陰)이 이르러 병을 얻어 위험하게 된 연후에 병을 치료하는 것은 마땅하지 않다.

소음인의 병이 낫는 경우의 땀은 인중(人中)에서 먼저 땀이 나고 한 번 발한(發汗)시켜도 가슴이 시원하고 활발해지나 망양(亡陽)이 된 경우의 땀은 인중(人中)에서 땀이 나고 나지 않음에 관계없이 여러 번 땀을 내도 가슴이 답답하고 조(躁)하며 기운이 없어진다.

소양인이 병이 낫는 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에 먼저 땀이 나고 한 번 설사시켜도 바깥 기운이 맑고 평안해지고 정신이 상쾌하고 명랑해지나, 망음(亡陰)이 된 경우의 설사는 손바닥과 발바닥에서 땀이 나지 않고 여러 번 설사를 시켜도 바깥 기운이 거슬러서 차고 정신이 흐릿하다.

- 소음인 평소 리번하고 땀 많은 경우 - 망양으로 갈 경향성이 높다
- 소양인 평소 표한하고 설사 많은 경우 - 망음으로 갈 경향성이 높다

- 소음인은 인중땀,
- 소양인은 수족장심땀이 병이 낫는 땀
- 소음인 땀이 계속 나면 망양이 되고,
- 소양인 설사를 계속하게 되면 망음이 된다

▶ 少陰人胃家實病 少陽人結胸病 正邪陰陽 相敵而相格故 日久而後 危證始見也

少陰人亡陽病 少陽人亡陰病 正邪陰陽 不敵而相格故 初證 已爲險證

繼而因爲危證矣.

譬如用兵 合戰交鋒 初1日合戰 正兵 爲邪兵所敗 折正兵幾許兵數

2日 又戰又敗 又折幾許數

3日 又戰又敗 又折幾許數

以3日交鋒觀之則 將愈益戰而 愈益敗 愈益折矣.

若4日復戰 5日復戰則 正兵之全軍覆沒 可知矣

所以用藥 必無過3日也. (9-36)

소음인의 위가실(胃家實)병과 소양인의 결흉병(結胸病)은 정기(正氣)와 사기(邪氣), 음과 양이 서로 대치되어서 다투기 때문에 오랜 후에야 위중한 증상이 비로소 나타나나, 소음인의 망양병(亡陽病)이나 소양인의 망음병(亡陰病)은 정기와 사기, 음과 양이 적수(敵手)가 되지 않은 상태로 다투기 때문에 처음 증이 벌써 험증(險證)이 계속되고 그로 인하여 위증(危證)이 되는 것이다.

병사(兵士)를 썸에 비유한다면 양군이 대전하여 첫날 싸워서 정병(正兵)이 사병(邪兵)에 패하게 되어 정병의 얼마의 병수를 잃고 2일에 또 싸워서 다시 패하여 병사의 얼마를 다시 잃고 3일에 다시 싸워 또 패하여 병사의 얼마를 다시 잃으니 이 3일간 싸운 것으로 본다면 장차 싸움이 계속될수록 계속 패하게 되어 더욱더 병사를 잃을 것이다. 만일 4일에 다시 싸우고 5일에 다시 싸운다면 정병의 전군이 전멸할 것을 가히 알 수 있다. 그렇기 때문에 약을 썸에 있어서도 반드시 3일을 넘겨서는 안 된다.

- 소음인 위가실(=울광)병, 소양인 결흉병 ⇒ 정사가 계속 싸우면서 오래되어야 위증
- 소음인 망양병, 소양인 망음병 ⇒ 초증부터 험증. 역증이므로 위험

- 의심하지 말고 약을 무조건 3일 안에 써야함. 빠르게 약 써라!

▶ 盤龍山老人者 李翁所居地 有盤龍山故 李翁 自謂盤龍山老人也。 此書中 論曰二者 無非盤龍山老人之論而 此章 特學盤龍山老人者 蓋亡陽亡陰 最是險病而 人必尋常視之 易於例治故 別以盤龍山老人 提學警呼而 警覺之也。(9-37) ▶ 亡陰證 古醫別無經驗用藥頭話而 李子建 朱震亨 書中 若干論及之 然 自無明的快驗 蓋此病 從古以來 殺人孟浪甚速 未暇經驗獵得裡許故也。(9-38) 럽: 사냥하다, 수렵
반룡산(盤龍山) 노인이란 것은 이가(李家) 노인이 살고 있는 곳에 반룡산(盤龍山)이 있기 때문이니 이가(李家) 노인이 스스로 반룡산 노인이라 한 것이다. 이 책 가운데 ·나는 논 하기를'이라고 말한 구절은 반룡산 노인의 말이 아닌 것이 없으나 이 장에서 특히 반룡산 노인이라고 들어 말한 것은 대개 망양(亡陽)과 망음(亡陰)은 가장 험한 증인데도 사람들 이 심상하게 보아서 예사로이 쉽게 치료하므로 특별히 반룡산 노인의 이름으로 크게 외 쳐 경각심을 가지도록 하는 것이다. 망음증(亡陰證)에 대하여서는 옛 의사들이 별로 약을 쓰는 경험에 대해서 말한 이가 없고 이자건(李子建)·주진형(朱震亨)의 저서 중에 약간 언급하였으나 그러나 명확한 경험은 없 다. 이 병은 예로부터 지금까지 사람을 죽이는 것이 맹랑하고 매우 신속해서 경험으로 이 치를 찾아낼 겨를이 없었기 때문이다.

(9-37)강조를 하기 위한 내용

- 망양, 망음은 위험하다
- 소음인 땀이나 소양인의 설사를 우습게 보지말라고 하는 등
- 관룡산 노인=이제마

(9-38) 망음증 경험이 별로 없는 이유

- 병이 맹렬하고 심하게 변해서 사람을 죽일 수 있기 때문
- 신속하게 변하고 심하게 변해서 소양인 망음증은 잘 관찰하여 조심해야함

✓ 정리: 망음병과 망양병 비교

	망양병	망음병
사상인	少陰人 소음인	少陽人 소양인
원인	陰盛格陽 음성격양	陽盛格陰 양성격음
기전	陽煖之氣 不能上升 敗陽外遁 양난지기 불능상승 패양외둔	陰清之氣 不能下降 敗陰內遁 음청지기 불능하강 패음내둔
증상	背表의 煩熱, 汗多 배표의 번열, 한다	腸胃의 畏寒, 泄下 장위의 외한, 설하
상태	內氷外炭 내빙외탄	內炭外氷 내탄외빙
소증	平居 裏煩汗多 평거 리번한다	平居 表寒下多 평거 표한하다
진행	2日3日 汗不止 病不愈 2일3일 한불지 병불유	2日3日 泄不止 病不愈 2일3일 설불지 병불유
汗, 泄	亡陽之汗 망양지한	亡陰之泄 망음지설
	胸膈悶躁, 下陷 흉격민조, 하함	表氣溯寒, 精神鬱冒 표기소한, 정신울모

患 者: 정○○(F/33)

發病日: 2006년 4월 25일

主訴症: 惡心, 胃脘痛, 水瀉, 無氣力, 少氣懶言, 眩暈

過去歷: 2002년 喘息으로 약 복용하고 현재 까지 흡입약 사용 중. 2006년 1월 痔疾수술.

家族歷: 別無所知

現病歷

상기 환자는 만 33세, 보통체격, 예민한 성격의 여자 환자로 평소 상기 過去歷 외에 別無大病하던 중 2006년 4월 25일에 상기 主訴 발하여 OO한의원 방문하여 치료 중 別無好轉하여 2006년 5월 3일 본원으로 입원함.

初診所見

1) 體質鑑別

① 體用氣像

키166cm 체중 54kg의 보통 체격으로 전제적인 체형이 上體와 下體가 균형 있게 발달하였고 팔다리가 길고 활동적인 느낌이나 氣力이 없어 보인다. 최근 체중감량을 무리하게 하여 3개월 동안 64kg에서 54kg으로 감량되었다.

容貌詞氣

피부색은 하얀 편으로耳目口鼻은 크지 않고 얼굴의 인상은 다소 예민해 보인다. 목소리는 크지 않고 가늘며 자신의 過去歷을 논리정연하게 설명하는 편이다.

性情

성격은 급하고 예민한 편이며 한 가지에 집착하는 편이 있고 일이 뜻대로 되지 않을 경우 신경을 많이 쓰는 편이다.

素證

① 食欲 및 消化狀態: 평소 食欲은 양호하고 음식을 많이 먹는 편이며 특별히 가리는 것은 없다.

② 大便: 평소 1~2회/일 排便하며 便秘는 없으나 (오전에 냉수마시는 것으로 관리하여) 음) 고등학교 시절부터 만성적인 痔疾이 있었다.

少陽人 亡陰證 환자의 治驗 2례

박은아

獨수원한방병원

③ 小便: 평소 4~5회/일 정도로 小便에서 불편한 감은 없었다.

④ 睡眠: 잘 자는 편이었으나 이번엔 發病이후 꿈도 많이 꾸고 잘 못 잔다.

⑤ 飲水: 갈증은 거의 없는 편으로 물은 의식적으로 많이 마시며 冷水나 溫水를 특별히 가리지 않았다.

⑥ 汗出: 평소 自汗出 별로 없으나 요즘 얼굴, 가슴에 조금씩 나는 편이다.

⑦ 舌質: 淡紅色 舌苔微白

⑧ 脈象: 沈軟

형방사백산
형방지황탕 처방

Table 1. The Progress of Symptoms(+++severe, ++moderate, +mild, -no symptom)

	5/3	5/5	5/7	5/9	5/11	5/13	5/15	5/17	5/19	5/21	이후
腹痛泄瀉	++	++	+	+	+	-	-	-	-	-	-
氣力	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	+	-
聲音	+++	+++	++	++	+	+	-	-	-	-	-
처방	藜防藹白散					藜防地黃湯					

설사를함 ->망음증으로 판단할 수 있는데 번조증있으니까 신열두통망음증으로 판단했고 형방사백산을 처방함(치료용). 형방지황탕은 보약같은 개념으로 사용될 수 있음. (소양인의 보약.)

섬어증

▶ 張仲景曰 太陽病不解 轉入少陽者 脇下硬滿 乾嘔不能食 往來寒熱者

尚未吐下 脈沈緊者 如小柴胡湯

若已吐下 發汗譫語 柴胡湯證罷(사라지다) 此爲壞證 宜壞法治之. (9-39)

▶ 傷寒 脈弦細 頭痛發熱者 屬少陽 不可發汗 發汗則譫. (9-40)

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 풀리지 않아 소양(少陽)으로 전입(轉入)된 것은 옆구리 아래가 뚝뚝하고 그득하며 헛구역이 나고 먹지를 못하고 추웠다 더웠다 하는 것이니 아직 토하거나 설사시키지 않고 맥이 침(沈)·긴(緊)한 경우라면 소시호탕(小柴胡湯)을 투여한다.

만일 이미 토하게 하거나 설사시키거나 땀을 내어 헛소리하는 것은 시호증(柴胡證)이 없어진 것이고 이것을 괴병(壞病)이라 하니 괴병(壞病) 치법에 의거해야 한다.

상한(傷寒)에 맥이 현(弦)하고 세(細)하며 머리가 아프고 열이 나는 것은 소양(少陽)에 속

하니 땀을 내서는 안 되는데 땀을 내면 헛소리한다.

- 소양인 표증에 토하거나 설사시키거나 땀을 시키면 이러면 섬어증이 나타날 수 있다

- 섬어증 41-42 조문이 원래 리증에 있었음. 마지막 치험례를 하면서 표증으로 옮기게 된것

->발한은 태음인쪽이 맞다!(환기를 시켜주는게 태음인의 치료기 때문.)

치험례1 (섬어증)

▶ 嘗治 少陽人 傷寒 發狂譫語證 時則乙亥年 清明節候也.

少陽人 一人 得傷寒 寒多熱少之病

4,5日後 午未辰刻 喘促短氣

伊時 經驗未熟 但知 少陽人應用藥 六味湯 最好之理 故 不敢用他藥 而

祇用 六味湯一貼 病人喘促 卽時頓定.

又數日後 病人 發狂譫語 喘促 又發 又用六味湯一貼則

喘促 雖少定而 不如前日之頓定矣

病人 發狂 連3日 午後喘促 又發 又用六味湯 喘促 略不少定

有頃 舌券動風 口噤不語 於是而 始知六味湯之無能爲也

急煎白虎湯 一貼 以竹管 吹入病人鼻中 下咽而

察其動靜則 舌券口噤之證 不解而 病人 腹中微鳴.

仍以兩爐煎藥 荏苒灌鼻(임염관비) 數3貼後 病人 腹中大鳴 放氣出焉

三人扶持病人 竹管吹鼻灌藥(죽관취비관약) 而

病人氣力 益屈強 三人扶持之力 幾不能支當矣.

又荏苒灌鼻 自未申時 至亥子時 凡用石膏 8兩

未境 病人 腹中大脹 角弓反張之證 出焉 角弓反張 後 少頃 得汗而睡

翌日平明 病人 又服白虎湯 1貼 日出後 滑便1次而 病快愈.

愈後 有眼病 用石膏 黃柏末 各1錢 日再服 7,8日後 眼病 亦愈.

伊時 未知大便驗法故 不察大便之祕閉幾日

然 想必此病人 先自表寒病 得病後 有大便秘閉而發此證矣. (9-41)

일찍이 소양인 상한(傷寒)에 발광(發狂)을 하고 헛소리하는 것은 치료한 적이 있는데 때는 을해년(乙亥年) 청명(淸明) 시기였다. 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 한(寒)이 많고 열(熱)이 적은 병에 걸려 4-5일 후 오미시(午未時)에 숨이 차고 호흡이 급한데 이때에 경험이 부족하여 단지 소양인의 약을 쏘에 육미탕(六味湯)이 최고로 좋은 줄만 알아서 감히 다른 약은 쓸 생각을 못하여 다만 육미탕 1첩을 썼더니 병인이 숨이 찬 것이 즉시 진정되었다. 또 수일 후에 병인이 발광(發狂)하고 헛소리하며 숨이 찬 것이 다시 발생하여 또 육미탕 1첩을 썼는데 숨이 찬 것이 비록 조금 안정되었으나 전일과 같이 진정되지는 않았다. 병인이 3일을 이어서 발광하더니 오후에 숨이 찬 것이 다시 발생하여 다시 육미탕을 쓰니 숨이 찬 것이 조금도 안정되지 못하고 잠시 있다가 혀가 말리고 땀이 동하며 이를 악물고 말을 못하게 되니 여기에 비로소 육미탕으로 될 수 없는 것을 알고 급히 백호탕(白虎湯) 1첩을 달여 대나무 관으로 병인의 코에 붙여넣어 목구멍으로 넘어가게 하고 그 동정을 살피니 혀가 말리고 이를 악문 증상은 풀리지 않고 환자의 뺨속에서 약간 소리가 났다. 그래서 2개의 화로로 약을 달여 계속해서 코에 3첩을 부어넣었더니 환자의 뺨속에서 큰 소리가 나고 방귀가 나왔다. 세 사람이 도와서 환자를 붙들고 대나무 관으로 코에 약을 붙여넣으니 환자의 기력이 더욱 강하여 세 사람이 도와서 붙드는 힘으로는 거의 당하지 못하였다. 다시 콧속으로 약을 부어 미신시(未申時)로부터 해자시(亥子時)에 이르기까지 석고를 8냥을 썼는데 마지막에 환자의 뺨속이 대단히 부르고 각궁반장(角弓反張)의 증세가 나더니 각궁반장한 후에 잠시 있다가 땀이 나고 잠이 들었다. 이튿날 동이 틀 때 환자에게 또 백호탕(白虎湯) 1첩을 먹고 해가 돋은 후에 활변(滑便)을 한 번 보고서 병이 나왔다. 병이 나온 후에 눈병이 나서 석고와 황백(黃柏) 가루 각각 1돈을 하루에 2번씩 먹이니 7,8일 후에 눈병이 역시 나왔다. 그때는 아직 대변으로 정험하는 법을 알지 못하였으므로 대변을 며칠이나 보지 못하였는지를 살피지 못하였으나, 생각컨대 그 환자는 먼저 표한(表寒)병을 얻은 후에 대변이 막혀서 이러한 증이 발생하였을 것이다.

✓ 섭어증 치험례 1 정리

소증	미언급 (先自表寒病, 寒多로 추정)
현증	得傷寒 寒多熱少之病 四五日後 午未辰刻 喘促短氣 → 결흉증으로 추정

체질/변증	소양인 / 병증분류는 불분명 (표→리)
처방 1-3	六味湯 (잘못된 처방)
경과	호전되는 기미를 보이다가 舌卷動風 口噤不語 발생
처방 4	白虎湯 (갑오본적 시각에서 리병으로 인식)
경과	角弓反張之證, 후에 便滑하며 호전, 眼病이 좋아짐
추후 해석	先自表寒病 得病後 有大便秘閉 而發此證矣
신축본 시각	→ 표한병 처방(형방도적산등) + 석고, 형방사백산

- 천축단기: 소양인 **결흉증 대표증상**
- 寒多熱少→**겉으로 둘러싼 한기가 많기 때문에(하강이 안되어서 수도가 막혔는데 육미탕으로 물을 보충해주면 더막힘)**
- 이릉: 소양상풍증의 더 심해지는 증상
- 소양상풍증에 대변비조 → 섭어 → 동풍: 섭어, 동풍은 위열이 치성한 상태
- 위열치성을 알 수 있는 것? **대변비조→이걸 확인해봤어야함.**
- 결흉증이므로 표음강기하는 처방을 썼어야 함 - ex. 형방도적산
- 잘못된 처방을 써서 병을 계속 끄니까 심해져서 **대변비조**-섭어-동풍까지 생김
- 섭어, 동풍까지 오면 지황백호탕 먼저 쓰고, 그 다음 형방도적산을 써야함 (불 먼저 끄고 표음강기 처방)
- 지황백호탕, 석고를 쓰는 이유: 현재 위열이 너무 크기 때문!
- 불을 먼저 끄는 약을 쓰고, 그 다음 표음강기하는 약을 써줘야한다
- ⇒ 병이 이렇게 심해지기 전 단계에서 형방도적산으로 치료해버리는 것이 나음
- 큰장기 , 작은 장기에 대해 생각하는 계기가 됨.

치험례2 (섭어증)

▶ 其後 又有 少陽人 一人 得傷寒 熱多寒少之病
 有人 教服雞肉湯 仍成陽毒發斑
 余教服白虎湯 連3貼而

其人 只服半貼 數日後 譫語而病重 病家慙急 顛倒往觀則
 病人外證 昏愠 已有動風之漸而 耳聾譫語 舌上白苔。
 藥囊 祇有石膏一斤 滑石一兩而 無他藥 故
 急煎石膏1兩 滑石1錢 頓服而
 其翌日 又服石膏1兩 滑石1錢
 此 兩日則 大便 皆不過一晝夜。
 至于第3日 病家 以過用石膏 歸咎故 一日不用石膏矣
 至于第4日 病家慙急 顛倒往觀 則 病人 大便祕閉 兩夜一晝(2.5일 대변비) 而
 語韻不分明 牙關緊急 水飲不入
 急煎石膏2兩 艱辛下咽而 半吐半下咽
 少頃 牙關開而 語韻則不分明如前。
 又連用石膏1兩
 其翌日則 以午後動風 藥不下咽之廬 故 預爲午前用藥 以備動風 而
 又 5,6日用之 前後用石膏 凡14兩 而
 未境 發狂數日 語韻宏壯而 病愈 數月然後 方出門庭. (9~42)

그 후에 또 소양인 한 사람이 상한(傷寒)에 열(熱)이 많고 한(寒)이 적은 병을 얻어 어떤 사람이 꿩고기탕을 먹게 하여 이에 양독발반(陽毒發斑)이 되었기에 내가 이르기를 백호탕(白虎湯) 3첩을 계속 복용하라 하였으나 그 사람은 다만 반첩을 먹었다. (이제마 말 안듣고 절반만 먹음) 수일 후에 헛소리하고 병이 중하여 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니, 환자의 겉으로 나타난 증상은 정신이 혼미하여지고 벌써 풍이 동할 징조가 보이고 귀가 먹고 헛소리하고 혀 위에 백태(白苔)가 끼여 있었다. 약 주머니에 다만 석고 1근과 활석 1냥만 있고 다른 약은 없었으므로 급히 석고 1냥과 활석 1돈을 달여서 한꺼번에 먹이고 그 이튿날 또 석고 1냥, 활석 1돈을 먹었더니 2일간은 대변이 막힌 것이 하루 밤낮밖에 지나지 않았다. 3일째가 되어 환자의 집에서 석고를 너무 많이 쓴다 하여 집으로 돌아왔기 때문에 그날은 석고를 쓰지 못했다. 4일째가 되어 환자의 집에서 급하다고 하소연하여 다시 가서 보았더니 환자가 대변이 막힌 것이 이틀 밤을 지나고도 하루 낮이 되니 말이 분명하지 않고 입을 꼭 물어서 물 마시는 것이 들어가지 않았다. 급

하게 석고 2냥을 달여 간신히 목구멍으로 넘겨 보내니 절반은 토하고 절반은 넘어가서 잠시 후에 입은 열렸으나 말이 분명치 못한 것은 전과 같았다. 다시 석고 1냥을 연이어 쓰고 그 이튿날에는 오후에 풍이 동하면 약이 목구멍으로 넘어가지 못할 염려가 있어서 미리 오전에 약을 써서 풍이 동하는 것을 예방하고 또 5,6일 석고를 썼으니 전후(前後)로 쓴 석고가 무릇 14냥이 되었다. 나중에 수일 동안 발광(發狂)을 하고 나서 말소리가 웅장해지면서 병이 나왔다. 수개월 후에 대문 밖을 나가게 되었다.

✓ 섬어증 치험례 2 정리

소증	미언급 (추정: 소양상풍증에서 출발한 熱多寒少) =소양상풍증 우증
현증	得傷寒 熱多寒少之病, 陽毒發斑
체질/변증	소양인/리병 (갑오본적 시각에서 리병)
치방 1	(석고, 활석을 씹)
경과	大便 皆不過一晝夜
미치료 1일	大便祕閉 兩夜一晝 而語韻不分明 牙關緊急 水飲不入
치방2	(석고, 활석을 씹)
경과	語韻宏壯 而病愈 數月然後 方出門庭
해석	소양상풍증 열다한소에서 발광섬어로 진행 (=신열두통망음)
신축본 처방	→ 行房事 白散

- 꿩고기: 열이 많은 소양인의 독약.
- 가장 강하게 표음강기, 열 끌 수 있는게 行房事 白散 (약력: 사백산>도적산>패독산)
- 백호탕: 3첩 먹으라 했는데 절반만 먹음 (말 안들음)
- 처방을 덜 썼더니 섬어, 동풍 오려는 찰나에 [섬어가 소양상풍증 우증의 대표적 증상]
→ 석고, 활석을 급히 달여 먹임
→ 하루 정도 되더니 대변비조 (좀 나아짐)
→ 하루는 석고를 못씹 (환자가 석고 많이 쓴다고 뭐라해서;;)
→ 환자가 말 안들어서 또 아픔: 대변 증상 좀 더 심해짐

→ 석고를 써서 반은 토하고 반은 내림

→ 소양상풍증 우증에서 약을 제대로 안써서 위열이 치성해짐!

위열이 치성해진 급한 상황이니까, 현증인 위열을 먼저 확 꺼줘야함 (선 지황백호탕 후 형방사백산)

아마 형방사백산을 처음부터 제대로 썼으면 괜찮았을 것

치험례3 (섬어증)

▶ 其後 又有 少陽人 一人 初得頭痛身熱 表寒病 8,9日.
其間 用黃連 瓜蒌 羌活 防風等屬 病勢少愈而 永不快祛矣
仍爲 發狂 3日 病家 以尋常例證 視之 而 祇用黃連 瓜蒌等屬
又 譫語 數日 始用地黃白虎湯 1貼
其翌日 午後動風 急煎地黃白虎湯 連3貼救急而 艱辛下咽
其翌日 則 白虎湯 加 石膏1兩 午前用之 以備動風而 連3日用之
病人 自起坐立 能大小便 病勢比前 快蘇快壯矣
不幸 病加於少愈 廬不周於完治 此人 竟不救
恨 不午前 祇用白虎湯 2貼 以備動風 而 午後 全不用藥以繼之也.
以此三人病觀之則 發狂譫語證 白虎湯 非但午前用藥 以備動風而已矣
日用5,6貼 7,8貼 10餘貼 以晝繼夜則好矣
不必待譫語後而用藥 發狂時 當用藥 可也
不必待發狂後而用藥 發狂前 早察發狂之漸 可也. (9-43)

그 후에 또 소양인 한 사람이 처음에 몸에 열이 나고 머리가 아픈 표한(表寒)병=신열두통
망음이 걸렸는데 그 사이에 황련(黃連)·과루인(瓜蒌仁)·강활(羌活)·방풍(防風) 등에 속
하는 약을 썼으나 병세가 좀 낫기는 하나 사뭇 꽤히 낫지 못하더니 이어 발광한지 3일이
되었다. 환자의 집에서는 가벼운 일반적인 증상으로 보고 다만 황련과 과루인 등에 속하
는 약만 쓰다가 또 헛소리한지 수일에 비로소 지황백호탕(地黃白虎湯) 1첩을 쓰기 시작했
다. 그 다음날 오후에 풍이 동하여 급히 지황백호탕을 달여 3첩을 계속 써서 구급하니
간신히 목구멍으로 내려갔다. 그 다음날에도 백호탕(白虎湯)에 석고 1냥을 더하여 오전에
썼는데 풍이 동할 것을 대비하기 위함이고 3일을 계속하여 석고를 쓰니 환자가 스스로

일어나 앉고 서고 대소변도 보게 되어 병세가 전에 비하여 꽤히 덜하고 회복되었으나 불
행하게도 병이 조금 낫다가 다시 나빠졌는데 내 생각이 완치하는 데까지 주밀하지 못하
여 이 사람을 마침내 구원하지 못하였다. 한스러운 것은 오전에 다만 백호탕 2첩을 써서
풍이 동할 것을 예방하기만 하고 오후에는 전혀 약을 쓰지 않아서 이어주지 못하였다는
것이 잘못된 것이다. 이 세 사람의 병으로 살핀다면 발광(發狂)하고 헛소리하는 증에 백
호탕을 다만 오전에만 써서 풍이 동할 것을 예방하기만 할 것이 아니라 하루에 5-6첩, 7-
8첩, 10여 첩을 써서 밤낮을 계속하여 이어주는 것이 좋을 것이다.

굳이 헛소리한 다음을 기다려서 약을 쓸 필요가 없고 발광할 때 당연히 약을 쓰는 것이
마땅하며, 발광한 다음을 기다려서 약을 쓸 것이 아니고 발광하기 전에 발광의 조짐을 조
기에 살펴서 약을 쓰는 것이 마땅하다.

✓ 섬어증 치험례 3 정리

소증	미언급 (추정: 熱多寒少)
현증	頭痛身熱 表寒病
변증	소양인 비수한표한병
치방 1	황련, 과루, 강활, 방풍
경과	病勢少愈 而永不快祛矣 → 發狂三日
치방 2	황련, 과루, 강활, 방풍
경과	譫語數日
치방 3	지황백호탕
경과	自起坐立 能大小便 病勢比前 快蘇快壯矣 → 廬不周於完治 此人 竟不
추후해석	不必待譫語後 而用藥 發狂時 當用藥 可也 不必待發狂後 而用藥 發狂前 早 察發狂之漸 可也
신축본 시각	신열두통망음증 → 형방사백산

- 두통신열 표한증: 신열두통망음증

- 신열두통망음 ⇒ 황련~방풍 사용

→ 낮는 듯하다가 발광 ⇒ 또 황련~방풍 사 ㄱㅇ

→ 발광에서 심해져서 섬어 생김 ⇒ 지황백호탕 사용

→ 동풍 ⇒ 지황백호탕

⇒ 다음날 또 백호탕+석고.. 결국 구하지 못함

- 섬어, 동풍 온 경우에는 위열이 치성한 것이므로 충분히 약을 써줘야 함

- 처방 1, 2는 잘못된 처방. 지황백호탕을 맞는 처방이나 충분히 못써서 사람을 살리지 못함

- 신열두통망음 처방: [설사>열] 저령차전자 vs [열>설사] 형방사백산

치험례4 (섬어증)

▶ 其後 又有一 少陽人 17歲 女兒 素證 間有悖氣 食滯腹痛矣

忽一日 頭痛寒熱食滯 有醫 用蘇合元 3箇(개) 薑湯調下

仍爲泄瀉 日數十行 十餘日不止 引飲不眠 間有譫語證

時則 乙亥年 冬11月 23日也.

卽夜 用生地黃 石膏 各6兩 知母 3兩 其夜 泄瀉度數 減半

其翌日 用荊防地黃湯 加石膏 4錢 2貼連服 安睡而能通小便

荊防地黃湯 2貼 藥力 10倍於 知母白虎湯 可知矣.

於是 每日 用此藥4貼 晝2貼連服 夜2貼連服 數日用之

泄瀉永止 頭部兩鬢 有汗而 病兒譫語證 變爲發狂證

病家驚惑 2晝夜 疑不用藥

病勢遂危 頭汗不出 小便祕結 口咬氷片 不省人事 爻象 可惡矣 勢無奈何

以不得已之計 一夜間 用荊防地黃湯 加石膏 1兩 連10貼灌口

其夜 小便通三碗 狂證不止 然 知人看面 稍有知覺.

其翌日 又用6貼 連5日 日用4,5,,6貼 發狂始止

夜間 或 霎時就睡 然 不能久睡便覺

又用3,4貼 連5日 頭頂兩鬢 有汗而 能半時刻 就睡 稍進粥飲少許.

其後 每日荊防地黃湯 加石膏 1錢 日2貼用之 大便過1日則 加4錢

至于12月 23日 始得免危 能起立房室中

一朔內 凡用石膏 45兩.

新年正月 15日 能行步一里地而來見我 其後 又連用荊防地黃湯 加石膏 1錢 至于新年3月 (9-

44)

그 후에 또 소양인 17세 여자 아이가 있었는데 평소에 간혹 딸꾹질이 나고 음식에 체하고 배가 아픈 증상이 있었다. 갑자기 하루는 머리가 아프고 추웠다 더웠다하고 음식에 체했는데, 한 의사가 소합향원(蘇合香元) 3개를 생강(生薑) 달인 물로 먹였더니 설사를 하는데 하루에 수십 번을 하고 심여 일이 지나도 그치지 않고 물이 먹히며 잠을 자지 못하고 가끔 헛소리하는 증상이 있었는데 그때가 기해년(己亥年) 겨울 11월 23일이었다. 그날 밤으로 생지황(生地黃) · 석고(石膏)를 각각 6냥, 지모(知母) 3냥을 썼더니 그날 밤 설사의 횟수가 절반으로 감소되었다.

그 이튿날 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 4돈을 더하여 2첩을 연이어 먹게 하니 편안히 자며 소변도 잘 통하게 되었으니 형방지황탕(荊防地黃湯) 2첩의 약 효과가 지모백호탕(知母白虎湯)의 10배나 되는 것을 알 수 있었다. 이에 매일 이 약을 4첩씩 쓰는데 낮에 2첩을 이어서 먹고 밤에 2첩을 이어서 먹여 수일간 쓰니 설사가 아주 그치고 머리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 병난 아이의 헛소리하는 증상이 변하여 발광하는 증으로 되었는데 환자 집에서 놀라 의심을 하여 2일 밤낮을 약을 쓰지 못하였는데 병세가 위태하게 되어 머리에 땀이 나지 않고 오줌이 통하지 않게 되고 얼음을 씹을 때처럼 입에서 소리를 내고 사람을 알아보지 못하게 되어 병의 예후가 매우 나쁘게 되었다. 이러한 형세를 어찌할 것인가? 부득이한 계책으로 하룻밤에 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1냥을 더하여 10첩을 연이어 입에 부어 넣었더니 그 밤으로 소변이 통하여 3사발이나 누었으나 광증(狂證)은 그치지 않고 다만 사람을 알고 얼굴을 보며 약간 제정신이 들었다. 그 다음날에 또 6첩을 쓰고 5일을 계속해서 4,5,6첩을 쓰니 발광이 그치기 시작하고 밤사이에 혹은 잠시 잠이 드나 오래 가지는 못하고 곧 깨기에 또 하루에 3,4첩을 5일 동안 이어서 쓰니 머리 정수리와 양쪽 귀밑머리에서 땀이 나고 능히 반 시각 동안 자게 되고 죽을 조금씩 막게 되었다. 그 후 매일 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈을 더하여서 하루에 2첩을 쓰되 대변을 하루 동안 보지 못하면 석고 4돈을 더하였더니 12월 23일에 이르러서 비로소 위

태한 지경을 면하게 되었고 방 안에서 일어서게 되었다. 한 달 동안에 무릇 석고를 쓴 것이 45냥이 되었다. 신년(新年) 정월(正月) 5일에 능히 1리가 되는 거리를 걸어와서 나를 보고 갔다. 그 후에도 또한 형방지황탕(荊防地黃湯)에 석고 1돈(錢)을 더하여 새해 3월까지 계속 썼다.

✓ 섭어증 치험례 4 정리 ⇒ 치험례4를 통해 소증 치료가 매우 중요함을 깨달음

소증	間有悖氣 食滯腹痛
현증	頭痛寒熱食滯,用蘇合元三箇 薑湯調下 仍爲泄瀉 日數十行 十餘日不止 引飲不眠 間有譫語
변증	소양인 신한복통망음증 소증에 신열한 약에 의한 위열 치성
처방 1	생지황 석고 各 六兩 지모三兩
경과	설사가 반 정도 감소함
처방 2	형방지황탕 加 석고 四錢 (소증을 기준으로 사용)
경과	安睡而能通小便 → 10배의 효력,泄瀉永止 頭部兩鬢有汗 而病兒譫語證 變爲發狂證,病家驚 惑 二晝夜 疑不用藥
처방 3	형방지황탕 加 석고 一兩
경과	其夜 小便通三碗 狂證不止 然 知人看面 稍有知覺.
처방 4	형방지황탕 加 석고 4달 이상 사용
해석	신한복통망음증으로 시작 → 형방지황탕+석고

- 소증: 패기(딸꾹질), 식체복통

- 설사가 그치지 않고 인음, 불면 (인음: 열이 심해진 증상)

⇒ 생지황 석고 지모 = 지모백호탕: 섭어증이 있으므로, 현증에 맞는 처방 → 설사가 반정도 감소

⇒ 형방지황탕+석고 → 매우 괜찮아짐

: 형방지황탕은 신한복통망음 처방(소증에 맞는 처방) : 형방지황탕이 지모백호탕보다 10배는 좋다

- 섭어가 발광으로 변함. 환자 집에서 놀라서 약을 못 씹. 그래서 병이 다시 더욱 심해짐 (동풍

생기려함)

⇒ 소증에 맞는 형방지황탕+석고 복용 → 조금씩 나아짐

⇒ 또 형방지황탕+석고 → 완전 나옴!

결론: 소증 치료가 더 좋다!!

- 모든 표증에서 섭어가 올 수 있다.

- 소양상풍병, 망양병, 신열두통망음병까지는 지황백호탕을 먼저 써주는 현증 치료가 괜찮다!

- 하지만! 신한복통망음병에는 형방지황탕, 즉 소증 치료가 더 낫다!

치험례 (섭어증)

▶ 論曰 少陽人病 以火熱爲證故 變動甚速 初證不可輕易視之也.

凡 少陽人 表病 有頭痛

裏證 有便秘 則 已爲重證也

重病 不當用之藥 1,2,3貼 誤投則 必殺人

險病危證 當用之藥 1,2,3貼 不及則 亦不救命. (9-45)

나는 논하기를 소양인 병은 화열(火熱)이 그 병증이 되기 때문에 변동이 매우 빨라서 처음 증이 나타나더라도 경솔하게 쉽게 보아서는 안 될 것이다. 대개 소양인의 표병(表病)에 머리가 아픈 것이 있거나 이병(裏病)에 변비가 있으면 이미 중병이 된 것이니 중병에는 쓰지 못할 약을 1,2,3첩만 잘못 투여하여도 반드시 사람을 죽일 것이고 험한 병과 위태한 증에는 반드시 써야 할 약을 1,2,3첩을 제때에 못 써도 또한 생명을 구하지 못할 것이다.

- 소양인병은 화열이 많다. 변동이 신속하다. 초기에 쉽게 보지 말아라.

- 표병의 대표적 증상이 두통

- 리증의 대표적 증상이 변비: 이미 중병

- 중병은 사람 죽일수도, 험위는 용량이 못미치면 죽일수도

⇒ 약을 빠르게 쓰고 양도 많이 써야 함

소양인은 병정도 변화가 빠르고 약을 쓴효과도 변화가 빠르다.

섬어증 ★18기출(객관식)

- 비수한표한병 내에서 오치하거나 적합한 치료를 못하고 시일을 끌게 되면 胃熱熾盛(위열치성)한 상태가 되어 나타나는 변증.
- 모든 表病에서 발생하며, 譫語가 심해지면 動風이 됨.
- 급변하고 병이 위중하기에, 소증을 기반해서 미리 용약하여 예방해야 함. (치험례4)
- 발광→섬어→동풍 순으로 악화, 반대(동풍→섬어→발광)로 호전

-소양인 표병의 한열다소에 따른 처방

病證	寒多熱少		熱多寒少	
소양상풍병	형방패독산		형방사백산	
	형방도적산			
망음병	신한복통망음	활석고삼탕	신열두통망음	저령차전자탕
		형방지황탕		형방사백산

+) 추가 설명

- 형방패독산: 아주 초기에 쓸 수 있는 처방
- 형방도적산: 천축, 흉격의 결흉증에 많이 사용

->이 두개는 **겉으로 나타내지는 열증**이 적을 때 사용.

(교수님 최애: 형방사백산(열증이 더 많을때) or 형방패독산)

- ✓ 신열두통망음
 - 설사>열: 저령차전자탕
 - 열>설사: 형방사백

- ✓ 신한복통망음

- 복통>설사: 활석고삼탕
- 무기력>복통: 형방지황탕 ⇒ 소양인 보약

✓ 결흉 우증

수역 있음: 감수 쓰고, 형방도적산

건구, 단기, 寸x ⇒ (수역 없으니까 감수 쓰지말고) 형방도적산 + 백복령, 택사 = 도적강기탕

- 조갈섬어: 더 심해진 상태 ⇒ 감수 쓰고 지황백호탕 사용

✓ 소양인 수역증: 감수를 먼저 쓰고, 형방도적산

cf) 소음인 하리청수: 파두 → 강출관중탕

★ 뭉쳐있는 것을 풀어주는 약

- 소양인: 감수
- 소음인: 파두

어떠어떠한 증상에 어떤 처방을 쓰느냐? 혹은 무슨 병증인가가 시험문제가 될 것!

->이걸 정리한게 밑에 표임 외워야함.

혹은 1학기때 배운 소양인인걸 판단하는 기준을 써야할 수도 있음.

비수한표한병

치법: 표음강기 / 공통 증상: 신한, 신체통

소양상풍병 <순증>	구고인건 목현십번	소양상풍병 경증	발열 결흉X	소양상풍병 초증	무한, 지속발열, 번조	형방패독산 소양인 표증에서 가장 좋은 약
				소양상풍병 우증	한열왕래, 흥협만, 구, 이릉	형방패독산, 형방도적산 (한디열소) 형방사백산 (열&설사; 열다한소) 표음강기력: 사백>도적>패독
		소양상풍병 중증	심하경만 심하비경 건구단기 수역 천촉단기 발열X	결흉증	대변비조X, 좁좁한출, 소변불리, 비풍슬한	형방도적산
				결흉우증	대변비조O, 변갈섬어 격내거통수불가근(아파서 손도 못댐)	감수, 형방도적산 -수역有: 선 감수 후 형방도적산 -수역無: 그냥 형방도적산만
						도적강기탕: 건구, 단기, 토X (=형방도적산+백복령, 택사) 지황백호탕: 조갈섬어 (선 지황백호탕 후 형방도적산)
망음병 <역증>	성정편급증 건망 평소설사	망음병 험증	두통 구갈 심번 소변적	신열두통망음증	설사	저령차전자탕 설사>열
				신열두통망음 우증	번조, 소소활리변 혹 변폐	형방사백산 열>설사
		망음병 위증	복통 오한 수족냉 소변빈삭	신한복통망음증	복통 위주 혹 설사	활석고삼탕 복통>설사: 소양인의 복통약
				신한복통망음 우증	신한심화, 비만, 소소활리변 혹 변폐	형방지황탕 소양인의 보약: 기력 없을 때 사용

- 모든 표증에서 섬어(=위열치성한상태)가 올 수 있다. - 소양상풍병, 망양병, 신열두통망음병까지는 지황백호탕을 먼저 써주는 현증 치료가 괜찮지만- 신한복통망음병에는 형방지황탕, 즉 소증 치료가 더 훨씬 낫다!

[소양인 위수열리열병]

1. 위수열리열병

1.1. 위수열리열병 기전

1.2. 위수열리열병의 분류

1.3. 위수열리열병의 공통점/차이점

2. 홍격열병

2.1. 홍격열병의 기전과 증상

2.2. 홍격열병의 輕證과 重證의 감별

2.3. 홍격열병 경증 구분

2.4. 홍격열병 중증 구분

2.5. 홍격열병 치료

3. 음허오열병

3.1. 음허오열병의 기전과 증상

3.2. 음허오열병의 險證과 危證의 감별

3.3. 음허오열병 협증 구분

3.4. 음허오열병 위증 구분

3.5. 음허오열병 치료

홍격열병(상소,중소) 음허오열병(하소->표리구병.)


4. 원문

1. 위수열리열병

증상 身熱, 胸煩悶燥, 大便燥

기전	胃局의 淸陽이 頭面四肢로 상승하지 못하거나 , 大腸局의 淸陽이 胃局으로 상승하지 못하여 頭面四肢또는 胃局에 강력한 熱氣가 형성되며 腎局陰氣의 손상을 동반하여 발생
의미	胃受熱: 胃局(脾局) 부위에 병리적 熱이 과도하여 생기는 병리 기전으로 나타나는 '청양상승불리淸陽上升不利' 현상 胃受熱裏熱病: 위수열의 병기를 거쳐 복리 부위에 열증이 나타나는 병증 → 대장국음청지기의 청양상승이 부족하여 위국이 열을 받아 裏局(위, 대장)에 열증이 발생한 병.

1.1. 위수열리열병 기전



[간단 설명]

애정기 역동(꼭스트레스만은 아닐 수 있음) → 신기 손상 → 작은 장부인 대장, 신이 더 작아짐 → 대장, 신의 음청지기 손상 → 대장에서 위로 올라가야하는 **청양이 상승x** (음청지기가 **상승**하니 **청양**이라함.과도한 열기 때문) = 청양상승불리 → 복리 부위 병리적 열증 = 위수열리열병

[PPT 설명]

- ① 애정기(衰情氣)의 역동(逆動) 暴發하여 작은 장부인 腎局(대장, 신)이 손상되고 큰 장부인 脾局(위, 비)은 점점 커져, 대장과 신의 陰清之氣가 손상
이로 인해 비국의 수곡열기는 더욱 커지고 동시에 신국의 수곡한기는 더욱 약해짐.
- ② 대장에서 위로 올라가야하는 淸陽(裏陽)이 과도해진 수곡열기로 올라가지 못함.
- ③ 올라가지 못한 淸陽(裏陽)으로 청양상승불리淸陽上升不利 현상이 됨.
- ④ 복리腹裏 부위에 병리적으로 熱의 증상이 나타나게 됨.

- 보명지주(음청지기): 신에서 생성, 대장→위로 상승, 쪽 가서 배표→방광으로 내려옴.

- 표병은 4번에서 못내려간 거. 리병은 2번에서 못 올라가서 열이 많아진 것

-왜 애정기? 이성적으로 생각하는 경우는 표병, **감정이 앞서는 경우는 리병**으로 가는 경우가 많다.

그래서 애“정”기가 원인. 경향성이 그렇다!

+) 오른쪽: 두번째 그림 기전설명

-흉격열증: 신이 수도원이라고 생각. 그런데 대장-위로 가는 길에 이물질이 낀 거라고 생각. 그

래서 **위까지만 겨우겨우 간게 흉격열증**

-상소증: **위까지 못하고 대장-위 사이에서 막힌 것**. 위국에 열증이 생긴 것

-중소증: 겨우 대장까지만 온 것. 대장에 머무름


-하소증: 대장에 다다르려고 하는데 순환 안 돼서 신에서 음청지기가 공급이 안됨. **그래서 대장 문앞에서 말라가는 것**

-음허오열증: 라인이 안돌아가니까 배표부위에서도 하강 못함. 물줄기가 약해지니까. 그래서 **배 표에서 표한병까지 동시에 생기는 게 음허오열증**. (소음인의 소음증과 함께 표리구병이다)

즉

-하소증은 역증. 수도 공급원(=신) 자체가 약한 상태에서 걸린 병

-음허오열증은 강음도 안돼서 배표에 한증까지 생긴 것



[PPT 설명]


흉격열병 胸膈熱病	淸陽(裏陽)의 상승이 약해져서 위국의 열기가 심화되어 위열증이 나타남
상소증 上消證	위열증이 심한 상태에서 淸陽(裏陽)의 상승에 문제가 서서히 발생하여, 淸陽(裏陽)의 상승이 위국까지 상승하나 위국에 쌓여서 頭面四肢로 가지 못하는 것
중소증 中消證	위열증이 심한 상태에서 淸陽(裏陽)의 상승에 문제가 서서히 발생하여, 淸陽(裏陽)의 상승이 위국까지 미치지 못하는 것
하소증 下消證	腎氣가 약한 상태인 腎弱으로 인하여 淸陽(裏陽)의 상승이 거의 되지 못하여 大腸局에 겨우 미치는 것 →하소증도 표증이 나타나나 음형열병보다 덜함.
음허오열병 陰虛午熱病	腎氣가 약한 상태인 腎弱의 상태로 淸陽(裏陽)의 상승이 거의 되지 못하여 腹裏부위의 열증이 생기고, 동시에 背脊에서 膀胱으로 表陰이 강음하지 못하여 背表부위에 한증이 생김 ⇒ 표리구병

참고) 청양淸陽(리양)

-사상의학에서 음:하강, 양:상승을 의미함. 보통 얘기하는 음양 아님

-즉, **청양은 올라가야하는 보명지주**를 의미함. 이게 상승 못해서 열증이 생긴다.

1.2. 위수열리열병의 분류



☞ 위수열리열병 공통증상: 신열, 흥변민조, 대변조

└ 같이다음, 다한출 → 흉격열증

└ 성정편급증(건망), 구건, 불다음수, 오열, 배한, 구 → 음허오열증

-배한, 구= 표증현상 : 음허오열증은 리증&한증 → 표리구병

-성정편급증: 평소에 마음적 스트레스가 있음 → 역증으로 갈 경향성이 크다

1.3. 위수열리열병의 공통점/차이점

공통점

공통증상	身熱(전신적인 열증), 胸煩悶燥, 大便燥(위열 증후)
- 둘 다 裏熱病이므로 裏熱을 가짐	

차이점

차이점	- 保命之主人 腎局陰清之氣의 손상여부가 다르다. - 陰虛 증상 유무 - 表病과 같은 증상유무(背寒, 嘔) - 性情偏急(健忘)의 유무
-----	--

2. 흉격열병(순증)

흉격열병			
흉격열병 경증		흉격열병 중증	
흉격열병 초증	흉격열병 우증	상소증 : 위국청양불상승증	중소증 : 대장청양불상승증
위수열리열병 공통증상: 신열, 흥변민조, 대변조			
흉격열병 공통증상: 같이다음 다한출			
급병: 소변적사		완병: 소변삭이소	
대변비조 (1일이하) 미오한 ->초증	대변비조 (1일이상) 섬어 두면부, 眼, 耳, 鼻, 口舌 열증 피부의 심한 열증 (紅, 腫, 熱, 痛 등)	설적순홍, 설상적열, 면적 (두면사지의 열증)	소곡선기, 선식이수 옹저, 안병, 고창 (위국의 열증)

- 상소증: 위국의 청양이 (두면사지로) 상승하지 못한 증

- 중소증: 대장의 청양이 (위국으로) 상승하지 못한 증

- **상소,중소는 요즘의 당뇨, 당뇨의 합병증들.**

- 초증, 우증증 나누는 것은 대변의 기간

- 중소: **음식은 먹지만 수척해지는 외형적인 변화가 나타나는 게** 상소와의 구분 포인트.

당뇨병 합병증이라고 생각하면 됨. 마르는데 염증도 같이 생기면 중소증

2.1. 흉격열병의 기전과 증상

기전	- 保命之主인 腎局陰清之氣는 건재한 순증順證 - 腎局的 陰清之氣는 힘이 있지만 淸陽上升하는 힘이 부족하여 상승하는 힘만 부족한 것. - 大腸局的 淸陽이 胃局 및 頭面四肢로 상승하지 못하고 胃局에 강력한 熱氣가 형성되어 발생.
증상	- 증상: 身熱, 胸煩悶燥, 大便燥(위수열공통) + 渴而多飲, 多汗出

2.2. 흉격열병의 輕證과 重證의 감별

[경증과 중증의 감별점]: 小便으로 구분	
경증(急病)	소변적小便赤 -> 급증이라 열이 확오름
중증(緩病)	소변삭이소小便數而小

2.3. 흉격열병 경증 구분

[경증의 감별점] 大便不通 이환기간으로 구분	
흉격열병 초증	대변불통 1일 이하 + 微惡寒
흉격열병 우증	대변불통 1일 이상 + 譫語, 頭面部 및 眼, 耳, 鼻, 口舌部 열증과 皮膚의紅, 腫, 熱, 痛등의 심한 열증

2.4. 흉격열병 중증 구분

[중증의 감별점] 上消냐, 中消냐로 구분

상소 (위국청양불상승)	上消증상 (頭面四肢熱證) = 舌赤唇紅, 舌上赤裂, 面赤
중소 (대장청양불상승)	中消증상 (胃局的熱證) = 消穀善飢, 善食而瘦, 癰疽, 眼病, 鼓脹

-중소는 합병증과 염증이 나타나야 함

2.5. 흉격열병 치료

병증	치법	처방
흉격열병 초증	청위열 淸胃熱	형방사백산
흉격열병 우증		저령차전자탕(소변불리가 너무 심할때), 지황백호탕
상소(위국청양불상승)		양격산화탕
중소(대장청양불상승)	청대장열 淸大腸熱	인동등지골피탕(인슐린 분비를 촉진)

3. 음허오열병(역증)

음허오열병->역증		
협증	위증	
하소증: 대장청양모손증	음허오열증	음허오열 우증
위수열리열병 공통증상: 신열, 흥번민조, 대변조		
음허오열병 증상: 성정편급증(건망), 구건, 불다음수, 오열, 배한, 구(표한증)		
오열 위주	배한 위주	
소변다이탁 퇴슬고세 골절산동	식체비만 복통 구토	토혈

- 대장의 청양이 점점 없어지는 증이 하소증

- 오열 배한 다 있는데 오열 위주면 험증, 배한이 많아지면 위증

3.1. 음허오열병의 기전와 증상

기전	- 保命之主인 腎局陰清之氣가 손상된 역증 - 腎局陰清之氣의 耗損으로 腎局陰清之氣 자체가 이미 부족한 상태 (험증) = 하소증 - 더 심해지면 腎局陰清之氣 자체의 약화가 심할 뿐 아니라, 大腸局의 清陽上升 하는 힘도 부족해지고, 동시에 背脊에서 膀胱으로 表陰降陰 하지 못하여 表寒病과 유사한 증상이 나타나게 되어 表裏 모두에 증상이 발생 (위증) = 음허오열증
증상	身熱, 胸煩悶燥, 大便燥(위수열공통) + 性情偏急(健忘), 口乾, 不多飲水, 午熱, 背寒, 嘔= 표한증

3.2. 음허오열병의 險證과 危證의 감별

[험증과 위증의 감별점] 午熱이 위주인지, 背寒이 위주인지	
험증	오열 위주
위증	배한 위주

3.3. 음허오열병 험증 구분

[험증] 大腸清陽耗損證(下消證)	
하소증 (대장청양모손증)	- 午熱위주 + 小便多而濁, 腿膝枯細骨節痠疼(下消증상)

3.4. 음허오열병 위증 구분

[위증] 吐血 여부로 구분	
음허오열증	背寒위주 + 食滯痞滿, 腹痛, 嘔吐
음허오열 우증	背寒위주 + 吐血

3.5. 음허오열병 치료

	병증	치법	처방
험증	하소증 (대장청양모손증)	리양승기 裏陽升氣	숙지황고삼탕 > 독활지황탕
위증	음허오열증		독활지황탕 > 숙지황고삼탕
	음허오열우증		십이미지황탕

숙지황고삼탕->인슐린 분비를 촉진한다는 연구결과.

4. 원문

• 10-1~8 흉격열병	• 10-12 소양인 표병, 리병 비교
• 10-9 위수열, 비수한 비교	• 10-13~24 소갈증
• 10-10 대변불통시 지황백호탕	• 10-25~29 음허오열병
• 10-11 소양인 대변	

흉격열병: 경증의 초증

- ▶ 張仲景曰 太陽病 八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱多寒少 脈微而惡寒者 此 陰陽俱虛 不可更發汗 更下 更吐 面色 反有熱色者 未欲解也 不能得小汗出 身必痒 宜 桂麻各半湯 (10-1)
- ▶ 太陽病 似瘧 發熱惡寒 熱多寒少 脈微弱者 此 亡陽也 身不痒 不可發汗 宜 桂婢各半湯 (10-2)
- ▶ 論曰 此證 大便 不過一晝夜而 通者 當用 荊防瀉白散 大便 過一晝夜而 不通者 當用 地黃白虎湯 (10-3)

중경(張仲景)이 말하기를 태양병(太陽病)이 8,9일에 학질(瘧疾)증상 같이 열이 나고 추위를 싫어하는데 추위보다는 열이 심하며 맥이 미(微)하고 추위를 싫어하는 것은 음과 양이 모두 허한 것이니 가벼이 땀을 내거나 설사시키거나 토하게 하지 말아야 한다. 얼굴빛이 도리어 열색(熱色) 있는 것은 병이 아직 풀리려고 하지 않는 것으로 조금이라도 땀을 내지 못하면 몸이 반드시 가려울 것이니 마땅히 계마각반탕(桂麻各半湯)을 써야 한다.

태양병(太陽病)이 학질(瘧疾) 같아서 열이 나고 추위를 싫어하며 열이 많고 한이 적으며 맥이 미(微)하고 약한 것은 이것은 망양(亡陽)이므로 몸이 가렵지 않으면 땀을 내지 말아야 한다. 마땅히 계비각반탕(桂婢各半湯)을 써야 한다.

나는 논하기를 이러한 증에 대변이 하루 밤낮을 지나지 않아서 통하는 경우는 형방사백산(荊防瀉白散)을 써야 하고 대변이 하루 밤낮을 지나도 통하지 않는 경우는 지황백호탕(地黃白虎湯)을 써야 할 것이다.

->중경해 너무 처방적응증이 세세함->적용에 어려움. ->제마해: 대변불통 몇일이 기준!

계마각반탕과 계비각반탕

계마각반탕	•10-1 身必痒 宜 桂麻各半湯 麻黃 1錢 5分, 白芍藥, 桂枝, 杏仁 各 1錢, 甘草 7分, 薑 3片, 棗 2枚 마황을 중용하는 처방, 마황이 1錢 5分으로 군약 → 太陰人 : 열재표 - 發汗을 시켜야 할 증->태음인에게 적용해야할 처방.
계비각반탕	•10-2: 身不痒 宜 桂婢各半湯

	석고 2돈, 마황, 계지, 백작약 각 1돈, 감초 3分, 강 3片, 조 2枚 석고를 중용하는 처방, 석고가 2錢으로 군약
--	--

- 계마각반탕은 태음인에게 맞는 처방 / 가려움 같은 증상이 없으므로 계비각반탕.

소양인한테 마황 쓰면 괴증 나타나므로 쓰면 안된다

계비각반탕 = 상한론의 계지이월비일탕

흉격열병의 대변 상태에 따른 처방

大便通	大便不通
형방사백산 <흉격열병 초증 처방> : 治頭痛 膀胱熾躁者 宜用 (신정 소양인병 응용요약(이하 “신정”)) 생지황 3돈, 복령, 택사 각 2돈, 석고, 지모, 강활, 독활, 형개, 방풍 각 1돈.	지황백호탕 <흉격열병 우증 처방> 석고 5돈~10돈, 생지황 4돈, 지모 2돈, 방풍, 독활 각 1돈.


흉격열병: 경증의 우증

- ▶ 張仲景曰 陽明證 小便不利 脈浮而渴者 豬苓湯 主之 (10-4)
- ▶ 三陽合病 頭痛面垢 譫語遺尿 中外俱熱 自汗煩渴 腹痛身重 白虎湯 主之 (10-5)
- ▶ 論曰 陽明證者 但熱無寒之謂也
 三陽合病者 太陽少陽陽明證 俱有之謂也
 此證 當用 豬苓湯 白虎湯
 然 古方 豬苓湯 不如新方 豬苓車前子湯之具備
 古方 白虎湯 不如新方 地黃白虎湯之全美矣
 若 陽明證 小便不利者 兼 大便秘燥則 當用 地黃白虎湯 (10-6)
- 장중경(張仲景)이 말하기를 양명증(陽明證)에 오줌이 잘 나오지를 않으며 맥이 부(浮)하고 갈증이 있는 것은 저령탕(猪苓湯)을 주로 쓴다고 하였다.
 삼양(三陽)이 합병(合病)되어 머리가 아프고 얼굴에 때가 끼고 헛소리하고 오줌이 저절로

나오고 속과 밖에 다 열이 있고 저절로 땀이 나고 번갈(煩渴)하며 배가 아프고 몸이 무거우면 백호탕(白虎湯)을 주로 쓴다.

나는 논하기를 양명증(陽明證)이란 것은 단지 열(熱)만 있고 한(寒)이 없는 것을 말하는 것이고 삼양(三陽)이 합병(合病)한다는 것은 태양·소양·양명증이 함께 있는 것을 말하는 것이다. 이러한 증에는 마땅히 저령탕(猪苓湯)이나 백호탕(白虎湯)을 써야 한다. 그러나 옛 처방인 저령탕이 새 처방인 저령차전자탕(猪苓車前子湯)의 구비한 것만 못하고, 옛 처방인 백호탕이 새 처방인 지황백호탕(地黃白虎湯)의 완전한 것만 못하다. 만일 양명병(陽明病)에 소변이 잘 나오지 않는 것에 겸하여 대변이 막히고 마른 것은 지황백호탕(地黃白虎湯)을 쓰는 것이 좋다.

흉격열병 처방



대변불통

- 리열을 가능하는 지표
- 대변불통이 지속되는 시간을 가지고 리열의 강도를 간접적으로 측정

흉격열병(양결): 경증의 우증

▶ 朱肱曰 陽厥 者 初得病 必身熱頭痛 外有陽證 至四五日 方發厥 厥至半日 却身熱 蓋 熱氣深 方能發厥, 若微厥 却發熱者 熱甚故也 其脈 雖伏 按之滑者 爲裏熱 或飲水 或揚手擲足 煩躁 不得眠 大便秘 小便赤 外證 多昏 用白虎湯 (10-7)

주굉(朱肱)이 말하기를 양결(陽厥)이란 것은 처음 병을 얻을 때 반드시 몸에 열이 나고

머리가 아프며 겉으로는 양증(陽證)이 있다가 4,5일에 이르러서야 장차 갈증이 일어나고 결증(厥證)된 지 반 날이 지나서 도리어 몸에 열이 난다. 대개 열기가 심하면 장차 결증이 일어나는데 만일 약간 결랭(厥冷)하고 도리어 열이 나는 것은 열이 심하기 때문이다. 그 맥이 비록 복(伏)하나 누르면 활(滑)한 것은 속에 열이 있기 때문이며, 또는 물을 마시며 혹 손발을 내젓고 또는 번조하여 자지 못하며 대변이 막히고 소변이 붉으며 밖의 증세로는 정신이 혼미한 편이 많으면 백호탕을 쓴다.

★ 결증(曰시험에 낸다)

- ① 소양인: 양결증 (몸에 열증 있는데, 손발만 차가움)
- ② 소음인: 수족결증 (열증 없이 손발만 차가움: 수족역냉이라고 나옴)
- ③ 태음인: 한결증 (열이 없고 단지 한증만)

흉격열병에서 지황백호탕 사용기준

▶ 論曰 少陽人 裡熱病 地黃白虎湯 爲聖藥 而 用之者 必觀於大便之通不通也 大便 一晝夜有餘而不通則 可用也, 二晝夜不通則 必用也 凡 少陽人 大便 一晝夜不通則 胃熱已結也 二晝夜不通則 熱重也, 三晝夜不通則 危險也 一晝夜八九辰刻 二晝夜 恰好用之 無至三晝夜之危險 若 譫語證便秘則 不可過一晝 (10-8)

나는 논하기를 소양인의 리열병(裡熱病)에 지황백호탕(地黃白虎湯)이 가장 좋은 약이나 이것을 쓰는 데에는 반드시 대변이 통하는지 통하지 않는지를 살펴야 한다. 대변이 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않으면 쓰는 것이 마땅하고 2일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 반드시 써야 한다. 무릇 소양인의 대변이 하루 밤낮을 통하지 않으면 위(胃)의 열이 이미 맺힌 것이고 2일 밤낮을 통하지 않으면 열이 중한 것이고 3일 밤낮을 통하지 않으면 위험한 것이니 40-42시간이나 2주야에 적당히 약을 쓸 것이고 3주야의 위험한 데까지 가게 하지 말아야 한다. 만일 헛소리하는 증에 변비(便秘)가 있으면 하루 밤낮을 지나지 말아

야 한다.

✓지황백호탕 사용기준

지황백호탕은 소양인 리열병의 성약.

대변 1주야불통하면 가용하고, 대변 2주야불통하면 필용한다.

사용시에는 반드시 대변의 통불통(위열을 살피는 1차 지표)을 살펴 사용하여야 한다.

1일불통이면 위열이 이미 났힌 것이고, 2일 불통이면 열이 중한 것이고, 3일 불통이면 위한 상태이다.

대변 상태에 따라 병의 경중을 설명하고 있다.

섬어증에 변비를 겸한 경우는 열이 극심한 상태이므로 하루를 지나면 안된다.

★ 소양인 성약 (㉔ 시험에 낸다)

표한증의 성약: 형방패독산

리열증의 성약: 지황백호탕

위수열, 비수한 비교

▶ 少陽人 胃受熱則 大便燥也

脾受寒則 泄瀉也

故 亡陰證 泄瀉二三日而 大便秘一晝夜則 清陰將亡而 危境也

胃熱證 大便三晝夜不通而 汗出則 清陽將渴而 危境 (10-9)

▶ 소양인이 위(胃)에 열을 받으면 대변이 굳어지고 소양인이 비(脾)에 한을 받으면 설사를 한다. 그러므로 망음증(亡陰證)에 설사를 2,3일 하다가 대변이 굳기를 하루 밤낮이 되면 청음(淸陰)이 장차 없어지게 되어서 위태로운 경지가 되고, 위열증(胃熱證)에 대변이 3일 밤낮을 통하지 않다가 땀이 나면 맑은 양(淸陽)이 장차 고갈(枯竭)되는 것으로 위태로운 경지가 된다.

✓ 소양인 표리병증 도식

병증	병리	변상태	증상변화	
표 表	비수한 脾受寒	변설 便泄	설 비 泄 秘	청음장망 淸陰將亡
리 裏	위수열 胃受熱	변조 便燥	불통 한 不通 汗	청양장갈 淸陽將渴

대변불통시 지황백호탕 조치

▶ 少陽人 大便不通病 用地黃白虎湯 3,4服

當日 大便不通者 將爲融會貫通 大吉之兆 (10-10)

▶ 소양인이 대변이 통하지 않는 병에 백호탕을 3,4회 복용해도 당일에 대변이 통하지 않는 것은 장차 녹아서 통하게 될 것으로 이것은 크게 좋은 징조이다. 의심할 필요 없이 이튿날 다시 2,3첩을 복용하면 통하지 않을 이유가 없다.

소양인 대변: 경험적 기준법

▶ 少陽人 表裏病結解 必觀於大便而

少陽人 大便 頭燥尾滑 體大而疏通者 平時無病者之大便也

其次 大便滑 一二次 快滑泄 廣多而止 有病者之病快解之大便也

其次 一二次 尋常滑便者 有病者病勢不加之大便也

其次 或過一晝夜有餘不通 或一晝夜間 三四五次 小小滑利者

將澁之候也 非好便也 宜預 (10-11)

▶ 소양인의 표리병(表裏病)이 났혔는가 풀렸는가 하는 것은 반드시 대변을 보아야 할 것이니

소양인의 대변이 처음은 조(燥)하다가 나중에는 활(滑)하며 덩이가 크고 잘 소통되는 것은 평상시에 병이 없는 경우의 대변이다.

그 다음은 크게 활변(滑便)을 보되 1,2차 시원하게 활설(滑泄)을 많이 하고 그치는 것은

병자의 병이 풀리려는 대변이다.

그 다음은 1,2차 보통 활변(滑便)을 보는 경우는 병자의 병이 병세가 더하지 않는 대변이다.

그 다음은 하루 밤낮을 넘어도 통하지 않거나 또는 하루 밤낮 사이에 3,4,5차 조금씩 조금씩 활리(滑利)하는 것은 장차 대변이 막힐 징후니 좋은 대변이 아니므로 예방하는 것이 마땅하다.

★ 소양인 대변 (㉔ 시험에 낸다)

정상	頭燥尾滑 體大而疏 : 처음에 단단하고 나중에 무름, 덩이가 크고 소통이 잘됨	平時無病者之大便
病解 : 병이 낫는 상태	大便滑 一二次 快滑泄 廣多而 : 크게 활변을 1-2번하고 딱 그침	病快解之大便
病勢不加 : 병이 낫지도 심해 지지도 않는 상태	一二次 尋常滑便 : 보통 활변을 1-2번 함	病勢不加之大便
악화	或過一晝夜有餘不通 或一晝夜間 三四五次 小小滑利 : 하루 넘어도 불통 또는 하루 사이 3-5번 조금씩 활리	將澁之候也 非好便也 宜預防

표리병에 따른 위열의 경증

▶ 少陰人 裡寒病 臍腹冷證, 受病之初 已有腹鳴泄瀉之機驗而其機甚顯則 病執證易見而 用藥可早也.

少陽人 裡熱病 胸膈熱證 受病之初 雖有胸煩悶燥之機驗而其機不甚顯則 病執證難見而 用藥太晚也.

若使 少陽人 胸煩悶燥之驗 顯然露出 使人可覺則 其病已險而 難爲措 (10-12)

▶ 소음인의 속이 찬 병에 배꼽 주위가 냉한 증세는 병의 초기에 벌써 배에서 소리가 나고 설사를 할 기미와 증험이 있어 집증(執證)이 쉬우므로 약을 빨리 쓸 수 있으나, 소양인의 속이 더운 병에 홍격열(胃隔熱)증은 병이 난 초기에 비록 가슴이 답답하고 어찌할 바를 모르는 기미와 증험이 있으나 그것이 심하게 나타나지 않으니 집증(執證)하기 어려워져서 약을 쓰는 일이 너무 늦어진다. 만일 소양인이 가슴이 답답해서 가만히 있지 못하는 징후가 뚜렷하게 나타나서 다른 사람이 그것을 깨달을 수 있게 되면 그 병은 이미 험증(險證)이 되니 손쓰기 어려울 것이다.

소양인 홍격열증과 소음인 리한병 진단과 치료 비교

少陽人 裡熱病	胸膈熱證	受病之初	雖有胸煩悶燥之機驗而 其機不甚顯	病執證難見而 用藥太晚
少陰人 裡寒病	臍腹冷證	受病之初	已有腹鳴泄瀉之機驗而 其機甚顯則	病執證易見而 用藥可早

소양인 표리병의 구분기준과 전변과정 ★

▶ 凡 少陽人 表病 有頭痛則 自是表病明白 易見之初證也, 若復引飲 小便赤則 可畏也

泄瀉 揚手擲足則 大畏也.

少陽人 裡病 大便 過一晝夜有餘而不通則 自是裡病明白 易見之初證也, 若復大便 過三晝夜有餘而不通則 危險矣 (10-12)

▶ 대개 소양인의 표병(表病)에 머리 아픈 것이 있으면 이것이 표병(表病)임이 확실하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 물을 많이 마시고 오줌이 붉으면 가히 염려스럽고, 설사하고 손과 발을 내저으면 대단히 염려스러운 것이다. 소양인의 이 병(裏病)에 대변이 하루 밤낮이 지나도록 통하지 않으면 이것으로 이병(裏病)임이 명백하니 쉽게 처음 나타나는 증임을 알 수 있고, 만일 그 위에 대변이 3일 밤낮이 지나도 통하지 않으면 위험한 것이다.

표병: 표음강기가 안되어 열이 심해지는 것 - 두통이 생김

위열이 점점 심해지면 인음, 소변적

더 심해지면 설사, 양수천촉 => 양수천촉: 위열이 가장 심할 때 => 지황백호탕

리열: 양수천촉이 나타날수있음(심각증상 아님) => 대변불통의 기간으로 위열의 정도를 파악해야 함

하루이상 대변불통 => 리병의 성약: 지황백호탕

열을 꺼줘야할때 지황백호탕 사용 / 인음, 소변적삽: 석고를 넣어서 사용도 가능 (예방)

소양인 표리병에 따른 위열의 경증 비교

- 소양인 표리병에 따라 위열을 가늠할 수 있는 지표들 각기 다르게 제시하고 있다.

소양인 표병: 두통 (표한병의 대표적 초기증상)	- 비수한표한병에서 표음하강이 안되면서 위열이 점점 심해져 병이 심해짐 - 인음, 소변적삽 : 신열두통망음(9-26, 27) - 두려워해야 할 증상 - 위열이 더 심해지면 (설사), 양수척족 - 매우 크게 두려워 해야 하는 증상
소양인 리병	- 대변 1주야간 불통: 대변불통이 리열병의 대표적인 증상 - 대변이 하루간 불통하는 것은 리병의 초증 - 대변불통이 3일 이상 지속되면 위험증 - 비수한표한병에서 위열의 강도로 제시한 인음, 소변적삽은 위수열리 열병에서는 위열의 경중에 관계없이 공통증상 이므로, 리병에서는 위열의 자료로 제시하지 않았다.

★ 양수척족揚手擲足, 대변불통 3일 이상이 위험증인 것 꼭 알아두기(시험)

소양인 여러 병증별 위험의 정도

▶ 背癰 腦疽 腎瘻 纏喉風 咽喉 等病 受病之日 已爲危險證也

陽毒發斑 流注丹毒 黃疸 等病 受病之日 已爲險證也

面 目 口 鼻 牙齒之病 成病之日 皆爲重證 (10-12)

▶ 배옹(背癰)·뇌저(腦疽)·순종(腎瘻)·전후풍(纏喉風)·인후(咽喉) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 위험증(危險證)이 된 것이며, 양독발반(陽毒發斑)·유주단독(流注丹毒)·황달(黃疸) 등의 병은 병이 든 때부터 이미 협증(險證)이 된 것이며, 얼굴·눈·입·코·치아의 병은 병이 형성된 날부터 모두 중증(重證)이 된 것이다.

배옹(背癰)·뇌저(腦疽)·순종(腎瘻)·전후풍(纏喉風)·인후(咽喉): 병이 시작되면서부터, 위험증

양독발반, 유주단독, 황달: 병이 시작되면서부터, 협증 => 피부전체증상

얼굴쪽에 병이 생긴 것: 병이 좀 심해진 경우에, 중증 => 얼굴부위에 열이 치우쳐있는 것으로 그나마 열적음

소양인 표병 두통, 리병 대변불통 치방

▶ 凡 少陽人 表病 有頭痛則 必用荊防敗毒散

裡病 有大便過一晝夜不通證則 用白虎湯 (10-12)

▶ 무릇 소양인의 표병에 머리 아픈 증이 있으면 반드시 형방패독산(荊防敗毒散)을 쓰고 이 병에 대변이 하루 밤낮이 지나도 통하지 않는 증이 있으면 백호탕을 쓴다.

- 표병 대표증상은 두통 => 이땐 형방패독산이 최고

각각 대표적 처방임을 알아두기

소갈의 정의와 증상, 경증

▶ 王好古曰 渴病有三 曰消渴 曰消中 曰消腎

熱氣上騰 胸中煩躁 舌赤脣紅 此渴 引飲常多 小便數而少

病屬上焦 謂之消渴

熱蓄於中 消穀善飢 飲食倍常 不生肌肉 此渴 亦不甚渴 小便數而晝

病屬中焦 謂之消中

熱伏於下 腿膝枯細 骨節痠痛 飲水不多 隨即尿下 小便多而濁 病屬下焦 謂之消腎 又有 五石過度之人 真氣既盡 石勢獨留 陽道興強 不交精泄 謂之強中 消渴 輕也 / 消中 甚焉 / 消腎 尤甚焉 若強中則 其斃可立而待也 (10-13)	▶ 왕호고(王好古)가 말하기를 갈병(渴病)에 세 가지가 있는데 소갈(消渴)·소중(消中) 그 리고 소신(消腎)이다. 열기(熱氣)가 위로 올라가면 가슴 속이 번조(煩躁)하고 혀가 빨강고 입술이 붉으니 이때의 갈(渴)은 항상 물을 많이 마시며 소변은 자주 보나 양은 적으니 병 이 상초(上焦)에 속하는데 소갈(消渴)이라 이른다. 열기가 중초(中焦)에 쌓여 먹는 데로 삭여서 시장기를 느끼며 음식을 평상시의 배로 먹으나 살이 붙지 않는다. 이때의 갈(渴)은 역시 심한 번조(煩躁)는 아니나 소변이 잦고 그 맛이 달아 병이 중초(中焦)에 속하는 데 소중(消中)이라 이른다. 열기가 하초(下焦)에 잠복되어 허벅지와 무릎이 말라서 가늘어 지고 뼈마디가 쭈시고 물을 많이 마시지는 않으나 마시면 오줌으로 나오고 소변량이 많 고 탁(濁)하니 병이 하초(下焦)에 속하는데 소신(消腎)이라 한다. 또 5가지 광물성 약재를 과도하게 먹은 사람으로 진기(真氣)는 이미 다 없어지고 광물성 약의 기운만이 남아 있어 서 음경(陰莖)이 역세게 일어나며, 성교(性交)하지 않아도 사정하는 것을 강중(強中)이라 한다. 소갈(消渴)은 경(輕)한 증세이고 소중(消中)은 심(甚)한 증세이고 소신(消腎)은 더욱 심한 증상이다. 만일 강중(強中)이 되면 그 죽음이 가히 서서 기다리는 것과 같다.
--	--

- 하소 중소 상소에 대한 증상을 말하기 위해 가져온 조문

소갈증

消渴	熱氣上騰	胸中煩躁, 舌赤脣紅 此渴 引飲常多, 小便數而少	病屬上焦
消中	熱蓄於中	消穀善飢, 飲食倍常, 不生肌肉 此渴 亦不甚渴, 小便數而晷	病屬中焦
消腎	熱伏於下	腿膝枯細, 骨節痠痛, 飲水不多 隨即尿下, 小便多而濁	病屬下焦

소갈 증상 처방 14-15 증상보기

▶ 朱震亨曰 上消者 舌上赤裂 大渴引飲 白虎湯主之 中消者 善食而瘦 自汗 大便硬 小便數 黃連豬肚丸主之 下消者 煩躁引飲 小便如膏 腿膝枯細 六味地黃湯主之 (10-14) ▶ 醫學綱目曰 渴而多飲 爲上消 消穀善飢 爲中消 渴而尿數 有膏油 爲下消 (10-15) ▶ 危亦林曰 因耽嗜色慾 或服丹石 真氣既脫 熱邪獨盛 飲食如湯消雪 肌膚日削 小便如膏油 陽強興盛 不交精泄 三消之中 最爲難 (10-16)	▶ 주진형(朱震亨)이 말하기를 상소(上消)라는 것은 혀가 빨강고 갈라지며 갈증이 심하며 물을 찾으니 백호탕(白虎湯)을 주로 써야 하고, 중소(中消)라는 것은 음식을 잘 먹어도 마르며 땀이 저절로 나며 대변이 굳으며 소변은 자주 보니 황연저두환(黃連豬肚丸)을 주 로 써야 하고, 하소(下消)라는 것은 번조하여 물이 당기고 소변은 마치 기름 같으며 허벅 지와 무릎이 말라서 가늘어지니 육미지황탕(六味地黃湯)을 주로 써야 한다. ▶ 《의학강목(醫學綱目)》에 말하기를 갈증이 나서 물을 많이 마시는 것은 상소(上消)라 하고, 음식이 잘 삭아서 시장기를 느끼는 것은 중소(中消)라 하며, 갈증이 나며 소변을 자 주 보고 기름 같은 것은 하소(下消)라 한다. ▶ 위역림(危亦林)이 말하기를 색욕(色慾)을 탐내거나 단석(丹石)을 복용하면 진기(真氣)가 이미 빠진데다가 열사(熱邪)가 홀로 왕성하여 마치 끓는 물에 눈을 녹이듯이 먹고 마시나 살은 날로 말라 들어가고 소변은 마치 기름과 같고 음경(陰莖)이 강하게 일어나서 성교하 지 않아도 정액(精液)을 설(泄)하는 것은 삼소(三消) 가운데서 가장 치료하기 어려운 것이 다.
--	--

소갈의 원인, 병리

▶ 論曰 消渴者 病人胸次 不能寬遠闊達而 陋固膠小 所見者淺 所欲者速
--

計策鷙突 意思艱乏則

大腸清陽 上升之氣 自不快足 日月耗困而 生此病也

胃局清陽 上升而 不快足於頭面四肢則 成上消病

大腸局清陽 上升而 不快足於胃局則 成中消病 (10-17-1)

▶ 나는 논하기를 소갈(消渴)이라는 것은 **환자의 마음이 너그럽고 원대하고 활달하지 못하고** 견문이 좁고 완고하며 작은 일에 집착하여 보는 바가 얇고 하고자 하는 바는 조급하며 계책은 골돌한데 생각은 모자라니 대장의 맑은 양이 위로 올라가는 기운이 자연히 만족하지 못하여 날이 갈수록 소모되고 노곤해서 이 병이 발생하는 것이다. 위국(胃局)의 맑은 양기(陽氣)가 상승하여 머리와 얼굴 그리고 사지(四肢)에까지 충족되지 못하면 상소(上消)가 되고, 대장국(大腸局)의 맑은 양기가 위로 올라가 위국(胃局)에까지 충족되지 못하면 중소(中消)가 된다.

- 마음의 스트레스로 인해 소갈이 생김대해 말하고 있음 ⇒ 좁은 생각! 남을 넓은 시각으로

안보고 좁은 시각으로

⇒ 요즘으로 보면 스트레스! 스트레스 받으면 몸에서 어떻게 작용하냐가 아래에 나옴!

- 대장청양 순환하는 기력이 점점 줄어서 병이 생긴다 (청=보명지주=음청지기/양=상승력)

- 보명지주는 대장 > 위 > 목으로 간다

⇒ 위에서 두면사지(목)로 못감 ⇒ 상소!

⇒ 대장에서 위로 제대로 못감: 위국도 컨트롤하지 못함 ⇒ 중소

⇒ 하소는 대장에 생기는 병

소갈의 경증과 처방

▶ 上消 自爲重證而 中消 倍重於上消 / 中消 自爲險證而 下消 倍險於中消 (10-17-2)

▶ 上消 宜用 涼膈散火湯 / 中消 宜用 忍冬藤地骨皮湯 / 下消 宜用 熟地黃苦參湯 (10-17-3)

▶ 상소(上消)는 자체가 중증이 되는데, 중소(中消)는 상소(上消)보다 배는 중하고 중소(中消)는 자체가 험증이 되는데, 하소(下消)는 중소(中消)보다 배는 험(險)한 병이다.

상소(上消)는 양격산화탕(涼膈散火湯)을 쓰는 것이 마땅하고, 중소(中消)는 인동등지골피

탕(忍冬藤地骨皮湯)을 쓰는 것이 마땅하며, 하소(下消)는 숙지황고삼탕(熟地黃苦參湯)을 쓰는 것이 마땅하다.

이 3처방은 소양인 당뇨에 잘 쓴다! 양격산화탕: 인슐린 분비에는 크게 작용 안함 but 인동등, 숙지황은 인슐린 분비를 증가시킨다는 유의한 실험이 있다!

소양인 당뇨 심해지면 신부전이 온다-처방에 칼륨이 많아서 병원에서 못먹게하는데, 교수님이 써 보니까 ㄹㅇ괜찮아지더라

상소) 양격산화탕: 위열치성 꺼줌

중소) 인동등지골피탕: 금은화 지모 황련 황백: 열을 꺼줌 - 염증에 효과적, 합병증 일어나지 않도록

하소) 숙지황고삼탕: 보명지주를 도와주기 위해, **숙지황 ⇒ 대장을 도와주는 역할을 많이**

-> 위 처방들은 시험에 낸다!

소갈치료의 心

▶ 又宜 寬闊其心

不宜 膠小其心

寬闊則 所欲必緩 清陽上達

膠小則 所欲必速 清陽下耗 (10-17-4)

▶ 또 마음을 너그럽고 넓게 가져야 할 것이고 작은 일에 집착하는 마음을 가져서는 안 될 것이니 마음을 너그럽고 넓게 가진다는 것은 하고자 하는 일을 반드시 완만하게 하는 것이니 맑은 양기가 위로 도달하고, 작은 일에 집착한다는 것은 하고자 하는 일을 반드시 조급하게 하는 것이니 맑은 양의 기운이 아래에서 소모될 것이다.

소갈에 마음적인 것이 중요하다

: 소갈에서 마음적인 것에 대해 강조 (마음만 원인이라는건 아님, 마음도! 원인이 된다)

⇒ 넓은 마음 가지면 청양 상승, 좁은 마음가지면 청양 밑으로 가라앉고 손싱

□소갈의 원인, 처방, 치료 ★ 알아두시길 바랍니다

消渴者 病人胸次 不能寬闊達而 陋固膠小 所見者淺 所欲者速 計策鶻突 意思艱乏則 大腸清陽 上升之氣 自不快足 日月耗困				
胃局清陽 上升而 不快足於頭面四肢	상소병	自爲重證		양격산화탕
大腸局清陽 上升而 不快足於胃局	중소병	自爲險證	倍重於上消	인동등지골피탕
	하소병		倍險於中消	속지황고삼탕
<마음을 넓게 가져야함> 又宜 寬闊其心 不宜 膠小其心		寬闊則 所欲必緩 清陽上達 膠小則 所欲必速 清陽下耗		

소갈에서의性情

▶ 平心靜思則 陽氣上升 輕清而 充足於頭面四肢也 此 元氣也 清陽也 勞心焦思則 陽氣下陷 重濁而 鬱熱於頭面四肢也 此 火氣也 (10-18)
▶ 마음을 편안하게 하고 생각을 고요하게 하면 양기가 위로 올라가 가볍고 맑아져서 머리와 얼굴 그리고 사지에 충족할 것이니 이것은 원기(元氣)이고 맑은 양의 기운이다. 속을 썩히고 애를 태우면 양기가 아래로 빠져 내려가 무겁고 탁해져서 머리와 얼굴 그리고 사지에 뭉쳐서 열이 될 것이니 이것은 화기(火氣)이고 소모된 양기이다.

마음을 편안히 하면 ⇒ 자신의 청양이 사기가 되지 않고 잘 올라감 [음청지기가 상승]

노심초사해서 스트레스 받으면 ⇒ 화기가 되어 청양 손상됨 [음청지기가 상승 못함]

소갈의變證

▶ 危亦林 曰 消渴 須防發癰疽 忍冬藤 不拘多少 根莖花葉 可服 (10-19)
▶ 李杲 曰 消渴之疾 能食者 未傳 必發腦疽背瘡 不能食者 必傳 (10-20)
▶ 東醫醫方類聚曰 消渴之病 變成發癰疽 或成水病 或雙目失 (10-21)

▶ 論曰 癰疽 眼病 皆是中消之變證也 中消 自爲險證則 上消 當早治也 / 中消 必急治也 / 下消則 瀕死 (10-22)
▶ 위역림(危亦林)이 말하기를 소갈(消渴)에는 모름지기 응저(癰疽)가 발생하는 것을 막아야 하니 인동등(忍冬藤)의 많고 적음에 관계없이 뿌리·줄기·꽃·잎을 모두 먹을 것이다.
▶ 이고(李杲)가 말하기를 소갈(消渴)의 질병에 음식을 잘 먹는 경우는 끝에 가서 반드시 뇌저(腦疽)나 등창(背瘡)이 생길 것이고, 음식을 잘 먹지 못하는 경우는 반드시 속이 팽만하거나 고창(鼓脹)이 될 것이다.
▶ 《동의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 소갈(消渴)의 병은 변해서 응저(癰疽)가 되기도 하고, 또는 수병(水病)이 되기도 하고 또는 두 눈이 멀기도 한다.
▶ 나는 논하기를 응저(癰疽)와 눈병 [당뇨의 합병증]은 모두 중소(中消)의 변증(辯證)이다.
중소(中消)는 자체가 험한 증세이기 때문에 상소(上消)는 마땅히 일찍 치료해야 하고, 중소(中消)는 반드시 급히 치료해야 하고, 하소(下消)는 죽음에 임박한 것이다.

癰疽 眼病: 중소에서 생길수 있는 ‘당뇨 합병증’

국시에 나왔음

소양인 당뇨 ~ 응저, 눈병 생김, 이때 어떤 처방? 중소로 생각하고 <인동등지골피탕>

소양인盜汗證과汗

▶ 王好古曰 一童子 自嬰至童 盜汗七年 諸藥不效 服涼膈散 三日 病已 (10-23)
▶ 論曰 少陽人 大腸清陽 快足於胃 充溢 於頭面四肢則 汗必不出也 少陽人 汗者 自是陽弱也而 服涼膈散 病已 卽 上消而 其病輕也 (10-24)
▶ 왕호고(王好古)가 말하기를 어떤 아이가 갓난아이부터 동자가 되기까지 잠자면서 땀을 흘리기가 7년이나 계속되었으나 모든 약이 효력이 없더니 양격산(涼膈散)을 3일간 복용하고 병이 멈췄다.
▶ 나는 논하기를 소양인의 대장의 맑은 양기가 위에 충족하여 머리와 얼굴 그리고 사지에 차서 넘치면 땀이 반드시 나지 않는다. 소양인이 땀을 흘리는 것은 본래 양기가 약한 것인데 양격산(涼膈散)을 복용하고 병이 그쳤다는 것은 이 병은 곧 상소(上消)로 병이 경

한 것이다.

청양이 잘 올라가면 도한이 생기지 않는다

도한이 왜 생김? 양! 양=올라가는 힘, 방향성 (음양의 양이 아님)

도한은 상소의 병증이다! 양격산화탕!

음허오열병

▶ 東醫醫方類聚 曰 夫渴者 數飲水 其人 必頭面眩 背寒而嘔 因虛故也 (10-25)

▶ 龔信 曰 凡 陰虛證 每日午後 惡寒發熱 至晚 亦得微汗而解 誤作瘧治 多致不救 (10-26)

▶ 《동의방유취(東醫醫方類聚)》에 말하기를 무릇 갈(渴)이란 것은 자주 물을 마시는 것이니 그 사람이 반드시 머리와 얼굴이 어지럽고 등이 차고 구역이 날 것이니 허하기 때문이다.

▶ 공신(龔信)이 말하기를 대개 음이 허한 증은 매일 오후에는 추위를 싫어하고 열이 나다가 해가 저물 때에는 도리어 약간 땀이 나고 풀리는 것이니 학질(瘧疾)로 잘못 알고 치료하다가는 흔히 구하지 못하는 지경에 이른다.

리증도 생기면서 표증(배한, 구)도 생긴 것!! 음허오열증은 표증, 리증 같이 있음 <표리구병>

소갈의 금기

▶ 孫思邈 千金方書 曰 消渴 宜慎者 有三

一飲酒 二房勞 三鹹食及麵 能慎此三者 雖不服藥 亦可自 (10-27)

▶ 손사막(孫思邈)의 《천금방(千金方)》에서 말하기를 소갈(消渴)에는 마땅히 삼갈 것이 셋이 있는데 첫째는 술을 마시는 것이고, 둘째는 성생활이고, 셋째는 짠 것을 먹고 국수를 먹는 것이니 능히 이 세 가지를 삼가면 비록 약을 먹지 않아도 역시 저절로 나을 수 있다.

하소증이 음허오열에 속하기 때문에 갑자기 소갈이 다시 나옴

음허오열병 혐위증의 주의점과 처방

▶ 論曰 上消中消 裡陽升氣 雖則虛損 表陰降氣 猶持完壯

故 其病雖險 猶能歲月支撐 以此也.

若夫 陰虛午熱 飲水背寒而嘔者 表裏陰陽 俱虛損 所以爲病尤險 與下消 略相輕重

然 能善攝身心 服藥 十之六七 尙可生也,

不善攝身心服藥則 百之百 必死也. 此證 當用 獨活地黃湯 十二味地黃湯. (10-28)

▶ 易之需九三爻辭曰 需于泥 致寇至 象曰 需于泥 災在外也 自我致寇 敬慎 不敗也

以此意而 倣 之曰 陰虛午熱 背寒而嘔 其病雖險然 死尙在外也

能齋戒其心 恭敬其身 又服好藥 不死也 (10-29)

▶ 나는 논하기를 상소와 중소는 속의 양기의 올라가는 기운이 비록 허손(虛損)하나 겉의 음기의 내려가는 기운은 오히려 완장(完壯)하기 때문에 그 병이 비록 험하여도 오히려 능히 오랜 세월을 지탱해 나갈 수 있는 것이다. 만일 음허오열(음이 허하여 낮에 열이 나고 물을 많이 마시고 등이 차고 구역하는 것)은 겉과 속의 음양이 모두 허손된 것으로 병이 되는 까닭에 더욱 험하게 되고 하소와 더불어 경중이 서로 비슷하다는 것이다. 그러나 능히 몸과 마음을 잘 조섭하고 약을 먹는다면 10에 6,7은 오히려 살아날 수 있을 것이나 몸과 마음을 잘 조섭하지 않고 약을 먹는다면 백이면 백이 반드시 죽을 것이다. 이러한 증에는 당연히 독활지황탕(獨活地黃湯)이나 십이미지황탕(十二味地黃湯)을 써야 한다.

▶ 《주역(周易)》의 수괘(需卦)의 9,3효사(爻辭)에 말하기를 진흙 속에서 기다리는 것이니 도둑을 이르게 하는 것이라고 하였고, 상(象)에서 말하기를 진흙 속에서 기다린다는 것은 재앙이 밖에 있기 때문이다. 내가 스스로 도적을 부르는 것이니 공경하고 삼가면 패하지 않을 것이라고 하였다. 이 뜻을 모방하여 말한다면 음이 허하여 낮에 열이 나고 등이 차고 구역하는 것은 그 병이 비록 험하나 죽음은 아직 밖에 있으니 능히 그 마음을 재계하고 그 몸을 공경하고 또 좋은 약을 먹으면 죽지 않을 것이다.

- 상소, 중소는 그래도 표에서는 보명지주가 하강하고 있음! (리에서는 상승 못함)

- 음허오열은 복리에서 상승도, 표음도 하강하지 못하는 상태임. 둘다 허손. 처음부터 심각하다

⇒ 하소증과 비슷하다! ⇒ 마음과 몸을 다스리면서, 약을 먹어야함!

-비록 병이 험하지만, 몸과 마음을 잘 다스리고 좋은 약을 먹으면 죽지않을 것이다

하소증과 음허오열증 비교 차이점, 공통점 잘 알아두기 *기출

	下消證 하소증	陰虛午熱證 음허오열증
특징	병이 오래 진행되어 나타나는 緩病 위열과 음청지기가 모두 약해진 虛勞 상태	병이 급박한 急病 음청지기가 약한 상태에서 위열이 강하게 나타나는 상태
증상	몸의 상태가 변함(瘦瘠, 腿膝枯細) -가장 큰차이:점점 말라져감(음허오열은x) 口乾 口渴 小便多而濁 有膏油 (기름기 있는 소변) 微惡熱, 微惡寒	口微乾 또는 平 小便濁 惡熱 + 惡寒 (오열 오한이 심하게) 食滯痞滿, 嘔吐
표리	裏病으로 腹裏 부위의 증상 위주로 나타남	表裏俱病으로 背表 부위와 腹裏 부위에서 증상이 나타남
공통점	동시에 寒熱의 증상 險危證으로 경중이 비슷함 식욕 양호 보통의 대변 또는 비조한 대변 발생 불면, 건망 (마음적 불안증상) 등이 동	

독활지황탕, 십이미지황탕


독활지황탕	- 治食滯痞滿者 宜用 (신정) - 又見 少陽人 少年兒 恒有 滯證痞滿 間有腹痛腰痛 又有口眼喎斜 初證(신한복통망음 조문에 나왔음-요론 증상에 독활지황탕 사용한다고)者 用獨活地黃湯 一百日內 200貼服 使之平心靜慮 恒戒哀心怒心 一百日而 身健病愈 (9-30) - 陰虛 午熱飲水背寒而嘔者 (10-28) - 中風嘔吐(가장심한증상) 宜用獨活地黃湯 (11-6)
-------	---

	- 少陽人 瘧疾 有間兩日發者 卽勞瘧(노학: 하루 나타나고, 하루 안나타나고)也 可以緩治 不可急治 - 此證 瘧不發日 用獨活地黃湯(학질증상이 나타나지 않을 때 독활지황탕) 2貼 朝暮服 - 瘧發日 預煎荊防敗毒(학질증상 나타나면 형방패독산)散 2貼 待惡寒發作時 2貼連服 - 一月之內 以獨活地黃湯 40貼 荊防敗毒散 20貼 爲準的則 其瘧 必無不退之理 (11-13)
십이미지황탕	- 별무내용 (신정) - 陰虛午熱 飲水背寒而嘔者 (10-28) - 吐血 宜用 十二味地黃湯 (11-6)

하소에 속지황고삼) 역증이므로 보명지주 도와주는 속지황!

바탕: 속지황 산수유 복령 택사 ⇒ 보명지주 도와주면서 청양 올려주는 원칙

표한병과 리열병의 감별진단 (참고)



소양인 리열병 음허오열증 vs 표한병 망음병

裏熱病 陰虛午熱病	表寒病 亡陰病
대변이 보통이거나 쉽게 굳어진다.	대변이 무르거나 설사를 자주한다.
식욕이 보통이거나 좋은 경우를 유지하는 경우가 많다.	식욕이 떨어지는 경우가 많다.(신한망음)
입이 마르고 갈증을 느끼는 경우가 많고, 물을 자주 마신다.	구건, 구갈 등이 적고, 상대적으로 물을 적게 마신다.(신한망음)
얼굴색이 검붉은 편이다.	얼굴색이 청백한 편이다. 붉어지더라도 본 바탕은 하얗거나 창백하다.
덥고 답답한 것에 예민한 경우가 더 많다. (비정상적인 한출 후 심한 오한을 느끼는 경우가 있다)	추위에 좀 더 예민하다.
하체 위주로 살이 빠지거나 전체적인 체중감소가 나타나는 경우가 많다.	살이 빠지거나 체중감소가 있으면서 부종이 동반되는 경우가 종종 있다.
도한이 동반되는 경우가 많다.	도한이 동반되는 경우가 적다.

->시험에 나올 가능성이 많겠죠?

위수열리열병						
신열 흉변민조 대변조						
순증 흉격열병	같이다음 다한출	흉격열병 경증	(급병) 소변적	흉격열병 초증	대변불통(대변비조) 1일 이하 미오한	형방사백산
				흉격열병 우증	대변불통(대변비조) 1일 이상 섬어 두면부 안이비구설 염증 피부의 심한 열증	저령차전자탕 (소변불리) 지황백호탕
		흉격열병 중증	(완병) 소변삭이소	위국청양불상승증 (상소증)	설적순홍 설상적열 면적 (두면사지의 열증)	양격산화탕
				대장청양불상승증 (중소증)	소곡선기 선식이수 용저 안병 고창 (위국의 열증)	인동등지골피탕
역증 음허오열병	성정편급증 건망 구건 불다음수 오열 배한 구	음허오열병 험증	오열위주	대장청양모손증 (하소증)	오열위주 소변다이탁 퇴슬고세 골절산동	속지황고삼탕
		음허오열병 위증	배한위주	음허오열증	배한위주 식체비만 복통 구토	독활지황탕
				음허오열우증	배한위주 토혈	십이미지황탕

->시험에 낸다

시험은 30문제 낼 생각. 1/3정도 냄. 객관식이 몇 개될것같고 나머지는 단답형 서술형은 두세개정도

사상체질의학 7주차

수업 ppt 내용 검은글씨 / 교수님 설명 회색글씨

01 소양인 위수열리열병

치험례 논문

지주막하출혈 수술 이후 발생한 이명을 소양인 흉격열증으로 진단한 치험 1례

임태형 · 박혜선
동신대학교 한의과대학 사상체질의학

3) 주소증

1) Tinnitus(Lt-Rt)

2) Headache(Frontal)

3) Sleep discomfort

7. 四診

1) 望診: 面黃赤, 靨骨과 이목구비가 뚜렷함. 관골 주위에 홍조를 동반함

2) 腹診: 右下腹部 壓痛, 胸脇苦滿

3) 舌診: 舌紅小苔

4) 脈診: 脈數

9. 食慾 및 消化

하루 3기 식사를 잘 소화했으며 소화불량 등이 거의 없는 편임. 음수량이 많으며 관골을 선호함

10. 大便

시원하게 보지 못할. 변이 갈라지는 형태이며 양은 많지 않음. 1일 1회로 주로 오후에 보는 편임.

11. 小便

시원하게 보는 편이며 1일 약 3-5회

12. 汗液

밤은 이마 및 흉부에 집중하여 나는 편

13. 寒熱

추위를 거의 느끼지 않으며 항상 덥다고 말하는 편. 더위가 심하면 흉부의 답답함을 동반함

2) 용모사기(Figure 2)

관골이 발달하였고 옆으로 젖어있으면서 위로 올라가는 눈썹과 눈매를 가지고 있음. 체격에 비해서 턱이 뾰족한 형태라 얼굴이 밑으로 날카로운 형태를 보임. 목소리는 목지한 듯하면서도 가랑가랑한 듯이 섞여 있어 열증한 느낌이 든다고 보기는 힘들다.

3) 성질(性格)

성격이 단순하면서 직관적인. 증상의 경과를 살필 때 가장 불편한 증상 한 가지만 주장하면서 부수적인 증상의 동반 여부는 타인이 충분한 시간을 갖고 물어보면 대답하는 편. 어떤 뚜렷한 주관을 가지고 강하게 이야기하지는 않고 어떤 가지를 말하면 들어주고 여러 가지를 제시하면 상대방의 주장에 순응하는 편.

3) 음수

물은 물론 여러 음료수도 따뜻한 것은 거의 마시지 않음

4) 땀

밤의 양은 두면부 및 흉부쪽에 집중하여 적당한 양

5) 소변 및 대변

소변은 야간에는 거의 가지 않지만 주간에 활동 중에는 자주 가는 편으로 소변량도 적지 않고 상쾌하게 볼. 대변은 배일 거르지 않고 보지만 딱딱한 소시지 형태로 시원하지 않고 양도 많지 않음. 특별히 시원하지 않은 날은 흉부 및 심하부에서 답답함을 느낄 때도 있음

6) 한열

더운 것을 매우 싫어하며 찬바람을 쐬면 눈이 뻑뻑하고 중첩될 때가 많으며 코에 건조감이 심해짐

19. 소증

1) 수면

이명이 있기 전에도 수면유지 등 수면에 불편감을 호소하였고, 야간에 열감을 느끼면 흉부의 답답함을 느끼면서 잠을 이루기 힘들었음

2) 식사

식사에 불편감을 느낀 적이 거의 없으며 소화불량도 거의 느낀 적이 없음

J Sasang Constit Med 2016;28(2):176-183
http://dx.doi.org/10.7730/JSCM.2016.28.2.176

3) 음수

물은 물론 여러 음료수도 따뜻한 것은 거의 마시지 않음

4) 땀

밤의 양은 두면부 및 흉부쪽에 집중하여 적당한 양

5) 소변 및 대변

소변은 야간에는 거의 가지 않지만 주간에 활동 중에는 자주 가는 편으로 소변량도 적지 않고 상쾌하게 볼. 대변은 배일 거르지 않고 보지만 딱딱한 소시지 형태로 시원하지 않고 양도 많지 않음. 특별히 시원하지 않은 날은 흉부 및 심하부에서 답답함을 느낄 때도 있음

6) 한열

더운 것을 매우 싫어하며 찬바람을 쐬면 눈이 뻑뻑하고 중첩될 때가 많으며 코에 건조감이 심해짐

19. 소증

1) 수면

이명이 있기 전에도 수면유지 등 수면에 불편감을 호소하였고, 야간에 열감을 느끼면 흉부의 답답함을 느끼면서 잠을 이루기 힘들었음

2) 식사

식사에 불편감을 느낀 적이 거의 없으며 소화불량도 거의 느낀 적이 없음

형방사백산 처방



- 찬물을 선호함 → 간열증을 가진 태음인, 흉격열증을 가진 소양인 → 소음인은 배제
- 위로 올라가는 눈썹과 눈매 → 소양인
- 직관적인 성격 → 소양인
- 흉부의 답답함을 느끼면서 잠을 이루기 힘들 + 흉부 및 심하부 답답 → 흉격열증
- 흉격열증 초증, 우증 판단 기준 : 대변불통 1일 이하 초증 / 1일 이상 우증
- 초증으로 판단하고 형방사백산

전신열감을 호소하는 소양인 여환 치험 3례

김진영 · 이지원 · 양성필 · 이준희 · 이의주 · 고병희

3) 주소증

- (1) Patalgia : 몸 전체가 쭈시고 따끔하며 침으로 목욕 해주는 듯한 통증 NSAID 새벽 기상시부터 취침전까지 통증 정도 일정함. 때가 항상 시리면서 차갑고 구강과 머리는 열감 실험.
- (2) Insomnia : 수면에 복용하지 않으면 잠을 잘 수 없음. 약 복용시 오후 9시 반부터 새벽 4시까지 취침, 꿈을 많이 꾸며 가위에 잘 놀려 12회/1주 발생함.

10) 사상체질진단

- (1) 體形氣像
- 키 140cm, 몸무게 50kg의 작은 체격으로 복부가 발달하였으나 골반부의 형태가 안쪽으로 위축되어 있는 것을 확인할 수 있다. 연세에 비해 자세가 바르고 가슴부위가 뾰족한 양상이다. 팔목, 발목이 가늘며 피부는 주리가 없고 부드럽다. 종아리 부위 근육이 약간 발달됨. 체간측정(cm) : 38-27-35-34-32
- (2) 容顏氣色
- 얼굴은 작은 편이며 눈매가 날카롭고 안개가 있다. 피부가 까무잡잡한 편이며 팔티도 확인된다. 머리카락이 적다. 음성이 맑고 말투가 단정적이다.

J Sasang Constit Med 2016;28(4):381-395
http://dx.doi.org/10.7730/JSCM.2016.28.4.381

3) 性質材質

신경이 예민하여 걱정하는 일로 잠을 잘 이루지 못한다. 처방되는 약과 역침의 모든 기전과 영향을 이해하고자 함. 열이 나는 증상에 몰두하여 온 신경이 예민해짐을 호소한다.

(4) 寒熱


- ① 睡眠: 하루 4-6시간 미만, 많이 많다. 자주 잠들기가 어려우며 자주 깨기도 한다.
- ② 食慾・消化: 식욕은 없는 편이고 식사량은 일정하지 않고 식사 속도는 전원이 하는 편이다. 자주 소화기 안 지어 명치권이 답답할 때가 많으며 답답함, 속쓰림, 통증, 하기를 빨리 느끼는 증상들도 있다.
- ③ 口渴・飲水: 입안이 많이 마르는 편이고, 알레르기도 가끔 난다. 물을 마시는 정도는 보통이며, 따뜻하거나 뜨거운 물을 좋아한다.
- ④ 大便: 대변은 보지 못하며 약간 굳은 편이다. 변비가 자주 생기는 편이고, 대변을 보는 시간은 보통이다. 배변 후에도 시원하지 않으며 복부 평만감, 복부 불쾌감 등의 증상도 있다.
- ⑤ 小便: 소변을 자주 보는 편이며 수면 중에도 1-2회 야간뇨가 있다. 가금 소변이 노랗거나 붉게 느껴지며, 시원하게 보지 못하는 편이다.
- ⑥ 汗出: 날씨가 덥거나 운동할 때에도 땀을 조금 흘리는 편이고, 가금 가연이 있을 때에도 관발이 나기도 한다. 저면시 많이 날 때도 있다.

⑦ 寒熱: 평소 추위와 더위 모두 싫어하는 편이지만 평소 따뜻한 기온이나 온도가 더 편안하게 느껴진다. 몸이 열이 나고 더운 증세도 자주 있으나 몸이 차고 한기를 느끼는 증세도 자주 있다. 손발이 뜨거운 증상이 자주 있다.

⑧ 기타: 피로감을 자주 느끼며 머리도 자주 아프고, 어지럽게 느껴지기도 한다. 눈이 쉽게 건조해지거나 피로하며, 쉽게 충혈되기도 한다. 귀에서 소리가 나거나 멍한 느낌이 자주 있고, 입벌도 자주 생긴다. 얼굴에 열이 오르는 증상과 목에 무언가 걸린 듯한 느낌도 자주 있다. 어깨나 뒷목이 뻣뻣하거나 무거우며, 손발이 저린 증상이 자주 있다. 가금 몸이 붓거나 피부가 가려우며 피부에 무언가 나기도 한다.

(5) 사상체질진단(QSCC II+) : 少陽人

도적강기탕 가 석고 12g, 십이미지황탕, 지황백호탕, 독활지황탕, 숙지황고삼탕



- 전신의 통증 + 불면증 호소
- 눈매가 날카로움 → 소양인
- 음성이 맑고 말투가 단정적 → 소양인
- 리열증이 많은 상태지만, 겉으로는 한증이 나타남 → 비수한표한병으로 처음에 판단 → 도적강기탕 + 열이 조금 있는 것 같으니까 석고
- 교수님 : 결흉증으로 판단한 것 같은데, 음허오열증으로 판단했으면 좀더 좋았을 것
- 추위도 느끼고 더위도 느끼는 상태 → 음허오열증으로 보는게 더 적합
- 평소 불안과 초조한 마음 → 망음병이나 음허오열증으로 갈 확률이 높음
- 결론 : 음허오열로 보는게 맞음

02 소양인 범론

소양인 증상 분류 (11-1)

- 少陽人病 中風 吐血 嘔吐 腹痛 食滯痞滿 五證 同出一屬而 自有輕重, 浮腫 喘促 結胸 痢疾 寒熱往來 胸脇滿 五證 同出一屬而 自有輕重
- 소양인의 병증에 중풍, 토혈, 구토, 복통, 식체비만의 다섯 가지 증세가 다같이 한 가지 등속에서 나와서 거기에는 경중의 병이 있으며, 부중, 천측, 결흉, 이질, 한열왕래, 흉협만의 다섯 가지 증세가 다같이 한가지 등속에서 나와 거기에 스스로 경중이 있다.

- 중풍지속 : 경중의 차이만 있고 모두 음허오열증이 심해지는 단계

- 결흉의 대표 증상 : 천측

- 중풍, 토혈, 구토, 복통, 식체비만 → 음허오열증

- 부중, 천측, 결흉, 이질, 한열왕래, 흉협만 → 결흉증

소양인 병증		경중의 단계	
음허오열증	중증	중풍 > 토혈 > 구토 > 복통 > 식체비만	경증
결흉증		부중 > 천측 > 결흉 > 이질 > 한열왕래 흉협만	

소양인 중풍 (11-2)

- 少陽人 中風 半身不遂 一臂不遂 未如何之疾也, 重者 必死 輕者 猶生 間以服藥 安而復之 待其自愈而 不可期 必治法之疾也
- 소양인의 중풍 반신불수의 한쪽 팔을 못 쓰는 것은 어찌할 수 없는 병이다. 중한 것은 반드시 죽고 경한 것은 간혹 복약하며 안정을 해서 회복되는데 저절로 낫기를 기다릴 것이고 기필코 다스리는 법이 있는 병이 아니다.

- 약 먹고 낫기를 기도할 수 밖에 없음

소양인 토혈지속과 구토지속 (11-3 ~ 11-4)

- 少陽人 吐血者 必蕩滌 剛復偏急 與人並駟爭塗之 淡食服藥 修養如釋道 一百日則 可以少愈 二百日 則 可以大愈 一周年則 可以快愈 三周年則 可保其壽
- 凡 吐血 調養失道則 必再發 再發則 前功 皆歸於虛地 若 再發則 又 自再 發日 計數一百日 少愈 一周年 快愈 若十年 二十年 調養則 必得高壽 (11-3)
- 凡 少陽人 間有鼻血少許 或 口鼻間痰涎中 有血 雖細微 皆吐血之屬也 又 口中暗有冷涎 逆上者 雖不嘔吐 亦嘔吐之屬也 少年 有此證者 多致夭折 以其等閑任置故也 此二證 必在重病險病之列 不可不預防 服藥 永除病根 然後 可保無虞 (11-4)
- 소양인이 토혈하는 자는 반드시 성격이 사납고 강한 것과 급한 성질과 다른 이와 경쟁하는 마음을 싹 씻어 버리고 음식을 싱겁게 먹고 약을 먹으며 수양하기를 불교도 사람들과 같이 하면 100일이면 조금 나을 것이고 200일이면 많이 나을 것이며 1년이면 완전하게 나을 것이고 3년이면 제 명수를 보전할 것이다.
- 대개 토혈증은 조리과 섭양을 옳게 못하면 반드시 재발할 것이며 재발하면 그 동안의 효과가 모두 다 허사로 돌아갈 것이다. 만약 재발하면 또 재발한 날로부터 계산하여 100일이면 조금 낫고 1년이면 완전하게 나을 것이고 만약 10년 20년을 조리 섭양하면 장수를 할 것이다.
- 소양인이 간혹 코피가 조금 나거나 혹은 입과 코의 가래와 침 가운데 피가 있는 것은 비록 그것이 미세하다 할지라도 모두 다 토혈의 등속이다. 또 입안에서 은은히 찬침이 올라오는 것은 비록 구토증이 없어도 그것은 역시 구토의 등속이다. 이런 증세가 있는 소년이 흔히 요절하게 되는 것은 그것을 등한히 내버려두기 때문이다. 이 두 가지 증세는 반드시 중한 병이며 위험한 병에 속한 것이니 예방으로 복약하여 영구히 병 근원을 제거한 후에라야 안심할 수 있는 것이다.

- 욕심없는 마음을 가져야 병이 낫는다!

- 중풍 → 병이 낫기가 쉽지 않음

- 토혈 → 약 먹고, 음식 담백하게 먹고, 마음도 잘 다스리면 나을 수 있음

- 토혈지속 → 코피도 나고, 가래도 뱉고, 콧물도 나옴. 피가 간간히 조금 섞여 나옴. 코든 입이든 약간만 혈액이 보이면 토혈

- 구토지속 → 오심, 찬 침의 역상, 속쓰림 등. 차가운 냉기가 올라오는 것

소양인 중풍 토혈 구토 복통 식체비만 치료 (11-5 ~ 11-6)

- 中風 受病太重故 治法 不可期必 吐血 受病猶輕故 治法 可以期必 中風 吐血 調養爲主 服藥次之 嘔吐以下 腹痛 食滯 痞滿 服藥調養則 其病易愈 (11-5)
- 中風 嘔吐 宜用 獨活地黃湯 吐血 宜用 十二味地黃湯 (11-6)
- 중풍은 벌써 발병시에 대단히 중한 증세이므로 기필코 낫게 하는 방법은 쓸 수 없지만 토혈은 병이 오히려 정하므로 기필코 다스리는 법은 쓸 수 있다. 중풍과 토혈에는 조리와 섭양이 주가 되고, 복약하는 것은 그 다음이 된다. 구토이하 복통, 식체, 비만은 복약하고 조절하면 그 병이 쉽게 낫는다.
- 중풍 구토에는 독활지황탕을 쓰는 것이 좋고, 토혈에는 십이미지황탕을 쓰는 것이 좋다.

- 중풍은 미리 예방하는게 중요. 걸리면 답 없음

- 중풍, 토혈 : 조리와 섭양이 먼저 + 그 다음 약 잘 먹기

- 구토, 복통, 식체비만 : 약만 잘 먹어도 충분

- 중풍, 구토 : 독활지황탕 / 토혈 : 십이미지황탕

소양인 부종 (11-7)

- 浮腫爲病 急治則生 不急治則危 用藥早則 容易愈也 用藥不早則 孟浪死也. 此病 外勢平緩 似不速死故 人必易之 此病 實是急證 4,5日內 必治之疾 謾不可以十日論之也.
- 浮腫初發 當用木通大安湯 或荊防地黃湯 加木通 日再服則 6,7日內 浮腫必解 浮腫解後 百日內 必用荊防地黃湯 加木通 2,3錢 每日1,2貼用之 以清小便 以防再發 再發難治. 浮腫初解 飲食尤宜忍飢而小食 若如平人大食則 必不免再發 大畏小便赤也 小便清則 浮腫解 小便赤則 浮腫結.
- 부종이란 병은 빨리 다스리면 살고 빨리 다스리지 않으면 위태하며 약을 일찍이 쓰면 쉽게 낫고 일찍 쓰지 않으면 맹랑하게 죽는다. 이 병은 밖에 나타난 병세가 평온하여 속히 죽을 것 같지 않으므로 사람들이 쉽게 여기나 이 병이 실상은 급한 병증이니 4-5일 내에 반드시 다스려야 할 병이고 늦어도 10일을 넘지 막아야 할 것이다.
- 부종이 첫번 발생하였을 때는 마땅히 목통대안탕이나 혹은 형방지황탕에 목통을 가하여 써야 하는데, 1일 2회 먹으면 6-7일 내에 부종이 반드시 빠질 것이니 부종이 빠진 후에는 100일까지 반드시 형방지황탕에 목통 3.75g-7.5g을 가하여 매일 1--2첩 써서 오줌을 맑게 하여 재발을 막아야 할 것이니 재발하면 다스리기 어렵다. 부종이 처음 발병했을 때는 배고픈 것을 참고 음식을 더욱 적게 먹어야 할 것이니 만약 건강한 사람과 같이 많이 먹으면 반드시 재발을 면치 못할 것이다. 오줌은 붉은 것이 크게 두려운 것이니 오줌이 맑으면 부종이 풀리고 오줌이 붉으면 부종이 빠지지 않는다.

- 심각한 부종에 대한 이야기 → 급치를 해야 낫고, 급치 안하면 위험해짐
→ 4-5일 이내에 치료해야하고, 10일을 넘기면 위험함

- 결흉에 의한 것이기 때문에 여기서는 심부전으로 인한 부종을 의미하는 것으로 추정됨

- 부종 초증 : 목통대안탕, 형방지황탕 + 목통

- 부종 해후(=예후관리) : 형방지황탕 + 목통

- 형방지황탕 : 소양인 보약. 소양인이 결흉 + 힘이 없을 때 이 처방 사용하면 좋음

- 결흉증 예방 → 형방도적산

소양인 고창 (11-8)

- 少陽人 中消者 腹脹則 必成鼓脹 鼓脹不治
少陽人 鼓脹病 如少陰人 藏結病 皆經歷五六七八月 或 周年而 竟死
蓋 少陰人 藏結 裡陰溫氣 雖在幾絕 表陽溫氣 猶恃完壯
少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰清氣 猶恃完壯
- 소양인 중소병자가 배가 팽만하면 반드시 고창이 되는 것이니 고창은 다스리지 못한 다. 소양인의 고창병은 소음인의 장결병과 같아서 5, 6, 7, 8개월을 지나며 혹은 1년만에 드디어 죽는다. 대개 소음인의 장결은 밖에 양의 온기가 비록 거의 떨어지게 되어 도 속에 음의 온기가 오히려 완실하고 건장한 것이 미더운 것이며 소양인의 고창은 속에 양의 맑은 기운이 비록 거의 떨어지게 되어 도 밖에 음의 맑은 기운이 오히려 완실하고 건장한 것이 미덥다.

- 고창 → 소양인의 중소에 속함
- 장결 → 소음인의 태음병에 속함

** 장결 시험에 나옴. 장결은 소음인 태음병

소양인 천축 (11-9 ~ 11-10)

- 少陽人 傷寒 喘促 宜先用 靈砂一分 溫水調下
因煎 荊防瓜蒌等藥 用之則 必無 煎藥時刻 遲滯救病 (11-9)
- 靈砂 藥力急迫 可以一再用而 不可屢用
蓋 救急之藥 敏於救急而已 藥必湯服 然後 充滿腸胃 能爲補陰補陽 (11-10)
- 소양인 상한병의 천축에는 먼저 마땅히 영사 0.375g 을 온수에 타서 먹이고 이어 형방, 과루 등의 약을 달여 먹으면 반드시 약을 달이는 시각이 지체됨으로써 병을 구하지 못하는 일이 없도록 하기 위함이다.
- 영사의 약 힘이 급박한 것이므로 한두 번 쓸 것이고 여러 번 쓰지 말아야 할 것이다. 대개 구급하는 약은 구급하는 데 약 효과가 빠를 따름이고 약은 반드시 달여 먹여야 위장에 충만하여 능히 보음 보양할 수 있다.

- 천축 : 영사를 사용함 → 급하게 영사를 쓰고, 그 후에 형방, 과루를 사용함
- 영사는 급치하는데 사용하고, 한번 정도만 씹 → 구급약의 개념
- 응급약으로 이런것들 썼다 이정도로 보고 넘어가기

소양인 이질, 구토 (11-11 ~ 11-12)

- 痢疾之比結胸則 痢疾 爲順證也而 痢疾之謂重證者 以其 與浮腫 相近也
嘔吐之比腹痛則 嘔吐 爲逆證也而 嘔吐之謂惡證者 以其 距中風 不遠也 (11-11)
- 少陽人 痢疾 宜用 黃連清腸湯 (11-12)
- 이질을 결흉에 비하면 이질은 순한 병증이니 이질을 중한 병증이라고 말하는 것은 그것이 부종과 서로 가까운 까닭이다. 구토를 복통에 비하면 구토는 순하지 못한 병증이니 구토를 좋지 않은 증세라고 말하는 것은 그것이 중풍과 거리가 멀지 않기 때문이다.
- 소양인의 이질에는 황련청장탕을 쓰는 것이 좋다.

- 소양인 이질 : 황련청장탕
- 이질은 결흉보다는 순증임

소양인 동출일속

범주	중증		경증		
結胸證	浮腫	喘促	結胸	痢疾	寒熱往來胸脇滿
	木通大安湯 荊防地黃湯 加 木通	甘遂 靈砂 荊防導赤散 導赤降氣湯	荊防導赤散 導赤降氣湯	黃蓮清腸湯	荊防導赤散
陰虛午熱證	中風	吐血	嘔吐	腹痛	食滯痞滿
	獨活地黃湯	十二味地黃湯	獨活地黃湯		

- 결흉증 원래는 형방도적산 / 이질이 나타나면 황련청장탕
- 부종일때는 형방지황탕에 목통을 가한 처방
- 음허오열증 생기면 토혈일때는 십이미지황탕. 나머지는 독활지황탕
- 왜 결흉이랑 음허오열만 따로 언급함? → 이 두개는 증상마다 처방이 달라지기 때문

** 위 표의 내용들은 시험에 내기 좋음

소양인 학질 노학 (11-13)

- 少陽人 瘧疾 有間兩日發者 卽勞瘧也 可以緩治 不可急治
此證 瘧不發日 用 獨活地黃湯 2貼 朝暮服
瘧發日 預煎荊防敗毒散 2貼 待惡寒發作時 2貼連服
一月之內 以 獨活地黃湯 40貼
荊防敗毒散 20貼 爲準的則 其瘧 必無不退之理.
- 소양인의 학질이 이틀에 한번씩이나 혹은 격일제로 앓는 것이 있으니 이것이 노학이다. 노학은 천천히 치료할 것이고 급하게 치료할 것이 아니다. 이 중에는 앓지 않는 날에 독활지황탕 2첩을 아침과 저녁에 먹고 발작하는 날에는 미리 형방패독산 2첩을 달여 두었다가 오한이 발작할 때에 2첩을 연복한다. 1개월 내에 독활지황탕 40첩과 형방패독산 20첩을 목표로 하고 쓰면 그 학질이 반드시 물러가지 않을 이치가 없을 것이다.

- 독활지황탕은 학질에도 사용되는 처방

소양인 전후풍, 순증 (11-14)

- 少陽人 內發咽喉 外腫項頰者 謂之纏喉風 2,3日內 殺人最急
又上脣人中穴腫 謂之脣瘡
凡人中左右逼迫處 一指許 發瘡 雖微如粟粒 亦危證也.
- 此二證 始發而輕者 當用涼膈散火湯 陽毒白虎湯
重者 當用水銀熏鼻方 一炷熏鼻而 項頰汗出則愈. 若倉卒 無熏鼻藥則 輕粉末 1分5厘 乳香 沒藥 甘遂末 各5分 和勻糊丸 1服盡.
- 소양인이 안으로 인후병이 나고 밖으로 목과 뺨이 붓는 것을 전후풍이라고 하는데 2--3일 내에 사람의 목숨을 빼앗는 것이 가장 급하다. 또 윗입술 인중혈의 현 데는 순증이라 한다. 인중의 좌우에 손가락 하나 놓일 만한 곳에 종기가 나면 비록 그것이 좁쌀알 같은 작은 것이라 할지라도 또한 위태한 증세이다.
- 이 두 가지 증세가 처음 발생하여 경한 것은 양격산화탕이나 양독백호탕을 써야 하고 중한 것은 수은훈비방을 써야 하는데 약 한데를 태워 코에 훈을 해서 목과 뺨에 땀이 나면 낫는다. 만약 창졸에 훈비 약이 없으면 경분가루 0.6g 과 유황 몰약 감수가루 각 0.2g 씩을 고루 풀에 반죽한 다음 알약을 지어 단번에 다 먹는다.

- 전후풍은 소갈 조문에 나옴 → 위중한 병
- 양격산화탕, 양독백호탕 → 홍격열증에 해당하는구나 알 수 있음
- 경분 : 소양인의 화를 없앴 → 경락을 통과시켜 홍격의 열을 꺼줌 → 석고랑은 좀 다름
- 결흉우증에서 위열이 더욱 치성해지는 경우에도 사용하면 좋음
- 결흉증이나 비수한표한병은 순환이 안돼서 겉을 감쌌 → 외냉포리열
- 감수는 맺혀있는 한기를 깨서 설사로 내려주는 약

소양인 소아 감증 (11-15)

- 少陽人 小兒 食多肌瘦 宜用 蘆薈肥兒丸 忍冬藤地骨皮湯
- 소양인 소아가 많이 먹으나 살이 여위는 데는 노회비아환 또는 인동등지골피탕을 쓰는 것이 좋다.

- 소아감증 : 먹어도 마르는 것 → 노회비아환, 인동등지골피탕 (중소)

→ 소아감증은 중소에 해당함

소양인 증기 (11-16 ~ 11-17)

- 嘗見 少陽人 肩上有毒瘡 火熬香油灌瘡 肌肉焦爛而 不知其熱 有醫 教以牛角片 置火炭上 燒而熏之 烟入瘡口 毒汁自流 其瘡立愈 (11-16)
- 일찍이 소양인의 어깨 위에 지독한 증기가 나서 참기름을 불에 끓여 증기에 부으니 살이 데어 익어도 뜨거운 줄을 몰랐다. 어떤 의사가 소의 뿔 조각을 숯불에 놓아 태우면서 연기를 쏘이라고 하기에 그대로 하였더니 연기가 증기에 들어가서 독물이 흐르더니 그 증기가 곧 낫는 것을 본 일이 있다.

- 증기 : 끓인 참기름, 소뿔조각

- 嘗見 少陽人 七十老人 發腦疽 有 醫教以河豚卵 作末傳之 其疽立愈 河豚卵 至毒 歲犬食之則 立死 掛於林木間 烏鵲 不敢食 (11-17)
- 일찍이 소양인 70세 노인이 뇌저가 생겼는데 어떤 의사가 복쟁이 알을 가루내어 붙이니 뇌저가 즉시 낫는 것을 본 일이 있다. 복쟁이 알이 지극히 독하여 돼지나 개가 먹으면 즉사하고 수풀나무 사이에 이것을 걸어 두어도 까마귀 까치도 감히 먹지 못하더라.

- 소양인 뇌저 : 하주란(복어알)

- 복어알이 열독을 없애줌 → 복어가 차가운 성질을 가지니까 소양인한테 좋겠구나

사두창(생인손), 연주담, 화상, 벌레 물린 곳 (11-18)

- 嘗治 少陽人 蛇頭瘡
- 河豚卵 作末少許 點膏藥上傳之而 1日1次 易以新末
- 傳藥5,6日 病效而 新肉急生而 有妬肉
- 因以磨刀砥末傳之 妬肉立消而疾愈
- 又用之於連珠痰 多日傳之者 必效 用之於爲炭火所傷 與狗咬蟲咬 無不得效.
- 일찍이 내가 소양인 생손앓이를 다스릴 때 복쟁이알 가루를 조금 만들어서 고약 위에 뿌려 붙이되 1일에 1번씩 새 가루를 바꾸어 붙였더니 약을 붙인 지 5--6일만에 병에 효력이 있고 새살이 급히 나고 군살이 생겼다. 이어 칼을 간 숯돌가루를 붙였더니 군살이 곧 없어지면서 병이 나은 일이 있고, 또 이것을 연주담에 여러 날 붙이면 반드시 효력을 보였고, 또 이것을 숯불에 덴 데와 개 물린 데 벌레에 물린 데 써서 모두 다 효과를 보았다.

- 사두창, 연주담, 개 물린 곳, 벌레 물린 곳

: 복어알 → 굳은살 생김 → 마두지말 → 굳은살 사라짐

- 사두창, 굳은살 → 복어알 효과 굳

- 연주담 → 임파선 질환

소양인 중풍 (11-19)

- 嘗治 少陽人 60老人 中風一臂不遂病 用輕粉5厘 其病輒加
少陽人 20歲少年 一脚微不仁痺風 用輕粉甘遂龍虎丹 2,3次 用之 得效.
- 일찍이 내가 소양인 60세 노인이 중풍으로 한쪽 팔을 못쓰는 병을 다스릴 때 경분 0.2g 을 썼더니 그 병이 그만 더하였고 소양인 20세 청년이 한쪽 다리가 불인한 비풍에 경분감수용호단을 2--3차 써서 효과를 본 일이 있다.

- 중풍 → 음허오열병

- 비풍 → 비풍슬한 → 결흉증에 의한 비풍 증상. 차가운게 곁에 쌓여있기 때문에 다리가 말을 안듣는 증상 발생 → 이럴때 경분써서 나온거임

- 음허오열병인 중풍에 경분을 쓰니까 더 악화됨 → 이때는 독활지황탕을 써야함

- 리와 표가 둘다 순환이 안되어서 표병, 리병 증상이 둘다 나타남 → 표리구병

- 리가 순환이 안되어서 리병인데, 표병 증상도 나타남 → 표리겸병

소양인 인후병 (11-20)

- 嘗治 少陽人 咽喉 水醬不入 大便不通 三日 病至危境 用甘遂天一丸 即效
- 일찍이 내가 소양인 인후병을 다스릴 때 물과 간장이 전혀 넘어가지 않고 대변이 3 일이나 통하지 못하고 병이 위태한 지경에 이르렀는데 감수천일환을 써서 즉시 효과를 본 일이 있다.

- 결흉증(수역증)으로 인한 인후병

→ 차가운 기운으로 둘러 쌓여 있는데, 안에서 염증(뜨거운 기운)이 툭 튀어나온 증상

→ 수역이면 뚫어줘야함 → 감수

→ 그 다음에 도적강기탕, 형방도적산을 써야함

소양인 변비 (11-21)

- 嘗治 少陽人 七十老人 大便 四五日不通 或六七日不通
飲食如常 兩脚 膝寒 無力 用輕粉甘遂龍虎丹 大便即通
後數日 大便又秘則 又用 屢次用之 竟以 大便 一日一度 爲準而 病愈 此老 竟得八十壽
- 일찍이 내가 소양인 70세 노인이 대변이 4--5일 통하지 못하거나 혹은 6--7일 통하지 못하면서 음식은 여전하나 무릎이 시리고 두 다리가 무력한데 경분감수용호단을 썼더니 대변이 곧 통하고 그후 수일 지나서 대변이 비결하면 또 쓰고 이렇게 여러 번 썼더니 마침내 대변이 1일 1회씩 기준이 되어 병이 나았고 그 노인이 마침내 80 세까지 장수하였다.

- 대변비조, 비풍슬한 → 결흉우증 증상

- 수역이 없으니까 감수, 경분보다는 도적강기탕, 형방도적산을 쓰는게 더 좋았을 것
→ 리열증에 의한 변비인지, 결흉증에 의한 변비인지 잘 구분해야함

- 결론 : 도적강기탕, 형방도적산을 쓰는게 더 적합하다!

소양인 잇몸 출혈 (11-22)

- 嘗見 少陽人 當門二齒齦縫 血出 頃刻間 數碗 將至危境
有醫 教以火熬香油 以新綿點油 乘熱灼齒縫 仍爲血止
- 일찍이 소양인이 두 앞니의 잇몸에서 피가 나오기 시작해서 잠깐 사이에 두 사발 나와서 장차 위험한 지경에 이르게 되었는데 의사가 불에 끓인 참기름을 탈지면에 찍어서 뜨거운 채로 잇몸을 지지니 피가 멎는 것을 본 일이 있다.

- 들기름보다는 참기름이 소양인한테 효과 좋음

소양인 금기, 머리카락 빗기 (11-23)

- 嘗見 少陽人 一人 每日 一次梳頭 數月後 得口眼喎斜病 其後 又見 少陽人日梳 得喎斜病者 凡三人 盖 日梳 少陽人 禁忌也 嘗見 太陰人 八十老人 日梳者 老人 自言曰 日梳 極好 我之日梳 已爲四十年云
- 일찍이 어떤 소양인이 매일 한번씩 머리를 빗고 수개월 후에 구안와사 병이 걸린 것을 보았으며 그 후에 또 소양인이 날마다 머리를 빗다가 와사병에 걸린 것을 세 사람이나 보았으니 대개 날마다 머리를 빗는 것이 소양인에게 금기할 일이다. 그런데 태음인 80세 노인이 날마다 머리를 빗는 것을 본 일이 있는데 이 노인이 말하기를 이것이 내게는 좋아서 날마다 머리를 빗은 지 이미 40년이나 된다고 하였다.

- 머리 빗으면 → 소양인 : 구안와사 / 태음인 : good

- 태음인은 빗질을 해주면 피부에서 창문을 열어주는 역할을 한다고 보기 때문에 좋음

- 소양인이 열이 치성해 열이 머리에 가서 부스럼이 생긴 것을 빗고 죽은 것을 본거임
→ 열증이 있어서 머리에 각질이 난 것인데, 이걸 열을 꺼줘야하는데 빗질만 해서 구안와사가 온 것이라고 보면 됨

03 소양인 처방

장증경 상한론 중 소양인병 경험설방약 10방

白虎湯 백호탕	石膏 5錢, 知母 2錢, 甘草 7分, 粳米 半合
豬苓湯 저령탕	豬苓, 赤茯苓, 澤瀉, 滑石, 阿膠 各 1錢
五苓散 오령산	澤瀉 2錢 5分, 赤茯苓, 豬苓, 白朮 各 1錢 5分, 肉桂 5分
小柴胡湯 소시호탕	柴胡 3錢, 黃芩 2錢, 人蔘, 半夏 各 1錢 5分, 甘草 5分
大青龍湯 대청룡탕	石膏 4錢, 麻黃 3錢, 桂枝 2錢, 杏仁 1錢, 甘草 1錢, 薑 3片, 棗 2枚
桂婢各半湯 계비각반탕	石膏 2錢, 麻黃, 桂枝, 白芍藥 各 1錢, 甘草 3分, 薑 3片, 棗 2枚
小陷胸湯 소함흉탕	半夏 製 5錢, 黃連 2錢 5分, 瓜蒌 大者 四分之一
大陷胸湯 대함흉탕	大黃 3錢, 芒硝 2錢, 甘遂 末 5分
十棗湯 십조탕	莞花 微炒, 甘遂, 大戟 炒 等分 爲末 別取大棗 十枚 水一盞 煎至半盞 去棗 調藥末 強人 一錢 弱人 半錢 大便利 下水 以粥補之
腎氣丸 신기환	六味地黃湯 加五味子 一味

(그냥 한번 읽고 빠르게 넘어가심)

- 백호탕은 지황백호탕 쓰기
- 저령탕도 저령차전자탕 쓰기
- 소시호탕, 대청룡탕, 계비각반탕도 마찬가지로
- 소함흉탕, 대함흉탕, 십조탕은 결흉증에 대해 얘기 → 형방도적산 써라
- 신기환도 음청지기를 보해주는 약으로 사용

원명 2대 의가 저술 중 소양인병 경험행용요약 9방

涼膈散 량격산

連翹 2錢, 大黃, 芒硝, 甘草 各1錢, 薄荷, 黃芩, 梔子 各5分

○ 此方 出於局方 治積熱煩躁 口舌生瘡 目赤頭昏.

○ 今考更定 此方 當去 大黃 甘草 黃芩

- 대황, 감초, 황금 → 이런걸 빼고 사용해야함

黃連猪肚丸 황련저조환

雄猪肚 1個, 黃連, 小麥炒 各5兩, 天花粉, 白茯苓 各4兩, 麥門冬 2兩

右爲末 入猪肚中 封口 安甌中蒸 爛搗 作丸 梧子大

○ 此方 出於危亦林得效方書中 治強中證

○ 今考更定 此方中 麥門冬一味 肺藥也. 肺與腎 一升一降 上下貫通 腎藥五味中

肺藥一味 雖爲贅材 亦自無妨 不必苛論

- 중소증에 사용해야함

六味地黃湯 육미지황탕

熟地黃 4錢, 山藥, 山茱萸 各2錢, 澤瀉, 牡丹皮, 白茯苓 各1錢 5分

○ 此方 出於虞博醫學正傳書中 治虛勞

○ 今考更定 此方中 山藥一味 肺藥也

- 폐약 → 태음인 약으로 생각함

生熟地黃丸 생열지황환

生乾地黃, 熟地黃, 玄參, 石膏 各1兩 糊丸 梧子大 空心 茶清下 50-70丸

○ 此方 出於李梴醫學入門書中 治眼昏

- 눈이 안보이고 어질어질한 경우에 사용

導赤散 도적산

木通, 滑石, 黃柏, 赤茯苓, 生地黃, 山梔子, 甘草梢 各1錢, 枳殼, 白朮 各5分

○ 此方 出於龔信萬病回春書中 治尿如米泔色 不過二服 愈

○ 今考更定 此方 當去

- 형방도적산으로 사용해라

荊防敗毒散 형방패독산

羌活, 獨活, 柴胡, 前胡, 赤茯苓, 荊芥穗, 防風, 枳殼, 桔梗, 川芎, 人蔘, 甘草 各1錢, 薄荷 少

許

○ 治傷寒 時氣 發熱 頭痛 項強 肢體煩疼

○ 今考更定 此方 當去 枳殼 桔梗 川芎 人蔘 甘草

- 소양인한테 필요 없는거 빼고 사용해라 → 소양인은 위열이 많은 외냉포리열 상태

→ 그 외의 약재들, 필요없는 약재들은 다 빼자

→ 이제마는 체질 의학관이 확고함

→ 그 전의 처방(군신좌사 이론 기반)에서 체질별 사람한테 필요 없는 약은 다 빼버림

肥兒丸 비아환

胡黃連 5錢, 使君子肉 4錢 5分, 人蔘, 黃連, 神麴, 麥芽, 山查肉 各3錢 5分, 白茯苓,

白朮, 甘草炙 各3錢, 蘆薈煨 2錢 5分

右爲末 黃米糊丸 綠豆大 米飲下 20-30 丸

○ 治小兒疳積 疳積病- 영양 불량이나 기생충 등으로 야위는 질환

○ 今考更定 此方 當去 人蔘 白朮 山查肉 甘草而 使君子一味 未能經驗的知藥性故

不敢輕論

- 감적병(먹어도 살 안찌는 병)에 사용

消毒飲 소독음

牛蒡子 2錢, 荊芥穗 1錢, 生甘草, 防風 各5分

○ 治痘不快出 及 胸前稠密 急用三四服 快透 解毒神效. 右三方 出於龔信醫鑑書中

○ 今考更定 此方 當去 甘草

- 홍격에서 발진같은게 덜 나온 경우에 사용하면 치료할 수 있음

水銀熏鼻方 수은훈비환

黑鉛, 水銀 各1錢, 朱砂, 乳香, 沒藥 各5分, 血竭, 雄黃, 沈香 各3分

右爲末 和勻 捲作紙燃七條 用香油點燈 放床上 令病人 放兩脚包住 上用單被

通身蓋之 口噤凉水 頻換則 不損口 初日 用三條 後日 每用一條 熏鼻

○ 此方 出於朱震亨丹溪心法書中 治楊梅天庖瘡 甚奇

○ 論曰 水銀 破積熱 清頭目 制陽回陰於下焦 爲少陽抑陽扶陰藥中 無敵之藥

而祇可用之於當日救急之用 不可用之於連日補陰之用者 以其拔山扛鼎之力 一舉 而直搗大敵之巢穴

再舉則 敵已解散 反有倒戈之患故也 纏喉風 必用之

○ 少陽人 一脚不遂兩脚不遂者 輕粉末 五厘 或一分 連三日服 無論病之差不差 必不過三日服 又不過日服 五厘 或一分 謹風冷 慎禁忌 一臂不遂 半身不遂 口眼喎斜 不可用 用之必死

○ 急病 可以急治 緩病 不可以急治 輕粉 劫藥 不可銳意用之 以望速效 緩病 緩愈然後 可謂真愈 緩病 速效則 終必更病 難治 有連三日用之者 有間一二三日連服 連三次用之者

○ 嘗見 少陽人 咽喉病 眼鼻病 脚痺病 用水銀 連三四日 或熏鼻 或內服 病愈者 病愈後 一月之

內 必不可 內處冷 外觸風 尤不可 任意洗手洗面 更着新衣梳頭也

犯此禁者 必死 又不可冷室 冷室則 觸冷而猝死 又不可燠室 燠室則 煩熱開牖觸風 而亦猝死 此皆目擊者也. 一人 病愈十餘日 更着新衣而猝死 一人 病愈二十日後 梳頭而猝死

一人 咽喉病 熏鼻 初日二條 翌日一條 當夜 燠日觸風而猝死. 時俗 服水銀者 忌鹽醬者 以醬中 有豆豉 能解水銀毒故也. 然 毒藥害毒 容或無妨則 不必苛忌 鹽醬.

- 양을 제어하고 하초로 음을 되돌아오게 함 → 양을 제어하고, 음을 복돋아줌

→ but, 요즘은 수은을 잘 안씀

- 다리에 마비증상이 오는 경우에는 경분 사용

- 음허오열로 오는 중풍증에는 사용하면 안됨

- 경분은 위험한 약이니 함부로 사용하면 안됨

신정 소양인병 응용요약 17방

형방패독산

羌活 獨活 柴胡 前胡 荊芥 防風 赤茯苓 生地黃 地骨皮 車前子 1

○ 治頭痛 寒熱往來者 宜用

- 소양상풍증에 사용 → 소양인 최고의 처방

- 소양인 왔는데 표병인지 리병인지도 잘 모르겠다하면 형방패독산 주면 됨

- 열도 꺼주고 순환도 시켜주니까 감기에 그냥 좋음. 교수님도 최고의 처방이라고 하심

- 패독산 먹으면 땀나는데, 덥다고 창문열거나 옷 갈아입거나 바람쐬거나 하면 병이 더 심해지니 주의하자

형방도적산

生地黃 3 木通 2 玄參 瓜蒌仁 1.5 前胡 羌活 獨活 荊芥 防風 1

○ 治頭痛 胸膈煩熱者 宜

- 걸흥증에 많이 사용

형방사백산

生地黃 3 茯苓 澤瀉 2 知母 石膏 羌活 獨活 荊芥 防風 1

○ 治頭痛 膀胱熒躁者 宜用

- 방광이 건조 → 병증을 나타냄.

- 홍격열증, 리열증, 표병에도 사용하고 망음증에도 사용함

→ but, 형방패독산을 더 많이 쓰긴함.. 형방사백산도 좋은 처방이긴 함

저령차전자탕

茯苓 澤瀉 2 猪苓 車前子 1.5 知母 石膏 羌活 獨活 荊芥 防風

○ 治頭腹痛 有泄瀉者 宜用

- 홍격열증에서 열이 심해서 소변불리일 때 사용
- + 신열두통망음에서 열증보다 설사가 더 심한 경우에 사용
- 리열증에서 소변불리까지 생겼을 때

활석고삼탕

茯苓 澤瀉 滑石 苦參 2 川黃連 黃柏 羌活 獨活 荊芥 防風 1

○ 治腹痛 無泄瀉者 宜用

- 소양인 복통약으로 많이 사용 → 신한복통망음증에서 많이 사용

독활지황탕

熟地黃 4 山茱萸 2 茯苓 澤瀉 1.5 牡丹皮 獨活 防風

○ 治食滯痞滿者 宜用

- 음허오열증에 사용함 → 식체비만, 중풍, 노화 등에서 사용

형방지황탕

熟地黃 山茱萸 茯苓 澤瀉 2 車前子 羌活 獨活 荊芥 防風 1

○ 咳嗽 加前胡, 血證 加玄參 牡丹皮, 偏頭痛 加黃連 牛蒡子, 食滯痞滿者 加牡丹皮, 有火者 加石膏, 頭痛煩熱 與血證者 用生地黃, 加石膏者 去山茱萸.

○ 荊芥 防風 羌活 獨活 俱是補陰藥 荊防 大清胸膈散風 羌獨 大補膀胱眞陰

→ **** 이 조문은 시험에 낼거임**

○ 無論 頭腹痛 痞滿 泄瀉 凡虛弱者 數百貼用之 無不必效 屢試屢驗

- 형개 방풍 독활 강화 (강독형방) → 소양인 처방에 많이 들어감. 모두 보음약
- 형개 방풍 → 홍격의 열을 꺼줌
- 강화 독활 → 방광의 진음을 보호
- 형개 → 상초 / 방풍 → 중상초
- 독활 → 하초 / 강화 → 중하초

십이미지황탕

熟地黃 4 山茱萸 2 白茯苓 澤瀉 2 牡丹皮 地骨皮 玄參 枸杞子 覆盆子 車前子

荊芥 防風 1

지황백호탕

石膏 5-10 生地黃 4 知母 2 防風 獨活 1

- 리열증의 성약

양독백호탕

石膏 5-10 生地黃 4 知母 2 荊芥 防風 牛蒡子 1

○ 治陽毒發斑 便秘者 宜用

- 피부발진이나 변비에 사용 → 피부발진에 효과 좋음

양격산화탕

生地黃 忍冬藤 連翹 2 山梔子 薄荷 知母 石膏 防風 荊芥 1

○ 治上消者 宜用

인동등지골피탕

忍冬藤 4 山茱萸 地骨皮 2 川黃連 黃柏 玄參 苦參 生地黃 知母 山梔子 枸杞子 覆盆子

荊芥 防風 金銀花 1

○ 治中消者 宜用

숙지황고삼탕

熟地黃 4 山茱萸 2 白茯苓 1.5 澤瀉 知母 黃柏 苦參 1

○ 治下消者 宜用

- 이 3개는 소양인 당뇨에 쓰는 처방
- 소양인 리열병으로 가는 경우는 거의 당뇨를 동반하는 경우가 많음
- 인동등지골피탕, 숙지황고삼탕은 실제로 인슐린 분비에 작용함

목통대안탕

木通 生地黃 5 赤茯苓 2 澤瀉 車前子 川黃連 羌活 荊芥 防風 1

○ 治浮腫者 宜用 險病 始終用藥 當至百餘貼

黃連 澤瀉 爲貴材則 貧者 或去連澤

- 부중에 사용

황련청장탕

生地黃 4 木通 茯苓 澤瀉 2 猪苓 車前子 川黃連 羌活 防風 1

○ 治痢疾者 宜用

去木通二錢 加荊芥一錢 淋疾者 宜用

- 이질에 사용

주사익원산

滑石 2 澤瀉 1 甘遂 5分 朱砂 1分 ○ 爲末 溫水 或 井華水 調服. 夏月滌暑 宜用.

- 여름날 더위에 사용

감수천일환

甘遂 1錢, 輕粉 1分. 和勻糊丸 分作 10 丸 朱砂爲衣

○ 作丸乾久 則堅硬難和 每用時 以紙二三疊包裹 以杵搗碎 作麤末 三四五片 口

含末 因飲井華水和下 候三四辰刻內 不下利 則再用二丸 下利三度 爲適中 六度

爲快過 預煎米飲 下利二三度 因進米飲 否 則氣陷 而難堪耐

○ 治結胸 水入還吐

甘遂一錢 輕粉五分 分作十九丸則 名曰 甘遂龍虎丹

輕粉 甘遂 各等分 作十九丸則 名曰 輕粉甘遂雌雄丹

輕粉一錢 乳香 沒藥 甘遂 各五分 分作三十九丸則 名曰 乳香沒藥輕粉丸

○ 輕粉 發汗 甘遂 下水. 輕粉藥力 一分 則快足 五厘 則無不及

甘遂藥力 一分五厘 則快足 七八厘 則無不及

輕粉 甘遂 自是毒藥 俱不可輕易過一分用之 斟酌輕重

病欲頭腦滌火 則輕粉爲君 病欲胸膈下水 則甘遂爲君

→ ** 이것도 시험에 나올 가능성 매우 높음

○ 少陽人藥 諸種 不可炮 炙 炒 煨用

- 물에 의해서 막히게 있을 때 사용

- 감수 먹고 설사를 하면 탈수에 걸리겠조 → 2~3번 설사하면 미음 준비해서 먹이자

- 결흉해서 못먹고 물까지 토해내는 경우에도 사용

- 유행물약경분환 → 전후풍, 순경에 사용 → 결흉우증에서 생길 수 있는 증상들에 감수나 경분을 응용할 수 있음 → but, 중풍에는 사용하면 안되고 독활지황탕을 사용해야함

- 경분은 발한, 감수는 하수

→ 여기서 발한은 피부를 열어주는게 아니라 통하게 해준다고 생각하기. 경락을 열어서 열을 사하시킨다고 생각하면 됨. 통로를 열어준다. 막혀있는 곳에 파이프를 넣어서 뚫어준다. 열어서 다 나가게 하는게 아니라.

- 흥격의 열 빼주기 → 경분 → 파이프를 꽂아서 뚫어줌

- 흥격에 차가운 물, 한기가 쌓여 막힘 → 감수

- 결론 : 소양인은 열이 많으니까 열 가하는 약들은 사용하지 말자

중간고사 시험공지

- 30문제
- 객관식 3문제 + 서술형 2문제 + 나머지 단답형
- 힌트는 토~일 내에 제공할 예정
- 힌트 내에서 잘 공부하시길 바람
- 오늘 강조한 내용들은 시험에 나올 예정

논문해석 조별과제 해설

시험엔 나오지 않을 듯. 궁금한 사람만 읽어보기

(논문 내용)

- 조열양상에 꽃핌 → 신양곤열은 외열포리냉 → 안에는 한이 가득. 겉에만 열
- 천궁계지탕, 황기계지탕, 팔물군자탕을 사용해야
- 땀을 많이 흘리니까 천궁보다는 황기를 쓴 것
- 땀나고 괜찮아지니까 그 다음 팔물군자탕을 써서 치료함

→ 조열양상에 꽃혀서 열을 없애야겠다고 생각하니까 천궁계지탕, 황기계지탕 중에 땀이 많으니까 황기계지탕을 쓰고 그 다음에 팔물군자탕을 쓴거임

(교수님 생각)

- 교수님 : 조열양상으로만 보면 안된다. 이건 주된 양상이 아니고 하나의 증상일 뿐!

- 해열제는 소음인한테 보명지주를 깎는 약
- 율광증에서는 땀이 나도 무력감이 안 생김. 망음증은 땀이 나면서 정신 무력감이 동반
- 해열제를 받고 무력감이 들었기 때문에 망음증 중증으로 보는게 훨씬 더 타당
- 승양익기탕을 처방하는게 더 좋다고 생각하심

- 결론 : 망음 중증 + 승양익기탕 사용(부자까지는 안쓴다)

→ 한출도 줄면서 무력감도 감소할 것

- 소변에 문제 없으니까 말증까지는 아니고
- 황기를 사용해서 땀을 먼저 잡고, 그 다음에 표병치료를 함

- 율광 초증은 무력감이 별로 안심함. 그래서 배제