

사상체질의학 15주차 써머리

[태양인 원문&신정방]

수업시작때 말하신 부분 (저번에 했었는데 굳이 한번 더 말하심)

- 경자본 : 이제마가 갑오본을 개정한 것. 팔강의 개념으로 병증을 이해하려했다.

(갑오본에서는 편소지장만 문제라고했지만 경자본에서는 편대지장도 병에걸림.

음양의 상하 순환의 부조, 한열의 부조에 따라서 설명을 추가함.)

->이에 따라 병증명이 바뀜.

- 신축본: 이제마의 제자들의 모임인 율동계에서 만든 것.

太陽人 外感 腰脊病論(4條) 태양인 외감 요척병론(4조)

[14-1] 內經에 曰 尺脈이 緩澁을 謂之解僂니라

○ 釋曰 尺爲陰部니 肝腎이 主之하니 緩爲熱中오. 澁爲亡血故로 謂之解僂라
解僂者는 寒不寒 熱不熱 弱不弱 壯不壯 瘳不可名, 謂之解僂也라

내경에 말하기를 척맥(尺脈)이 완삽(緩澁)한 것을 일러 해역(解僂)이라 한다. 해석하여 말하기를 척맥(尺脈)은 음부(陰部)가 되고 간(肝)과 신(腎)이 주한다. 완(緩)은 열중(熱中)한 것이고 삽(澁)은 망혈(亡血)이 되기 때문에 해역(解僂)이라 일컬은 것이다. 해역(解僂)이라는 것은 추운 듯하나 춥지도 않고 더운 듯하나 덥지도 않고 약한 듯하나 약하지도 않고 씩씩한 것 같으나 씩씩하지도 않으니 괴상하기를 무엇이라고 이름 할 수 없어

서 해역(解僂)이라 일컬은 것이다.

㉞ 핵심 단어는 망혈/맥에 대한 언급(척맥완삽): 기액의 순환x 상태를 말하고자 함

㉞ 간: 편소지장/기전에 대한 얘기: 제대로 순환되지 않는 상황 '망혈' => '해역'

완삽맥 ->부족하고 나른하고 한 맥.

[14-2] 靈樞曰 髓傷則消癯니 肝痿, 體解僂나 然不去矣니 不去은 謂不能行去也니라

영추(靈樞)에 말하기를 골수(骨髓)가 상하면 말라 버려서 종아리가 저리고 몸이 해역(解僂)하여서 가지를 못한다. 가지를 못한다는 것은 걸어서 가지를 못한다는 것을 일컬은 것이다.

- 행산: 정강이가 시림, 저림/- 해역: 걸어서 가지 못함

- 다리가 풀림(체간이아니라) ->음 ->신기혈정중 혈이 허해진 병이다.

- 교수님은 이게 비타민부족, 영양소의 부족의 증상이라고 생각하심. 따라서 태양인 약재도 이러한 영양소를 보충해주는 느낌의 약재가 많음.

[14-3]○論曰 此證은 卽太陽人 腰脊病 太重證也라

必戒深哀, 遠嗔怒, 修清定然後에 其病이 可愈니 此證에 當用五加皮壯脊湯니라

나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 요척(腰脊)병으로 아주 중한 증이니 반드시 너무 슬퍼함을 경계(警戒)하고 성내는 것을 멀리하며 마음을 태평하게 한 후에야 그 병이 가히 나을 수 있다. 이 증에는 마땅히 오가피장척탕(五加皮壯脊湯)을 쓸 것이다.

- 계심애 원진노: 태양인은 怒의 감정을 가장 조심해야함

- 요척: 태양인의 편소지장
- 경증은 마음관리만해도 낫는 것. 해역증은 중증이니 오가피장척탕을 써준다.

※관련 내용: 애노희락과 천기인사

확충론 [3-1]	천기		인사	
상기(속이는 사회)	천시	애	사무	출외흥
상모(업신여김)	세회	노	교우	생소인
상조(도와줌)	인륜	희	당여	친숙인
상보(보호해줌)	지방	락	거처	주내주

[14-4] ○解僂者是 上體完健, 而下體解僂나 然, 脚力이 不能行去也而其脚이 自無痲痺腫痛之證오 脚力이 亦不甚弱하나니 此이 所以弱不弱 壯不壯 寒不寒 熱不熱 而其病이 爲腰脊病也라

有解僂 證者은 必無大惡寒發熱, 身體疼痛之證也니 太陽人이 若有大惡寒發熱 身體疼痛之證 則腰脊表氣이 充實也니 其病을 易治오 其人이 亦完健니라

해역(解僂)이라는 것은 상체(上體)는 완전히 건강하나 하체(下體)가 해역(解僂)하여 다리 힘으로 걸아갈 수 없는 것이다. 그러나 그 다리가 마비(痲痺), 종통(腫痛)의 증은 없는 것이며 다리의 힘도 심히 약한 것은 아니니 이것은 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않고 추운 듯하나 춥지도 않고 더운 듯하나 더운 것도 아니니 이 병은 요척(腰脊)의 병이 된다. 해역의 증이 있는 경우는 반드시 심히 오한하거나 발열 또는 신체 동통(身體疼痛) 등의 증은 없다. 태양인이 만약 심한 오한이나 발열 또는 신체동통 등증

이 있다면 이것은 요척(腰脊)의 표기(表氣)가 충실한 것이다. 이 병은 쉽게 치료되며 그 사람도 역시 완전하게 건강하다.

- 상체는 건강하나 하체가 걸을 수 없다: but 마비, 종통은 아님 ->기능엔 문제x

: 특정 영양소의 영양결핍 가능성 높음 (비타민, 철분..)/오늘날 루게릭 초기, 파킨슨

(애매)

- 오한발열, 신체동통있는거다 ->강 감기걸려서 다리에 힘풀린거다.

- 태양인 질환은 무언가 부족해진 상황이라고 생각하심.(한달동안 술만쳐먹었거나 혹은 영양분 부족으로 인해 중추신경, 말초신경에 문제가 생겨 다리에 힘풀리고 이유 없이 구토를 하는 증상.)

太陽人 內觸 小腸病論(11條) 태양인 내촉 소장병론(11조)

[15-1] 朱震亨이 曰

噎膈反胃之病은 血液이 俱耗하야 胃脘이 乾枯니

其枯이 在上近咽 則水飲은 可行나 食物은 難入하며 入亦不多니 名之曰噎오

其枯이 在下近胃 則食雖可入나 難盡入胃며 良久復出니 名之曰膈며 亦曰反胃라 (위에서 소장으로 내려보내지 못함->구토)

大便이 秘少하야 若羊屎然하니 名雖不同나 病出一體니라

又曰 上焦噎膈은 食下則胃脘이 當心而痛라가 須臾에 吐出하며 食出痛乃止

하고

中焦噎膈은 食物이 可下나 難盡入胃며 良久에 復出하고

下焦噎膈은 朝食暮吐하며 暮食朝吐니 氣血이 俱虛者은 口中에 多出沫라

但見沫多出者은 必死오 大便이 如羊屎者은 難治오 不淡飲食者도 難治니라

주진형(朱震亨)이 말하기를 열격(噎膈), 반위(反胃)의 병은 **혈(血)과 액(液)이 같이 소모** 되어서 위완(胃脘)이 건조하여지는 것이다. 그 건조한 것이 위에 있어서 목구멍에 근접 하면 물을 넘길 수 있으나 음식물은 들어가기가 어려우며 또한 많이 들어가지도 못하니 이것을 말하여 **열(噎)**이라고 하고, 그 건조한 것이 아래에 있어서 위와 근접하면 음식을 넘기기가 어렵고 어렵게 위에 들어가도 오래지 않아 다시 나오니 이것을 말하여 **격(膈)**이라 하며 또한 말하여 **반위(反胃)**라 한다. **대변이 마르고 적으며** 마치 양의 똥과 같으니 이름이 비록 같지 않으나 병은 한 곳에서 나온 것이다. 또 말하기를 상초의 열격(噎膈)은 음식물이 내려가면 위완으로부터 가슴에까지 치받쳐서 아프다가 잠시 후에 토하게 되니 음식물이 나오면 아픈 것이 곧 멎고, 중초의 열격은 음식물은 아래로 내려가나 위에 들어가기가 어렵고 얼마 후에 다시 나온다. 하초의 열격은 아침에 먹으면 저녁에 토하고 저녁에 먹으면 아침에 토하니 **기혈이 모두 허한 경우는 입안에서 거품을 많이 토한다**. 다만 반드시 거품이 많이 나오는게 보이는 경우는 죽는다. 대변이 양의 똥 같은 경우도 치료하기 어렵고 음식을 담백하게 먹지 않는 경우도 치료하기 어렵다.

- 열격: 받아들이지를 못하는 것 / 반위: 토하는 것

- 열격반위: **혈액 모두 모손** ⇒ 건조/**대변비소**: 혈액구모 위완건고가 원인

- **구중다출말**: 거품이 많이 나오는 것도 기액 순환X

- **변비**는 어느 체질에서도 나타날 수 있음 (소양소음 안넌다했으니까 태음태양만 봐도 될 듯)

- 하초열격->폐색의 가능성, 소화기의 기능적인 이상.

소음인 변비	울광증, 망양증	팔물군자탕, 파두
소양인 변비	홍격열증	지황백호탕
태음인 변비	조열증	갈근승기탕
태양인 변비	열격	미후등식장탕

[15-2] ○張鷟이 曰 噎은 當是神思間病니 惟內觀自養라도 可以治之니라

장계봉(張鷟)이 말하기를 열(噎)은 당연히 **신(神)과 사(思)사이의 병**이니 오직 안을 살려서 스스로 자양(滋養)해야만 가히 치료할 수 있다.

- 여기서 神은 신기혈정의 '신'

[15-3] ○龔信 醫鑑에 曰 反胃也 膈也 噎也은 受病이 皆同하니

噎膈之證은 不屬虛 不屬實 不屬冷 不屬熱오 乃**神氣中一點病**耳니라

공신(龔信)의 《의감(醫鑑)》에 말하기를 반위(反胃), 격(膈), 열(噎)이 병이 되는 것은 모두 같은데 열격(噎膈)의 증은 허에 속하지도 않고 실에 속하지도 않고 냉에 속하지도 않고 열에 속하지도 않으니 곧 **신기(神氣) 중의 한 가지** 병이다.

- 냉(冷): 패혈증 같은 심한 기능저하(감염X)

- 생각과 관련된 병이다! (원인을 특정할 수 없어서 이렇게 말한 듯)

[15-4] ○論曰 此證은 卽太陽人 小腸病 太重證也라 必遠嗔怒 斷厚味然後에 其病이 可愈니 此證에 當用彌猴藤植腸湯니라

나는 말하기를 이 증은 곧 태양인의 소장병(小腸病)이 아주 중한 증이니 반드시 진노(嗔怒)를 멀리하고 기름진 음식을 끊은 연후에야 그 병이 나을 것이다. 이 증에는 마땅히 미후등식장탕(彌猴藤植腸湯)을 써야 한다.

☞ 내측소장병 치료: 원진노, 단후미 해야함 (기름진 음식X: 술, 고기 등)

[15-5] ○食物이 自外入 而有所妨碍 曰噎오 自內受 而有所拒格 曰膈오 朝食暮吐하며 暮食朝吐 曰反胃라 然나 朝食而暮吐하며 暮食而朝吐者이 非全食皆吐也오 有所妨碍 而拒格於胃之上口者이 經宿而自吐也 則反胃이 亦噎膈也라

蓋噎膈者은 胃脘之噎 膈也며 反胃者은 胃口之噎 膈也니 同是一證也라

有噎膈證者은 必無腹痛 腸鳴 泄瀉 痢疾之證也니 太陽人이 若有腹痛 腸鳴 泄瀉 痢疾之證 則小腸裏氣이 充實也니 其病을 易治오 其人이 亦完健니라

음식물이 밖으로부터 들어오는 데에 방해받는 바가 있는 것을 열(噎)이라고 말하며, 안 으로부터 받아들이는 데 막히는 바가 있는 것을 격(膈)이라고 말하며, 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저녁에 먹은 것을 아침에 토하는 것을 반위(反胃)라고 말한다. 그러나 아침에 먹은 것을 저녁에 토하고 저녁에 먹은 것을 아침에 토하는 것은 먹은 것을 모두 토 하는 것은 아니고 방해받는 바가 있어서 위(胃)의 상구(上口)에서 막혀서 체류되었던 음

식물이 저절로 토하여지는 것이니 반위(反胃)도 역시 열격이다. 대개 열격은 위완의 열 격이며 반위는 위구(胃口)의 열격이나 다 같은 병증이다. 열격의 증이 있는 경우는 반드시 복통, 장명(腸鳴), 설사, 이질(痢疾)의 증은 없다. 태양인이 만약 복통, 장명, 설사, 이질의 증이 있다면 소장의 리기(裏氣)가 충실한 것이니 그 병은 쉽게 치료되고 그 사람은 역시 완전히 건강하다.

☞ 밖에서 들어오는데 방해 = 열 / 안으로부터 받아들이는데 막힘 = 격

- 열격은 위완이 막힌 것 VS 반위는 위가 막히는 것 BUT 다 같은 병증이다~

- 열격 있으면 ⇒ 복통/장명/설사/리질 X, if 태양인이 복통/장명/설사/리질 있으면 ⇒ 건강한 것

- 위의 증상이 있으면 그냥 콜레라 티푸스 이런거 걸린것이다.

✓ 정리하면

食物이 自外入 而有所妨碍	열
自內受 而有所拒格	격
朝食暮吐하며 暮食朝吐	반위
噎膈	위완之噎
反胃	위구之噎
有噎膈證者	必無 복통 장명 설사 리질之證

[15-6] ○解你噎膈은 俱是重證 而重證之中에 有輕重之等級焉하니

解你而無噎膈 則解你之輕證也오 噎膈而無解你 則噎膈之輕證也라

若解你이 兼噎膈하며 噎膈이 兼解你 則其爲重險之證을 不可勝言 而重險中
에 又有輕重也니

太陽人 解你噎膈이 不至死境之前에 起居飲食이 如常하야 人必易之하야 視
以例病故로 入於危境 而莫可挽回也라

余이 稟臟太陽人로 嘗得此病하야 六七年 嘔吐涎沫하며 數十年攝身하야 倖
而免夭하고 錄此以爲太陽人 有病者戒하로니 若論治法거대 一言蔽曰 遠嗔怒
而已矣니라

해역과 열격은 모두 중증이지만 중증 중에서도 경중의 등급이 있으니 해역만 있고 열격
이 없으면 해역의 경증이고 열격만 있고 해역이 없으면 열격의 경증이다. 만약 해역에
열격을 겸하거나 열격에 해역을 겸한다면 그것이 위험한 증이라는 것을 더 말할 여지가
없으나 위험한 증에도 역시 경중이 있으니

태양인의 해역 열격은 사경(死境)에 이르기 전에는 기거(起居)와 음식(飲食)이 여전하므
로 사람들이 반드시 쉽게 생각하고 보통의 병으로 보기 때문에 위경(危境)한 지경에 들
어가서는 구원할 수 없는 것이다. 나는 본래 체질이 태양인인데 일찍이 이 병을 앓아 6-
7년간. 연말(涎沫)을 토하다가 수 십년을 몸을 섭양하여 다행히 요절을 면하였다. 이것
을 기록하여 태양인으로서 병든 경우에 경계하도록 한다. 만약 치법을 논한다면 한마디
로 말하여 진노(嗔怒)를 멀리하라고 할 따름이다.

☞ 해역o열격x: 해역의 경증 / 열격o해역x: 열격의 경증 / 열격겸해역&해역겸열격: 중험증

- 태양인은 평소에 건강해서 신경을 잘 안씀. ->건강검진~

- 태양인 치법을 한마디로 하면 '遠嗔怒(원진노)'

✓ 정리하면

解你而無噎膈	해역之경증
噎膈而無解你	열격之경증
解你이 兼噎膈하며 噎膈이 兼解你	중험之證 / 重險中에 又有輕重

Q. 체질별 경중험위로 구분했는데 태양인은 경중 2가지만 있는가? A. 아니다! 태양인도 4가지

표	순	경중	태음인	태양인
			배추표병증	해역
리	순	경중	태음인	태양인
			조열증	열격
표	역	험위	위완한증	해역겸열격
			음혈모갈증	열격겸해역

[15-7] ○太陽人은 意強而操弱하니 意強則胃脘之氣이 上達而呼散者이 太過
而越也오 操弱則小腸之氣이 中執而吸聚者이 不支而饒也니 所以其病이 爲
噎膈反胃也니라

태양인은 의지(意志)가 강하고 조행(操行)이 약하다. 의지가 강하면 위완의 기가 위로
올라가서 호산(呼散)하는 것이 많아지고 넘친다. 조행(操行)이 약하면 소장의 기운이 가
운데 뭉쳐서 흡취(吸取)되는 것이 부족하여 위축된다. 이러한 병을 일러 열격(噎膈), 반
위(反胃)라 한다.

- 意強而操弱=폐대간소의 다른 표현

※ 15-7 관련 조문 [장부론]

[4-14] 津海藏意, 膏海藏慮, 油海藏操, 液海藏志.

진해에는 의(意)가 감추어져 있고, 고해에는 여(慮)가 감추어져 있고, 유해에는 조(操)가 감추어져 있고, 액해에는 지(志)가 감추어져 있다.

[15-8] ○問朱震亨이 論噎 膈反胃 曰血液이 俱耗하고 胃脘이 乾枯하야 食物

이 難入라니 其說이 如何오

曰水穀이 納於胃 而脾이 衛之하며 出於大腸 而腎이 衛之하나니

脾腎者은 出納水穀之府庫 而迭爲補瀉者也오

氣液이 呼於胃脘 而肺이 衛之하며 吸於小腸 而肝이 衛之하나니

肺肝者은 呼吸氣液之門戶 而迭爲進退者也라

是故로 少陽人 大腸出水穀陰寒之氣이 不足 則胃中納水穀陽熱之氣이 必盛也
오

太陽人 小腸吸氣液陰冷之氣이 不足 則胃脘呼氣液陽溫之氣이 必盛也니

胃脘陽溫之氣이 太盛 則胃脘血液이 乾枯은 其勢固然也라 然나 非但乾枯而
然也오

上呼之氣이 太過 而中吸之氣이 太不支故로 食物이 不吸入 而還呼出也니라

어떤 사람이 문기를 주진형(朱震亨)이 열격(噎膈)과 반위(反胃)에 대하여 논하여 말하
기를 혈액(血液)이 모두 소모되고 위완(胃脘)이 건조하여 마르게 되어 음식물이 들어가기

어렵다고 하니 그 말이 어떠한 것인가? 대답하기를 수곡(水穀)은 위에 들어가서 비의 보
호를 받고 대장에 나가서는 신의 보호를 받으니 비와 신이라는 것은 수곡이 나가고 들어
오는 창고로서 교대로 보태고 빠지는 것이다. 기액(氣液)은 위완에서 내보낼 때는 폐의
보호를 받고 소장에서 흡수될 때는 간의 보호를 받으니 폐와 간은 기액을 호흡하는 문호
(門戶)로서 교대로 들어오고 나가는 것이다.

그러므로 소양인은 대장에서 내보내는 수곡의 음한(陰寒)한 기가 부족하기 때문에 위중
(胃中)으로 들어오는 수곡의 양열(陽熱)한 기가 반드시 성하고, 태양인은 소장에서 흡수
되는 기액의 음량(陰凉)한 기가 부족하기 때문에 위완에서 흡수되는 기액의 양온(陽溫)
한 기가 반드시 성하다.

위완의 양온한 기가 너무 성하면 위완의 혈과 액이 건조하여 마르게 되는 것은 당연한
이치이다. 그러나 비단 건조하여 마르게 되어서만이 아니라 위로 내보내는 기가 너무 과
도하여 안으로 흡수되어지는 기가 너무 부족하게 되니 음식물이 흡인(吸引)되지 못하고
다시 나오는 것이다.

✓ 정리하면

비신者		출납수곡 之府庫		而迭爲 보사 者也	
폐간者		호흡기액 之門戶		而迭爲 진퇴 者也	
수곡		納於 위 而 비 衛之		出於 대장 而 신 衛之	
기액		呼於 위완 而 폐 衛之		吸於 소장 而 간 衛之	
수곡	대장(出)	음한之氣	위중(納)	양열之氣	
기액	소장(吸)	음냉之氣	위완(呼)	양온之氣	

[15-9] ○或曰 朱震亨所論 噎 膈反胃者이 安知非少陰少陽太陰人病 而吾子이 必名目 曰太陽人病라하며 內經所論 解俵 者이 安知非少陰少陽太陰人病 而吾子이 必名目 曰太陽人病라하니 莫非牽強附會耶아 顧問其說하로라

曰少陽人이 有嘔吐 則必有大熱也오 少陰人이 有嘔吐 則必有大寒也오 太陰人이 有嘔吐 則必病愈也니 今此噎膈反胃이 不寒不熱 非實非虛 則此非太陽人病 而何也오

解俵 者은 上體完健 而下體이 解俵 然 疴瘕 不能行去之謂也니 少陰少陽太陰人이 有此證 則他證이 疊出 而亦必無 寒不寒 熱不熱 弱不弱 壯不壯之理 矣리라

어떤 사람이 또 물기를 주진형(朱震亨)이 논한 열격과 반위라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인의 병이라고 지명하였으며, 내경에서 논한 해역이라는 것이 어떻게 소음인, 소양인, 태음인의 병이 아니라는 것을 알고 당신은 반드시 태양인의 병이라고 지명하였는가? 말을 억지로 끌어다가 그럴 듯하게 꾸며낸 것이 아니냐? 원컨데 그 설명을 듣고 싶다.

답하기를 소양인이 구토가 있다면 반드시 높은 열이 있고, 소음인이 구토가 있다면 반드시 대한(大寒)이 있고, 태음인이 구토가 있다면 반드시 병이 낫는다. 지금 이 열격과 반위가 차지도 않고 덥지도 않고 실(實)하지도 않고 허(虛)하지도 않으니 이것이 태양인의 병이 아니고 무엇이라? 해역이라는 것은 상체(上體)는 건강하나 하체(下體)가 해역하여

종아리가 시리고 걸어가지 못하는 것을 이르는 것으로 소음인, 소양인, 태음인이 이러한 증이 있다면 다른 증이 겹쳐진 것으로 또한 반드시 추운 듯하나 춥지 않고 더운 듯하나 덥지 않고 약한 듯하나 약하지 않고 실한 듯하나 실하지 않을 이치가 없을 것이다.

- 물음: 해역이 왜 태양인병이나? 건강부회 아니냐?
- 대답: 해역의 증상은 소음/소양/태음에 다 해당 안 된다.

정리하면

소양인	구토	대열
소음인		대한
태음인		병유
태양인	열격반위	不寒不熱 非實非虛
열격/반위는 한열허실 무엇에도 속하지 않음		
이러한 증상은 소양/소음/태음인에 해당하지 않으므로 해역/열격/반위는 태양인 병이다!		

[15-10]

○或曰 吾子이 論太陽人解俵病治法 曰戒深哀 遠嗔怒 修清定라하고 論噎膈病治法 曰遠嗔怒 斷厚味라하니 意者 太陽人解俵病이 重於噎 膈病 而哀心所傷者이 重於怒心所傷乎아

曰否라 太陽人噎膈病이 太重於解俵病 而怒心所傷者이 太重於哀心所傷也니 太陽人哀心이 深着 則傷表氣하고 怒心이 暴發 則傷裡氣故로 解俵 表證에

以戒哀遠怒로 兼言之也니라

2) 日然則 少陽人怒性이 傷口膀胱氣하며 哀情이 傷腎大腸氣하고

少陰人樂性이 傷目腎氣하며 喜情이 傷脾胃氣하고

太陰人喜性이 傷耳腦髓氣하며 樂情이 傷肺胃脘氣乎아 日然하다

1) 어떤 사람이 또 문기를 당신이 태양인의 해역병(解僂病)의 치료법을 논하여 말하기를
깊이 슬퍼함을 경계하며 진노(嗔怒)하는 것을 멀리하며 마음을 수양하여 깨끗하고 바르게 하라 하였고, 열격병(噎膈病)의 치료법을 논하여 말하기를 진노하는 것을 멀리하고 기름진 음식을 끊으라고 하였으니 생각하건대 태양인의 해역병이 열격병보다 중하며 애심(哀心)에 손상된 것이 노심(怒心)에 손상된 것보다 더 중한 것인가?

답하기를 그렇지 않다. 태양인의 열격병은 해역병보다 더욱 중하고 노심(怒心)에 손상을 받은 것이 애심(哀心)에 손상을 받은 것 보다 더욱 중하다. 태양인의 애심(哀心)이 심하면 표기(表氣)가 상하고 노심(怒心)이 폭발하면 리기(裏氣)가 상하는 고로 해역의 표증에는 슬퍼함을 경계하고 노여워하는 것을 멀리하라고 겸하여 말한 것이다.

2) 어떤 사람이 문기를 그러면 소양인의 노성(怒性)은 입과 방광의 기를 상하게 하고 애정(哀情)은 신과 대장의 기를 상하게 하고, 소음인의 락성(樂性)은 눈과 여(膂)의 기를 상하게 하고 희정(喜情)은 비와 위의 기를 상하게 하고, 태음인의 희성(喜性)은 귀와 뇌추의 기를 상하게 하고 락정(樂情)은 폐와 위완의 기를 상하게 하는가? 답하기를 그렇다.

☞ 해역은 애노 둘다 조심 / 열격은 노만 조심.

->이전 국영수예시와 마찬가지로 노를 강조한 이유.

✓

✓

✓ 정리하면

치법	해역	戒深哀 遠嗔怒 修清定 (계심애 원진노 수정청)	
	열격	遠嗔怒 斷厚味 (원진노 단후미)	
	열격>해역	噎膈病이 太重於解僂病 (열격이 해역보다 중함=심각)	
	노심>애심	怒心所傷者이 太重於哀心所傷 (노심손상이 애심손상보다 중함)	
사상인	감정	감정이 상하게 하는 것	
소양인	노성	口(입)	방광
	애정	신	대장
소음인	락성	目(눈)	배려
	희정	비	위
태음인	희성	耳(귀)	뇌추
	락정	폐	위완

[15-11]

○太陽人 大便이 一則宜滑也오 二則宜體大而多也며

小便이 一則宜多也오 二則宜數也며

面色이 宜白不宜黑하며

肌肉이 宜瘦不宜肥하고

鳩尾下에 不宜有塊니 塊小則病輕 而其塊이 易消오 塊大則病重 而其塊이 難消니라

태양인의 대변은 첫째로 활(滑)한 것이 좋고 둘째로 덩어리가 굵고 많은 것이 좋으며, 소변은 첫째로 많은 것이 좋고 둘째로 자주 보는 것이 좋다. 얼굴빛은 흰 것이 좋고 검은 것은 좋지 않으며, 살은 여윈 것이 좋고 살찐 것은 좋지 않다. 구미(鳩尾)아래에 뭉친 것이 있으면 좋지 않으니 덩어리가 작으면 병이 경하며 그 덩어리는 쉽게 없어지나 덩어리가 크면 병이 중하고 그 덩어리가 없어지기 어렵다.

✓ 정리하면

대변	宜	첫째로	滑	둘째로	體大而多
소변		첫째로	多	둘째로	數
면색		白	不宜	黑	
기육		瘦	不宜	肥	
구미하		不宜有塊	塊小	病輕 易消	
			塊大	病重 難消	

✓ 면색흑/기육비(살짐)/종괴: 다 순환이 안되는 것!

本草所載 太陽人病 經驗要藥 單方十種 及 李梴 龔信 經驗要藥 單方二種

본초서에 있는 태양인병에 경험된 주요 단방 10종 및 이천·공신의 경험된

단방 2처방

*본초서= 신농본초경

本草曰, 五加皮, 治兩脚疼痺, 骨節攣急, 痿躄, 小兒三歲, 不能行, 服此, 便行走.

본초서에서 이르기를 오가피(땃드름)는 양쪽 다리가 아프고 저리거나, 뼈마디에 쥐가 나며 땅기거나, 걷지 못하는 것을 치료한다. 아이가 3세가 되도록 걷지를 못하였는데, 이를 복용하고 바로 걸어 다니게 되었다.

- 오가피: 양다리가 아프고 저리고 뼈관절이 당기고 경련 + 저리면서 걷지 못하는 것

- 소아마비같은게 아니라 일시적인 영양불량이었을 것.

○ 松節, 療脚軟弱.

송절은 다리가 무르고 약한 것을 치료한다.

- 송절: 소나무 줄기, 마디 갈라지는 곳 모아놓은 약재 : 다리에 힘이 없는 것 치료

→ 오가피, 송절 = 해역 치료

○ 木苳, 止嘔逆, 煮汁飲之, 最佳.

모과(모과의 열매)는 구역질을 멈추게 한다. 삶아 즙을 마시는 것이 가장 좋다.

모과: 구역을 그치게 함 → 열격 치료

○ 葡萄根, 止嘔噦, 濃煎取汁, 細細飲之, 佳.

포도근(포도의 뿌리)은 구토와 딸꾹질을 멎게 한다. 진하게 다린 물을 조금씩 마시면 좋다.

포도근 → 열격 치료

○ 獼猴桃, 治熱壅, 反胃, 取汁服之, 藤汁, 至滑, 主胃閉吐逆, 取汁服之, 甚佳.

미후도(다래)는 열이 막아서 된 반위를 치료한다. 즙을 내서 복용한다. 덩굴의 즙은 매우 매끄러워서 위가 막혀 토하는데 주로 쓰며, 즙을 내서 복용하는 것이 매우 좋다.

미후도 → 반위 치료

○ 蘆根, 治乾嘔噎, 及五噎, 煩悶, 蘆根五兩, 水煎, 頓服, 一升, 不過三升, 卽差.

노근은 헛구역질과 오열로 가슴이 답답한 것을 치료한다. 노근 5냥을 물에 달여 1되를 단번에 마시니, 3되를 넘지않고 즉시로 낫는다.

- 노근 = 갈대뿌리 : 목메는 증상을 해결 (가슴답답)

- 頓服 = 한꺼번에 먹음 / 一升 = 한그릇 단위

○ 蚌蛤, 治反胃吐食.

방합은 반위로 토하는 것을 치료한다.

- 방합 = 조개

○ 鯽魚, 治反胃.
붕어는 반위를 치료한다.

○ 蓴, 和鯽魚, 作羹食之, 主反胃, 食不下, 止嘔.
순채는 붕어와 함께 끓여 먹는다. 반위로 음식을 내려 보내지 못하는 것을 다스리고, 구토를 멎게 한다.

- 순(나물) : 미끈한 우묵가사리 같이 코팅된, 민물에서 자라는 것

- 붕어와 함께

○ 蕎麥, 實腸胃, 益氣力
모밀은 장과 위를 실하게 하고, 기력을 더해 준다

+) 참고: 교맥 = 메밀 / 소맥 = 밀 / 대맥 = 보리

○ 李梴曰, 杵頭糠, 主噎, 食不下, 咽喉塞, 細糠一兩, 白粥清調服
○ 龔信曰 蛭蛤, 治反胃
이천이 말하기를 저두강(절구 방망이 끝에 묻은 가는 겨)은 목이 막혀서 음식을 내려 보내지 못하는 것과 목구멍이 막힌데 주로 쓴다. 자잘한 겨 1냥으로 흰죽을 쑤어 숟가락에 타서 복용한다.
공신이 말하기를 방합은 반위를 치료한다.

☞ 저두강 = 쌀 껍질을 벗기려고 찧으면 살겨가 엉겨붙는 것 (현대에 마그네슘보충제 같은것)

☞ 향산화 작용이 강하고 기능 향상시키는거 ->매운거 색이 진한거 향이센거(고추, 마늘)

☞ 음식물이 내려가지 않을 때 or 목구멍이 막혔을 때

✓ 정리하면

약재	주치
五加皮 오가피	治兩脚疼痛, 骨節攣急, 痿痺
松節 송절	療脚軟弱.
木菰 모과	止嘔逆
葡萄根 포도근	止嘔噦
獼猴桃 미후도	熱壅, 反胃 [반위]
蘆根 노근	乾嘔噎 [가슴 답답]
蚌蛤 방합	反胃吐食
鯽魚 즉어	反胃
蓴 순	和鯽魚, 作羹食之, 主反胃, 食不下, 止嘔.
蕎麥 교맥	實腸胃, 益氣力
杵頭糠 저두강	噎, 食不下 咽喉塞
蛭蛤 방합	反胃

新定 太陽人病 應用設方藥 二方 새로 정한 태양인병의 주요 2처방

앞에선 응용'요약'이라 했었음

五加皮壯脊湯 오가피장척탕	표 증	모과	포도 근	노근	앵도육	오가피	교맥미	청송절	
獼猴藤植腸湯 미후등식장탕	리 증	모과	포도 근	노근	앵도육	오가피	미후도	송화	저두 강

구성은 비슷: 미후도 들어가냐 안들어가냐 / 송화나 송엽이나 정도의 차이

청송절 = 소나무 이파리로 대신할 수 있음

미후도 = 산다래 : 줄기로 대신할 수 있음

1. 五加皮壯脊湯 오가피장척탕

五加皮 四錢, 木苽 · 青松節 各二錢, 葡萄根 · 蘆根 · 櫻桃肉 各一錢, 蕎麥米 半匙. 青松節, 闕材, 則以好松葉代之. 右方治表證.
오가피 4돈, 모과 · 청송절 각2돈, 포도근 · 노근 · 앵도육 각1돈, 교맥미 반 숟가락. 청송절이 없는 약재이면 좋은 송엽으로 대체한다. 이 처방은 표증을 치료한다.

✓ 앵도육은 앞(신농본초경)에서 언급되지 않았음!!

2. 獼猴藤植腸湯 미후등식장탕

獼猴桃 四錢, 木苽 · 葡萄根 各二錢, 蘆根 · 櫻桃肉 · 五加皮 · 松花 各一錢, 杵頭糠 半匙. 獼猴桃, 闕材, 則以藤代之. 右方治裏證.
미후도 4돈, 모과 · 포도근 각2돈, 노근 · 앵도육 · 오가피 · 송화 각1돈, 저두강 반 숟가락. 미후도가 없는 약재이면 덩굴로 대체한다. 이 처방은 리증을 치료한다.

凡菜果之屬, 清平疏散之藥, 皆爲肝藥, 蛤屬, 亦補肝

무릇 채소와 과일의 부류들은 맑고 고르며 성기고 담백한 약들로 모든 간의 약이다. 조개의 부류도 역시 간을 보한다.

채소, 과일 = 清平疏散청평소담 = 肝에 속함

>> 여기서 간? liver가 아니라, 태양인의 편소지장으로서의 간

조개 = 간을 보함

論曰, 藥驗, 不廣者, 病驗, 不廣故也. 太陽人數, 從古稀少, 故古方書中, 所載證藥, 亦稀少也. 今, 此五加皮壯脊湯, 獼猴藤植腸湯, 立方, 草草, 雖欠不博, 而若使太陽人, 有病者, 因是二方, 詳究其理, 而又變通置方, 則何患乎無好藥

哉.

논하여 말하기를 약의 경험이 넓지 못한 것은 병의 경험이 넓지 못하기 때문이다. 태양인 수는 예로부터 매우 적어서 옛날 의서에도 이에 대한 증상과 약을 실은 것이 또한 매우 드물다. 지금 이 오가피장척탕과 미후등식장탕의 처방을 만든 것이 보잘 것 없고 비록 수가 모자라 두루하지 못하기는 하나, 만약 태양인이 병을 얻었을 때 이 두 가지 처방을 가지고 그 이치를 자세히 궁리하고 변통하여 새로운 처방을 만들 수 있다면 어찌 좋은 약인 없는 것을 걱정할 필요가 있겠는가?

약의 경험이 넓지 못한 것 = 병의 경험이 넓지 못한 것 = 태양인 수가 적기 때문

이제마 스스로도 태양인 병증 정리가 상대적으로 부족하다고 느낌

欠 >> 缺로 보아야한다!