

사상체질의학 12주차

<시험공지>

- 사상의학을 할 때 가장 기본적으로 외워야할 것들 : 시험 문제의 80% 정도

→ 미리 와플에 올려줄 테니까 원문을 한글 말고 **꼭 한자로 써야함**

→ 체형기상, 성질재간, 용모사기, 보명지주, 각 체질별 병증과 처방 등에 대한 내용

- 나머지 20%는 태음인, 태양인에서 공부를 얼마나 스스로 알아서 열심히 했는가 판단

→ 태음인, 태양인에서 내신다는 것 말고는 다른 언급은 없으셨음

01 위완한증

위완한증 (12-11 ~ 12-13)

* 기출 : 본문 빈칸 채우기(처방명) → 원문 형광펜 부분이 빈칸

[12-11]

1) 嘗治, 太陰人, 胃脘寒證, 癰病. 有一太陰人, 素(소증)有怔忡, 無汗, 氣短, 結咳矣. 忽焉又添出一證, 泄瀉, 數十日止, 即表病之重者也, 用太陰調胃湯加枳實皮一錢, 日再服十日, 泄瀉, 方止, 連用三十日, 每日流汗滿面, 素證亦減,

2) 而忽其家五六人, 一時瘟疫, 此人, 緣於救病, 數日不服藥矣. 此人, 又染瘟疫癰證, 粥食無味, 全不入口, 仍以太陰調胃湯加枳實・黃芩各一錢, 連用十日, 汗流滿面, 疫氣少減, 而有二日大便不通之證, 仍用葛根承氣湯五日, 而五日內, 粥食大倍, 疫氣大減, 而病鮮. 又用太陰調胃湯加枳實・黃芩, 四十日調理, 疫氣既減, 素病亦完.

1) 일찍이 태음인이 위완한증(胃脘寒證)의 온병(瘟疫)을 치료한 적이 있다. 태음인 한 사람이 평소에

정충(怔忡), 무한(無汗), 기단(氣短), 결해(結咳)가 있었는데 갑자기 한 증세가 더하여 설사가 수 십일이 되어도 멎지 않는데 이것은 표병(表病)으로 중증(重證)이다. 태음조위탕(太陰調胃湯)에 저근백피(枳根白皮) 1돈을 가하여 매일 2첩씩 10일간 썼더니 설사가 멎으므로 계속 30일을 쓰니 매일 얼굴에서 땀이 흐르고 본디 갖고 있던 병증도 나아갔다.

2) 그런데 별안간 그 집안사람 5, 6명이 한꺼번에 온역병에 걸려 이 사람이 그것을 간호하게 되어 수일간 약을 복용하지 못하였다. 또한 이 사람도 온병에 전염되어 입맛이 잃고 아무것도 먹지를 못한다. 곧, 태음조위탕에 승마(升麻)・황금(黃芩) 각 1돈을 가하여 계속 10일간 복약하게 하였더니 얼굴에서 땀이 흐르고 역기도 약간 덜 하는데 대변을 이틀간 보지 못하므로 곧 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 5일간 썼더니 5일 동안 죽을 2배로 먹고 역기도 대감(大減)하면서 병이 풀리는 것이다. 또한 태음조위탕에 승마・황금을 가하여 40일간 조리시켰더니 역기는 이미 풀렸고 본래 앓던 병증도 완치되었다.

1)

- 위완한증은 역증에 해당하는 병증 → 순증, 역증 구분은 보명지주로 하는데, 태음인은 호산지기가 문제가 있는지, 없는지에 따라 순증, 역증을 구분함

- 의미있는 한자 '素'(소증) → 정충, 무한, 기단, 결해

- 정충, 무한, 기단, 결해 + '설사' → 태음조위탕 + 저근백피 = 고기조위탕

→ 태음인에게 설사는 기액이 빠져나가는 것으로, 수분이 빠지기 때문에 문제가 됨

2)

- 밥을 먹지 못하기 때문에 승마, 황금을 가미함

→ 粥食無味, 全不入口 → 태음조위탕 + 승마, 황금 = 승금조위탕

- 汗流滿面(관찰요점) : 땀이 남(얼굴에 땀이 흐르는지가 포인트) → 열이 풀리는 것

- 大便不通 : 대변이 나오지 않음 → 이때의 변비는 장마비 같은 상황을 의미함

- '대변불통' → 갈근승기탕

소증: 怔忡, 無汗, 氣短, 結咳 泄瀉, 數十日不止 [설사]	태음조위탕 加 저근백피 1돈 = 고기조위탕
粥食無味, 全不入口 [식욕x]	태음조위탕 加 승마 황금 각1돈 = 승금조위탕
二日大便不通 [변비]	갈근승기탕

(+ 처방 설명하시면서 태음인 처방은 약재 하나가 더 들어가냐 마냐에 따라서 처방의 적응증이 달라지는 경우가 많다고 강조하심 → 언급하신 처방들 약재 정리해봄)

- 태음조위탕(태음인 기본처방) : 의이인 나복자 맥문동 길경 오미자 석창포 마황 건울
- 한다열소탕 : 의이인 나복자 맥문동 길경 황금 행인 마황 건울
- 한다열소탕에는 황금, 행인 / 태음조위탕에는 오미자, 석창포

- 열다한소탕(태음인 리병 기본처방) : 갈근 황금 고본 나복자 길경 승마 백지
- 갈근해기탕 : 갈근 황금 고본 길경 승마 백지
- 갈근해기탕과 열다한소탕은 나복자가 들어가는 것만 다름

- 갈근승기탕 : 갈근 황금 대황 승마 길경 백지
- 갈근승기탕에는 대황이 들어감

- 열다한소탕 + 대황 = 청폐사간탕 → 임상에선 청폐사간탕을 多用

[12-12] 結咳者, 勉強發咳, 痰欲出不出而或出, 曰結咳. 少陰人結咳, 謂之胸結咳. 太陰人結咳, 謂之頷結咳.
결해(結咳)라고 하는 것은 힘을 써서 기침을 하면서 가래를 뱉으려고 하여도 잘 떨어져 나오지 않기도 하고 혹 떨어져 나오기도 하는 것을 결해라 한다. 소음인 결해를 흉결해(胸結咳)라하고 태음인 결해를 함결해(頷結咳)라고 한다

- 結咳 : 매핵기를 말함 → 결해라는 것이 약한 부분에서 생긴다고 말하고 싶은 것임
- 소음인은 흉 / 태음인은 함 → 각 체질에서 약한 부분(=편소지장의 신체부위)

[12-13] 大凡瘟疫, 先察其人素病如何, 則表裡虛實, 可知已. 素病寒者, 得瘟疫, 則亦寒證也. 素病熱者, 得瘟疫, 則亦熱證也. 素病輕者, 得瘟疫, 則重證也. 素病重者, 得瘟疫, 則險證也.
대개 온역은 먼저 그 사람의 평소의 병이 어떠한가를 살펴보아야 표리허실(表裏虛實)을 잘 알 수 있는 것이다. 평소 한증(寒證)의 병이 있는 사람이 온병(瘟疫)에 걸리면 역시 한증이 되고 평소 열증의 병이 있는 사람이 온병에 걸리면 역시 열증(熱證)이 된다. 평소의 병이 경(輕)한 사람이 온병에 걸리면 중증(重證)이 되고 평소 병증이 중(重)한 사람이 온병에 걸리면 험증(險證)이 된다.

- 그 사람의 원래 소증, 표리허실이 어떠하였는지에 따라 현재 병의 특성이 결정됨
- 한태음인 : 태음조위탕 / 열태음인 : 열다한소탕
- 편소지장에 있어서 장부대소의 균형이 어떻게 되는지를 살펴봐야 함
- 팔강을 잘 결정해야 처방을 잘 쓸 수 있음

땀에 대한 증례 (12-14)

[12-14]

- 1) 有一太陰人素病, 咽嗌乾燥, 而面色青白, 表寒或泄. 盖, 咽嗌乾燥者, 肝熱也, 面色青白하며, 表寒或泄者, 是 胃脘寒也 이니. 此病, 表裡俱病, 素病之太重者也.
 - 2) 此人, 得瘟病, 其證, 自始發日至于病解, 二十日. 大便初滑或泄, 中滑末乾, 每日二三四次, 無日不通, 初用寒多熱少湯, 病解後, 用調理肺元湯, 四十日調理, 僅僅獲生.
 - 3) 此病始發, 大便, 或滑或泄, 而六日內, 有額汗, 眉稜汗, 顴汗, 飲食起居, 有時如常, 六日後, 始用藥(=한다열소탕), 七日, 全體面部髮際以下, 至于脣頤, 汗流滿面, 淋漓洽足, 而汗後, 面色帶青, 有語訥證, 八日九日, 語訥耳聾, 而脣汗還爲顴汗, 顴汗還爲眉稜汗, 汗出微粒, 乍出乍入, 而只有額汗, 呼吸短喘矣.
 - 4) 至于十日夜, 額汗還入, 而語訥耳聾, 尤甚, 痰涎壅喉, 口不能嚥, 病人, 自以手指, 探口拭之, 而出十一日, 呼吸短喘, 尤甚. 至于十二日, 忽然, 食粥二碗, 斯時, 若論其藥, 則熊膽散, 或者可也, 而熊膽關材, 自念此人, 今夜必死矣. 當日初昏, 呼吸, 暫時少定.
 - 5) 十三日鷄鳴時, 髮際有汗. 十四日, 十五日, 連三日, 食粥, 二三碗, 額汗, 眉稜汗, 顴汗, 次次發出, 面色脫青. 十六日, 臆汗始通, 稍能嚥痰, 語訥亦愈. 至于二十日, 臆汗, 數次大通, 遂能起立房中, 諸證皆安, 而耳聾證, 則自如也.
- 病解後, 用藥=조리폐원탕調理, 四十日, 耳聾目迷, 自祛.

- 1) 태음인 한사람의 평소 병이 목안이 건조하고 얼굴빛이 청백(淸白)하며 몸이 차고 설사를 하는 증세가 있었다. 목안이 건조한 것은 간열(肝熱)이고 얼굴이 청백하며 몸이 차고 혹 설사 하는 것은 위완한(胃脘寒)이다. 이 병은 표리가 모두 병이 된 것이니 평소 병이 매우 중(重)한 것이다.

- 2) 이 사람이 온병이 전염되었는데 그 증세가 병이 시작하여 풀리기까지 20일 사이에 대변이 처음에는 활(滑) 혹 설사하기도 하고 중간은 활하다가 끝에 가서는 건조한 대변을 보기도 한다. 이와 같이 하기를 매일 3,4회씩 보지 않는 날이 없었다. 그리하여 처음 약은 한다열소탕(寒多熱少湯)을 쓰고 병이 풀린 후에 조리폐원탕(調理肺元湯)을 40일 동안 써서 조리를 시켰더니 겨우 생명을 구하게 된 것이다.
- 3) 이 병이 처음 시작할 때는 대변이 혹 묽기도 하고 혹 설사하기도 하며 6일까지는 이마 눈썹 뺨에 땀이 나고 음식과 기거가 평소와 같으므로 6일 후에 비로소 약=한다열소탕을 쓰니 7일에는 발제이하 입술과 턱에 이르기까지 얼굴 전체에 땀이 줄줄 흐른다. 땀이 흡족히 흘러 떨어지더니 땀이 난 후에 얼굴색이 청색을 띠고 어눌증(語訥證)이 일어나더니 8,9일에는 어눌증에 이농증(耳聾證)을 더하면서 입술의 땀이 다시 뺨의 땀으로 돌아가고, 뺨의 땀이 돌아가 눈두덩이의 땀으로 되면서, 땀이 미립(微粒)모양으로 때로 있다 없다 하더니 단지 이마의 땀만 있고 숨이 몹시 차다.
- 4) 10일째 되던 밤에는 이마의 땀마저 들어가고 어눌증과 이농증은 더욱 심하여지고 가래덩어리가 목에 막혀서 입으로 뱉어내지 못하고 병인이 손가락으로 더듬어 끄집어내었다. 11일에 호흡곤란이 더욱 심하여지더니 12일에 이르러 갑자기 죽을 2사발이나 먹었다. 이런 때는 웅담산(熊膽散)이나 써보는 것이 좋겠지만 웅담도 없으니 나의 생각으로는 이 사람이 반드시 오늘 저녁에 죽을 것이라고 짐작하고 있었다. 그러나 그 사람이 그날 초저녁부터 호흡이 잠깐 안정되는 것이다.
- 5) 13일 새벽 계명(鷄鳴)시부터는 면부 발제(面部髮際)에 땀이 나고 14, 15일 연 3일간 죽을 2, 3사발씩이나 먹으면서 이마 눈두덩 뺨에 차차 땀이 나고 얼굴에 청색이 없어지고 16일에는 가슴에서 비로소 땀이 나고 가래를 조금씩 뱉고 어눌증도 또한 없어졌다. 20일에 이르러서는 가슴에서 수차례 많은 땀이 나고 드디어 차츰 방 안에서 걷기도 하고 모든 증상이 다 나아왔으나 아직 이롱증이 남아있다. 그리하여 병이 풀린 후에 약을 써서 40일간 조리 시켰더니 이롱증과 어지러운 증세도 스스로 없어지는 것이다.

1)

- 소증 : 咽嗑乾燥(간열), 而面色靑白, 表寒或泄(위완한) → 열증과 한증이 겹쳐 있음
- 위완수한표한병 : 태음조위탕(의이인, 건을) / 간수열리열병 : 열다한소탕(갈근, 대황)

2)

- 이 사람은 표리구별이라는 것이 포인트
- 大便初滑或泄, 中滑末乾 : 기액이 빠져나가다가 나중에 기액이 보존되어 좋아짐
→ 대변을 관찰 → 기액과 관련
- 처음에 한다열소탕 쓰다가, 나오니까 조리폐원탕을 씀
- 태음조위탕 : 의이인 나복자 맥문동 길경 오미자 석창포 마황 건을
- 한다열소탕 : 의이인 나복자 맥문동 길경 황금 행인 마황 건을
- 조리폐원탕 : 의이인 나복자 맥문동 길경 황금 마황
- 처방 구성의 차이 알아두기
- 간열을 치료한 약재 : 황금

3)

- 汗流滿面 : 땀이 송글송글 맺혀서는 풀리지 않음 → 이게 포인트
- 심각한 감염 상황이라 열이 40도까지 오르고, 소변도 거의 안나오고, 폐렴이 있는 상태

4)

- 웅담산 : 교수님도 안써봄. 항생제 느낌의 처방

5)

- 병이 낫고 나서 약을 사용 → 조리폐원탕

(+ 태음인은 소음인, 소양인에 비해 병증을 이해하기 위한 자료가 부족 → 소음인, 소양인은 갑오본 공부를 안하지만, 태음인은 갑오본 원문 공부를 할 예정)

02

조열증

개괄

- [13-1] ~ [13-28] 간수열리열병 조문 / [13-29] ~ [13-40] 태음인 범론 조문

- 간 부분에 열이 생긴 병증 → 간열증
- 기액이 부족해진 병증 상태인 간열보다 더 심해져서 조증이 나타나는 병증 → 조열증
- 그리고 음혈모갈증
- 보통 조열증 / 음혈모갈증 두가지로 구분하지만, 조열증을 간열증이 심해진 병증으로 구분해서 설명하심
- 갈근해기탕-열다한소탕-녹용대보탕 → 간열-조열-음혈모갈 순서대로

기액순환에 대한 내용 (13-1 ~ 13-5)

[13-1] 朱肱曰, 陽毒, 面赤斑, 斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血, 宜葛根解肌湯・黑奴丸. 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尙煖, 斡開其口, 灌黑奴丸, 藥下咽, 卽活.

주굉(朱肱)이 말하기를 양독(陽毒)은 얼굴에 붉은 반점이 있는데 그 반점이 마치 비단 무늬같이 나타나기도 하고 목구멍이 아프며 가래에 피고름이 섞여서 나오는 것이다. 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)・흑노환(黑奴丸)을 써야 한다. 양독과 괴증상한(壞證傷寒)은 의서(醫書)에 치법(治法)이 별로 없지만 정신과 기혈(氣血)이 이미 마른 것이라도 가슴에 아직 따뜻한 기가 있으면 입을 벌려 흑노환을 물에 부어 넣어 약물이 목구멍으로 넘어가기만 하면 즉시 살아난다.

- 이제마는 병증 아이디어를 선대들의 어떤 파트에서 가져왔는지 기록해 두었으나, 태음인 파트는 소음인, 소양인에 비해 이 부분이 조금 약함 → 13-1 ~ 13-4 조문이 선대 파트

- 陽毒 : 아토피는 아니고, 건선. 피부감염. 장미색 비강진 + 호흡기계 질환
→ 여기에 갈근해기탕, 흑노환 사용
- 포인트 : 주굉이 말한 양독이 간열로 인한 증상

[13-2] 李梴曰, 微惡寒發熱, 宜葛根解肌湯. 目疼鼻乾, 潮汗閉澀, 滿渴狂譫, 宜調胃承氣湯. 熱在表, 則目疼不眠, 宜解肌湯. 熱入裡, 則狂譫, 宜調胃承氣湯.
이천(李梴)이 말하기를 미오한(微惡寒) 발열(發熱)에 마땅히 갈근해기탕이오 눈알이 아프고 콧속이 마르며 땀이 쏟아지다가 막히고 조갈이 심하며 미친 사람같이 헛소리를 하면 조위승기탕(調胃承氣湯)을 쓰는 것이 좋다. 열이 표(表)에 있으면 눈이 아프고 잠을 이루지 못하니 마땅히 해기탕(解肌湯)을 쓰고 열이 리(裏)에 들어가면 미친 사람같이 헛소리를 하니 마땅히 조위승기탕을 쓴다.

- 熱在表 : 갈근해기탕 / 熱入裡 : 조위승기탕

(교수님 설명)

- 열이 겉에 있는 경우 : 간열 → 갈근해기탕
- 열이 속에 있는 경우 : 조열 → 열다한소탕

[13-3] 龔信曰, 陽明病, 目疼, 鼻乾, 不得臥, 宜葛根解肌湯.
공신(龔信)이 말하기를 양명병(陽明病)에 눈알이 아프고 콧속이 마르고 잠을 이루지 못하면 마땅히 갈근해기탕(葛根解肌湯)을 쓴다.

- 이 조문의 갈근해기탕은 공신의 갈근해기탕 / 이제마의 갈근해기탕은 이와 구성이 다름

[13-4] 三陽病深, 變爲陽毒, 面赤眼紅, 身發斑黃, 或下利黃赤, 六脈洪大, 宜黑奴丸.
삼양병(三陽病)이 심하면 양독으로 변한다. 얼굴이 붉고 눈이 빨가며 몸에는 노란 반점이 생기고 간혹 황적색의 설사를 하며 육맥(六脈)이 홍대(弘大)하면 마땅히 흑노환(黑奴丸)을 쓴다.

- 陽毒 : 양명경 라인의 증상이 나타나는 것을 이야기함
- 장염으로 인해 간에도 영향을 준 상황 같음

[13-5] 論曰, 右諸證, 當用葛根解肌湯・黑奴丸.
위의 증에는 갈근해기탕 흑노환을 사용한다.

- 論曰 : 이제마의 의견 → 갈근해기탕, 흑노환
- 이제마의 갈근해기탕 : 갈근 황금 고본 길경 승마 백지 → 나복자는 x

맥에 대한 내용 (13-6 ~ 13-9)

[13-6] 靈樞曰, 尺膚熱深, 脈盛燥者, 病瘟也.
영추(靈樞)에 말하기를 척맥(尺脈) 부위 피부에 열이 깊어서 맥(脈)이 성(盛)하고 조증(燥證) 있는 자는 온병(瘟病)이다.

- 온병의 맥이 나타남
- 熱深 / 燥 → 간열 떠올릴 수 있음

[13-7] 王叔和曰, 瘟病脈, 陰陽俱盛, 病熱之極, 浮之而滑, 沈之散澀.
왕숙화(王叔和)가 이르기를 온병맥(瘟病脈)은 음양(陰陽)이 다 같이 성하니 병의 열이 극도에 이르면 맥이 부지이활(浮之而滑)하며 침지이산삽(沈之而散澀)하다.

- 온병에 대한 이야기를 하기 위해 써놓음

[13-8] 脈法曰, 瘟病二三日, 體熱, 腹滿, 頭痛, 食飲如, 故脈直而疾, 八日死.
瘟病四五日, 頭痛, 腹滿而吐, 脈來細而強, 十二日死.
八九日, 頭身不痛, 目不赤, 色不變而反利, 脈來澁, 按之不足, 舉時大, 心下堅, 十七日死.
맥법(脈法)에 온병 2~3일에 몸에 열이 나고 배가 부르며 두통이 있으며 음식은 전과 같고 맥이 곧고 빠르면 8일에 죽고 온병이 4~5일이 되어서 두통이 나고 배가 부르면서 토하고 맥이 가늘면 서 굳세게 나오면 12일에 죽는다. 또 8~9일이 되어서 머리와 몸이 아프지 않고 눈알이 붉거나 열 굴색이 변하지 않으나 설사를 하며 맥이 삽(澁)해도 누르면 없어지고 들면 크게 나타나고 명치 밑 이 단단하면 17일에 죽는다.

- 죽는 맥을 이야기함
- 조열증이라는 것이 심각한 병증임
- 體熱, 腹滿, 頭痛 : 조열증이고, 맥이 이렇게 나타나면 죽음
- 원인은 간열

[13-9] 龔信曰, 瘟病, 穰穰大熱, 脈細小者, 死, 瘟病, 下利痛甚, 死.
공신(龔信)이 말하기를 온병에 열이 몹시 성하나 맥이 가늘게 나오면 죽는 것이고 온역에 설사가 심하고 배가 몹시 아픈 것도 죽는다.

- 심각한 장염 상황. 죽는 상황임

공신의 경험 (13-10 ~ 13-11)
[13-10] 萬曆丙戌, 余寓大梁, 瘟疫大作, 士民多斃.
其證, 增寒壯熱, 頭面項頰赤腫, 咽喉腫痛, 昏憤. 余發一秘方, 名二聖救苦丸, 大黃四兩, 豬牙皂角二兩, 麵糊和丸, 菉豆大, 五七十丸, 一服卽汗, 一汗卽愈, 稟壯者, 百發百中. 皂角, 開關竅, 發其表, 大黃, 瀉諸火, 通其裡.
공신이 또 말하기를 병술년(丙戌年)에 내가 대량(大梁) 땅(=마을)에 살고 있을 때에 온역병(瘟疫病)이 크게 유행하여 많은 사람들이 죽어 가는 것을 보았다.
그 온역병의 증상을 말하면 병이 발생하는 초기부터 크게 고열이 발하면서 오한을 거듭하는 것이다.
그리고 이어 머리에서부터 얼굴 목 뺨에 이르기까지 붉게 붓고(=붉은 종기가 난다) 인후에 염증을 일으켜 아프며 혼수상태가 된다. 그리하여 내가 한 가지 비방을 발명하고 이성구고환(二聖救苦丸)이라 하였다. 대황(大黃) 4양(兩)과 저아조각(猪牙皂角) 2량(兩)을 가루로 만들어 밀가루 풀로 환을 만드는데 녹두알 크기로 한다. 복용법은 1회에 50~70환(丸)을 한번만 먹게 한다. 한번 먹고 즉시 땀이 나고 그 병이 풀리니 건강한 사람들에게는 백발백중으로 낫는 것이다. 조각(皂角)은 땀구멍을 열고 사기(邪氣)를 땀으로서 밖으로 발산시키고 대황은 속에 있는 모든 열화와 사기(邪氣)를 설사로서 아래로 통하게 하는 것이다.

- 赤腫 : 볼거리, 결핵성 임파선염 → 대황, 저아조각으로 작은 환을 만들어서 먹게 함
- 저아조각 : 고춧가루를 뺀아서 먹인 느낌 → 발산작용
- 대황 : 설사 시킴 → 장마비

[13-11] 感四時不正之氣，使人，痰涎壅盛，煩熱，頭疼身痛，增寒壯熱，項強睛疼，或飲食如常，起居依舊，甚至聲啞，或赤眼口瘡，大小腮腫，喉痺，咳嗽稠粘，噴嚏.

신(=공신)이 또 말하기를 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절에 바르지 못한 나쁜 사기(邪氣)에 감염되면 사람으로 하여금 가래가 성하여 막히고 번열(煩熱)이 나고 머리와 온 몸이 쑤시고 아프면서 또 열이 크게 나서 오한증이 점점 더하여 목이 뻣뻣하며 눈동자가 쑤시며 혹은 음식과 기거하는 것은 보통 때와 다름없고 심하게 되면 목이 쉬고 혹은 눈이 벌겍게 되고 입안이 험고 뺨에는 크고 작은 부스럼이 생기며 목구멍이 아파서 기침하게 되면 끈끈한 가래가 나오고 재채기를 하는 것이다.

- 간조열증 증상들 → 구체적인 증상들은 열이 많이 나거나, 피부 증상, 호흡기 증상
- 피부 증상 : 燥의 범주 / 호흡기 증상 : 태음인의 간대폐소한 현상

이제마의 처방 (13-12)

[13-12] 論曰，右諸證，增寒壯熱燥澁者，當用皂角大黃湯・葛根承氣湯。

頭面項頰赤腫者，當用皂角大黃湯・葛根承氣湯。

體熱腹滿自利者，熱勝，則裡證也，當用葛根解肌湯。

寒勝，則表證，而太重證也，當用太陰調胃湯，加升麻・黃芩。

우측 제증에 증한장열조삽자는 조각대황탕(皂角大黃湯)・갈근승기탕(葛根承氣湯), 두면 항협적중자는 조각대황탕・갈근승기탕, 체열복만자리자는 열이 승하면 이증(裏證)이니 갈근해기탕(葛根解肌湯), 한이 승하면 표증(表證)이 태중이니 태음조위탕(太陰調胃湯)에 승마・황금을 가한다.

- 원문을 보면 처방을 어떻게 쓰라고는 되어있지만, 그 이전에 대해서는 소음인, 소양인에 비해 태음인은 부족함 → 태음이에 대한 정리가 약함

- 燥澁 : 건조한 증상. 피부 증상일수도, 호흡기 증상일수도 → 이게 나오면 기액에 문제가 생긴 태음인 병증이라고 볼 수 있음 → 이걸 한(태음조위탕) / 열(갈근해기탕, 열다한소탕)로 나눠서 치료

→ 호흡기, 피부 증상이 함께 있을 때 → 간열증, 조열증 병증이라고 보면 됨

寒勝	기액의 <u>순환장애</u> or 기액의 <u>누설</u> (무한, 설사)	태음조위탕 加 승마, 황금(=승금조위탕)
熱勝	간부분의 열, <u>건조함</u> (변비)	갈근해기탕 조각대황탕 갈근승기탕

간열열증 증례 (13-13 ~ 13-14)

[13-13] 嘗治，太陰人，**肝熱熱證**癰病，有一太陰人素病，數年來，**眼病**，**時作時止**矣，此人，**得癰病**，**自始發日**，用**熱多寒少湯**，三四五日，大便，或滑或泄。**至六日**，有**大便**，**一日不通**之證，仍用**葛根承氣湯**，連三日，粥食大倍，又用三日，**疫氣**大減。**病解後**，復用**熱多寒少湯**，**大便燥澀**，則加**大黃一錢**，滑泄太多，則去大黃，如此調理二十日，其人完健。

태음인이 소병으로 **안병**이 있어서 때로는 나왔다가 때로 재발하곤 하였다. 이렇게 몇 해를 지내오던 참에 이 사람이 온병에 걸린 것이다. 1~5일 병 발생 첫 날 부터 **열다한소탕**을 3, 4, 5일을 계속 썼더니 대변이 흑 뭍기도 하고 흑 설사를 하다가 6일에 이르러서 **대변이 1일간 불통**하는 것이다. 그리하여 즉시로 쓴 것이 **갈근승기탕(葛根承氣湯)**이었다. 3일간 계속 썼더니 죽을 굶 배나 더 먹고 3일간 또 다시 썼더니 **역기**가 크게 풀리고 나온 것이다. 병해 후 다시 **열다한소탕(熱多寒少湯)**을 쓰니 **대변이 조삼하면 가 대항1돈**하고, 뭍거나 설사를 하면 대항을 빼고 썼다. 20일간 조리하니 완전히 건 강해졌다.

- **眼病** : 간열열증온병으로 봄
- **大便燥澀** : 변비가 있을 때도 간열이라고 봄
- 갈근승기탕 : 대항이 들어가는 처방
- 임상적으로는 열다한소탕 + 대항 = 청폐사간탕 → 사실 이렇게 많이 씀

병 발생 첫날	열다한소탕
6일째	대변불통 1일 (장이 마비되는 상태로 봄) ⇒ 갈근승기탕 : 대항
병이 풀린 뒤	열다한소탕 / 대변조삼 ⇒ 加 대항 1돈 *청폐사간탕 = 열다한소탕 + 대항

[13-14] 此病始發，**嘔逆嘔吐**，**昏憤不省**，重痛矣，末境，反爲輕證，十二日而病解。

이 병이 처음에는 구역구토(嘔逆嘔吐)하며 혼궤불성(昏憤不)하여 중통하더니 말경에 다시 가벼워져 12일로서 병이 풀린 것이다.

리열 온병 10세 아이 증례 (13-15 ~ 13-16)

[13-15] 一太陰人, 十歲兒, 得裡熱瘧病, 粥食全不入口, 藥亦不入口, 壯熱穢穢, 有時飲冷水, 至于十一日, 則大便不通, 已四日矣. 恆怯譫語, 日有百蟲滿室, 又有鼠入懷云, 奔遑匍匐, 驚呼啼泣, 有時熱極生風, 兩手厥冷, 兩膝伸而不屈, 急用葛根承氣湯, 不憚啼泣, 強灌口中, 卽日, 粥食大倍, 疫氣大解, 倖而得生. [13-16] 此病, 始發四五日, 飲食起居如常, 無異平人矣, 未境, 反爲重證, 十七日而病解.
[13-15] 10세된 아이가 리열 온병(裏熱 瘧病)에 걸렸다. 미음이거나 약도 전혀 입으로 넘기지 못하고 열이 가득차서 때로 냉수를 마시는 것이다. 이렇게 11일에 이르러서 대변을 못 본지 이미 4일이 되었다고 한다. 무서워서 겁을 내며 헛소리하기를 각종 벌레가 방안에 가득하다고 하며 또 내 몸으로 쥐가 들어온다고 하며 황급히 엎드려 엉금엉금 기며 놀라 소리 지르며 눈물을 흘리며 우는 것이다. 열이 극도에 이를 때는 동풍이 생겨 두 손이 차가워지는 것이다 (+무릎을 꿇다 구부렀다 할 수 없다.) 급히 갈근승기탕(葛根承氣湯)을 다려서 울고 있는 것도 꺼리지 않고 억지로 입안에 부어 넣었더니 그날로 미음을 굵으로 더 먹고 역기가 크게 풀려 요행으로 생명을 살린 것이다. [13-16] 이 병이 발생한 지 4~5일 동안은 먹는 것이나 앓고 서는 것이 떼떽하여 보통 사람과 다름이 없다가 나중에 도리어 중병으로 변하여서 17일로서 병이 풀린 것이다.

- 13-15)
- 온병 : 태음인 병증 → 조증과 관련 → 온병, 눈병, 변비 등이 같이 있을 수 있음
 - 결론 : 온병은 태음인 병증으로 보고 치료했음
 - 갈근승기탕을 입안에 강제로 넣음 → 바로 음식을 먹으면서 감염성 질환의 증상이 풀림

(13-17 ~ 13-18)

[13-17] 內經曰, 諸澁, 枯涸皴揭, 皆屬於燥.
내경에 말하기를 모든 조삽하여 갈갈한 것(澁)에 몸이 여위고 마르고 쭈글쭈글하게 되어 천하게 된 것은 모두 조삽(燥)에 속하는 것이라 하였다.
- 어떤 것을 조열로 볼지를 이야기함
[13-18] 論曰, 太陰人, 面色青白者, 多無燥證. 面色黃赤黑者, 多有燥證, 盖肝熱相燥而然也.
태음인이 면색이 청백자는 다무조증(多無燥證)하고 면색이 황적흑자는 다유조증(多有燥證)이니 모두 간열폐조(肝熱肺燥)하기 때문이다.

- 면색청백 = 위완한 : 설사, 오한 위주
 - 면색황적 = 간열 : 변비, 발열 위주
- 燥해진 원인 : 태음인의 편대지장인 간에 열증이 생기면서 편소지장인 폐의 기액이 부족해졌기 때문
- 간에 열증이 나타나면 조증이 항상 동반됨

수지초흑반창병 증례 (13-19)

[13-19] 嘗治，太陰人，**燥熱證，手指焦黑癰瘡病**，自左手中指，焦黑無力，二年內，一指黑血焦凝過掌心，而掌背浮腫，以刀，斷指矣。又一年內，癰瘡，遍滿全體，大者，如大錢，小者，如小錢，得病，已爲三年，而以壯年人，手力，不能役勞一半刻，足力，不能日行步三十里，以**熱多寒少湯，用藁本二錢，加大黃一錢**，二十八貼，用之，大便始滑，不過一二日，又秘燥，又用二十貼，大便不甚滑泄，而面部癰瘡，少差，手力足力，稍快有效矣。又用二十貼，其病快差。

내가 일찍이 태음인의 **간열폐조증(燥熱證)**을 치료하여 본 바 있다. 그 증상이 **손가락이 붉으레 검은 반점에 창병**이 있었다. 처음에 왼손 가운데 손가락이 붉으레 검게 되고 힘이 없더니 2년이 채 못 되어서 한 손가락이 검은 피가 탄 것처럼 영키어서 손바닥을 지나고 손등까지 부어 있는 것이다. 칼로 손가락을 잘라버렸더니 또 1년이 채 못 되어서 반창이 몸 전체에 두루 퍼진 것이다. 큰 것은 큰 엽전과 같고 작은 것은 작은 엽전과 만큼 되어 있다. 이런 악한 병에 잡힌 지 이미 3년이나 지내었다. 한창때인 청장년인 사람으로서 손에 힘이 없어 불과 반시간도 일 할 수 없고 다리 힘이 없어서 1일에 30회(*30리=12km)도 걷지 못하는 것이다. **열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본 2돈, 대황 1돈을 가하여** 28첩을 썼더니 대변이 비로소 묽어지다가 겨우 하루나 이틀을 지나더니 굳어지는 것이다. 그리하여 다시 20첩(10일)을 썼더니 대변이 심한 설사가 아니고 묽게 나감으로서 얼굴에 반창이 조금 차도가 있고 손의 힘 다리의 힘이 조금 효과가 있는 것이다. 다시 20첩을 쓰고 그 병이 쾌차하였다.

- 조열증
- 손가락이 검게 타서 반점으로 굼아버린 사람 → 감염으로 인한 혈관 폐쇄 질환
- 버거씨병이라고 보는 사람도 있음
- 피부 증상. 기액의 순환장애. 울체
- 열다한소탕에 고본, 대황을 가하여 씀

- 결론 : 열다한소탕을 통해 전염병을 치료한 예

조열증 vs 소갈 (13-20 ~ 13-23)

[13-20] 靈樞曰，二陽結，謂之消，**飲一溲二**，死不治。

註曰，**二陽結**，謂胃及大腸，熱結也。

영추에 이양결(二陽結)을 소(消)라 이름이니 **음수1 소변2(飲一溲二)**면 죽는 것으로 불치라고 하였고 주(註)에 이양결은 위와 대장의 열결(熱結)이라고 하였다.

- 飲一溲二 : 한잔을 먹는데, 소변을 두잔 봄 → 소변이 마시는 것보다 더 많이 나오면 기액이 빠져나오는 것이니까 **燥의 문제**가 생김
- 땀, 소변, 피부 증상 : 갈근해기탕, 열다한소탕 → 더 심해지면 녹용대보탕, 공진흑원단

[13-21] 扁鵲，難經曰，**消渴脈**，當得緊實而數，反得沈瀋而微者，死。

편작 《난경(難經)》에 **소갈** 맥은 긴실이삭(緊實而數)인데 오히려 침색(沈瀋)하고 미(微)한 것은 사증이다 하였다.

- 기액을 잃어버리니까 맥이 약해짐

[13-22] 張仲景曰，**消渴病，小便反多**，如飲水一斗，小便亦一斗，腎氣丸主之。

장중경이 **소갈**병에 **소변이 오히려 많아** 음수 일두(一斗)에 소변이 역시 일두하면 신기환(腎氣丸)으로 치료한다.

- 장중경의 소갈에 대한 인식
- 태음인의 소갈 : 소변이 많음

[13-23] 論曰, 此病, 非少陽人消渴也, 卽太陰人燥熱也.
此證, 不當用腎氣丸, 當用熱多寒少湯, 加藁本・大黃.
이병은 소양인 소갈병이 아니고, 태음인 조열병이다. 신기환(腎氣丸)을 사용치 말고 열다한소탕(熱多寒少湯)에 고본과 대황은 가하여 쓴다.

- 태음인 조열병이다! → 기액의 손상, 물이 나간다하면 태음인의 조증을 말함

갈근해기탕	양독 (피부증상)
갈근승기탕	변비
열다한소탕	조열

죽은 사람 증례 (13-24)

[13-24]
사례1) 嘗治, 太陰人, 年五十近衰者, 燥熱病, 引飲, 小便多, 大便秘者, 用熱多寒少湯, 藁本二錢, 加大黃一錢, 二十貼, 得效矣. 後一月餘, 用他醫藥五貼, 此人, 更病, 復用熱多寒少湯, 加藁本・大黃, 五六十貼, 用藥時間, 其病僅僅支撐, 後終不免死, 又嘗治, 사례2) 太陰人, 年少者, 燥熱病, 用此方, 三百貼, 得支撐一周年, 此病, 亦不免死, 此人, 得病一周年, 或間用他醫方, 未知緣何, 故也. 盖燥熱, 至於飲一溲二, 而病劇, 則難治. 凡太陰人, 大便秘燥, 小便覺多, 而引飲者, 不可不早治豫防.
사례1) 태음인 50세 가까운 사람이 심히 쇠약해진 것이다. 이 사람이 조열증으로 물을 많이 마시고 소변을 많이 누며 변비가 되었다. 열다한소탕(熱多寒少湯)을 쓰는데 고본 2돈, 대황 2돈을 가해서 20첩을 쓰고 효과를 보았다. 그 후 1개월 후에 다른 의원에게서 약을 5첩 쓰니 다시 병이 재발되는 것이다. 그리하여 또 다시 열다한소탕을 쓰는데 고본과 대황을 가해서 50~60첩을 썼더니 약을 쓰는 기간에 겨우 지탱하다가 결국 사망하였다. 사례2) 태음인 년소자가 조열병에 걸렸다. 열다한소탕에 고본・대황을 가하여 300첩을 썼는데 겨우 1년 지탱하다가 사망을 면치 못하였다. 이 사람이 병이 생긴 지 1년쯤 되었으니 간혹 다른 의사의 처방을 썼는 지 알 수 없는 연고로 어찌 할 수 없도다. 대개 조열병은 물 한 사발 마시면 오줌 두 사발을 누며 병이 극에 이르면 고치기 어렵다. 무릇 태음인이 대변이 비조(秘燥)하고 오줌이 많다고 생각되며 물이 많이 먹히거든 빨리 약을 써서 미리 예방해야 한다.

- 사례 1) 열다한소탕 말고 다른 처방 쓰면 병이 악화될 수 있음
- 사례 2) 병이 진행되면 고치기 어려움
- 소변이 많이 나오는 질병은 치료하기가 아주 어려움 → 미리 예방해서 치료해야함

양생의 중요성 (13-25)

[13-25] 此病, 非必不治之病也. 此少年, 得病用藥一周年後, 方死, 盖此病原委, **侈樂無厭, 慾火外馳, 肝熱大盛, 肺燥太枯**之, 故也. 若此少年, **安心滌慾**一百日, 而用藥, 則焉有不治之理乎.

盖自始病日, 至于終死日, 慾火無日不馳, 故也. 諺曰, 先祖德澤, 雖或不得, 一一箇報, 而恭敬德澤, 必無一一不受報, 凡無論某病人, 恭敬其心, 蕩滌慾火, 安靜善心, 一百日, 則其病無不愈, 二百日, 則其人無不完, 恭敬德澤之箇箇受報, 百事皆然, 而疾病尤甚.

이 병은 반드시 불치병이 아니다. 이 젊은 사람은 병을 얻고 약을 사용한지 1년 후에 비로소 죽었다. 대개 이병은 원래 **치락무엄(侈樂無厭)**하여 **불같은 욕심(慾火)**이 **매우 심하여 간열이 크게 성하게 되고 폐조가 매우 심하게 된** 까닭이다. 만약 그 젊은 사람이 백일동안 **안심척욕(安心滌慾)**하면서 약을 쓴다면 어찌 불치병이 될 이치가 있겠는가?

대개 병이 시작하는 날로 부터 죽는 날까지 욕심이 불같이 밖으로 내달리지 않는 날이 없었기 때문인 것이다. 속담에 말하기를 당대 이전의 대대 어른들의 덕택은 비록 낱알이 갇을 수는 없지만 마음을 공손히 삼가는 은덕의 혜택은 반드시 하나하나 갇음을 받지 않는 것이 없다 하니 무릇 어떠한 병자를 막론하고 그 마음을 삼가 공경하며 불같은 욕심을 깨끗이 씻고 마음을 가라앉히고 착한 마음을 가지면 100일이면 그 병이 낫지 않을 이치가 없고 200일을 안정하여 치료하면 그 사람이 완전하게 되지 않을 이치가 없는 것이다. 마음을 공손히 삼가는 덕택을 낱알이 받는 것과 같이 100가지 일(=모든 일)이 다 그러하므로 질병에 있어서는 더욱 그러한 것이다.

- 역증에서 성정조절을 강조함 → 편소지장과 편대지장의 균형을 잘 맞추는 것이 중요 (교수님 설명)
- 감염이라던가, 먹을 것이 없는 상황에서 정신적인 증상이 온게 아닐까 싶음
→ 이때 성정조절은 정신적인 이상, 중금속 중독으로 인한 신경이상을 말하는게 아닐까

음혈모갈증 (13-26 ~ 13-28)

[13-26] 危亦林曰, **陰血耗竭, 耳聾目暗, 脚弱腰痛**, 宜用**黑元丹**.

위역림이 말하기를 음혈이 모갈(耗竭)하여 이롱(耳聾), 목암(目暗), 각약(脚弱), 요통이 오면 **흑원단(黑元丹)**을 쓴다 하였다.

- 음혈 : 태음인의 핵심물질
- 기액이 다 닳아서 없어짐 → 이롱, 목암, 각약, 요통 → 흑원단
- 결론 : 음혈이 다 빠져버리면 흑원단을 써야한다! By 위역림

[13-27] 凡男子, 方當壯年, 而眞氣猶怯, 此乃稟賦素弱, 非虛而然, 滋益之方, 群品稍衆, 藥力細微, 難見功效, 但固天元一氣, 使水升火降, 則五藏自和, 百病不生, 宜用**拱辰丹**.

무릇 남자가 떳떳한 기운이 한창인 젊은 사람으로서 오히려 겁을 내는 것은(교수님 해석: **진기가 오히려 허약한 것은**) 천품 본래의 성질이 약한 것이며 신체가 허한 것은 아니다. 자익(滋益) 처방이 고루 많이 있으나 약력이 미약하여 그 효과를 보기가 어려운 것이니 본연의 선천적인 원기를 보하여 수승화강(水升火降)하게 하면 오장이 스스로 순화하여 백병이 생기지 않으니 **공진단(拱辰丹)**을 사용한다.

- 자익 처방은 많지만, 약의 힘이 약함 → 공진단을 써야한다! By 위역림

[13-28] 論曰, 此證, 當用黑元與拱辰丹, 當歸・山茱萸, 皆爲蠱材, 藥力未全, 欲收全力, 宜用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯.

이러한 병세에 흑원단・공진단이 좋기는 하지만 당귀나 산수유는 태음인에게 벌레와 같은 약이므로 약력이 미진하다. 완전한 힘을 얻기를 원한다면 공진흑원단(拱辰黑元丹)・녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 써야 한다.

- 論曰 : 이제마의 결론
- 이릉, 목암, 각약, 요통 → 음허모갈증. 허증 상태
- 당귀는 소음인, 산수유는 소양인 약 → 태양인에게는 약력이 완전하지 않음
→ 완전한 힘을 얻기를 원한다면 공진흑원단, 녹용대보탕을 써야함
- 음혈모갈증 처방 : 공진흑원단, 녹용대보탕

태음인 범론 (13-29 ~ 13-40)

[13-29] 太陰人證, 有食後痞滿, 腿脚無力病, 宜用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯・太陰調胃湯・調胃升清湯.

태음인의 병증에 음식을 먹은 후에 가슴과 배가 더부룩하며 다리에 힘이 없는 병세가 있으니 마땅히 공진흑원단(拱辰黑元丹)・녹용대보탕(鹿茸大補湯)・태음조위탕(太陰調胃湯)・조위승청탕(調胃升清湯)을 써야 한다.

- 모두 역증 처방
 - 공진흑원단, 녹용대보탕 → 음혈모갈증
 - 태음조위탕, 조위승청탕 → 위완한증
- but, 병증 진단과정이 빠져있음

[13-30] 太陰人證, 有泄瀉病, 表寒證泄瀉, 當用太陰調胃湯, 表熱證泄瀉, 當用葛根蘿菥子湯.

태음인 병증에 설사병이 있으니 표한증설사(表寒證泄瀉)에 태음조위탕(太陰調胃湯)을 쓰고 표열증설사(表熱證泄瀉)에 갈근나복자탕(葛根蘿菥子湯)을 쓴다.

- 갈근나복자탕 : 갑오본에는 넣었다가 신정방에는 빼기한 처방
- 표한증설사 : 위완 부분이 차가워진 것
- 표열증설사 : 태음인에서 표열증 있다고 초창기(갑오본)에 잘못 생각한 것

[13-31] 太陰人證, 有咳嗽病, 宜用太陰調胃湯・鹿茸大補湯・拱辰黑元丹.
태음인 병증에 해수(咳嗽)병이 있으니 마땅히 태음조위탕(太陰調胃湯)・녹용대보탕(鹿茸大補湯)・공진흑원단(拱辰黑元丹)을 써야 한다.

- 태음조위탕 → 위완한증 / 녹용대보탕, 공진흑원단 → 음혈모갈증

[13-32] 太陰人證, 有哮喘病, 重證也, 當用麻黃定喘湯.
태음인 병증에 효천(哮喘)병이 있으니 중증(重證)이다. 마땅히 마황정천탕(麻黃定喘湯)을 써야 한다.

- 마황정천탕 → 코로나, 만성기침에 사용. 교수님이 RCT 연구까지 한 괜찮은 처방
- 마황정천탕은 크게 보면 위완한증 처방 → 설사, 정충, 기단, 무한, 결해 등의 증상에 씀

[13-33] 太陰人證, 有胃腹痛病, 危險證也, 當用麻黃定痛湯.
태음인 병증에 흉복통(胸腹痛)병이 있으니 위험증(危險證)이다. 마땅히 마황정통탕(麻黃定痛湯)을 써야 한다.

[13-34] 太陰人小兒, 有泄瀉十餘次無度者, 必發慢驚風, 宜用補肺元湯, 豫備慢風.
태음인 소아가 설사를 10여 번 이상 거듭하면 반드시 만경풍(慢驚風)을 일으키게 되므로 보폐원탕(補肺元湯)으로 예방해 주어야 한다.

- 경풍 → 보폐원탕으로 예방하자
- 보폐원탕은 생맥산에서 기원한 처방 → 생맥산(인삼 오미자 맥문동)에서 인삼이 태음인 약재가 아니니까 인삼을 빼고 길경 넣음 → 보폐원탕(길경 오미자 맥문동)

[13-35] 太陰人, 有腹脹浮腫病, 當用乾栗蟬蛻湯, 此病, 極危險證, 而十生九死之病也, 雖用藥病愈, 三年內, 不再發然後, 方可論生, 戒侈樂禁嗜慾, 三年內, 宜恭敬心身, 調養慎攝, 必在其人矣.
태음인이 복창부종(腹脹浮腫)하는 병이 있으니 마땅히 건율제조탕(乾栗蟬蛻湯)을 써야 한다. 이 병은 지극히 위험한 병으로 열의 아홉은 죽는 병이다. 비록 약을 써서 나았더라도 3년 안에 재발되지 않아야 비로소 살았다고 말할 수 있는 것이다. 사치와 향락을 경계하고 하고 싶은 것과 욕심을 버려야 하며 3년 동안 반드시 그 몸과 마음을 공경해야 하는 것이니 섭생하고 조심하는 것은 반드시 그 사람의 마음에 달려 있는 것이다.

- 腹脹浮腫 : 복수 → 간경화. 전해질 균형이나 영양과 관련된 문제이지 않을까
- 술이나 고기 종류 등의 고단백 식이로 인한 간경화 증상들이라고 생각하심
- 꼭 태음인 병증에 속한다고 보기는 어렵지만 일단 이렇게 서술해놓음

[13-36] 凡太陰人病, 若待浮腫已發, 而治之, 則十病九死也. 此病, 不可以病論之, 而以死論之可也. 然則如之何其可也. 凡太陰人, 勞心焦思, 屢謀不成者, 或有久泄久痢, 或淋病小便不利, 食後痞滿, 腿脚無力病. 皆浮腫之漸, 已爲重險病, 而此時, 以浮腫論, 而蕩滌慾火, 恭敬其心, 用藥治之, 可也.
무릇 태음인의 병에 있어서 만약 부종이 이미 발한 후에 이를 다스리면 열에 아홉은 죽는 병이다. 그런즉 이 병을 병으로 논해서는 안 되고 죽음으로 논하는 것이 옳을 것이다. 그렇다면 이렇게 위독한 병을 어찌하여야 좋은가? 무릇 태음인이 노심초사(勞心焦思)하여 자주 도모한 일이 이루어지지 못한 자이거나 혹은 설사와 이질병이 오래된 자와 혹은 임병(淋病)으로 소변불리한 자와 식후에 비만증이 있으면서 퇴각무력(腿脚無力)한 병들이 모두 점차 부종이 되는 것이다. 이미 병이 중하여 험병(險病)이 되었으니 이때부터 부종으로 논해서 당척욕화(蕩滌慾火)하고 공경기심(恭敬其心)을 하여야 한다.

敬其心)하여 약을 써서 치료함이 옳을 것이다.

- 간경화는 병이나 아니냐를 논할게 아니라, 죽냐 사냐를 논해야 할 정도로 심한 병증

[13-37] 太陰人證, 有夢泄病, 一月內, 三四發者, 虛勞, 重證也,

大便秘一日, 則宜用熱多寒少湯, 加大黃一錢,

大便每日不秘, 則加龍骨, 減大黃, 或用拱辰黑元丹・鹿茸大補湯.

此病, 出於謀慮太多, 思想無窮.

태음인의 병에 몽설병(夢泄病)이 있는데 1개월에 3-4회를 발설하는 것은 허로(虛勞)로서 중증(重證)이다. 대변이 하루 변비가 되면 열다한소탕(熱多寒少湯)에 대황 1돈을 가하고

대변이 매일 굳지 않으면 대황을 빼고 용골(龍骨)을 가하여 쓴다. 혹은 공진흑원단(拱辰黑元丹)・

녹용대보탕(鹿茸大補湯)을 쓴다. 이 병은 모려태다(謀慮太多)하고 사상무궁(思想無窮)하여 생긴 병이다.

- 허한 것 중에서도 중한 병증 → 생각이 너무 많고, 쓸데없는 생각이 지속되어서 발생
- 열다한소탕(+대황) → 간열을 진정 → 조열증 처방
- 공진흑원단, 녹용대보탕 → 폐조를 해결 → 음혈모갈증 처방
- 허로가 조열증, 음혈모갈증 2가지에 해당한다고 보고 있음

[13-38] 太陰人證, 有卒中風病, 胸臆格格, 有窒塞聲, 而目瞠者, 必用瓜蒂散.

手足拘攣, 眼合者, 當用牛黃清心丸.

素面色黃赤黑者, 多有目瞠者, 素面色青白者, 多有眼合者,

面色青白, 而眼合者 手足拘攣, 則其病急危也,

不必待拘攣. 但見眼合, 而素面色青白者, 必急用清心丸, 古方清心丸, 每每神效.

目瞠者, 亦急發, 而稍緩死, 眼合者, 急發急死, 然, 目瞠者, 亦不可以緩論, 而急治之

태음인이 **졸중풍(卒中風)**병이 있는데 가슴이 꽉 막혀 숨이 통하지 못하고 가래 끓는 소리가 나고 **두 눈을 딱 부릅뜨고 있는 자**에게는 반드시 **과체산(瓜蒂散)**을 써야 한다. **손발에 경련이 나고 눈을 감고 있는 자**에게는 마땅히 **우황청심환(牛黃淸心丸)**을 써야 한다. 평소 얼굴빛이 황적흑(黃赤黑)한 사람들은 눈을 부릅뜨는 자가 많고 평소 얼굴빛이 창백한 사람들은 대개 눈을 감는 자가 많다. 얼굴빛이 창백하고 눈을 감는 자가 손발에 경련이 일어난다면 그 병은 위급하게 된 것이다. 경련이 일어나기를 기다릴 필요가 없이 눈을 감고 있으며 평소 얼굴빛이 창백한 사람이라면 급히 청심환(淸心丸)을 써야 한다. **고방청심환(古方淸心丸)**이 번번이 실효한 것이다. 눈을 부릅뜨는 자는 병이 급히 발생하나 조금 완만하게 죽는 것이고 눈을 감은 자는 병이 급히 발하고 급히 죽는다. 그러나 눈을 부릅뜨는 자도 병이 완만한 것이라고만 생각하면 옳지 않으며 급히 치료를 하여야 한다.

- 중풍 : 실증, 허증 구분해서 과체산, 우황청심환 사용
- 우황청심환 → 허증 / 과체산 → 실증

- 시커먼 사람 → 열태음인 / 하얀 사람 → 한태음인
- 얼굴빛 창백, 눈 감는자가 손발에 경련 → 급, 위증
- 결론 : 허실 잘 구분해서 양상을 잘 조절해야함

[13-39] 牛黃淸心丸, 非家家必有之物, 宜用遠志・石菖蒲末各一錢, 灌口, 因以皂角末三分, 吹鼻. 此證, 手足拘攣, 而項直, 則危也, 傍人, 以兩手, 執病人兩手腕, 左右撓動兩肩, 或執病人足腕, 屈伸兩脚.

太陰人中風, 撓動病人肩脚, 好也, 少陽人中風, 大忌撓動病人手足, 又不可抱人起坐,

少陰人中風, 傍人, 抱病人起坐, 則可也, 而不可搖動兩肩, 可以徐徐按摩手足.

우황청심환(牛黃淸心丸)은 집집마다 반드시 있는 약물이 아니므로 마땅히 **원지(遠志)・석창포(石菖蒲)**

蒲) 분말 각 1돈씩을 입에 넣어주고 이어서 조각(皂角)가루 3푼을 코에다가 붙여넣는다. 이 병증에 손발에 경련을 일으키고 목이 뻣뻣해지면 위험한 것이다. 곁에 있는 사람들이 손으로 환자의 두 손목을 잡고 양쪽 어깨를 좌우로 운동시켜 주어야 하며 또 환자의 두 발목을 잡고서 양 무릎을 굴 신시킨다.

태음인 중풍은 환자의 양쪽 어깨와 다리를 요동시켜 주는 것이 좋다.

소양인 중풍은 환자의 수족을 요동시키면 크게 해롭고 앉히거나 안아서 일으키는 것도 좋지 않다.

소음인 중풍은 곁에 사람들이 환자를 껴안아 일으켜 앉히는 것은 좋으나 양쪽 어깨를 흔드는 것은 좋지 않고 환자의 수족을 천천히 문질러 안마해 주는 것이 좋다.

- 원지, 석창포 가루를 넣어도 비슷한 효과
- 조각을 코에 붙여 넣어도 비슷한 효과
- 체질별 움직임을 보명지주와 연관을 지을 수는 있지만, 과학적 근거가 있다고 보기에는 어려움이 있다고 언급하심

[13-40] 中毒吐瀉, 宜用麝香.

중독으로 토사(吐瀉)할 때는 마땅히 사향(麝香)을 써야 한다.

- 당시 웅담, 사향은 응급약