

사상체질의학 13주차

01 태음인 처방.

2. 태음인 처방

2.1. 張仲景 傷寒論中 太陰人病 經驗設方藥 四方

장중경 <상한론> 중 태음인병에 경험된 주요 4처방

- 장중경에게서 힌트를 얻은 처방 4개

: 마황탕, 계마각반탕, 조위승기탕, 대시호탕

1) 마황탕

麻黃湯

麻黃 三錢, 桂枝 二錢, 甘草 六分, 杏仁 十枚, 生薑 三片, 大棗 二枚.

마황 3돈, 계지 2돈, 감초 6푼, 행인 10개, 생강 3편, 대조 2개.

- 마황 3돈: 약 12g → 하루에 2첩쓰면, 24g

: 하루에 에페드린 120g 정도 먹으면, 교감신경 흥분으로 인한 손떨림 등 부작용 생김

- 행인 10개 = 약 4g / 생강 3편 = 약 4g / 대조 1개 = 약 2-3g

- 마황, 행인: 주된 약재 / 계지 감초 생강 대조: 소음인 약재

✓ 관련 조문

[12-1] 張仲景曰, 太陽傷寒, 頭痛發熱, 身疼腰痛, 骨節皆痛, 惡寒無汗而喘, 麻

黃湯主之.

[12-2] 註曰, 傷寒, 頭痛身疼腰痛, 以至牽連, 百骨節, 俱痛者, 此太陽傷寒, 榮血不利, 故也.

태음인에서 땀이 안난다는건 영혈이 순환이 잘 안된다는 거니 마황발표탕을 써준다!

2) 계마각반탕

桂麻各半湯

麻黃 一錢五分, 白芍藥 · 桂枝 · 杏仁 各一錢, 甘草 七分, 生薑 三片, 大棗 二枚.

마황 1돈5푼, 백작약 · 계지 · 행인 각1돈, 감초 7푼, 생강 3편, 대조 2개.

- 계마각반탕은 태음인 조문에 없고, 소양인 위수열리열병에 나옴

교수님 생각: ① 원래 계마각반탕이 태음인 간수열리열병에 있었던 것 같음. 근데 생각해보니 기액과 관련없는 것 같아서 소양인 조문으로 옮겼을 가능성 有, 미처 처방 부분까지는 다 못 옮긴 것 같다. or ② 마황이 주된 처방이라서, 태음인에게도 쓸 수 있는 처방이다

⇒ ① 이 더 맞는 것 같다고 생각하심

✓ 관련 조문: 소양인 위수열리열병

[10-1] 張仲景曰, 太陽病, 八九日, 如瘧狀, 發熱惡寒, 熱多寒少, 脈微, 而惡寒者, 此陰陽俱虛, 不可更發汗. 更下更吐, 面色反有熱色者, 未欲解也, 不能得小汗出, 身必痒, 宜桂麻各半湯.

[10-2] 太陽病, 似瘧, 發熱惡寒, 熱多寒少, 脈微弱者, 此少陽也, 身不痒, 不可發汗, 宜桂枝各半湯.

3) 조위승기탕

調胃承氣湯
大黃 四錢, 芒硝 二錢, 甘草 一錢.
대황 4돈, 망초 2돈, 감초 1돈.

- 갈근해기탕을 쓰는 경우는 조위승기탕에서 아이디어를 얻은 것! 핵심은 **열입리***
- 보통 열입리를 소화기계증상이나 정신의 증상으로 생각(잠 못자거나 변비하거나)
- 이제마는 태음인 양독증에 갈근해기탕을 쓰는데, 장중경은 열입리에 조위승기탕을 썼다.

✓ 관련 조문: 태음인 간수열리열병

[13-2] 李梴曰, 微惡寒發熱, 宜葛根解肌湯. 目疼鼻乾, 潮汗閉澀, 滿渴狂譫, 宜調胃承氣湯. 熱在表, 則目疼不眠, 宜解肌湯. 熱入裡 , 則狂譫, 宜調胃承氣湯.
--

4) 대시호탕

大柴胡湯
柴胡 四錢, 黃芩 · 白芍藥 各二錢五分, 大黃 二錢, 枳實 一錢五分.
治少陽轉屬陽明, 身熱, 不惡寒, 反惡熱, 大便硬, 小便赤, 譫語, 腹脹, 潮熱.
시호 4돈, 황금 · 백작약 각2돈5푼, 대황 2돈, 지실 1돈5푼. 소양에서 양명으로 전변되어 몸에 열이 나나 오한은 없고 도리어 오열이 있으며, 대변이 굳고, 소변이 붉으면, 헛소리를 하고, 배가 부풀어 오르며 조열이 있는 것을 치료한다.

- 우리가 배운 원문에 안나옴

- 황금이나 대황이 무언가 아이디어를 준 처방같다

- 소양전속양명 : 소양과 양명 중간의 단계

※ 참고: 갈근해기탕, 태음조위탕의 표병/리병 분류 변화

1894	갑오본 [현상위주]	- 갈근해기탕: 표병 (양독, 피부증상이니까) - 태음조위탕: 리병 (설사니까)
1900	경자본 [기전위주]	- 갈근해기탕: 리병 (증상은 겉으로 나타나지만, 원인은 속의 간열이니까) - 태음조위탕: 표병 (설사의 원인은 기액의 순환장애, 누설 등을 유발하는 위완한이니까)
1901	신축본	이하동일

※ 처방관련 편명비교

소음인	宋元明 三代醫家 著述中 少陰人病 經驗行用要藥 十三方 巴豆藥 六方 송 · 원 · 명 삼대의가 저술 중 소음인병에 경험된 주요 13처방과 파두약 6처방
-----	---

소양 인	元明二代醫家著述中 少陽人病 經驗行用要藥 九方 원·명 이대익가 저술 중 소양인병에 경험된 주요 9처방
태음 인	唐宋明三代醫家著述中 太陰人病經驗行用要藥 九方 당·송·명 삼대익가 저술 중 태음인병에 경험된 주요 9처방

- 소음인: 왕호고, 이고 이런 사람들

- 태음인: 당나라의 손사막(천금방), 송나라의 주광, 명나라의 이천과 공신

→ 당송명 의가들은 태음인병을 보긴 했지만 태음인병인지는 몰랐다는 것

그렇게 처방한 것들이 이제 나올 석창포원지산, 조중탕, 흑노환 등 9개

(시험이랑은 크게 관련없을 것 같은 내용)

-천기(천시 / 세희 / 인륜 / 지방.) 인사(사무 / 교우 / 당여 / 거처)

-천기는 그대로인데 인사는 순서가 양인끼리, 음인끼리 꼬여있음.

(태양인이 교우 / 소양인이 사무 / 태음인이 거처 / 소음인이 당여.)

->이에 관해서 교수님은 원래 태양인이 사무를 잘하고 두번째로 잘하는게 교우인데

선천적으로 타고난 사무는 그대로 냅두고 교우에 시간,노력을 쓰느라 당여에 쓸 시간을 교우에

전부 투자했다는 것. (폐대간소이므로 당여가 약한부분.) 그래서 꼬여있다.

따라서 교우가 능하다는것에 당여에 신경을 써서 부족해지지 않게 잘 관리하라는 의미존재.

2.2 唐宋明三代醫家著述中 太陰人病經驗行用要藥 九方

당·송·명 삼대익가 저술 중 태음인병에 경험된 주요 9처방

1) 석창포원지산

石菖蒲遠志散

石菖蒲·遠志, 爲細末, 每服一錢, 酒飲任下, 日三, 令人, 耳目聰明.

此方, 出於孫思邈千金方書中.

석창포·원지를 매우 곱게 가루로 만들어 매번 1돈을 복용하니 술을 마셔 넘기기를 하루에 세번씩 하면 사람의 귀와 눈을 맑게 한다. 이 처방은 손사막의 <천금방> 중에 나온다.

- 총명탕의 재료이기도 함 [총명탕=원지+석창포+백복령]

->순환이 안되는 사람들에게 썼다는 것임.

2) 조중탕

調中湯

大黃 一錢五分, 黃芩·桔梗·葛根·白朮·白芍藥·赤茯苓·蘘本·甘草 各一錢.

此方出於朱肱活人書中. 治夏發燥疫, 口乾咽塞.

今考更定, 此方, 當去白朮·芍藥·茯苓·甘草.

대황 1돈5푼, 황금·길경·갈근·백출·백작약·적복령·고본·감초 각1돈.

이 처방은 주광의 <활인서> 중에 나온다. 여름에 조역이 생겨 입이 마르고 목구멍이 막히는 것을 치료한다.

지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 백출·작약·복령·감초는 빼야 한다.

- 조중탕, 흑노환 from 주광의 활인서

- 조중탕은 열다한소탕의 기원처방 [열다한소탕=갈근 황금 고본 나복자 길경 승마 백지]

→ 체질에 해당하지 않는 약재 빼버림 (백출 백작약 적복령 감초)

- 조역燥疫: 조의 전염병 (피부에 뭐가 많이 나타나는 발진 티푸스등) ->얼굴의 발진이 영혈이 넘쳐서 발생한 것이라고 판단함. (영혈불리)

- 금고경정(지금와서 생각해서 다시 정한다): 갑오본 cf. 논왈: 경자본(검손한 표현)

3) 흑노환

黑奴丸 麻黃 · 大黃 各二兩, 黃芩 · 釜底煤 · 芒硝 · 礞突墨 · 樑上塵 · 小麥奴 各一兩. 右爲末, 蜜丸, 彈子大, 每一丸, 新汲水化服, 須臾振寒, 汗出而解. ○ 此方 出於朱肱活人書中. ○ 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尙煖, 幹開其口, 灌藥下咽, 卽活. ○ 今考更定, 此方, 當去芒硝.
마황 · 대황 각2냥, 황금 · 부저매(술 밑의 그을음) · 망초 · 조돌묵(아궁이 굴뚝의 그을음) · 양상진(들보 위의 먼지) · 소맥노(밀감부기) 각1냥. 이상을 가루로 만들어 꿀로 반죽하여 환을 만들기를 탄환크기로 하고, 매번 1알씩 새로 길어온 물에 녹여 복용하니, 잠시 후에 추위에 떨며 땀이 나면서 낫는다. 이 처방은 주광의 <활인서> 중에 나온다. 상한양독과 괴상한의 병은 의사도 치료하지 못한다. 정(精)과 백(魄)이 이미 다했으나 명치가 아직 따뜻할 때는 입을 벌리고 약을 흘려 넣어주어 식도로 넘기면 산다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 망초는 빼야 한다.

- 주광이 흑노환, 조중탕을 제시 → 이제마가 열다한소탕을 만드는데 도움

- 피부색 변하거나 발진 (양독) : 기액 순환 안되어 침착된 것 → 가벼운 것으로 순환시키자

망초:설사 / 조돌묵: 굴뚝의 그을음 / 양상진: 대들보 위의 먼지 / 소맥노: 밀에 생긴 곰팡이 → 가볍다

→ 순환시켜서 양독을 풀 수 있음 cf. 소맥: 밀, (형이상학적인 처방임)

탄자대: 요즘 4g이 맞는것 같다

- 망초 → 마그밀 생각: 제산제, 설사시킴 (성분: 수산화마그네슘MgOH2)

망초에 수용성 성분 多 : 대황으로도 안될 때, 망초 사용 (망초 1회복용량 6g 적당 by 교수님)

but 체질적으로 보면 소양인 약재이니깐 빼야함

✓관련 조문

[13-1] 朱肱曰, 陽毒, 面赤斑, 斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血, 宜葛根解肌湯 · 黑奴丸. 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尙煖, 幹開其口, 灌黑奴丸, 藥下咽, 卽活. [13-4] 三陽病深, 變爲陽毒, 面赤眼紅, 身發斑黃, 或下利黃赤, 六脈洪大, 宜黑奴丸.

4) 생맥산

生脈散 麥門冬 二錢, 人蔘 · 五味子 各一錢, 夏月, 代熟水飲之, 令人, 氣力湧出. ○ 今考更定, 此方, 當去人蔘. 此方 出於李梴醫學入門書中.
맥문동 2돈, 인삼 · 오미자 각 1돈. 여름철에 끓인 물 대신에 마시는데, 기력이 샘솟듯이 나오게 한다. 이 처방은 이천의 <의학입문> 중에 나온다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 인삼은 빼야 한다

- 생맥산은 보폐원탕의 기원처방

- 보폐원탕: 인삼을 길경으로 바꿈

5) 저근피환

樗根皮丸 樗根白皮, 爲末, 酒糊和丸. ○ 治夢遺, 此藥性, 凉而燥, 不可單服. 此方 出於李梴醫學入門書中.
저근백피를 가루내어 술을 넣어 쏘 풀로 반죽하여 환을 만든다. 이 처방은 이천의 <의학입문> 중에 나온다. 몽유를 치료한다. 약성이 차고 마르기 때 문에 단독으로 복용해서는 안 된다.

- 몽유: 정액이 나오는 것 → 기액누설로 볼 수 있음

☞ 기액이 누설되지 않도록 하는 것이 저근백피이다!

6) 이성구고환

二聖救苦丸 大黃 四兩, 猪牙皂角 二兩, 麵糊和丸, 菥豆大, 五七十丸, 一服卽汗, 一汗卽愈. ○ 此方, 出於龔信萬病回春書中, 治天行瘟疫.
대황 4냥, 저아조각 2냥. 밀가루풀로 반죽하여 녹두알 크기로 환을 만든다. 50-70 알씩 한 번 복용하면 땀이 나고, 한 번 땀이 나면 낫는다. 이 처방은 공신의 <만병회춘> 중에 나온다. 천행역려를 치료한다.

- 녹두대 : 0.1g 정도 ⇒ 50~70개 먹으면 5~7g

- 천행온역: 두면항협적중.. ⇒ 감염질환

曰 실제로 증한장열~훈궤에 이성구고환을 쓰진 않겠조.

항생제 항바이러스를 쓰고 나서 한약 써주면 효과가 배가 될 것

✓ 관련 조문

[13-10] 萬曆丙戌, 余寓大梁, 瘟疫大作, 士民多斃. 其證, 增寒壯熱, 頭面頰赤腫, 咽喉腫痛, 昏愴. 余發一秘方, 名**二聖救苦丸**, 大黃四兩, 猪牙皂角二兩, 麵糊和丸, 菥豆大, 五七十丸, 一服卽汗, 一汗卽愈, 稟壯者, 百發百中. 皂角, 開關竅, 發其表, 大黃, 瀉諸火, 通其裡.

7) 갈근해기탕

葛根解肌湯 葛根 · 升麻 · 黃芩 · 桔梗 · 白芷 · 柴胡 · 白芍藥 · 羌活 · 石膏 各一錢, 甘草 五分. ○ 此方, 出於龔信醫鑑書中. 治陽明病, 目疼, 鼻乾, 不得臥. ○ 今考更定, 此方, 當去柴胡 · 芍藥 · 羌活 · 石膏 · 甘草.
갈근 · 승마 · 황금 · 길경 · 백지 · 시호 · 백작약 · 강활 · 석고 각1돈, 감초 5푼. 이 처방은 공신의 <의감> 중에 나온다. 양명병으로 눈이 아프고, 코가 마르며, 눕지 못하는 것을 치료한다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 시호 · 작약 · 강활 · 석고 · 감초는 빼야 한다.

1) 갈근해기탕 vs 열다한소탕

- 갈근해기탕: 갈근 황금 **고본** 길경 승마 백지 *이제마 ver.

- 열다한소탕: 갈근해기탕 + **나복자**

2) 갈근해기탕: 공신 vs 이제마

공신	갈	승	황	길	백	시	백작	강	석	감
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---

	근	마	금	경	지	호	약	활	고	초
이제마	갈	승	황	길	백	고				
동의사상신	갈	승	황	길	백	행	산조	대		
편	근	마	금	경	지	인	인	황		

vs 동의사상신편(원지상)

- 공신: 소양인, 소음인 약재가 섞여 들어가 있음
- 이제마: 공신의 갈근해기탕 - (시호/백작약/강활/석고/감초) + 고본

시호, 강활, 석고: 소양인 / 백작약, 감초: 소음인

☞ 동의사상신편: 고본이 빠지고, 행인/산조인/대황 3가지 약재가 추가됨

행인: 인후부 증상(인후통, 타농혈) / 산조인: 不得臥 / 대황: 양독으로 인한 변비

✓ 관련 조문

[13-1] 朱肱曰, 陽毒, 面赤斑, 斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血, 宜葛根解肌湯 · 黑奴丸. 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尚煖, 斡開其口, 灌黑奴丸, 藥下咽, 卽活.
[13-2] 李梴曰, 微惡寒發熱, 宜葛根解肌湯. 目疼鼻乾, 潮汗閉澀, 滿渴狂譫, 宜調胃承氣湯. 熱在表, 則目疼不眠, 宜解肌湯. 熱入裡, 則狂譫, 宜調胃承氣湯.
[13-3] 龔信曰, 陽明病, 目疼, 鼻乾, 不得臥, 宜葛根解肌湯.

8) 우황청심환

牛黃清心丸
山藥 七錢, 甘草炒 五錢, 人蔘 · 蒲黃 · 神麴炒 各二錢五分, 犀角 二錢, 大豆黃

卷炒 · 肉桂 · 阿膠炒 各一錢七分, 白芍藥 · 麥門冬 · 黃芩 · 當歸 · 白朮 · 防風 · 朱砂水飛 各一錢五分, 柴胡 · 桔梗 · 杏仁 · 白茯苓 · 川芎 各一錢三分, 牛黃 一錢二分, 羚羊角 · 龍腦 · 麝香 各一錢, 雄黃 八分, 白麝 · 乾薑炮 各七分, 金箔 一百四十箔, 內四十箔爲衣, 大棗 二十枚, 蒸取肉, 研爲膏.
右爲末, 棗膏入煉蜜和勻, 每一兩, 作十丸, 金箔爲衣, 每取一丸, 溫水而下.
○治卒中風 · 不省人事 · 痰涎壅塞 · 精神昏憤 · 言語蹇澀 · 口眼喎斜 · 手足不遂 · 等證.
○ 右二方, 出於龔信醫鑑書中.
○ 今考更定, 此方, 當去白朮 · 人蔘 · 甘草 · 神麴 · 肉桂 · 阿膠 · 芍藥 · 當歸 · 川芎 · 乾薑 · 大棗 · 清蜜 · 柴胡 · 茯苓 · 雄黃 · 朱砂.
산약 7돈, 감초(볶는다) 5돈, 인삼 · 포황(볶는다) · 신국(볶는다) 각2 돈5푼, 서각 2돈, 대두황권(볶는다) · 육계 · 아교(볶는다) 각1돈7푼, 백작약 · 맥문동 · 황금 · 당귀 · 방풍 · 주사(수비한다) · 백출 각1돈5푼, 시호 · 길경 · 행인 · 백복령 · 천궁 각1돈3푼, 우황 1돈2푼, 영양각 · 사향 · 용뇌 각1돈, 우황 8푼, 백령 · 건강(습지에 써서 굽는다) 7푼, 금박 140장, (이 중 40장은 우황청심원의 겉에 입힌다), 대추 20개(찌고 살을 바른 뒤 갈아서 고약으로 만든다).
이상의 약을 가루내고, 여기에 대추 고약에 졸인 꿀을 넣고 고루 섞은 것 1냥으로 10알을 만 들고 금박을 입힌다. 1알씩 따뜻한 물에 먹는다. 줄중풍 으로 인한 인사불성, 담연이 막힌 것, 정신이 희미한 것, 말하지 못하는 것, 손발을 쓰는 못한 증상을 치료한다. 위 2처방은 공신의 <의감>중에 나온다. 지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 백출 · 인삼 · 감초 · 신국 · 육계 · 아교 · 백작약 · 당귀 · 천궁 · 건강 · 대조 · 청밀 · 시호 · 백복령 · 우황 · 주사 등은 빼야 한다.

☞ 포황: 지혈, 자궁수축 → 임신부x / 주사: 수은제제 → 요즘에 쓰지x / 1돈: 4g

✓ 관련 조문: 태음인 간수열리열병 음혈모갈증

[13-38] 太陰人證, 有**卒中風病**, 胸臆格格, 有窒塞聲, 而目瞪者, 必用**瓜蒂散**. **手足拘攣**, **眼合者**, 當用**牛黃清心丸**. 素面色黃赤黑者, 多有目瞪者, **素面色青白者**, 多有眼合者, 面色青白, 而眼合者 手足拘攣, 則其病急危也, 不必待拘攣. 但見眼合, 而素面色青白者, 必急用清心丸, 古方**清心丸**, 每每神效. 目瞪者, 亦急發, 而稍緩死, 眼合者, 急發急死, 然, 目瞪者, 亦不可以緩論, 而急治之

과체산은 실증 졸중풍/ 우황청심원은 허증, 졸중풍.

9) 마황정천탕

麻黃定喘湯

麻黃 三錢, 杏仁 一錢五分, 黃芩 · 半夏 · 桑白皮 · 蘇子 · 款冬花 · 甘草 各一錢, 白果去殼碎炒 二十一箇 去殼碎炒黃色.

○ 歌曰, 諸病, 原來有藥方, 惟愁齁喘難當, 病人, 遇此仙丹藥服後, 方知定喘湯.

○ 此方, 出於龔信萬病回春書中, 治**哮喘神方**.

○ 今考更定, 此方, 當去半夏 · 蘇子 · 甘草.

마황 3돈, 행인 1돈5푼, 황금 · 반하 · 상백피 · 소자 · 관동화 · 감초 각1돈, 백과 21개(껍질을 벗겨 부순 후에 볶아 누런색이 되도록 한다)

노래에 " 모든 병은 원래 처방이 있지만, 코고는 소리가 나는 천식이 근심이 되니 제일 감당하기 어렵다. 환자가 이 선단의 약을 만나 복용한 후에 정천탕을 알 것이다"

라고 하였다.

이 처방은 공신 <만병회춘> 중에 나온다. 효천을 치료하는 신묘한 처방이다.

지금 자세히 검토하여 고쳐 바로 잡으니, 이 처방에서 반하 · 소자 · 감초는 빼야 한다.

- 백과 21개 = 약 15g: 3~4돈

※참고[작년 수업내용]

- **효천신방(哮喘神方)**처럼 이제마가 약 효과 좋다고 말한 조문

① 형방지황탕: 허증엔 한열허실 막론하고 수백첩 써도 된다.

② 형방패독산: 삼신산불사약

->마황정천탕도 위 두개처럼 **진짜 좋다고 생각함**.

2.3. 新定 太陰人病 應用要藥 二十四 方

새로 정한 태음인병의 주요 24처방

- **처방: 24개, 약재: 44개** (약재의 상당수가 우황청심원에만 들어감)

- 가장 많이 쓰인 약재: **길경, 맥문동** (12개 처방에서 쓰임)

- 표병에서만 쓰인 약재(7): 건울, 상백피, 백과, 관동화, 사군자, 저근백피, 웅담

리병에서만 쓰인 약재(21): 녹용 연자육 부평 대황 갈근 조각 고본 승마 백지(언급은 여기까지)

감국 오매 포황 서각 대두항권 우황 영양각 용뇌 사향 백령 금박 과체

시험관련 공지)

태음인부분도 최대한 단답식, 상식적으로 낼 것. 신경방에서 표병에 있어 태음조위탕은 꼭 구성까지 암기, 리병에서는 열다한소탕은 꼭 구성까지 암기하기.

목차

1. 太陰調胃湯

9. 葛根承氣湯

17. 乾栗蟾蜍湯

2. 葛根解肌湯	10. 調理肺元湯	18. 乾栗櫟根皮湯
3. 調胃升清湯	11. 麻黃發表湯	19. 瓜蒂散
4. 清心蓮子湯	12. 補肺元湯	20. 熊膽散
5. 麻黃定喘湯	13. 鹿茸大補湯	21. 麝香散
6. 麻黃定痛湯	14. 拱辰黑元丹	22. 石菖蒲遠志散
7. 熱多寒少湯	15. 皂角大黃湯	23. 麥門冬遠志散
8. 寒多熱少湯	16. 葛根浮萍湯	24. 牛黃清心元

1) 태음조위탕

太陰調胃湯
薏苡仁 · 乾栗 各三錢, 蘿蔔子 二錢, 五味子 · 麥門冬 · 石菖蒲 · 桔梗 · 麻黃 各一錢.
의이인 · 건율 각3돈, 나복자 2돈, 오미자 · 맥문동 · 석창포 · 길경 · 마황 각1돈.

- 위완한증 처방 [표병 역증]

- 설사수십일부지 ⇒ 加 저근백피 / 음식무미 전불입구 ⇒ 加 승마, 황금

- 태음인 소화기 증상에 대응: 위를 조절해주는 약

이중 식품이 아니라 약재로 쓰는 건 마황, 석창포, 맥문동정도

-> 주된 작용이 마황이라고 생각하심. (체질 불구하고 태음조위탕하면 비만에 대표적인 처방으로 자리잡음.) -> 교감신경을 활성화시키는 작용에서 비롯된 것.

✓ 관련 조문

[12-11] 嘗治, 太陰人, 胃脘寒證, 瘧病. 有一太陰人, 素有怔忡, 無汗, 氣短, 結咳矣. 忽焉又添出一證, 泄瀉, 數十日不止, 卽表病之重者也, 用太陰調胃湯, 加櫟根皮 一錢, 日再服十日, 泄瀉, 方止, 連用三十日, 每日流汗滿面面, 素證亦減, 而忽其家五六人, 一時瘟疫, 此人, 緣於救病, 數日不服藥矣. 此人, 又染瘟疫瘧證, 粥食無味, 全不入口, 仍以太陰調胃湯, 加升麻 · 黃芩 各一錢, 連用十日, 汗流滿面, 疫氣少減, 而有二日大便不通之證, 仍用葛根承氣湯, 五日, 而五日內, 粥食大倍, 疫氣大減, 而病解. 又用太陰調胃湯, 加升麻 · 黃芩, 四十日調理, 疫氣既減, 素病亦完.

증상: 素有怔忡, 無汗, 氣短, 結咳矣 -> 기액의 순환장애를 의미한다.

2) 갈근해기탕

葛根解肌湯
葛根 三錢, 黃芩 · 蘊本 各一錢五分, 桔梗 · 升麻 · 白芷 各一錢.
갈근 3돈, 황금 · 고본 각1돈5푼, 길경 · 승마 · 백지 각1돈.

- 조열증 중 양독증 처방 [리병 순증] (피부증상 + 호흡기증상)

- 길경, 맥문동: 보폐, 인후를 부드럽게

갈근해기탕 + 나복자 -> 열다한소탕.

나복자: 기액의 순환장애로 인해 생긴 담음, 가래, 소화불량으로 인한 적체를 해결해주는 약재.

황금, 고본으로 간열을 식혀주고 나복자, 길경, 백지, 승마로 순환시켜주는 느낌.

✓ 관련 조문

[13-1] 朱肱曰, 陽毒, 面赤斑, 斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血, 宜葛根解肌湯 · 黑奴丸. 陽毒及壞傷寒, 醫所不治, 精魄已竭, 心下尚煖, 斡開其口, 灌黑奴丸, 藥下咽, 卽活.

[13-2] 李梴曰, 微惡寒發熱, 宜葛根解肌湯. 目疼鼻乾, 潮汗閉澀, 滿渴狂譫, 宜調胃承氣湯. 熱在表, 則目疼不眠, 宜解肌湯. 熱入裡, 則狂譫, 宜調胃承氣湯.

[13-3] 龔信曰, 陽明病, 目疼, 鼻乾, 不得臥, 宜葛根解肌湯.

[13-4] 三陽病深, 變爲陽毒, 面赤眼紅, 身發斑黃, 或下利黃赤, 六脈洪大, 宜黑奴丸.

[13-5] 論曰, 右諸證, 當用葛根解肌湯 · 黑奴丸.

3) 조위승청탕

調胃升清湯

薏苡仁 · 乾栗 各三錢, 蘿蔔子 一錢五分,

麻黃 · 桔梗 · 麥門冬 · 五味子 · 石菖蒲 · 遠志 · 天門冬 · 酸棗仁 · 龍眼肉 各一錢.

의이인 · 건울 각3돈, 나복자 1돈5푼, 마황 · 길경 · 맥문동 · 오미자 · 석창포 · 원지 · 천문동 · 산조인 · 용안육 각1돈.

- 태음조위탕 + 원지 · 천문동 · 산조인 · 용안육 [安神 약물 4가지]

- 조위승청탕 ⇒ 스트레스, 마음 관련[安神] / 태음조위탕 ⇒ 소화기증상

안신 약물 4가지)

밑의 조문에 보면 腿脚無力病라고 나와있음. ->정신족 증상이 아니라 기액의 순환장애를 해결

해주는 약재들이라고 봐야함. (태음인 편소지장인 폐소한상환(순환장애)해결)

✓ 관련 조문

[13-29] 太陰人證, 有食後痞滿, 腿脚無力病, 宜用拱辰黑元丹 · 鹿茸大補湯 · 太陰調胃湯 · 調胃升清湯.

4) 청심연자탕

清心蓮子湯

蓮子肉 · 山藥 各二錢,

天門冬 · 麥門冬 · 遠志 · 石菖蒲 · 酸棗仁 · 龍眼肉 · 柏子仁 · 黃芩 · 蘿蔔子 各一錢,

甘菊花 三分.

연자육 · 산약 각2돈, 천문동 · 맥문동 · 원지 · 석창포 · 산조인 · 용안육 · 백자인 · 황금 · 나복자 각1돈, 감국화 3푼.

- 본문엔 안 나오지만 임상적으로 많이 사용

- 청심연자탕: 안신(잠못잠) 음혈모갈 [기액누설 기액부족] → 부작용도 크게 없다

- 음혈모갈증에 분류되는 처방

5) 마황정천탕

麻黃定喘湯

麻黃 三錢, 杏仁 一錢五分,

黃芩 · 蘿蔔子 · 桑白皮 · 桔梗 · 麥門冬 · 款冬花 各一錢, 白果炒黃色 二一箇.

마황 3돈, 행인 1돈5푼, 황금 · 나복자 · 상백피 · 길경 · 맥문동 · 관동화 각1돈, 백

과(복아서 누런빛을 띄는 것) 21개.

- 대부분 호흡기 관련 약재

마황이 세돈이나 들어감. 기침에 쓰는약재가 많음. ->哮喘

✓ 관련 조문

[13-32] 太陰人證, 有哮喘病, 重證也, 當用麻黃定喘湯

6) 마황정통탕

麻黃定痛湯

薏苡仁 三錢, 麻黃·蘿蔔子 各二錢,

杏仁·石菖蒲·桔梗·麥門冬·五味子·使君子·龍眼肉·柏子仁 各一錢, 乾栗七箇.

의이인 3돈, 마황·나복자 각2돈, 행인·석창포·길경·맥문동·오미자·사군자·용안육·백자인 각1돈, 건울 7개.

- 마황정통탕 = 태음조위탕 + 행인, 사군자, 용안육, 백자인

- 건울 7개: 1개 6g → 총 42g → 약 1량

- 심장관련 질환으로 볼 수 있음

✓ 관련 조문

[13-33] 太陰人證, 有胃腹痛病, 危險證也, 當用麻黃定痛湯.

※참고

- 태음조위탕, 열다한소탕 구성을 외우고, 가감으로 다른 처방 구성도 외워라~

- 한다열소탕= 태음조위탕 -(오미자 석창포) + 황금 행인

: 새로 들어간 것은 [황금과 행인] / 행인: 폐, 황금: 간에 작용 ⇒ 간폐를 한번에 조절해줌

오미자, 석창포는 안으로 수렴시키므로.

7) 열다한소탕

熱多寒少湯

葛根 四錢, 黃芩·藁本 各二錢, 蘿蔔子·桔梗·升麻·白芷 各一錢.

갈근 4돈, 황금·고본 각2돈, 나복자·길경·승마·백지 각1돈.

☞ 열다한소탕 = 갈근해기탕 + 나복자

- ‘면역’ 관련 연구, 논문 多 but 간수치를 가끔 올림 (아마 황금 때문)

☞ 曰 효과 좋은 처방) 조위승청탕[안신, 피로에 굿], 청심연자탕[불면, 가슴두근], 마황정천탕[호흡
기증상: 마황양 조절하면 굿, 임상 많이 쓰진x]

✓ 관련 조문

[13-13] 嘗治, 太陰人, 肝熱證瘧病, 有一太陰人素病, 數年來, 眼病, 時作時止矣, 此人, 得瘧病, 自始發日, 用熱多寒少湯

[13-19] 嘗治, 太陰人, 燥熱證, 手指焦黑癰瘡病, (중략) 以熱多寒少湯, 用藁本二錢, 加大黃一錢,

[13-23] 論曰, 此病, 非少陽人消渴也, 即太陰人燥熱也. 此證, 不當用腎氣丸, 當用熱多寒少湯, 加藁本·大黃.

[13-24] 嘗治, 太陰人, 年五十近衰者, 燥熱病, 引飲, 小便多, 大便秘者, 用熱多寒少湯, 藁本 二錢, 加大黃 一錢, (생략) / 太陰人, 年少者, 燥熱病, (생략)

8) 한다열소탕

寒多熱少湯
薏苡仁 三錢, 蘿蔔子 二錢, 麥門冬·桔梗·黃芩·杏仁·麻黃 各一錢, 乾栗 七箇.
의이인 3돈, 나복자 2돈, 맥문동·길경·황금·행인·마황 각1돈, 건울 7개

- 한다열소탕 = 태음조위탕 - (오미자 석창포) + (황금 행인)

: 한다열소탕은 기액순환에 도움 [한궤에 사용], 오미자 석창포 수렴작용이어서 빼버림

✓ 관련 조문

[12-10] 論曰, 太陰人病, 寒厥四日, 而無汗者, 重證也. 寒厥五日, 而無汗者, 險證也. 當用熊膽散, 或寒多熱少湯, 加蟬蟬五七九介.

9) 갈근승기탕

葛根承氣湯
葛根 四錢, 黃芩·大黃 各二錢, 桔梗·升麻·白芷 各一錢.
本方, 加大黃 二錢, 則名曰葛根大承氣湯.
減大黃 一錢, 則名曰葛根小承氣湯.
갈근 4돈, 황금·대황 각 2돈, 길경·승마·백지 각1돈.
본처방에 대황 2돈을 가하면 갈근대승기탕이라고 하고, 대황 1돈을 빼면 갈근소승기탕이라고 한다.

- 갈근승기탕 = 갈근 황금 대황 길경 승마 백지

- 갈근해기탕 = 갈근 황금 고본 길경 승마 백지

- 열다한소탕 = 갈근해기탕 + 나복자

☞ 청폐사간탕 = 열다한소탕 + 대황

→ 갈근승기탕 쓰기보단, 대황 양을 추가하면서 열다한소탕에 가감

✓ 관련 조문

[12-11] 嘗治, 太陰人, 胃脘寒證, 瘧病. (중략) 汗流滿面, 疫氣少減, 而有二日大便不通之證, 仍用葛根承氣湯,
[13-12] 論曰, 右諸證, 增寒壯熱燥澀者, 當用皂角大黃湯·葛根承氣湯. 頭面項頰赤腫者, 當用皂角大黃湯·葛根承氣湯.
[13-13] 嘗治, 太陰人, 肝熱熱證瘧病, (중략), 有大便, 一日不通之證, 仍用葛根承氣湯, 連三日, 粥食大倍, 又用三日, 疫氣大減.
[13-15] 一太陰人, 十歲兒, 得裡熱瘧病, 粥食全不入口, 藥亦不入口, 壯熱穰穰, 有時飲冷水, 至于十一日, 則大便不通, 已四日矣. 恆怯譫語, 日有百蟲滿室, 又有鼠入懷云, 奔遑匍匐, 驚呼啼泣, 有時熱極生風, 兩手厥冷, 兩膝伸而不屈, 急用葛根承氣湯, 不憚啼泣, 強灌口中, 即日, 粥食大倍, 疫氣大解, 倖而得生.

10) 조리폐원탕

調理肺元湯
麥門冬·桔梗·薏苡仁 各二錢, 黃芩·麻黃·蘿蔔子 各一錢.
맥문동·길경·의이인 각2돈, 황금·마황·나복자 각1돈.

- 조리폐원탕 = 한다열소탕 - 행인, 건울

(한다열소탕 쓰다가 좀 좋아지면 조리폐원탕으로 바꿔씀)

✓ 관련 조문

[12-13] 有一太陰人素病, 咽噎乾燥, 而面色青白, 表寒或泄. 盖, 咽噎乾燥者, 肝熱也, 面色青白, 表寒或泄者 胃脘寒也 此病, 表裡俱病, 素病之太重者也. 此人, 得瘟病, 其證, 自始發日至于病解, 二十日. 大便初滑或泄, 中滑末乾, 每日二三四次, 無日不通, 初用寒多熱少湯, 病解後, 用調理肺元湯, 四十日調理, 僅僅獲生.

11) 마황발표탕

麻黃發表湯

桔梗 三錢, 麻黃 一錢五分, 麥門冬 · 黃芩 · 杏仁 各一錢.

길경 3돈, 마황 1돈5푼, 맥문동 · 황금 · 행인 각1돈.

- 마황탕: 마황이 군약 / 마황발표탕: 길경이 군약

☞ 황금: 간열 꺼춤 / 행인: 폐의 순환 도움

- 마황발표탕 = 한다열소탕 - 의이인, 나복자, 건을

: 조리폐원탕과 마황발표탕 모두 한다열소탕이 기본처방

✓관련 조문

[12-1] 張仲景曰, 太陽傷寒, 頭痛發熱, 身疼腰痛, 骨節皆痛, 惡寒無汗而喘, 麻黃湯主之.

[12-2] 註曰, 傷寒, 頭痛身疼腰痛, 以至牽連, 百骨節, 俱痛者, 此太陽傷寒, 榮血不利, 故也.

[12-3] 論曰, 此, 卽太陰人傷寒, 背傾表病輕證也. 此證, 麻黃湯, 非不當用, 而桂

枝甘草, 皆爲蠱材, 此證, 當用麻黃發表湯.

12) 보폐원탕

補肺元湯

麥門冬 三錢, 桔梗 二錢, 五味子 一錢.

加山藥 · 薏苡仁 · 蘿蔔子 各一錢, 則尤妙.

맥문동 3돈, 길경 2돈, 오미자 1돈.

산약 · 의이인 · 나복자 각1돈을 더하면 더욱 신묘하다.

- 기원처방: 생맥산 [인삼 → 길경으로 대체]

- 주치: 설사, 소아만경풍 (설사가 있다가 증상이 더 심해지면 정신증상이 나타남.)

✓관련 조문

[13-34] 太陰人小兒, 有泄瀉十餘次無度者, 必發慢驚風, 宜用補肺元湯, 豫備慢風.

13) 녹용대보탕

鹿茸大補湯

鹿茸 二三四錢, 麥門冬 · 薏苡仁 各一錢五分,

山藥 · 天門冬 · 五味子 · 杏仁 · 麻黃 各一錢.

○ 虛弱人, 表症寒證多者, 宜用.

녹용 2, 3, 4돈, 맥문동 · 의이인 각1돈5푼, 산약 · 천문동 · 오미자 · 행인 · 마황 각

1돈.

허약한 사람의 표증으로 한증이 많은 경우에 써야 한다.

- 조위승청탕과 구성, 방해 비슷

- 음혈모갈증에서 **表증이 寒증**이 있을 때 사용

: 한증 = 오한 무한 등

✓ 관련 조문

[13-27] 凡男子, 方當壯年, 而眞氣猶怯, 此乃稟賦素弱, 非虛而然, 滋益之方, 群品稍衆, 藥力細微, 難見功效, 但固天元一氣, 使水升火降, 則五藏自和, 百病不生, 宜用拱辰丹.

[13-28] 論曰, 此證, 當用黑元與拱辰丹, 當歸・山茱萸, 皆爲蠱材, 藥力未全, 欲收全力, 宜用拱辰黑元丹・**鹿茸大補湯**.

稟賦素弱 : 기액이 원래부터 부족한 사람들에게 사용.

14) 공진흑원단

拱辰黑元丹

鹿茸 四五六兩, **山藥**・**天門冬** 各四兩, **螻蛄** 一二兩, **麝香** 五錢.

煮烏梅肉爲膏, 和丸梧子大, **溫湯**下五七十丸, 或**燒酒**下.

○ **虛弱人, 裡症多者**, 宜用.

녹용 4, 5, 6냥, 산약・천문동 각 4냥, 제조 1, 2냥, 사향 5돈.

오매육을 삶아 고가 되면 섞어서 오자대 크기로 환을 만든다. 5, 7, 10환을 따뜻한 물에 복용하거나 소주로 먹어도 된다.

허약한 사람의 리증이 많은 경우에 써야 한다.		
虛弱人	녹용대보탕	表症寒證 多者 [한증]
	공진흑원단	裡症 多者 [리증]

- 오자대: 0.3g 정도 → 50개 먹으면 15g

- 제조: 단백질 보충 / 사향: 순환

✓ 관련 조문

[13-27] 凡男子, 方當壯年, 而眞氣猶怯, 此乃稟賦素弱, 非虛而然, 滋益之方, 群品稍衆, 藥力細微, 難見功效, 但固天元一氣, 使水升火降, 則五藏自和, 百病不生, 宜用**拱辰丹**.

[13-28] 論曰, 此證, 當用黑元與拱辰丹, 當歸・山茱萸, 皆爲蠱材, 藥力未全, 欲收全力, 宜用拱辰黑元丹・**鹿茸大補湯**.

15) 조각대황탕

皂角大黃湯

升麻・**葛根** 各三錢, **大黃**・**皂角** 各一錢.

用之者, **不可過三四貼**, 升麻 三錢, 大黃・皂角, 同局藥力峻猛, 故也.

승마・갈근 각3돈, 대황・조각자 각1돈.

이 처방을 쓰는 경우에 3, 4첩을 넘게 써서는 안되니, 승마 3돈과 대황・조각은 같은 약력을 가진 것으로 강하고 맹렬하기 때문이다.

- **공신**이 만든 처방: 대황 조각 [**이성구고환**에서 아이디어] ⇒ 加 승마 갈근 ⇒ **조열병**

✓ 관련 조문

[13-12] 論曰, 右諸證, 增寒壯熱燥澀者, 當用皂角大黃湯・葛根承氣湯. 頭面項
頰赤腫者, 當用皂角大黃湯・葛根承氣湯.

16) 갈근부평탕

葛根浮萍湯

葛根 三錢, 蘿蔔子・黃芩 各二錢, 紫背浮萍・大黃 各一錢, 蟬蛻 十箇.

○ 治浮腫, 裡症熱多者, 宜用.

갈근 3돈, 나복자・황금 각2돈, 자배부평・대황 각1돈, 제조 10개

부중에 리증으로 열증이 많은 경우에 써야한다.

- 본문 내용은 없지만, 부중 리증 열다

- 당시 단백질 부족(알부민부족)으로 인한 부종아니었을까 생각하심.

- 갈근: 간열 꺼춤

표병 약재	의이인 건울 마황
리병 약재	갈근 고본 대황

17) 건울제조탕

乾栗蟬蛻湯

乾栗 百枚, 蟬蛻 十箇.

湯服, 或灸食, 黃栗, 蟬蛻 十箇, 作末, 別用, 黃栗湯水, 調下.

○ 治浮腫, 表症寒多者, 宜用.

건울 100개, 제조 10개.

달여서 복용하거나 혹은 구워 먹는다. 황율과 제조 10개를 가루로 만들어, 별도로
황율 다린 물로 복용한다.

부중에 표증으로 한증이 많은 경우에 써야한다.

- 건울 1개 약 6g → 100개면 600g = 1돈 / 제조 10개: 약 4g

- 한증 多: 오한, 추위, 身痛 등

✓ 관련 조문

[13-35] 太陰人, 有腹脹浮腫病, 當用乾栗蟬蛻湯, 此病, 極危險證, 而十生九死
之病也, 雖用藥病愈, 三年內, 不再發然後, 方可論生, 戒侈樂禁嗜慾, 三年內, 宜
恭敬心身, 調養慎攝, 必在其人矣.

✓ 태음인 부중 처방 2가지: 갈근부평탕, 건울제조탕

浮腫	갈근부평탕	裡症熱多
	건울제조탕	表症寒多

※ 참고[작년 수업내용]: 체질별 부중 처방

태음인 부 중	갈근부평탕, 건율제조탕
소음인 부 중	적백하오관중탕, 십이미관중탕
소양인 부 중	목통대안탕, 형방지황탕+목통

18) 건율저근피탕

乾栗櫟根皮湯 乾栗 一兩, 櫟根白皮 三四五錢. ○ 治痢疾, 或湯服, 或丸服, 而丸服者, 或單用櫟根白皮 五錢.
건율 1냥, 저근백피 3, 4, 5돈. 이질을 치료한다. 혹은 다려서 복용하고, 혹은 환으로 만들어 복용하는데, 환으로 복용하는 경우에는 저근백피 5돈을 쓰기도 한다.

- 저근백피 들어가면 → 대부분 설사, 이질, 유정

19) 과체산

瓜蒂散 瓜蒂炒黃爲末 三五分, 溫水調下, 或乾瓜蒂 一錢, 急煎湯用. ○ 治卒中風, 臆膈格格, 有窒塞聲, 及目瞪者, 必可用. 此藥, 此病此證, 可用, 他病他證, 必不可用.

胸腹痛, 寒咳喘, 尤忌用. 雖滯食物, 不可用此藥, 而用他藥. ○ 面色青白, 而素有寒證, 表虛者, 卒中風, 則當用, 熊膽散 · 牛黃清心元 · 石菖蒲遠志散, 而不可用瓜蒂散.
과체를 볶아서 누렇게 된 것을 가루로 만들어 3. 5푼을 따뜻한 물로 복용하거나, 혹은 말린 과체 1돈을 신속히 다려서 복용한다. 졸중풍병으로 가슴이 가로막혀 틀어막힌 소리가 있으면서 눈을 부릅뜨는 경우에는 반드시 써야 한다. 이 약은 이 병과 증에는 쓸 수 있으나, 다른 병과 증에 써서는 안 된다. 얼굴빛이 푸르거나 희면서 평소에 한증으로 표허한 사람이 졸중풍에 걸린 경우에는 웅담산 · 우황청심환 · 석창포원지산 등을 써야 하며, 과체산을 써서는 안 된다.

☞ 태음인 흥복통, 한해천, 체식물에 과체산 사용하면 x

✓ 정리하면,

卒中風	臆膈格格, 有窒塞聲, 目瞪 [열증]	과체산
	面色青白 素有寒證, 表虛 [한증]	웅담산 우황청심원 석창포원 지산

20) 웅담산

熊膽散 熊膽 三五分. 溫水調下
웅담 3, 5푼. 따뜻한 물로 복용한다.

☞ 한꺠증 처방

✓ 관련 조문

[12-10] 論曰, 太陰人病, 寒厥四日, 而無汗者, 重證也. 寒厥五日, 而無汗者, 險證也. 當用熊膽散, 或寒多熱少湯, 加蟪蟪五七九介.
[12-14] 有一太陰人素病, 咽噎乾燥, 而面色青白, 表寒或泄. 盖, 咽噎乾燥者, 肝熱也, 面色青白, 表寒或泄者, 胃脘寒也. 此病, 表裡俱病, 素病之太重者也. 此人, 得瘟疫, 其證, 自始發日至于病解, 二十日. 大便初滑或泄, 中滑末乾, 每日二三四次, 無日不通, 初用寒多熱少湯, 病解後, 用調理肺元湯, 四十日調理, 僅僅獲生. (중략) 至于十日夜, 額汗還入, 而語訥耳聾, 尤甚, 痰涎壅喉, 口不能啗, 病人, 自以手指, 探口拭之, 而出十一日, 呼吸短喘, 尤甚. 至于十二日, 忽然, 食粥二碗, 斯時, 若論其藥, 則熊膽散, 或者可也, 而熊膽闕材, 自念此人, 今夜必死矣. 當日初昏, 呼吸, 暫時少定.

21) 사향산

麝香散
麝香 三五分. 溫水調下, 或溫酒調下. 只舉三五分, 則四分在其中.
사향 3, 5푼 따뜻한 물로 복용하거나, 따뜻한 술에 복용한다. 단지 3, 5푼을 거론했지만, 4푼도 해당된다.

✓ 관련 조문

[13-40] 中毒吐瀉, 宜用麝香.

22) 석창포원지산

石菖蒲遠志散
遠志 · 石菖蒲 各一錢, 猪牙皂角, 並末三分.
溫水調下, 或遠志 · 菖蒲末, 溫水調下, 皂角末, 吹鼻.
원지 · 석창포 각1돈, 저아조각 가루낸 것 3푼. 따뜻한 물로 복용한다. 혹은 원지 · 석창포 가루를 따뜻한 물에 복용하고, 조각가루는 코에 불어 넣는다.

23) 맥문동원지산

麥門冬遠志散
麥門冬 三錢, 遠志 · 石菖蒲 各一錢, 五味子 五分.
맥문동 3돈, 원지 · 석창포 각1돈, 오미자 5푼

- 사향산, 석창포원지산, 맥문동원지산 ⇒ 모두 중풍에 활용

24) 우황청심원

牛黃清心元
山藥 七錢, 蒲黃炒 二錢五分, 犀角 二錢, 大豆黃卷炒 一錢七分, 麥門冬 · 黃芩 各一錢五分, 桔梗 · 杏仁 各一錢三分, 牛黃 一錢二分, 羚羊角 · 龍腦 · 麝香 各一錢, 白朮 七分, 金箔 七十箔, 內二十箔爲衣, 烏梅 二十枚, 蒸取肉研爲膏, 右爲末, 烏梅膏和勻, 每一兩, 作二十丸, 金箔爲衣, 每取一丸, 溫水化下.
산약 7돈, 포황초 2돈5푼, 서각 2돈, 대두황권초 1돈7푼, 맥문동 · 황금 각1돈5푼, 길경 · 행인 각1돈3푼, 우황 1돈2푼, 영양각 · 용뇌 · 사향 각1돈, 백령 7푼, 금박 70

개(이중 20개는 옷을 입히는데 쓴다). 오매 20개를 찌서 과실육을 취하여 갈아 고로 만든다. 이상의 약들을 가루내어 오매고에 골고루 섞어 1냥당 20환[⇒ 1개당 2g]을 만들고, 금박으로 옷을 입힌다. 매번 1알을 따뜻한 물에 먹는다.

✓ 관련 조문

[13-39] 牛黃清心丸, 非家家必有之物, 宜用遠志・石菖蒲末各一錢, 灌口, 因以皂角末三分, 吹鼻. 此證, 手足拘攣, 而項直, 則危也, (생략)

25) 수치법

○ 右太陰人藥, 諸種, 杏仁, 去雙仁, 去皮尖, 麥門冬・遠志, 去心, 白果・黃栗, 去殼, 大黃, 或酒蒸, 或生用 鹿茸・皂角, 酥炙, 酸棗仁・杏仁・白果, 炒用.

이상의 태음인약 여러 종류 중에 행인은 두 개의 씨알맹이와 피침(알맹이 끝의 씨눈)을 제거하고, 맥문동과 원지는 심을 빼버리며, 백과와 황을 껍질을 제거하고, 대황은 술로 찌거나 날 것으로 쓰며, 녹용과 조각은 졸인 것을 발라서 볶고, 산조인, 행인 백과는 볶아서 쓴다.

※ 참고[작년 수업내용]: 체질별 수치법

① 소음인 신경방에 수록된 수치법

右少陰人藥諸種, 付子, 炮用, 甘草, 灸用, 乾薑, 炮用, 或生用, 黃芪, 灸用, 或生用. 窮巷僻村, 病起倉卒, 雖單方, 猶百勝於束手無策. 陽明病, 雖單黃芪・桂枝・人蔘・芍藥, 亦可用. 少陰病, 雖單付子・芍藥・人蔘・甘草, 亦可用. 太陽病, 雖單蘇葉・蔥白・黃芪・桂枝, 亦可用. 太陰病, 雖單白朮・乾薑・陳皮・藿香, 亦可用. 爲先用單方, 而一邊求得全方, 則必無救病失機之理. 然, 當用, 全方中, 所有之藥, 不當用, 全方中, 所無之藥.

이상의 소음인의 여러 약 중에 부자는 구워서 쓰고, 감초는 볶아서 쓰며, 건강은 구워서 쓰거나 날 것으로 쓰고, 황기는 구워서 쓰거나 날 것으로 쓴다. 궁벽한 산간 벽지에서 갑자기 병이 생길 때, 속수무책으로 그냥 놔두는 것보다 비록 단방이라도 쓰는 것이 좋다. 양명병에 황기・계피・인삼・작약 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있으며, 소음병에 부자・작약・인삼・감초 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 태양병에 소엽・충백・황기・계지 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있고, 태음병에 백출・건강・진피・곽향 등을 비록 단독으로라도 쓸 수 있다. 먼저 단방을 쓰더라도 한 편으로 온전한 처방을 구하여 쓴다면 병을 고칠 기회를 놓치지 않을 것이다. 그러나 약을 쓸 때에는 처방 중에 들어 있는 약만을 써야 하며, 처방에 없는 것은 써서는 안 된다.

② 소양인 신경방에 수록된 수치법

(생략) 則甘遂爲君. 右少陽人藥諸種, 不可炮炙炒煨用.

이상의 소양인 약물은 포구초외(炮炙炒煨)하여 사용하는 것이 불가하다.

- 소음, 태음인 신경방은 마지막에 따로 수치법 나와있음
- 소양인 신경방은 17번째 약재인 감수천일환 부분 끝에 한 줄 정도 있음

갑오본과 경자본의 차이점)

교수님께서 강조하셨던 내용위주로 정리. (갑오본과 경자본에서의 처방별 약재 구성 차이는 와플 13주차 강의자료 피피티에 나와있는거 참고해주세요.)

-명칭의 차이 (갑오본 : 외감표병경증 ->경자본 : 배추표병경증)

처방의차이)

- 외감표병경증에서 처방을 갑오본은 계마각반탕을 사용.

- **한궐증에서 갑오본은 갈근해기탕**을 사용! (경자본은 한다열소탕)

->가장큰 차이인데 **갈근해기탕을 갑오본에서는 표병의 처방**으로 인식했음.

(경자본에서는 리병에 쓰는 처방.)

- 갑오본에서는 복통자리(설사)에 길경생맥산을 사용함.

->경자본에서는 설사에 태음조위탕을 사용. 즉 태음조위탕도 경자본에서 표,리의 개념이 바뀜.

(경자본에서 위완한증(표증)에 태음조위탕을 사용 (설사))

-청심연자탕이 경자본에서는 어느 상황에 쓰는지 원문이 없었지만 갑오본에서는 생각이 많아서 생긴 허로증(중풍증)에 청심연자탕을 썼었음.

->경자본에서 이 부분을 빼 이유는 이러한 중풍증이 생각으로인한 허로가 아니라 간열로인해 말라버렸다고 생각했기 때문이다.

이부분에서 경자본에서는 한열에 좀 더 주안점을 두었다는 것을 알 수 있다.