

24장. 증후

제 5절 한증

1. 개요

- 한증(汗證) : 비정상적인 한출
- 소아의 한증
- : 안정된 상태에서 전신 혹은 국부적으로 과도한 한출이 있는 것. 영유아~학령전기 아동에 다발
- 서의학적 다한증 : 체온조절 필요량을 넘어 땀이 나는 것

2. 자한

자한 : 별다른 이유 없이 자연히 나는 것

변증시치

曰 : 일단 수업을 음허자한, 양허자한만 띄워놓고 수업하시기도 하셨고(나머지는 삭제하심), 기출도 두 개밖에 없어서 이 두 개만 아시면 될 것 같아요

자한 : 별다른 이유 없이 자연히 나는 것. 도한 (밤에 나는 것)과 구분!

변증	증상	치법	처방
음허자한 기출 ★	- 평소에 더워하며 편도도 비대되어 있다 - 코피가 자주 난다 - 식욕이 좋다 - 변비가 있다. - 경면설, 맥세삭 曰 : 음허자한의 감별법 1. 평소에 더워한다	자음고표	당귀육황탕 합 사군자탕
양허자한 기출 ★	-평소에 자주 추워한다 - 숨이 잘 찬다 - 식욕부진하고, 조금만 먹어도 복부가 창만하다 - 대변이 묽다	온양지한 (溫陽止汗)	계지가부자탕

	- 설반눈, 맥지약 曰 : 양허자한의 감별법 1. 평소에 추워한다		
표허	기단나연 설태박백 맥허무력	보기고표 (補氣固表)	옥병풍산
양명경에 실열	발열불오한 한출여증 기부작열	신한청열 (辛寒淸熱)	백호탕
열성	대변불통	공하사열 (攻下瀉熱)	조위승기탕

(2) 허실별 진행

① 허증 : 양기허약(陽氣虛弱) → 주리불밀(腠理不密) → 위기공소(衛氣空疎) → 진액이 밖으로 발설
(허증은 표허자한 기준)

② 실증 : 양명열성(陽明熱盛) → 사열(邪熱)이 훈증 → 汗이 외설(外泄)

3 도한

도한: 수면중에 땀이 나며 깨어나면 그치는 것

변증시치

曰 : 교과서 개정 후는 심허, 폐허, 신음허로 나뉘는데 수업에서는 음허도한, 양허도한으로 수업하셨습니다. 기출을 보니까, 제 생각에는 음허도한, 양허도한으로 나오는 것 같아서(교수님이 교과서 개정 전으로 시험을 내시는 듯), 나 오면 음허도한 양허도한으로 쓰시는 게 나을 것 같아요.

- 교과서 개정 전

변증	증상	치법	처방
----	----	----	----

음허도한 기출 ★	- 평소에 더워하며 편도도 비대되어 있다 - 코피가 자주 난다 - 식욕이 좋다 - 변비가 있다. - 경면설, 맥세삭 曰 : 음허도한의 감별법 1. 평소에 더워한다	자음고표	당귀육황탕 합 사군자탕
양허도한 기출 ★	-평소에 자주 추워한다 - 숨이 잘 찬다 - 식욕부진하고, 조금만 먹어도 복부가 창만하다 - 대변이 묽다 - 설반눈, 맥지약 曰 : 양허도한의 감별법 1. 평소에 추워한다	온양지한 (溫陽止汗)	계지가부자탕

● 교과서 개정 후

변증	증상	치법	처방
① 심허	심계, 심번다몽 수족심열 설홍소진, 맥세삭	양혈자음 (養血滋陰) 녕심안심 (寧心安神)	산조인탕
② 폐음허	해수, 기단, 가래가 적고 끈끈 오심번열 설홍소 태, 맥세삭	자음청화 (滋陰淸火) 윤폐익음 (潤肺益陰)	백합고금탕
③ 신음허	요슬산연, 요통 오심번열 설홍소태, 맥세삭	자음사화 (滋陰瀉火)	당귀육황탕

3. 한출 부위에 따른 분류

변증	증상	원인	처방
1) 두한(頭汗)	두면부·두경부에는 땀 O, 신체에는 X	위가(胃家)에 실열 (양명 병)	조위승기탕

		홍협에 수결	적복령탕
		폐열	-
2) 수족한(手足 汗)	수족이 항상 조습. 다른 부위엔 땀 X	비위습열, 비기허쇠, 음허 양성	귀비탕 + 고삼지제*
3) 심홍한(心胸 汗)	가슴 부위에만 땀	심기허, 심혈허	-
4) 반신한(半身 汗)	좌·우반신, 상·하반신에 땀. 반대쪽엔 땀 X	담(痰), 어(瘀), 습(濕)	-
5) 액한(腋汗)	겨드랑이~옆구리까지 국소적 땀 & 조 습	간경습열, 심양허약	-
6) 음한(陰汗)	하초 음부에 땀	하초습열울증, 신허양쇠	삼미안신환 팔미지황 환

제 5 절 서증

1. 서의학적 분류

1) 전염병 : 일본뇌염, Dengue열, 렙토스피라, 인플루엔자

2) 열 스트레스 질환(中暑)

	심부체온	임상증상	치료
열실신	정상	• 현기증, 기립성 저혈압 • 눕히면 빠르게 회복되는 실신	• 시원한 환경으로 이동, 양와위 • 염분 포함 음료를 먹이거나 정맥내 수액 사용
열경련	정상 혹은 ≤40℃	• 운동 후 하지 대근육 통증성 경련	• 근육 스트레칭 및 마사지 • 염분 포함 음료를 먹이거나 정맥내 수액 사용
열테타니	정상 혹은 ≤40℃	• 과호흡 및 수족 연축, 후두연축, 입 주위 감각이상	• 시원한 환경으로 이동 • 지속시, 저농도 산소 마스크 사용

④ 열탈진	≤40°C	• 현기증, 짧은 실신, 빠른 치료에 반응하는 경도 혼란 • 정상 혈압, 빈맥, 경도-중등도 탈수 • 오심, 구토, 두통, 피로, 쇠약, 갈증, 발한	• 즉시 운동 중단, 시원한 환경으로 이동 • 과도한 의복 벗기고 염분 포함 음료를 먹임
⑤ 열사병	>40°C	• 중추신경계 기능이상 • 무한증	• 열 스트레스 원인을 제거 • 부채질, 얼음찜질 등 빠르게 냉각 시행 • 필요시 안정, 정맥내 수액, 급속 냉각, 장기기능부전 치료 시행

2. 한의학적 분류

① 상서 (傷暑)	• 신열, 두통, 몸을 찌르는 듯한 느낌	• 인삼백호탕, 죽엽석고탕
② 모서 (冒暑)	• 소화기 장애 유발	• 황련향유산, 청서육화탕
③ 복서 (伏暑)	• 모서(冒暑)가 오래되어 삼초와 장위 간에 잠복하다가 변하여 - 한열왕래, 토사곽란, 변갈 유발	• 주증환련환, 계령감로산
④ 중서 (中暑)	• 더위에 상한 것(광의) /心に 사기가 들어가서 의식장애(협의)	
⑤ 서풍 (暑風) 서궤 (暑厥)	• 체온조절능력 상실 ⇒ 체온 이상상승 ⇒ 중추신경장애 - 서풍 : 경련이 나타남 - 서궤 : 의식장애 + 사지냉 (더위먹고 쓰러지는 걸로 생각)	
⑥ 음증상서 (陰症傷暑)	• 더운 여름 지나치게 서늘한 곳에 장시간 있다가 발생. 현대에는 냉방기기 과사용이 원인	
⑦ 양증상서 (陽症傷暑)	• 장시간 강한 직사광선에서 보행이나 훈련, 노동을 한 후에 발생	

⑧ 주하병 (注夏病)	• 늦봄~초여름에 발생, 가을 이후에 점차 호전 매년 주기적으로 발생 질병 기간이 비교적 길다 • 비위허약한 소아에서 多 • 증상 : 두통, 전신권태, 식욕부진, 대변부조 • 감별 진단 : ❶ 명확한 발열이 없음 ❷ 비위 증상 위주 하계열과의 감별 포인트!
⑨ 하계열 (夏季熱)	• 체온조절이 미숙한 영유아 시기의 급성 변화가 없는 -> 서열증 • 증상 : 발열이 오래감, 구갈다음, 다뇨, 땀 조금 or 땀 막힘 • 나이 : 6개월 ~ 3세에 주로 생기고, 5세 이상이 되면 나타나지 않음 • 계절 : 여름(6-8월)에 집중적으로 생기고, 가을이 되면 자연회복 → 예후 양호

3. 하계열 변증시치

하계열: 여름에 발열이 지속된다고 함

변증	증상	치법	처방
① 서상폐위 暑傷肺胃 기출 ★	-오후에 발열이 심해짐 -구갈 인음함(목이 말라 물을 마시려고함) - 피부가 건조함 - 땀이 나지 않거나 땀이 조금 남 曰 : 서상폐위의 감별법 1. 오후에 발열이 심해진다	청서익기(淸暑益氣) 양음생진(養陰生津)	청서익기탕 곽향정기산, 생맥산
② 서습상비 暑濕傷脾 기출 ★	- 열이 오르락 내리락 한다 -신열불창 (몸에 열이 나고 몸이 시원치않다) -구갈욕음 (목이 말라 물을 마시려고함) -면색창황(얼굴이 노랗다) -음식을 먹지 않는다 -대변이 윤택하지 않다 曰 : 서습상비의 감별법 1. 열이 오르락 내리락한다	건비익기(健脾益氣) 청서화습(淸暑化濕)	전씨백출산 곽향정기산

③ 상성하허 上盛下虛	열이 아침에 심하고 저녁에 완화 면색창백, 소변 색 맑고 깨끗 설담태황, 태박맥, 맥침삭무력 曰 : 상성하허의 감별법 1. 열이 아침에 심하고 저녁에 완화	청상온하(淸上溫下)	청상온하탕
④ 열류음분 熱留陰分	저녁에 열·몸은 차가움(暮熱身涼), 수족심열 소변 담황색, 소변 잿음 설질홍강, 무태 혹은 소태, 맥세침이삭 曰 : 열류음분의 감별법 1. 저녁에 열, 몸은 차가움	자음청열(滋陰淸熱)	청호별갑탕 백호가인삼탕

제 9 절 감증

- 감증(痾證) : 영양 부적당, 질병 ⇒ 비위의 운화 기능 손상

⇒ 기혈진액의 화생이 소아의 발육에 대한 수요를 만족X, 만성 영양장애

1. 증상

- 주증상 : 전신허약, 몸이 야윈, 면황, 머리·피부 푸석푸석, 정신이상 + 생장발육 지연

- 감별 진단

감증(痾證) : 후천적인 비위의 허약, 체질허약이 원인

노체(癆瘵) : 선천적인 폐신의 음허가 원인

2. 변증 시치

曰 : 이건 수업에서는 교과서 개정 후로, 기출을 보니까, 이 역시 교수님이 교과서 개정 전으로 시험을 내셨습니다.

아마 19때도 안 나왔고, 기출이 많은 파트가 아니라서 기출에 나온 것만 보셔도 될 듯하나, 공부하실꺼라면 교과서

개정 전으로 공부하시는 게 좋을 듯 합니다. .

간감 : 식욕부진, 식욕감소가 주소입니다

● 교과서 개정 전

변증	증상	치법	처방
비감 기출 ★	- 얼굴이 누렇다 - 머리카락에 윤기가 없고 건조하다 - 코와 입이 말라있다 - 식체 이후 기름지고 영양가 높은 음식을 먹어 더 병이 악화되었다 曰 : 비감의 감별법 1. 식체 이후 기름지고 영양가 높은 음식을 먹어 더 병이 악화되었다	비위조리	삼령백출산
간감 기출 ★	-눈이 따끔거리고 아파, 자주 비비게 된다 - 얼굴이 푸르다 - 몸이 여위다 - 헛배가 부르고 설사를 자주 한다 曰 : 간감의 감별법 1. 눈을 비빈다	청간사화, 청열제감	시호청간산, 노회비아환

● 교과서 개정 후

변증	증상	치법	처방
감기(痾氣)	말라보임 면색소화 모발이 적음 정신부진, 편히 못 잠 외감에 쉽게 걸리고 변비	조화비위 (調和脾胃) 익기조운 (益氣助運)	자생건비환
감적(痾積)	확실히 마름 면색위황 모발 적고 황색, 푸석 정신 번조, 편히 못 잠 배가 부풀어 커짐, 식욕감퇴, 이식증, 손 빨고 이를 간다	소적리비 (消積理脾) 화중청열 (和中淸熱)	비아환
건감(乾痾)	뼈가 보일 정도로 마름 노인처럼 보임 모발 건조 정신위미	보익기혈 (補益氣血)	팔진탕

	피부 말라서 주름, 입·혀 건조, 복부 함몰된 것처럼 보임		
--	----------------------------------	--	--

제 10 절 비만

1. 원인

- 한방 : 고량후미다식. 주요 장부는 비·폐·신 (脾가 가장 중요!)
- 양방 : 과도한 음식섭취, 유전적 소인, 사회 경제적 요인, 운동부족 등

2. 진단

- BMI 95백분위수 이상 또는 체질량 지수가 30이상인 사춘기 아이는 과체중으로 진단
- BMI 계산법 : 몸무게 / 키 (m^2)

현재 우리나라 체질량지수(BMI) 기준	
분류	BMI
저체중	0~18.4
정상체중	18.5~22.9
과체중	23~24.9
비만	25~29.9
고도비만	30 이상

*세부 기준 : ①비만도 20% 이상 ②체질량지수 95백분위수 이상 ③피부주름두께 95백분위수 이상

3. 합병증

(1) 소아 비만의 합병증

- 고도비만의 합병증 : 고지혈증(61.7%), 지방간(38.3%), 고혈압(7.4%), 당뇨병(0.38%)
- 기타 합병증 : 간기능 이상, 심인성 정신장애, 수면 무호흡 증후군, 내분비 이상(성조숙, 인슐린 저항성 등), 대퇴골두 골단 분리증 등

(2) 합병증 검사

① 심혈관 질환 및 당뇨 검사	• 혈중지질, 금식시 포도당·인슐린 농도, HbA1c, 간기능 검사
② 갑상선저하증과 고코티솔혈증 감별	• 자유티록신(fT4), 갑상샘자극호르몬, 24시간 소변내 자유 코티솔 등
③ 렙틴 농도 및 유전자 변이 검사	• 가족력에 비해 비만이 심하게 빨리 발생한 경우 → 단일 유전자 결함 확인

4. 치료

(1) 치료 목표

- ① 소아 비만치료에서는 “어린이가 성장하고 있다”는 것을 고려
- ② 성인 비만치료의 목표 : 체중감량

소아 비만치료의 목표 : 비만도 감소

(2) 허실에 따른 치법

① 허증	건비법 위주	+ 익기, 보신, 온양, 양음법
② 실증	거습, 화담, 이수법 위주	+ 활혈화어, 소도법

[참고]

3. 변증시치 曰 : 변증시치 관련 문제가 나왔는데, 몰라도 풀 수 있는 거라 바쁘시면 몰라도 될 것 같긴 합니다.

비만이 주소

변증	증상	치법	처방
1. 비허습열	- 부종이 있다 - 무력하고, 몸이 무력하다 - 배가 뽕뽕하다 曰 : 비허습열의 감별법 1. 허증	건비익기 화습소증	평위산
2. 위열습조	- 배가 빨리 고프다 - 머리가 어지럽다 - 말하는 것도 귀찮아한다 - 구갈다음 - 대변비결 曰 : 위열습조의 감별법 - 현훈이 있다	청위사열 제습소증	사황산
3. 비신양허	- 부종이 있다 - 무력하다 - 요슬산연이 있다 - 몸이 차고, 추운 것을 싫어한다 曰 : 비신양허의 감별법 1. 양허증 (요슬산연, 몸이 차다)	보비고신 온양화습	육군자탕 합 오자연종환
4. 음허내열	- 요통산연 - 오심번열 - 저열 - 두통 曰 : 음허내열의 감별법 - 음허증 (오심번열)	자음청열(滋陰淸熱)	기국지황환
5. 간기울결	- 흥협창민 - 완복비만 - 월경부조 - 폐경 曰 : 간기울결의 감별법 - 간병 (옆구리가 아픔)	소간이기 활혈화어	시호소간산