

1절. 소아과학의 개념

✓ 소아과학의 정의

[1] 목적

태생기로부터 청소년기에 이르기까지의 성장 발달하는 과정에서 신체적, 정신적, 사회적으로 건강하고 훌륭한 성인이 될 수 있도록 기틀을 마련해주는 것

[2] 의의

- ① 연령과 성별에 따른 건강 표준 수립
- ② 소아 특유의 생리 병리 연구
- ③ 질병의 예방, 진단, 치료법의 연구와 개발
- ④ 한의학적 섭생법 연구

✓ 소아과학의 역사

1) 萌芽期(맹아기)

① 春秋戰國時代 이전

- 최초의 소아과 의사인 扁鵲에 관한 기록
- 소아의 선천성 기형 질환의 언급

② 春秋戰國時代 ~ 秦漢時代(B.C 770~221부터 B.C 221~ AD 220까지)

東漢末(동한말)의 張仲景 : 소아과학의 발전에 많은 영향

-《傷寒論》의 처방은 급성 열성병, 유행성과 전염성 疾患에 유효한 처방들

-《金匱要略》의 장부변증은 錢乙의 장부변증의 기초가 됨

-왕속화 <맥경> : 小兒辨證의 기재

-《黃帝內經》: 소아과학 형성에 원칙을 제시

(2) 形成期 형성기

① 三國, 兩晉, 隋唐시대 AD260~960 (체계적 경험 쌓이는)

- 이 시기의 특징

: 전문적인 少小科로 분과

: 太醫署에서 교육 받아 전문의사가 되는 제도로써 전문의에 관한 초보

적 형성

- 소아의 건강을 유지, 질병의 예방을 중시

- 臍風(신생아 파상풍)을 인식하여 감염을 방지를 위한 방법 소개

- 소아의 四大證인 痘(천연두), 麻(홍역), 驚(경련), 疳(영양결핍)이 기재되어 있음 → 소아과 질병에 대한 예방치료에 큰 공헌을 함

- 巢元方 《諸病源候論》

: 증후와 병인병리에 대해 계통적으로 논술

- 孫思邈 《千金方 少小嬰孺方》

: 소아의 양육, 조리, 발육, 일상생활 등 여러 방면의 내용 풍부

- 王臺 《外臺秘要 小兒諸疾》

: 당대이전과 당대 의가의 의론과 처방을 수집하여 당시의 소아과에 대한 대략을 알 수 있음

- 《顛風經》

: 최초의 소아과 전문서로서 “순양”이론과 맥법, 火丹(丹毒), 驚癇疳痢

등을 논술.

: 현존하는 것은 <四庫全書>에 수록

: 무방의 저서명을 빌어 지은 것으로 당말송초에 저작된 것

② 兩宋시대(A.D 960~1219)

- 錢乙 : 北宋의 명의 《소아약증직결》

: 소아과학의 발전에 중대한 영향을 미침

: 실용적인 소아과 전문서

- 소아의 생리병리 특징을 개괄 “臟腑柔弱, 易虛易實, 易寒易熱”

- 진단에 있어서 망진을 중시하여 “面上證”과 “目內證”

- 오장한열허실의 변증 및 치법과 오장보사방제를 만들

었음

- 맥법 : 맥관, 현급, 침완, 측급, 부, 침의 6가지로 임상 실제와 부합

- 발진성 전염병의 감별을 상세히 묘사 & 치료에 있어서 비위의 조리를 중시

- 환, 산, 고, 단 등의 제제약 개발 & 육미지황환 등 고방을 활용하여 新方을 창제

-董汲의 <소아반진비급방론>

: 두진의 전문서

: 寒涼법으로 치료함

-진문중의 <소아병원방론-소아두진방론>

: 두진을 온보방약으로 치료

: 동급과 진문중 두 사람의 대비되는 학술관점 → 후세 소아과에 많은 영향을 미침

-劉昉의 <幼幼新書>

: 송대이전의 소아과 관련 학술을 집대성한 것

: 그 당시로 내용이 가장 완비된 소아과 전문서

-<小兒衛生總微論方>

: 저자가 알려져 있지 않음

: 명대 弘治 2년에 “保幼大全”으로 개명하여 간행

: 제풍의 예방과 관련한 기술과 선천성 기형에 대한 기재가 있음

: 南宋 시기에 소아과학이 진보했음을 알 수 있다

-<성제총록-소아문>

: 진당 이후에 내려오는 소아과 관련 논저

: <천금방>, <외대비요>에 비해서 간단명료하여 <四庫全書>에 수록되었다.

(3) 발전기 發展期 (금원사대가의 영향)

① 금원시대 ★ 교수님 피셜 주관식 1번으로 낸다!

- 의학이론에 대한 백가쟁명의 시기

- 소아과 분야에 있어서 새로운 내용이 추가

▶ 특히 금원사대가의 독특한 견해가 소아과학에 큰 발전

-유하간 <선명방론-兒科論>

: 주하론, 한량파

: “大概小兒病者純陽, 熱多冷少也”

소아는 열병 (체질소인, 病邪의 성질)을 많이 앓는다

: 辛苦寒涼藥物로 열성병을 치료함 (실제와 많이 부합함)

: 즉 해표하고 청열하는 약을 많이 썼다 (防風通聖散)

방풍통성산은 '쌍해통성산'이라고도 한다. 근데 교수님은 안 쓰심.

-장자화

: 공하파

: 소아질환은 대부분 외감육음과 내상음식으로 인한 것이 많음 → 한토 하법을 사용

曰: 감기걸리면 발한시키고, 체해서 쌓여있으면 토시키고, 아랫배가 보글보글하면서 안 좋으면 설사시킨다. 한토하의 삼법을 사용함!

: “養生當論食補, 治病當論藥攻”을 제출

→ 食補藥攻을 제창하며 질병의 예방을 중시함

: 소아의 건강한 성장발육을 위한 측면에서 중요한 의의

-이동원

: 보토파(비위론)

: 소아의 장부는 微弱하여 비위의 병이 가장 많다

→ 비위의 조리를 중시

→ 비위학설의 제창

→ 소아비위에 대한 전일보된 인식으로서 중요한 의의

-장원소

: 장부의 변증용약을 중시

: 전율의 “五臟所主”와 “五臟補瀉”를 기초하여 보충함

-주단계

: 소아과에 대한 더욱 중요한 관계를 가진다

: “陽常有餘, 陰常不足”의 이론

→ 滋陰을 중요시 함

→ “乳下小兒常濕熱多”

“小兒食積, 痰熱, 傷乳爲病, 大概肝與脾病多”

“小兒易怒, 故肝病最多, 肝只是有餘, 腎只是不足”

小兒易怒, 肝常有餘, 腎常不足.★

-元代

:소방맥의 명칭 외에 유과도 병칭하여 사용되기 시작

: 曾世榮의 <活幼口議>, <滑幼心書> → 소아과 전문의 보급과 발전을 촉진

명청시대 (변증논치로 돌아가려 한 시기)

◎ 소아과 전문의가 급격히 증가

◎ 대량의 소아과 전문서적이 출현

◎ 소아과 기초 이론 연구가 심화

◎ 온병학설이 발전

◎ 痘麻疹의 전문서가 형성, 증두법의 발명

① 明代

-薛氏 文子들

- 설기 <保嬰撮要> ★

: 脾腎 및 脾腎과 각 장부 간의 상응관계를 중시(東垣의 補脾論 + 錢乙의 補腎論)

- 薛立齋 <保嬰粹要>

: 장부허실변증 가운데 비신 및 비신과 각 장부간의 상응관계를 중시

: 역수학설을 응용해서 자신의 임상경험과 연계한 것으로 소아과 학 발전에 상당한 공헌을 함

-萬全 ★(3개년)

: 전을을 기초로 해서 단계학설의 영향하에 “三有餘四 不足”의 관점을 제출

有: 간심 + 양 // 無: 폐비신 + 음

: 후세 소아의 생리병리 특징을 연구하는데 중요한 영향을 줌

: 추나요법을 응용함

: 치료에 있어 비위를 중시함

: 예방을 위주로 태교와 교육을 중시함

: <幼科發揮> <育嬰家秘> <片玉心書>

-장경약 ★

: 전을, 설기를 추종

: <경약전서-소아칙> : 소아변증에 있어 표리한열허실을 표준으로 해서 후세 소아과에서 팔강변증을 응용하는데 규범이 되었다

-魯白嗣(어사백) <嬰童百問>

: 100문의 소아증례를 논술

: 800여 처방을수록

-王肯堂(왕금당) <幼科準繩(유과준승)>

: 내용이 풍부하고 이전의 방서를 광범위하게 수집하여 정리

-<晉濟方-嬰孩>

: 명나라 이전의 경험을 총결한 방서

② 清代

- 夏禹鑄(하우주) <幼科鐵鏡>

: 호구삼관지문의 진단에 대한 異議를 제기

: 望面色審苗竅와 장부허실변증을 주장

: 推拿, 燈火요법을 중시함

- 陳復正 <幼幼集成> ★(2개년)

: 소아지문진단에 대한 객관적인 분석을 함

: 小兒勿輕服藥을 주장

: 종합요법, 내외겸치, 단용외치를 응용함

曰 : 아토피가 심하고 두피염이 너무 심할 때, 양약은 스테로이드를 쓰면 아기의 면역력이 너무 떨어진다. 교수님은 지실 → 지실, 고삼 → 지실, 고삼, 토복령, 어성초, 황금을 피부에 발라주기만 했는데, 2주만에 깨끗해짐.

: 경풍은 일종의 병이 아닌 여러 가지 요인으로 발생하는 질병에 모두 나타날 수 있는 일종의 증후로 인식했다

장염에 걸려서 고열이 나도 경련을 일으킬 수 있음

-섭천사 <유과요략>

: 위기영혈으로 온병변증의 강령으로 삼았음

: 비위학설의 연구를 진행하여 비와 기타 장부와의 관계를 진일보하여 밝힘

-오국통 ★

: 온열병의 치료에 있어서 청열양음법의 확립으로 소아의 열성병에 있어서도 많이 활용하여 좋은 효과를 거두고 있음

: <온병조변-해아난> “小兒稚陰稚陽”학설을 주장

曰: 소아는 아직 음도 어리고 양도 치하다.

: 용약에 있어서 “苦寒藥爲兒科之大禁”으로 인식함

③ 청대 말

-서양의학이 도입되면서 중의학에 많은 충격을 가져다 줌

-中西醫學匯通의 길이 열리게 되었다

✓ 우리나라 소아과학의 역사

(1) 삼국시대

(2) 통일신라시대

- 의학에 있어서도 당에 의존

- 불교에 수반된 인도의설과 의방이 영향을 미침

- 이 시기에 소아과는 少兒科로 분과

- 약물요법과 침구술이 주로 병행

(3) 고려시대

소아의 질병원인, 약증에 관한 지식이 조금 나옴

-《救療小兒病經》: 소아의 初生日부터 12세에 이르기까지의 질환을 치료하는 소아과학 서적

-《小兒巢氏病源》: 巢元方の《諸病源候論》중의 소아 부분만을 따로 떼어 출판한 것

-《鄉藥集成方》: 소아과부문에만 9개의 方文이 인용됨

-F 국내산 약재로 질병치료 목적으로 간행

(4) 조선시대

- 趙廷俊 《及幼方》: 우리나라 최초의 소아과 전문서, 《醫學入門》과 《錢乙諸方》을 위주로 함★

- 李獻吉《麻疹方》, 丁茶山《麻科會通》, 洪奭周《麻方統彙》, 李元豐《麻疹彙成》 등의 麻疹書

- 崔奎憲 《小兒醫方》 등

✓ 소아질병의 변천사

- 과거 소아과 4대 질병은 痘麻驚疳(천연두, 홍역, 열성 경련, 영양실조)
- 예방접종과 식생활 변화로 인해 광복 전 소아의 주요 질병은 감염과 영양장애였음
- # 예방접종의 발달로 두진은 찾아볼 수 없게 되었고, 마진도 감소. 감병은 식생활의 변화로 현저하게 감소. 광복 전 소아의 주요한 질병은 감염과 영양장애이다.
- 경제상태의 개선, 항생제 개발, 예방접종의 보편화로 인해 감염증과 영양실조증이 급격히 감소함
- 바이러스성 감염, 알레르기 질환, 악성종양, 선천기형, 사고, 중독 등은 그대로 남아있으면서, 비만이 차차 문제가 되고 있음
- 선천이상, 뇌성마비, ADHD 등에 의한 심신장애아, 학습부진아, 가출, 청소년비행, 약물 남용, 혼전 임신 등이 증가하고 있음

2절. 소아기의 분류

A) 출생전기 : 모체의 자궁 내에서 생활하는 기간

- F 모체의 질병, 약물등에 민감한 시기
- 배아기(embryonic) : 수정으로부터 8주, 약물, X선, 감염병 등에 영향이 큰 시기
- + 4~8주간은 주 요기관의 구조적 형성이 이루어짐.
- 태아기(fetal) : 임신 9주부터 출생, 각 장기가 자라며 기능적으로 완성됨

B) 신생아기 : 생후 4주

- 자궁 밖에서의 생활로 변화, 적응하는 시기
- 협의의 신생아기 : 생후 1주(광의 -4주까지)
- 출생전후기 : 재태 22주부터 생후 1주, 사망 또는 장기 예후의 관점에서 볼 때 중요한 시기

C) 영아기(infancy) : 乳兒期, 생후 1개월~1년

- 성장발육이 왕성하다.
- 모유 또는 모유 대용 영양품을 주식으로 섭취하는 기간
- 성장과 발육이 특히 왕성하고 영양 장애도 생기기 쉬운 시기

D) 유아기(preschool period) : 幼兒期, 생후 1~5년

- 보행, 언어 등의 발달이 왕성하다.

교수님께서 워딩으로 2~5년이라고 하심

E) 학령기(prepubertal period) : 생후 6년~10년

F) 사춘기(puberty) : 생후 11년~20년

- (남 12~20년, 여10~18년)
- 소아가 성인이 되어가는 이행기
- 2차 성징이 뚜렷해지고 정신적 으로도 감수성이 예민해짐

3절. 소아의 특징

A) 생리적 특징 ★(3개년)

[1] 臟腑嬌嫩, 形氣未充(稚陽未充 稚陰未長)

- 선배 첨언: 성장 : 체중증가 / 발달 : 신경계통이 발달하여 앓고 기는 것들이 발달하는 것!
- ① 臟腑嬌嫩 : 小兒의 각 기관의 발육이 성숙하지 못한 것 (특히 폐, 비, 신)
- ② 形氣未充 : 형체와 기능이 완전하지 못한 것

● 《幼科發揮》의 脾常不足 肺常不足 腎常虛 - 脾常不足 : 성장발육이 신속하여 영양물질 요구량이 많은데 비해 脾胃運化는 왕성하지 못하여 생긴 상대적부족 - 腎常虛 : 성장발육, 질병에 대한 저항력, 骨格, 腦髓, 髮, 耳, 齒 등이 腎과 밀접한 관계를 가짐 - 肺常不足 : 항상 부족한 脾氣의 強弱이 肺氣의 強弱을 결정

[2] 生機旺盛, 發育迅速

- ① 미성숙한 시기에 있어서 생기왕성하고 발육이 신속함
- ② 陽氣가 偏盛하여 “陽常有餘 陰常不足”한 것 ; 熱病이 많고 火熱化火하기 쉬운 특징
- 선배 첨언: 소아는 열병이 많다!
- 선배 첨언: (ppt에는 生機蓬勃 : 쑥이 자라듯 쑥쑥 자란다는 뜻)

B) 병리적 특징 ★(9개월)

[1] 易于發病 : 장부와 衛外기능이 약해 外因(六淫所侵)과 內因(飲食所傷)에 상하기 쉽다.

曰: 질병의 이환과 전변이 쉽다.

-특히 脾肺(소화기 호흡기) 질환이 60-70%를 차지한다.

-肝常有餘로 인한 질환이 적지 않다.(열성질환, 급경련 소아에 게만 나타남)

선배첨언: 심주경 간주풍

-心氣不足 神氣怯弱하여 夜啼 夜驚 유뇨 유분 식욕부진 행동 장애가 발생하기 쉽다.

-脾常不足하여 각종 질병 시에 설사, 구토, 疳病 등의 소화기 질환이 발생하기 쉽다.

曰: 비상부족으로 비위의 병이 많다.

선배첨언: 영양부족으로 발전하기 쉽다.

-衛外不固하여 六淫의 邪氣가 침범하기 쉬워 급성 호흡기 감염으로 인한 感冒, 해수, 해천, 폐렴 등이 나타나기 쉽다.

-선천품부부족으로 인한 유전성, 선천성 질환, 後天失 으로발 생한 신허 증인 지능 및 발육 장애, 解顱 (대천문이 열려있다. 뇌수종, 대천, 五遲 등이 나타난다.)

선배첨언: 원래 18개월쯤 닫힌다. / 뇌수종은 뇌압상승의 결과

-유행성, 전염성 질환이 많다.

선배첨언: 볼거리(MMR):풍진 - 15개월에 예방접종

[2] 易于變化 : 傳變이 신속하여 寒熱虛實의 변화가 빠르다.

[3] 易于康復 : 회복이 빠르고 쉽다.

#선배첨언: 신진대사가 빨라서 그래요

-생장기능 왕성하고 칠정의 영향을 덜 받아 병인 단순하기 때문

曰: 변증이 정확하고 치료가 즉시 이루어지며 간호를 잘하게 되면 쉽게 회복한다.

C) 장부생성론

-① 오장 : 腎에서 시작하여 자기를 克하는 臟부터 생성

-② 육부 : 소장에서 시작하여 자기가 克하는 순서로 생성

D) 十月養胎

-열 달 동안 태아가 자라는 것을 말한다.

-肝心脾肺腎의 순서로 기른다

曰: 족결음 / 족소양 / 수결음 /수소양 /족태음 / 족양명 / 수태음 / 수양명 / 족소음 /족태양의 순서예요~

E) 變蒸 ★★(9개월)

[1] 變蒸의 정의

-小兒가 출생 후부터 정신적·육체적으로 성장하는 과정 에서 32일 마다 간격을 두고 간헐적으로 나타나고, 미열과 발한 등이 나타나는 특이한 生理現象

曰: 즉, 소아의 신체 발육과 지적 발달에 있어서의 일정한 정상생리변화과정

-變은 지능발육으로 32일에 1變하고, 蒸은 신체성장 으로 64 일에 1蒸한다.

-病的원인은 발견되지 않고 微熱, 嘔吐, 微汗, 驚悸, 傷寒과 비슷한 증상이 나타났다가 5~8일이 경과하면 자연 회복

-張景岳, 陳復正은 비판하였고 巢元方, 孫思邈, 錢乙 등은 긍정적 견해를 보였다.

선배첨언: 장경경등은 태어났을때부터 형성되었다고 봄. 발달 순서는 있을 수 없고. 이런 것들이 나오는 것은 병을 이기는 과정에서 나오는 병리적인것! (병리적 까지는 아님)

- 출생시 이미 장부가 형성되어 있고 오장육부가 발달하는데 순서가 있을 수 없으며, 소아가 성장과정에서 열이 나고 편치 않은 현상이 나타나는 것은 반드시 내상이나 외감으로 인한 것이며 원인이 없이 병상이 나타나지 않는다.

-변증은 생리적 현상이라는 것이 중요. 소아는 순양지체로서 열이 조금 높고 위가 약해 생리적인 구토도 많으며 잘 놀람. 즉 이런 증상은 병리적인 것이 아님

[2] 原因說

-陰陽水火說, 胎毒說, 胎中生成說 등이 있다.(p.35)

선배첨언) 태독설 : 태어날 때 태독이 남아서

-태중생성설 : 태중에서는 성장미숙하다가 자라면서

[3] 症狀과 治法

-① 輕症 : 潮熱, 自汗微出, 其狀似驚(5일정도 지나면 자연 소실) → 和平之劑, 微表之(惺惺散)

-② 重症 : 壯熱, 脈亂而數, 或吐或汗, 或煩啼躁渴 → 熱實 則 微利之(紫霜丸)

[4] 실제적 의의

4절. 소아출생률, 성비 및 사망률

-우리나라 출생아수는 갈수록 감소하는 추세

-출생성비는 남아선호사상으로 높았다가 현재는 정상 성비로 회복

-영아사망률은 1000명 당 3.2명으로 현저히 감소했다. 전체 영아 사망의 54.5%가 신생아기에 발생하였고 7일 미만 사망이 37%로 나타났다.

-소아 사고사 3대 원인 : 교통사고, 익사, 타살