

✏ 소아과 7주차 SUMMARY 공지사항

- 과연 시험에 나올 것인가?!
- 앞에 양생 및 기공요법은 교과서 외 내용이라서 써머리에서 제외하였습니다.(K-med 란 무엇인가?와 같은 것들)



6장. 소아 양생

1절. 개요

- 예방 소아과학의 목적
- 단순히 질병의 예방 뿐만 아니라 그 어린이의 (현재와 미래) 건강을 최대한 증진시키는 것
- 넓은 의미에서 소아의 양생은 胎兒期부터 시작되며, 胎兒期の 養生은 胎教에 해당됨
 曰: 교과서 내용은 위와 같고, 옛 선현들은 임신전부터로 봤습니다.

1) 출생 전 예방

① 출생 전 임신부에 대한 지도

- 적절한 영양
- 약물사용에 대한 주의 사항
- 감염병, 방사선에 대한 주의 사항
- 유전 상담
- 모유영양에 대한 예비교육
- B형 간염, 혈액형, 성병에 대한 예비검사
- *자폐아?

: 터너증후군(성염색체이상)과 자폐아(염색체 정상. 변연계 발달장애)

* 교수님 한의원 부원장님이 자폐에서 벗어난 사람이라는 썰~

② 출생 전 아빠

- 의학적으로 정상적인 남성의 고환에서 단백질합성을 통해 정자가 만들어지는 기간: 약 **74일 정도**

- 생성된 정자는 부고환과 정관을 통과하는 데 걸리는 기간: **20여 일이 소요**

→ 즉, 사정을 위해 정관의 끝 부분인 팽대부에 저장되기까지는 **무려 94일을** 기다려야함

* 曰: 남편들한테 임신 준비 시 세달 정도 금연, 금주하도록 노력하라고 티칭해야한다.

③ 정자

1. 활동성

-수면

* 활동성이 안 좋으면 수면이 안 좋은 경우 多

2. 숫자

-영양(아침 식사)

* 숫자가 적으면 영양 부족한 경우 多

3. 유전적 안정성

-담배, 환경호르몬, 술....

→ 曰: 어차피 요즘은 다 양방에서 검사하고 오긴 하는데, 그래도 알아야 환자한테 감나라 배나라 티칭할 수 있는 거니까 알아두자.

1) 출생 후 예방

① 신생아 관리

- 신생아 안질 예방(임균감염예방)
- 비타민 K 주사(출혈성질환 예방)
- 영양법 지도

② 예방 접종

- 감염병

③ 영양 지도

- 영양 : 분유 /모유. 이유식

* 曰: 모유수유의 WHO 기준 객관식 내겠다!! (이건 박은정 교수님이 이미 내실 것 같아요 교수님 π π)

④ 사고의 예방

- 급증

⑤ 치아 및 구강위생

- 유치 관리 부족 - 영구치의 위치나 형성에 지장을 초래
- 아이를 재우기 위해 우유나 과일 주스가 들어있는 젖병을 물리는 것은 금함.
- 설탕이 많이 든 간식을 자주 먹이는 것은 치아 우식을 유발.
- 3세 이전의 소아 - 식후 거즈로 이 닦아 줌.
- 학령 전 어린이는 보호자가 1분씩 칫솔질.
- 식간에 당분이 많이 든 간식을 삼가
; 치아 우식 조장, 식욕 감퇴 요인
- 장기간 인공젖꼭지를 물거나 손가락을 빠는 버릇은 주의 관찰
; 치아교합의 이상, 턱관절의 이상발육을 초래

⑥ 정기적 건강 검진

- 신생아 대사질환 검사
- 발달 평가 : 한국형 영유아 발달검진, 허약아 검진 등
- 시력 및 청력 검사 : 시력표를 이용한 객관적 시력검사는 3세에 가능, 청력검사는 출생 직후 신생아에게 모두 시행하는 것을 권장
- 혈압 : 3세 이상 1년에 1회
- 철 결핍성 빈혈 : 영유아는 생후 9개월경, 미숙아는 생후 1주일 및 9개월에 검사 시행, 초경후 검사
- 요검사
콜레스테롤 : 비만 등 위험인자가 있는 소아

⑦ 선별 검사

- 선별 : 어떤 질환이나 또는 그 전 단계에 있는 무증상 환아를 가려내서 잠정적 진단을 내리고 확진과정을 통해서 그 질병이 확인되면 효과적인 치료법이 있는 경우 조기치료를 함.
- 선천성 갑상선 저하증(크레틴병 :갑상선호르몬부족 신경발달 저하 지능운동장애)
- 페닐케톤노증(상염색체유전대사질환. 페닐알라닌분해효소결핍으로 체내축적. 기형없이 태어나 단백질 먹으면서 증상악화 발달장애)*저페닐알라닌분유

→ 曰: 저페닐알라닌분유 같은 특수분유를 먹이기도 하는구나 & 이런 유전병이 있구나 만 아시면 됩니다.

→ 曰: 유전병의 경우 한약으로 완치보다는 삶의 질 향상에 도움을 줄 수 있다는 식으로 접근합니다.

⑧ 청소년에 대한 지도

그냥 주루룩 읽으시거나 읽어보라고 넘어간 파트여서 제가 정리할 게 따로 없네요ㅠ
가독성이 좀 떨어지지만, 딱히 중요한 내용은 아닌 듯 합니다!
교수님께서 읽어보세요~ 하신 부분은 회색처리했습니다!

(1) 성교육 통제력 + 해방(혐오보단 아껴줌)

- 남녀의 생리적 특징과 서로의 성역할을 이해, 성에 대한 건전한 태도를 형성, 건전한 가치관으로 변화하는 사회에 대처할 수 있도록 자기 통제력을 기르게 한다.
- 유아기 및 학동기에는 성별의 신체적 차이, 성역할 등에 대해 자연스럽게 교육하는 것이 좋으며, 사춘기 이후에는 성지식, 이성교제, 윤리적 가치관 등과 함께, 성비행, 성범죄, 성피해 방지를 위한 교육이 이루어져야 한다.

→ 曰: 자연스러운 현상이야. 너는 건강한거야~ 라는 식으로 접근

- 1980년대부터 성교육 시행 - 제한적 여건.
- 대상자의 발달특성을 고려, 대상자의 요구에 부합한 체계적 교육.
- 유아기 및 학동기 - 성별의 신체적 차이, 성역할 등에 대해 자연스럽게 교육
- 사춘기 이후 - 성지식, 이성교제, 윤리적 가치관, 성비행, 성범죄, 성피해 방지를 위한 교육
- 성인기 : 성에너지 준비->노하우(테크닉)->사후보강
- Cf. 양방: 성병&콘돔, 비아그라&시술 정도...

* 曰: 한방성교육에서는 상중하 단전, 천계 등을 말하고, 하단전이 정말 중요하다. 그러기 위해서 해가 되는 일은 안 하고, 잘 먹고 운동 열심히 해서 하체 체력을 강화시킨다 등등을 말한다.

- 성교육의 목표

: 건강한 성문화로 건강한 아이가 태어나서 행복한 출산

: 의료비 절감

→ 성병 부인과질환 불임 성교불능

한의학에서 보는 여자의 생장

- 女子七歲, 腎氣盛, 齒更髮長;]
- 二七而天癸至, 任脈通, 太沖脈盛, 月事以時下, 故有子;
- 三七, 腎氣平均, 故眞牙生而長極;
- 四七, 筋骨堅, 髮長極, 身體盛壯;
- 五七, 陽明脈衰, 面始焦, 髮始墮;
- 六七, 三陽脈衰於上, 面皆焦, 髮始白;

- 七七, 任脈虛, 太衝脈衰少, 天癸竭, 地道不通, 故形壞而無子也.

- 여자 일곱에 신기 왕성해져 이를 갈고 머리가 길어진다.
- 열넷에는 월경을 시작하며 자식을 낳을 수 있다.
- 스물하나에 신기 충만해 사랑니가 생기고 키가 다 크다.
- 스물여덟에 신체가 가장 건강해진다.
- 서른다섯에 얼굴은 비로소 초취해지고 탈모시작.
- 마흔둘에 얼굴은 모두 초취해지고 새치자람
- 마흔아홉에 임맥은 텅 비고 충맥도 힘을 잃어
- 천계가 말라버리고 월경이 멎는다.
- 따라서 형체는 노쇠하고 아이를 가질 수 없게 된다.

한의학에서 보는 남자의 생장

- 남자는 여덟에 신기가 실효되고 이가 새로 난다.
- 열여섯에 신기가 왕성해져 정액이 넘쳐 흐를 수 있다.
- 스물넷에 신기가 충만해 근골이 굳어지고 따라서 사랑니가 나오고 키가 다 자란다.
- 서른둘에 근골과 근육이 가장 건강해진다.
- 마흔에 신기가 쇠퇴하여 머리카락 빠지고 이가 마름
- 마흔여덟에 얼굴 초취해지고 머리카락 수염이 희끗
- 선여섯에 간기가 쇠하여 근을 움직일 수 없고 천계가 말라버려 정액이 적어진다.

예순여섯이 되면 이와 머리카락이 사라진다

강한 남성이 되는 방법

- 1) 禁 취중입방 (Energy:선천지정 Shield:후천지정)
- 2) 禁 난교
3. 必 藏精

청소년기 성E 승화 대안들

-운동 : 축구 탁구 자전거 악기연주

-봉사활동

-여행

=>각종 동적 활동 (결국 교육비 투자 선택의 문제)

저출산 시대와 성교육

성교육 = 성행위 교육의 필요성

진지함. 권위.

한의학의 영역 (준비, 행위, 대비)

*보양 vs 비아그라

*曰: 양방에서는 비아그라 막 쓰는데, 끝까지 듣지도 않고 한방에서 할 수 있는 영역이 훨씬 세분화 되어 있다.

(2) 금연 교육

- 우리나라 중·고등학생의 흡연율은 2007년 13.3% 이후 감소하고 있는 추세
 - 흡연은 건강에 가장 심각한 영향을 주는 습성이며, 흡연자의 80%는 18세 이전에 흡연이 시작
- 검진시 금연에 대한 교육 필수.

- 금지보단 불이익 설명

- 최대한 어렸을 때, 시작하기 전에 한다.
- **1.남들이 싫어해**
- **2.경제적으로 안좋아.**
- **3.건강에도 많이 안좋아.(미세먼지도 먹는데)**
- **스트레스보단 더 좋은 기쁨을 제공해야함**

(3) 음주 및 물질 남용 교육

- 1996년 이후 급격히 증가한 추세

- 술(61.8%), 진통제(66.4%), 담배(32.3%), 진해제(13.5%), 각성제(11.0%), 수면제(5.7%), 본드(4.3%), 가스(4.1%), 신경안정제(3.6)

- 개인적 요인, 가정환경요인, 학교를 포함한 사회, 심리적 요인 등 다양한 요인이 작용
- 흡연과 환각성 물질은 호기심으로, 음주는 호기심과 가족·친척의 권유로 하게 되는 경우가 많다.

(4) 청소년의 유해 매체물 및 컴퓨터 게임 이용

- 유해 매체물 이용률은 해마다 증가, 특히 스마트폰 사용의 증가에 따라 성인 매체 접촉율도 매년 증가
- 2019년 WHO는 총회에서 게임이용장애를 질병으로 분류하는 국제질병분류 11차 개정안(ICD-11)에 포함하는 안을 통과시켰다.

<<정신 이상아 대표유형>>

- **실증 : 좋은 영양 + 게임 중독..**
- **허증 : 나쁜 영양 + 엄한 부모..**

에너지 입출입 관점.

2절. 태교

1. 태교란?

- 심신이 건강한 아기의 受胎와 태내발달 및 출생을 위하여 부모가 될 夫婦가 妊娠을 준비하는 기간부터 아기의 출생 시까지 수행하는 필요한 모든 교육적 노력.
- 어머니가 먹는 **음식**, 복용하는 약물, 앓는 질병, 호흡하는 공기, 느끼는 **정서** 모두 배속에 있는 아이에게 영향을 미침.

- **특정한 환경적인 손상은 태아에 따라 다르게 영향을 줌.**

- 현대에 들어와서 서양의학 중심의 의료체계에서 태교는 **역사 속의 주술적 혹은 미신적 민속의 한 형태**로 밀려나서 의료인과 임신부 또는 주위사람들에게 그 중요성과 과학성을 외면당하고 있는 실정이었다.

* 曰: 이것도 그 당시에는 최선이었다. 근데 또 요즘은 너무 획일적이다 보니까 과거의 의미를 가져와서 활용하면 더 풍성해지기도 한다. 이런 식으로 우리가 접근해볼 수 있는 것이다.

- 그러나 최근 **과학과 현대의학의 발전에 따라 임신 중 모체의 심리적, 정서적, 신체적 상황이 태아에게 중대한 영향을 준다는 것이 입증**되고 있다.

2. 전통 태교의 역사 및 내용

→ 이 파트도 후루루룩~ 넘어가심 거의 래퍼 수준. 몰라도 되지 않을까요..? 장담x

1) 역사 (중국)

- 賈誼가(B.C. 200 ~ B.C. 168)의 <<新書>>
- **중국에서 현존하는 최초의 문헌**
- 왕실태교법과 성왕의 어머니 畚姜의 태교가 소개됨
- 한나라 劉向유향(B.C. 77 ~ B.C. 6) <<烈女傳>>
- 주나라 초기 太任이 행한 태교를 기록
- <<千金方>>
- 태교내용과 徐之才의 '十月養胎論'이 인용수록
- 交合時期까지 다룸

- 《婦人良方大全》, 《景岳全書》, 《葉天士女科》 등에 인용
- 《小學》에서도 태교를 논함


2) 역사 (우리나라)

- 고려말기 鄭夢周의 모친 李氏 <胎中訓文>에서 시작
- 조선시대 <閨閣叢書>, <戒女書>, <閨範>, <內訓>
- 대부분 열녀전의 내용을 근거로 한 것
- ****조선후기 師朱唐 李氏가 저술한 <胎教新記>****
- 태교에 대한 전문서적으로 기존의 태교에 대한 내용을 정리
- **부성 태교와 임신 전 태교를 강조 (신사임당 버금가는 조선여성학자)**
- * 사주당 이씨에 관한 설명으로, 아래 블로그 들어가서 한번 보라고 하심
- <http://blog.naver.com/bhjang3?Redirect=Log&logNo=140201844047>
- <東醫寶鑑>
- 陰陽交合의 忌避, 10개월간 태아의 성장과 발육상황, 妊娠에 조리하는 법, 日遊胎殺이 있는 곳, 房中日遊神이 있는 곳, 飲食禁忌, 藥物禁忌 등을 제시
- 이 외에도 '三胎道', '七胎道'라고 하는 민간 태교법

* 曰: 임상에서 활용하기는 칠태도가 좀더라고요~

태아의 성장과정

[임전 초기 초음파 영상]



曰: 태아의 성장과정이 이렇게 있고요~ 하고 넘어가심. 허허

칠태도 ★★ 시험!

- 임신중의 태교 및 섭생법

1) 칠태도(七胎道)

- 우리나라 민간 태교의 대표적인 것으로, 말 그대로 **태교의 일곱가지 법도**를 적은 것
- 칠태도에는 각종 우리 나라의 전통태교, 또는 **민속 태교**에서 전해 내려오는 것들이 거의 모두 포함되어 있음

제1도	- 임신 중 해서는 안 될 다섯 가지 일 (금기사항) 1. 머리를 감지 않을 것 2. 높은 마루, 바위, 또는 제기(祭器) 위에 올라가지 않을 것 3. 술을 마시지 않을 것 4. 무거운 짐, 험한 산길, 또는 위태로운 냇물을 건너지 않을 것 5. 밥을 먹을 때 색다른 맛 (異味)
제2도	- 말 많거나 - 웃거나 - 놀라거나 - 겁먹거나 곡하거나 - 울지 않는 것
제3도	- 태살(胎殺)의 장소를 피한다. - 태살의 장소는 태아를 해치는 살기가 서려 있는 곳을 뜻한다.(태아에게 악영향을 미칠 수 있는 장소) - 옛사람들은 매 임신 달마다. 이러한 장소를 지정하여 임신부들의 접근을 막음 - 첫달: 마루 -방안에서 안정을 취하는 것이 좋다는 의미 - 둘째달: 창과 문 - 강한 소리나 갑작스런 변화가 일어나는 장소를 의미. - 셋째달: 문턱 - 외부변화에 안정감이 생기나 산모 스스로 힘이 빠져 넘어질 수 있는 시기. - 넷째달: 부뚜막 - 뜨거운 장소. - 다섯째달: 평상 - 태아가 급속히 성장하는 시기에 더위 느끼기 쉽다. 그리

	도 바람을 조심할 것. 여섯째달: 공간 -너무 먹지 말 것. 작게 낳아 크게 키우는 것이 정석. 땅기는 식욕에도 적당히. 일곱째달: 학돌(절구와 비슷한 돌) - 몸이 무거워지고 뼈가 약해지는데 돌에 부딪히지 않도록. 여덟째달: 뒷간(화장실) - 조산의 위험이 있으니 오래 앉아있지 말 것. 아홉째달: 서재 - 아기가 크면 쉽게 낳기 어려우니 운동을 해야 합니다. 뒤늦은 독서태교를 해서는 안되는 시기.
제4도	- 임신부가 조용히 앉아서, 아름다운 말만 들으며, 선현의 명구를 외우며, 시나 붓글씨를 쓰며, 품위 있는 음악을 들어야 한다는 것 - 세 가지 행해서는 안 되는 사항:나쁜 말을 듣지 말고, 나쁜 일을 보지 말며, 나쁜 생각은 품지도 말라는 것
제5도	- 임신부가 가로놓지 말고, 기대지 말고, 한 발만으로 가우뚱하게 굽혀 서있지 말라는 것 - 그러나 임신된 후 홀수 달에 한해서는 왼쪽으로 가로놓게 함 (이는 홀수는 곧 왼쪽이라는 주술 때문에 해석을 할 수 있음)
제6도	임신 3개월이면 아이의 기품이 형성되므로 기품이 있는 서상(犀象), 난봉(鸞鳳), 주옥(珠玉), 종고(鐘鼓), 명향(名香) 같은 것들을 가까이 하고 몸에 지니라는 것이다. 풍입송(風入松): 소나무에 드는 바람소리를 듣고자 노력하라는 것과 매화나 난초의 은근한 향을 맡으라는 운치가 있는 사항들도 있다.
제7도	- 임신 중에는 금욕하라는 것 - 특히 해산달 부부관계를 하면 아이가 병들거나 일찍 죽는다고 가르침

→ 이러한 일곱 가지 태교의 법도에 물론 미신적인 요소, 또는 주술적인 요소가 없는 것은 아님

→ 그러나 일부 미신적인 요소를 제외하면, 우리 나라 전통 태교의 근본은,

1. 좋은 것을 보고 듣고 느끼며,
2. 심성을 곱게 가지고,
3. 몸을 주의 깊게 움직이라는 것이 대원칙이다.

2) 부성태교

«胎教新記·只言教子章»

“스승이 십년을 잘 가르치는 것이 어머니가 뱃속에서 열 달을 잘 가르침만 못하고, 어머니가 뱃속에서 열 달을 잘 가르침이 아버지가 교합시 正心한 만 못하다”

→ 10년 교육은 10달 태교만 못하고, 10달 태교는 교합 시 正心만 못하다는 뜻으로, 건강한 아이의 출산을 위해서는 부부가 함께 노력해야함을 말함

(1) 성생활에서 삼가해야 할 것

- 기후나 장소가 부적합한 곳에서 성교는 좋지 않음
- 기후나 장소가 신체적, 심리적 조건에 영향을 미칠 수 있고 심신의 불안을 초래

(2) 成胎 후의 禁慾

- 妊娠이 된 후에는 절대로 성생활을 하지 않도록 함
- 임신 초기의 성교는 유산의 위험을 높일 수 있으며, 임신 말기의 성교는 조산의 위험이 따를 수 있음

- 전통사회에서는 위생이 철저하지 않아 감염의 가능성
- 父性的식을 일깨우면서 자녀출산을 위해 부부가 함께 노력하도록 함

+) 우리나라에서는 선행이나 덕행을 행하고 母性을 심리적, 물리적으로 지원하며 근신하는 내용도 포함

3) 모성태교 이것도 후루룩~ 넘어가셨습니다.

«萬氏婦人科·胎前» “婦人受胎之後，所當戒者，日房事，日飲食，日七情，日起居，日禁忌，日醫藥，須豫先調養，不可少犯。以致傷胎難產。”

→ 스승의 10년 공부보다 태중교육 10개월을 더 무겁게 봄

(1) 受胎이전의 심신관리

- «東醫寶鑑·雜病篇 婦人 求嗣» “求嗣의 道는 여자들은 월경을 고르게 하는 것이 중요하고 남자들은 精氣를 충실하게 하는 것이 중요하다. 또 성욕을 억제하고 마음을 깨끗하게 가지는 것이 제일 좋은 방법이다.”

(2) 妊娠婦가 먹으면 좋은 음식

- «胎教新記» “欲子端正食鯉魚，欲子多智有力食牛腎與麥，欲子聰明食黑蟲，當產食蝦與紫菜，妊婦飲食”
- 우리나라에서는 정갈하면서 영양가가 높아서 胎教에 좋은 음식으로 잉어 또는 붕어, 해삼, 새우, 장닭, 황소의 콩팥, 보리밥, 고추, 대추, 밤, 호두, 잣, 밀감 등이 선정
- 영양가 외에 男胎주술의 의미로 선정

(3) 妊娠婦의 飲食禁忌

- 과식을 피하고, 너무 열하거나 너무 찬 음식, 맵고 자극적인 음식, 기름진 음식
- 임신에 좋지 않은 효과를 가져오는 음식
- 정서적으로 좋지 않은 영향을 줄 수 있는, 당시의 통념상 부정스런 음식, 불결한 음식
- 당나귀고기, 말고기, 토끼고기, 오리고기, 참새고기, 자라고기, 산양고기, 비늘없는 물고기, 메기, 방개, 울무, 맥아, 비름나물 등
- 임산부와 고추장: 한의학적 음양관론 가능.

→ 曰: 이런 질문에 잘 대응해줘야 환자가 유지된다!

Q. 원장님 저 어제 고추장이 너무 땡겨서 저도 모르게 한 숟갈 먹어버렸어요 ππ 괜찮나요?? (놀랍지만 실제로 연기하시면서 똑같이 말씀하셨습니다. 역시 한자리출신)

A. 잘했어요. 당신은 지금 심장이 약해서 매운 게 땡기는 겁니다. 고춧가루는 너무 자극적인데 고추장은 숙성을 시켜놨기 때문에 덜 자극적입니다. 덜 자극적인 매운 것에서 당신이 심장을 강진시킬 수가 있어요. 당신이 지금 심장 약해가지고 임신해가지고 내가 알잖아요. 당신 심장 약해가지고 바닥부터 놀라고 손발 차고 했던 거 알잖아요. 그래서 아마 땡기는 거고 이거는 당신의 부족한 부분을 채우는 거예요. 몸이 원하는대로 행하세요!

환자: 원장님 너무 감사합니다!

(4) 藥物禁忌

- 금기약물은 주로 破瘀血劑, 溫熱劑, 瀉下劑, 逐水劑, 破氣劑, 祛痰劑, 刺戟性 藥物과 礦物性 藥物, 강력한 通氣劑들로 되어 있는데 이들은 낙태의 위험이 있으며 태아에게 또한 악영향을 미치기 때문
- 술을 마시거나 약을 술에 타 먹지 말고, 약은 물로만 달여 먹도록 함(«世醫得效方»).
- 임신 중 금기약물로는 莞青, 斑猫, 水蛭, 虻蟲, 烏頭, 附子, 天雄, 野葛, 水銀, 巴豆, 牛膝, 薏苡仁, 蜈蚣, 三稜, 代赭石, 莞花, 麝香, 大戟, 蛇蛻, 雄黃, 雌黃, 牙硝, 芒硝, 牡丹皮, 桂皮, 槐花, 牽牛子, 皂角, 半夏, 南星, 通草, 瞿麥, 乾薑, 蟹甲爪, 礞砂, 乾漆, 桃仁, 地膽, 茅根(醫學正傳), 躑躅花, 螻蛄, 牛黃, 藜蘆, 金箔, 銀箔, 胡粉, 蜥蜴(도마뱀), 飛生(날다람쥐), 蟬殼, 龍腦, 蝟皮(고슴도치 가죽), 鬼箭羽, 鷹鷄, 馬刀, 依魚(좀벌레), 大蒜, 神麴, 葵子, 犀角, 大黃 등
- 한약 먹어도 되나요? 에 대한 답은?

A) 가능하다. 한약은 치우친 음식이라고 생각할 수 있다. 치우친 음식인 한약으로 당신의 불균형을 해소할만큼만 사용하겠다!

(5) 妊娠시 생활 관리

놀랍게도 여기서부터 허약아전까지 피피티 내용은 말씀을 거의 안 하셔서,, 물어보라고 하시기에 첨부는 할게요 ππ

- 대부분 임산부의 정서에 좋지 않은 영향을 줄 수 있거나, 다칠 위험이 있다고 생각되는 것들
- 태아의 형성발달에서 가장 중요한 것은 母性の 정성스러움으로 봄
- 옷은 너무 덥게 하지 말 것, 음식은 너무 배불리 먹지 말 것, 술을 마시지 말 것, 함부로 달인 약을 먹지 말 것, 함부로 침과 땀을 놓지 말 것, 무거운 것을 들거나 높은 곳으로 올라가거나 험한 데를 걷지 말 것, 힘든 일을 지나치게 하지 말 것, 잠을 지나치게 자거나 누워있지 말고 때때로 거닐 것, 크게 놀라지 않도록 할 것, 몸 풀 때에는 머리를 감지 말 것, 높은 곳에 있는 변소에 올라가지 말 것 등

* 曰: 땀은 역아일 때 함. 근데 요즘은 땀으로 안 하긴함. 임신 6개월 쯤에 초음파로 봐서 애가 거꾸로 바로 서 있으면 그때 엄마가 자세를 숙여 아이를 다시 돌아가게 해야 하는데, 이 타이밍을 놓치면 제왕절개할 수 밖에 없음(6개월 전후 타이밍을 놓치면 안됨!!)

* 머리 감아도 된다! 옛날에는 숙여서 감으니까 복압이 올라가서 그랬던 것.

* 曰: WHO 기준 출산 후 24시간 내에 모유수유를 10번 이상 물려야 함.(제왕절개를

했더라도, 출산 후 24시간 내에 모유를 물려야 모유수유 성공할 수 있음

- 3*7=21일, 산욕기6주

曰: 3*7일동안은 절대 안정 취해야 하며 무거운 것을 들면 안 되고, 산욕기 6주 동안은 웬만하면 씻지도 않고 조심했는데, 요즘은 안 그럼(옛날엔 위생이 별로였으니까~)

강요는 아니지만 6주까지는 조심하도록 티칭

- "임신 중에는 다니거나 앉는데 단정해야 하며 마음이 화평하고 즐거워야 하며 항상 조용한 곳에 있으며 아름다운 말을 많이 듣고 詩書를 읽고 禮와 樂을 들으며 귀로 나쁜 말은 듣지 말고 나쁜 일은 보지 말아야 아이가 오래 살고 충효를 행하며 현명하다"

- 妊娠婦의 정서관리를 중요하게 인식
- 옷은 너무 덥게 하지 말 것
- 음식은 너무 배불리 먹지 말 것
- 술을 마시지 말 것
- 함부로 달인 약을 먹지 말 것
- 함부로 침과 땀을 놓지 말 것
- 무거운 것을 들거나 높은 곳으로 올라가거나 험한 데를 걷지 말 것
- 힘든 일을 지나치게 하지 말 것
- 잠을 지나치게 자거나 누워있지 말고 때때로 거닐 것
- 크게 놀라지 않도록 할 것
- 몸 풀 달에는 머리를 감지 말 것
- 높은 곳에 있는 변소에 올라가지 말 것

(6) 분만전의 관리

- 分娩에 대한 불안감을 갖지 말며 안정을 취해야 함.
 - 過食, 過飲酒, 雜物 등의 服用을 禁
 - **多睡**, 過於安逸로 인해 胎體過大하지 않게 함.
 - 犯房은 禁
 - 天氣가 熱할 시에는 冷處를, 天氣가 冷할 시에는 密室溫煖한 곳의 장소를 선택
- 分娩時 用力太早하여 產母의 困倦 방지 (단녹용탕)

* 曰: 분만 전에는 많이 자면 안 되지만, 임신 초기에는 많이 자야한다.

* 산모가 피곤할 때 단녹용탕! 조산원에서는 단녹용탕을 먹여줌.

- *조산사의 순산비결?

→ 임신 6개월에 무료 교육을 하더라.(출산 관련 교육)

→ 이때 역아도 체크하고 역아면 돌려놔야 함

→ 그리고 임신 후반부에는 엄청 운동시켜야 함(양수가 터져서 애기 머리가 보여도 10cm가 아니라 3cm 열린 거면 그냥 걷거나 가능하면 오리걸음도 시킴 → 순산을 위해 골반을 약간씩 자극하는 원리인 듯)

시기별 주의사항

임신전후 태교	7태도
임신 초반	안정
임신 후반	활동
출산	'산후풍 방지'와 '신생아 면역' 양자집법

3. 현대적 의의

- "산전관리" - 임신부와 태아의 신체적 건강관리에만 초점을 맞춘 것
- "태교"는 임신부와 태아의 건강 뿐 아니라 지능 발달 및 정서적 안정, 인격 발달 등에도 초점
- 신생아에게서 생리학, 신경학, 생화학, 및 심리학적으로 확인된 사실의 **대부분이 자궁 안 6개월 태아에게도 그대로 적용**된다는 사실이 밝혀짐.
- 6개월이 지난 태아는 청각 및 시각 반응을 일으킴.
- 임신부의 정서적 긴장이나 불안, 임신 중 섭취하는 술, 담배, 카페인 등의 기호식품이 태아의 뇌 발달에 부정적 영향을 미침
- 임신부의 목소리, 임신부와 태아와의 친숙한 교류, 간접적인 신체접촉이 태아의 뇌 발달 및 지능지수에 긍정적인 영향을 미친다는 연구결과들이 보고. (Levinson, 1993).
- 영양공급, 유해물질 차단, 모성의 정서적 안정 등 자궁내 환경이 태아의 지능지수(IQ)에 영향을 준다는 연구결과가 발표

1. 初生斷臍

- 臍風을 예방할 수 있는 斷臍法에 대한 언급
- : (옛날에는 斷臍 중 감염에 의한 臍風이 많이 발생해서)

→ 曰: 옛날에는 그랬는데 요즘엔 다 잘하니까~

- <千金方> “不得以刀子割之，順令隔單衣物咬斷，兼以暖氣呵七遍，然後纏結所有臍帶，令至兒足趺上，短則中寒，令兒腹中不調”
- 이 외에도 불을 이용한 斷臍法
- 특히 寒氣가 入腹하는 것을 방지하는 데 초점
 - 불을 이용한 斷臍法, 입김을 부는 방법, 艾灸를 하는 방법 등
- 斷臍 후 관리도 주의
- <醫學綱目>에서는 “斷臍包紮(감을찰)之後，絕不可時常揭(뜻말갈)看，待臍帶落去後，自無風矣”，“勿使犯水”

2. 하태독下胎毒

- 小兒기 발생하는 많은 질병을 胎毒과 연관
- 胎毒을 제거하는 구체적인 방법으로 약물을 이용
- 출산 후 황련, 감초 달인 물로 아이 입속 닦아줌 ; 위장관 내 태열독이 태변과 함께 빠져나옴. 태열 야제 아토피 등 태열독에 의한 제반 질환

자연분만 vs 제왕절개 (네셔널 지오그래픽 내용)

→ 썸부 요약: 미생물이 없는 환경에서 살다가 산도를 통과하는 과정에서 수많은 미생물에 노출됨 → 엄마의 산도를 통과하며 엄마의 면역을 갖게 됨(엄마의 미생물을 받으니까)
→ 면역계 발달 측면에서 산도 통과한 아기가 더 좋았다!

* 曰: 애가 나오면 때가 켜 있는데, 그것만 가볍게 닦아주고 1~2시간 정도 풍욕을 시켜준다. 물로 깨끗하게, 막 알코올로 닦는 게 아니다. 1~2시간 풍욕 후에 목욕이 필요하다면 목욕도 시키고~

3. 목욕 沐浴

(1)

초생아는 피부가 연약하고 감염에 취약

污垢(때구)를 제거하여 腠理를 開泄하는 의미
“令兒體滑舒暢，血脈流通”

(2) 삼조목욕三朝沐浴

- 출생 후 3일 동안의 목욕
- <千金方> : 三朝沐浴시 桃根湯(桃根, 李根, 梅根)을 煎湯하여 면포에 적셔서 몸을 닦도록 함.
- <醫宗金監> : 五枝湯(桃枝, 槐枝(회화나무:제습), 桑枝, 梅枝, 柳枝)을 煎湯하여 목욕
- 이 외에도 苦蔘, 黃蓮, 豬膽汁, 白芨(수렴지혈약) 등

(3) 平時沐浴

- 평소에는 藥을 넣지 않으며, 혹 약간의 소금을 넣음
- 목욕 시에 가장 주의할 것은 **風寒을 피하는 것**
 - 목욕물의 온도를 적당히 하고, 바람이 없는 적당한 곳에서 목욕할 것, 生水를 사용하지 말 것, 너무 오래 목욕시키지 말 것 등
- **臍帶가 탈락하기 전(아물기 전)에는 목욕을 너무 자주 시키지 않도록 함**
 - <證治准繩> “湯水不冷不熱，于無風密室浴之，勿令久”，“勿犯生水”
 - <奇效良方> “小兒臍帶未脫，不可頻浴，頻浴則臍中入水，撮口臍風，皆從此起，不可不慎。”
- -호두골, 도지, 저담 끓여 금은기(위생)에 부어 목욕 (동의보감)
- -물이 오르는 시기의 버드나무 전탕 목욕 (두창문)
- -소아 냉증(질염): 고삼 사상자 고백반 끓여 좌욕
- -입욕제: 어성초 삼백초/ 고삼 백선파 사상자 지부자 지유 형개 5 대항 3.5

4. 哺乳

- 母乳가 통하지 않을 때에 다른 동물의 乳汁으로 대용
 - <<古今醫統>> “初生時或未有餌子，產婦之乳未下，可用猪乳代之，可免驚癇痘瘡.”
- 乳母가 복용한 약물은 乳汁을 통하여 아이에게 전해지므로 수유 중에는 약물복용에 주의

- 子病治母”하는 치료법을 사용하기도 함

→ 曰: 애기가 약을 잘 못 먹으면 그 약을 엄마가 먹고, 모유를 통해 그것이 아기에게 전달됨

- 乳母가 병에 걸려 大寒, 大熱, 毒性이 있는 약물을 복용할 때에는 수유를 중단하고, 병이 나은 후에 수유하도록 함
- 젖을 지나치게 많이 먹이면 嘔吐하고, 脾胃를 損傷시키므로 항상 節制할 것, 젖을 물리고 자지 말 것, 아이가 울 때에는 젖을 물리지 말 것, 야간에 수유할 때에는(중은데 힘들다?) 일어나 앉아서 수유하고, 누워서 먹이지 말 것, 수유 후에는 잠시 아이를 똑바로 세워 溢乳하지 않도록 하는 내용들이 기재

:<<千金方>> “凡乳兒不欲太飽，飽則嘔吐，母候兒吐者，乳太飽也” “母欲寢則，奪其乳，恐慎口鼻，又不知飢飽也.

:<<萬氏家藏育嬰秘訣>> “其子啼哭未止勿乳，睡未醒勿乳，飽後勿乳. 夜間母必起座床上，抱其兒乳之，勿側臥乳，乳後抱其子，使其身直，恐軟弱傾倒，致乳溢出也”

*Shaken Baby Syndrome 흔들린 아기증후군 : 아이 흔들는 것 뇌 혈관 심장에 악영향

5. 이유식

- 시작시기는 대부분 6개월로 언급
- 稀粥(묽은 죽)으로 시작할 것을 권함.
- 10개월 이후에는 점차 稠粥爛飲(된 죽)으로 넘어갈 것을 언급
- 1세 이전에는 葷腥(생선, 고기류), 生冷油膩甜物을 피함.

이유식의 필요성

- 1. 양질의 영양공급.
 - 2. 산모의 활동보장. (근무력 심허)
- 주의사항. 이유의 공포 최소화

6. 飲食

- 小兒는 脾胃가 嬌嫩(아릿다울고 어릴눈)하므로, 성질이 陰寒生冷하거나 소화하기 힘든 음식은 피하도록 함
- 문헌에 기재된 피해야 할 음식으로는 柿子(감), 栗子(밤), 李子(자두), 杏子(살구), 生棗(생 대추), 韭菜(부추), 蛤蚌(조개), 牡蠣(굴), 蟹子(게), 炒豆(볶은 콩), 豬肉, 生蔥(생파), 蜜, 生冷雞卵, 기름기 많은 음식 등
- 小兒의 과식과 이른 이유(離乳)를 경계

7. 衣服 및 環境

- 아이들의 의복은 부드럽고 세탁이 쉬운 것
- 지나치게 덥게 옷을 입히지 않도록 함
 - 옷을 너무 덥게 입히면 內熱이 발생하여 筋骨이 약해짐
- 옷은 느슨하게 입히도록 함
 - 지나치게 조이는 옷을 입으면 氣血의 흐름을 방해

8. 기타

父母는 항상 유아 곁에 있어 살펴 보호하고, 위험한 곳에 가거나, 음식이 아닌 물질을 먹지 않도록 조심시킨다.

《格致餘論》 “至于乳子之母，尤宜謹節.”

《育嬰家秘》 “父母常將幼子隣”

小兒는 8개월에 掌骨成하니 이때에 기는 것을 가르치며

1세에 行步하도록 돕는다.(여아가 조금 빠름)

小兒가 말할 수 있을 때에 옳은 말(正言)로 교육에 힘써야 한다.

《古今醫統》 “小兒二百四十日，掌骨成，母當教以匍匐，一周滿，母當扶以行步.”

《育嬰家秘》 “小兒能言，必教之以正言，如鄙俚之言勿語也.”

9. 養子十法 ★★

[1] 要背暖 : 등을 따뜻하게 한다. → 外感으로부터 肺俞를 보호하기 위함

[2] 要肚暖 : 배를 따뜻하게 한다. → 복부가 차면 泄瀉 같은 消化器 疾患 유발

[3] 要足暖 : 발을 따뜻하게 한다.

[4] 要頭凉 : 머리를 서늘하게 한다. → 頭部는 諸陽之會이므로 마땅히 차게 함

[5] 要心胸凉 : 가슴을 서늘하게 한다.

[6] 勿令小兒 突然看異常之物 : 낯선 사람이나 이상한 물건을 보이지 않게 한다.

→ 소아들은 뇌의 발육이 완전치 못해, 정신과 질환이나 여타 증상 유발 → “小兒勿見非常之物” <고금 의통>

[7] 乳食要溫 : 따뜻한 음식을 먹인다. → 소화기를 따뜻하게 하지 않으면 소화기 장애, 전신적인 부조화

[8] 兒啼未定, 勿使飲乳 : 소아가 울 때 젖을 먹이지 말라 → 呼吸器로 들어가 질식할 우려 → 호흡기로 들어가

질식할 우려가 있음

[9] 勿服輕粉朱砂 : 경분 주사 등의 약을 경시해서 함부로 복용하지 않는다. → 가급적 毒極藥을 쓰지 말라

[10] 宜少洗浴 : 목욕을 너무 자주 시키지 않는다 → 小兒의 皮膚가 연약하므로, 외부감염을 경계

허약아

- 허약아 : 유난히 또래에 비해 심하게 잔병치레를 하는 아이들

- 주로 만 1세에서 6세 사이의 소아들이 해당
- 남자아이가 좀 더 많은 편
- 같은 질환을 같은 형태로 반복하는 특징
- 보호자들은 아이가 잦은 감기에 시달리며, 식욕부진이 심하고, 안면의 혈색이 좋지 않으며, 쉽게 지치고 피로감을 느끼는 것 같다고 호소
- 허약아는 기본적으로 오장육부의 미성숙으로 인해 각종 질병에 쉽게 이환되고, 기혈 부족으로 쉽게 회복되지 않아 증상이 반복되는 것
- 五臟辨證을 위주로 하여 치료, 관리하며, 補法과 養生을 적극적으로 활용
- 호흡기계 허약아 : 특히 최근에는 미세먼지, 황사 등 호흡기를 자극할 수 있는 요인이 늘어나고 맞벌이 부부가 증가하면서 어린이집이나 유치원 등 조기 집단의 시작으로 호흡기 감염이 증폭되고 있는 편
- 소화기계 허약아 : 조기 모유수유의 중단과 부적절한 이유식, 건강기능식품 및 영양제에 과도한 의존 등으로 소화기계 질환도 만성화되는 경향
- 알레르기성 질환이나 자율신경계의 부조증을 호소하는 小兒, 심신 장애아, 비만아 등 심인성 질환과 정신신경계 장애아

1. 脾系 허약아(소화기계) ★★

특징적 증상	식욕부진과 편식 - 오심, 구역 내지 구토, 빈번한 복통(특히 臍주위) * 臍주위의 복통은 기질적인 병변이 아님 - 자주 체하며 구취가 심하고 지도설 - 소화불량 변, 설사나 변비 등 대변의 이상 - 수족냉, 복부 불쾌감이나 팽만감, 장명 등 복부의 이상 자주 호소 - 흉복부 또는 전신의 피부가 매끄럽지 않음 - 복벽의 지방층이 얇아 장의 유동운동 촉진 - 안색은 황백색이며 윤기가 없고 쉽게 피로를 느끼며 무기력 - 체형은 수척한 편, 대개 체중이 늘지 않는다고 호소 - 과거력 : 장염, 이질 등의 경력
섭생법	- 밥을 잘 먹지 않는 경우는 그 요인을 제거(청량 음료수, 사탕, 과자, 간식 등을 제한) - 소화에 지장을 주는 음식을 피하고 잘되는 음식을 주로 먹이며 밥을 적당량 일정한 시간에 따뜻하게 먹일 것
치방	養胃湯, 小健中湯, 香砂六君子湯, 參朮健脾湯 (+ 전씨백출산, 보중익기탕) 등

2. 肺系 허약아(호흡기계) ★★

특징 증상	- 잦은 감기와 발열, 야간과 새벽의 해수 (肺腎陰虛, 축농증 등) - 재채기, 맑은 콧물, 코 막힘 잦음 - 심하면 쌉쌉소리, 가래 끓는 소리, 숨 쉴 때 휘파람 소리 - 인두부나 편도선에 감염흔적 (대부분 비대) - 외부의 기후변화에 극도로 민감하게 반응 - 피부가 연약하여 추위를 잘 탐 - 찬 음식물에도 기침을 하는 등 외부 환경에 대한 적응력이 몹시 약함 - 과거력 : 모세기관지염, 기관지염, 인후염, 편도선염, 폐렴, 기관지 천식, 축농증
이환되기 쉬운 증상	- 중이염 병발 - 특히 알레르기성 비염이 많음
섭생법	- 너무 덥게 키우지 말 것 - 감기에 자주 걸리면 일광욕, 해수욕이나 냉수, 건포마찰 등으로 피부를 단련할 것 - 되도록 탁한 공기를 피할 것 - 콧속을 소금물로 청결히 할 것
치방	健肺湯, 清上補下湯, 麥門冬湯, 小兒補血湯 (+ 가미지황환, 좌귀음) 등

3. 心系 허약아(순환기 및 정신신경계) ★★

특징적 증상	심장의 기질적 장애를 수반하는 경우 안색이 창백하며, 다소 푸른색을 띠기도 하고, 손과 발끝이 굵고 짧음 - 가슴이 두근거리고 부정맥이나 빈맥 등 맥이 고르지 못함 - 잘 먹지 않고 특히 체중이 늘지 않고 수척하며 감기에 잘 걸림 - 심은 신지를 주관함 : 易驚, 무서움을 잘 타며 불안, 초조, 淺眠(중간에 자주 깬), 多夢, 몽유 등 - 小便頻數 소변빈삭 - 신경이 몹시 예민하여 매사에 신경질을 잘 냄 - 복진하면 복직근 拘攣 의 증상을 보임 - 대변은 가늘고 燥한 편 - 영아기와 유아기 : 밤에 꼭 한두 차례 갑자기 깨어 울다가 다시 잠 듬. 잘 놀래며 경기를 잘 함 - 학동기 : 비교적 총명하지만 지구력이 떨어짐 / 비교적 총명하지만 지구력이 떨어짐 /일반적으로 신 경질적인 아이들
섭생법	- 갑작스러운 자극(큰 소리, 이상한 물체)을 피할 것 - 불안의 요소를 없앨 것 : 무서운 영화나 만화 등을 보지 못하게 하며, 고전음악 등으로 정서적 분위기 - 기를 유도하고, 화목한 가정을 만들도록 노력하기
치방	- 溫膽湯, 歸脾湯 등 - 대변이 가늘고 燥한 경우 산조인 원지 석창포 등, 귀비온담탕(夜驚 夜啼 등에 좋음) 등을 사용

4. 肝系 허약아(간기능 및 대사기계)

증상	- 식욕부진, 안색이 윤택하지 않은 황색, 이피로, 계절을 심하게 타는 편 - 肝은 血과 筋을 주관하므로 血虛증상 → 현훈, 잦은 코피, 살(근육)이 무른편, 쥐가 잘 남, 식은땀, → 손발톱의 발육상태가 나쁨, 눈의 감염이 잘 생기고 시력도 약해짐
섭생법	- 적당하게 운동을 시킨다. 과도한 운동은 역효과가 날 수 있다. - 목욕을 자주하여 혈액순환을 돕는다.
치방	- 小柴胡湯, 加減胃苓湯 등으로 實證을 제거한 후 - 十全大補湯, 補兒湯, 四物湯으로 虛를 補 - 운동기계가 허약한 경우 六味地黃湯을 활용

5. 腎系 허약아(비뇨생식기 및 골격계)

증상	- 신장 및 방광자체의 기질적 장애와 함께 생식기와 관계되는 개념을 모두 포함하여 소변의 이상, 배뇨곤란, 생식기의 발육부전, 精氣가 허약한 상태 - 頻尿, 多尿, 尿失禁, 血尿, 尿濁, 排尿痛 등, 성기는 왜소하며 무기력, 활동이 활발하지 못함, 신경 예민, 아침에 일어나면 눈 주위가 자주 붓고 안색도 창백, 골격이 약하고 수족이 참, 야간에 무릎이나 팔 통증, 치아와 모발의 발육상태가 불량, 여아에서는 손발이 차고 비임균성 질염으로 황색 분비물이 분비 - 과거력으로 감염 끝에 신염
섭생법	- 몸을 차게 하지 않도록 한다. - 소화가 잘 되도록 한다.
치방	- 六味地黃丸, 腎氣丸, 四六湯 등을 활용

6. 保養法

1) 개념

- 保養: 인체의 陰陽氣血, 臟腑 및 기타 器官이 일절 虛損되지 않도록 豫防措處를 하거나 이미 虛損된 부분을 치료하는 행위
- 養生法 : 虛損되지 않은 건강상태에서 시행
- 補法 : 虛損시 시행
- 補法은 虛損에 응용되는 치료법으로 인체의 陰陽氣血, 臟腑의 虛損에 대처하기 위한 治法
- 각종의 補藥을 운용하여 인체의 偏重을 조화시켜 平靜과 平衡을 도모하는 것
- 간접적으로 病邪 제거하는 면에서도 효과적.
 - : 補法을 쓰면 正氣가 회복될 뿐 아니라 餘邪를 제거하는데도 유리

2) 補法の 運用

	분류
虛證	陽虛, 陰虛, 氣虛, 血虛
補法	補氣, 補血, 補陰, 補陽

- 소아는 생리적 특성상 “陽有餘, 陰不足”
- 成長發育이 활발한 陽盛期에 해당 → 상대적으로 부족해지기 쉬운 陰性의 資質을 공급해주는 것이 필요하다! (六味地黃湯과 같은 補陰劑를 保養劑로 많이 사용)

- 실제 임상에서는 脾胃氣虛, 衛氣虛로 인한 消化器系 및 呼吸器系 虛弱兒를 많이 관찰可 → 脾胃를 補 & 衛氣를 강화시켜주는 補劑를 사용
- 즉, 환아에 따라 病症에 맞는 적절한 補法을 사용

3) 補法の 주의점

- 먼저 **脾胃의 기능을 고려**
- 病實하거나 病邪가 旺盛할 경우에는 신중히 고려
 - 이런 경우에 補法을 오용하면 병이 악화될 수 있으므로, 祛邪를 위주로 하거나 혹은 攻補를 동시에 하도록
- 保養劑의 복용은 계절적인 制約이 없음
 - 인체 陰陽氣血에 變調가 있으면 계절을 막론하고, 適宜하게 복용하는 것이 기본 원칙

4) 小兒 補藥

- <<素問·刺法論>> “正氣內存, 邪不可干”
- 특히 소아는 성인에 비하여 면역력이 약하여 外邪에 쉽게 感하여 질병에 이환될 수 있으므로 주기적으로 正氣를 강화시켜 줄 수 있는 補藥을 복용하는 것이 추천
- 최근에는 환경 변화로 인한 알레르기성 질환 및 과도한 학습량과 이로 인한 스트레스, 운동부족 등으로 인하여 체력이 떨어지면서 만성 피로, 식욕부진, 頭痛, 眩暈 등 다양한 증상을 호소하는 경우도 크게 늘어나고 있으며, 이를 개선하기 위해 補藥을 원하는 환자 및 보호자도 증가
- 소아의 보약 복용회수는 통상적으로 만 1세부터 시작하여, 1년에 2회 이상 꾸준히 하게 복용하는 것을 추천하나 필요에 따라 출생 시부터 증회
- 복용량은 환자의 연령, 체중, 환자의 건강상태에 따라 적정하게 조절
- 鹿茸, 人蔘은 인체의 精血을 보충해주고, 補氣, 生津液 하는 효과로 허약체질의 소아에게 많이 사용하는 약재이나 實熱者, 陰虛火旺者에게 사용하면 오히려 부작용이 나타날 수 있으므로 주의

曰: 피피티 내용은 하~나도 말 안하고 원대 후배가 녹용 처방해서 애기랑 산모 둘 다 잠 못자는 상황에서 자기가 그걸 형방사백산으로 커버했다는 썰만 주구장창 말하심...