

신계내과학 12주차 SUMMARY

산기(疝氣)

내분비계의 개요
 내분비계의 질환
 갑상선의 생리 및 질병
 췌장의 생리 및 당뇨병
 갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용
 부신의 생리 및 질병
 부갑상선의 생리 및 질병
 ▶ 대사성 질환
 기타 신계 병증의 임상 적용
 노인병학의 정의
 노인병의 특징 및 양생법

[1] 정의

- 고환과 음낭이 腫[脹疼]痛하여 간혹 小腹까지 牽引疼痛하는 병증
 → 족궤음간경, 임맥과 밀접
- 임상적: 급·만성 고환염, 부고환염, 고환종양, 음낭수종 등 고환과 음낭의 염증·종대·종양 등

[2] 역대제가설

1. <내경>의 7산

- 癰疽·狐疝·癰疽·癰疽 (고환의 산) | 疝瘕·厥疝·衝疝 (腹中の 산) → 병인: 寒·氣

癰疽, 癰疽, 癰疽	고환과 음낭의 종창동통
호산	갑자기 나타났다가 갑자기 사라져 그 출입의 일정치 않음을 말함
충산	소복에서부터 심까지 上衝하면서 痛함
궤산	기가 복중에 쌓여 氣逆해서 疝이 발생함
疝瘕	疝氣가 쌓이고 뭉쳐 산이 발생함

2. 金元代 장자화 <유문사친>

- 한산·수산·기산·호산·癰疽·血疝(서혜부 종물)·筋疝(음경종창 或 경중통)
- 이후 산기는 주로 음낭과 고환 부위의 병증을 지칭

3. 明代 장경약

- ‘治疝必先治氣, 故病名亦曰疝氣’

4. 清代 진수원

- 산기를 고환의 疝으로만 한정함

[3] 병인병기

寒濕凝滯	평소 陽虛하거나 오래도록 卑濕한 지역에 거처 → 한습의 邪가 肝腎의 經에 客
濕熱搏結	① 한습鬱久하여 열로 化 or ② 평소 습열 + 외한
肝鬱氣滯	정지억울이나 분노號哭 → 간실소설로 기기不暢
氣虛下陷	선천적인 稟賦부족이나 후천적인 중기下陷
痰瘀血瘀	습열담적 → 深入 時 어혈을 凝聚

[4] 진단요점

- 여성의 疝證은 기충 부위에 많이 나타남
→ 개정된 교과서에서는 남성에게만 있는 고환과 음낭의 疝만을 다룸
- 급성: 疝痛 동통 · 견인소복통
- 만성: 酸脹[下墜感]

* 이전 교과서 - 정의

- ① 前陰疝: 생식기의 병증으로 염증, 종양, 종창이나 기형
- ② 痛疝: 흉협복에 극렬한 동통 (絞痛한, 刺痛열)
- ③ 脫疝: 체강의 내용물이 복벽, 서혜부, 음낭으로 탈출(정류고환, 자궁하수, 탈항 포함)
= 小腸氣, 盤疝

[5] 변증시치

변증		증상	치법	처방
寒疝	寒實證	堅硬如石, 喜暖畏寒	온경산한	椒桂湯, 천태오약산
	허한증	按之不堅, 形寒足冷	散寒行氣	煖肝煎, 반종산
水疝	한습증	如水晶狀, 낭습한출	化氣利水	오령산
	습열증	皮膚破損而出黃水	泄熱이수	大分清飲
氣疝 (時緩時急)	기체증	분노호곡而引發	소간이기	天台烏藥散
	기허증	遇勞即發, 舌淡邊有齒印	익기거함	보중익기탕
狐疝		時上時下, 臥則入腹, 立則入囊	소간이기	보중익기탕
癰疝 오래된 산기 또는 암	痰濕瘀結證	不知癢痛, 四肢重着	행기이습	橘核丸
	痰熱瘀結證	紅腫癢痛	청열화습	용담사간탕 습 굴핵환

[6] 경과 및 예후

- 산기의 대다수는 예후가 좋은 편이지만, 狐疝은 단지 치료 후에 증상 경감이 있을 뿐 근본적인 치료가 쉽지 않다.
- 산기로 담어결취하여 오래 경과하여 癌瘤가 되면 병정이 위험하다.
- 예방 및 조리: 과로를 피하고 음낭과 고환에 부담 가지 않는 의복을 착용.

* 이전 교과서 <寒疝>

- 한사가 침습하여 고환이 멍치고 引痛하며 수족사지가 한냉함
- 병인: 久坐濕地, 冰雪上 담보, 風寒한 곳 坐臥, 방로과도 후 當冷
- 치법: 溫陽補陰(완치되지 않으면 無子의 우려)
- 처방: 蟠葱散, 當歸四逆湯, 烏頭桂枝湯.

※ 이전 교과서 <水疝>

- 유연한 파동성 (無痛性) 투광성 腫囊
- ① 음낭수종: 고환 고유 莢膜腔 안에 담황색 액체가 저류된 것(외상, 부고환염, 고환염, 고환종양의 합병증)
- ② 고환 종양이나 탈장: 유연하지 않고 파동이 없고, 광선을 투과하지 않는다.
- ③ 精液瘤: 고환망(rete testis)이나 부고환의 두부에 정자를 포함한 액체가 저류되어 생긴 종낭(우유양 액체 + 정자 발견)
- ④ 부고환의 결핵: 동통 → 유착 → 癭孔
- 치법: 급성 - 청열이습 | 만성 - 온양이습, 행기이수
- 처방: 五苓散가감, 三稜丸가감

<음낭수종>

- 고환초막(tunica vaginalis)의 두 막 사이에 장액이 저류되는 것
- 태생기에 고환과 함께 음낭 내로 내려 온 복막 즉 고환초막 내에 복막액이 많이 저류된 것으로 고환초막이 폐쇄되지 않으면 복막강과도 연결 되어 교통성 음낭수종이 됨
- 탈장까지 동반되면 嵌頓(고여서 괴사) - 위험함 ∴ 바로 탈장수술
- 속발성 음낭수종: 부고환염, 고환염, 고환종양
- 진단: 광선투조법 (透照되지 않으면 탈장이나 종양 염두)
- 치료: 1세 이전까지는 관찰 → 이후에는 수술(고위결찰술)

※ 이전 교과서 <筋疝>

- 음경이 궤양, 농즙이 유출
- 下疳瘡과 유사
- 하감창: 연성하감과 유사. 급속하게 진행, 2차성 감염도 흔함, 통증이 수반
- 치법: 청열해독, 청열이습
- 처방: 龍膽瀉肝湯, 消疳敗毒散

※ 이전 교과서 <血疝>

- 結塊한 腫物이 서혜부의 횡골 兩端 約紋中에 생기는 것
- 서혜임파부 종창 = 橫痃(단단하고 저리면서 통증; 터진 후 피고름이 흘러 나오고 잘 아물지 않는 것 = 魚口) = 편독(便毒)
- 치법: 清熱消腫
- 처방: 仙方活命飲 / 虛寒者 - 托裏消毒飲

<성병성 림프육아종>

- 원인균: Chlamydia
- 증상: 일시적인 성기 병변 후 림프선염, 때때로 직장협착, 남성에서는 다발성 누공

※ 이전 교과서 <癰疽>

- 陰囊의 諸症(종창 堅硬 종대 + 압통)
 - ① 腸癰 - 음낭이 종대 되고 偏墜. 출혈과 괴사로 膿血이 하류하면 危症 = 小腸氣
 - ② 卵癰 - 무겁고 굳으며, 서혜부 하복부 牽引痛
 - ③ 氣癰 - 기형 결함 + 충격(분노, 鬱氣) → 昏冒 현훈
 - ④ 水癰 - 점액이 腫瘤된 것
- 기형이나 결핵 매독의 후유증
- 치법: 行氣消腫
- 처방: 十六味流氣飲 (治옹저, 영류; 십전 + 사마탕 + 길경지각산 + 소엽 후박 방풍)

신착(腎着)

[1] 정의

- 허리 및 허리 아래 부분의 重冷[痛]을 자각하는 병증
- 병인: 濕寒
- 病位: 腎의 外府 및 帶脈
- 기타 증상: 口不渴, 飲食如故, 小便自利
- 甘薑苓 芍藥湯: 사군자탕 - 인삼 + 건강
- 임상적: [류머티스성·비대성·급성] 척추염 (척수신경근이 자극 받아 나타나는 증상 포괄)

[2] 역대제가설

東漢代 張仲景 [金匱要略]	‘腎着之病, 其人身體重, 腰中冷如坐水中, 形如水狀, 反不渴, 小便自利, 飲食如故, 病屬下焦. 身勞汗出, 衣裏冷濕, 久久得之, 腰以下冷痛, 腹中如帶五千錢, 甘薑苓朮湯主之.’ 증상, 원인, 처방
宋代 [聖濟總錄]	‘以濕氣着而不去, 故名腎着.’
清代 喻昌	‘此證乃濕陰中腎之外廓: 甘溫從陽 淡滲行濕.’

[3] 병인병기

병인	濕邪爲主 > 兼以寒邪 久臥寒濕之處 · 涉水冒雨 · 汗出衣裏冷濕日久 · 久從水中作業
증상	- 口不渴 ：熱在上焦氣分則渴, 熱在下焦血分則不渴 盖血中有濕 故不渴也. - 소변자리: 下焦有寒 - 음식여고: 胃中無病 → 誤治하면 水病_{edema} 가능

[4] 감별진단

- ① 腰痛: 요부 동통 / 신착 - 요 및 요 이하 重冷이 주증임
- ② 腰軟: 요부의 연약무력
- ③ 風水: 全身浮腫이 주증 + 腰冷重·惡風·關節증상·時咳
- ④ 濕痺(着痺): 근육과 피부 저림 + 關節腫痛

[5] 변증시치

- 주증: 腰及腰以下冷重, 身重, 구불갈, 음식여고, 소변自利, 久則腰以下冷痛 + 부은 듯
- 치법: [온양건비] 散寒祛濕
- 방약: 감강영출탕[腎着湯], 腎着散

[6] 경과 및 예후

- 예후는 좋으며, 水病으로 전변되는 경우는 드물다.
- 예방 및 조리
 - ❶ 久坐濕地뉘시, 涉水冒雨래프팅, 身勞汗出, 스쿠버다이빙을 피한다.
 - ❷ 溫燥한 의복
 - ❸ 생강탕

골위(骨痿)

[1] 정의

- 腰背酸軟, 하지위약무력, 牙齒乾枯, 難於直立 등이 나타나는 위증
- 骨枯·骨極·骨痺·骨痛·腰背痛 등과 유사
 - ↳ 骨極: 치아흔들거림, 손발시큰함, 不能久立
- 임상적: 골형성부전증(anostosis), 구루병(rickets), 골연화증(osteomalacia), 골다공증(osteoporosis) 등

[2] 역대제가설

[소문·痿論]	肺熱葉焦로 인한 腎臟熱(허열)을 주요 원인으로 제시하면서 신장 기능 장애로 골위가 발생한다고 함
[영추·決氣]	氣津精液의 결손 → 痿證
金元代 이동원	습열
明代 장경악	元氣敗傷·精血虧虛를 위증의 원인으로 강조

[3] 병인병기

- 腎虛하여 골수가 감소되는 것이 本이 되고, 어혈·풍한습邪가 標가 됨
- ① 腎精不足: 年老, 음식부절 → 기혈의 化生이 부족
- ② 氣血兩虛: 신체허쇠, 음식부절 → 기혈의 화생이 불량
- ③ 寒濕凝滯, 瘀血阻絡: 衛外不固 → 풍한습 침습

[4] 감별진단

皮痿	皮毛枯槁, 咳喘氣逆 / 痿臂
脈痿	국부가 창백하거나 紫暗하면서 사지관절이 굳어질 것 같으며 腿軟不任地
肉痿	기육不仁. 운동장애 or 무감각, 사지불능舉動
筋痿	筋脈拘急, 점차 痿弱不用 / 筋急而攣
骨痺	풍한습사가 함께 허한 틈을 타서 침범하여 留而不去하여 발생 주요 증상은 뼈가 쑤시고 몸이 무거우며 마비되는 듯한 느낌이 있고 팔다리가 무거워서 들기가 힘들다(重而不舉)

[5] 변증시치

변증	증상	치법	처방
신정부족	足跟作痛, 齒搖	보신전정	補髓丹
간신음허	오심번열, 조열도한	자보간신	좌귀음, 虎潛丸
脾腎陽虛	사지무력, 肢冷畏寒, 便溏	온보비신	우귀환
기혈양허	자한핍력, 氣短懶言, 면색無華	익기보혈	팔물탕
한습응체	동통 반복발작 감수한랭 及 거주潮濕之地而가중	散寒祛濕	독활기생탕
혈어기체	劇烈 통처고정	활혈화어	신통죽어탕

+ 동의보감 위병치법: 蒼朮 黃芩 治痿之要藥也.

cf) 二妙散: 음식, 칠정, 육음으로 인한 기습열담

[6] 경과 및 예후

- 골간에 열이 있고 사지가 緩弱하며 不能起于床하면 난치에 속한다.

- 예방 및 조리

- ① 보온과 한랭 자극에 주의
- ② 禁: 습지, 용력거중, 고량후미, 폭음, 폭식, 흡연, 커피, 콜라, 짠 음식, 화, 조금, 비관
- ③ 완만하고 부드러운 운동, 적절한 일광욕
- ④ 清淡한 음식

* 오위의 분류

분류	五臟	五體	병인
皮痿 (痿臂)	肺	皮毛 (經絡)	感染性
脈痿	心	血脈 (循環)	血行障碍 心因性
筋痿	肝	筋膜 (腱)	痙攣・有痛性・中樞性 (상위운동원장애)
肉痿 (肌痿)	脾	肌肉 (筋肉)	筋原性
骨痿	腎	骨髓 (神經)	神經질환 (하위운동원장애)

동양의학에서 筋은 腱(상위뉴런)을 지칭하며, 서양의학에서 筋^{muscle}은 동양의학에서는 肌肉에 해당한다