

# 신계내과학 13주차 SUMMARY

## 이명이론

내분비계의 개요

내분비계의 질환

갑상선의 생리 및 질병

췌장의 생리 및 당뇨병

갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용

부신의 생리 및 질병

부갑상선의 생리 및 질병

대사성 질환

### ▶ 기타 신계 병증의 임상 적용

노인병학의 정의

노인병의 특징 및 양생법

### [1] 정의

- ① 耳鳴: 蟬鳴·潮水聲·鐘鼓聲 등 耳內的 鳴響을 자각하면서 청각에 장애가 있는 경우  
cf. 타각적 이명: 심한 전신쇠약자에 있어서 이관이 비정상적으로 개방되었을 때 호흡과 일치해서 바람부는 소리와 같은 이명이 들리며 대부분 일시적으로 나타남
- ② 耳聾: 청각이 減弱해서 대화에 지장을 받거나 심지어 전혀 들을 수 없어 정상적인 생활에 영향을 받는 경우 (주관적 또는 객관적 청력 장애)  
- 65세 이상의 40%가 경험 → 소외 → 치매 ↑  
- HET, DM과 밀접함 / 흡연, 소음 + 항암제, 방사선 치료  
- 重聽: 가벼운 이롱 cf. 耳菌
- ③ 임상적: ENT(외이/고막/중이병변), IM(급성 전염성 병변; 감기·성홍열), CNS(뇌막염, 뇌종양, 청각신경종양, 뇌압 상승 질환) 등

### [2] 역대제가설

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [영추·해론]          | 髓海不足, 則腦轉耳鳴                                                                          |
| [소문·厥論]          | “少陽之厥, 則暴聾”<br>이명과 이롱이 외감과 내상을 불문하고 발생할 수 있으며, 내상은 주로 기허·신기휴허에 의한 정수부족·膽의 經氣厥逆으로 기인함 |
| 隋代 소원방           | ‘耳爲宗脈之所聚’인 까닭에 오장육부와 십이경맥의 병변은 모두 이명이론을 일으킬 수 있음                                     |
| 宋代 엄옹화           | 大抵氣厥耳聾尙易治, 精脫耳聾不易藥愈.                                                                 |
| 明代 王肯堂<br>[증치준승] | 耳聾須分新久, 新聾多熱, 少陽陽明火多故也, 宜散風熱, 開痰鬱之劑. 久聾多虛, 腎常不足故也. 宜滋補兼通竅之劑.                         |
| 清代 [의림개착]        | 瘀血의 치료를 중시                                                                           |

## [3] 병인병기

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 風邪外侵         | 풍사襲表 → 循經上搖 or 肺氣不宣 → 經氣가 阻塞不通<br>聾聵 塞耳 + 풍열                                       |
| 肝膽火盛         | 惱怒傷肝 → 간실소설 → 간기울결 → 氣鬱化熱 → 耳를 上搖<br>삼초蘊熱 + 풍열<br>[잡병원류서측] - '有肝膽火盛, 耳內蟬鳴, 漸至於聾者.' |
| 痰火鬱結         | 肥胖 or 고량후미 → 담습內盛<br>담성 + 풍열 or 습담鬱久化熱 → 담화상승                                      |
| 脾胃虛弱<br>中氣不足 | 병후, 과로, 憂思 → 清陽不升·濁陰上逆                                                             |
| 肝腎虧虛         | 품부부족, 恣情縱慾, 구병, 年老                                                                 |
| 瘀阻宗脈         | 외상으로 기혈逆亂 / 간기울결로 기체혈어                                                             |

## [4] 감별진단

- 동반 증상: 외감표증·두훈목현·오심구토 등

- ① 聾啞: 선천적이거나 유아기에 열병을 앓은 후에 발생 (흔히 이롱 → 口啞)  
→ 이롱은 성인에게 많이 발생하고 口啞는 나타나지 않음
- ② 耳菌: 肝·腎經에 火毒 응취되어 발생, 표고버섯 모양으로 종괴가 耳道를 폐색하거나 耳外로 돌출됨, 重聽을 유발
- ③ 腦鳴: 腦內鳴響을 본인이나 (기계를 통해) 타인이 듣는 것

## [5] 변증시치

- 暴起 - 실증: 풍·화·담 + 어혈
- 漸起 - 허증: 기허·혈허·비허·간허·신허

| 변증           | 증상                                  | 치법   | 처방           |
|--------------|-------------------------------------|------|--------------|
| 풍사외침         | 刮風樣(바람스치는 소리), 발열오통, 비색유체, 流膿血      | 거풍해표 | 형방패독산        |
| 간담화성         | 如鐘, 如潮水聲, 如風雷聲(시끄러운 소리); 구고인건, 번조이노 | 청간사화 | 사청환, 총이노회환   |
| 담화울결         | 時輕時重, 胸脘煩悶, 痰多, 오심                  | 화담청화 | 이진탕, 복총탕     |
| 비위허약<br>중기부족 | 勞則更甚(과로시 심), 신피핍력, 소기나연             | 건비익기 | 보중익기탕, 익기총명탕 |
| 간신티허         | 요슬산연, 或 양위, 두훈목현                    | 온양장신 | 팔미           |
| 어조종맥         | 流陳血, 설질紫暗 或瘀阻(외상의 병력)               | 활혈화어 | 통규활혈탕        |

## [6] 경과 및 예후

- 暴聾은 특히 조기에 적절히 치료해야 함  
→ 청력이 오랫동안 회복되지 않으면 영구히 청력을 상실 가능
- 抽搐, 각궁반장, 驚厥, 神昏 등의 증상 시 예후가 좋지 않음
- 예방 및 조리: 귀를 함부로 후비지 말 것, 성관계를 절제, 항상 유쾌한 마음가짐.
- 침구치료혈: 청회, 중저, 예풍, 청궁, 이문, 태계, 신수, 함곡 順

## 실음

## [1] 정의

- 輕則聲音嘶啞 或聲不能出, 重則舌強不語하는 상태 = 瘖 = 暗
  - ① 喉瘖: 肺腎과 관련 cf. Dysphonia(발성장애)
  - ② 舌瘖: 心과 관련 cf. Aphasia(실어증), Dysarthria(構音障礙)
- 임상적: 喉瘖(인후염, 성대결절 등: 발성기관 자체의 병변),  
舌瘖(CVA sequela : 중추신경장애)

## [2] 역대제가설

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [영추·憂患無言]         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 喉嚨者, 氣之所以上下者也. 會厭者, 音聲之戶也. 口脣者, 音聲之扇也, 舌者, 音聲之機也, 懸壅垂者, 音聲之關也. 頰頰者, 分氣之所泄也. 橫骨者, 神氣所使, 主發舌者也.</li> <li>- 수태음肺經·족소음腎經·수소음心經·족厥음肝經이 지나감<br/>→ 특히 회염은 肺經, 舌本은 腎經 (脾經X)</li> <li>- 성음과 언어가 장부와 밀접한 관계가 있음을 말함</li> </ul> |
| [내경]              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외감 瘖-肺 문제(풍한), 내상 瘖-심·간·신 문제(심맥虛, 간기울결, 신음부족)</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 隋代 소원방<br>[제병원후론] | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘陰邪搏於陽氣, 使氣道不調流, 所以聲嘶也.’</li> <li>- 併發되어 나타나는 실음증: 원발병 위주의 치료가 마땅</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 宋代 전을             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실음증과 大病後無力發聲證을 구분 / 大驚失語의 원인, 처방 제시</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 金代 유완소            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 地黃飮子: 治中風 舌瘖 足癱 腎虛 氣厥不至舌下 cf. 舌根, 舌本<br/>→ 뇌동맥경화나 新음신양兩虛에 속하는 CVA sequela</li> <li>- 燥火傷金으로 인한 실음 제시 → 청폐윤조·자음강화</li> </ul>                                                                                          |
| 明代 樓英<br>[醫學綱目]   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실음을 舌瘖과 喉瘖 2가지로 명확히 분류함</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 장경악               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심·폐·신 중 특히 腎을 강조 / 예후는 ‘暫而近者易, 漸而久者難’</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| 清代 程鐘令            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 小兒실음: 품부부족과 모체로부터 받은 五志之火·驚風·중풍 등 원인</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

## [3] 병인병기

- 閉·燥·虛

- ① 感受外邪: 寒客會厭, 熱灼咽喉, 火灼肺津, 灼津成痰, 寒包於熱
- ② 久病虛勞: 久嗽不愈나 勞傷肺腎으로 傷津, 大病 후 비위허약, 품부본허, 주색과도
- ③ 기타: 憂思鬱怒, 暴飲冷水, 辛辣煎炸음식의 과식, 高聲歌唱

## [4] 감별진단

- ① 喉痺: 인후의 염증[홍종동통] + 경도의 聲低音啞 ; 가미사물탕(길경)
- ② 喉癰: 喉關이 종창화농하여 폐색을 일으켜 吞咽時호흡곤란 + 語言難出 ; 청화보음탕
- ③ 喉瘤: 인후부의 혹 + 오래되면 聲音嘶啞 ; 육미 + 생맥산
- ④ 飛揚喉(懸旗風; 懸旗癰): 脾胃熱이나 외상으로 상악이나 현옹수 하단에 갑자기 자주색 물질[血泡]이 발생 + 심하면 口不能言 ; 감길탕 + 쌍화탕 + 원지 석창포

## [5] 변증시치

| 변증 |   | 증상   | 치법                         | 처방   |
|----|---|------|----------------------------|------|
| 후음 | 실 | 풍한속폐 | 해수, 비색, 오한발열               | 소풍산한 |
|    |   | 담열교조 | 신열, 咳痰黃稠                   | 설열화담 |
|    | 허 | 폐조금상 | 喉燥, 無痰                     | 청조윤폐 |
|    |   | 폐신음허 | 허번불면, 灼熱, 수족심열, 消瘦, 腰酸, 目眩 | 자신양폐 |
| 설음 | 실 | 열극생풍 | 번갈, 舌絳, 맥현삭                | 식풍개규 |
|    |   | 담미심규 | 痰多, 或甚卒中                   | 척담개규 |
|    | 허 | 비허실양 | 사지위연무력, 手撒                 | 익기개규 |
|    |   | 신기불영 | 유뇨, 或足廢不能行                 | 보익신정 |

## [6] 경과 및 예후

- 일단 虛損의 상태에 이르면 예후가 좋지 않음
- 情志所傷이나 기기울결로 인한 喉癆의 경우는 재발이 흔함
- 舌癆는 졸중혼미 이후의 속발성인 경우가 많아서 원발병의 치료에 따라 예후가 다름
- 예방 및 조리
  - ① 慎기거: 감기 예방
  - ② 節음식: 辛辣煎炸 X, 담배 X, 술 X / 청담한 음식(배, 굴, 白木耳) O
  - ③ 調整지

## 천증

## [1] 정의

- 呼吸急促하고, 심하면 張口擡肩·鼻翼煽動·不能平臥를 특징으로 하는 병증
  - ① 急: 호흡이 빠른 것
  - ② 促: 호흡이 얕으면서 빠름
- 임상적: 천식형 기관지염, 만성 기관지염, 폐기종, 폐렴, 심부전 등

## [2] 역대제가설

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내경]            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 喘鳴·喘息·喘逆·喘喝·肩息 등 → 모두 천증</li> <li>- 병변부위는 주로 肺·腎</li> <li>- 원인: 賊風虛邪, 水氣乘肺, 脈絡瘀阻, 情志, 勞倦, 기후변천 등</li> </ul> |
| 漢代 [금궤요략]      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '咳而上氣'하는 肺脹</li> <li>→ 上氣: 천식불능평와</li> <li>→ 폐창: 폐렴, 급성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 폐기종의 합병감염</li> </ul>            |
| 隋代 [제병원후론]     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 陰不足, 陽有餘, 故上氣也.</li> </ul>                                                                                  |
| 宋代             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 下虛上實</li> </ul>                                                                                             |
| 金元代 주단계 [脈因證治] | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 實喘은 瀉肺 위주로, 虛喘은 補腎을 위주로 치료</li> <li>① 실천: 氣實肺盛, 담, 화, 水氣 / ② 허천: 腎虛</li> <li>- 哮病과 喘病을 구분함</li> </ul>       |
| 明代 장경악         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실천: 邪氣實, 長而有餘, 聲高息涌, 呼出而快(거칠고 빠르고 큼)</li> <li>- 허천: 元氣虛, 氣短而不續, 聲低息短, 引張一息[深吸]爲快(완만하고 짧고 낮음)</li> </ul>     |
| 清代 蔣寶素         | 喘因痰作을 강조 cf. 氣→痰→嗽                                                                                                                                   |

### [3] 병인병기

- ① 風寒束肺: 풍한外束 → 한사客肺 → 肺失肅降 / 평소 담음 + 감수풍한  
→ 한사가 담음을 動하게 함
- ② 表寒裏熱: 평소 폐열 + 한사외속 or 表寒化熱 → 열을 → 肺失宣降
- ③ 熱邪壅肺: 풍열침습 → 폐에 침범 → 청숙기능 상실 /  
풍한화열 or 脾失健運 → 聚濕生痰 → 화열 → 痰火交阻 → 清肅之令을 不行
- ④ 痰濁阻肺: 肥甘·생랭물·술 → 비失건운 → 담탁이 폐를 上凌 → 승강불리
- ⑤ 氣鬱傷肺: 憂思氣結 → 氣阻胸中 or 惱怒傷肝 → 간기乘肺 → 폐失선강
- ⑥ 肺虛: 久咳 or 우사·노권傷脾 → 폐기허 → 속강불능
- ⑦ 腎不納氣: 구해구천·年老·구병·勞慾 → 신기불고 → 氣失攝納 → 기 역상

### [4] 감별진단

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 哮證 | - 반드시喘이 동반되어 호흡곤란하고 심하면 천식불능평와, 喉中哮鳴                                              |
| 短氣 | - 氣急而短, 不足以息, 數而不能接續하나 擡肩, 痰鳴聲이 없음<br>+ 누우면 좋아짐<br>- 호흡이 짧고 촉박[短促]하며 연결이 잘 안된다는 뜻 |

#### ※ 천증과 단기의 구별

표 5-3. 喘證과 短氣의 구별

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 喘證 | 氣粗聲高, 張口擡肩, 搖身擡肚, 심하면 눕지도 못한다.                                                                |
| 短氣 | 呼吸은 빠르나 얇고 급하며 微弱하여 接續이 어렵고, 或은 短氣는 숨쉬는데 있어 不足하여 喘과 비슷하나 소리가 없고, 역시 어깨를 들먹이지도 않으며 누우면 좋아진다. / |

#### ※ 천증의 허실변별

표 5-1. 喘證의 虛實辨別

| 임상표현 | 實喘           | 虛喘           |
|------|--------------|--------------|
| 呼吸   | 深長有餘 呼出爲快 氣粗 | 短促難續 深吸爲快 氣怯 |
| 聲音   | 高大 伴有痰鳴咳嗽    | 低微 少有痰鳴咳嗽    |
| 脈象   | 數而有力         | 微弱或浮大中空      |
| 病勢   | 驟急           | 徐緩 時輕時重 遇勞即甚 |

#### ※ 천증의 장부감별

표 5-2. 虛喘의 臟器辨別

|      | 肺虛            | 腎虛                    | 心氣(陽)虛                |
|------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 천식양상 | 操勞後氣短而喘       | 靜息時也有氣喘息促<br>喘息持續不已   | 動則更甚                  |
| 동반증상 | 面色白<br>自汗 易感冒 | 面色蒼白或靚紅 冷或<br>煩熱 腰痠膝軟 | 心悸 浮腫 紫紺<br>頸脈怒張(脈結代) |

### [5] 변증시치

| 변증   | 증상                                         | 치법   | 처방             |
|------|--------------------------------------------|------|----------------|
| 풍한속폐 | 咳痰清稀, 비색류체                                 | 신온해표 | 소청룡탕           |
| 표한리열 | 발열오한, 무한축한출부다, 해천번민,<br>객토황조담, 구갈희냉음, 뇨황변건 | 해표청폐 | 대청룡탕,<br>마황정천탕 |
| 열사용폐 | 홍통, 비익선동                                   | 청열선평 | 상국음, 사백산       |
| 담탁조폐 | 胸盈仰息, 口粘                                   | 화담강기 | 도담탕,<br>소자강기탕  |
| 기울상폐 | 咽中如室, 홍협창통                                 | 개울강기 | 사마탕,<br>반하후박탕  |
| 폐허   | 기단, 기겁, 신피핍력                               | 익기양음 | 보폐탕            |
| 신불납기 | 呼多吸少, 기불접속, 요슬산연                           | 온신납기 | 팔미             |

### [6] 경과 및 예후

- 實喘은 예후가 좋으나, 오래되면 폐·비·신에 영향을 미치며, 脣·舌·指甲靑紫와 맥결대 등이 나타나면 心까지 영향을 미친 상태
- 예방 및 조리: [禁] 담배, 매연, 정신자극, 생랭물, 肥膩之品  
寒暖을 적절히, 기공단련, 긍정적인 마음, 清淡한 음식