

2024 심계내과학(신선호) [1주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!

그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📌 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표한 처방] 신력탕, 이중탕, 부자이중탕, 진무탕, 지황음자, 생맥산

신력탕

✓ 원래 요통에 쓰던 처방

- ➡ 후대로 가서 요통 이외에도 중풍 후유증에 썼더니 괜찮아져서 중풍 후유증에도 씀
 - ➡ 그러나 요즘은 잘 안 씀
 - 신력탕이 방약합편 중에서도 상통에 수록된 처방인 만큼, 중풍 중에서도 연세가 많이 드셨는데 너무 안 드시고,, 그런 분들에게 썼었는데 (本虛 중에서도 신력탕은 음허가 기본일 때) 지금은 고지혈증, 콜레스테롤 수치 증가 등 너무 잘 먹어서 생긴 혈관 질환이 많기 때문
- (+ 자석이 들어간 처방으로 장에 문제를 일으킬 수 있어서 잘 쓰이기도 함)

이중탕

★ 風門을 볼 때 주의할 점 ★

- 내풍/외풍으로 나눠서 보기
 - ① 내풍: 중풍 (뇌혈관 증상은 종잡을 수 없어서 중풍이라고 했음)
 - ➡ 요즘 표현으로 하면 "퇴행성 뇌혈관 질환"
 - ② 외풍: 감염성 질환

- ✓ 외풍으로 인한 복통, 설사에 사용 (➡ 중초를 치료하는 처방)
 - ↳ 상한론 육경변증으로는 태음병 복통

부자 이중탕

- ✓ 이중탕보다 좀 더 심한 복통에 사용하는 처방
 - ↳ 상한론 육경변증으로는 태음병과 소음병 그사이 복통
- +) 상통에는 사군자탕을 기본으로 하는 처방이 많음
(소화기가 좋아지면 다른 것도 자연스럽게 좋아진다고 본 것 같음)

진무탕

✓ 복통이 굉장히 심할 때 사용 (➡ 약을 엄청 세게 씀)

이중탕, 부자이중탕, 진무탕은 요즘도 많이 쓰니까 잘 알고 있으세요~~

지황음자

✓ 지금도 많이 쓰는 처방

(음허도 있으면서 양기가 같이 떨어지는 노인분들에게)

- ➡ 신허로 인한 제반 증상 ⇨ 특히 하체쪽 ⇨ 파킨슨, 치매 등

✓ 부자는 신중하게 쓰자!!

- 부자: 화력을 세게 해주는 느낌
 - ↳ 부자를 쓸 때는 태을 게 있고, 땀감이 있어야 함
(특히 음허와 같은 상황에 부자를 잘못 썼다가는 심한 부작용 유발 가능)
기가 막힌 교수님의 표현: 햇빛이 세면 그림자도 짙은 것처럼 부자의 효과가 다이내믹하더라도 잘못 쓰면 부작용 大
- cf) 육미: 땀감 역할 (육미 + 부자/육계 = 팔미)

생맥산

✓ 지금도 많이 쓰는 처방

cf) 사암침법 육기에 대한 설명을 갑자기 하심

- 태음습도: 경맥에서는 수태음폐경 (항상 촉촉해야 함)
(촉촉한 땅) 족태음비경 (숨 쉰 후 살기 위해선 음식 섭취)
- 소음군화: 임금은 정신, 의식, 사유를 담당하는 존재로
족소음신경 - 학습과 관련되어 있음
수소음심경 - 정신, 사유를 담당 (심주신명)

제1절 한방 순환 · 신경내과학의 개요

한의학에서 心이란

- 1) 정의: 실질 장기 + 기능계로서의 心
- 2) 기능: 心主血脈, 心主神志
 - 心主血脈: 혈액순환을 주관하는 "심혈관계"의 기능
 - 心主神志: 의식, 사유, 정지 등을 주관하는 "신경계"의 기능
- 3) 특징
 - 교수님이 언급하신 부분만 정리했습니다!
 - 소장과 습한다.
: 소장은 火에 해당하며 소장을 소화기 쪽으로 생각하지 말고 心和 관련지어 혈병으로도 생각해보기
(수태양소장경의 경맥 유주 중 어깨 부분이 있는데, 어깨 통증에 활혈거어지제를 쓰면 좋아지는 경우 有)

역대제가설 설명하기 전, 교수님의 脾胃에 대한 설명

중요해보이지는 않지만 그래도 의미있는 설명이라 참고하면 좋을 것 같아 정리했습니다.

✓ 脾胃의 차이 (각각에 문제가 생긴 경우)

	예시	치료	
		처방(藥)	경락(針)
脾에 문제	아침도 안 먹었는데 속 쓰리고, 입맛 없고, 스트레스 몽땅 받아서 배도 아프고, 소화도 안 되는 것 같은 경우	<氣滯로 보아서> 소합원 반하사심탕 향사육군자탕	脾經
胃에 문제	어제 늦게까지 술을 많이 먹어서 소화가 안 되어서 소화제를 좀 먹어야 할 것 같은 경우	<食滯로 보아서> 평위산	胃經

* 脾經: 비의 복모혈 -> 부교감신경 활성화를 유발해 소화에 도움을 줌_氣滯에 사용

* 胃經: 위의 복모혈 -> 食滯에 사용함

제5절 흉통(胸痛)

1. 개요

- 1) 정의: 흉부에 발생하는 불편감과 통증  기출/악마 흉통의 특징을 모두 적으시오(08)
- 2) 범주
 - (1) 한의학적: 心痛 胸痺저리고 胸痞답답한 것 結胸 胸悶가슴답답 胃脘痛
 - (2) 현대적: 심장성 / 비심장성

	심장성	비심장성
정의	심장 자체의 병변으로 인한 심통	심장 이외의 병변으로 인한 심통 - 胃脘痛, 心脾痛, 心腹痛, 胃脘當心而痛, 胸痞 등 포괄
원인	심장 음양기혈의 偏虛, 寒凝, 熱結, 痰阻, 氣滯, 血瘀 등	飲食不節 ↳ 소화기로 인한 경우 多情志실조, 무리한 움직임, 면역력 저하 등
특징	① 협심증, 심근경색, 대동맥협착, 심낭염, 대동맥박리 등의 질환으로 발생 ② 응급상황에 해당	폐렴, 특발성 기흉 역류성 식도염 ↳ "화끈거린다"는 표현 중요 소화성 궤양, 근골격계 질환, 대상포진, 늑막염 등과 관련 有

- ✓ 흉통환자가 왔을 때는 과거력을 따져 보아야 함 (병력 청취 중요)
↳ 예전에도 이런 증상이 있었나요? 갑작스러운 증상인가요? 건강검진은 받아보셨나요?

2024 심계내과학(신선호) [2주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표한 처방] 공진단, 쌍화탕, 향사육군자탕, 십전대보탕

공진단

- ✓ 공진단, 경옥고는 비싸서 그렇지 효과가 아주 괜찮음
ex) 경옥고: 교수님 와이프 (와이프도 한의사..) 도 매일 한 포씩 먹는 중
- 마라톤도 하시는데 효과가 좋고, 모발도 굵어지고, 흰머리도 덜 나고..
- ✓ 목향과 침향
 - 목향: 소도지제
 - 침향: 개규시켜주는 느낌

쌍화탕

- ✓ 쌍화탕은 사물탕 가감방 (혈가약)
 - 황기, 육계도 들어가 있음
- cf) 육계는 보약, 계피는 발산하는 약 (감기약), 계지는 순환을 원활히 해주는 약
(ex - 계지: 산에 올라갔다오면 양 볼에 허열이 뜨면서 후끈거리는데 이럴 때 계지는 원래 열이 자기 자리로 가게 해주는 역할)

향사육군자탕

- ✓ "氣滯"로 인한 소화불량에 아주 좋은 처방
- ✓ 요통에 사용하는 한의사도 꽤 있음
 - 식후도포 즉, 식사 후 배에 가스가 차서 뽕뽕하게 불러 올라와서 상/하초의 순환을 방해하고 허리에도 영향을 미칠 수도 있기 때문 (기능적 문제가 지속되면 기질적 변화까지 일으킴) ➡ 소화기를 좋게 했더니 병이 치료된다고 보는 관점

십전대보탕

- ✓ 임상에서 많이 쓰이는 처방
 - 산모, 간계 질환, 응저에 쓸 수 있음
 - ↳ 산모에겐 황기육계를 빼고 팔물탕을 씀 (오로가 빠짐없이 배출되어야 하기에)
- ✓ 황기: 탁독배농, 소종생기하는 효과 有
ex) 황기가 군약인 처방: 아무리 항생제를 써도 당뇨로 인해 사지말단이 썩는 환자..
- ✓ 십전대보탕에서 무슨 약을 군약으로 하는지에 따라 효능이 조금씩 다름
- ✓ 십전대보탕에 천궁도 들어감
 - 천궁: 혈중지기약
 - ↳ 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 협심증으로 천궁 성분이 들어간 양약을 복용하고 있는 환자도 있으니 활혈거어약을 사용할 땐 이미 복용 중인 약이 무엇인지 물어보기 (ex - statin)

제5절 흉통(胸痛)

2. 역대제가설 (흉통을 어떻게 바라봤는가)

특별히 언급하시진 않았는데 악마에 있어서 정리해주었습니다.

내경	특징	心痛의 원인과 증상, 예후 등을 상세히 기록 ➡ 眞心痛: 心痛 중에서도 가장 위급하고 생명을 위협하는 心痛으로 인식
	원인	經脈閉阻하고 血行不暢하고 寒邪가 경맥에 침범하여 발생
	치료	침술 치료의 혈위와 방법을 중요하게 여김
장중경 (漢代)	특징	胸痺라고 함 병인병기 및 처방에 대해 구체적으로 제시
	원인	痰濁이 가슴에 內阻하여 胸陽이 不通하여 발생
	치료	辛溫通陽 病情의 경중에 근거하여 각각 다른 방제를 세움
세의특효방 (金元代)	· 危亦林(위역림)이 소합향원을 卒暴心痛에 사용한다고 언급 (芳香溫通 효과) ↳ 胸痺 치료에 진일보함	
증치준승 (明清代)	· 胸痺 인식에 많은 발전 有 · 王肯齋(왕궁당)이 心痛과 胃痛을 명확히 구분하였으며 이전의 경험을 총결하여 활혈화어법을 사용하였음 (紅花, 桃仁, 降香, 失笑散 등으로 死血心痛 치료)	
시방가팔 (明清代)	· 단산음으로 心腹諸痛을 치료	
의림개착	· 혈부축어탕으로 흉비심통 등을 치료 ↳ 胸痺치료에 있어서 커다란 발자취를 남김	
동의보감	· 心痛과 胃脘痛의 원인이 다르다고 인식 ↳ 淸정심통이라고 기술	

[동의보감의 6종心痛]

교수님이 언급한 내용, 처방 위주로만 정리했으니 자세한 건 아래 사진을 참고해주세요

	특징		처방
脾心痛	현대의 "역류성 식도염"	소화기 관련	부교감신경 자극
胃心痛		脾心痛과는 차이 有	
腎心痛	현대의 "결석"으로 인한 것과 같다고 볼 수도 있음		
積心痛	· 쌓여서 오는 것 ↳ 음식 적취, 과식으로 혈액순환이 안 되어서 발생		
厥心痛	· 갈 때까지 간 것 cf) 厥의 의미 ① 병정: 갈 때까지 간 것 ② 병위: 손끝 or 발끝 ③ 병의 상태: 아주 열증 or 한증		출부탕, 금령자산 ➡ 협심증에 사용함 ★ 협심증, 심근경색, 심부전의 차이는? 시험에 낼 거예요!! (악마정리파일에 답 정리함)
眞心痛	현대의 심근경색		

표 5-2 東醫寶鑑의 六種心痛

六種心痛	특징			처방
脾心痛	心下急痛, 心痛甚而至於脇下 如刀割之痛 如以錐鍼刺其心 心痛甚			訶子散 手拈散 復元通氣散
胃心痛	腹脹而心痛 胃脘當心而痛 木鬱之發民病 胃脘當心而痛 上支兩脇 嗝咽不通 又厥陰之勝 胃脘當心而痛 蓋木氣被鬱發則太過 故民病有土敗木敗之候 胃爲脾之府 陽先於陰 故藏未病而府先病也			草豆蔻丸 加味枳朮丸 清熱解鬱湯 清鬱散
腎心痛	心痛與背相控 善癆 如從後觸其心 僂僂 下重而苦泄 寒中 腎傳之心病 筋脉相引 心下急痛 病名曰癆			神保元烏沈湯 蟻葱散 神聖復氣湯
	腎之積名曰奔豚 自臍下上衝 心痛最甚			五苓散去白朮倍肉桂
積心痛	飲食積聚 遇食還發			行氣香蘇散 煮黃丸 草豆蔻丸 加味枳朮丸
	凡人飲食後 忽然暈倒 口噤不言 目不識人 四肢不舉 多因飲食過度 氣道窒塞 或滯氣滯			急用薑鹽湯多灌探吐之 後服平胃散 六君子湯
厥心痛	因內外邪 犯心之包絡 或他藏之邪 犯心之支脉 他藏病干之而痛也邪在心 乍間乍甚成疹 久不死	寒厥 心痛	手足厥逆 身冷 汗出 尿清 不渴 氣微力弱	朮附湯
		熱厥 心痛	身熱 足冷 痛甚煩躁 脈洪大	金鈴子散
眞心痛	大寒觸犯心君或汚血衝心 因內外邪犯心君 心痛 手足青至節 心痛甚 朝發夕死 夕發朝死			不治

[동의보감의 9종心痛]

교수님이 언급한 내용, 처방 위주로만 정리했으니 자세한 건 옆 사진을 참고해주세요

	특징 (원인)	처방
蟲心痛	- 해충, 기생충으로 인한 것 - 증상: 위완통이 있는데 식후엔 관촌	화충환, 화충산 모응환, 이진탕가고련근 ↳ 요즘은 거의 안씀
疰心痛 疰	이상한 것을 보고 깜짝깜짝 놀라서 생기는 심통	소합향원
風心痛	외부 감염으로 인한 통증	마황계지탕, 분신기음
悸心痛 (七情心痛)	칠정울결로 인한 심통	사칠탕, 가미사칠탕 칠기탕, 정기천향탕
食心痛	- 음식으로 인한 심통 ↳ 밀가루 같은 음식을 먹으면 깔끔하게 배출되지 않고 장내에 축적되는 경우가 많음 ➡ 장에서 가스가 분비되면서 배가 부풀어 올라 횡격막을 누르게 되고, 흉곽 내 폐가 압박을 받아서 심장축이 비틀어지면서 천식 발생 가능 +) 만성적으로, 이로 인해 혈관이 찌그러져 있다 보면 혈관 내강이 좁아지게 되고 혈액이 전신을 순환하는 데에 힘이 많이 필요하고, 그러다 보면 말초저항도 생겨 좌심실비대증 또한 발생 가능	향소산 평위산 향사양위탕
飲心痛 (痰飲)	찌개와 같이 국물을 많이 먹는 사람, 국에 밥 말아 먹는 사람, 밥 먹고 물을 벌컥벌컥 마시는 사람에게 있어서 생길 수 있음	궁하탕 오령산
冷心痛	차가워서 생기는 심통 (혈관 수축으로 인한 통증)	부양조위탕
熱心痛	뜨거워서 생기는 심통	연부육일탕 (황련이 청열조습)
去來痛	간헐적으로 오는 심통	

표 5-1 東醫寶鑑의 九種心痛

九種心痛	특징	처방
蟲心痛	胃脘痛 痛定能食 乍發乍止 心腹痛 上下攻刺 嘔噦涎沫 或吐清水 面色青黃	化蟲丸 化蟲散 妙應丸 二陳湯加苦練根
疰心痛	卒感惡忤尸疰 神昏卒倒 口噤人事不省	蘇合香元 備急丸
風心痛	因傷風冷 或肝邪乘心 兩脇引痛	麻黃桂枝湯 分心氣飲
悸心痛 (七情心痛)	因七情 驚悸 怔忡 以致心痛 心傷者 勞役則頭面赤而下重 心中痛而自煩 發熱 臍上跳 其脉弦	四七湯 加味四七湯 七氣湯(婦人) 正氣天香湯 辰砂五苓散
食心痛	因食生冷或食物過多以致心痛	香蘇散 平胃散 香砂養胃湯
飲心痛(痰飲)	傷水飲 聚痰涎 心痛如刺 水飲流注 胸脇痛	芎夏湯 五苓散 三花神祐丸
冷心痛	寒氣客於背俞之脉則血脉溢 血脉溢則血虛 血虛則痛其俞注於心 故相引而痛 形寒飲冷 當風取涼 或腎邪乘心痛 則心懸若飢 泄利下重	扶陽助胃湯 桂枝四七湯 鷄舌香散 神效散 卻痛散 草豆蔻丸 溫胃湯 抽刀散 二薑丸
熱心痛	積熱攻心 暑毒入心 面目赤黃 身熱 煩躁 掌中熱 大便堅 實熱心痛	連附六一湯 金鈴子散 莎芎散 梔薑飲 甚者大承氣湯 小柴胡湯去人參甘草加枳殼梔子仁赤芍藥各一錢
去來痛	心痛或作或止 久而不愈 心包絡爲風邪冷熱所乘痛 故成疹不死 發作有時 經久不得 心胃久痛	神仙九氣湯 吞下九痛元 莎芎散 妙應丸 丁香脾積元

3. 병인병리

☞ **홍통의 병인병기(01)** : 한사내침, 정지실조, 음식부절만 언급하셨는데 고대 기출에 있어서
답음, 어혈, 기혈음양허손 내용도 정리했습니다.

✓ **홍통은 대부분 추위, 스트레스, 음식물 등의 소인과 관련 有**

- ↳ 병인: 寒邪內侵, 情志失調, 飲食不節, 痰飲, 瘀血, 氣血陰陽虛損 등
- ↳ 병리: 허실 구분 ➡ 주요 병리는 本虛表實

寒邪內侵	- 음한응체증 / 양기허쇠증의 홍통 발생 - 평소 양기가 허하고 홍양이 부족한 사람에게 한사가 허한 틈을 타고 침범하게 되면 기체 및 기혈운행이 원활하지 못하기 때문 ↳ “차가우면 뭉치니까” - cf) 활혈거어지제 중에서도 차가워서 뭉친 것을 처리하는 건 따뜻한 약 그 외) 목단피 단삼: 뜨거워서 생기는 어혈을 풀어주는 약
情志失調	- 스트레스로 인한 - 칠정 중 흠를 제외한 나머지는 기를 떨어뜨리거나 오그라들게 하는 등 홍통 유발 O ↳ 너무 기뻐도 문제가 생길 수 있음 - ex) 귀하게 키운 아들이 금의환향했는데 이걸 보고 너무 기뻐던 어머니가 갑자기 뇌출혈.....
飲食不節	불규칙한 식습관, 과식, 폭식, 生冷한 음식물, 고량후미, 과도한 음주 등은 비위를 손상시켜 운화실조로 음식조체증의 홍통을 유발할 수 있음
痰飲	- 외감육음, 음식, 칠정내상 등으로 비폐신 등의 기능 실조로 수액대사 장애가 발생하여 생긴 병리적 산물 - 체내의 기혈운행을 막고 수액대사에 영향을 미치게 됨 ↳ 흉부에 정체된 경우 담탁옹색증과 담열옹폐증의 홍통 발생
瘀血	- 생리적 기능을 상실한 혈이 모여 생긴 병리적 산물로, 기혈순환이 방해됨 - 기허, 기체, 한사, 열사, 외상 등으로 발생 - 어혈이 흉부에 있게 되는 경우, 심혈어조증의 홍통 발생 가능
氣血陰陽虛損	- 심기부족, 심양부진하여 기혈의 온조작용, 추동작용 발휘 X ↳ 양기허쇠증, 기음양허증의 홍통 발생

5. 유사증후감별

다음 페이지에 치료를 한 번에 정리하고 싶어서 유사 증후 감별, 조리 및 예방 먼저 넣었어요!

위완통	소화가 증상이 있으면 위완통 ex) 위완 답답, 창만감 혹은 구토, 신물이 넘어오고, 음식을 잘 못 먹고, 변비, 설사 등
결흉	- 눌렀을 때 통증 ➡ 按之痛 - cf) 홍통: 누르지 않아도 통증이 있음 - 결흉은 물이 찬 것 ➡ 소함홍탕, 대함홍탕, 감수 대항 망초 등 준하축수약을 많이 씀
홍비(痞)	가슴이 답답한데 통증은 없음 · 痞 한자 확인하기 (痺 X)

6. 조리 및 예방

- ① 정신적 자극 피하기
- ② 기름진 음식 밀가루 음식 피하고 규칙적인 식습관 가지도록 하기
- ③ 금연
- ④ 지나친 음주 X
- ⑤ 규칙적인 생활
- ⑥ 환자의 상태에 따라 도인 기공 체조 산책 달리기 등을 권함
 - ↳ 운동은 꼭 하도록 하기: 승부가 걸린 운동이 아닌, 꾸준히 할 수 있는 순한 운동

4. 치료

☞치법과 증상을 알맞게 고르기(08)

: 강조한 것도 딱히 없고, 모든 내용을 다 읽지도 않으셨는데 기출에 있어서 정리해왔고,
교수님이 언급한 부분은 파란색 글씨로 해렸습니다.

고루고루 기출에 언급된 걸 보니 그냥 외우시는 게 좋을 것 같네요.....

	증상	치법	처방
陰寒凝滯 음한응체	胸痛徹背(홍통철배) 感寒痛甚 胸悶 心悸 氣短 重則端息 不能平臥 面色蒼白 四肢厥冷 舌苔白 脈沈細	辛溫通陽 開痺散寒	과루해백백주탕(따뜻한 약) ↳ 심장질환에선 주로 과루실 用
肝氣鬱結 간기울결	胸部脹痛 痛處不定, 정서변화에 따라 홍통 약화 / 완화 胸悶, 食欲不振, 舌質淡紅, 苔薄白或薄黃, 脈弦	舒肝理氣 行氣止痛	시호소간산, 가미소요산
心血瘀阻 심혈어조	胸部刺痛 痛處固定 入夜更甚 日久不愈 或心悸不寧 舌質紫暗 脈沈澀	活血化瘀 通絡止痛	혈부축어탕 심적탕: 중국에서 만든 아스피린st 약
痰濁壅塞 담탁옹색	胸悶如窒而痛 或痛引肩背 (답답, 통증, 어깨까지 땡기기도 하고...) 氣短 喘促 肢體沈重 痰多 舌苔濁 脈滑	寬胸化痰 豁痰開結	과루해백반하탕
飲食阻滯 음식조체	胸痛 胃脘痛 或 惡心 嘔吐 梅核氣로 咯不出嚥不下(객불출연불하) 腹部膨滿感(팽만감) 舌質淡紅 脈滑 → 음식조체 부분은 위에서 동의보감 9종 심통 중 食心痛과 같은 원인으로 인한 심통이니 그 부분 읽어보기	消食導滯	평위산, 안중산
痰熱壅肺 담열옹폐 ↳ 호흡기 관련 증상들	胸痛 喘咳 咯痰黃稠 혹 咯血 咯痰腥臭 煩悶 發熱 舌紅 苔黃 脈滑數	清熱化痰	시경반하탕

	증상	치법	처방
陽氣虛衰 양기허쇠	胸悶 氣短 甚則胸痛徹背 心悸 汗出 畏寒 肢冷 腰痠乏力 面色蒼白 脣甲淡白或青紫 舌淡白或紫暗 脈沈細或沈微欲絕	益氣溫陽 活血通絡	삼부탕 팔비지향탕
陰血虛損 음혈허손	胸悶 胸痛 頭暈 心悸 心煩不寐 耳鳴 盜汗 腰痠膝軟 舌紅 脈細數或細澀	滋陰益腎 養心安神	좌귀음 육미지향환
氣陰兩虛 기음양허	胸悶隱痛 時作時止 心悸 氣短 倦怠 面色少華 頭暈 目眩 勞則甚 舌紅或有齒痕 脈細弱無力或結代	益氣養陰 活血通絡	고진음자, 심전대보탕 생맥산 (심근수축력을 세게 해줌 → 심장 자체를 뽕뽕하게!)

제6절 경계(驚悸) · 정충(怔忡)

1. 개요

옳은 설명은?(05, 06)

경계와 정충을 구분하여 설명하시오.(08)

驚悸 경계	怔忡 정충
가슴이 세차게 뛰고 잘 놀라며 마음이 불안한 것을 환자가 자각하고 스스로 자제할 수 없는 증후로서, 대개 맥이 불규칙하거나 빠른 등의 타각소견을 나타내는 경우 多	
- 정신적 자극이나 과로로 인하여 간헐적으로 가슴 두근거림이 발생 - 증상이 가볍고 발작하지 않을 때는 정상인과 같음	- 특별한 이유 없이 가슴이 두근거리고 불안 - 피로할 때 더욱 심해짐 - 전체적으로 몸 상태가 좋지 못한 것 - 비교적 중한 상태 - 驚悸가 심해지면 怔忡으로 발전 可
✓ 驚: 심이 갑자기 놀라서 안정되지 않는 것 ✓ 悸: 가슴이 두근거리고 무서워 놀라는 것	

2. 역대제가설

: 수업시간에 진짜 대충대충 넘어가셨는데, 기출에도 있어서 봐줘야 할 것 같습니다.
(교수님께서 언급하고 넘어가신 부분은 파란색으로 표시)

내경	- 경계, 정충의 병명이 직접 나타나지는 않지만, 임상적 증후나 맥상에 대한 설명 거론 <素問 平人氣象論> 胃之大絡 名曰虛里 ... : 임상 증상 중 虛里의 조동을 외부로 의복에까지 느끼게 되는 것 <素問 痺論> 心痺者 脈不通 煩則心下鼓 ↳ 心下鼓: 경계/정충의 자각 증상 <靈樞 經脈> 心中憺憺大動 : 心中 심포락의 병이 심해져 “憺憺大動”한 증상 ↳ 憺憺: 물이 출렁이는 모습 / 심장이 같이 동동거리는 느낌을 표현한 듯 (노래를 엄청 크게 들으면 심장 동동거리는 것처럼) <素問 平人氣象論> 乍疏乍數曰死 : 갑자기 빨리 혹은 늦게 뛰면 죽을 수 있다. <靈樞 根結> 持其脈口 數其至也 .. 不滿十動一代者 五臟無氣 .. 予之短期者 乍數乍疏也 : 맥구를 잡아 그 수를 세어 열 번 뛰기 전에 한번 건너된다면 죽을 수 있다. 얼마 남지 않은 사람은 맥이 갑자기 빨라지거나 느려질 수 있다. (부정맥 증상들)
금궤요략 (장중경) 漢代	- 驚悸라는 단어를 처음 사용함 → “시험에 내기 아주 좋겠조 ~” - 寸口脈動而弱 動即爲驚 弱即爲悸: 맥진을 통한 진단 - 心下悸: 반하마황환 처방 기록 (기침에 多用)
상한론 (장중경) 漢代	자감초탕: 심계 치료하는 처방으로 기록 (지금도 부정맥 환자들에게 用)
천금요방 (손사막) 唐代	心悸의 원인: 虛 ↳ 定心湯을 처방으로 기록

제생방 (임용화) 宋代	· 경계, 정충의 병인 병기, 병정 변화, 치법, 방약 등을 분별하여 비교적 상세히 기술
	1) 경계 (1) 원인: 心膽虛怯 (2) 다양한 발병동기와 동반 증상에 대해 언급 ↳ 大驚: 깜짝 놀람 聞虛響(문허향): 이상한 소리를 들음 / 見異常: 이상한 것을 봄 登高陟險(등고척험): 체력을 고려하지 않고 높고 험준한 곳을 오름 (3) 치료: 寧其心以壯膽氣 → 온담탕, 원지환 * 壯膽氣: 담기가 제 역할을 잘하게 한다 * 온담탕: 간담을 따뜻하게 해주는 약 (간담이 서늘한 것은 생리/병리 중 병리인 것처럼 간담은 따뜻해야 하나봐 ..) 2) 정충 (1) 원인: 심혈 부족, 外邪感受, 飲邪停聚 (2) 치료: 證에 따른 치료법을 제기하여 후대 의가들의 논술이 풍부해지고, 상호 연계하게 발전하게 됨 📖원인은 심담허겁, 치법은 寧其心以壯膽氣, 처방은 온담탕, 원지환을 사용하는 의가는? (05, 06)
	소문현기 원병식 (유완소) 金代
	· 心胸躁動: 정충의 임상 표현
	상한명리론 (성무기) 金代
단계심법 (주단계) 元代	· “悸者 心忪是也 筑筑惕惕”이라고 언급 ↳ 筑: 악기 이름 / 惕: 두려워하다, 놀라다 (심장이 놀라는 것) · 심계 발생 원인으로 기허, 停飲 제안 (停飲: 놀라서 대사를 제대로 못 하는 것)
	· 경계, 정충 모두 血虛가 원인이라고 인식하였으며 痰으로 발병됨을 강조 📖 혈허가 원인이며 담으로 발병함을 강조한 의가는?
	의학정전 (우박) 明代
의학입문 (이천) 明代	· 정충은 경계가 오래되어 발생
	증치준승 (왕궁당) 明代
경약전서 (장경약) 明代	· 정충을 陰虛勞損의 원인으로 인식 ① 증상별 구분: 위에 있으면 → 浮撼于胸億 아래에 있으면 → 振動于臍傍傍 ② 치료 및 조리: 宜節慾節勞 切戒酒色(절계주색) 養氣養精 滋培根本
	의림개착 (왕청임) 清代
혈증론 (당종해) 清代	· 心跳心忙 用歸脾安神等方不效 用此方(血府逐瘀湯) 百發百中 → 清代에는 어혈에 대한 개념이 도입되었음을 알 수 있음 (心忙: 건망증)
	· 정충이 사려과도, 실혈과다로 인한 허증뿐만 아니라 담음과 어혈을 겸하는 경우도 있으므로 진단에 유의할 것을 설명
동의보감	병이 心經과 膽經에 有, 맥이 크게 뛸 때 → 주사안신환, 진심단, 가미온담탕 血虛와 膽으로도 생김 → 기혈이 虛할 경우 양심탕 用 치료로 피를 보하고 정신 안정시킬 때 → 정신단, 영지원, 양혈안신탕, 주사고 기울로 인한 驚悸일 때 → 교감단, 가미사칠탕 用 명치 밑에 수기가 있으면 怔忡이 생김 → 오령산 用 +) 怔忡에 익영탕, 복령음자, 안신보심탕, 강출탕, 주작환, 사물안신탕, 진사영지환, 가미영신환, 천왕보심단 등 다양한 처방 제시
	잘 놀라고 무서워할 때 → 연곡, 내관, 음릉천, 협계, 행간 등에 자침 가슴이 두근거리고 몹시 뛸 때 → 대릉, 삼리에 자침 ✓ 행동요법도 제시: 常法治驚이라고 하여 일상적인 방법으로 驚을 치료한다고 함 📖 동의보감은 몇 편으로 구성? 동의보감의 저자를 한문으로 쓰시오, 동의보감 구성 5편을 한문으로 쓰시오, 동의보감을 한문으로 쓰시오

2024 심계내과학(신선호) [3주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표한 처방] 귀비탕, 경옥고, 청상보화환, 금수육군전, 비화음

귀비탕

- ✓ 수험생/부인과 환자들 -> 스트레스받아서 잠을 못 자는 사람들에게 用
: 이 경우엔 치자 황련을 가미해서 쓰기도 함
- ✓ 봉루, 대하, 녹혈에도 사용
 - * 특 컷는데 멍이 잘 드는 경우: 간장혈이 안 돼서
 - * 코피가 자주나는 경우: 비통혈이 안 돼서

경옥고

- ✓ 만성 기침 (코로나 후유증) 환자에게 좋음
cf) 폐주 피모 - 호흡기 질환
- ✓ 한의원에서 만들기는 힘드니, 기왕이면 검증된 회사의 경옥고를 쓰는 게 좋음

청상보화환

- ✓ 감기 걸린 후 계속 기침할 때, COPD, 진폐증 환자에 good
 - * 교수님의 치료설: 폐결핵이 너무 심해 토혈을 계속 하고, 시한부선고를 받은 환자
➔ 청상보화탕 + 백급(렴폐지혈) 처방으로 토혈은 많이 줄어들게 함
- ✓ 육미 + 보음지제 구성이니 소화기가 안 좋은 사람에겐 주의할 것
- ✓ 기침의 원인이 심장질환(심부전)인제, 호흡기 때문인지를 구분해서 쓰기
- ✓ 탕으로 써도 되고, 환으로 써도 됨

금수육군전

- ✓ 기침을 심하게 하는데, 연세 드신 분이 아침에 가래를 콕 뱉으시고 이럴 때 用
➔ 교수님: 좀 더 만성 기침엔 청상보화탕 쓰심
- ✓ 경약전서에 나온 처방임
 - ↳ 굉장히 효율적인 처방! (간단하면서도,,)

비화음

- ✓ 사군자탕이 기본방
 - ↳ 과거엔 못 먹고 살았기 때문에 진창미를 180ml 양을 넣어서 (소주 반병 양) 만들었음 (거의 쌀죽에다가 한약 탄 것)
 - ➔ 요즘엔 애들이 밥 안 먹고(부모님이 밥그릇을 들고 다니면서 한 입만 더 먹자 ~~하는 친구들..) 그럴 때 우리 애기 밥 좀 먹게 해주세요,, 키 크게 해주세요 ,, 라고 할 때 쓰는 처방

제6절 경계(驚悸) · 정충(怔忡)

3. 병인병리

- ➔ 기질적 장애도 많지만 기능적으로 원래 약하게 태어난 사람들도 있음
 ✓ 변증을 볼 때 “경계, 정충”이 주증인지 겸증인지를 보기
 ex) 비신양허에서는 소화기, 비뇨기계 관련 증상이 주증상이고 경계정충은 겸증임

七情傷 칠정상	✓ 스트레스, 공포감, 열받음 등으로 생긴 경계/정충 ① 평소 심담허겁한 사람이 갑자기 驚恐을 만남 → 心神을 거스름 → 심신이 동요 → 스스로 자제 불가능 → 심담허겁 → 心悸 ② 장기간 憂思가 해결되지 않음 → 심기가 울결됨 → 음혈이 소모 → 심을 영양할 수 없음 → 心悸 ③ 화가 변하여 담이 생김 → 담화가 심을 동요 → 심신이 不寧 → 心悸
心血虛損 심혈허손	✓ 체육샘이 햇볕 쬔 운동장에서 몇 시간씩 수업하면서 땀을 너무 많이 흘려 가슴이 두근두근하다는 것도 심혈허손에 해당할 수 있음 (이때 교수님 처방: 사물안신탕 + 옹골모려) [심혈허손을 유발하는 요소] ① 稟賦부족, 장부허손 ② 병후에 조리를 잘못함 ③ 사려과도로 心脾를 손상 ④ 일이 뜻대로 되지 않아 진혈 허손 ⑤ 비위허쇠로 기혈의 생화 부족 ⑥ 실혈 과다 등 → 위 원인들이 심혈허손을 유발하면 ⇨ 血의 心에 대한 영양작용 실조 ⇨ 기음양허증, 심비양허증의 경계, 정충 발생

心氣不足 심기부족	· 氣陰兩虛, 脾腎陽虛로 인해 心陽不振, 心氣不足 기 음 양 허 비 신 양 허 심 양 부 진 심 기 부 족 ⇨ 心脾兩虛證, 심담허겁증의 경계, 정충 발생 可
肝腎陰虛 간신음허	① 肝血虧損 → 心血虛損 → 心氣不足 → 氣陰兩虛證의 경계/정충 간 혈 휴 손 심 혈 허 손 심 기 부 족 기 음 양 허 증 ② 肝陽上亢 → 肝火熾盛 → 위로 心神을 擾亂 ㄱ 간 양 상 항 간 화 치 성 요 란 ㄱ 간신음허증의 경계 ㄱ 정충 발생 可 肝腎不足 → 腎水虧損 ㄱ 간 신 부 족 신 수 휴 손
痰飲內停 담음내정	✓ 담음 치료할 때는 담음을 없애줄 뿐 아니라 담음을 만들만한 신체적 컨디션까지도 해결해주어야 함 ex) 담음 치료에 육군자탕: 이진탕(으로 담을 없애고) + 사군자탕(으로 보해줌) ① 脾腎陽虛에서 腎陽不足하여 膀胱氣化가 안 되고 ㄱ 비 신 양 허 신 양 부 족 방 광 기 화 ㄱ 담탁조체증의 ㄱ 경계정충발생 可 ② 脾의 運輸기능이 원할 X → 痰飲內停 ㄱ 운 수 담 음 내 정
血脈瘀阻 혈맥어조	✓ 어혈도 마찬가지로, 어혈을 없애고 어혈을 만들만한 신체적 컨디션도 해결해주어야 함 ① 心氣 不足, 心陽이 不振 → 혈맥을 운행시키지 못함 ㄱ ㄱ혈맥어조증의 ㄱ경계정충발생 可 ② 寒邪의 침습으로 혈맥의 운행이 凝滯되어 不暢 ㄱ 응 체 불 창

4. 치료

오른쪽에 있는 표 부분은 약마를 보시면 아시겠지만, 꽤 자주 교수님께서 출제하시는 부분이라 꼭 봐두어야 할 것 같습니다. 기출에 언급된 부분을 초록색 형광펜으로 표시해두었으니, 그것 먼저 외우시고, 파란색 글씨는 이번에 교수님께서 언급하신 부분이라 그것도 외우시면 될 것 같습니다.

- ✓ 경계/정충의 병인은 주로 心에 있으므로 약물도 補心安神之劑를 사용해야 함
but, 다른 장부의 허손과 기능실조와도 관계가 있으니 발병 원인이 다른 장부에 있다면 그 장부를 먼저 치료해서 근본적인 원인을 제거해야 함

[경계 / 정충 비교]

驚悸 경계	怔忡 정충
- 경계, 정충의 특징: 虛實을 겸함 ① 허: 오장의 기혈이나 음양의 허손을 의미 ② 실: 痰飲, 血瘀, 火邪의 협잡을 의미 ⇒ 痰飲, 瘀血, 火邪가 병리적 산물 혹은 병리현상이나 일정한 상황에서 水停心下 혹은 痰火擾心 혹은 瘀血阻於心脈(어혈이 심맥에 조체됨) 등이 모두 경계, 정충을 일으키는 직접적인 요인이 될 수 있음 => 변증할 때 정기의 허함과 사기의 실한 것을 모두 고려하여 허실의 정도를 정확히 구분해야 함	- 重症 (경계가 발전해서 오는 경우도 有) - 놀래는 일이 없어도 스스로 가슴이 뛰고 자주 두려움을 느끼고 불안해함 - 피로 시에는 더욱 심하며 대부분 장부 기혈 음양허손의 모습을 보이며 때로는 담음 어혈이 혼합되어 있음

[경계/정충 침치료]

- 膻中, 少府, 然谷, 內關, 陰陵泉, 俠谿, 行間, 太陵, 三里, 合谷, 太衝에 자침
단 중 소부 연곡 내관 음릉천 협계 행간 대릉 삼리 합곡 태충
- ✓ 약을 처방할 때처럼 침 치료도 변증했을 때 비신의 문제로 인한 증상이라고 하면, 비신 문제를 해결해주는 혈위 또한 선택해야 함
(당장 직면한 문제-증상을 치료하면서도 근본 또한 치료)

	증상	치법	처방
氣陰兩虛 기음양허	心悸 氣短 頭暈 乏力 自汗 動則悸發 靜則悸緩 易驚 心煩 失眠 口乾 微熱 五心煩熱 盜汗 舌質淡紅 苔薄白或 舌紅少津 脈細弱或細數	補益心氣 滋養陰血 寧心安神	五味子湯 生脈散 炙甘草湯 (부정맥에도 사용) 朱砂安神丸(잘 안씀) cf) 딸꾹질: 정향시체탕+백지
心脾兩虛 심비양허	心悸 氣短 頭暈 目眩 面色不華 神疲乏力 納呆 腹脹 舌質淡 脈細弱	健脾養心 補益氣血	歸脾湯 補血安神湯 四物安神湯 (교수님 多用)
心膽虛怯 심담허겁	心悸 善驚 易恐(겁이 많다) 坐臥不安 如人將捕 觸事易驚 多夢易醒 食少納呆 惡聞聲響 舌象正常 脈細數 或弦細	益氣養心 鎮驚安神	溫膽湯 桂枝加龍骨牡蠣湯 (밤에 잠 못 자고 두근거릴 때 굳)
肝腎陰虛 간신음허	心悸 失眠 五心煩熱 顫紅 眩暈 耳鳴 急躁易怒 腰痛 遺精 舌紅少津 脈細數	滋養肝腎 養心安神	六味地黃丸 知柏地黃湯 ⇒ 가슴 두근거림이 주증이 아니니까 육미, 지백지황탕
脾腎陽虛 비신양허	心悸 倦怠 少氣 懶言 腹脹 納呆 腰痛 畏寒肢冷 小便不利 或 下肢浮腫 頭暈 目眩 嘔吐痰涎 舌苔白膩 脈沈細	溫補脾腎 利水寧心	八味地黃湯 理中湯合真武湯
痰濁阻滯 담탁조체	心悸 氣短 心胸痞悶脹痛 痰多 食少腹脹 惡心嘔吐 舌苔白 脈滑	理氣化痰 寧心安神	導痰湯 五散苓 苓桂朮甘湯 瓜蒌薤白半夏湯
血脈瘀阻 혈맥어조	心悸 怔忡 短氣喘息 胸悶不舒 心痛時作 或 刑寒肢冷 舌質暗或有瘀占瘀斑 脈澀或結代	活血化痰	血府逐瘀湯 丹參飲 桃紅四物湯 桂枝茯苓丸(실증) 當歸芍藥散(허증) *계지: 위로 확 치밀어 오르는 두통, 현훈, 여드름 등에 多用

5. 유사증후감별 - 心痛, 奔豚/臍動悸, 心澹澹大動證

心痛	이건 통증!	
奔豚 분돈	심양허하여 소복과 심하부를 위아래로 오르내리는 증상 (치받고 올라오는 것)	cf) 경계/정충: <u>심중</u> 에서 발작 ⇒ <u>경계/정충과 분돈, 제동계는</u> <u>그 위치가 다름!</u>
臍動悸 제동계	소복에서 심하까지 위아래로 오르내리는 증상	
心澹澹 大動證	(1) 정의: 담담은 水波가 요동함과 같이 크게 움직이는 것으로 경계/정충보다 심한 상태 (2) 원인/처방: 痰飲飲水 / 공하탕 물 많이 먹고 수음으로 인해서 생긴 기혈순환방해로 볼 수 있음	

6. 조리 및 예방

- ① 즐거운 마음 유지
- ② 과식을 피하고 규칙적인 생활
- ③ 경증 환자는 적당히 운동을 하고 피로를 느끼지 않는 정도로

ex) 가벼운 걷기, 산책 추천할 것

“나는 허리아프고 무릎아파서 못걸어~~~~” 이라고 하시는 환자분이 계신다면

“그럼 박수치기합시다!!(공연보고 나서 하는 박수 X, 팔을 넓게 넓게 휘저으면서 박수 O)”라고 추천하기

7. 예후

일시적인 흥분 스트레스 심리적 원인일 경우 쉽게 호전되며 양호한 편

→ 두근거림과 함께 호흡곤란이나 흉통 호소 시 심장 문제일 수도

8. 두근거림 관련 질환 및 임상 연구 긴 내용이지만 교수님께서 언급한 부분만 정리했습니다.

1) 정의: 가슴이 두근거리고 심장의 박동을 느끼는 경우

2) 두근거림이 발생할 수 있는 질환

- (1) 부정맥과 관련: 동성빈맥, 심실빈맥, 심방세동 발작성상심실성 빈맥이 원인이 되어 나타날 수 있음
- (2) 심장병으로 인한 경우: 심장 판막 질환, 심부전, 협심증 등으로 나타나는 경우 有
⇒ 심한 경우 돌연사의 원인이 될 수 있기에 두근거림과 흉통을 같이 호소한다면 주의깊게 관찰해야 함
- (3) 정신적 자극이나 질환에 의한 경우: 스트레스, 우울증, 불안장애, 공황장애 등
- (4) 그 외: 갑상샘기능항진증, 갈색세포종, 저혈당증, 갱년기 장애, 약물중독, 편두통 등

3) 부정맥 치료

- (1) 실증일 때: 시호가용골모려탕
- (2) 중간증: 사역산, 향소산, 황련해독탕 등
- (3) 허증: 시호계지건강탕, 계지가용골모려탕, 반하후박탕, 자감초탕, 억간산, 영계감초탕, 영계출감탕, 조등산, 당귀작약산 등

4) 부정맥 변증/처방

- (1) 심허담겁(안신정지환가감) => 온담탕
- (2) 음허화왕(천왕보심단가감) => 사물안심탕
- (3) 기허로 인할 때 => 보중익기탕, 생맥산, 오미자탕 등

5) 그 외 추가 질환에 대한 연구

- 자감초탕, 청심연자탕, 소풍보심도담탕합생맥산, 시호계지건강탕, 양격산화탕 등을 투여한 연구 有 (뇌경색 이후에 발생한 심방세동 또는 심방조동에 대한 치료가 대부분)
⇒ 자감초탕: 심전도상의 유의한 변화와 환자의 증상이 호전됨을 보임

2024 심계내과학(신선호) [4주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
 그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
 (자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 첨부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표한 처방] 오적산, 소속명탕, 소풍탕, 이기거풍산, 난간산

오적산

- ✓ 각종 뭉친 것을 치료하는 약
 - 똥똥하면서 얼죽아인 사람들이 허리가 아프고 이럴 때 효과 좋음
- ✓ 오적산은 風약이 많으니까 오래 쓰면 음허증상을 유발할 수 있어서 주의가 필요함
 - 연세드신 분들은 본허표실하기 때문에 표실한 증상을 해결한 다음에는 이 약을 오래 쓰면 안 됨
 - ex) 뇌출혈 시, 뇌가 출혈이 되면서 부어 다른 부분의 뇌를 누르게 되는데 (뇌부종) 이를 예방하기 위해 양방도 이뇨제를 쓰고, 한방에서도 이기거풍행기시키지만 너무 과도하게 사용하면 뇌가 위축되어 치매를 유발하기도 함 (이때 부종을 빼면서도 보음지제를 사용해야 함)

소풍탕

- ✓ 이진탕 가미방에 거풍습, 사물탕지제 등등이 포함된 처방
 - 허실이 모두 있을 때 사용
 - cf) 교수님은 소풍탕을 중풍보다는 감기약에 쓰는 편

소속명탕

- ✓ 風은 入也라...
 - ➡ 風은 각종 감염성 질환, 각종 퇴행성 신경계 질환을 의미함
- ✓ 뇌혈관질환
 - : 옛날에는 뇌출혈이 많았으나 요즘은 수명도 연장되었고 고혈압이 있는 사람들은 그 전에 혈압관리를 잘하기 때문에 뇌경색 발병률이 더 높음

이기거풍산

- ✓ 구안와사
 - └ 말초성 -> 이기거풍산이 사용되는 때임
 - └ 중추성
- ⇒ 풍이 감염성 질환을 의미할 때: 특정 균에 감염되었을 때 (극심한 다이어트 등으로 인한 면역력 약화) 이 균이 신경절에 앉아 병을 일으킴
 - => 처음에 거담시키고 (거담한다는 게 염증을 없애는 것 아닐까라는 교수님의 의견..)
 - + 다시는 담이 생기지 않도록 몸 상태를 만들어줌
- cf) 견정산: 백부자가 들어있는 만큼, 통증이 있으면서 寒으로 인해 통증이 너무 심할 때 좀 더 효과적인 처방

난간산

- ✓ 잠자기 바로 직전까지 모니터보고, 그래서 눈이 뻑뻑할 때 쓰는 게 구기자
 - => 난간전!
- cf) 유행성 결막염 -> 홍종열통 증상 발현
 - ⇒ 눈을 지나는 경락에는 방광경, 위경, 간경이 있는데 이를 치료할 때는 원위취혈로는 족태양방광경(태양한수)의 혈위를 선택해 찬물을 끼얹어 불을 끄는 형식을 취하고, 족양명위경(양명조금)의 혈위를 선택해 모래를 뿌려 불을 끄는 방식을 취하기도 함

제7절 부종(浮腫)

1. 개요

- ✓ 부종은 외사, 노곤, 내상, 음식실조 등 다양한 원인으로 발생할 수 있음
→ 기혈순환이 원활하지 못하여 기질적 질환 없이 발생하는 경우도 있지만
심부전, 간경변, 갑상샘기능저하증, 림프 부종, 쿠싱증후군 등 다양한 질환으로 발생 가능

- ✓ 특히 심장성으로 인한 부종은 **우심부전에서 현저하게 나타남**
→ 전신 정맥의 울혈로 인해 여러 장기 및 피하 조직 등에 부종이 발생하며 **특히 하지부에 부종이 잘 나타남**

★ 심부전으로 인한 부종 / 천증 ★ => 교수님께서 따로 언급하신 것으로, 잘 알아두세요!

1) 부종 = 우심부전으로 인한

: 우심방이 제 역할을 못하여 체순환된 혈액이 우심방으로 들어오지 못하고 계속 저류가 생겨 부종이 생김 (하지부종)

2) 천증 = 좌심부전으로 인한

: 좌심방에 문제가 생겨 폐순환된 혈액이 좌심방으로 들어오지 못하면 폐울혈이 되면서 폐가 본인 역할을 하지 못해 기침을 함 (천증이 생김)

cf) 심방과 심실의 차이는? 교수님 피설.....

- 실: 거실, 실내, 실외라고 하듯이 실은 바깥과 연결되어있는 느낌
- 방: 안방, 건넌방이라고 하듯이 좀 깊숙이 들어가 있는 느낌
- ↳ 방에서 실: 내부에서 움직이는 것, 실에서는 바깥으로 나가는 것..?

2. 역대제가설

자세한 설명은 없으셨지만,, 기출에 있길래 정리했습니다.

내경

- 병인: 勞汗當風, 邪客玄府 飲食失調 氣道不通 등을 제시
- 병기: 폐, 비, 간, 신, 삼초 등과 관련이 있으며 그중 腎이 本
- 치법: 經重緩急에 따라 發汗, 利尿, 逐水를 제시

漢代 張仲景
(張仲景)

- 부종을 心水를 비롯한 五臟水로 분류하였음
→ 특히 부종 치료에서 發汗 利水의 원칙을 제시함

<金匱要略>

隋代 巢元方
(巢元方)

- 부종을 10水候와 24水候로 상세하게 분류
- 원인을 脾腎虛弱으로 인식 but 발병엔 단지 脾胃虛弱을 중요시

<諸病源候論>

元代 朱丹溪
(朱丹溪)

- 기존의 분류 방법 외에 陰水와 陽水로 분류하는 새로운 방법 제시
- ① 양수: 若遍身腫 煩渴 小便赤澀 大便閉 此屬陽水
- ② 음수: 若遍身腫 不煩渴 大便 小便少不澀赤 此屬陰水

<丹溪心法>

宋代 陳言
(陳言)

- “以短氣 不得臥 爲心水”
- : 고방의 10가지 증후뿐 아니라 五臟六腑의 水腫證과 治療를 상세히 분류함

<三因方>

- * 不得臥: 좌심부전으로 인한 천증 증상으로 추정

明代 張景岳
(張景岳)

- 내경의 수증 치료법을 발전시켜 補益脾腎의 중요성을 강조
(보익이 수증을 치료하는 正法이라고 함)

清代 李用粹
(李用粹)

- 調中健脾하면 脾氣가 승강운동되어 수습이 自除됨
- ↳ 부종치료의 大法이 調中健脾임을 주장함
- 分治六法 제시: 治分陰陽 治分汗參 濕熱宜清 寒濕宜溫 陰虛宜補 邪實宜攻

동의보감

- 습으로 붓는 것은 모두 脾土에 속함
- 부종이 나타날 수 있는 다양한 원인을 자세히 기술
: 오랫동안 숨이 차고, 학질, 이질 등을 알아 수척해짐 등
- 形證: 다리가 붓고, 배가 몹시 불러옴, 위로는 숨이 차 눕지 못함
↳ 심부전으로 인한 부종과 호흡곤란의 특징 묘사
- ↳ 기출/악마: 동의보감에 나타난 부종의 형증은?
- 눈 아래 부종이 생기는 것이 부종의 징조이고, 경맥이 움직이고, 호흡곤란하고 기침하는 것은 수병이라고 함
- 부종을 분류하는 법 제시 - 五臟水, 陽水, 陰水 등
- 부종의 치료법: 補中, 行濕, 利小便
↳ 처방) 보중치습탕, 가감위령탕, 사령오피탕, 집향탕, 실비음, 침향호박환, 삼인환, 초시원, 해금사환
↳ 침구) 사지와 얼굴이 붓는 경우 수분혈, 기해혈에 뜸치료

3. 병인병리

기출/악마: 부종의 병인병리는? (05), 부종의 병인병리를 간단히 쓰시오. (05)

↳ 내상과 외감 등 다양한 원인으로 부종이 발생하지만 주로 脾, 肺, 腎과 三焦의 기능부전으로 발생

風寒濕邪 풍한습사	[풍한습사에 상하게 되어] · 肺氣의 기능 실조 (通調水道, 下輸膀胱의 기능을 할 수 X) ↳ 肌膚로 流溢하여 부종이 되거나 臟氣가 손상되어 기화 작용이 원활하지 못해 부종이 발생하게 됨 · 습사에 노출되어 수습이 경락으로 유주하게 되면 脾虛濕勝하여 不能制水하거나 腎에서 關閉不利하여 水氣가 肌膚로 범람하여 부종이 발생하게 됨 ex) 습사 노출: 작업환경이 습하거나 비를 맞거나 땀 흘린 옷을 자주 갈아입지 못하는 등
飮食傷 음식상	· 오랜 기간 고량후미 섭취, 기아, 飮冷太過 등 ↳ 脾失健運하여 습열이 內鬱하고 진액이 不化하여 水氣가 留聚하여 발생
脾腎虛弱 비신허약	· 勞傷, 기아, 노역태과, 영양불량 등으로 脾胃元氣가 손상되어 土不制水 · 방로 과다 등으로 眞元 손상으로 인한 명문화 쇠약: 陰寒 억제 불능 → 水邪가 泛溢하여 부종이 발생
七情傷 칠정상	· 칠정상, 스트레스로 인해 氣機不利, 氣鬱 -> 진액 불화하여 부종 발생

4. 치료

기출/악마: O, X 문항 (05)

✓ 부종의 원인이 외감인지, 내상인지 구분을 잘해야 함

- 외감과 내상은 서로 영향을 주고받음

(외감: 오한, 발열, 두통, 신통, 맥부 등 표증 동반 / 내상: 內臟이 虧虛하여 精氣가 부족하거나 반복적으로 외감에 감촉되어 精氣가 손상되어 발생)

✓ 부종은 항상 痰飲 心悸 哮喘 鼓脹 癰閉 등의 병증과 동반하여 나타남

	증상	치법	처방
<陽水부종>에 가까울 때			
風水泛濫	眼瞼浮腫 四肢全身皆腫 多有惡寒 發熱 肢節酸楚 小便不利	散風清熱 宣肺行水	越脾加朮湯 防己黃芪湯
- 부종이지만 장기 쪽에 치명적인 이상이 있는 것은 아니고 감기에 걸렸는데 대사가 잘 안 되어 붓는 정도일 때를 의미함			
水濕氣滯	全身浮腫 按之陷沒 身體困重 心胸痞悶 納呆 小便短少 苔白膩 脈沈緩	健脾化濕 行氣利水	五皮飲 五皮散 五苓散 分心氣飲
- 오피산, 오피음: 약력이 강하지 않아 완만하게 쓸 수 있는 利水지제			
濕毒侵淫	眼瞼浮腫 全身浮腫 小便不利 瘡瘍 甚者潰爛 惡風發熱 舌質紅 苔薄黃 脈浮數或滑數	宣肺解毒 利濕消腫	赤小豆湯 麻黃蓮翹赤小豆湯
- 습독이라는 명칭 자체가 좀 더 센 증상일 때 붙는 것 - 이 습독침음은 간독성으로 습열황달에 가까운 경우를 의미함			
濕熱壅盛	遍體浮腫 短氣 喘症 胸脘痞悶 煩熱口渴 小便短赤 或大便乾結 苔黃膩 脈沈數或濡數	分利濕熱	胃苓湯 猪苓湯 疏鑿飲子 大橘皮湯 己椒藶黃丸 葶藶大棗瀉肺湯
- 심부전이랑 비슷함			
<陰水부종>에 가까울 때 (장기가 제 역할을 하지 못함) / 허증에 해당함			
脾陽虛證	身腫 腰以下尤甚 按之凹陷 腹滿 脹悶 面色萎黃 神疲肢冷 身重 食少 小便短少 便溏 舌質淡白 苔白膩 脈沈緩或沈弱	溫運脾陽 調理水濕	實脾飲 補中治濕湯
腎氣虛證	面身浮腫 腰以下尤甚 按之凹陷不起 心悸 氣促 腰部冷痛酸重 四肢厥冷 惡寒 身疲 舌質淡白 舌體胖 苔白 脈沈細或沈遲無力	溫腎助陽 化氣行水	眞武湯 黑錫丹 濟生腎氣丸

5. 유사증후감별

結陽證 결양증	· 사지가 붓는 것을 의미함 ↳ 평소에 氣病이 있는데 습열이 겹치게 되어 팔다리에 부종이 생기게 됨 · 팔다리가 붓는 경우를 오직 風으로 보는 경우가 있지만, 결양증에선 서각탕 用 ➡ 교수님 曰 : 갑상선 기능 문제로 볼 수도 있다고 생각함 ① 갑상선 기능 저하증: 허증으로 왔을 땐 보하는 약들을 좀 써주고 ② 갑상선 기능 항진증: 陽亢이니까 補陰 or 陽亢을 꺾든지 → 양약 단독 사용보다는 한약을 같이 사용해주는 게 좋음 (완치는 아니지만 삶의 질 상승으로 굳)
氣分證 기분증	· 氣가 飲에 막혀서 가슴이 그득하고 답답하며 腹鳴, 骨痛, 冷痺가 있는 경우 ↳ 桂朮湯 사용
血分證 혈분증	· 경맥이 잘 순환하지 못하여 팔다리가 벌겋게 붓는 것 ↳ 桂枝湯 사용

6. 조리 및 예방

대충 이야기하셨지만 기출 有

기출/약마부종의 조리 및 예방에 대해 쓰시오. (05, 06)

- 한온을 조절하고, 한습한 환경을 피하기
- 칠정상은 기울을 발생시켜 기혈순환을 방해하므로 마음을 편하게 할 것
- 과도한 방로, 과로는 기혈순환을 막으므로 조심하기
- 과식, 짠 음식, 기름진 음식, 찬 음식 피하기
- 음주 흡연 X
- 꽉끼는 옷, 신발 피한다. 손이나 다리가 부으면 높게 들어 부종빼기

+ 잘 자기!!

7. 예후

기출/약마: O, X 문항 (05)

- ✓ 부종의 원인은 특발성 부종이나 알레르기 부종의 경우 예후가 양호한 편이나
울혈성 심부전이나 만성 신부전으로 인한 부종의 경우 증상 회복이 어려움
- ✓ 한의학에서 虛腫은
 - ↳ 먼저 心腹에 발병한 후에 四肢에 미치는 것: 치료하기 쉬움
 - ↳ 먼저 四肢에서 발병한 후 心腹에 흠어지는 것: 치료하기 어려움

8. 부종을 일으키는 질환과 임상 연구

기출/약마심장성/산성 부종 비교 (05)

심장성/신성/내분비성 부종 알맞은 설명끼리 연결하기 (06)

	특징	호발 부위
특발성	원인 불명으로, 여성에게 많고 부종의 변동이 심하다. 심장, 신장, 간장, 영양성 부종, 내분비성 부종 등 다양한 질환으로 발생	
심장성	울혈성 심부전으로 인한 정맥압 항진 심장비대, 호흡곤란 등 동반	하지부에서 호발하는 전신성 부종
신성	급성 신염, 신증후군 만성 신부전으로 인한, 혈압 상승	안검이나 안면에서 호발하는 전신성 부종
간성	간경변으로 인한, 지주상혈관종, 수장홍반, 간비대, 황달 등 동반	복부나 하지 부위에 발생
영양성	저단백혈증: 영양부족이나 실조로 나타나는 경우 多	하퇴나 전신에 주로 나타남
내분비성	갑상샘 기능 저하 or 쿠싱 증후군 등	전신에 잘 발생
알러지성	알레르기인 혈관성 부종 ↳ 경과: 수분에서 수 시간으로 짧음	안면 사지 음부 구강 기도 등에 호발
림프성	원발성 림프관 폐쇄되어 나타나는 경우 多	주로 일측성

+) 이 부분에서 교수님께서 언급한 부분

- 심장질환에서 볼 수 있는 부종은 불완전한 심실구혈 또는 부적절한 심실 이완의 심기능의 장애로 울혈성 심부전이 악화되면서 호흡곤란, 폐 기저부 수포음, 정맥의 종창과 간비대와 같은 증상이 함께 나타나는데 주로 하지에서 더 심하고 저녁에 더 심해지는 경향이 있으며 체위에 따라 결정되기도 함

· 만성 심부전의 변증과 처방

- 심폐기허: 양심탕 + 보폐탕가감
- 기음휴허: 생맥산가감
- 심신양허: 계지감초용골모려탕 + 금궤신기환가감
- 양허수핍: 진무탕가감

Kampo 의학) 이뇨가 충분히 이루어지지 않은 심부전의 中間證에 오령산 用

제9절 천증(喘證)

✓ 전체적으로 앞선 부증과 마찬가지로 천증은 신계내과학에서 자세히 배울 거라고 하시며
속속 지나가셨지만 일단 기출에 있는 것 위주로 보시면 될 것 같습니다.

1. 개요 - 천증이란?

<정의> 호흡곤란 혹은 氣息이 측급한 것

<증상> 張口擡肩 (입 벌리고 어깨 들썩이면서 숨쉬기), 鼻翼煽動, 不能平臥(제대로 눕지 못함)

2. 역대제가설

수업 안 하시고 넘어가셨는데 기출이 있어서 정리했습니다

기출/악마 천증에 대하여 옳은 것은? (06, 11, 12)

내경	- 천증의 원인, 증상, 병기 언급 - 폐가 主病의 臟이지만 천증이 폐 이외의 장에도 발생할 수 있음. - 병인: 風寒, 水氣, 實邪適風, 歲火太過, 氣有餘
금궤요략	上氣, 哮喘, 肺脹의 증후 설명 →사간마황탕, 월비탕, 소청룡가석고탕, 조협한 등의 처방 제시
주단계	- 칠정, 포식, 장기불화 등이 호흡을 방해함 - 脾腎俱虛해도 발생
경약전서	천증을 허실로 귀납하여 천증의 변증강령 제시
동의보감	천증을 8가지로 분류

3. 병인병리

이 부분도 대충 하시고 넘어가셨는데 기출이 있어서 정리했습니다

기출/악마: 천증의 병인병리를 간단히 쓰시오(06), 천증에 대한 설명은?(12)

외감	- 주로 풍한에 거둬 감촉되어 발생 ① 풍한에 거둬 감촉→사기가 폐에 침습→기기승강이 失常하여 상역→천증 ② 표한이 풀어지지 않았는데 안에서 열로 化하거나 폐에 열이 있는데 泄하지 못하면 => 기억하여 천증
내상	- 주로 음식, 술 + 소화기 안 좋아서 발생 ① 生冷肥甘한 음식을 많이 먹거나, 과음하면 기억하여 천증 (중조를 손상하여 脾가 운화하지 못하여 담탁이 内生하고 위로 폐가 건조해져서 폐기를 막아 승강이 제대로 안 되어 기억) ② 습담이 울체된 것이 오래되어 熱化→肺火가 盛→폐기가 상역→천증 ③ 情志가 사하여 폐기가 승강작용을 失常하면 기억하여 천증 ④ 勞慾은 腎을 상하게 하고 정기를 內奪하게 하여 기억상분하여 천증

[동의보감의 8가지 천증]

- 진짜 거의 훑듯이 말하고 넘어가셨는데 언급은 하셨으니,, 19학번 최유진 선배님 자료에서 가져왔습니다..

	증상	치법	처방
風寒喘	尋常感冒	咳嗽	金沸草散 五味子湯
	→ 감기로 인한喘		
痰喘	肺實肺熱	胸膈痞悶 喉中痰聲	定喘化痰湯
氣喘	七情所傷	無痰聲	加味四七湯 四磨湯 六磨湯 清金湯 蘇子降氣湯 定肺湯 杏仁半夏湯 등
火喘	衝脈之火	行動則氣促	滋陰降火湯
	→ 화나서(열받아서) 생기는喘		
水喘	(水氣 支飲 停飲)	(怔忡) 喘息	小青龍湯
	→ 심부전으로 인한喘		
久喘	久病氣短	氣短 似喘非喘	調中益氣湯
胃虛喘	氣上逆	身熱而煩	生脈散
	→ 심부전으로 인한喘으로 볼 수도 있지만 그건水喘이 좀 더 가까움		
陰虛喘	陰虛 血虛	血虛:陽無所依附而上奔 陰虛:氣從臍下 直衝清 道而上.	人蔘五味子散 寧肺湯 四物湯倍芍藥加人蔘五味子 四物湯合二陳湯 등

4. 치료

기출/악마: 천증에서 관련있는 것끼리 연결하시오(05)
폐기울비, 심혈어조, 담탁조폐의 치법, 치방 연결(10)

<변증 요점>

- (1) 발병의 병기는 주로 폐와 신에 有
- (2) 허증과 실증의 구분
 - ① 실증 (實喘在肺)
: 외사, 담탁, 간울기역, 사옹폐기로 인하여 선발속강이 제대로 안 되어喘
 - ② 허증 (虛喘在肺, 腎 兩臟)
: 정기부족, 기울휴손으로 인해 肺腎이 출납을 제대로 하지 못하여喘
 - ③ 病程錯雜한 경우는 보통 下虛上實을 함께 볼 수 있음
- (3) 중증은 대개 心까지 영향을 미침

<변증시치> - “生脈散” 등을 빈용 한약제제로 사용 可

[虛喘]

	증상	치법	처방
肺虛	喘促短氣 氣怯聲低 喉有鼾聲 咳聲低弱 痰吐稀薄 自汗畏風 或咳痰少質粘 煩熱 口乾 咽喉不利 面潮紅 舌質淡紅或舌紅 苔剝 脈軟弱或細數	補肺益氣 養陰	보폐탕 보중익기탕
腎虛	喘促日久 動則喘甚 呼多吸少 氣不得續 形瘦神疲 跗腫 汗出肢冷 面青脣紫 舌苔淡白或黑潤 脈微細或沈弱 或喘咳 面紅 煩燥 口咽乾燥 足冷汗出女油 舌紅少津 脈細數	補腎納氣	삼부탕 진무탕 금수육군전 금래신기환 팔미지황탕
心氣虛 心陽虛	心悸 氣短 脈弱數或結大 兼面白晄白 神疲體倦 自汗少氣 舌淡苔白 若見畏寒 肢冷 面色滯暗 胸悶 或疼痛 則是心陽虛	補益心氣 溫補心陽	양심탕 생맥산

허천 중 폐, 신, 심과 연관하여 천식의 정도를 설명하시오. (01)
심기허로 인한 천식양상은 動則更甚이며 동반증상은 自汗, 易感冒이다. (X) (06)
폐허, 신허, 심기허와 관련된 증상 고르기 (11)

[實喘]

	증상	치법	처방
風寒襲肺	喘咳氣逆 胸部脹悶 痰多稀薄色白 兼有頭痛 惡寒 或伴發熱 不口渴 無汗 苔薄白而滑 脈浮緊 → 마황: 이수소증 효과도 있어서 오래 쓰면 폐음이 안 그래도 부족한데 음허 증상을 더 심각하게 만들 수 있음 (단기적으로 쓸 것)	宣肺散寒	마황탕 계지가후박행자탕
表寒裏熱	喘逆上氣 胸脘或痛 鼻粗鼻煽 咳而不爽 痰吐稠粘 伴有形寒 身熱 煩悶 身痛 有汗 或無汗 口渴 苔薄白或黃 舌質紅 脈浮數(滑) → 마행감석탕: 태음인형인 소아가(밥 잘 먹고 얼굴 하얗고,,,) 가래가 진하지 않고 몽글몽글할 때(?) 쓰기 좋은 처방 (효과도 좋음!!)	宣肺泄熱	마행감석탕
痰熱鬱肺	喘咳 胸部脹痛 痰多粘稠色黃 或挾血色 伴有胸中煩熱 身熱 有汗 渴喜冷飲 面紅 咽乾 尿赤 大便秘 苔黃或膩 脈滑數	泄熱痰熱	상백피탕
痰濁阻肺	喘而胸滿悶窒 甚則胸盈仰息 咳嗽痰多粘膩色白 咯吐不利 兼有惡心嘔吐 納呆 口粘不渴 苔厚膩色白 脈滑	化痰降氣	이진탕 삼자양친탕
肺氣鬱癰	情志刺激而誘發 發時突然呼吸短促 但喉中痰盛不著 氣憋 胸悶脹痛 咽中如窒 或失眠 心悸 苔薄 脈弦	開鬱 降氣 平喘	오마음자
心血瘀阻	心悸 氣短而喘 胸前刺痛或悶痛 有時牽引及兩脇肩臂 舌暗紅或紫斑瘀點 脈洪或結代 嚴重時面青 唇爪青紫 → 胸前刺痛或悶痛: 어혈에 해당하는 증상이지만, 이 증상이 있을 때 추가적으로 양방 검사도 해볼 것을 권유하는 게 좋음	通絡化瘀	혈부축어탕

[虛喘의 장기변별]

	肺虛	腎虛	心氣虛
천식양상	操勞後氣短而喘	靜息時也 有氣短喘息促 喘息持續不已	動則更甚
동반증상	面色白 自汗 易感冒	面色蒼白或靛紅 冷或煩熱 腰膝酸軟	心悸 浮腫 紫紺 頸脈怒張 脈結大

5. 유사 증후 감별

[喘證과 短氣의 구별]  기출/악마: 천증과 기단의 공통점 (01, 06), 천증과 기단을 감별하시오 (05)

喘證	氣短
호흡이상, 氣息短促, 胸悶不暢	
氣粗聲高기조성고, 張口擡肩장구대견; 입 벌리고 어깨 들썩이면서 숨쉬기, 搖身擲肚요신힐두; 기침을 많이해서 몸이 흔들리고 배가 깨내듯이(?) 아픔, 심하면 눕지 못함	숨이 급하고 짧으며 빈번하고 미약하여 숨을 잘 이어나가지 못하고, 천증과 비슷하게 보이나 어깨를 들썩이지 않 으며 신음처럼 들리나 통증이 없고, 누우면 좋아함

6. 조리 및 예방

- ① 평소 식음조절을 하여 恬點肥膩之品을 적게 먹고 담배/술을 경계, 신열한 자극식품을 피하기
- ② 기후 변화 시, 寒濕을 더욱 경계하여 외사에 감촉되어 질병 유발 방지 - 적정 온도/습도 유지
- ③ 과도한 정서 자극을 피하기
- ④ 대증요법 하면서 환자의 기인성 알려지를 찾아서 제거하기. (연기, 냄새, 먼지 등)
- ⑤ 천증에 좋은 것: 생강, 냉이씨, 굴껍질, 호도, 살구씨, 은행알, 잉어고기, 배, 무 등

7. 예후

"중거나 나쁘거나 ~~"

✓ 일반적으로 實喘은 치료가 쉽고, 虛喘은 치료가 어려울 수 있음

8. 천증 관련 질환과 임상 연구

 기출/악마: 심장성 천식에 대하여 쓰시오. (05)

심장성 천식은 호흡기의 문제가 아닌 심혈순환계의 문제로 인한 경우이며, 대부분 울혈성 심부전으로 인해 야기되어 喘鳴 기침 또는 短氣 등의 증상을 보이며, 특징적으로 발작성 야간 호흡 곤란의 양상을 보인다. 발작성 야간 호흡곤란의 증상은 만성 기관지염에 의한 점액의 과분비로 인해 발생하기도 하기 때문에, 감별에 세심한 주의가 필요

*** 천증 = 좌심부전으로 인한**

: 좌심방에 문제가 생겨 폐순환된 혈액이 좌심방으로 들어오지 못하면 폐울혈이 되면서 폐가 본인 역할을 하지 못해 기침함 (천증이 생김)

2024 심계내과학(신선호) [5주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
 그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 📌기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
 (자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 첨부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표한 처방] 십신탕, 승마갈근탕, 인삼패독산, 삼소음, 소청룡탕

십신탕	✓ 현대의 종합감기약
	- 갈근, 마황 등 덩치 있고 태음인형에 맞는 감기약 / 강활, 독활, 방풍 등 기육이 건실하고 짹짹 소양인형 감기약 / 향부자, 소엽 등 가벼운 발산만 하는 소음인형 감기약
	✓ 군약을 어떤 것으로 할 것인지는 사람에 따라 다르게 하면 됨

승마갈근탕	✓ 승마: 上/下의 개념 有 → 약들을 끌고 위로 올라감 : 얼굴 쪽 질환에 좌사약으로 많이 사용 (양명경쪽) ex) 승마유풍탕: 얼굴 부을 때 승마부자탕: 얼굴이 찢 때 승마황련탕: 얼굴에 열이 있을 때 cf) 시호: 횡적인 느낌
인삼패독산	✓ 강활, 독활 등을 포함 → 패독산은 주로 소양인형의 짹짹한 체형에 활용 ✓ + 쌍화탕 = 쌍패탕 ✓ 활용 - 편도선 붓기 → 우방자, 선태, 현삼, 산두근, 사간, 길경 등 - 가래, 기침 → 삼자(소자, 나복자, 백개자) - 몸살 → 강활, 독활, 갈근, 마황 ↳ 전체를 보고 처방을 결정한 후, 증상을 보고 가감할 것
삼소음	✓ 기침하는 가벼운 허증 감기에 활용 cf) 원방을 쓰는 것보다는 사람에 따라 군약을 확실하게 하기
소청룡탕	✓ 가성비가 훌륭한 많이 사용하는 처방 ✓ 청룡 = 마황 * 마황: 이수소종, 정천화담 (오랫동안 쓰는 약은 X) ✓ 기침, 맑은 콧물 주루룩(음이 많은 증상), 비염이 심한 경우에도 사용

제9절 혈증(血證)

1. 개요

✓ 血이란?

- 생성된 후 인체 내를 꾸준히 순환하면서 온몸을 영양하고, 각 기관이 정상기능을 유지하게 하는 것
- 心에 의해 주관 (血病의 병리가 항상 心과 밀접한 관계가 있는 이유)

* 비통혈, 심주혈, 간장혈

- ➔ 쉽게 멍이 드는 사람: 간장혈이 안 되는 사람
- ➔ 출혈이 잦은 사람 (코피): 비통혈이 안 되는 사람
 - ↳ 코피: 열받아서도 생김 (시험 기간에 공부를 너무 열심히)

✓ 血病의 병리

① 血瘀

② 出血

출혈을 의미하는 질환

- 혈액이 일반적인 경로를 순행하지 않은 것
- 口鼻諸竅로 上溢(비출, 객혈, 토혈)
- 前後二陰로 下泄(노혈, 변혈)
- 肌膚로 滲出(기출)하여 형성되는 출혈성 질환을 총칭

cf) 원전에서는 血病, 失血이라 칭하기도 함

서양의학에서는 급만성 질병(호흡기, 소화기, 비뇨계통 등)에서 발생한 출혈
혹은 조혈 계통 병변에서 발생한 출혈 포괄

* 출혈이 생기면 먼저 내시경 검사를 해볼 것을 추천하기

* 출혈이 생기는 이유에는 “어혈”도 있음

- ↳ 피가 지나다니는 길에 어혈이 길을 막고 있으면 피가 다른 길로 가기 때문
- => 지혈만 할 것이 아니라 “거어”까지도 복합적으로 생각해야 함

③ 血虛

* 혈허라고 해서 보혈약만 쓰면 X

- ↳ 기는 혈을 끌고 다니기에 보기지제 먼저 (녹용, 인삼, 사군자탕 등) 쓰고 보혈약을 써야 함
(소화기가 역할을 제대로 할 수 있어야 약효도 나는 법)

2. 역대제가설

📖기출/악마: 혈증에 대한 설명으로 옳은 것은? (09, 11, 17)

內經	· 혈의 생리 및 병리에 대하여 깊은 인식이 있었고 일상적으로 보이는 출혈에 대해 논함 ↳ 혈의 생성은 수곡정미에 의존하고 혈의 생성 후에는 脈中으로 쉬지 않고 운행하여 전신으로 퍼져 인체의 각 조직과 기관은 혈액의 영양 및 자운작용에 의존해 정상 기능 활동을 유지
漢代 張仲景 <金匱要略>	· 血汗同源의 원리로 (출혈이 있는 사람에게) 汗법을 신중히 사용해야한다고 함 · 토혈(吐血)의 처방 : 백엽탕, 사심탕 · 변혈(便血)의 처방 : 황토탕, 적소두당귀산
隋代 巢元方 <諸病源候論>	· 혈행이 망행하면 토혈이 생기고, 腸虛하면 하혈(下血), 表虛하면 한혈(汗血)이 발생하며 모두 손상이 심해 극히 허함.
<千金要方>	· 토혈의 종류를 內衄, 肺疽, 傷胃 3가지로 분류 · 서각지향탕 처방을 처음으로 기재 * 肺疽: 폐결핵 말기에 허혈이 있을 때 → 청상보하탕 + 백급
<濟生方>	· 失血의 원인은 虛, 음주과도, 과식, 매운 음식, 걱정, 분노 등으로 다양하나 熱이 가장 중요한 원인이라 함
<素問玄機原病式>	· 유완소: “失血의 주요 원인을 熱盛”이라고 인식
<丹溪心法>	· 주단계: “身熱 脈大하면 난치, 身涼 脈靜하면 치료가 쉽다” → 출혈 예후 설명
<醫學入門>	· “血病每以胃藥收功, 胃氣一復, 其血自止” 비위의 중요성을 강조 → 귀비탕(기본방 사군자탕) 📖 의학입문에서 말하는 혈증 치료의 원칙은?
<景岳全書>	· 치료에서 “有火/無火” 및 “氣虛/氣實”의 양 방면으로 살펴야 함
<醫貫>	· 기혈 사이의 관계 중시 → 혈을 먼저 치료하기 위해 理氣해야 하며(ex. 녹용), 血脫에는 먼저 益氣해야 한다. 📖 의관 논혈증에서 血脫, 必先 (益氣) 라고 하였다. (03)
<東醫寶鑑>	· 失血諸證을 설명하면서 원인을 크게 혈열, 칠정, 내상으로 봄 · 각 失血證에 대한 병인과 증상 및 치료법에 대하여 상세히 소개함

3. 병인병리

기출/악마: 혈증의 발생 원인과 치료 원칙은? (01, 03, 05, 06)
혈증의 병인병리는? (05, 06)

1) 병인

기출/악마: 혈증의 발생 원인은? (03) 출혈증의 발생 원인은? (18)

: 혈액은 脾에서 생화하여 - 肝에 저장되고 - 心에서 통솔되고 - 肺에서 輸布되고
- 腎에서 化精하여 - 맥중으로 運行不息되어 環周不休하여 - 전신을 영양함

感受外邪 감염성 질환	· 외사가 침습하여 맥락을 손상하여 출혈 발생 ⇒ “감기 걸려도 코피 나잖아요” → 열사가 가장 흔하며, → 풍·열·조사가 상부맥락을 침범하면 → 衄血, 咳血, 吐血 열·습사가 하부맥락을 침범하면 → 尿血, 便血
情志過極 열받으면	· 憂思惱怒가 과도하여 1) 간화상역하면 → 폐 침범 → 녹혈, 해혈 2) 간화횡역하면 → 위 침범 → 토혈
飲食不節 과음과식	· 음주과다, 辛辣厚味(신랄후미)를 과식하여 → 습열이 생기면 열이 脈絡을 상하여 출혈을 일으킴
勞倦過度 너무 힘들면	· 노권과다로 心 脾 腎이 손상되어 기가 상하면 氣不攝血로 출혈
熱病 or 久病 병이 오래되면	· 열병이나 구병으로 음이 고갈되면 1) 음허화왕 → 迫血妄行 2) 정기휴허 → 氣不攝血 3) 혈락어조 → 순행이 안되어 출혈

2) 병리

- 두 종류 ① 火熱薰灼(화열훈작)하여 迫血妄行하거나
② 氣虛不攝하여 血溢脈外
- 화열은 실화와 허화로 구분 ① 實火: 외감풍열 燥火 濕熱內蘊 肝鬱化火
② 虛火: 음허화왕
- 기허에는 [기허]만 있는 증과 [기허+양허] 같이 있는 증으로 구분
↳ 구분하기 어려우나 후자가 더 심함
- 증후의 虛實에 따라 구분 ① 實證: 氣化亢盛으로 인해 발생
② 虛證: 陰虛火旺 및 氣虛不攝으로 인하여 발생
↳ 실증에서 허증으로의 轉化가 잘 발생함
- 출혈 후 경맥을 떠난 이후에 체외로 배출되지 않고 체내에 축적되어 울결되면 어혈
→ 新血의 생장 및 기혈의 정상 운동을 방해하여 출혈 반복

3) 혈증의 주요 증후 감별

- 출혈만으로 열성, 음허, 기허를 구분하기는 어렵고 겸증이 무엇인지에 따라 변별해 치료

	특징	증상
熱盛迫血證	· 혈증 초기에 많이 발생 · 발병이 급함	發熱 煩燥 口渴慾飲 便秘 尿黃 舌質黃 苔黃 少津 脈弦數 或滑數 *脈弦數: 피가 부족하니 맥이 자주 뛰는 것
陰虛火旺證	· 발병이 완만 · 熱盛迫血證이 변해서 나타나기도 cf) 식이조절이 너무 엄격하거나 끼니를 잘 걸러 단백질 섭취가 굉장히 부족한 분들	반복적인 출혈과 더불어 口乾 咽燥 觀紅 潮熱 盜汗 頭暈 耳鳴 腰膝酸軟 舌質紅 苔少 脈細數 * 口乾 咽燥: 쇼그렌 증후군 환자 多 ↳ 몸에 있는 진액이 모두 바짝바짝 마르는 것 (건조하니 조직이 약해져 쉽게 출혈)
氣虛不攝證	· 병정이 길고 오래되어 낫지 않은 환자에게 多 · 발병은 비교적 완만하고 반복적으로 출혈이 생김	倦怠 心悸 氣短 懶言 頭暈 目眩 飲食不振 面色蒼白 或萎黃 舌質淡 脈弱

4. 치료

기출/악마: 혈증의 발생 원인과 치료 원칙은? (01, 03, 05, 06)

1) 출혈의 변증 요점

① 출혈의 원인 질환을 구별해야 함 → “기질적 문제인지 기능적인 문제인지”

- 출혈의 발생원인 및 출혈 부위가 같지 않기 때문

ex) 똑같이 입으로 피를 토하더라도 吐血과 咳血의 구분 有

② 장부병변의 다름을 구별해야 함 → “선행 질환이 무엇인지를 먼저 보기”

- 동일한 血證이어도 다른 장부의 병변에서 발생하기 때문

ex) 똑같은 코피이더라도 병변 장부가 肺일 수도 胃일 수도 肝일 수도 있음

③ 증후의 허실을 구별해야 함

- 일반적으로 초기에는 實證이 많고, 오래된 병은 虛證이 많음

2) 출혈의 치료원칙 3가지 治火 治氣 治血

① 治火

- 火熱薰灼화열훈작으로 脈絡을 손상하는 것이 출혈에서 가장 많이 보이는 병리

- 實火는 청열사화하고 虛火는 자음강화해야 함

- 손상 장부가 같지 않음을 참고하여 적당한 처방을 선용할 것

② 治氣

- 실증은 清氣降氣 허증은 補氣益氣함

→ 益氣攝血익기섭혈에 귀비탕, 益氣升陽익기승양에 보중익기탕, 益氣固脫익기고탈에 독삼탕/삼부탕

③ 治血

- 출혈을 치료하기 위해서는 각종 증후의 병인 및 병리에 근거하여 변증논치하고 그중에서 적당한 涼血止血양혈지혈, 收斂止血수렴지혈, 祛瘀止血거어지혈의 처방을 포함하여 선용

3) 병증별 변증시치

(1) 鼻衄 비강출혈

鼻衄에서 관련있는 것끼리 연결하시오. (보기 주고 변증명-증상1개-처방 짝짓기) (06, 12)

- 鼻衄 혹은 衄血이라 하며, 혈증 중 가장 자주 나타나는 병증 + 잘 안 나옴
- 화열이 迫血妄行해 발생하는 것이 많은데, 폐열, 위열, 간화로 인한 것이 대부분

	증상	치법	처방
熱邪犯肺證	鼻燥 衄血 口乾咽燥 身熱 惡風 頭痛 咳嗽 痰少 舌質紅 苔薄 脈數	清泄肺熱 涼血止血	桑菊飲가감
	→ 상국음: 상엽, 국화, 행인, 길경 등 有 → 서늘한 약들 → 열사범폐증의 주증은 발열이 심함, 감기몸살, 기침이고 코피는 겸증임		
胃熱熾盛證	鼻衄 或兼齒衄 血色鮮紅 口渴欲飲 鼻乾 口乾臭穢 煩躁 便秘 舌紅苔黃 脈數	清胃瀉火 涼血止血	玉女煎가감 백호탕가감 (석고 들어간 처방)
	→ 위에 열이 있으면 입에서 냄새남 + 설태가 두꺼움 + 붓 뜨고 빠르면서 활맥 → 위열치증은 열성 음식(술/담배)을 많이 먹는 사람에게 多		
肝火上炎證	鼻衄 頭痛 目眩 耳鳴 煩躁 易怒 兩目洪赤 口苦 舌紅 脈弦數	清肝瀉火 涼血止血	龍膽瀉肝湯가감
	→ 이어폰, 노트북, 태블릿 등으로 이명, 안구건조증인 젊은 사람들 多 → 이명 환자도 허실을 따져서 처방 / 침은 예풍, 삼초경 (이건 원위취혈) 허/실에 따라 약침도 달라짐 → 초기 이명환자일수록 치료 효과 굳		
氣血虧虛證	鼻衄 或兼齒衄 肌衄 身疲乏力 面色黃白 頭暈 耳鳴 心悸 夜寐不寧 舌質淡 脈細無力	補氣攝血	歸脾湯가감
	→ 기혈허증이 많이 있음 → 양방에서는 아래와 같이 구별 ┌ 가짜 어지러움: 안경을 바꿨거나 배, 놀이기구를 탔을 때 └ 진짜 어지러움: 소뇌 or 귀에 이상이 있을 때 (자세 변화에 따라 발생) if) 선행 질환 有 + 계속 어지럼 = 빨리 MRI, 응급실 코피 + 머리가 멍하면서 특히 오전에 아픔 + 오심 = 두개내압상승 증상 (이런 경우도 빨리 MRI 찍어보기)		

(2) 齒衄 잇몸에서 출혈

- 주로 위장 및腎의 병변과 관계가 있으며 직접적으로 齒齦 국부병변이나 전신성 질병으로 인해 발생할 수 있는데 혈액병, 비타민 결핍증, 및 간경화 등에서 많이 볼 수 O
- * 대장경 쪽에 습열이 있으면 風齒 = 이 전체가 다 흔들거리는 것
 - ↳ 맥주(이 자체로 습열) + 딱딱한 안주 (오징어, 마른 안주를 질경질경)
 - + 양치 안 하면 풍치 발생 가능
 - ➔ 처방으로는 옥자산, 양치 후 소금물로 가글링 (입에 2~3분 정도 머금고 있기)

	증상	치법	처방
胃火熾盛證	齒衄 血色鮮紅 齒齦紅腫 疼痛 頭痛 口臭 舌紅 苔黃 脈洪數	清胃瀉火 涼血止血	加味清胃散 合瀉心湯가감
	→ 잇몸 출혈 외에도 소화기에 열이 있는 증상이 있음 (구취 등) → 청위산: 황련, 목단피, 생지황 등이 들어가 있음 * 황련: 특히 일체 안구질환의 성약 (눈병 실증에) 대사증후군 이런 데에도 좋음 ➔ 가짜 황련은 안 됨 (일황련, 천황련 쓰기 / 호황련은 안 됨)		
陰虛火旺證	齒衄 血色淡紅 起病較緩 常因受熱 及煩勞而透發齒搖不堅 舌質紅苔少 脈細數	滋陰降火 涼血止血	六味地黃丸合茜 根散가감
	→ 음허 증상 有 → 나이가 들면 이가 말라간다고 표현을 하심 => 잇몸이 점점 내려앉으면서 이뿌리가 조임 cf) 저작운동과 치매가 관련있는 만큼 이 관리는 중요		

(3) 咳血

기출/악마: 해혈의 특징? (06)

- 혈액이 폐, 기관지로 上溢하여 기침과 함께 나온 것. 가래에 피가 섞이거나 순수하게 피만 나오는 것 모두 포함 → 각종 영상을 찍어서 폐결핵 유무 확인 必
- 嗽血, 喀血이라고도 함
- 주로 온열병에서 발생하며, 기관지확장증, 급성기관지염, 만성기관지염, 폐렴, 폐결핵, 폐암 등에서 발생

	증상	치법	처방
燥熱傷肺證	喉痒咳嗽후양해수 痰中帶血 口乾 鼻燥 身熱 舌質紅少津 苔薄黃 脈數	清熱潤肺 寧絡止血	桑杏湯가감
	ex) 감기 걸렸을 때		
肝火犯肺證	咳嗽陣作해수전작, 기침이 계속 나옴 痰中帶血 純血鮮紅 胸脇脹痛 煩躁 易怒 口苦 舌質紅 苔薄黃 脈弦數	清肝瀉火 涼血止血	瀉白散 合黛蛤散대합산 가감
	→ 대합산: 청대(쪽)이 들어가는데 이는 청열력 大 (먹으면 이도 파랗게 물들킴)		
陰虛肺熱證	咳嗽痰少 痰中帶血 或反復咳血 血色鮮紅 口乾咽燥 觀紅 潮熱 盜汗 舌質紅 脈細數	滋陰潤肺 寧絡止血	白合固金湯가감
	→ COPD 환자에 해당. COPD 환자엔 청심보화탕, 폐결핵, 폐암 환자가 피를 토할 땐 백급(군약) 백급언급이 잦으니네용.. → 白合固金湯: 육미가 들어간 처방		

cf) 吐血과 咳血의 감별 요점표

	吐血	咳血
천식 양상	위에서 구토와 함께 나온다	폐에서 기도를 경유하여 기침과 함께 나온다
동반증상	胃痛, 積聚 등의 소화기 증상	肺癆, 久咳, 천증 등의 호흡기 증상
출혈 전조증상	胃脘不適,胃痛,惡心 = 소화기 증상	해수, 흥민, 喉痒 = 호흡기 증상
혈액 성상	紫暗色이며 食物殘渣食物잔사가 섞임	선홍색이며 泡沫痰涎포말담연이 섞임
출혈 후 정황	객담 중 혈액이 없으며 다만, 대변색은 흑색을 띰	객담 중 혈액이 나오나 대변색 정상

(4) 吐血 (또는 嘔血)

- 혈액이 위에서부터 입으로 토혈하여 피만 나오거나 음식물과 피가 섞여 나오는 것
- 주로 상부소화관 출혈
 - 소화성궤양 출혈, 간경화로 인한 식도정맥류 파열이 가장 많음
 - ↳ 상당히 대량출혈이라 우리가 해줄 수 있는 게 없음 (응급실로 빠르게 전원)
- 식도염, 급만성위염, 위점막미란 등의 병증 및 전신성 질병에서 나타날 수 있음

	증상	치법	처방
胃熱壅盛證	脘腹脹滿 嘈雜不適 甚則作痛 吐血色紅或紫暗 脈滑數 常夾有食物殘渣 嗝逆 口臭 便秘 大便色黑 舌質紅 苔黃膩	清胃瀉火 化瘀止血	瀉心湯 合十灰散가감
	→ 十灰散: 대게, 소게, 하엽 등 초탄하여 지혈작용 있는 약재들 有 cf) 목단피, 단삼: 서늘한 활혈거약으로 뜨거워서 생긴 어혈에 用		
	기출/악마: 심회산의 구성약물과 창방목적, 복용법은?(10) · 구성 약물: 대게 소게 측백엽 박하엽 모근 천초근 대황 치자 종려피 목단피 · 창방 목적: 열성 출혈상태의 량성지혈약 · 복용법: 각각 재가 될 정도로 초탄 후 복용(특히 목단피)		
肝火犯胃證	吐血色紅或紫黯 口苦 脇痛 心煩易怒 寐少 夢多 舌質紅絳 脈弦數	肝火清胃 涼血止血	龍膽瀉肝湯가감
	→ 龍膽瀉肝湯 : 구성 약물로 작약, 목단피, 구기자 有 = 간계 약물 cf) 난간전		
氣虛血溢證	吐血纏綿不止 托혈전면불지 時輕時重 血色暗淡 神疲乏力 心悸氣短 面色蒼白 舌質淡 脈細弱	健脾 益氣 攝血	歸脾湯가감
	→ 토혈의 정도가 심하지 않을 때 → 神疲乏力 心悸氣短: 허증임을 나타내는 증상		

(5) 便血 기출/악마: 便血에서 관련있는 것끼리 연결하시오. (보기 주고 변증명-증상1-치법 짝짓기) (06)

- 위장의 맥락이 손상을 받아 혈액이 대변을 따라 나오는 것
- 結陰, 下血, 腸風, 臟毒 등으로 칭함
- 위장관염증, 궤양, 용종, 게실염, 치질, 대장암 등에서 나타나며, 이질이나 치질과 감별해야 함 → 내시경을 먼저 실시해서 용종과 같은 문제있는 지를 확인해야 함

	증상	치법	처방
腸道濕熱證	便血色紅黏稠 大便不暢或稀溏 或有腹痛 口苦 舌質紅 苔黃膩 脈濡數	清化濕熱 涼血止血	地榆散 合槐角丸가감
	→ 습열 음식 많이 먹었을 때 생길 수 있음		
氣虛不攝證	便血色紅或紫暗 食少 體倦 面色萎黃 心悸 少寐 舌質淡 脈細	益氣攝血	歸脾湯가감 보종익기탕
	ex) 습관적 치질 “갑자기 밥 먹다가 아 나 빠졌어ㅋㅋ...”		
脾胃虛寒證	便血紫暗 甚則黑色 腹部隱痛 喜熱飲 面色不華 神倦 懶言 便溏 舌質淡 脈細	健脾溫中 養血止血	黃土湯가감

(6) 紫斑

- 혈액이 피부 사이로 溢出해 피부에 靑紫반점이나 斑塊가 나타나는 병증
- 타박상, 알레르기성 자반증, 특발성 혈소판 감소성 자반증 등에서 나타남

	증상	치법	처방
血熱妄行證	皮膚出現靑紫斑點或斑塊 或伴有鼻衄 齒衄 便血 尿血 或有發熱 口渴 便秘 舌質紅苔黃 脈弦數	清熱解毒 涼血止血	十灰散가감
陰虛火旺證	皮膚出現靑紫斑點或斑塊 時發時止 常伴鼻衄 齒衄 或月經過多 觀紅 心煩 口渴 手足心熱 或有潮熱 盜汗 舌質紅苔少 脈細數	滋陰降火 寧絡止血	茜根散천근산 가감
	→ 천근산: 차가운 약으로 음허화왕에 청리가감탕 등으로 음허를 해결하면서 이 천근산을 사용함 (활혈거어 항염증 항암)		
氣不攝血證	反復發生肌衄 久病不愈 神疲乏力 頭暈 目眩 面色蒼白或萎黃 食欲不辰 舌質淡 脈細弱	補氣攝血	歸脾湯가감

(7) 尿血 기출/악마: 尿血에서 관련있는 것끼리 연결하시오. (보기 주고 변증명-증상1-치법 짝짓기) (06)

- 소변에 혈액이 혼합되거나 심하면 血塊를 수반하는 병증
- 담홍색, 선홍색 혹은 다갈색 소변
 - ↳ 소변 색이 다갈색인 경우는 눈에 띄지만, 담홍색, 선홍색은 눈에 띄게 붉지 않고 평소와 색이 살짝 다른 정도여서 육안으로 구분이 어려운 경우가 더 많으므로 나이가 많거나 신장이 안좋으신 분들은 주기적으로 혈액 소변검사 해봐야 함
 - 정상 소변, 대변의 상태가 어땠는지 파악하는 게 병리 상태 파악에 매우 용이
- 이전의 뇨혈은 육안적 뇨혈을 말했으나, 현미경에서 적혈구가 발견되는 것도 포함
- 요로감염, 신결핵, 신사구체신염, 비뇨기계종양 등에서 나타남
 - ↳ 혈뇨를 걸코 쉽게 보면 안 됨

	증상	치법	처방
下焦濕熱證	小便黃赤灼熱 尿血鮮紅 心煩 口渴 面赤 口瘡 夜寐不安 舌質紅 脈數	清熱利濕 涼血止血	小薊飲子 가감 팔정산
腎虛火旺證	小便短赤帶血 頭暈 耳鳴 身疲 觀紅 潮熱 腰膝酸軟 舌質紅 脈細數	滋陰降火 涼血止血	知柏地黃丸 가감
脾不統血證	久病尿血甚 或兼見齒衄肌衄 食少 體倦乏力 氣短 聲低 面色不華 舌質淡 脈細弱	補中健脾 益氣攝血	歸脾湯 가감
	→ 비불통혈이면 다른 데에도 출혈 有		
腎氣不固證	久病尿血 面色淡紅 頭暈 耳鳴 精神困憊 腰脊酸痛 舌質淡 脈沈弱	補益腎氣 固攝止血	無比山藥丸 가감
	→ 精神困憊: 피곤, 고달픔 → 無比山藥丸: 기름기가 많은 종자가 많은 만큼 소화도 잘 안 될 수 있고, 방귀냄새 지독하기도 함		

4) 침구치료 교수님이 언급한 부분만 정리했습니다

- 특정 병에 특정 혈자리 X → 변증에 따라 선택
- 기불섭혈해서 생긴 변혈에 백회에 뜸을 뜨기도 함
- 뇨혈이 멎지 않으면 삼릉침으로 기충을 찔러 피를 내면 즉시 멎는다
 - ↳ 어떻게 해도 즉시 멎는 경우는 거의 없어..

5. 조리 및 예방

이 부분은 교수님이 다 언급하셔서 그냥 한번 읽어보는 걸 추천드립니다.

- 출혈증은 대부분 火가 원인인 경우가 많으므로 화열을 조장할 수 있는 과음, 신랄한 음식, 고랑후미한 음식, 밀가루 음식 (밥 면 떡) 등을 피해야 함
 - +) 칠정의 과격 및 노권, 성욕 등에 의해서도 출혈증이 발생할 수 있으므로 安心靜養 하며 과도한 사려와 과로를 피하고 성정을 다스려야 함
 - +) 순한 운동 하기 (동적인 운동보다는 정적인 운동)
- 치핵(혈변의 흔한 원인)의 경우
 - : 화장실에서 과도한 힘을 주거나
 - ↳ 복압을 자연스럽게 올려줄 수 있도록, 변기에 앉았을 때 발을 올릴 수 있도록 의자 같은 걸 두기
 - : 오래 앉아 있는 것을 피하기
 - ↳ 화장실에 휴대폰 들고 가는 걸 피하기
- 그 외) 온수 좌욕 (35도 정도의 물에 10분 내외)을 하는 것이 도움이 되며, 변비 예방 차원에서 섬유질이 많은 음식을 복용하는 것이 좋음
- 자반증의 경우 (치유 후 반복 재발이 잘 됨)
 - : 재발을 방지하기 위해서는 상기도 감염의 발생을 예방하고 적절한 실내 습도와 온도를 유지하며 약물의 오남용에 주의하고 음식물 섭취에도 주의할 필요가 있음

6. 예후 - 3가지 요소와 관련 有 기출/악마: 혈증의 예후를 쓰시오(05, 06)**1) 출혈이 발생하는 원인**

- 외감은 易治 ↔ 내상은 難治
- 新病은 易治 ↔ 久病은 難治

2) 출혈량의 多少에 따라

- 출혈량이 적으면 輕病 ↔ 출혈량이 많으면 重病

3) 합병증과 관련됨: 출혈에 발열, 천해, 맥삭 등의 합병증이 수반되면 병이 중하다.

- ↳ 출혈로만 병원을 찾는 사람은 드물

2024 심계내과학(신선호) [6주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표 처방] 굴피일물탕, 청상사화탕, 이진탕/궁하탕, 청훈화담탕, 반하백출천마탕, 방풍통성산

굴피 일물탕

- ✓ 굴피, 진피: 육진약 / 청피: 덜 익은 껍질
- ✓ 굴피는 담을 없애는 약이며, 굴피일물탕에 말린 게 약 40g 들어가는 건 양이 굉장히 많은 편
- ✓ 대금음자(술 깨는 약): 군약이 진피
 - * 진피는 담을 없애기도 하지만 허한 것을 더 허하게 할 수 있음
 - 이기지제를 쓸 때는 조심
(연세 드신 환자에게 표실증이 없어지면 본허를 꼭 보기)
 - 굴피일물탕, 대금음자는 오래 쓰는 약 X

청상 사화탕

- ✓ 담화로 인한 두통에 아주 효과 굳
 - 열결두통에도 쓰이는데 이는 실제로 40도에 육박하는 체온 상승이 아니라 오랫동안 스트레스를 받아 화가 많이 끓어서 머리 아플 때 사용하면 좋음
↳ 환자 히스토리를 꼭 들어보기 (왜, 언제부터.....)
- ✓ 오래 쓰는 약은 아니며, 속이 차가운 사람은 설사할 수 있음
 - ↳ 소화기 상황 파악하고 쓰기
- ✓ 승마: 위로 올라가는 약 / 여기서 황기 = 좌사약 정도 (인경약 역할)

이진탕 궁하탕

- ✓ 오령산, 궁하탕, 이진탕, 도담탕의 사용 때 비교
오령산: 水氣
궁하탕: 水氣와 痰 사이쯤
이진탕: 痰
도담탕: 痰이 심할 때
| 痰이 끈끈하고 연세 드시면 이진탕, 도담탕 계열 用
- ✓ 궁하탕: 이진탕보다는 좀 더 순해서 소화제로도 쓸 수 있고 사용 범위가 넓음
↳ 대신 실증이고 담음 즉, 水가 좀 더 있을 때 쓰는 것

청훈 화담탕

- ✓ 실증 어지러움에 쓰는 대표적 처방
 - ↳ 완고한 담에 쓰이는 만큼 청훈화담탕을 쓴다고 해서 어지러움이 금방 낫지는 X
cf) 천마구등음, 식풍탕: 훨씬 실증에 씀 (혈압높고, 맥홍삭, 설태황백)
⇒ 허실을 판별하여 각각에 맞는 처방을 쓸 것
- ✓ 어지러움을 유발할 수 있는 질환: 추골기저등맥허혈증(VVI), 이석증(BPPV)
 - ↳ 뇌에 문제: 자세에 관계 없이 어지러움 + 운동실조
 - ↳ 귀에 문제: 자세 변화에 따라 어지럼증 유발 가능 (이석증은 재발도 잘 됨)

반하백출천마탕

- ✓ 담음으로 인한 두통 + 소화기 증상이 있을 때 用

방풍 통성산

- ✓ 대사증후군에 굉장히 좋은 처방
ex) 교수님 병원 간호사쌤이 고지혈증, 고혈압이 심했는데 이 방풍통성산 1달 정도 쓰니까 눈에 띄게 좋아졌음
- ✓ 반드시 실증에 쓸 것 → 허증에 쓰면 어지러울 수 있음
ex) 잘 먹고 잘사는데 술 독한 거 먹고 그 다음날 피부에 발진

제10절 어혈(瘀血)

* 원래는 다른 단원과 마찬가지로 개요 다음에 역대제가설인데 공간이슈로 병인병리, 진단 먼저 정리했습니다.

1. 개요

기출/악마: 어혈이란? (03)

[어혈이란?]

: 혈액의 운행이 불창하여 瘀積이 응체, 離經之血이 체내에 정체된 병리적 산물이자 원인
→ 원인(병인)이자 결과(병리적 산물)

- ① 혈액의 순행이 원활하지 못하여 정체된 것
- ② 汚血 : 혈액의 성분, 성질의 이상변화로 운행이 불창하게 된 것
- ③ 久病入絡 : 장부나 기관의 병변으로 조성된 혈액이 어체되어 불창한 것
- ④ 이미 경락을 떠난 후 체외로 배출되지 않은 혈액

* 어혈의 특징: 만성, 통처 고정, 찌르듯이 아픔
진단하기가 다른 것에 비해 편하고 치료 효과도 드라마틱함

* 왜 어혈이 되었는지를 생각해보기

↳ 교통사고, 타박상이 아닌 기허로 혈액순환이 잘 안 된 경우는 실증인 어혈을 없애고
보기지제를 써서 어혈이 생길만한 원인을 제거하기

2. 병인 및 병리

기출/악마: 어혈의 병인병리를 쓰시오. (03)

외상	타박상, 넘어짐, 교통사고, 추락 등 외부 충격으로 어혈 발생 (특히 노인분들 취약)
情志에 의한 내상	情志가 극에 달하면 먼저 氣에 병이 생기는데 기와 혈액은 밀접한 관계로 정지의 내상에 의하여 유발된 기체, 기허도 발전하면 기체혈어, 기허혈어가 발생
한사에 感受	寒의 뭉쳐서 끌어당기는 성질로 발생
열사에 感受	열로 인해 점도가 증가하여 운행이 원활하지 못하고 어혈을 형성
正氣의 虧虛	병이 오래되거나 기타 원인으로 기허하면 혈액의 정상 운행 추진이 되지 않아서 어혈이 생성됨

3. 진단

기출/악마: 어혈의 임상증상 / 설상, 맥상을 쓰시오. (03)

어혈의 임상증상 및 통증의 특성	· 발생 부위, 기혈 음양 장부의 손상 정도에 따라 통증, 부종, 발열 등이 나타날 수 있음 (이때 발열은 미미한 정도) · 가장 중요한 증상 = 통증 ↳ 통처 고정, 자통, 야간에 심해지며 잘 낮지 않고 반복 발작 · 입이 건조해도 입안을 핥을 정도로 물을 마실 뿐 물을 많이 마시려고 하지 않는 특징 有
瘀血體症	· 안면 및 안검 부위와 입술 색깔이 암자색을 띠게 됨 ↳ 말초혈관이 많이 보이는 곳에 혈액순환이 잘 안 되어 확장되어 정맥혈관 색이 보이는 것
舌象과 脈象	· 舌象: 舌質紫色, 紫紅色の 瘀點瘀斑을 동반. 심하면 설질이 暗紫색이거나 입술이 위축되고 舌靑. +) 설하정맥류, 잇몸의 색깔이 거무스레해지는 등의 변화가 나타남 · 脈象: 澀脈이 대표적 沈結脈 - 어혈이 오래되면 心에 영향을 미쳐 心氣가 고르지 않고 맥박이 울동을 잃어 나타날 수 있음
병력	· 문진에서 어혈 발생과 밀접한 연관이 있는 외상, 출혈, 월경태산, 수술력 등 파악이 중요 ↳ 특히 교통사고 후유증에 어혈 치료를 우선적으로 고려할 수 있음
월경력 ↳ 따로 안 읽으심	· 여성일 때 어혈진단을 위해 월경력(월경통 유무, 덩어리, 불규칙여부) 확인 必
치료력	· 어혈 증상이 불명확해도 다른 약을 수차례 복용해도 효과가 없다면 久病入絡의 각도로 어혈증을 고려할 수 있음
어혈증의 현대적 병리 진단 지표	· 어혈증의 객관적 판단 기준이 되는 병리 진단표로 국제어혈증진단표준표가 활용되고 있음 (아래 표는 참고용....)

표 10-1 국제어혈증진단표준표								
증상	점수							
	남	여						
眼輪部の 색소침착	10	10	齒肉의 暗赤色化	10	5	回盲部壓痛・抵抗	5	2
안면의 색소침착		2	舌의 暗赤紫色化	10	10	S자 結腸部壓痛・抵抗	5	5
피부의 甲錯 ¹⁾		5	혈관확장 ²⁾	5	5	季肋部壓痛・抵抗	5	5
口唇의 暗赤色化	2	2	피하출혈	2	10	치질	10	5
			手掌紅斑	2	5	월경장애		10
			臍傍壓痛・抵抗(左)	5	5	20점 이하: 非瘀血病態 21점 이상: 瘀血病態		
			臍傍壓痛・抵抗(右)	10	10	40점 이상: 重症瘀血病態		
			臍傍壓痛・抵抗(正中)	5	5			

1) 피부가 거칠고 균열이 일어난 상태

2) 도세혈관의 확장 거미모양 혈관종 등 판단기준

4. 역대제가설

內經	· 어혈이라는 말이 직접 나타나 있지 않지만 의미를 포함한 개념인 惡血, 死血, 血凝位 언급 · 邪氣 가운데 “寒”이 혈액을 응체하게 하고 흐름을 불창하게 하여 맥락을 어조하는 중요한 인자로 보았음 · 외상이 치료되지 못하면 혈행이 불창하여 어혈이 생길 수 있음 cf) 어혈은 뜨거워서도 생기고, 차가워서도 생김 ex) 뜨거워서 어혈 - 마치 선지국에 들어있는 선지처럼 ... ↳ 이때는 단삼, 목단피, 백작약처럼 서늘한 약으로 어혈을 풀어줌 차가워서 생긴 건 생활 습관 지도도 필요함
<傷寒> <金匱要略>	· 장중경은 어혈이라는 용어를 처음 사용 · 계지복령환, 저당탕, 하어혈탕, 도핵승기탕 등 제시 ↳ 계지복령환: 부인과 환자에서 얼굴 쪽 피부질환에 응용하기도 함 ex) 상열감, 뽀루지, 기미, 주근깨, 복통 등
<諸病源候論>	· 寒邪뿐만 아니라 熱邪도 어혈을 형성할 수 있음을 제시
<千金要方>	· 어혈을 부인의 질병을 일으키는 주요 인자로 봄 · 精神, 墮墜 타추, 추락 跌仆 절부, 넘어짐 등도 어혈을 일으키는 인자
<三因方> - 진무택	· 어혈 발병 이론에 대해 언급한 바 있음 ↳ 哀怒가 간을 손상시켜 간울기체 → 혈행 불창 → 맥락 막힘 → 양협 동통 ⇒ 감정으로 인한 어혈의 생성을 제시
<丹溪心法> - 주단계	· 痰瘀挾雜(어혈과 담이 같이 나타날 때): 肺脹易嗽 或左或右 不得眠 증상이 나타남 · 후세의 痰瘀相關 이론에 대하여 적지 않은 영향을 끼침
<王肯堂> 왕 금 당	· 痛有定處를 어혈의 주요 증상으로 보았음
<葉天士> 葉桂	· 병이 오래되면 기혈 순행이 불리하여 혈액에 응체되어 어혈이 형성되면 병이 오랫동안 낫지 않는다고 주장 · 痺證, 痛證, 鬱證, 積聚, 癥瘕 등 여러 가지 병증에서 活血化瘀 通絡의 효능이 있는 약물을 광범위하게 응용함 · 위기영혈변증에서 涼血散血의 치법을 주장

<동의보감>	· 축혈증을 설명하며, 어혈의 증상에 대해 논함 “상부에 축혈하면 잘 잊어버리고, 중부에 축혈하면 가슴이 그득하고 몸이 누렁고 양치만하고 물을 삼키려하지 않고, 하부에 축혈하면 발광하고 변이 검고 아랫배가 단단하고 아프다.”
<의림개착> - 왕청임 - cf) 왕금당과 왕청임 모두 왕씨여서 헷갈리죠? -> 잘알아두기	* 청나라로 서양의학이 유입되어 혈액 자체에 대한 인식 확장된 시기 · 어혈 발병의 병리(기에는 허실이 있고, 혈에는 虧와 瘀가 있다)를 서술하면서 離經之血도 어혈의 범주에 귀속 · 왕청임은 어혈학설 발전에 큰 공헌을 함 → “외감내상을 막론하고 상하는 바가 기혈이 아님이 없는데 氣에는 허&실이 있고 / 혈에는 虧&瘀가 있다.” → 통규활혈탕, 혈부축어탕, 격하축어탕 창안 (촉어나 활혈의 명칭이 있는 처방)
청대 <血證論> - 唐容川 당 용 천	· 어혈의 지표: 일정한 부위가 있고 침으로 찌르는 듯한 통증 ↳ 어혈 발병의 특징에 대해 철저하게 분석함 - cf) 혈액순환이 안 되는 사람의 혈관을 보면 정맥혈이 확장되면서 어전, 어반과 같은 양상으로 정맥혈이 잘 보이게 됨 (설진, 입술, 눈혈관 등을 잘 볼 필요 有)
일본	1910년대 이후) 湯本求真(사람이름임..) : “어혈의 瘀는 汚穢의 뜻이며 더러워진 비생리적 혈액으로 세균의 배양기가 되는 유해한 독성을 가진 혈액이다.” 1938년) 津間駿輔: “어혈은 정체와 유체의 뜻이 있다.” 최근) 비생리적 惡血 血毒의 뜻으로 인식하려는 경향과 留滯血液으로 인식하려는 경향 有
중국	· 어혈을 단순한 물질적인 면에서 연구하기보다 기혈담의 상호관계에서 체계적으로 파악하려고 함

5. 치료

📌기출/악마: 어혈치료 시 변증요점을 쓰시오. (05, 06)

1) 변증 요점

① 어혈 발생 부위를 구별해야 함

- 혈의 운행은 이르지 않는 곳이 X
- 상/중/하초, 사지, 심맥, 폐맥, 경락에 따라 증상이 다른 “**刺痛 강조**”

상초	健忘健망 胸背肩膊刺痛흉배견전자통 視野不明시아불명 煩燥번조
중초	脘腹刺痛완복자통 腹中脹滿복중창만 胸脇疼痛흉협동통
하초	小腹硬滿刺痛소복경만자통 譫語如狂섬어여광 大便色黑대변색흑
사지기주(肌腠)	四肢腫脹刺痛사지종창자통 顏色青紫안색청자 紅斑結節홍반결절
심맥	心刺痛심자통 ⇒ 심자통이 나타나면 심전도, 초음파를 해보아야 함
폐맥	咳嗽해수 咯痰객담 喘促천촉
경락	肢體麻木疼痛지체마목동통 活動不利활동불리 癱瘓단탄

② 한열을 구별해야 함

- ┌ 열증어혈: 熱邪나 음허 등으로 발생
 - ↳ 發熱, 口渴, 面紅, 目赤, 尿黃, 便結, 舌紅, 苔黃, 脈數 등의
- └ 한증어혈: 寒邪나 양허 등으로 발생
 - ↳ 惡寒, 喜暖, 得熱症減, 口淡不渴, 小便清長, 舌淡苔白, 脈緩 등

③ 허실을 구별해야 함

- ┌ 주로 실증에 해당함 – 한사응체나 熱邪薰蒸열사훈증으로 인한 어혈증
- └ 허증 – 기허, 음허, 양허로 인한 병증으로 어혈증이 오래되어 정기를 耗傷하고
기혈음양휴허의 정황을 겸함으로써 나타남
+) 여기서 허증은 허실헵잡증에 해당함

2) 치료원칙

↳ **활혈화어**를 기본으로, 꼭 **한열허실을 판별**할 것

한증어혈	溫經散寒온경산한
열증어혈	清熱解毒청열해독 瀉熱通腑사열통부
실증어혈	理氣行氣이기행기
허증어혈	益氣익기 養血양혈 滋陰자음 溫陽온양

【활혈화어는 기본, 한열허실에 따른 치료 원칙】

3) 변증시치 - 한/열/허/실에 따라 기출/악마: 허증혈어의 증상 10가지 이상과 처방을 쓰시오. (03)

		증상	치법	처방
寒證血瘀		心胸痞悶 肌肉筋骨關節等處疼痛 麻木 重着 關節屈伸不利 時而刺痛 疼痛部位固定不移 得溫疼痛減輕 喜暖 惡寒 舌質紫暗 或有瘀點瘀斑 苔薄白 脈澀	溫經散寒 活血祛瘀	온경탕 신통죽어탕 몰약제통탕
熱證血瘀	熱盛血瘀	壯熱 口渴 頭痛 煩燥不寧 或有神昏譫語 肌膚發斑 甚或衄血 吐血 便血 舌絳 或紫暗 苔黃 脈滑數	涼血化瘀 解毒活血	선방활명음
	瘀熱互結	身熱 少腹堅滿脹痛 小便不利 大便色黑 神亂如狂 舌有瘀斑 脈沈實有力		청온패독음
	血瘀成癰	發熱 煩渴 病變部位腫脹 煩熱 頭痛 活動障礙 甚至局部化膿 舌紅 苔黃 脈數		도인승기탕 서각지황탕
	→ 선방활명음 외에도 탁리소독음도 괜찮은 처방 - 황기를 군약으로 하는 처방으로 응저를 치료할 때 좋음			
實證血瘀	頭面血瘀	頭痛 目痛 白睛紫赤 或頭髮脫落 或健忘 眩暈 或少寐多夢 或作癲狂 或發癰證 舌有瘀點瘀斑 脈弦澀	行氣活血 攻下逐瘀	혈부죽어탕 통규활혈탕 도인승기탕 소복죽어탕
	胸脇血瘀	心胸或脇肋刺痛 痞悶不舒 舌質紫暗 或有瘀點瘀斑 脈弦澀 或結		
	血瘀成積	腹中或脇下積塊 固定不移 疼痛拒按 皮膚有赤絲縷紋 甚則腹堅青筋顯露 或有腹瀉甚至久瀉 或大便色黑 舌質紫暗 脈沈澀		
	小腹血瘀	少腹脹滿疼痛 或有積塊 或有淋濁 小便短少 甚至癃閉 或尿血 顏色紫暗 舌紫暗 或有瘀點瘀斑 脈弦或澀		
	瘀阻經絡	肢體疼痛 麻木 或肢體活動障礙 發生偏癱 手足不溫 膚色青紫或蒼白 舌質紫暗 脈細澀		

虛證血瘀	氣虛血瘀	神疲乏力 心悸 氣短 動則益甚 食少 顏面微浮 或心胸刺痛 或頭痛 健忘 或半身不遂 或腹中積塊疼痛 舌色淡黯 脈緩而弱	益氣活血	補陽還五湯 桃紅四物湯
	血虛血瘀	頭暈 眼花 心悸 失眠 面色萎黃 或身體某部刺痛不移 或有血瘀積塊 舌質淡 有瘀點或瘀斑 脈細澀	養血活血	
	陰虛血瘀	微熱 手足心熱 形體消瘦 頭暈 兩目乾澀 心胸脇肋或胃脘部刺痛 舌質紅 有瘀點 或瘀斑 苔少 脈弦細數	滋陰活血	
	陽虛血瘀	倦怠乏力 喜暖畏寒 面色蒼黃而黯 或有心胸刺痛 或四肢水腫 舌質淡紫 或舌淡而有瘀點 脈沈細澀或結或遲	溫陽活血	
	→ 보양환오탕의 군약은 황기 - 황기와 같은 氣家약으로써 나머지 陰적인 약을 도와서 약효를 발휘하도록 함 → 단삼을 군약으로 한 보양환오탕보다 더 효과가 좋음			

6. 조리 및 예방

- 유발인자(과로, 스트레스, 육기, 담음 등)를 조절해야 한다. → 적당한 운동
- 더위나 추위에 노출되지 않도록 적절한 온도를 유지해야 한다.
- 외상이나 타박에 의해서도 어혈이 생길 수 있고 과도한 철정 발현에 의해서도 어혈이 생길 수 있으므로 편안한 마음을 가져야 한다.
- 짠 음식과 기름진 음식을 피하고 단백질 음식을 섭취해야 한다.
- 과도한 음주와 흡연도 삼간다.
- 항혈액응고제를 복용하는 경우 비타민K 섭취량을 조절하며 특히 미역, 시금치, 양배추, 브로콜리, 청국장 등의 음식에 주의한다.
- 자주 체위를 바꿔주고 고정된 자세를 피하며, 자주 스트레칭을 해주며, 예방 차원에서 탄력 스타킹을 착용하는 것이 좋다.

7. 예후

[한/열/허/실 4개의 대분류]

- ① 寒: 陰邪로 양기를 손상 → 한증어혈이 오래됨 → 양허어혈(치료: 散寒+助陽)
- ② 熱: 陽邪로 쉽게 陰津을 손상시켜 후기에는 음허혈어로 전화한다.
- ③ 實: 실증은 주로 기체어혈을 의미하며 오래되면 허증어혈로 전화한다.
- ④ 虛: 일반적으로 혈어는 邪實의 범주에 속하는데 허증어혈은 실제상 正虛邪實
↳일반적으로 허실험잡하여 나타나는 경우도 많고 전화도 된다

8. 어혈 관련 질환과 임상 연구

- 완전 간단하게 하고 넘어가셨어서 중요하지 않아보입니다.

- 1) 이상지질혈증 - 약을 썼더니 좋아졌다는 결과,,
- 2) 폐색성 동맥경화증 - 이 질환에 실제로 양약을 많이 씀
- 3) 심부정맥혈전증 - 이미 양약을 먹고 있는 환자들 多

2024 심계내과학(신선호) [7주차] 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

✓ 발표에 대한 교수님 첨언 정리

: 발표 내용 자체는 시험에 안 나오지만, 발표를 시키는 순서를 보니 교수님께서 학생들에게 전하고 싶은 내용에 따라 빌드업(?) 형식으로 시키시더라고요!
그래서 발표 내용을 정리하기보다는 처방에 따라서 교수님께서 첨언하신 내용만 정리해두었으니 가볍게 읽고 넘어가시면 될 것 같습니다.

- 검은색 - 교과서 내용
- 파란색(글씨, 표 배경색)
 - 교수님께서 설명하신 내용 (아래 발표한 처방에 대한 설명도 파란색 표!)
- 빨간색 - 교수님께서 강조하신 내용
- 기출/악마 - 기출/악마에 나온 부분이면 제목에 표시해두겠습니다.
(자세한 답안 정리는 따로 악마 파일에 정리해두겠습니다~)
- 회색 - 교수님 여담, 중요하지 않은 내용 등
- 밑줄 및 볼드: 쌤부가 임의로 표시한 것 (가독성을 위해)

[발표 처방] 대금음자, 주증황련환, 향사평위산, 치자시탕, 황련해독탕,

대금음자

- ✓ 평위산과 약물 구성은 같으나 군약이 "진피"인 처방
- ✓ 같은 숙취여도 어떤 술로 인한 건지에 따라 처방이 달라짐
 - 대금음자, 굴피일물탕계열: 맥주처럼 차가운 술을 많이 먹어서 머리도 멍하게 아프고, 설사도 짹짹하고, 몸이 그냥 냉장고가 된 상황일 때 사용
 - ↳ 자극을 줘서 움직이도록 할 때 쓰는 처방

주증 황련환

- ✓ 대금음자와 달리 고량주, 양주를 먹고 무지하게 취해 입에서 단내, 답답해서 잠을 못자, 대변도 활변을 보고 냄새도 매우 심할 때 쓰는 처방 (열증으로 피부에 반점이 생기기도 함)
- ✓ 중국과 한국의 용량 차이
 - 중국에서 하루 분량 = 1재 / 한국에서 하루 분량 = 1첩

향사 평위산

- ✓ 평위산, 향사평위산, 향사육군자탕, 사군자탕 계열 = 소도지제, 건비지제
- ✓ 향부자와 같은 약재를 소화에 쓰는 효과
 - = 평소에도 스트레스를 많이 받아서 소화기가 안 좋고 체했을 때 기운을 풀어주면서 소화를 도움
- ✓ 교수님: 요통 환자에게 향사육군자탕을 쓰기도 함
 - ↳ 원인 불명의 가스가 요추를 눌러 생긴 요통

치자시탕

- ✓ 치자시탕의 치자와 두시는 족소양담경약, 즉 이담약
 - 여기서 "이담" (≠ 소화액 분비 촉진)
 - = 속 끓어 생긴 허번증의 화를 내려주는 효과 (체온이 38도, 39도 이런 열 X)

황련 해독탕


- ✓ 많이 쓰는 처방
 - cf) 경희대에서는 황금황련황백에 치자 대신에 다른 약을 넣어서 중풍 치료, 각종 염증 치료에 사용하는 처방을 만들어 사용하기도 함
- ✓ 황련은 특히 대사증후군(당뇨, 고지혈증)에 탁월한 효과가 있음
 - ↳ 단, 황련을 많이 썼을 땐 맛이 아주 안 좋으니 환자에게 미리 설명하기
- ✓ 황련해독탕 + 사물탕 = 은청음
 - ↳ 효과 짱 좋고 교수님이 많이 쓰시는 처방
- ✓ 삼초의 적열을 풀어준다 = 삼초의 이화작용 과항진이 캄다운되도록
[삼초의 의미] 상/중/하초에서 이화 작용을 주관함 (=> 삼초기화)

응답 사간탕

- ✓ 간경이 지나다니는 쪽에 실열(실증)이 있을 때 효과 좋은 처방

제11절 화열증(火熱證)

1. 火의 개념

정의	溫, 熱, 暑를 포함하여 양성한 기가 化生한 것
화/열 비교 	· 화: 심화상염, 간화항성, 위화치성처럼 內生한 병리 상태 ↳ 정기, 사기 모두 될 수 있음 └ 少火: 인체의 정기로, 생리적으로 온후작용 └ 壯火: 양성태과하여 인체정기를 소모하여 病邪가 된 것 · 열: 풍열, 서열, 습열처럼 外淫에 속함 ↳ 정기에 속한다는 설명 X cf) 풍열: 감염성질환 + 열이 들 때 서/습열: 여름에 나타날 수 있는 열 (습은 서보다 좀 더 무거운 느낌)
온/화열 비교	성질이 같고 정도의 차이만 有
화열병 내외구분	· 내생에 속하는 경우: 장부경락의 음양실조로 생긴 것 · 외감에 속하는 경우: 온열사기를 직접 감수한 것
五氣化火	화열을 일으키는 외사는 온열사 외에도 肺한서습조 등으로 인한 것이 有 [풍한습조가 火로 전화하기 위해서 반드시 갖춰야 할 조건] ① 오랫동안 鬱하여 화로 변하는 것 ② 체질 인자 → 양성체질, 음허체질 모두 쉽게 從陽하여 化火 ③ 邪의 침범 부위와 관련이 있을 때 ex) 양명조금에 침입하면 화로 변하기 쉬우나 태음습토에 침입하면 그렇지 X
계절성	炎熱한 여름에 양성하지만 暑邪처럼 뚜렷한 계절성은 없어 다른 계절에도 발병할 수 있음
한의학에서 화열증의 범주	체온이 상승하는 염증성 질환의 발열뿐 아니라, 심리적 요인, 자율신경 이상, 내분비 이상 등 체온상승은 없지만 열감을 호소하는 상열감, 상열하한, 안면홍조, 수족심열, 번열 등을 포함

2. 역대제가설

내경	화는 오행의 하나로 배속되어 양기, 온열 약물의 성질, 열, 오운육기의 기 등으로 인식
손사막	비급천금요방에서 膏火에 의해 精欲이 왕성하고 그로 인해 정을 남발할 수 있으니 잘 갈무리하여 섭생해야 한다고 함
허숙미 許叔微	허리의 腎氣가 왕성한 것은 眞火
이동원	心君이 편하지 못하면 火가 발생이 되고 火는 七情의 賊 ↳ 火로 인해 정상적인 정신활동이 힘들 수 있으며 陰火에 대해서 처음으로 논함
유완소 劉完素	소문현기원병식에서 육기가 모두 화가 될 수 있고, 寒涼藥으로 치료해야 한다고 함
동의보감	화는 원기의 적이며, 화로 인한 병은 해로움이 크고 변화가 빠르며, 증세가 뚜렷하고 죽는 것도 빠르다고 봄 / 화열에 대한 다양한 분류, 치료법을 제시
정국팽 程國彭	의학심오에서 實火를 賊火 / 虛火를 子火라고 표현함

3. 병인병리

- 外因으로는 크게 풍한사로 인한 경우, 熱邪로 인한 경우로 나눌 수 있음
- 五氣가 허할 때 풍한사가 침범하게 되면, 상한이나 온병을 일으키게 되어 발열하게 됨

1) 화열사기의 특징

📖 화열의 특징은? (03)

- 자연계의 화열이 연소하여 출현하는 火熱上騰(위로 올라가는) 및 紅赤明亮(얼굴이 붉은) 등의 현상
- (1) 화열은 양사 “火熱爲陽邪, 其性燔灼炎上”
- (2) 화열은 진액을 잘 소모시키고 燥하게 만듦 “耗傷陰津 易生燥熱: 화열은 원기의 적”
* 관련 증상: 구갈희음, 대변건결
- (3) 화열을 풍을 일으킴 (각종 퇴행성 신경계 질환) “生風動血 易致腫瘍”
- (4) 심은 혈맥을 주관하고 神을 저장 “與心相應”

2) 화열의 증상

📖 화열의 증상은? (05, 06)

전신 혹은 국소의 현저한 열상	발열, 喜冷, 面紅, 目赤, 舌紅 등 염증성 증상
배출물이 粘稠 배출시 작열감, 병세는 급함	끈기 있는 痰, 混濁尿, 급성하리, 악취가 나는 대변, 肛문의 열감
진액을 소모	舌乾少津, 口渴喜冷, 大便硬
脈絡을 傷灼	출혈, 發疹
신명을 요란	의식불명 躁狂

cf) 화열의 맥상: ㄱ 홍맥(실화): 팽팡팡 뛰는 것 -> 눌러도 힘이 계속 있는 것
ㄴ 대맥(허화): 딱 누르면 힘이 없음 (위에선 힘이 있는 것 같은데,,)

3) 화열의 진단

: 언제, 어느 부위에 열이 발생하는지, 허열인지/실열인지, 열의 발생 형태가 어떤지?

- (1) 手按辨熱深淺: 희안/거안을 구분하는 건데 쉽지 않다
- (2) 審臟腑熱: 장부의 열
 - 심열병은 顔部가, 비열증은 鼻部가, 간열병은 左頰이, 폐열증은 右頰이, 신열병은 턱이 먼저 붉어짐. → 각종 안면부, 피부과 질환도 열과 관련 有

4. 치료법

1) 화열증의 치료 총론

- (1) 靜心制火: 心을 안정시켜 火를 제어 → 말이 쉽죠,,,,,, ㅎㅎ
- (2) 退熱法: 심을 맑게 해주는 것으로 반드시 맥문동 증심초 백출 복령을 써야 함
+) 壯熱, 번조에는 시호, 황금, 대황으로 解利시키고 열이 해산되지 않으면
황금 천궁 감초 오매를 중심으로 황련 생지황 적복령 등심을 가하여 복용

시호

= 아스피린 느낌 -> 해열

↳ 시호계지탕: 아스피린처럼 해열 쪽에 강함 (양이 많을 때)

고열에 썼을 땐 별로 반응이 없지만, 37~38도까지는 많이 쓰면 열이 떨어짐

(3) 臟腑瀉火藥

↳ 삼초 이화작용의 과항진으로 발생한 열을 꺼주는 것 (실열 X)

: 상초열에는 치자, 편금 / 중초열에는 황련, 작약 / 하초열에는 대황, 황백을 사용

[증상] 가슴 두근거리고 / 많이 먹어도 배고프고 / 소변량이 많고

(4) 화열의 통치약

<丹心> 制熱하고 瀉火하는 데는 甘寒之氣味가 아니면 안됨

大熱, 맥이 홍대한데는 苦寒지제를 쓰고, 해열되지 않으면 석고를 加.

↳ 석고: 양명경 열을 기가 막히게 꺼주지만, 광물성 약재니까 주의할 것

여름에 화가 망동하면 익원산 사용

<得效> 實火에는 황련해독탕류로 瀉하고 虛火는 삼출, 생감초 종류로 補

<丹心> 화가 盛한 데에는 한량한 약을 급하게 쓰지 말고 반드시 溫散을 겸해야 함

+) 화열의 痛治에는 방풍통성산, 황련해독탕을 통용

↳ 방풍통성산: 통풍에도 응용 가능

(5) 甘溫除熱法과 引火歸源法

- 화열에 대한 인식은 한의학 역사 상 가장 많은 논란을 불러일으킨 존재

	특징	적용할 수 있는 상황
甘溫除熱法	· 황제내경에서 처음 등장 · 이동원을 통해 큰 발전을 이룸	① 내상발열일 때 (↔ 외감) : 정신적 스트레스, 식습관 불균형, 피로로 인해 발생한 발열 ex) 마라톤하고 입에서 단내나면서 얼굴이 혹 달아오를 때 계지탕을 써서 열이 원래 자리로 가도록 하는 방법이 감온제열법이라고 할 수 있음 ② 허약자의 감기, 만성감염증, 기능성 발열, 고령자의 항생제 내성균 감염 (MRSA, VRE 감염) 등
引火歸源法	화열증 치료를 위해 육계+부자가 함유된 팔미환을 사용하는 것으로 대표되는 처방	임상에서 고령자의 장시간 발열, 허약자의 감기, 만성 감염증 등의 상황

2) 화열증의 치료 각론

(1) 군화와 상화

군화	상화
형/질이 상생하여 오행에 배열되었으므로 君 - 군화가 명령 ↳ 심은 군주지관, 신명출언이라는 말처럼, 실무를 수행하기보다는 명령하는 것	머무는 곳 없이 발생하여 자기 직분을 지키며 명령받거나 그 동작으로 나타나니 相 - 상화가 수행 ↳ 실제로 일을 하는 것
소장의 작용	심포락 삼초의 작용
心火 습으로 攻하고 수로써 減할 수 있으니 황련지제로 조절	龍火 수로 감할 수 없으므로 黃蘗지제로 하강

(2) 음양화

- └ 陽虛로 인한 火: 주간에 발열이 심하고 야간에는 경하며 口中無味
- └ 陰虛로 인한 火: 오후에 발열하고 夜半에는 그치며 口中有味

→ 陰虛內熱음허내열/陰盛內寒음성내한, 陽虛畏寒양허외한/陽盛畏熱양성외열,
陰虛火動음허화동으로 나눌 수도 있음

(3) 허실화 - 허실화의 4대 치법 <의학심오>

	法	기전 (→ 방법)	처방
甘溫除熱法	發	풍한응폐하여 화사내울 (→ 升發)	승양산화양탕류
	清	내열이 왕성 (→ 寒涼)	황련해독탕류
	攻	화기가 울결해서 대변불통 (→ 攻下)	승기탕류
	制	眞水가 有虧 不制 (→ 滋其腎) (물이 부족해 열을 못 끄는 상황)	지황탕류
引火歸源法	達	肝經氣結해서 五鬱相因 → 順氣性而升之 (→ 木鬱則達之)	소요산류 ↳ 소달시켜주기
	滋	허화상염 (→ 滋其水 鎮陽光)	육미탕류
	溫	노역으로 神疲하고 원기손상으로 생긴 陰火가 乘其土 (→ 溫之(勞者溫之))	보중익기탕류
	引	腎氣가 허한하여 無根하여 지키지 못한 火가 펴박당하여 위로 뜸 (→ 壯水약 중의 辛熱제로 導之下行) (導龍入海 引火歸元)	팔미지황탕류

cf) 發 + 清 + 攻: 방풍통성산의 역할

(4) 오장열

	정의	증상	처방
간열	기육 하부와 골 상부에 열이 있는 것	寅時, 卯時 사이에 甚, 四肢滿閉, 대변난통, 전근, 多怒多驚, 筋痿, 침상에서 일어나지 못함	사청환 시호음자
심열	피부 하부 기육 상부에 열이 있는 것	日中에 甚, 심번, 심통, 掌熱感	도적산 황련사심탕
비열	輕하지도 重하지도 않은 중간에 열이 있는 것	야간에 甚, 怠惰, 嗜臥, 사지불수, 무기력	실열: 사황산 조위승기탕 허열: 인삼황기산 보중익기탕
폐열	가볍게 按하면 피모 하부에 나타나고 깊이 누르면 없어짐	태양이 西天에 기울어질 때 甚, 천해, 한열	經: 사백산 重: 백호탕 양격산
신열	가볍게 按하면 열하지 않고 깊이 누르면 骨 部に 열감	열이 손가락을 찌는 것 같고, 불로 굽는 것 같다. 骨이 蟲蝕하는 것 같고, 困熱하여 감내하지 못하고 침상에서 일어나지 못함	자신환 육미지황환

(5) 삼초화: 방풍통성산, 황련해독탕 多用

삼초화의 통치방은? (01, 03)

다음 중 관련있는 것끼리 연결하십시오. (11) - 증상/치법 연결

	증상	처방
상초	咳嗽 肺痿 眼目赤腫 頭項腫痛 口舌生瘡	涼膈散 龍腦飲子 抑青丸 清心湯 黃芩湯 清金丸 朱砂涼膈丸 九味清心元 黃連清膈丸 上清元 清金降火丹 子芩散 既濟解毒湯 加減涼膈散
중초	大便秘結, 胸膈煩躁, 飲食不味	調胃承氣湯 洗心散 四順清涼飲 當歸龍薈丸 桃仁承氣湯 白朮除濕湯 既濟清神散
하초	尿血, 小便不利, 小便赤澁, 大便秘結	大承氣湯 立效散 八正散 五苓散 防風當歸飲子 黃柏丸 回金丸 左金丸

통치방: 三黃湯 三黃元 三補丸 加味金匱丸 清心丸 大金花丸 黃連解毒湯 防風通聖散 清火湯

(6) 적열(積熱)

: 장부에 열이 鬱積된 것으로 煩赤, 번갈, 구설생창, 五心煩躁

(7) 골증열: 뼈속 깊이 쑤시는 열

골증열의 원인, 증상, 치법은? (01)

↳ 음허가 극에 달했을 때 생기는 경우가 많음 (체력적 소모가 많은 사람에게 多)

- 骨病은 5종이 있는데, 骨蒸은 病根이 腎에 있는 것이다.
- 모두 음기가 부족하고 기혈의 不榮으로 골수가 고갈되어 발한다.
- 사람이 嗜慾을 조절하지 못하고 노상을 과도히 하면 眞水가 고갈되고 음화가 上炎해 생긴다
- 증상은 해수, 발열, 객혈, 吐痰, 白濁 白淫이 배출, 유정, 도한, 정신황홀, 점차 消瘦, 勞劇
- 치료 : 보음지제 사용 → 五蒸湯, 地骨皮散, 人蔘清肌散, 補腎清骨湯

(8) 五心熱, 수족냉감

- 오심번열: 手足掌心과 心臟腑가 다 열한 것. 화울로 인한 것
- 사지는 비토에 속하는 것인데 심화가 비토 중에 하함하여 서함하지 못하고 울결
→ 근본은 혈허에 기인하며, 혹은 냉물을 과식하여 발생
- 升陽散火湯, 火鬱湯 사용

- 수족번열 (화열증의 중요한 증후): 만성피로한 환자 가운데 2.8%에서 나타남

↳ 자율신경실조증 환자인 경우 많으며, 애기를 잘 들어주는 것이 중요함 (치방은 귀비탕을 多用)

cf) 수족냉증: 손발 차갑 + 저린 증상

↳ 따뜻하게 해주기 (건강, 부자, 초오,, 진교(삼비의 성약))

(9) 五心熱, 수족냉감

- : 열이 조수와 같이 일정한 시간에 왔다갔다 발열하는 것 (일포: 해가 질 무렵)
→ 平朝의 조열은 열이 陽分에 있는 것으로 백호탕을 사용
→ 日晡時의 조열은 열이 陰分에 있고 地骨皮散을 사용

(10) 虛煩

: 심흥이 煩擾해 평안하지 못한 것

(11) 오열, 오한

→ 전체 증상을 봐야 함 (외감일 수도, 자율신경 실조일 수도 있고,,)

(12) 음주발열

- : 술은 습열을 유발하므로 과음 후에 발열.
- 황련해독탕, 반하사심탕

(13) 어혈발열 (滯血)

어혈 발열의 증상과 처방은? (05, 06)

- ① 증상: 맥이 삽해 물로 양치만 하고 嘔下하지 X, 痰涎嘔逆 兩脚厥冷 小腹急結증이 있으며 唾紅하고 鼻衄함
② 처방: 시호, 황금을 쓰되 천궁, 백지, 도인, 오령지를 좌약으로 삼고 大黃濃蜜을 加

(14) 열의 晝夜相異

(15) 暑病

서병의 정의와 증상은? (01, 03) / 中暑와 中熱을 비교 설명하시오. (05, 06)

- ① 정의: 하지 이후의 열병
② 증상: 身熱 自汗 口乾 面垢
③ 종류 ㄱ 中暑(陰證): 찬 것을 많이 먹거나 에어컨을 많이 켜서 생긴 냉방병
ㄴ 中熱(陽證): 일사병, 열사병 (행군, 농사일 등)
④ 처방: 보중익기탕, 생맥산

(16) 안면홍조

계지복령환에 대해 설명하시오. (구성과 적응증) (18)

- ① 계지복령환 - 실증에 (→ 피부과 질환↑)
: 등산, 마라톤 등 운동 후 상열이 혹 달아오른 경우 주로 위쪽에 작용하여 올라온 상열을 제자리로 보내주는 역할
② 당귀작약산 - 허증에
: 경계에 통증도 좀 있고 하신 분들

(17) 고열의 관리

- : 고열 = 체온이 급격히 38.5도 이상으로 상승되어 4시간 이내에 소실되지 않는 상태
↳ 양한방 협진 必 - 고열은 급증인 만큼 치료시기를 놓치지 않아야 함

5. 조리 및 예방

- 1) 과도한 스트레스는 기체, 기울을 조장하여 내열을 발생할 수 있게 되므로 정지과극은 피하기
- 2) 고량후미의 과다 섭취는 내열을 조장하므로 담백하게 식사하기
- 3) 풍한사와 열사에 과도한 접촉은 화열증을 조장할 수 있으므로 피하도록 하고, 적절한 체온 유지에 주의하며 고온다습하거나 너무 건조한 밀폐된 곳에서 활동할 경우에는 환기에 유의하여 건강 챙기기

6. 예후 는 좋거나 말거나 겠죠?

7. 화열 관련 질환 및 임상 연구

1) 고혈압

↳ 고혈압은 유전의 영향이 크기 때문에 가족력이 있으면 관리하는 건 필수!

(스트레스나 급성 요인으로 인한 간양상항, 고혈압, 음허로 인해 잠깐 높아진 간신음허 고혈압에 만 한약이 효과가 있지, 본태성 고혈압처럼 만성인 것은 효과가 미미함)

[변증시치]

	증상	치법	처방
肝陽上亢	頭痛面眩 心煩易怒 面紅目赤 睡眠不寧 口苦 舌質紅 舌苔黃 脈弱惑弦數	平肝潛陽 瀉火	天麻鉤藤飲 鉤藤散
肝腎陰虛	頭痛 眩暈 耳鳴 骨蒸潮熱 盜汗 腰痛痠軟 神疲乏力 遺精 帶下 失眠 舌質紅 舌苔少 脈細數無力	滋補肝腎 補腎益元	六味地黃丸 杞菊地黃丸
濕痰內阻	頭痛昏蒙 胸脘滿悶 惡心 嘔吐痰涎 身重勞倦 舌苔白膩 脈滑或弦滑	祛濕化痰 滲濕利水	半夏白朮天麻湯 五苓散
氣虛	隱隱頭痛眩暈 少氣無力 食慾不振 自汗 舌苔薄白 脈虛無力	健脾益氣	補中益氣湯
瘀血內阻	頭痛經久不愈 痛處固定不移 心悸 怔忡 胸悶 夜間尤甚 舌質紫或有瘀斑 苔薄白 脈細或細澀	活血化瘀	血府逐瘀湯