


비만약 위의 내용과 무관하게 별도

1. 식욕감퇴제 Anorexiant: Appetite suppressants

: **펜터민 Phentermine** / 디에틸프로피온 Diethylpropion



- 기전: 노르에피네프린, 도파민 증가 → Fight or Flight 반응 교감신경 활성화
- 부작용: 의존성, 남용가능성, 입마름, 두통, 불면, 변비



2. 리파아제 억제제 Lipase inhibitors 급성 췌장염 치료 주사제로도 많이 사용

: **오르리스타트 Orlistat** - 펜탄산 Pentanoic acid

- 기전: 위 및 이자 리파아제 억제 → 식이지방의 분해 억제
- 지방흡수 30%까지 감소
- 약동학: 지방 포함한 식사와 함께 경구투여
- 부작용: 유성반점, 방귀, 화급한 배변, 위장관 증상, 지용성비타민(A/D/E), β -carotene 복용 권고



3. 세로토닌 작용제 Serotonin Agonists

: **로르카세린 Lorcaserin** - 5-HT_{2c} 선택적 길항제

- 기전: 선택적으로 5-HT_{2c} 수용체 활성화
- 멜라노코르틴 Melanocortin 수용체 활성화에 의해 식욕감소
- 약동학: 심한 콩팥 손상 환자는 권장하지 않음
- 부작용: 구역, 두통, 입마름, 변비, 기면, 자살사고 정신 질환도 판단하여 약을 복용

