

세 번째 강의

학습 목표

① 흉부의 구조물

- 쇄골
- 흉골 검상돌기
- 늑골 (늑골각, 늑골연골)


② 복부의 구조물

- 백선 배꼽
- 장골능 치골상연

③ 흉복부 진찰


- 망진
 - 윤곽, 대칭, 변화, 운동성
- 청진
 - 호흡음, 장음
- 타진
 - 지지타진: 간의 위치 확인
- 촉진 안진
 - 복모혈 경근
 - 소흉근 복직근 장요근
 - + 외복사근 내복사근

흉복부의 경락 유주



1. 흉부

① 흉부의 형태 (쇄골, 흉골, 늑골, 검상돌기)





- 쇄골: 그림엔 일직선이지만 실제로는 거의 휘어있음
- 흉골의 병과 체의 경계선상도 찾을 수 있기는 한데 세게 눌러서 찾기는 힘들
- 늑골 연골이 탄력을 결정함 -> 늑연골의 양쪽 탄력성도 비교해 볼 것임
- 검상돌기: 끝을 찾기 어려움
- 양 쪽이 이루는 늑골 각을 살펴보기 (직각보다 넓은지, 좁은지. 사람마다 개인차가 심한 편)
- 11, 12번째 늑골은 떨어져서 뒤쪽에서 만져짐 -> 하부 확인
- 오웬돌기를 쇄골, 쇄골지로 헛갈릴 수 있음!

- 쇄골 끝에 견쇄관절 존재


② 흉곽

- 대칭적, 타원형 확인: 통흉(특 튀어나옴), 계흉(새가슴), 구흉(구부러짐) / 측만, 후만, 전만
- > 양쪽의 갈비뼈 대칭성이 있는지, 한쪽이 낮은지 높은지, 전체적인 높이는 어떤지 살펴보기
- 호흡 운동: 호흡 자세 (가슴으로 숨 쉬는지 배로 숨 쉬는지)
- > 호흡 본다고 말하지 않고 보기 (말하면 신경쓰게 됨)
- 청진: 성음, 호흡음(흡기/호기), 기관지음(전면 1-2번째 늑간, 후면 견갑골 사이)
- > 청진기로는 주로 호흡음 확인



좌측 그림에선 2번(견갑골 사이), 우측 그림에서는 1번을 주로 확인 (원래는 번호 순서대로 다 듣는게 원칙이지만, 시간이 너무 오래 걸림)


- 심음: Erb's point



- 5군데에서 보통 듣는데, 그 중에서도 Erb's point 추천 (빨간색 포인터 위치)
- 1심음과 2심음을 구분하고자 노력하는 것이 중요

2. 복부

1) 복부의 형태 (백선, 배꼽, ASIS, 치골상연)



- 배꼽 기준으로 백선을 긋고, 상하좌우 네 구역으로 나눔
- 치골상연은 아래에 생식기가 있기 때문에 상대방의 동의를 반드시 구하기 + 환자의 손을 이용해 촉진 or 빠르게 촉진하는 스킬 필요
- 복부의 구조물은 그렇게 중요하지 않음
- 갈비뼈, 장골능 사이의 공간을 비교해보기 (너비, 탄력 등)

2) 복부 망진, 청진, 타진, 촉진

① 망진


- 윤곽확인: 대칭 상태 확인(색상변화, 점, 반흔, 정맥망 / 국소적 팽윤,

비대칭 여부) / 움직임(호흡 / 연동 운동) -> 연동 운동이 확인되면 안 좋은 상태인 것 (심한 설사 or 쇠약한 상태인 것)

- 탄력성 확인: 체중 감소, 탈수, 체력 저하 등이 있으면 탄력성이 떨어질 수 있음

② 청진

- 회맹부에서 시작(시계방향): 분당 5회 30회 정도 / 혈관음 / 장명음
- 장명음으로 뭔가를 판단하긴 어렵지만 아예 안들리면 큰일



그림에 나타난 노란 점 중 5군데 정도 확인 (다 하면 너무 오래 걸림)

③ 타진

- 고음(장)/탁음(간)

④ 촉진


- 가벼운 촉진(1cm/온도/긴장감/경직/덩어리 살피기)
- 심부 촉진(4~8cm/운동성, 박동성, 경직, 통증 살피기)
- > 5cm 이상 누르는건 좋지 않음 / 두 손을 이용해 누르기 (뒤에서 자

세히)

- Fluid wave: 한 쪽을 누르면 반대쪽에서 파동이 일음
- 반동 압통: 장기에 염증이 있는 경우 눌렀다 떼었을 때 통증이 느껴짐

3. 흉복부 촉진


- (1) 복모혈 촉진: 중부, 단중, 거결, 중완, 관원, 천추 (꼭 눌러보며 좌우/상하 통증을 각각 비교해봐야함)



- 중부나 천추는 좌우 비교 쉬움 (양쪽에 있어서 2개라)
- 임맥 선상에 있으면 비교가 어려우니 경혈의 아래, 위를 눌러 비교
- 단중: 흉골과 갈비뼈의 결합을 가장 잘 드러냄
- 관원: 비뇨생식기계의 반응점
- 천추, 소장, 대장의 상태를 확인할 때 도움이 됨

(2) 흉복부 근육 축진 (소흉근, 복직근, 외복사근, 내복사근, 장요근)

① 소흉근



위치적 특징

- 오웬돌기 ~ 늑골 3, 4, 5 하방에 붙음
- 오웬돌기 근처에서만 축진이 가능함 (대흉근에 덮여있어서)
- 오웬돌기를 잡고 있기 때문에 누운 상태로 어깨가 떠 있다면 소흉근이 짧아진 것
- 그 앞이 대흉근으로 덮여 있음
- > 사진에서 주황 동그라미 부분만 축진 가능

작용

- 견갑골을 내리거나 아래쪽으로 회전시키는 작용
- 주로 어깨를 앞으로 내미는 작용을 하게 함
- > 웅크리고 앉아있는 직장인의 경우 대부분 소흉근 단축 존재
- 호흡 보조근으로 사용되기 때문에 달리기, 빠른 호흡과 연관이 있음
- 소흉근에 힘이 없으면 팔을 신전시키기가 어려움

경락

- 폐경의 유주와 겹침 (특히 폐경의 중부혈)
- 아래쪽은 위경의 영역이긴 하나 우리는 폐경 영역만을 만질 수 있음

축진

- 누운자세 / 앉은자세 -> 견갑골을 아래로 내리는 동작을 하게 함
- 소흉근의 위치, 얼마나 단단한지, 압통이 있는지 정도를 파악하기
- 근육의 결에 대해 수직으로 만지기

② 복직근



위치적 특징

- 치골결합에서부터 검상돌기와 5, 6, 7 늑골 상방에 붙음
- 아래는 좁고 위로 올라갈수록 넓어지는 형태의 근육

작용

- 척추관절에서 몸을 굽히거나 측굴할 때 도움을 줌 (특히 굽힘)
- 골반을 뒤쪽으로 기울이게 함

- 흉곽과 골반을 잇는 아주 강한 근육 (드물지만 좌우 차이가 나면 문제가 됨)
- 복직근이 제 역할을 못하면 주위 근육에 무리가 많이 감


경락

- 임맥과 위경에 걸쳐서 있음 (거의 위경)
- 바깥쪽으로 가면 비경, 신경에 걸쳐있음

촉진

- 누운 자세에서 복부가 드러나게 하고 고개를 들게 하면 복직근이 단축됨
- 엷몸일으키기 자세를 해서 긴장을 시킴
- > 좌우대칭, 얼마나 딱딱해지는가, 압통 유무를 확인
- 복횡근과 복직근을 구분해야 함 (복직근은 호흡 및 복압에 힘을 주는 데에는 관여 X -> 고개 들지 않고 배에 힘줄때 복횡근만 작용)
- > 두 근육을 구분해서 외측 라인을 잡아 보도록 노력하기

③ 외복사근, 내복사근



위치적 특징

- 외복사근: 아래쪽 6-8 갈비뼈에서 시작하여 치골과 장골로 넓게 퍼짐
- 내복사근: 아래쪽 갈비뼈 3개에서 시작해서 치골과 장골로 내려감
- > 외복사근과 내복사근을 구분하여 촉진하는 것은 거의 불가능
- > 위치를 찾고 어떻게 움직이는지 정도만 확인
- +) 대강의 모양과 내복사근 경계와 복직근 외측 경계를 찾는 게 중요

작용

- 몸통 구부리기, 비틀기 (+ 복압 올릴 때 복횡근과 함께 작용)

촉진

- 누워있는 환자를 손가락을 끼고 팔꿈치는 펴고 머리 뒤에 위치시킴 (엷몸 일으키기 할 때 자세)

④ 장요근 (대요근 + 소요근 + 장골근. 이 중에서 우리가 촉진할 것은 대요근. 소요근은 촉진 어려움)



위치적 특징

- 우리 몸의 가장 깊은 곳에 있는 근육 중 하나

- 오른쪽 사진에서 동그라미 친 부분을 찾아볼 것
- 대요근은 T12부터 L5까지 분포
- 앞가쪽 척추에서 시작하여 하외방으로 나가서 대전자(대퇴 상부의 돌기)의 소결절로 내려감

작용

- 고관절의 굴곡
- 앉거나 선 자세에서 몸의 균형을 안정적으로 잡아주는 코어 근육
- 일부 장기지지 및 운동 도와줌
- 뒤에 있는 근육과 협조하여 골반대를 안정적으로 유지하게 만들
- 장요근이 짧아지면 척추의 모양이 아주 이상해짐 + 호흡이 이상해짐

촉진

- 앉거나 누운 자세에서 누를 것 (앉은 자세가 더 좋음)




- 다음과 같이 근육 결을 따라 손모양을 위치시켜 촉진


경락

- 위경, 비경 라인에 위치함.
- 실제로 소화가 안될 때, 변비가 있을 때 장요근과 연관짓기도 함.

흉복부 경락 참고



3. 요배부



거의 대부분 방광경에 해당

(1) 요배부의 구조 (견갑골(극, 견갑 내연 하각), 늑골(늑척각), 척추(흉추, 요추), 장골(장골능, psis), 천골)

- ① 척추가 수직선으로 잘 구분되어 있는지 확인
- ② 경추, 흉추, 요추의 레벨 확인
- ③ 매우 마르지 않은 이상 뒤쪽에서 갈비뼈를 보기는 쉽지 않음
- ④ 늑척각 부위를 꼭 확인하기 (신장 문제 확인을 위해)
- ⑤ 장골 - PSIS를 확인하기 (뒤쪽에 가장 튀어나온 부위를 잘 찾아보기)
- ⑥ 견갑골 관련해서 극이 제대로 있는지, 떠 있지는 않은지 등 자세히 볼 필요가 있음


(2) 요배부의 기능

- ① 견갑골: 위치, 운동성
- ② 척추: 굴곡, 신전, 회전, 측굴
- ③ 장골: 위치

- 서 있는 것과 앉아있을 때 각각 비교해서 볼 필요 있음

(3) 요배부의 망진

- ① 견갑골: 위치
- ② 척추: 만곡, 방광경근 대칭성
- ③ 장골: 장골 대칭, 둔부 근육 대칭
- ④ 무게 중심선 확인



-> 뒤에서 본 모습과 옆에서 본 모습 비교

4. 요배부 촉진



(1) 기준점

- ① 유양돌기첨 C1
- ② 대추혈 C7
- ③ 견갑골상연 T2, 3
- ④ 견갑골하연 T7
- ⑤ 검상돌기 T9 - 말라있거나 살이 찌 있는 정도에 따라서 위치 변화 가능
- ⑥ 늑골하연 L2
- ⑦ 배꼽 L3, 4 - 살이 얼마나 찢느냐에 따라 달라지는거 유의
- ⑧ 장골릉상연 L4

(2) 요배부 청진, 타진, 촉진

- ① 청진
 - 등 부위 청진은 큰 의미 X


- 심음은 잘 안 들리고 호흡음 정도 확인할 수 있음

② 타진


- 타진도 큰 의미 X
- 늑척각 부위에 심장이 있기 때문에 주먹으로 가볍게 쳐서 확인

③ 촉진

- 배수혈을 꼭 확인해야함
- 근육: 기립근군, 능형근, 요방형근을 촉진할 것




배수혈 (치료 및 진단의 기준이 될 수 있음)



- 폐 T3 / 심 T5 / 간 T9 / 비 T11 / 신 L2

(3) 근육 촉진

① 기립근군 (장능근, 최장근, 극근)



작용

- 신전, 측굴, 회전(그 중에서도 주로 신전에 관여)
- 서 있을 때 지지하는 작용

촉진

- 목 주위의 기립근군은 목 근육과 구분이 어려움
- 촉진보다는 전체적인 좌우 두께와 기능을 확인
- > 목을 제외하고 아래쪽의 좌우 대칭 확인
- 부위를 세 부위로 나누어서 확인하는 것이 좋음 (T1-7, T7-12, 요추)
- 좌우 근육을 수축 이완을 반복시키며 비교해보기 (길이, 경결 정도)

② 능형근



위치

- C7-T5 극돌기에서 시작해서 견갑골 내측연에 정지

작용

- 승모근과 역할이 많이 겹쳐서 잘 사용을 안함
- 안정성이 떨어지면 어깨, 목까지 문제를 일으킬 수 있음
- 견갑골을 안쪽으로 모으는 일을 함

경락



- 방광경이나 소장경 정도에 해당

촉진

- 위에 승모근이 덮고 있어서 승모근을 제외하고 촉진하여 기능을 판단
- > 만질 때 승모근을 제외시킬 방법을 찾아보기
- > 견갑골을 들어올리면 승모근이 들려서 아래쪽을 만지는게 쉬움
- 옆드리거나 앉아서 촉진이 가능
- 대소 능형근의 구분은 불가능

- 위쪽보다는 아래쪽을 만져서 느끼는 것이 더 쉬움
- 판상근, 견갑거근, 능형근 사이의 공간을 만져볼 수 있으면 치료가 수월해짐

③ 요방형근



위치적 특징

- 심부근육이라 만지기 어려움
- 척추 기립근과 외복사근 경계 선상에 안쪽 깊숙이 있음

작용

- 대요근과 짝을 이루어서 골반의 균형을 잡아주는 중요한 근육
- 척추 관절에서 신전과 측굴에 많이 관여함
- 움직임보다는 오히려 버티는 역할을 많이 함
- 기립근과 함께 뒤쪽 벽을 아주 튼튼하게 받쳐주는 근육
- 요통이 일어나면 주로 요방형근에 통증을 호소하는 경우가 많음

- 요부 염좌에 빠지지 않고 등장하는 아주 중요한 근육
- 요방형근 문제 시 골반이 틀어져버림

경락

- 거의 대부분 방광경에 해당

촉진

- 눕거나 혹은 옆으로 누워서 확인
- 어떤 사람은 만져지고 어떤 사람은 움직이고 어떤 사람은 안 만져짐
- 문제가 있는 경우 압력을 주었을 때 통증을 느낌
- 깊숙이 있기에 엉덩이를 들어 올렸을 때의 움직임만 느낄 수 있음
- 사람마다 만져지는 위치도 제각기 다름