

✏ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.
- 발표 자료 다 걸어지면 매주 발표할 것이며 한주에 4명씩 한 주제당 5분씩 배정됨

✏ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색

▶ 오늘의 진도

[제 3장. 소화기계 질환]

· 제 1절. 내상

- 1. 개요 - 2. 서양의학적 이해 - 3. 한의학적 고찰

· 제 2절. 애역

- 1. 개요 - 2. 서양의학적 이해 - 3. 한의학적 고찰

· 제 3절. 구토

- 1. 개요 - 2. 서양의학적 이해 - 3. 한의학적 고찰

*침을 놓는 방법

- 오수혈 위주로 놓는 정경침의 경우 어떤 경을 고르는 것이 중요하다.
- 처음으로 진단하여 치료할 경을 고르고, (제일 중요) 부수적인 혈들을 정해서 치료한다.
(EX, 체했을 때, 어떤 것 때문에 체했는지 확인하고, 위가 상해서 그런 것인지, 다른 원인이 있는지 확인하는 것이 중요하다)

* 소화기 진단 팁

- 소화 관련 질환은 위를 먼저 생각하고, 소화효소를 분비하는 위장인 비, 대장, 소장, 간, 심, 신경성(스트레스), 식도(심포경)의 문제가 있는지 생각해야 한다.
- 특히 신경성 문제는 생각보다 비율을 차지한다.
- 배에 가스가 차서 통증이 있는 환자에게 대장의 정혈인 상양을 사용하셨다고(또 임맥, 독맥을 많이 활용하심)
- 위 질환 환자가 많이 오고, 허실이 섞인 경우가 많기에 보사법을 동시에 활용하는 경우가 많다.
- 1) 간으로 인한 질환

- 피로감이 동반되는 경우가 많다.

2) 위장으로 인한 질환

- 소화효소의 문제로 입맛이 없는 경우가 많다.
- 인슐린과 같은 호르몬 문제, 알칼리성 위장액이 분비되지 않아 속쓰림

3) 위로 인한 질환

- 위는 밥통과 같은 느낌으로 풍선처럼 뽕뽕한 느낌이 들거나 음식을 잘 먹지 못하는 증상과 연관된다.

4) 소장으로 인한 질환

- 흡수가 잘 안되어서 나타나는 문제로 살이 안 찌는 경우가 있음.

5) 대장으로 인한 질환

- 가스가 차고, 아래가 더부룩한 느낌이 있는 경우가 많다.

제 3장. 소화기계 질환

제 1절. 內傷내상

1. 개요

- 외감(外感): 외인, 즉 육음으로 인하여 발생하는 병
- 내상(內傷): 내인, 즉 음식/칠정/과로/과일(過逸) 등에 의해 체내 장기를 손상하여 발생하는 병. 음식상(飮食傷), 노권상(勞倦傷)으로 나뉨
- 현대에는 음식상, 노권상 외에 칠정상에 의한 발병이 증가하는 추세

내상의 분류		
飮食傷 음식상	① 허증: 飢餓不飮食者 胃氣空虛 음식을 너무 안 먹어서 위기가 공허함	手按心口刺痛 심구(명치, 거꿀 부위)를 눌렀을 때 찌르는 듯한 통증
	② 허중실증(虛中實證): 飮食太過而停滯者 胃氣受傷 음식을 너무 많이 먹어서 정체되면 위기가 수상함	
勞倦傷 노권상	① 과노력(過勞力): 傷氣(기가 상함)	手按心口不痛 심구를 눌렀을 때도 통증이 없음
	② 과노심(過勞心): 傷氣兼傷血(기, 혈 같이 상함)	
	③ 과방로(過房勞): 傷腎與勞倦相似 (신장이 상함, 노권상과 비슷)	
	④ 과일(過逸): 氣血運行不暢 (너무 안 움직여서) 기혈 운행이 안 됨)	

2. 서양의학적 이해

- **내상:** 넓은 의미) 인체의 내부 요인에 의하여 발생하는 모든 질환
- 보통 소화기계 질환과 유관
- **음식상:** 식중독, 콜레라, 각종 식도염, 급 만성 위염, 신경성 소화불량, 소화성 궤양, 급 만성 췌장염, 알코올성 질환, 음식 및 약물 인과성 알레르기 등의 질환과 연관
- **노권상:** 하부 식도 괄약근 이완불능증, 기능성 소화불량증, 소화기계 종양, 소화기계 흡수장애, 염증성 장 질환, 장폐쇄증, 과민성 대장증후군 등의 질환과 연관
- **참고) 위식도역류 질환(gastroesophageal reflux disease; GERD)**
 - 위 들문(위-식도의 연결 부위)의 형태이상 또는 기능부전으로 인해 위의 내용물이 병적으로 식도로 역류하여 여러 증상을 초래하는 병태
 - **역류성 식도염:** 이로 인해 하부식도에 나타나는 점막의 발적, 미란 등
 - 위의 내부는 위산에 의해 강한 산성으로 유지됨. 이 산성물질이 식도점막을 손상시켜 역류성 식도염이 발생
 - 위산이 더 위쪽으로 올라가면 인두와 후두부 등에도 손상 미침
 - **주증상:** 가슴쓰림 속쓰림(heart burn), 가슴답답함, 위산역류, 연하곤란 → 심장질환과 잘 감별
 - 연하통(음식 삼킬 때 아픔), 작열감, 딸꾹질, 구역 구토
 - 협심증과 같은 흉통, 목의 이물감(매핵기), 쇠목소리, 천식과 같은 발작과 원인 불명의 만성기침도 동반할 수 있음
 - ⇒ +) 역류성식도염으로 인한 기침의 특징: ①마른 기침(가래 無) ②밤에 더 심함
 - ▶ ∴저녁에 먹고 바로 누우면 중력/복압의 상승으로 위산 역류가 심해지므로
 - ⇒ +) 매핵기의 원인: ①역류성 식도염 ②비염(∴후비루) ③신경성(스트레스)
- **원인**
 - 가장 큰 원인: 식도하부 괄약근(LES)의 기능저하 → 식도열공헤르니아, 식도의 연동운동 저하, 위산분비 증가, 위의 연동운동 저하 (→LES 쪽에 압력이 가해짐), 중력(구부리거나 누운 자세), 복압의 상승(비만, 변비 등)
- **검사와 진단:** 식도내압검사, 식도 내시경
- **합병증:** 식도협착, 식도출혈, 궤양, 천공, 바렛식도(Barrett's epithelium)
 - 바렛식도: GERD에 의해 반복적으로 손상을 입은 식도 점막(중층 편평상피)이 원주상피로 화생(metaplasia)한 것. 약 10%에서 샘암종이 나타남(식도암의 원인)

→ +) 식도협착: ∴위산이 반복적으로 상피세포 손상하여 발생

- 치료

→ 생활습관의 개선: 금주, 금연, 취침 전 음식섭취 금지, 베개를 높임(중력을 이용), 변비, 비만의 해소, 혈압약·심장약(→ LES 기능저하 유발 가능) 확인 → 약물요법/외과요법

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 음식상(飮食傷)

· 원인

- ① **음식실절(飮食失節):** 과식으로 인해 음식적체, 기아(飢餓)로 인한 위기공허(胃氣 空虛)로 운화불능(運化不能)
- ② **음식편기(飮食偏嗜):** 생랭한 음식, 자극성 음식, 고량후미, 음주, 기호식품 과식
- ③ **음식불결(飮食不潔):** 부패 또는 변질된 음식, 독성이 있는 음식 섭취 → 식중독
- ④ **약물에 의한 장애**

· 증상

- 氣口脈必緊盛 胸膈必痞塞 噯氣如敗卵氣臭 亦有頭痛 身熱 但身不痛爲異耳
- 기구맥필긴성 흥격필비색 애기여패란기취 역유두통 신열 단신불통위이이
- 우측 촌구맥이 긴맥 / 흥격이 반드시 답답하고 막혀있음 / 트림 시 계란 썩는 냄새 / 두통 / 신열 / 하지만 몸살은 없음(두통신열은 감기와 비슷하지만 몸살은 없음)
- 飽悶 惡食 不食 噯氣作酸 下泄臭屁 或腹痛 吐瀉 重則發熱 頭痛 左手關脈平和 右手 關脈緊盛 此傷食也
- 포만 오식 불식 애기작산 하설취비 흑복통 토사 중즉발열 두통 좌수관맥평화 우수 관맥 긴성 차상식야
- 포만: 배부르고 답답하고 더부룩 / 애기작산: 신 트림 / 하설취비: 냄새나는 방귀 / 중하면 발열두통 / 좌수관맥은 평화롭고, 우수관맥은 긴성(비위맥이 우수관맥에 있으므로)

· **치법**

- ① **실증**: 음식의 양을 줄이고 소도(消導)시키되 다소 중(重)하면 공하(攻下)시키고, 매우 중하면 토법(吐法)·하법(下法)
- ② **허증**: 위기허(胃氣虛)하므로 보익(補益)

· **치료혈**: 中脘중완 足三里족삼리 內關내관 公孫공손 下脘하완 天樞천주 氣海기해 合谷합곡 太衝태충 內庭내정 陷谷함곡 三陰交삼음교 脾俞비수 胃俞위수

- ① **불사음식(不思飲食)**: 足三里족삼리 三陰交삼음교 四關사관 胃俞위수 脾俞비수 然谷연곡(출혈)
- ② **기불능식(飢不能食)**: 合谷합곡 太衝태충 中脘중완 章門장문 期門기문
→ +) 기불능식: 배가 고프데 음식이 안 들어감
- ③ **간위기체(肝胃氣滯)**: 中脘중완 太衝태충
- ④ **비위허한(脾胃虛寒)**: 脾俞비수 胃俞위수 關元관원(灸)
- ⑤ **답습(痰濕), 수음(水飲)이 류(留)**: 巨闕거결 豐隆풍룡(담음에 다음) 陰陵泉음릉천
- ⑥ **어혈응체(瘀血凝滯)**: 膈俞격수(혈 관련 질환에 다음) 三陰交삼음교 公孫공손
- ⑦ **위열(胃熱), 기응체(氣凝滯)**: 陷谷함곡 內庭내정(→ 위염, 위궤양)
- ⑧ **식적(食積)**: 建里건리 中脘중완 上脘상완 下脘하완

· +) "소화가 안 돼서 왔어요"

- 1. **먹은 것부터 확인**: 기름진/찬(→화혈 사용) 음식 먹어서 손상된 건 치법이 달라짐
- 2. **스트레스 확인** → 심포경, 태충(간경) 사용
- 3. **맹장염(급성 충수염)**[아주 가끔]: 초기에는 심와부에 체한 것처럼 통증
- 4. **만성 소화불량**: 어떤 게 문제가 되는지 찾기
→ 1. **위**: 만성/위축성 위염으로 인한 위 기능 저하 or 위 자체 경직(위가 안 늘어남)
→ 2. **췌장(脾)**: 췌장에서 소화효소 분비 안 될 때 → "입맛이 없어요"
→ 3. **담낭(쓸개)**: 쓸개즙 분비 안 됨 or 만성 담낭염(통증 없이 소화 안 됨)
cf. 담석은 통증 有) → "고기(지방) 먹었을 때 소화가 안 돼요"
→ 4. **장**: 변비가 있어 연동운동이 잘 안 돼 대변을 잘 배출해주지 못하는 경우
→ 5. **심장**: 심장에서 위장으로 혈액을 잘 못 보내서 위장 운동이 잘 안 일어남 →
"잘 체해요" "찬 거 먹으면 바로 체해요"

(2) 주상(酒傷)

· **원인**: 음주과다로 상장위(傷腸胃)

· **증상**

- ① 神昏錯謬신혼착류 目不見物목불견물 渴欲飲水갈옥음수 尿赤뇨적 四肢不營사지 불영
→ +) 신혼착류: 정신없음 / 목불견물: 눈에 보이는 게 없음 / 사지불영: 사지를 제대로 못 움직임
- ② **주독변위제병(酒毒變爲諸病, 주독이 변해 제병이 됨)**
→ 병이 심하지 않을 때: 嘔吐구토 自汗자한 瘡瘍창이 鼻鼈비사 自泄자설 心脾痛 심비통 등
→ 심해지면: 消渴소갈 黃疸황달 肺痿폐위 內痔내치 鼓脹고창 失明실명 哮喘호천 勞嗽노수 癰癤전간
→ 구음주(久飲酒)하여 장부에 열독(熱毒)이 쌓이면: 蒸筋증근 傷神상신 損壽손수

· **치법**: 發汗발한, 利小便리소변하여 使上下分消其濕사상하분소기습 - +) 술 깨는 것도 찬 술 / 더운 술 따라 달라짐 → 맥주(찬 술) ⇒ 맥주 먹고 설사 많이 함
← 따뜻하게 데워주는 치법

· **치료혈**: 中脘중완 足三里족삼리 陽陵泉양릉천 膽俞담수 公孫공손 三陰交삼음교 委中 위중 至陽지양

- ① 취두통(醉頭痛): 攢竹찬죽 印堂인당 足三里족삼리
- ② 주정중독(酒精中毒), 숙취(宿醉): 率谷솔곡 百會백회 尺澤척택 合谷합곡 魚際어제
- ③ 주병(酒病): 魚際어제
- ④ 주사(酒釀): 素膠소료 迎香영향 合谷합곡

(3) 노권상(勞倦傷)

- **원인:** 過勞力과로력(勞役過多노역과다; 육체적 과로), 過勞心과로심(喜怒不節희노부절; 정신적 과로), 房勞過多방로과다로 상기(上氣)하면 화(火)가 왕성해져서 사지를 주관 하는 비토(脾土)를 침범하여 발생
- **증상:** 困熱근열 無氣以動무기이동 懶於言語라어언어 動作喘乏동작천핍 表熱표열 自汗자한 心煩不安심번불안
 - 피로, 권태, 무기력, 불안, 움직이기 싫어하는 증상들
 - +) 라어언어: 말하기 귀찮아함
- **치법**
 - ① 調其飲食조기음식 適其起居적기거거(기거 적절히) 澄心息慮징심식려(마음 맑게)
 - ② 노권(勞倦)으로 양기하함자(陽氣下陷者): 補氣升提보기승제 방로(房勞)로 양기상승자(陽氣上昇者): 滋陰降火자음강화
- **치료혈:** 中脘중완 足三里족삼리 關元관원 氣海기해 腎俞신수 胃俞위수 脾俞비수 - +) 보하는 혈 위주로 쓰임

(4) 내상전변제병(內傷傳變諸病)

- 음식불근(飲食不謹, 음식을 삼가지 않음), 외감육기(外感六氣), 내감칠정(內感七情) 등의 원인으로 양기가 성하여 흉부에 열이 쌓이거나, 체질적 소인으로 음화염상(陰火炎上)하면 비(痞), 통(痛), 불사식(不思食), 열애부기(噎噎腐氣, 트림 시 음식 썩는 냄새), 탄산(吞酸), 조잡(嘈雜), 팽만(膨滿) 등의 증상으로 전변됨
- 한증+열증, 실증+허증이 섞인 것 → 이를 한증으로 오인해 조열(燥熱)한 약을 쓰면 담음이 발생되어 비(痞), 통(痛), 구토(嘔吐), 열격반위(噎膈反胃) 등이 순차적으로 발생
 - +) 소화기계 질환: 허중실 - 허/실이 항상 같이 있다고 생각
- 소화 안 되면 위에 염증이 생김: 염증은 발적, 미란, 붓는 등 열의 증상이 같이 있는 것 (열증) → 허/실, 한/열 같이 있음
- ① **탄산(吞酸), 토산(吐酸):** 위의 신물이 올라오는 것 ≡ 역류성 식도염
- **원인**
 - **실증:** 濕熱在胃습열재위, 肝熱간열
 - **허증:** 脾胃虛寒비위허한
- **증상:** 탄산(酸水刺心산수자심; 신물이 심장을 찌르는 듯함)

토산(吐出酸水토출산수; 신물이 넘어와서 토하게 되는 것)

- **실증:** 吐酸時作토산시작 噯臭腐氣애취부기 胃脘飽悶위완포민
- **허증:** 吐酸時作時止토산시작시지 喜唾涎沫희타연말 飲食喜熱음식희열
 - ⇒ +) 토산시작시지: 나타났다 안 나타났다 / 희타연말: 맑은 침을 뱉는 것을 좋아함 / 음식희열: 따뜻한 음식을 좋아함
- **치법**
 - **실증:** 泄肝和胃설간화위
 - **허증:** 溫中散寒온중산한
- **치료혈:** 中脘중완 期門기문 巨闕거결 膈俞격수 肝俞간수 內庭내정 陷谷함곡
 - with 背痛배통: 天宗천중 育俞황수 肺俞폐수 肩外俞견외수
 - with 便秘변비: 天樞천추 大腸俞대장수 足三里족삼리
- ② **조잡(嘈雜)**
 - **원인:** 胃中痰火위중담화, 食鬱有熱식울유열, 思慮傷心사려상심으로 인한 血虛혈허
 - **증상:** 위완부 감각이 편하지 않은 것 / 似飢不飢사기불기, 似痛不痛사통불통, 懊惱 不自寧오뇌부자녕 / 惑噯氣혹애기, 痞滿비만, 惡心오심을 검하기도 함 / 점차 胃脘 痛위완통을 일으킴 → 담음
 - +) 사기불기: 배가 고픈 것 같기도 아닌 것 같기도 / 사통불통: 아픈 것 같기도안 아픈 것 같기도 / 오뇌부자녕: 답답해서 불편함
- **치법:** 消痰降火소담강화, 健脾行濕건비행습
- **치료혈:** 中脘중완 胃俞위수 豐隆풍릉 足三里족삼리 內庭내정 陷谷함곡 神門신문 → +) 중완, 풍릉: 담음 치료혈
- ③ **오뇌(懊惱):** 조잡이 심한 것
 - **원인:** 상한표증에 오하(誤下)하면 양기하함하여 심하고경(心下固硬)한 결흉이 되는 데, 이때 위기공허(胃氣空虛)한 상태에서 객열재격(客熱在膈)하면 오뇌가 됨
 - **증상:** 心中煩熱심중번열을 자각하는 것 / 心中不寧심중불녕 短氣단기 煩燥微疼번조미동 煩不得眠번부득면 飢不能食기불능식 / 번조보다 심한 것 - 담음 +화의 증상
 - +) 번조미동: 가슴 속이 달아오르면서 편치 않고 답답함
- **치법:** 消痰降火소담강화, 健脾行濕건비행습
- **치료혈:** 中脘중완 胃俞위수 豐隆풍릉 足三里족삼리 內庭내정 陷谷함곡 神門신문

· ④ **애기(噯氣/噯氣)**

- 원인

→ **실증**: 胃中鬱火위중울화, 胃中濕熱위중습열, 稠痰조담, 食鬱식울→ **허증**: 寒氣客于胃한기객우위, 寒在上焦胸中한재상초흉중, 胸中氣下交흉중기하교- **증상**: 轉出食氣전출식기(먹고 나서 트림)→ **실증**: 食罷噯轉腐氣식파애전부기, 甚則物亦噯심즉물역애(음식을 먹은 후 냄새 나는 트림)→ **허증**: 不因飲食불인음식, 常噯상애(음식과 관계없이 자주 트림함)

- 치법

→ **실증**: 消痰降火소담강화 和胃降逆화위강역→ **허증**: 溫中降火온중강화 補益脾胃보익비위- **치료혈**: 中脘중완 下脘하완 天樞천주 神門신문 太淵태연 通里통리· ⑤ **비만(痞滿)**- **원인**: 食傷(食傷), 정신적 울체(鬱滯), 선천적 허약 등 → 태음습토(太陰濕土)의 습기(濕氣)가 심하를 웅색 [소화가 문제] / 상한병에 너무 일찍 하제(下劑)를 써 한습(寒濕)이 심하에 침입 [상한병의 오치] → 비증- **증상**: 흉격(胸膈)이 포만(飽悶)하여 서창(舒暢)하지 못하는 것

→ 비(痞): 흉이 痞滿하면서 통증이 없는 것 → 경증

→ 결흉(結胸): 흉이 滿하면서 통증이 있는 것 → 중증

- **치법**: 補氣健脾보기건비, 消導和胃소도화위, 順氣寬中순기관중- **치료혈**: 湧泉용천 內關내관 公孫공손 足三里족삼리 神門신문 中脘중완 上脘상완 巨闕거궤 太白태백 三陰交삼음교

(5) 기타

· ① **식후혼곤(食後昏困)**: 밥 먹고 나면 졸린 것 → 단순히 소화기 문제X- **원인**: 비허약(脾虛弱)으로 인하여 승발지기불행(升發之氣不行)하여 발생- **증상**: 食入則困倦식입즉곤권 精神昏冒而欲睡정신혼모이욕수- **치법**: 健脾行氣건비행기

- +) 소화할 땐 피가 소화기 쪽으로 몰리는데, 피가 부족한 상태에서 소화기로 몰리면 뇌로 산소 공급이 안 됨 ⇒ 밥 먹으면 졸림: 빈혈인 경우가 많음 ⇒ 빈혈 치료

· ② **식궤(食厥)**: 음식을 과도하게 먹어 갑자기 쓰러지는 것- **원인**: 음식과도(飮食過度)- **증상**: 卒然暈倒졸연혼도 口噤不能言구금불능언 目不識人목불식인 四肢不舉사지불거

→ +) 목불식인: 사람 못 알아봄

- **치법**: 開竅探吐개규탐토 (음식을 토하게 함)→ +) 음식물이 소화 안 돼서일 수도 있지만, 식도/기도에 걸려 숨을 못 쉬는 것일 수도
→ 하임리히법- **치료혈**: 中脘중완 足三里족삼리 內庭내정 中衝중충(심포경 정혈) 四關사관(합곡+태충)· ③ **식적류상한(食積類傷寒)**: 상한과 비슷한 증상- **원인**: 傷食成積상식성적- **증상**: 發熱발열 頭痛症두통증 似傷寒사상한- **치법**: 消積降氣소적강기

2) 기타치료

(1) 사암침법 (참고)

· ① **탄산**: 심열산(心熱酸)/간열산(肝熱酸)/식열산(食熱酸)으로 나뉘서 치료· ② **조잡**: 비상(脾傷) – 비정격(脾正格) 사용· ③ **애기**: 반위(反胃) – 위정격(胃正格) 사용

제 2절. 呃逆애역

1. 개요

- **딸꾹질(애역):** 氣가 逆하여 상충(上衝)되어 후부(喉部)에서 짧고 잦게 소리를 이어서 내는 것 = 열(噦), 흘역(吃逆), 해역(咳逆)
- **원인:** 飲食不節음식부절, 情志不和정지불화, 胃陰不足위음부족, 脾腎陽虛비신양허, 久病耗損구병모손 등
- **치법:** 和胃降氣화위강기
- **특징**
 - 사람이 스스로 억제 X
 - 대개는 증상 경미하여 저절로 호전되지만, 숨을 돌리기 어려울 정도로 연속되거나 만성적 허증의 애역은 치료가 필요
 - 다른 질환의 합병증상으로 나타나는 경우도 있음

2. 서양의학적 이해

- 흉복강의 장기에 발생한 자극이 횡격막신경, 미주신경을 거쳐 뇌 중추에 전달 → 반사적으로 횡격막의 간대성 경련을 일으킴: 호흡을 하고자 하나 성문이 갑자기 닫히면서 특유의 소리를 발하는 것
- +) 간대성 경련: 불규칙하게/비대칭적으로 경련하는 것

· 일시적인 딸꾹질

- 위 팽만(탄산음료, 공기 삼킴, 과식), 기온의 급격한 변화(더운 환경에서 찬 음료/찬 샤워), 음주, 과다한 흡연, 고양된 감정상태(흥분, 스트레스, 웃음) 등에 의해 발생

· 재발하며 지속적인 딸꾹질: 심한 동반질환 암시

- **기질적인 원인:** 소화기계의 염증성 질환 및 다른 복강내 질환, 감염질환, 종양/염 증에 의한 횡격막 자극, 중추신경계의 기질적 이상, 대사장애, 혈관질환, 전신 감염
 - **심리적인 원인:** 심한 스트레스/과도한 흥분, 전환장애/애도반응, 신경성 식욕부진, 인격성 장애, 히스테리성 신경증
 - +) 원인을 복부 쪽 / 중추신경계 쪽인지 구별
- 복부: 종격동 종양/염증, 폐 질환으로 횡격막에 문제, 심장(심낭염, 심근경색), 소화기(식도염, 위염, 위궤양, 위암), 담낭/신장/간 질환

→ 중추신경계: 뇌경색, 뇌출혈, 경막혈종, 뇌종양, 척수공동증, 외상 등

· 치료 → 일시적인 딸꾹질

- 혀를 잡아당기면서 비인후부 자극, 티스푼으로 목젖 들어올리기, 비인후부에 대한 카테터 자극, 1티스푼의 설탕 먹기
- 숨 참기, 재채기, 갑자기 놀래키기, 비닐봉지에 내신 숨을 재호흡하기
- 경동맥 마사지, 미주신경 자극하기
- 양 무릎을 가슴에 붙여서 횡격막 자극하기
- 위의 팽창을 감소시키기 위해 트림을 하거나 비위관을 삽입

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 위한애역(胃寒呃逆)(한애(寒呃))

ㄸ 呃聲沈緩連續有力애성침완연속유력 遇寒尤甚우한우심 得熱則減득열즉감 常兼 胸膈及胃脘不舒상검흉격급위완불서 胃脘痞悶위완비민 喜飲熱湯희음열탕 飲食減少음식감소 口不渴구불갈 苔白태백 脈遲緩맥지완

- +) 애성침완연속유력: 딸꾹질 소리가 가라앉고 느린데 연속되고 힘이 있음 / 우한 우심: 한을 만나면 심해짐 / 득열즉감: 득열하면 감소함 / 상검흉격급위완불서: 흉격/위완이 편치 않음

· 치법: 溫中(溫胃)散寒온중(온위)산한, 降逆止呃강역지애 ← ㄸ한증

- **치료혈:** 上脘상완(灸) 章門장문(灸) 脾俞비수(補) 內關내관 中脘중완(灸) 足三里족삼리 - +) 구법, 보법 같이 많이 사용

(2) 위화애역(胃火呃逆)(위열(胃熱), 열애(熱呃))

· **증상:** 呃聲洪亮有力애성홍량유력 衝逆而出충역이출 自發自止자발자지 口渴面赤구갈면적 煩燥口臭번조구취 煩渴번갈 多喜飲冷다희음냉 小便短赤소변단적 大便秘結대변비결 苔黃태황 脈滑數맥활삭

- +) 애성홍량유력: 애성(딸꾹질 소리)이 맑고 크고 힘 있음 / 충역이출: 찌르는 듯한 역상을 하면서 출현

· 치법: 清胃泄熱청위설열, 降逆止呃강역지해(清心降逆청심강역 和胃止呃화위지애)

- **치료혈:** 解谿해계(위의 경화혈) 胃俞위수 內庭내정 足三里족삼리(瀉)

(3) 담애역(痰呃逆)(습담(濕痰))

- **증상:** 呃逆痰聲애역담성 胸悶흥민 脘脹완창 惑心下堅痞혹심하견비 苔膩태니 脈滑有 力맥 활유력
- **치법:** 順氣滌痰순기척담(燥濕化痰조습화담)
- **치료혈:** 豐隆풍릉 三陰交삼음교 上脘상완 足三里족삼리

(4) 간위불화애역(肝胃不和呃逆)(간기범위(肝氣犯胃))

- **증상:** 呃逆頻作애역빈작(呃逆時作時休애역시작시휴) 呃逆連續애역연속 聲低而頻성저 이 빈 情志不暢정지불창 胸脇脹痛흉협창통 胸悶흥민 胃脘脹痛위완창통 食少식소 噯氣 애기 呑酸탄산 心煩易怒심번이노 苔薄黃태박황 脈弦맥현(脈弦緩맥현완)
- +) 애역빈작: 애역이 빈번히 일어남 / 애역시작시휴: 때때로 일어났다 때때로 쉬어감 / 성저이빈: 짧은 소리가 여러 번
- **치법:** 舒肝和胃서간화위(疏肝和胃소간화위 順氣降逆순기강역)
- **치료혈:** 梁門양문(瀉) 行間행간(간의 형혈)(補) 內庭내정(위의 형수혈)

(5) 식애역(食呃逆)(정식(停食)): 많이 먹어서 생긴 것

- **증상:** 呃聲有力애성유력 或酸腐之味혹산부지미 隨呃而出수애이출 脘腹脹痛완복창통 噯氣 呑酸애기탄산 呃逆連聲애역연성 胸脘脹悶흥완창민 呃腐吐酸애부토산 惑失氣臭 穢혹실기 취에 舌苔厚膩설태후니 脈滑有力맥활유력 - 식상으로 인한 증상들 같이
- +) 애성유력: 딸꾹질 소리가 힘 있음 / 산부지미 수애이출: 시름, 썩은 듯한 냄새가 올라 오고, 따라서 딸꾹질이 나옴
- **치법:** 消食導滯소식도체
- **치료혈:** 天樞천추(瀉) 梁門양문 脾俞비수 公孫공손

(6) 비신양허애역(脾腎陽虛呃逆)

- **증상:** 呃逆聲低不斷애역성저부단(呃聲低長애성저장, 呃聲低沈少力애성저침소력, 久病 呃逆구병애역, 聲低氣弱성저기약, 時斷時續시단시속) 氣不按續기불안속 少氣懶言소 기나연 脘腹不舒완복불서 喜熱喜按희열희안 食少倦怠식소권태 或便溏久瀉혹변당구사 腰膝無力 요슬무력 畏寒肢冷외한지냉 手足不溫수족불온 小便清長소변청장 舌淡苔 薄白설담태박백 脈細弱맥세약(脈沈弱맥침약) - 비허/신허한 증상들이 같이 나타남
- +) 애성저장: 낮고 긴 소리 / 애성저침소력: 낮고, 가라앉고, 힘 없는 소리 / 구병애 역:

오래된 병에 애역하는 것 / 성저기약: 소리가 작고 힘 없음 / 시단시속: 가끔씩 그쳤다 가 또 지속됨

- **치법:** 溫補脾腎온보비신, 和胃降逆화위강역
- **치료혈:** 足三里족삼리 關元관원 氣海기해 太谿태계

2) 기타치료**(1) 사암침법 (참고)**

- 대장정격, 간정격, 심정격, 비정격, 신정격 사용

▶ Tip: 잡병해역(雜病咳逆)

- ① 이후해역(痢後咳逆): 이질을 앓고 난 뒤 생긴 애역. 중기부족(中氣不足)하여 발생
- ② 식색해역(食塞咳逆): 음식이 흉중에서 막히거나 과식하여 발생
- ③ 담폐해역(痰閉咳逆): 위로는 담(痰)이 막히고, 아래로는 화(火)가 동(動)하여 발생
- ④ 수결해역(水結咳逆): 위(胃)가 허냉(虛冷)한 사람이 물을 지나치게 마시거나 수결 흉(水結胸)이 생겨 발생
- ⑤ 과소해역(過笑咳逆): 지나치게 웃다가 발생하는 딸꾹질. 실증에 속함

제 3절. 嘔吐구토

1. 개요

- <황제내경> 諸嘔吐逆衝上 皆屬於火 → 구토는 火에 속함
- **정의:** 기능적, 기질적 병변으로 인해 위실화강(胃失和降)하고 기(氣)가 역상(逆上)하여 위의 내용물이 다시 입으로 나오는 증상
- **원인:** 비기허약(脾氣虛弱), 한기객위(寒氣客胃), 음식소상(飮食所傷)
- **분류:** 기혈(氣血)의 다소(多少)에 따라 → 구(嘔) / 토(吐) / 해(噦)로 나눔

嘔 구	嘔者 陽明也 구는 양명에 속함	多血多氣 다혈다기	有聲有物: 소리O 물질O 구역질하면서, 음식물이 나옴	氣血俱病也 기혈 모두 병 (嘔比吐爲重也) 구가 가장 위중한 것
吐 토	吐者 太陽也 토는 태양에 속함	多血少氣 다혈소기	無聲有物: 소리X 물질O 구역질은 없으면서, 음식물이 나옴	血病也 혈병
噦 해	噦者 少陽也 해는 소양에 속함	多氣少血 다기소혈	有聲無物: 소리O 물질X 구역질처럼 소리는 있지만, 음식물은 안 나옴 → 토할 것 같으면서 토해지지 않음	氣病也 기병

구토의 3가지 분류

상초구토	食入即吐 渴欲飲水 大便燥結 氣上衝胸而發痛 脈浮洪 식입즉토 갈욕음수 대변조결 기상충흉이발통 맥부홍 먹자마자 토함 / 갈증이 나면서 물을 마시려 함 / 대변조결 / 기가 상충되면서 흉에서 통증 / 맥부홍	因氣逆 기 역으로 인함
중초구토	先吐而後痛 或 先痛而後吐 脈浮弦 선토이후통 혹 선통이후토 맥부현 먼저 토하고 뒤에 통증이 오거나 / 먼저 통증이 있고 뒤에 토함 / 맥부현	因積 적으로 인함
하초구토	朝食暮吐 暮食朝吐 小便清利 大便秘而不通 脈沈遲 조식모토 모식조토 소변청리 대변비이불통 맥침지 아침에 먹은 것을 저녁에 토함 / 저녁에 먹은 것을 아침에 토함 → 먹고 나서 한참 뒤에 토하는 것	因寒 한으로 인함

2. 서양의학적 이해

· 구토(vomiting)

- 뇌간에 의해 조절됨
- 흉복부 및 장근육과 인두의 수축으로 인해 상부위장관의 내용물이 분출되는 것
- 위중(胃中)의 유독물질을 제거하는 기능 or 다른 질병의 동반 증상으로 관찰되기도

· 유발 요인

- 복강내 질환

- 염증성 질병: 위염, 담낭염, 췌장염, 충수염, 간염 등
- 폐쇄성 질환: 유문, 소장, 대장 폐색
- 장운동장애 질환: 위 및 대장마비, 기능성 소화불량증 등

- 복강외 질환: 뇌종양, 수두증, 멀미, 우울증, 심근경색증, 대사성 내분비질환 등

- 식중독, 음주 등

· 원인질환

- **급성 복부 응급질환:** 급성충수염, 급성 담낭염, 장폐색, 급성복막염 등 수술이 필요한 급성 복증
- **소화관 질환:** 만성 소화불량, 소화성 궤양, 유문폐쇄, 특발성 위운동장애(위무력) 등 위장관운동이상 환자
- **중추신경계 질환:** 두개내압상승, 편두통, 수막염, Meniere병, 멀미
- **감염성 질환:** 위장관의 바이러스성, 세균성, 기생충 감염. 발열을 동반한 급성 전신성 감염(특히 소아)(발열·구토·설사 같이하는 경우)
- **대사성 및 내분비질환:** 요독증, 당뇨병성 케톤혈증, 부갑상선 기능저하 및 기능항진, 부신저하증
- 심장질환, 말기암, 임신, 약물(마약, 항암제, 알코올), 정신과적 질환(대식증(잔뜩 먹어놓고 일부러 토하는 것), 신경성 식욕부진)

· 구토 유사 증상들

- 오심(nausea)

- 인두와 상복부에서 느끼는 불쾌한 느낌, 대부분 타액과다(침이 많이 올라옴)를 동반. 반드시 구토를 동반하지는 않음

→ +) 유성무물(소리O, 물질X)이 오심에 속함

- 역류(reflux)

→ 오심없이 음식물이 나오며(소리X, 물질O), 구토와 달리 복부 **횡격막 근육의 수축없이** 나타남

→ 식도물질의 역류(식도협착, 게실), 위물질의 역류(위식도역류질환, 유문부 협착이나 폐쇄, 위무력증)

- 반추(regurgitation)

→ 식도내 하부괄약근의 압력이 약화되어 나타나는 현상. 식후 위의 수축 운동 시음식물이 구강 내로 되새김되는 것.

· 구토의 양상

- 시간적 양상

→ 기상 직후: 임신, 알코올성 위염, 요독증

→ 식사 중, 식사직후: 정신과적 질환과 연관

→ **식사직후: 유문궤양**

→ **식후 1시간 이상: 소화성 궤양, 위암, 당뇨병, 담낭질환, 장폐쇄**

→ 식후 4-6시간, 많은 양의 소화되지 않은 음식물(→ 위 밑으로 내려가지 못한 것임): 위 팽만, 특정 식도질환

- 내용물

→ **소화되지 않은 음식물(→ 거의 식도쪽 문제): 식도이완불능증, 식도협착증, 인두게실 등** 음식물이 식도에 고여 역류

→ **장내 내용물: 장폐쇄, 장마비.** 대개 변냄새가 남

→ **담즙구토:** 위수술 후

→ **진한 커피색/선홍색 구토:** 상부위장관 출혈

· 구토의 합병증

- **대량의 토혈(Boerhaave 증후군, Mallory-Weiss증후군):** 구토 반복 시 식도/식도분문이 행부의 외상파열을 초래해 발생

- **저칼륨 혈증을 동반한 대사성 alkalosis:** 장기간 지속되면 전해질(탈수, 위액 염산 상실)로 발생

- **흡인성 폐렴:** 혼수 시 위내용물이 폐로 흡입되어 발생

→ +) 옆으로 눕혀서 방지

- **영양실조:** 음식 제대로 섭취 못하여 발생

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본치료혈

· 中脘중완 內關내관 足三里족삼리

· ① 감수풍한(感受風寒): 合谷합곡 外關외관

· ② 감수풍열(感受風熱): 大椎대추 曲池곡지 金津玉液금진옥액 - 열을 꺼주는 혈들

· ③ 음식소상(飲食所傷): 下脘하완 內庭내정

· ④ 담음정축(痰飲停蓄): 豐隆풍릉 膻中단중 公孫공손

· ⑤ 간기범위(肝氣犯胃): 上脘상완 太衝태충 陽陵泉양릉천 - 간담경 같이 사용

· ⑥ 비위허약(脾胃虛弱): 脾俞비수 胃俞위수 章門장문 公孫공손

· ⑦ 위음부족(胃陰不足): 三陰交삼음교 內庭내정

2) 변증치료

(1) 위한구토(胃寒嘔吐)

· **증상:** 面靑면청 手足厥冷수족궤냉 食久乃吐식구내토

- +) 식구내토: 음식 먹은 지 오래돼서 토하는 것

- **식상생냉(食傷生冷):** 中焦滿悶중초만민 先腹痛後吐선복통후토/先吐後腹痛선토후복통

- **한기범하초(寒氣犯下焦):** 朝食暮吐조식모토 暮食朝吐모식조토

· **치법:** 溫中散寒온중산한

· **치료혈:** 中脘중완 足三里족삼리 胃俞위수 脾俞비수 內關내관 氣海기해

(2) 위열구토(胃熱嘔吐)

· **증상:** 嘔物酸熱臭구물산열취 喜冷惡熱희냉오열 煩渴引飲번갈임음 食已即吐식이즉토 尿赤便閉뇨적변폐 - +) 구물산열취: 구토물이 시큼, 열한 냄새를 풍김 / 식이즉토: 먹자마자 토함

· **치법:** 清熱降逆청열강역

· **치료혈:** 中脘중완 胃俞위수 解谿해계 內關내관 內庭내정 金津玉液금진옥액(刺出血자출혈) 商陽상양(대장경의 정혈) 關衝관충(삼초경의 정혈) → 사법 good

(3) 위허구토(胃虛嘔吐)

- **증상:** 食多卽吐식다즉토 時時發作시시발작 喜食熱物희식열물 疲倦乏力피곤핍력 四肢 清冷사지청냉 口吐冷涎구토냉연 大便時瀉대변시당
- +) 식다즉토: 많이 먹으면 구토 / 시시발작: 때때로 발작 / 희식열물: 뜨거운 음식 먹기를 좋아함
- **치법:** 溫運脾陽온운비양
- **치료혈:** 中脘중완 章門장문(灸) 脾俞비수 內關내관 關元관원(균보(均補)) - 모혈 다용

(4) 외감구토(外感嘔吐)

- **증상:** 嘔吐구토 寒熱頭痛한열두통 脈浮緩而滑맥부완이활 - 외감 증상 같이 나타남
- **치법:** 疏解風寒邪蓄熱內蘊소해풍한사축열내온 兼腧 清胃火청위화
- **치료혈:** 胃俞위수 三焦俞삼초수 內庭내정 外關외관

(5) 습담구토(濕痰嘔吐)

- **증상:** 時時惡心시시오심 胸痞眩暈흉비현훈 吐物多痰涎토물다담연 心悸怔忡심계정충 吐出如清水或豆汁토출여청수혹두즙
- +) 시시오심: 때때로 오심 / 토물다담연: 구토물에 담이 많이 보임 / 토출여청수혹 두즙: 맑은 것을 토함
- **치법:** 行水化痰행수화담
- **치료혈:** 中脘중완 豐隆풍릉 足三里족삼리 膻中단중 氣海기해

(6) 식적구토(食積嘔吐)

- **증상:** 胸腹脹滿홍복창만 噯氣食臭애기식취 大便秘結대변비결 頻頻失氣빈빈실기
- **치법:** 健脾消積건비소적
- **치료혈:** 足三里족삼리 公孫공손 脾俞비수 胃俞위수 內關내관 天樞천추 上脘상완 中脘중완

(7) 목역구토(木逆嘔吐)(간기범위(肝氣犯胃))

- **증상:** 脇肋疼痛협늑동통 吞酸吐酸탄산토산 胸脘不時痞脹疼痛흉완부시비창동통 煩燥 善怒 번조선노
- **치법:** 抑木扶土억목부토

- **치료혈:** 行間행간(간의 형화혈) 足三里족삼리 公孫공손 陽陵泉양릉천 中脘중완 曲池곡지

(8) 구토류증(嘔吐類症)

· ① 오심(惡心)

- **원인:** 胃口有熱위구유열·有痰유담·有虛유허
- **증상:** 欲吐不得吐욕토부득토 無聲無物무성무물 見飲食則心便惡之견음식즉심편오지
→ +) 욕토부득토: 토할 것 같은데 토하지 않음 / 견음식즉심편오지: 음식을 보면 불편한 마음이 들고 음식이 싫어짐
- **치법:** 健脾化痰건비화담, 清熱降逆청열강역
- **치료혈:** 中脘중완 上脘상완 梁門양문(鍼) 脾俞비수 胃俞위수(灸)

· ② 건구(乾嘔)

- **원인:** 胃中所有熱위중소유열
- **증상:** 有聲無物유성무물 (소리는 있는데, 토물이 없음)
- **치법:** 清熱降逆청열강역
- **치료혈:** 尺澤척택 章門장문 間使간사 中脘중완 足三里족삼리 內關내관 脾俞비수 胃俞위수 內庭내정 厲兌여태

· ③ 식비토식(食痺吐食)

- **원인:** 胃氣逆而不下行위기역이불하행, 寒氣客於腸胃한기객어장위
→ +) 위기역이불하행: 위기가 역상하여 밑으로 내려가지 않음
- **증상:** 食已心下痛식이심하통 陰陰然不可名也음음연불가명야 不可忍也불가인야 吐出痛乃止토출통내지
→ +) 식이심하통: 먹으면 심하에 통증 / 음음연불가명야: 뭐라 말할 수 없이 아픔 / 불가인야: 참을 수 없이 아픔 / 토출통내지: 토해서 뱉어내면 통증이 그침
- **치법:** 溫中降逆온중강역
- **치료혈:** 下脘하완 天樞천추 厲兌여태 內庭내정

- +) 구토는 보통 소화기계 질환(위/장 문제)으로 인하지만, 중추신경계(메니에르, 멀미) 문제일 수도 있음
- 19썸머리상론 제 4절 열격 및 반위까지 나갔는데, 저희 수업은 여기까지 나갔습니다.