

5장 호흡기 질환

1절 감모

풍한감모 10,12,14,17	惡寒重, 發熱輕, 頭痛, 無汗, 四肢痛, 鼻塞聲重, 鼻涕清涕, 咳嗽, 痰稀白, 口不渴喜熱飲, 舌苔薄白, 脈浮或浮緊
	열결, 영향, 지정, 풍문, 풍지, 합곡
풍열감모 11,13,18	發熱重, 不惡寒微惡風, 汗出或雖汗出而不暢, 口乾而渴, 鼻塞不暢, 鼻涕黃涕, 咽喉紅腫疼痛, 頭痛較重, 咳嗽, 咳黃稠粘痰, 舌苔薄黃, 脈浮數
	척택, 어제, 곡지, 내정, 대추, 외관
서습감모 15	發熱, 微惡風, 汗少, 肢體酸重, 頭昏重而脹痛, 咳嗽痰粘, 鼻涕濁涕, 心煩口渴, 小便短赤 胸悶渴不多飲 脈有數
	공치, 합곡, 중완, 족삼리, 지구
기허감모 09	惡寒發熱, 頭痛鼻塞, 咳嗽痰白, 倦怠無力, 氣短, 舌淡苔白, 脈浮無力
	족삼리, 풍지, 합곡
음허감모	頭痛身熱, 微惡風寒, 無汗或微汗, 頭暈心煩, 口渴咽乾, 手足心熱, 乾咳少痰, 舌紅, 脈細數
	열결, 지정, 풍지, 부류, 영향, 폐수

2절 해수

외감 해수	풍한	咳嗽聲重有力, 痰稀色白, 鼻塞流涕, 發熱惡寒, 頭痛, 舌苔薄白, 脈浮或浮數
		열결, 합곡, 폐수, 척택, 풍문, 풍지, 외관
	풍열	咳嗽頻劇, 氣粗咳聲啞, 身熱口渴, 不惡寒, 咽喉疼痛, 舌苔薄黃, 脈浮數, 或浮滑
		풍문, 풍지, 대추, 열결, 합곡, 외관, 태연, 폐수
내상 해수	풍조	乾咳無痰, 口鼻發燥, 咽乾澀痛, 舌尖紅
		풍문, 풍부, 폐수, 태연, 부류
	습탁	咳嗽重濁, 痰唾粘稠, 身重肢怠
		열결, 상구, 중완, 음릉천
내상 해수	폐신	咳而無痰, 咽喉燥痛, 或 唾血, 午後潮熱
	음허	폐수, 신수, 태계, 척택, 행간, 삼음교, 중부, 열결, 조해
	비신	咳嗽痰多, 面色蒼白, 形容憔悴, 胃納減少, 入冬更劇
	양허	비수, 중완, 족삼리, 폐수, 고향수

3절 폐창

담탁응폐	咳嗽氣短或喘促氣急, 氣息不得臥 痰白量多, 胸脘痞悶, 心悸浮腫
	폐수, 열결, 정천, 비수, 풍릉
담몽심규	喘咳, 不得平臥, 胸悶心悸, 腹脹, 眩暈, 手足青紫, 甚則神志模糊
	태연, 정천, 비수, 풍릉, 격수, 신문, 간사
폐신기허	喘咳聲低, 呼多吸少, 動則甚, 自汗, 痰多稀薄, 四肢不溫, 腰膝酸軟
	태연, 태계, 폐수, 신수, 단중, 풍릉
양허수범	喘咳痰多, 胸悶氣促, 動則尤甚, 汗出心悸, 面色灰暗, 下肢浮腫, 小便短少
	삼초수, 기해, 폐수, 비수, 신수, 족삼리, 삼음교

4절 폐위

허열	咳吐濁涎沫, 其質較粘粗, 咳聲不暢, 甚則音啞, 氣急喘促, 口渴咽燥, 咳痰帶血, 午後潮熱
	어제, 척택, 폐수, 족삼리
허한	吐涎沫, 其質清稀量多, 口不渴, 小便數, 形寒, 神疲乏力
	폐수, 태연, 단중, 비수, 중부 [기타] 족삼리, 소부, 열결, 어제, 태연, 폐수, 곡지, 중부, 음교, 태충

5절 효천

허증	氣乏, 身冷, 痰如水, 面白, 喉中有聲
	족삼리, 신수, 관원, 명문, 기해, 고향, 폐수, 비수, 중완
실증 10,12,17,18,19	面赤, 飲水, 身熱, 痰盛, 胸脹氣粗, 呼吸擡肩, 不得平臥 어제, 합곡, 족삼리, 폐수, 내관, 풍문, 척택, 풍릉, 천돌, 중완
한증 11	形寒肢冷, 咳唾稀涎, 面皁不渴, 二便通調, 遇寒即發 폐수, 중완, 단중, 열결, 고향수, 족삼리, 합곡, 척택
열증	身熱喘滿, 煩渴引飲, 便秘尿赤, 遇熱則甚
	폐수, 열결, 천돌, 풍릉, 소상, 합곡, 풍부

6절 기병증 기억과 상기, 단기와 소기 구별

기억	氣가 腹中에서 時時로 上衝 척택, 상구, 태백, 삼음교
단기 09	氣가 急하고 短促하여 連續되지 못하는 症. 呼吸은 數하면서도 서로 接續되지 못하는 것이니 喘息과 유사하나 肩을 搖動하지 않으며, 呻吟하는 것 같으나 痛症은 없으며 寸口脈이 沈 혹은 滑한 것 대릉, 척택 / 천정, 대추, 폐수, 간수, 어제, 척택 [뜸] 대추, 폐수, 신궤, 오추하
소기	氣가 弱하고 少하여 말할 기력도 부족한 증상 肺虛하면 정상호흡이 곤란하고, 腎氣가 虛하면 骨痠懶惰하여 동작하지 못함 간사, 신문, 대릉, 소충, 족삼리, 하림, 행간, 연곡, 지음, 간수, 기해
상기	呼吸多하여 氣息이 促急 [뜸] 태충

기병증 사암침법 14,15

① 怒 氣上	태충 補 경거 瀉	⑤ 恐 氣亂	태충 補 소부 瀉
② 喜 氣緩	태백 溫 삼리 涼	⑥ 驚 氣下	신수 灸 행간 鍼瀉
③ 思 氣結	간사 鍼 기해 灸	⑦ 寒 氣收	단전, 기해 灸 百壯
④ 悲 氣消	상완 灸 요수 鍼	⑧ 勞 氣耗	삼음교 폐수 灸

7절 성음질환

음불득어	① 설음: 舌本만 轉運하지 못하여 언어를 구성하지 못하는 것, 중풍 환자가 음성은 발하면서도 언어를 구성하지 못하는 것	
	② 후음: 喉頭의 손상으로 聲嘶되어 발성만 안 되고 설본은 정상적으로 전운하는 것으로, 즉 발성은 잘 안되어도 언어는 구성되는 것	
	폭음	합곡, 양교, 통곡, 천정, 기문, 지구, 용천
	꺠기주후불능언	조해
	후비졸음	풍릉
	폭음기천	부돌, 염천
	음불능언	뇌호, 음극, 삼양락
	폭음불능언후익통	풍부
	설강난어	금진옥액, 염천, 풍부
	설완	태연, 합곡, 충양, 내정, 곤륜, 삼음교, 풍부
	설강	아문, 소상, 어제, 이간, 중충, 음곡, 연곡
	구금불개	협거, 승장, 합곡, 지구, 외관, 열결, 내정, 여태
	설중난어	염천, 금진옥액 자후에 천돌, 소상
	음아	지구, 부류, 간사, 합곡, 어제, 영도, 음곡, 연곡, 통곡
졸연무음	졸연무음, 졸연실음	
	풍한실음	풍지, 폐수, 경거, 합곡, 천돌, 염천
	풍열실음	대추, 열결, 척택, 합곡, 염천, 태연
	조열실음	폐수, 척택, 곡지, 어제, 소상
	폐허실음	조해, 염천, 폐수, 태연, 태계
	신허실음	신수, 경문, 태계, 삼음교
	실음불어	간사, 지구, 영도, 어제, 합곡, 음곡, 부류, 연곡
	폭실음	신문, 용천
	식음선구불능언	통곡
	불어음식불수	협거, 지창
	설하중난언	염천
	설완불능언	아문

8절 언어질환

광언	開目하고 사람과 대화하면서도 평생에 見聞도 없는 일을 말하며, 선악을 가리지 못하고, 親疏를 가리지 않고, 悖倫無知하며, 의복도 수렴하지 못하고 暴言妄說	
	기본치료혈	태계, 양곡, 하림, 곤륜, 백회
	광어경공	지구, 어제, 합곡, 곡지, 소해, 완골
	광어도한	간사
소(笑)	광귀언	足大拇趾爪甲(무지발톱)下入少許即止
	기본치료혈	수구, 열결, 양계, 대릉, 양곡, 신문, 어제, 노궁, 부류, 폐수
	희소	인중, 열결, 양계, 대릉, 백회
태식	太息 或恐人將捕之 或不嗜食 或善嘔 或 腹脹	
	膽病者 善太息 口苦 嘔宿汁	양릉천
	善嘔 嘔有苦 長太息 恐人將捕之	족삼리
	色蒼蒼然太息如將死狀振寒 溲白 便難	중봉
	好太息 不嗜食 多寒熱 汗出	공손
	心寒脹滿 不得食	구미
	脾虛令人病不樂好太息	상구
	小腹熱 欲走太息	일월, 대횡
	太息 煩滿 少氣 悲驚	소충

9절 진액과 한증

자한 12	無時로 汗出되며 운동하면 심해진다	
	營衛不和	심수, 비수, 곡지, 합곡, 족삼리, 부류, 대추
	肺氣不固	폐수, 열결, 합곡, 단중, 족삼리, 부류
	熱淫于內	곡지, 합곡, 합곡, 외관, 위중
	暑傷氣津	대추, 곡지, 곡택, 십이정혈
	風濕傷表	대추, 곡지, 합곡, 외관, 음릉천, 열결
	自汗	합곡(보), 부류(사), 음시
	汗不止	곡차, 음시, 합곡
	傷寒汗出寒熱	오차, 찬죽, 상완
	傷寒身熱汗出足厥冷	대도
	少汗	先補 합곡, 後瀉 부류
	多汗	先瀉 합곡, 後補 부류
도한 11,12	寢汗인바 睡眠中에 汗出되어 깨어나면 곧 그친다	
	음도, 오리, 간사, 중극, 기해,	후계, 폐수, 백로
	심혈부족	심수, 거궤, 격수, 통리, 관원
	음허화왕	심수, 신수, 태계, 노궁, 신문
	도한부지	음극(사)
	도한발열오한	폐수, 음도에 땀을 뼀 후 침
	도한(허혈)	기해(땀), 신수
망양	사암침법	심정격: 대둔·소충 보, 음곡·소해 사
	汗多不止하거나 或 取汗하여도 한출이 안 되는 것, 한출과다로 인하여 진액이 涸竭되어 소변이 難通하며 사지한랭 혹은 구급하여 신체가 冷痺	
	한다부절	합곡(보)
무한	당한불한	합곡(사)
	상성, 아문, 풍부, 풍지, 지구, 경거, 대릉, 양곡, 완골, 연곡, 중저, 액문, 어제, 합곡, 중충, 소상, 상양, 대도, 위중, 함곡, 여태, 후계	
	무한	합곡(사), 부류(보)
읍루	상한무한	내정(사), 합곡(보), 부류(사), 백로
	안목에서 유출되는 액을 루라 한다. 液은 精을 灌漑하여 孔竅를 潤澤케 하는 것이므로 상부의 液道가 개방되면 읍루가 유출되며, 누액이 과다부지하면 액이 후갈되어 정이 안목을 灌漑하지 못하므로 시력이 혼암해지는데, 이것을 奪精이라 함	
	영풍냉루	찬죽, 대골공, 소골공 자침 후에 삼음교 자침
	두풍냉루출	찬죽, 합곡
	냉루	정명, 풍지, 두임읍, 완골
	영풍유루	정명, 풍지, 두임읍, 두유
	목루출	백회, 액문, 두임읍, 후계, 전곡, 간수
체(涕)	풍목광란풍루출	두유, 관료
	체는 폐의 액이고, 신이 액을 주관하며 폐에 들어가면 체가 된다. 체란 비강으로 유출되는 것을 말한다.	
연(涎)	비류청체	상성, 인중, 풍부 刺後 백회, 풍지, 풍문, 백로
	口角(口吻)으로 流出不禁되는 것	
	토연	사죽공, 백회
타(唾)	구토청연	대릉, 단중, 중완, 노궁
	인후와 舌齒에서 토출되는 액인후와 舌齒에서 토출되는 액	
	다타	삼리
음갈신복다타	음갈신복다타	
	은백	

10절 담음

담음 (담음이 위장에 있는 경우)	形體素盛今瘦, 飲食減少, 腸鳴漉漉, 大便稀溏, 或兼頭昏目眩, 心悸短氣, 嘔吐痰沫, 舌苔白, 脈弦滑	
	기본치료혈	중완
	비신양허	삼초수, 기해, 비수, 신수, 삼음교
	음류위장	비수, 장문, 음릉천, 족삼리, 상거허
	노채유담(난치)	[뜸] 고향
	한담해수경경풍	열결
	담격연민 흉중은통	先 공손, 後 노궁·단중·간사
	구토담연 현훈불이	先 공손, 後 단중·중괴·풍릉
	풍담	풍문, 거궤, 풍릉, 견정
	담열결흉	열결, 대릉, 용천
해수홍담(노채)		백로·폐수·중완·삼리 등 刺後 고향·신수·유근
일음(溢飲) (담음이 지체에 있는 경우) 13,14,17,18	身體疼痛而沈重, 甚則浮腫, 畏寒無汗, 或有喘咳, 痰多白沫, 胸悶嘔惡, 舌苔白, 脈弦緊	
	기본치료혈	비수, 음릉천, 삼음교, 풍문, 합곡
	일음협하긴통	중완
	일음수도불통닉항소복리급종동설체통인골	경문
유음(留飲) 15,19 (담음이 심하에 있는 경우)	背寒冷如掌大, 脇下痛, 引缺盆, 咳嗽則轉心, 胸中有留飲, 其人短氣而渴, 四肢歷節痛, 脈沈	
	결적류음, 벽낭홍만, 음식불소	[뜸] 격수 5장, 족통곡 50장

11절 조증

조증	肺金의 병으로, 폐가 열을 받으면 化해서 燥하고 澁해짐	
	소부·어제 瀉, 태백·태연 補	

12절 상한

상한의 전경	巨陽	풍부
	陽明	내정, 이간
	少陽	임음, 중저
	太陰	은백, 소상
	少陰	태계, 신문
	厥陰	중봉, 간사
	過經未汗	기문, 삼리

태양	태양경병	太陽傷寒	脈浮緊, 頭痛, 發熱, 惡寒, 身疼, 腰痛, 四肢骨節皆痛, 惡風, 無汗, 喘息 • 풍한: 풍지·열결·외관 • 풍열: 풍지·대추·곡지·합곡
		太陽傷風	脈浮緊, 陰脈弱, 齋齋惡寒, 淅淅惡風, 翕翕發熱, 自汗, 鼻鳴, 乾嘔 풍부, 풍지, 대추, 상성, 영향, 합곡
		太陽兩傷風寒	脈浮緊, 惡寒, 發熱, 身疼, 無汗, 煩燥 풍부, 풍지, 풍문, 합곡, 부류, 두유
		傷風寒 咳嗽 脹滿	- 열결, 단중, 풍문, 합곡 풍부
		태양부병	蓄水 10
	蓄血 15,17		小腹硬痛, 脈狀微沈, 小便自利, 如狂 삼리, 내관, 신문, 중극, 방광수
	양명	경병	壯熱煩躁, 大渴引飲, 大汗出, 脈狀洪大, 脣口乾燥 이간, 삼간, 합곡, 곡지, 내정, 삼리, 조해, 중완
부병		日晡潮熱, 譫語, 口臭, 腹痛拒按, 大便燥, 小便短少, 脈狀實有力, 甚則沈伏	
		이간, 삼간, 합곡, 곡지, 내정, 삼리, 조해, 중완	
소양	寒熱往來, 胸脇苦滿, 不欲飲食, 心煩, 嘔吐, 口苦咽乾, 頭痛, 目眩, 耳聾, 脈象弦細, 或 弦數 중저, 간사, 기문, 족임음, 규음		
태음	寒化	腹滿而吐, 食不下, 時腹刺痛, 自利自痛, 自利不渴, 脈狀遲 或微, 舌苔白 은백, 공손, 삼리, 장문, 중완	
	熱化 12	壯熱煩渴, 舌焦黃, 脈象洪數 소상, 은백, 대도, 삼음고, 천추, 중완	

소음	寒化	전체의 機能衰弱病으로 下焦虛汗 體溫低下로 사지에까지 熱度를 미치지 못하므로 惡寒 四肢厥冷하며 한사가 過盛하여 血滯緩滯가 와서 聲低息微, 不欲言語, 脈狀細微하다. 사지가 寒으로 인하여 수축되므로 身痛而臥蹠, 消化不良이 오고 신장의 흡수 기능이 약하여서 설사가 온다 간수, 태계, 부류, 관원
	熱化	체온이 항진되어서 肌膚灼熱이 오고 心煩而不能安眠한다. 또 체온이 높아지면 血行이 신속하여져서 맥상이 虛數하다. 지음, 통곡, 신문, 용천, 조해, 태계, 부류, 교신
결음	純陰症	한사가 결음에 直中하여서 체온을 유지하지 못해 寒盛하게 되며, 혈행이 瘀滯되어서 조갑이 청흑색을 띠고 胃가 寒에 상하여서 소화불량이 되기 때문에 下利清穀 嘔吐酸水한다 간수, 행간, 기문, 관원, 중완
	純陽症	열사가 傳入 결음하여 체온이 極高하여 熱甚而不惡寒하며, 결음은 간에 속하며 肝熱이 上撤하게 되므로 目開而直視한다. 또 열성하면 기혈이 沸騰하여서 煩燥不眠과 心胸에 灼熱이 오며, 열사가 腸中에 入하면 장벽에 염증이 發하여 장막에 潰爛이 생겨서 便不利에 膿血이 出한다 영도, 간수, 대돈, 중봉, 기문
	陰陽錯雜症	음양이 착잡하여 한열이 相互見한다 ① 有陰症: 吐利, 厥冷, 腹中疼痛 등 ② 有陽症: 心中煩熱, 渴欲引飲 등 그러나 이것은 純熱이 아니기 때문에 飲下即吐하게 된다 간사, 간수, 영도, 중봉, 관원

상한 사암침법 10,11,12,13,18,19

상한 1일	상양 補 삼리 瀉	상한 7일	소양경의 정격 및 승격
상한 2일	삼리 補 임읍 瀉	상한 8일	삼리 補 임읍·합곡 瀉
상한 3일	협계 補 상양 瀉	상한 9일	통곡·협계 補 지음·규음 瀉
상한 4일	음릉천·경거 補 은백 瀉	상한 10일	신문·태백 補 은백·대돈 瀉
상한 5일	음곡·경거 補 태백 瀉	상한 11일	척택·음곡 補 태백·태계 瀉
상한 6일	음곡·대돈 補 경거 瀉	상한 12일	음곡·곡천 補 상양·대돈 瀉

13절 온병

온병	합곡, 후계, 족삼리, 부류, 곡지, 풍부, 풍지, 백회, 태계, 대추, 소상, 상양
	目疼 상성, 신도, 전정, 찬죽, 사죽공
	咳喉 폐유, 어제, 척택, 천돌, 십이정혈, 십선혈, 대추, 합곡, 내관, 척택
	열병 십이정혈, 팔사, 팔풍, 오처, 승광, 통천, 임읍, 목창, 정영, 승령, 뇌공, 화료, 오십구자법 부백, 승장, 대추, 백회, 상성, 신정, 풍부, 염천, 풍설, 천주
대두온증 11	頭痛腫大如斗(天行時疫), 潰裂膿出而 反染他人(疫癘), 耳의 전후로부터 腫이 일어나는 것(蝦蟆癰), 턱으로부터 종이가 일어나는 것(鸕鷀癰), 인후종통, 增寒壯熱, 심하면 인후폐색, 구금, 신훈하여 위험하다. 태양, 위중, 척택, 십정혈, 합곡, 곡지

9장 소아과 질환

1절 호흡기 질환

백일해(돈해)	사봉, 내관, 합곡, 열결	
	[오한무한] + 대저, 대추	[후비] + 천돌
	[인홍이통] + 소상	[해수중] + 폐수, 천돌
	[해혈, 녹혈] + 천부, 상성	-
	초해기	초기는 감모와 유사하여, 해수, 재채기, 비체, 포말상의 맑은 객담을 토하고 苔薄, 脈浮, 指紋淡紅 풍문, 합곡, 열결
	경해기 08,11,12	해수가 심해지고 진발성 발작을 하며, 해수 소리가 그치지 않고 해수 후에 廻吼聲 (鷄鳴과 같은 백일해의 특징적인 썹썹거리는 소리)이 나며, 咳出粘痰 또는 浮食을 토하고 나서 陳咳가 잠시 멈춘다. 이와 같은 반복작용은 밤이 되면 더욱 심해진다. 혹은 身熱, 口乾舌燥, 便秘溲赤하거나 痰中帶血, 鼻中衄血, 舌苔黃, 脈滑數, 指紋紫紅 등을 兼한다. 대추, 신주, 척택, 풍릉
회복기		해수의 횡수와 지속시간이 감소되고 廻吼聲도 점점 소실된다. 구토가 감소되고 해수가 힘이 없으며 소량의 맑은 담이 있고, 氣短聲祛, 自汗無力, 舌淡苔少, 脈虛無力, 指紋靑淡 폐수, 비수, 태연, 족삼리
소아 급성 편도염 12,13		소상, 합곡, 천창
소아폐렴	중부, 거골, 폐수, 풍문	
	[고열] 대추, 곡지	[홍통] 내관
	[복창] 족삼리	-

2절 소화기 질환

감병(감증)	하완, 족삼리, 상구	
	[복창변당] + 장문, 천추, 기해, 공손	[사지불온] + 기해
	[수면불녕] + 간사	[목적홍적 정생우예] + 행간, 음릉천
	비위허약	面黃無華或晄白, 形體枯瘦, 目光無彩, 納呆厭食, 睡臥露睛, 或有低熱, 甚者頭大頸細, 腹部凹陷如舟, 哭聲無力, 神疲便溏, 發音遲緩, 脈細弱無力, 指紋淡 + 중완, 장문, 비수, 위수, 공손
	적체상비 09,14,18	面黃肌瘦, 毛髮稀疏, 精神不振, 脘腹脹滿, 或食則嘔吐, 手足心熱, 煩燥易怒, 便溏或乾結, 尿黃濁如米甘, 舌濁膩, 脈滑細 + 선기, 복결
	감염충질 05,07	兼見食慾異常, 嗜食異物, 腹痛經常, 睡中磨牙, 青筋暴露, 舌淡脈細弦 + 거결, 중완, 천추, 백충와
적벽	[소아벽기구불소] 장문, 중완, 척중	
	식적 15,17,18	乳食에 체한 것이 계속되고 소화를 시키지 못하는 한편, 음식의 절도를 잘 맞추지 않아 위장이 大虛한 것 肚腹熱, 面黃浮腫, 多嘔腹鳴, 夜間身熱, 小便如油
	벽괴	상복부가 단단하게 촉지되는 증상이 오래된 상태 中腕部 兩脇痞結, 飲水不止, 寒熱往來, 腹痛喘咳

3절 정신신경 질환

소아 뇌성마비	풍부, 풍지, 백회(사신총), 대추, 신주, 근축, 명문, 요양관, 신수, 질변, 환도, 곡지, 후계, 합곡, 족삼리, 절골	
	신휴혈허	+ 태계, 대장수, 비수
	양허혈어	+ 관원, 기해, 혈해, 삼음교
	사율폐위	+ 합곡, 척택, 폐수, 풍릉
소아마비 (회백수염)	합곡, 곡지, 족삼리, 삼음교	
	폐열	發熱, 咳嗽, 咽紅, 嘔吐, 腹瀉, 肢體疼痛. 계속되면 痿軟無力 苔薄白 脈細數 + 열결, 풍지
	습열	發熱 肢體疼痛而沈重으로 만지지도 못할 정도이며 계속되면 肢體痿軟이 나타난다. 혹 복부의 근육이 이완되어 부풀어 오르는 형상이 나타나거나 번조를 겸하여 나타나며 嗜睡, 汗多, 舌質紅, 苔黃膩 + 음릉천
	간신후손 13,14,18,19	병 후기에 근이 상하고 골이 위축되며, 기육의 위축과 골의 성장이 완만해지고 관절의 기형이 나타나며 舌淡 脈沈細 + 간수, 신수, 절골, 양릉천, 태계
소아경련 ① 급경풍 19	백회, 인당, 수구, 대추, 합곡, 태충, 십선, 양릉천	
	사암침법 14,15,18	태충 補 소부 瀉
	외감경풍	發熱, 頭痛, 咳嗽, 咽紅, 惡心嘔吐, 口渴煩燥 + 소상, 곡지
	담열경풍	發熱, 腹脹腹痛, 納呆嘔吐, 喉間痰鳴, 便閉或大便腥臭, 挾有膿血 + 중완, 풍릉
	경공경풍 05	不發熱, 四肢失溫, 夜臥不寧, 昏睡不醒, 醒後器啼易驚 + 인당, 신문, 용천
② 만경풍	비위허약	비수, 위수, 중완, 장문, 기해, 족삼리, 태충
	간신훈허	백회, 노식, 관원, 삼음교, 곡천, 용천
③ 만비풍	허쇠한 정도가 만경풍보다 심하며 閉目搖頭, 面脣發青發暗, 額上出汗, 四肢厥冷, 手足微縮, 氣弱神微, 昏睡不語, 舌短聾啞, 嘔吐清沫, 脈象沈細, 指紋隱弱不明 비유, 수십지두, 인중, 대추, 이문, 열결, 대돈, 백회, 상성	
찰구	不可飲乳, 舌強脣青, 嘔吐痰涎, 面色赤黃, 氣息喘急, 啼聲不出하거나, 身熱多驚, 手足抽搐, 四肢厥冷 연곡	
금구	혀에 黍米樣의 작은 瘡이 나고, 不能吮乳 啼聲微細 牙關緊閉 이변불통 신결, 천추, 관원, 소장수, 비수	
소아 야뇨증	[지력지둔] + 백회, 신문 [소변삭유] + 대돈 [변당] + 비수, 신수	
	신기부족	하룻밤에 1-2회 이상 발생하고 면색晄白하고 지능이 떨어지며, 요슬痿軟하고 소변은 清長頻數하며 심하면 지랭오한하고 맥은 沈遲無力 관원, 중극, 방광수, 신수, 태계
	비폐기허 05,08,09,11,13,15,17	대부분 병후에 혹은 신체허약자가 수면 중에 유뇨하나 양이 적으며, 면색晄白 정신권태, 사지핍력, 식욕부진, 大便稀溏, 舌質淡, 脈緩 혹은 沈細 기해, 태연, 삼음교, 족삼리
	① 객오: 청·황·백말을 토출하고 혹은 소화되지 않은 수곡과 雜物을 下痢하기도 하며, 안색이 오색으로 변하고, 복통으로 몸부림치고 痙攣症이 발생하며, 驚癇과 같은 증상을 나타내지만, 눈을 치뜨지는 않는다 ② 중오: 卒然心腹刺痛 悶亂欲死 人中靑黑 [중오객오] 제중, 인중, 중완, 기해 [중오불성] 수구, 중완, 기해	
야제	비한 05,11	복통으로 인하여 울며, 안색이 창백하고, 口中에 냉기가 있으며, 수족이 냉하고, 腹中이 냉하여 허리를 구부리고 울며, 夜半(자정 이후)에 우는 예가 많다 은백, 합곡, 중완, 신주, 백회, 풍부, 풍지, 곡택, 수구, 대추, 용천
	심열 07,12	심이躁急해서 울며, 안색이 붉고 소변도 붉으며, 구중이 열하고, 복부가 온난하며 혹은 한출하고, 몸을 뒤로 젖히면서 울며, 자정 이전에 우는 예가 많다. 소상, 소택, 이간, 합곡, 후계

	구창중설	젖을 입에 대면 곧 울며 젖을 빨지 못하고 몸과 이마에 미열이 있다 금진옥액, 합곡, 내관, 인중, 삼음교, 소상, 위중, 천돌, 노궁, 행간
	객오	황혼 무렵 전후에 더욱 심한데 이는 객오와 중오를 겸한 것이다 신문, 간사, 후계
학모 12,17	한열이 매일 혹은 격일로 발생하며 혼탁하여 기면하고, 두부에 땀이 나며 협하에 비괴가 결취된다 내정, 대추, 백회, 후계, 간사, 도도	
제풍	脣口撮緊, 牙關緊閉, 啼聲不出, 不能乳食, 口噤舌強, 嘔吐涎沫, 喉口有痰이 있으며, 重한 상태에 가면 顔面口脣眼目이 收引한 것이 마치 고통 속에서 웃는 모양, 두항강직, 각궁반장, 사지혹닉 등의 증상 연곡, 승장, 제중, 비수, 위수, 신수	

4절 근골격계 질환

해로	소아가 생후에 대천문(fontanel)이 정상아보다 큰 것 頭大面小, 智力薄弱하고 白睛이 많고 눈에는 神氣가 없으며 形體瘦弱, 頭縫不合如開閉, 目多白睛
구홍	홍부가 높게 융기창만하여 거북의 가슴과 유사한 형태로 변한다 견중수, 황수, 심수, 신수, 유중
구루병	척골돌기하여 배부가 거북등처럼 된다 심수, 폐수, 격수, 곡지, 수구, 풍지, 절골

11장 피부 질환

두드러기	피부가 가려워 긁으면 팽진이 발생하는데 크기는 불규칙적이고 담홍색으로, 중앙은 창백하고 가장 자리는 홍색이다	
	곡지, 어제, 혈해, 삼음교, 위중, 양릉천	
	① 상반신 심하면: + 합곡, 곡지, 풍부, 대추, 백회, 영향, 사죽공	
	② 하반신 심하면: + 복토, 풍시, 족삼리, 위중	
습진	외감풍사	起病急驟, 瘙癢異常, 疹連成片, 遇寒或風吹則發病或加劇, 伴有身熱, 口渴, 肢體痠楚, 苔薄白, 脈濡數 + 견우, 양계, 풍문, 대추
	위장적열 11,13,19	因飲酒 或吃魚蝦類食物 而反復發作, 皮疹色紅, 瘙癢劇烈, 伴有腕腹疼痛, 神疲納呆, 便秘或泄瀉. 舌黃膩, 脈滑數 + 족삼리, 열결, 중안
	과민성 염증성 피부 질환의 하나. 대칭적으로 나타나는 多形性 皮疹과 반복적 발생이 특징이며, 발생시기에 따라 급성·아급성·만성으로 분류	
	대추, 곡지, 족삼리, 삼음교, 신문	
신경성 피부염 09	① 상지: + 합곡, 내관	
	② 하지: + 족삼리, 삼음교	
	③ 외음/항문부: + 장강, 회음	
	습열증 14,18	急性者多見. 丘疹紅腫, 糜爛, 浸淫成片, 瘙癢不堪, 或伴有身熱, 大便秘結, 小溲短赤, 苔黃膩, 脈弦滑 + 음릉천, 도도, 폐수
대상포진	혈허증 17,18	慢性者多見. 病程遷延, 反復發作, 皮疹色淡, 增厚, 脫屑, 呈苔蘚樣變, 間見搔痕色素沈着, 血痂, 伴有頭昏脛淡, 肢軟乏力, 舌淡, 脈細弦 + 대도, 극문, 혈해
	진발성 피부소양감과 태선화를 주요 증상으로 하는 만성 피부염으로, 정서적 자극과 밀접한 관련이 있다. 소양감이 서서히 극렬해지며 긁은 후 淡褐色이나 정상 피부색의 원형·다각형의 편평구진이 생긴다. 오래되면 피부가 두꺼워지며 苔癬化되고 건조해지고 작은 鱗屑들이 생긴다. 긁으면 血痂가 생기고 오래되면 합쳐져서 片을 형성한다.	
	풍지, 대추, 혈해, 곡지, 내관, 위중, 신문, 조해, 아시혈	
	풍습화열	病程이 迅速, 片丘疹 형성, 紅色, 濕潤, 糜爛, 血痂, 苔薄黃, 脈濡數 + 양릉천, 태백, 태연
피부소양병	혈허풍조	病程이 長久, 皮疹乾燥, 肥厚, 脫屑, 牛皮狀, 眩暈, 苔薄, 脈細 + 삼음교, 족삼리, 격수
	발진 전에 미열이 있고, 피로 등의 전신증상이 나타난다. 발병 시 환부에 띠 모양의刺痛이 있으며 피부가 붉어지고, 綠豆大에서 黃豆大의 크고 작은 血疱疹이 연속적으로 생기고 수포로 변하며, 밀집하여 신경주위에 띠 모양으로 배열되고 주위가 붉게 변한다.	
	약 7-8일 후 수포의 潰破, 糜爛, 삼출, 혈가가 나타난다. 皮疹은 항상 일측에만 나타나고 신경주위에 배열되며 중앙을 넘지 않는다	
	풍화형 10,11,14	多發腰肋部, 口苦, 頭痛, 眩暈, 心煩易怒, 目赤面紅, 溲赤, 舌紅, 脈弦數 환부주위 및 기문, 곡천, 족규음, 중저, 지구 [심번] + 극문, 신문 [후유동통] + 내관, 양보 [구고] + 양릉천, 지구
피부소양병	습열형	多發胸部, 面部, 水泡潰破, 疲勞, 納呆, 苔黃而膩, 脈滑數 환부주위, 내정, 외관, 협계, 공손, 곡지 [열성] + 합곡, 대추
	소양감은 수면 전이나 정신긴장, 기후변화, 음주 또는 매운 음식을 먹은 후에 유발되거나 가중되며, 소양 발작 시 참기 힘들며 잠복하여 심하면 전신으로 퍼질 수도 있다.	
	소양증이 가벼운 경우엔 긁지 않고 참으면 지나가지만 심한 경우에는 심하게 긁어서 피부가 혈고 출혈, 동통이 생긴다. 오랫동안 긁으면 피부 전신에 抓痕, 혈가, 색소침착, 태선화가 나타난다	
	곡지, 합곡, 풍문 / 혈해, 격수, 족삼리	
피부소양병	① 항문소양증: + 장강, 승산 ② 외음소양증: + 삼음교, 신수, 관원, 음렴, 음포	

	풍조혈열	청·장년층에 많으며, 병정은 짧고, 잠자기 전이나 이불이 매우 따뜻한 경우에 소양증, 피부건조증, 脫屑 발생 舌淡紅 脈浮數 혹은 滑數 + 곡지, 태계, 삼음교
	혈허간왕 15	노인에게 많으며, 병정이 비교적 길고, 정서나 기후변화에 따라 쉽게 소양을 일으킨다. 피부 紅潮되고 갈라지며 頭屑이나 변비 동반하기도 한다. 舌苔薄質紅 脈細數 혹은 弦數 + 간수, 태충
과민성 자반 19	일종의 반응성 모세혈관 출혈 질환으로서 피부 혹은 점막의 癍點을 특징으로 하고, 동반증상이 정도의 차이는 있지만 혈뇨, 복통, 관절종통을 일으킨다. 아동과 청년기에 자주 발생한다. 紫癍은 하지 및 둔부에 대칭적으로 분포하며 크기의 차이가 있고, 피부 표면에 출혈성 구진을 나타낸다. 위중하면 자반이 융합되어 大血泡를 형성하며 중심부에는 출혈성 괴사 발생 곡지, 족삼리, 합곡, 기해, 혈해, 비양 [복통] + 삼음교, 태충, 천추	
단독	풍열형	갑자기 발병하며 항상 먼저 오한발열, 두통, 구갈 등의 전신적 중독증상이 발생하고, 계속적으로 선홍색의 斑片이 나타나며 손으로 누르면 색이 없어진다. 홍색이 신속하게 주위로 퍼지거나 자홍색의 반편을 형성하고, 표면이 종창되고 작열하며 경계가 清楚하고 자각적인 작열통이 있고 누르면 더 심해지고 부근의 림프선 종대가 나타난다.
		두면부에 발생하고 먼저 한쪽의 면종창 혹은 鼻頰 혹은 耳部에서 비교적 심하고 빠르게 두면부로 퍼진다. 피부가 심하게 紅腫되며 작통, 오한발열, 두창통, 구갈, 노적하며 舌苔薄黃, 脈浮數 곡지, 백회, 풍문, 합곡, 족삼리, 태양, 아시혈 [열심] + 도도, 대추 [심번] + 내관, 단중
		하지부에서 발생하거나 재발성 단독이다. 피부가 선홍색에서 암홍색으로 변하거나 황색수포를 형성하고 파궤하며 流水하며 痒痛, 발열, 神倦, 심번, 구고인건, 골절산통, 먹는 것을 싫어하며 구토, 변비, 소변단적, 舌苔黃膩, 脈濡數 합곡, 족삼리, 혈해, 위중, 음릉천, 삼음교, 아시혈 [경궤] + 십선, 수구 [구토] + 내관, 중완
	습열형	
원형탈모증	두발이 돌연 탈락하거나 점점 탈락한다. 斑禿은 국한성으로 斑狀의 脫髮을 말하는 것으로, 원형이나 타원형이고 불규칙하며 크기가 같지 않고 경계가 명확하며 국소적으로 모발이 탈락하며 염증은 없다. 백회, 두유, 풍지, 격수, 족삼리, 삼음교	
	혈허형 17	두발이 점점 細軟하고 건조해지며 영화롭지 못하며, 골고루 탈락되며, 나날이 희소해지고 面色瑣白, 心悸健忘, 頭昏眼花, 少氣乏力, 舌淡脈細 + 간수, 신수, 태계
	혈열형 11,13,14	두발이 갑자기 탈락하고, 頭皮光亮, 국소적으로 微痒, 혹은 皮屑穢垢油膩, 心煩口渴, 便秘溲黃, 脈實或弦滑 + 곡지, 혈해
	혈어형 15	두발이 부분적으로 탈락하거나 전부 탈락하고, 혹은 눈썹도 탈락하며, 日久不長하며 面色暗晦, 舌有瘀點, 脈象沈澁 + 태충, 구허, 격수
주사비	面鼻部에 발생하는 일종의 만성 피부병으로, 특징은 피부가 미만성 홍조를 띠고 구진, 결절 혹은 농포를 동반하며 모세혈관이 확장되고 나중에는 鼻端이 비대해지고 鼻贅가 형성된다. 영향, 소료, 인당, 중저, 사백, 관료, 합곡, 천부, 협백	
경피병	① 국한성: 피부경화로 주로 표현	
	② 계통성: 내장기관까지 연계됨 [전체적 치료] 대추, 신수 / 명문, 비수 / 기해, 혈해 / 격수, 폐수 [국소적 치료] 팔사, 양지	