

8장 부인 질환

2. 월경질환

1) 월경부조

(1) 경조 - 월경주기 빨라져 심하면 한 달에 2번

기본치료혈		관원, 기해 [심번자] + 간사 / [홍협창통] + 내관, 기문 / [월경과다] + 은백
변 증	실열 09	월경량다, 색심홍혹자홍, 경질점조, 심홍번민, 색적구건, 대변비, 소변황, 설홍태황, 맥활삭 + 태충, 곡지
	허열	월경량소, 색홍, 경질점조, 조열도한, 수족심열, 요슬산연, 설홍소태, 맥세삭 + 족삼리, 연곡
	울혈	월경량혹다혹소, 색자홍, 경질점 유혈괴, 경행불창 홍협유방창통, 심번이노, 설태박황, 맥홍삭 + 행간, 지기
	기허	월경량다 색담, 경질청희, 면색황백, 신권지피(피곤), 심계기단, 소박만, 설담태박, 맥약무력 + 족삼리, 비수

(2) 경지 - 월경주기가 길어져 5-6주일 또는 그 이상

기본치료혈		기해, 기혈, 삼음교 [소복냉통] + 관원 / [심계실면] + 신문 / [소복창통] + 중극, 사만 月經量少, 色黯, 小腹冷痛, 得熱痛減, 畏寒肢冷, 脘腹冷痛劇烈, 舌苔薄白, 脈沈緊 + 귀래, 천추
변 증	실한 12,17,18	月經量少色淡, 經質清稀, 小腹隱隱作痛, 喜熱喜按, 腰痠無力, 大便薄, 舌淡苔白, 脈沈遲 + 명문, 태계
	허한 05	量少色淡, 小腹空痛, 身體瘦瘠, 面色萎黃, 頭目眩暈, 心悸少寐, 舌淡紅少, 脈虛細 + 비수, 격수, 족삼리

기체	量少色淡, 小腹脹滿而痛, 精神抑鬱, 胸痞不舒, 噯氣稍減, 胸脇乳房脹滿, 苔白脈弦 + 여구
----	--

(3) 경란 - 월경의 주기가 길었다 짧았다, 월경량과 기간도 일정x

기본치료혈		관원, 삼음교 [홍협창통] + 지구, 태충 / [요슬산연] + 신수, 곡천
변 증	간울 07,11,14	色紫紅 質黏稠, 經行不暢, 胸脇乳房脹痛, 噯氣不舒, 善太息, 舌苔白, 脈弦 + 태충, 간수, 기문
	신허	月經量少, 質稀, 腰膝痠軟, 頭暈耳鳴, 舌淡苔白, 脈沈弱 + 신수, 태계, 수천

2) 통경(월경통)

습음체 07	추위싫어, 따뜻하게 하면 통증 경감, 월경량少, 색 어둡고 혈괴, 허리까지 통증	중극, 지기, 수도 [복통련요] + 명문, 신수 / [극통] + 차료, 귀래
간울기체 12,13,15	아랫배 압통 뚜렷, 유방/가슴/옆구리 창만, 월경색 검붉고 덩어리, 혈괴 배출 시 통증 경감	기해, 태충, 삼음교 [복창만] + 천추, 기혈, 지기 / [협통] + 양릉천, 광명 / [홍민] + 내관
간신희손 11	은은하게 아픔, 색은 담, 허리와 무릎 시리고 아픔	관원, 간수, 신수, 조해, 족삼리 [두훈이명] + 태계 / [요슬산통] + 신수, 요안

3) 경폐(무월경) 09

(1) 혈고경폐 - 월경량이 점차 적어지다 무월경

기본치료혈	비수, 신수, 기해, 족삼리 [조열도한] + 고향, 연곡 / [납소설사] + 천추, 종완 / [심계정충] + 내관
-------	--

(2) 혈체경폐 - 갑자기 무월경

기본치료혈	중극, 합곡, 혈해, 삼음교, 행간 [홍협창만] + 기문, 지구 / [소복창만] + 기해, 사만
-------	--

4) 갱년기장애

(1) 갱년기장애 - 대략 45-55세에 난소 기능 쇠퇴하여 월경폐지, 조열, 번조 등

기본치료혈		풍지, 관원, 기해, 중완, 신수, 합곡, 족삼리, 곡골, 인당, 교신 [번조, 신지실상] + 합곡, 대릉 / [오심번열] + 조해, 노궁, 용천 [실면] + 신문 / [부종] + 관원, 족삼리, 수분 [다경혈량] + 태충, 교신, 삼음교
변 증	간신음허	정신이 긴장되고, 안면이 홍조하며, 가슴이 답답하고 화가 잘 나고, 현훈·이명하며, 기억력이 감퇴되고, 허리가 시리고 뼈가 아프다. 舌紅하고 찜는 적으며, 脈弦細數 + 태계, 간수, 백회
	심신불교 15	가슴이 뛰고 잘 놀라며, 번조로우면서 편안하지 않고 잠이 적어지면서 꿈이 많아진다. 입이 쓰고 목이 아프며, 오심번열이 있고, 기억력과 집중력이 감퇴된다. 舌紅苔少脈細數 + 심수, 통리, 지실
	비신양허	면색이 恍白하고 기력이 없으며, 추위를 싫어하고, 팔다리가 차고, 다리가 붓고, 변이 무르며, 밤에 소변을 자주 본다. 舌淡苔白色 脈沈弱 + 비수, 음릉천, 삼음교
	음허간왕★ 05,07,11,12 ,19	정지가 억울하고 별다른 이유 없이 비애에 잠기고 심한 경우 자제력을 잃게 된다. 舌紅苔少 脈弦細數 + 조해, 태충, 대릉

(2) 장조증 - 히스테릭 발작증후에 해당

심비구허	때때로 悲傷欲哭, 心悸燥煩, 鬱悶不安, 晝則慘慙, 夜則不眠 심하면 발광, 조번증을 발작하여 이를 狂躁라 한다
	대릉, 신문, 백회, 용천, 심수 [담탁] 중완, 풍릉 / [간화] 태충, 행간 / [혼부불성] 수구

3. 불임증 15

기본치료혈		중극, 삼음교, 대혈, 지기
변 증	신허	월경량이 적고 월경주기가 길며 안색이 창백하고 피로하며 허리가 시리고 아랫배가 차며 백대하가 있고 소변은 청장하고 舌淡 脈沈細 + 신수, 관원, 태계
	혈허	월경량이 적고 색이 淡하며 형체가 수척하며 머리가 어지럽고 이명이 나타나며 얼굴이 萎黃하고 피로하며 舌質淡 脈細弱 + 격수, 혈해, 족삼리
	간울	월경량이 불규칙하고 주기도 일정하지 않으며 흉협과 유방이 창통하며 자주 한숨을 쉬고 舌苔薄白 脈弦 + 태충, 음릉, 곡천
	습담★ 13,14,18 ,19	비만하고 월경부조 혹은 경폐가 나타나고 대하량이 많으며 色은 백색이고 피로를 느끼고 舌淡 苔白膩 脈滑, 보통 실증 + 중완, 풍릉, 음릉천
	어혈	經色이 암흑색이고 덩어리가 있으며 흉협과 유방이 창통하고 아랫배가 은은하게 아프며 舌은 암흑색이거나 어반이 있고 脈弦澁 혹은 沈澁 + 격수, 차료, 혈해

4. 여성생식기질환

1) 대하

기본치료혈		대맥, 백환수, 기해, 삼음교 [대하연면부절] + 충문, 기충 / [대하량다] + 대혈, 기혈 [대하색홍] + 간사
변 증	비허 05	대하의 양 多, 백색/담황색, 무취, 점조, 대하가 조금씩 지속적으로 나옴. 面色萎黃 納少便溏 精神疲倦 四肢倦怠 舌淡苔白膩, 脈緩弱 + 족삼리, 음릉천
	신허	대하가 청량, 양 多, 백색, 質稀薄, 지속적으로 흐르는 경향,. 腰痠如折 小腹冷 大便薄 小便清長 夜間尤甚 舌淡苔白, 脈沈遲, 尺脈尤甚 + 관원, 신수, 차료
	습열 12,17	대하가 황록색, 농이 있고, 혹은 혈액을 동반하거나, 쌀뜨물처럼 혼탁하고 냄새, 음부소양감, 구고인건, 소변단적 舌紅苔黃, 脈滑數 + 중극, 음릉천, 하료

2) 봉루

기본치료혈		① 실증: 기해, 삼음교, 은백 ② 허증: 관원, 삼음교, 신수
변 증	혈열	출혈량이 많거나 적으면서 계속되기도 한다. 심홍색, 끈적, 역한 냄새, 입안이 말라서 喜飲, 혀는 붉고 씹는 누르고, 脈滑數 + 혈해, 수전
	습열	출혈량 多, 자홍색, 끈적, 대하의 양도 많고 황색, 역한 냄새, 음부 소양감, 舌苔黃膩 脈濡數 + 중극, 음릉천
	기울 05	혈색은 정상이나 흑 혈괴가 보이기도 하며 번조이노, 소복창만의 전신증상이 나타나며 舌苔薄白, 脈弦 + 태충, 지구, 대돈
	혈어	漏下가 끊임없이 있으며 돌연 양이 많아지기도 한다. 자홍색/검은빛, 혈괴 有, 소복에 손을 못 댈 정도로 통증, 혈괴 배출 뒤 통증경감, 舌質紫暗 或瘀點 脈沈澀 + 지기, 기충, 충문
	비허	갑자기 대량 하혈/조금씩 흐르기도 하며 色淡質薄, 面色萎黃, 神倦肢怠, 氣短懶言, 納呆便溏, 舌質淡 苔薄白 脈沈細無力 + 기해, 비수, 족삼리 [열중] + 대추, 곡지 / [심번] + 간사 / [음부양통] + 여구, 혈해
	신양허	출혈량이 많고, 오래도록 그치지 않으며 담홍색이면서, 少腹冷痛, 喜溫喜按, 形寒畏冷, 大便薄 舌淡苔白, 脈沈細而遲 + 기해, 명문, 부류
	음허	출혈량이 적고 홍색, 두훈, 이명, 심번불매, 요슬산통의 증상이 나타나며, 舌紅하고 씹는 적고 脈細數 + 연곡, 음곡 [도한] + 음극 / [리수] + 고향 / [실면] + 신문

3) 음부소양증

기본치료혈		중극, 하료, 삼음교 [기양난인] + 곡골, 대돈 / [심번소매] + 간사
변 증	습열하주	외음부/질내 가려움, 심하면 통증, 황록색의 농 같은 또는 많은 양의 쌀뜨물 같은 비린내 나는 대하 수반. 외음 및 질이 붉은색/충혈. 가슴이 답답, 잠을 잘 이루지 못하며 입이 쓰고 입맛이 없다. 舌苔黃膩 脈弦細 + 혈해, 음릉천, 여구
	간신음허	음부가 乾澀하고, 작열감, 가렵다. 대하량이 적고 누렇기도 하여 심하면 血性. 五心번열, 머리와 눈이 어지럽고, 입이 쓰며 입이 마르지만 물을 마시고 싶지는 않다. 귀가 울리고 허리가 시리다. 혀는 붉고 씹는 적다. 脈細數無力 + 조해

4) 자궁하수(음탈) 07

기허 하함 10	개요	陰道 속에 탈출물, 일을 하면 더 심해지고, 身倦肢疲, 心悸氣短, 小便頻數, 四肢乏力, 白帶量多, 舌淡苔白 脈虛弱
	기본치료혈	백회, 기해, 유도, 족삼리, 삼음교
신허 실고	개요	陰挺, 小腹下墜, 요산퇴련, 소편빈삭, 백대가 없이 음도가 乾澀하고, 두훈, 이명, 舌淡紅 脈沈而弱
	기본치료혈	관원, 대혈, 자궁, 신수, 조해
습열 하주 05,15	개요	子宮이 탈출되고 표면에 潰瘍이 생기며 외음부가 부어오르고 아프며 황색의 분비물, 신열심번, 小便短赤熱 혹은 구고, 구건, 舌紅苔黃, 脈滑數
	기본치료혈	중극, 대맥, 차료, 곡천, 음릉천, 대돈

5) 유방질환

(1) 유소

기본치료혈		단중, 유근, 소택, 천중, 견정
변 증	기혈허약 08	산후 유즙 감소, 심하면 나오지 않음, 유즙이 묽고 유방이 유연, 창만하지 않는다. 안색창백, 입술과 손톱에 윤기가 없으며 피곤, 食少, 대변이 무르다. 舌質이 옅고 舌苔는 적고 脈虛細 + 비수, 족삼리
	간울기체★ 05,11,13,17,19	산후에 유즙이 나오지 않거나 감소하여 유방창만/통증, 흉협이 더부룩하고 그득하며 情志억울, 불쾌하며 위완부 답답. 식욕감퇴. 舌紅苔褐黃色 脈弦 + 내관, 태충

(2) 유옹 - 유선염

기본치료혈 14	족삼리, 상거허, 태충, 견정, 여태, 풍릉
----------	--------------------------

6) 임신질환

(1) 오조

변 증	비위허약 08	임신 후 2-3개월에 오심구토, 식즉토 혹은 구토清涎, 脘腹창만, 神疲倦怠 嗜臥嗜睡 舌淡苔白 脈滑無力 중완, 상완, 내관, 족삼리, 공손
	간위불화 12	임신초기에 쓴물이나 신물을 구토하며 脘悶脇痛, 噯氣歎息, 정신억울, 頭暈目窓. 舌苔微黃 脈弦滑 단중, 중완, 내관, 족삼리, 태충

(2) 자간증 - 임신 중 간질 (전신경련, 각궁반장, 수족추축, 신혼, 담연유출 등)

기본치료혈	백회, 인당, 수구, 내관, 풍지, 행간, 태충, 태계, 삼음교, 족삼리, 천주, 양릉천, 곡지, 풍부, 대릉, 견외수 [혈압항진] + 행간, 지음 / [두통] + 삼간
-------	---

(3) 태위이상 - 32주 이후에도 자궁 내 태아 위치가 부정한 것

기본치료혈	양측 지음에 뜸
-------	----------

(4) 난산(체산)

기본치료혈		합곡, 삼음교, 지음, 독음 [정신평로] + 관원, 기해 灸 / [심계기단] + 내관, 태계
변 증	기혈허약	양수가 터진 지 오래되었지만 분만X. 진통이 약하고 지속시간이 짧으며 하혈량 多, 면색창백 정신피로, 숨이 부족, 舌淡. 脈허약 + 족삼리, 부류
		양수가 터진 지 오래되었지만 분만X. 허리와 배가 지속적으로 심하게 아프며, 하혈량이 적고, 검붉은 색, 면색은 어두운 푸른색, 정신억울, 가슴과 상복부가 답답, 때때로 메스껍다. 舌暗紅色 脈沈實 + 태충, 견정
	기체혈어	

(5) 포의불하 (태반 반출X)

변 증	기허	출산 후에 태반불하, 소복창만, 압통 은은, 덩어리가 있지만 딱딱하지 않다. 맑은 색의 출혈량 多, 면색은 흰데 두훈, 심계, 氣短, 神疲, 舌淡苔薄白, 脈虛弱 + 관원, 족삼리, 삼음교, 독음
	혈어	태반불하, 소복이 차고 아프며 거안, 단단한 덩어리, 암홍색 오로가 조금 나오고 면색 자암, 舌質暗紅色 脈沈弦 혹은 沈澱 + 합곡, 삼음교, 중극, 기해, 독음, 견정

(6) 혈훈증

기본치료혈		족삼리, 삼음교, 중극, 조해, 내관, 곤륜, 인당, 수구, 지구 [급구훈결] + 인당, 백회, 수구
변 증	기허	頭暈眼花, 심하그득, 심하면 혼미, 사람을 알아보지 못하고, 면색창백, 口噤氣冷 呼吸短, 식은땀, 손발이 차고, 오로가 많아 멈추지 않는다. 舌淡少苔 脈虛細無力
		+ 관원, 기해, 신결, 족삼리
	혈허	두목현훈하며 돌연혼결하고 기허증상. 脈息細促 혹은 浮大而虛 + 삼음교, 태계, 간수, 격수, 관원, 족삼리
		어혈

(7) 산후복통

변 증	혈허 05	소복이 은은히 아프며, 腹軟喜按, 오로의 양이 적고, 어지러우며, 이명, 면색晄白, 心悸氣短, 대변조결하다. 舌質淡苔薄白 脈細數 + 관원, 기해, 족삼리, 삼음교
		소복냉통, 拒按, 따뜻한 것을 좋아한다. 면색청백, 사지불온, 심하면 구토. 舌質黯淡 脈沈緊 + 관원, 기해, 신수, 삼음교
	혈어	소복창만 또는 자통하여 흉협으로 이어진다. 오로의 양이 적으며 색이 거무스레하고 덩어리가 있다. 舌質紫黯 혹은 瘀斑이 있고 苔白 혹은 微黃하고 脈沈弦 + 중극, 귀래, 격수, 혈해, 태충

10장 안이비인후·치아 질환

1. 안질환

내장	睛瞳 속이昏暗, 예막이 흑정 내에 생겨서 동자를 가리는 것 외관으로는 정상, 동자 속 은은하게 청백한 것이 있기도 없기도 함 - 간수, 신수, 족삼리, 풍지, 천주, 합곡, 광명 - 찬죽, 사죽궁, 태양, 사백, 합곡	
	瞼裂處의 球結膜 위에 일종의 익상으로 된 채생물, 眼眦部位에 커다랗고 납작한 赤脈이 생겨나 白睛部位를 가로로 관통하여 黑睛 부분까지 침범, 심한 경우에는 동자에까지 이르게 되는 것 풍지, 태양, 찬죽, 정명 [풍열웅성] 열결, 십선, 합곡 [비위적열] 합곡, 족삼리 [신음모상] 간수, 조해 -	
노육반정	[안정통] 풍부, 풍지, 통리, 합곡, 신맥, 조해, 대돈, 규음, 지음 [안폭적중통] 신정, 상성, 신희, 전정, 백희 [안중통] 십선혈	
안구동통	[안정통] 풍부, 풍지, 통리, 합곡, 신맥, 조해, 대돈, 규음, 지음 [안폭적중통] 신정, 상성, 신희, 전정, 백희 [안중통] 십선혈	
안혼(청맹) 17	양쪽/한쪽 눈이 흑백은 구분이 되지만 사물이 분명하게 보이지 않는 것 풍지, 구후, 정명	
	간신부족	眼症同前 伴頭暈耳鳴 腰膝痠軟 咽乾潮熱 舌紅苔薄脈細大數 간수, 신수
	심영휴허	眼症同前 面白無華 頭暈心悸 失眠健忘 舌淡脈細弱 심수, 격수
	비신양허	眼症同前 面白形寒畏冷 腰膝痠冷 少氣乏力 食少便溏 舌淡 苔白 脈沈細 비수, 신수, 족삼리
	간기울결	眼症同前 情志不舒 頭暈目脹 口苦脇痛 脈弦細數 협계, 태충, 광명
	기혈어체	眼症同前 常伴頭眼部外傷史 頭痛健忘 舌色瘀暗 脈澀 기문, 내관, 격수, 상양
색맹 09	內絡의 기혈이 불화하여 汗孔의 기능에 영향, 간이 불화→ 오색 변 별x	
	[주] 천유, 상관, 동자료 [배오] 정명, 청궁, 사죽궁, 사백, 합곡, 광명, 족삼리 임읍, 행간, 중봉, 해계, 소부, 정명, 동자료, 풍지, 사백, 합곡, 족삼리, 광명, 행간	

목불명	시력이 약한 증상 (眼病은 대부분의 전신성 질환에서 일반적으로 나타남) 정명, 사죽궁, 찬죽, 상성, 전정, 천주, 양로, 광명 [보익간신] 간수, 신수, 곡천, 곤륜 [청심사화] 심유, 완골, 합곡	
	속눈썹이 내측 중앙으로 향하여 동자를 찌르는 증상 눈물 똑똑, 점차 예막이 생김, 안검 긴장, 속눈썹이 剋立되어 동자를 찌름	
목적통	목적, 안검부종, 동통이 주요증상으로 나타나는 급성 안질	
	외감풍열 11	目赤腫痛, 畏光, 流淚, 頭痛, 發熱, 眼澀爛睛, 脈浮數 풍지, 정명, 태양, 합곡, 곡지, 외관
	간담화성	目赤腫痛, 畏光, 流淚, 口苦煩燥, 舌邊紅, 苔黃, 脈弦數 풍지, 정명, 태양, 행간, 협계
목예	黑睛疾患으로, 예막의 크기가 일정하지 않고 厚薄이 똑같지 않으며 대개 瞳神을 가리어 시력이 저하되거나 시력장애가 있다. 정명, 찬죽, 승읍, 동자료, 풍지, 간수, 족임읍, 대소골공 [풍열] 임읍, 풍지, 합곡 [간신음허] 간수, 신수	
	黑睛疾患으로, 예막의 크기가 일정하지 않고 厚薄이 똑같지 않으며 대개 瞳神을 가리어 시력이 저하되거나 시력장애가 있다. 정명, 찬죽, 승읍, 동자료, 풍지, 간수, 족임읍, 대소골공 [풍열] 임읍, 풍지, 합곡 [간신음허] 간수, 신수	
유루증	냉루증 15,18	眼睛發赤, 통증X, 눈물, 바람을 쐬면 눈물이 흐름, 눈물이 날 때 열감이 없고, 치료하지 않으면 시력저하가 나타나기도 함 정명, 찬죽, 풍지, 간수, 신수
	열루증	眼睛紅腫, 熱痛, 畏光이 있으며, 누액은 점조하다. 바람을 쐬면 극렬해지고, 눈물이 날 때 열감이 있다. 정명, 찬죽, 합곡, 양백, 태충
안포종 (맥립증)	안검에 발생하는 국한성 종통, 경결, 동통, 觸痛을 주증으로 한다	
	비위온열 12,14,19	瞼緣에 국한성의 홍종경결, 동통 또는 축통, 경결의 꼭대기 끝에 나타나는 黃色膿點, 口臭, 心煩, 口渴, 苔黃膩, 脈濡數 승읍, 족삼리, 음릉천, 합곡, 소충
	외감풍열	瞼緣에 국한성의 홍종경결, 동통 또는 축통, 혹은 경결의 꼭대기 끝에 나타나는 黃色膿點, 惡寒發熱, 頭痛, 咳嗽, 脈浮數

		풍지, 정명, 합곡, 이침
사시	한 눈이 어떤 물체를 직시할 때 반대 눈이 그것과 다른 방향으로 향하는 것	
	풍지, 합곡, 구후, 정명, 태양	
	[소아통정] 정명, 찬죽, 동자료	-
근시	가까운 거리 사물은 잘 보이나, 먼 거리의 사물을 볼 때는 模糊不清한 질병	
	간신희손	視力遂漸減弱, 遠視模糊, 久視則眼痠, 頭暈 眼球痛, 兼有腰痠或失眠者, 舌紅, 脈細
		정명, 찬죽, 승읍, 풍지, 간수, 신수, 광명
원시	먼 거리의 사물은 잘 보이나, 가까이 있는 사물을 볼 때는 模糊不清한 질병	
	정명, 풍지, 간수, 신수 + 찬죽, 승읍, 동자료, 합곡, 족삼리, 광명, 태계	
수명	빛에 대한 과민반응을 보이는 현상	
	① 풍화: 目赤腫痛과 눈곱과 열루(熱淚)가 흐르는 경우	
	② 음허혈휴: 눈에 赤痛이 없고 乾澁羞明한 것	
안검순동	정명, 동자료, 찬죽, 합곡, 소골공, 이간, 행간, 광명	
	안검이 자기도 모르게 떨리는 것	
	정명, 사백	
	[풍열] + 찬죽, 두유	[혈허] + 혈해, 격수

2. 이질환

이명 15	內耳에서 올리는 소리를 자각하는 것	
	실증	暴病耳聾, 或耳中覺脹, 鳴聲隆隆不斷, 按之不減 ① 肝膽之火挾痰濁者 兼有頭脹 面赤, 咽乾 煩躁善怒, 脈弦 ② 外感風邪者 兼有畏寒發熱, 脈浮數 [실증] 예풍, 청회, 중저, 협계, 풍릉, 행간 [담실] 규음 상양 補, 양보 양곡 瀉
		久病耳聾, 或耳鳴時作時止, 聲細調底, 操勞則加劇, 按之鳴聲減弱 / 때때로 兼有頭暈, 腰痠, 遺精, 帶下, 脈虛細
이롱	허증 17	신수, 관원, 태계, 예풍, 청회, 중저
	청력장애를 말하는 것으로 重聽과 無聞의 구분이 있으며, 청력감퇴로부터 점차 全聾까지 되는 돌발성 이롱도 있다	
	[보] 예풍, 청회, 이문, 청궁, 신수, 족삼리	
	[사] 족임읍, 액문, 중저, 외관, 풍지, 합곡, 족삼리	
	[중청] 간수, 신수, 태계, 삼음교	[꼭청] 풍지, 합곡, 태충, 청회
정이	[이롱(허로리수)] 신수, 심수	[이롱기폐] 청궁, 청회, 예풍 / 삼리, 합곡
	[이롱무문] 천용	[이롱부득면] 액문
	耳內의 화농성 질환	
이통	실증 11,19	耳內 통증이 극렬, 작열감, 두통, 발열과 함께 鼻塞多涕, 咽乾口苦, 納呆 동반하며, 수일 후 고막의 궤파, 황색의 점조한 농의 유출. 舌紅, 苔黃膩, 脈弦數 풍지, 예풍, 청회, 중저, 족임읍, 대추
		時發時癒, 頭暈, 耳鳴, 聽力減退, 약간의 농유출이 동반, 비허자는 腹脹便溏, 納 동반. 舌紅苔少薄白, 脈弦細或 濡細
	허증 12	신수, 태계, 예풍, 중저
이통	예풍, 청회, 곡지, 외관, 합곡, 중저	

3. 비질환

비연	① 영향, 인당, 상성, 풍지	
	② 상영향, 인당, 폐수, 신수, 합곡, 열결	
	[면홍구고] + 행간, 풍지 -	
	급성	發病急, 兼有頭痛, 發熱, 納呆, 脈浮數 + 합곡, 열결, 대추
만성★ 11-14,18,19	反復發作, 鼻流濁涕, 色黃腥臭, 鼻塞不聞香臭, 頭昏 眉額脹痛, 思緒分散, 記憶減退	
	+ 족삼리	
비구 17, 18	맑은 콧물, 반복 鼻痒, 噴嚏 鼻塞, 鼻流清涕 鼻中水出 상성, 인중, 풍부, 백회, 풍지, 풍문, 대추, 신회, 전정, 영향, 합곡	
비색	비색불리, 不知香臭, 鼻塞聲重, 噴嚏하고, 후각장애와 함께 두통, 두훈, 악취의 증상을 나타낸다	
	영향, 상성, 인당, 신회, 백회, 사관, 외관, 찬죽	
	[해풍사] 풍부, 합곡, 상성	[비색폐한] 태백, 태연, 소부, 어제
	[비색부문향취] 영향, 상성, 합곡, 풍부, 백로, 전곡, 수구, 신회	
비치	비강 내부에 石榴子와 흡사한 치핵→점차 비색하여 호흡이 힘들어진다	
	폐수, 풍문, 풍지, 풍부, 척택, 열결, 합곡, 상성, 영향, 통천, 인당, 수구, 화료	
비사	비두혈관 확장→국부 피부가 發紅, 病久하면 자홍색, 비두가 증대	
	영향, 외관, 곡지, 합곡, 비준두, 대추, 백회	
비늑	주로 비종출혈을 의미	
	[폐열상옹] 풍문, 척택	[위열훈작] 합곡, 내정
	[간화상염] 간수, 곡천	[두풍겸늑혈] 상성, 영향, 풍부
	[폐위구열] 척택, 삼리, 내정	[폐신음허] 척택, 용천
비저/비옹	鼻中에 생기는 옹저	
	거료, 부류, 규음	

4. 구설질환

구고	口味가 苦하여 或 生瘡	
	족삼리, 절골, 연곡, 신문	
	[구고설건] 관충	[구고익중개개연] 양릉천
	[선구구고] 삼리, 양릉천	[구중고미] 통곡, 절골, 규음
구취 11	口內에서 醒臭 등의 취가 난다	
	대릉, 인중	
	[청심사화] 노궁, 관충, 외관	[청열거담] 염천, 충양, 내정
	[구취난근] 은교·승장 또는 금진	[구중종취] 노궁
	옥액	
구창	[구내생창 악취난근] 십선혈, 인중, 승장, 합곡, 금진옥액	
	口內에 창양과 미란이 발한다	
	심수, 비수, 위수, 풍지, 수구, 승장, 곡지, 노궁, 소상, 은백, 합곡	
	[청심사화] 노궁, 관충, 외관	[청열거담] 염천, 충양, 내정
	[구설생창(심열)] 합곡, 후계, 신	[구중란] 승장, 노궁
구건순종	문	
	[설치부란] 승장, 노궁	-
	口脣이 緊小해져서 개합이 안 되고 음식을 먹지 못하니 급치한다	
설창/설출혈	삼음교, 합곡, 족삼리, 수삼리, 소상, 상양	
	[견순 청심열] 신문, 대릉, 척택	-
	동통, 생창, 심하면 미란이 발생하며 설이 破하여 출혈	
중설/목설	금진옥액, 합곡, 위중, 내관, 수구	[설창] 삼음교, 용천
	[설상생창] 열결, 관충, 외관, 인중, 영향, 지창, 금진옥액	
	설하에 동통, 홍 혹은 자색의 종괴가 돌출되어 小舌狀을 형성하는 것	
중설/목설	① 중설: 舌根下에 작은 舌形을 한 것이 발생하는 것	
	② 목설: 舌腫이 口에 滿하여 氣를 면하지 못하는 증	
	십정혈, 십선혈 / 금진옥액, 내관, 합곡, 십정혈, 삼음교	
	[중설] 소상, 어제, 용천, 행간	[목설] 금진옥액, 십선혈
	[중설단아] 대둔·소충 보, 음곡·소해 사 / 음곡·곡천 보, 경거·중봉 사	
중설/목설	[중설종창 열극난언] 외관, 십선혈, 혈해, 금진옥액	

설강 12	혀가 강경해져 운동이 원활X, 언어불청 지체탄탄 구안와사 풍부, 염천, 통리, 행간
	[고열상진 조화치성] 중충, 어제, 외관 / 중충, 관충
설완	혀가 늘어져 뜻대로 움직이지X, 말X, 구안와사처럼 涎出不止하 는 증상
	염천, 삼음교, 내정

5. 치아질환

치통	위화아통	牙痛甚劇, 兼有口臭, 口渴, 便秘, 舌苔黃, 脈弦 하관, 내정, 협거, 합곡
	풍열아통	牙痛甚而齰腫, 兼形寒身熱, 苔薄白, 脈浮數 하관, 대추, 합곡, 외관, 협거, 풍지
	신허아통	牙痛隱隱, 時作時休, 口不臭, 或牙齒浮動, 舌尖紅, 脈細 태계, 행간, 합곡, 협거, 하관
치우 14	甘酸 과식하여 구강이 불결, 풍담습열이 수양명경으로 혼증하는 경우 에 多發	
	치주와 치아가 모두 아프고, 치근이 드러나며 요동한다 합곡, 삼간, 여태, 내정, 하관, 이문 [우치통] 합곡, 내정 [치우] 중저, 신맥, 합곡, 열결	
아감	치간홍종동통하고 지속적으로 출혈과 부식이 있거나, 냄새가 있는 것 합곡, 승장, 하관, 내정	
	보통 동통은 없고, 치간이 심홍색 혹은 자홍색, 표면은 수종과 치간 이 비대되면서 출혈 있는 만성염증 급성으로 발생하면 치간에 농종과 함께 고열, 두통, 인통, 구취, 충 혈, 극심한 통증과 함께 임파선종대 등을 볼 수 있다. 협거, 하관, 지창, 영향, 합곡, 격수	
치늑	외감풍열	+ 외관, 풍지
	양명실화	+ 내정, 족삼리, 대추
	양명허화	+ 삼음교, 태충

6. 인후질환

인후중 통	외감풍열 11,12	咽喉紅腫疼痛 兼惡寒 發熱 咳嗽 音啞, 喉間如有物梗阻, 吞嚥不利, 苔薄, 脈浮數 수태음, 수양명경 위주 / 소상, 합곡, 척택, 곡지
	위 중 실 화	咽喉紅腫疼痛 兼有口渴, 口臭 大便乾 小便黃 苔黃 脈 洪數 수·족양명경 위주 / 상양, 내정, 천돌, 척택
	신음후모 15	咽喉稍見紅腫, 疼痛較輕 咽乾舌燥 手足心熱 舌質紅 脈 細數 족소음, 수태음경 위주 / 태계, 조해, 어제
전후풍	열이 인후에 맺혀서 腫이 밖까지 뚫리고 마비가 오고 가려운 증. 二邊~ 턱밑을 지나서 붉음, 내외측에 모두 종이 남. 口禁不開 소상, 상양, 관충, 천돌, 합곡, 상성, 족삼리, 태계, 천용, 협거, 곡지, 위 중, 조해	
	聲音과 嘶啞를 지칭하는데, 심한 경우 소리를 내지 못하는 것 = 瘡	
실음	폭음	주로 실증, 인후부 질환과 유관, 외사를 感受/폐기옹성/聲道 가 불통 폐수, 천돌, 부들, 어제, 합곡
		정기가 손상되어 폐신음허하여 성도가 자운을 받지 못한 경우 신수, 폐수, 부류, 용천
	구음	
매핵기 13	인후에 매실씨 같은 이물감이 마치 매핵상, 嚔不出 嚥不下하는 상태 로, 정신위축, 번민, 불면, 흥민, 애역, 오심이 있다. 천돌, 단중, 내관, 행간, 열결, 족삼리, 조해	