

Performance Modeling of Computer Systems and Networks

Prof. Vittoria de Nitto Personè

The model for a service center:
analytical results

Università degli studi di Roma Tor Vergata
Department of Civil Engineering and Computer Science Engineering


Copyright © Vittoria de Nitto Personè, 2021
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



1

Analytical models

Server center




Little's law

$$E(T_s) = E(T_q) + E(S)$$

$$E(N_s) = \lambda E(T_s)$$

$$E(N_s) = E(N_q) + \rho$$

$$E(N_q) = \lambda E(T_q)$$



$$E(T_s) = \frac{E(N_s)}{\lambda}$$

$$E(T_q) = \frac{E(N_q)}{\lambda}$$


ok se conosco popolazione coda... ma senza?

Prof. Vittoria de Nitto Personè

2

2

The Kendall notation



Prof. Vittoria de Nitto Personè

3

3

Non-preemptive, abstract scheduling (Non conosco/uso dimensioni) → **M/G/1**
 non intercambiabili (nostra notazione)

FIFO, LIFO-non-preemp, Random] cambia variabilità

It seems like

FIFO should have the best mean response time because jobs are serviced most closely to the time they arrive

LIFO may make a job wait a very long time (difficile uno venga scalzato)

all the above policies have exactly the same mean response time.

Stesso tempo di risposta medio.

Prof. Vittoria de Nitto Personè

4

4

S.403 'Performance' Analytical models
M/G/1

1930: The Khinchin Pollaczek equation (KP)

Markov
espon.

generale
↑
servente singolo

M/G/1 abstract scheduling

$$E(N_Q) = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} \left[1 + \frac{\sigma^2(S)}{E(S)^2} \right]$$

dipende da
utilizzazione

= C^2
Squared coefficient of variation
Service time dispersion

1. Any service time distribution
2. Poisson arrivals
3. Abstract discipline (FIFO, LIFO, RAND...)

Prof. Vittoria de Nitto Personè 5

5

Analytical models
Phase-type distr

Phase-type distributions

Exponential

Servente singolo

k-Erlang
(se k=1 è caso precedente!)

1 server
k stadi di servizio
(service time 1/k*mu)

hyperexponential distribution
se p=0,5 → stadi equiprobabili → e espon.

1 server
due stadi con media esponenziali a 2 stadi (≈ 2 freq.)

Cox distribution
può modellare ogni distribuzione, fasi arbitrarie ed esponenziali, e exit (b_i) o fase successiva (a_i)

Finale

Prof. Vittoria de Nitto Personè

6

The Khinchin Pollaczek equation (KP)

$$E(N_Q) = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} [1 + C^2]$$

The mean queue population grows as C^2 (coeff. quadratic, dispersion tempi servizio attorno)

$$D \longrightarrow C^2=0$$

$$E_k \longrightarrow C^2 = \frac{1}{k}, k \geq 1$$

$$(espon.) \quad M \longrightarrow C^2=1$$

$$H_2 \longrightarrow C^2 = g(p) = \frac{1}{2p(1-p)} - 1$$

congestione coda = pop. media nella coda

var. crescente

$$60\% \text{ perimanti media } \frac{1}{2p\mu}, 40\% \frac{1}{2(1-p)\mu}$$

$$p = 0.6 \quad C^2 = 1.08\bar{3}$$


$$p = 0.7 \quad C^2 = 1.38095$$

$$p = 0.8 \quad C^2 = 2.125$$

$$p = 0.9 \quad C^2 = 4.\bar{5}$$

The Khinchin Pollaczek equation (KP)

M/G/1 abstract scheduling



$$\underbrace{E(T_Q)}_{\text{Little}} = \frac{E(N_Q)}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda 2(1-\rho)} [1 + C^2] = \frac{\rho}{1-\rho} \frac{C^2 + 1}{2} E(S)$$

Analytical models
M/G/1

$C^2 = \frac{\text{var}}{\text{media}^2}$

The Khinchin Pollaczek equation (KP) *generali*

$g(p) = \frac{1}{2\rho(1-p)} - 1$

$E(N_Q) = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} [1 + C^2]$, $E(T_Q) = \frac{\rho}{1-\rho} \frac{C^2 + 1}{2} E(S)$

Service time	$E(N_Q)$	$E(T_Q)$
Deterministic, M/D/1	$\frac{\rho^2}{2(1-\rho)}$	$\frac{\rho E(S)}{2(1-\rho)}$
Markovian, M/M/1	$\frac{\rho^2}{1-\rho}$ (metà)	$\frac{\rho E(S)}{1-\rho}$ (metà)
K-Erlang, M/E _k /1 $\sigma^2(S) = \frac{E(S)^2}{k}$	$\frac{\rho^2}{2(1-\rho)} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$	$\frac{\rho E(S)}{2(1-\rho)} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$
Hyperexpo, M/H ₂ /1 $\sigma^2(S) = E(S)^2 g(p)$	$\frac{\rho^2}{2(1-\rho)} (1 + g(p))$	$\frac{\rho E(S)}{2(1-\rho)} (1 + g(p))$

Prof. Vittoria de Nitto Personè

9

tutti i valori
sono
indipendenti
da C^2 .

- esempio provider che
dove fronteggiano gli arrivi:
raddoppiati
- 9
- $\lambda' = 2\lambda$
 $\mu' = 2\mu$
 $\rho' = \rho$
- $E(S') = \frac{E(S)}{2}$ nb: $E(T_Q)$ dip da $(E(S), \rho)$
- $E(T_S') = E(T_Q') + E(S') = \frac{E(T_Q)}{2} + \frac{E(S)}{2} = \frac{E(T_S)}{2}$

Analytical models
M/G/1

Service time Sensitivity

$$E(N_Q)_D \leq E(N_Q)_{E_k} \leq E(N_Q)_M \leq E(N_Q)_{H_2}$$

$$\sigma^2(N_Q)_D \leq \sigma^2(N_Q)_{E_k} \leq \sigma^2(N_Q)_M \leq \sigma^2(N_Q)_{H_2}$$

By considering $E(N_S) = E(N_Q) + \rho$, the same order holds for the variable N_S

By considering the Little's equation, the same order can be derived for the mean times $E(T_S)$ and $E(T_Q)$, but just for the 1° order moment, not for the variance

Prof. Vittoria de Nitto Personè

10

Discipline Sensitivity (scheduling)

By definition, KP holds for any abstract service discipline, so

$$E(N_Q)_{\text{FIFO}} = E(N_Q)_{\text{LIFO}} = E(N_Q)_{\text{RAND}} = E(N_Q)_{\text{abstract}}$$

$$\sigma^2(N_Q)_{\text{FIFO}} = \sigma^2(N_Q)_{\text{LIFO}} = \sigma^2(N_Q)_{\text{RAND}} = \sigma^2(N_Q)_{\text{abstract}}$$

By considering $E(N_S) = E(N_Q) + \rho$, the same equalities hold for the variable N_S

By considering the Little's equation, the same holds for $E(T_S)$ and $E(T_Q)$,

$$E(T_Q)_{\text{FIFO}} = E(T_Q)_{\text{LIFO}} = E(T_Q)_{\text{RAND}} = E(T_Q)_{\text{abstract}}$$

??, Is $\sigma^2(T_Q)$ the same for all these policies? ??
 lo scheduling conta!

Prof. Vittoria de Nitto Personè

11

11

Discipline Sensitivity


No!

LIFO can generate some extremely high response times because we have to wait for system to become empty to take care of that first arrival

"b" vede arrivare dei job, e il suo tempo di esecuzione ne risente.

$$\sigma^2(T_Q)_{\text{FIFO}} \leq \sigma^2(T_Q)_{\text{RAND}} \leq \sigma^2(T_Q)_{\text{LIFO}}$$

qui parlo di varianza (non media),
 e vale se ρ è grande, cioè se "b" ha alta probabilità che coda sia piena.



Prof. Vittoria de Nitto Personè

12

12