lecture 2 presentation

Simon Fløj Thomsen

29/7/2022

1/30

- 1 Fase diagrammer
- 2 Taylor approximation
- Opgaver

Section 1

Fase diagrammer

3/30

Ramsey model ligninger

Ligninger


$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}$$
$$\dot{k} = f(k) - c - (n+g)k$$

Kort forklaring af variable

- f'(k) interest on capital
- ρ Discount raten (hvor meget værdi de sætter på forbrug nu relativt til forbrug i fremtiden)
- $oldsymbol{ heta}$ "risk" parameter, hvis lille er husholdningerne "okay" med at lade deres forbrug svinge mere periode fra periode
- g vækstraten i teknologi
- n vækstraten i arbejdskraft

Dynamics of c

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}$$
$$f'(k) - \rho - \theta g = 0$$
$$\rho - \theta g = f'(k)$$




Dynamics of k


$$\dot{k} = f(k) - c - (n+g)k$$

$$f(k) - c - (n+g)k = 0$$


$$c = f(k) - (n+g)k$$



Combined



Combined



• k(0) eksogent bestemt

Section 2

Taylor approximation

9/30

Generalt

Før så vi saddelpath i mod ligevægten:

Men! Hvor hurtigt tilpasser vi os til (c^*, k^*) ved afvigelser?

Maclaurin polynomials

Approximation af f(x) når x = 0

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(x)^n$$

Taylor polynomials

Approximation af f(x) når x = c


$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (x - c)^n$$


Maclaurin polynomials


• Maclaurin approximation af f(x) når x = 0.


$$p(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0) * \frac{1}{2!}x^2 + f'''(0) * \frac{1}{3!}x^3 + \dots + f^n(0) * \frac{1}{n!}x^n$$

Udledning











Taylor polynomials


• Taylor approximation of f(x) when x=c


$$p(x) = f(0) + f'(0)(x - c) + f''(0) * \frac{1}{2!}(x - c)^{2}$$
$$+ f'''(0) * \frac{1}{3!}(x - c)^{3} + \dots + f^{n}(0) * \frac{1}{n!}(x - c)^{n}$$

Udledning









Som nævnt tidligere ønsker vi at finde ud af hvor hurtigt vi tilpasser os k^* ved små afvigelser (find hældningen af saddelpath omkring k^*)

Hvordan? Find 1. order Taylor approximation omkring $k=k^*$ og $c=c^*$ givet:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \rho - \theta g}{\theta}$$

$$\dot{k} = f(k) - c - (n+g)k$$

Først opstiller vi de to taylor approximations:

$$\dot{c} pprox rac{d\dot{c}}{dk}[k-k^*] + rac{d\dot{c}}{dc}[c-c^*] \ \dot{k} pprox rac{d\dot{k}}{dk}[k-k^*] + rac{d\dot{k}}{dc}[c-c^*]$$

Vi omskriver nu afvigelserne: $\tilde{c}=c-c^*$ og $\tilde{k}=k-k^*$ **Da** c^* **og** k^* **er konstante kan vi også skrive** $\dot{\tilde{c}}=\dot{c}$ **og** $\dot{\tilde{k}}=\dot{k}$

Dermed:

$$\dot{\tilde{c}} pprox rac{d\dot{c}}{dk}\tilde{k} + rac{d\dot{c}}{dc}\tilde{c}$$

$$\dot{\tilde{k}} pprox rac{d\dot{k}}{dk}\tilde{k} + rac{d\dot{k}}{dc}\tilde{c}$$

Vi kan nu finde de afledte!

• For $\dot{\tilde{c}}$

$$\frac{d\dot{c}}{dk} = \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}$$
$$\frac{d\dot{c}}{dc} = 0$$
$$\dot{c} = \frac{f''(k^*)c^*}{\theta}\tilde{k}$$

• For \hat{k}

$$\frac{d\dot{k}}{dk} = f'(k) - (n+g)$$

$$\frac{d\dot{k}}{dc} = -1$$

$$\dot{\tilde{k}} = [f'(k) - (n+g)]\tilde{k} - \tilde{c}$$

• ud fra $\dot{c}/c = 0$ kan vi udlede at $f'(k) = (\rho + \theta g)$

$$\dot{\tilde{k}} = [(\rho + \theta g) - (n+g)]\tilde{k} - \tilde{c}$$

• da $[(\rho + \theta g) - (n + g)]$ blot er parametre kan vi sætte det ligmed en konstant β

$$\dot{\tilde{k}} = \beta \tilde{k} - \tilde{c}$$

ullet For at få vækstraterne dividerer vi med \tilde{c} i $\dot{\tilde{c}}$ og \tilde{k} i $\dot{\tilde{k}}$

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \frac{\tilde{k}}{\tilde{c}}$$
$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}}$$

Vi kan se det der bestemmer growthrates i \tilde{c} og \tilde{k} er ratioen mellem de to!

Derfor hvis vækst raten er ens i de to $(\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}})$ vil rationen ikke ændres og der vil være en konstant vækstrate for både \tilde{c} og \tilde{k}

• For at gøre det nemmere sætter vi nu $\mu = \frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}}$ og kan omskrive $\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{f''(k^*)c^*}{a}\frac{\tilde{k}}{\tilde{c}}$ til:

• Ovenfor fandt vi at $\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}}=\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}}$ defor kan vi nu skrive:

$$\mu = \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}}$$

- Og kan nu indsætte udtrykket for $rac{ ilde{c}}{ ilde{k}}$

$$\mu = \beta - \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \frac{1}{\mu}$$

- Vi kan nu flytte det hele på venstresiden for at sætte ligmed 0:

$$\mu^2 - \beta \mu + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} = 0$$

• Vi kan bruge nulpunktsformlen:


$$\mu = \frac{\beta \pm [\beta^2 - 4(f''(k^*)c^*/\theta]^{1/2}}{2}$$

MEN! Husk at \tilde{c} og \tilde{k} er afstanden fra deres steady states levels! Derfor hvis $\mu>0$ vil afstanen vokse hver periode! Hvis tilgengæld $\mu<0$ vil vi gå mod en ligevægt i (c^*,k^*)

• Vi ved $f''(k^*)$ er negativ (Da marginal produktet af kapital er aftagende)

Derfor benytter vi følgende nulpunkt:

$$\mu = \frac{\beta - [\beta^2 - 4(f''(k^*)c^*/\theta]^{1/2}}{2}$$



Section 3

Opgaver

30 / 30