

Characteristic	Overall, N = 3,102¹	Severity 1, N = 1,992¹	Severity 2, N = 1,110¹	p-value²
local thrombolysis	520 (17%)	122 (6.1%)	398 (36%)	<0.001
percutaneous transluminal thromboembolectomy	522 (17%)	126 (6.3%)	396 (36%)	<0.001
Stent	802 (26%)	530 (27%)	272 (25%)	0.2
Stentgraft	64 (2.1%)	22 (1.1%)	42 (3.8%)	<0.001
Atherektomie	17 (0.5%)	10 (0.5%)	7 (0.6%)	0.6
Drug Coated PTA	271 (8.7%)	180 (9.0%)	91 (8.2%)	0.4
Drug-Eluting Stent	156 (5.0%)	96 (4.8%)	60 (5.4%)	0.5
A. Tibialis Anterior	209 (6.7%)	92 (4.6%)	117 (11%)	<0.001
A. Tibialis Posterior	104 (3.4%)	35 (1.8%)	69 (6.2%)	<0.001
A. Fibularis	141 (4.5%)	55 (2.8%)	86 (7.7%)	<0.001

Characteristic	Overall, N = 3,102¹	Severity 1, N = 1,992¹	Severity 2, N = 1,110¹	p-value²
Truncus Tibiofibularis	178 (5.7%)	86 (4.3%)	92 (8.3%)	<0.001
A. Femoralis Communis	167 (5.4%)	134 (6.7%)	33 (3.0%)	<0.001
A. Femoralis Superficialis	986 (32%)	693 (35%)	293 (26%)	<0.001
A. Femoralis Profundus	57 (1.8%)	36 (1.8%)	21 (1.9%)	0.9
A. Iliaca Communis	259 (8.3%)	209 (10%)	50 (4.5%)	<0.001
A. Iliaca Externa	209 (6.7%)	171 (8.6%)	38 (3.4%)	<0.001
A. Iliaca Interna	24 (0.8%)	22 (1.1%)	2 (0.2%)	0.005
A. Poplitea	480 (15%)	281 (14%)	199 (18%)	0.005
Total Proximal Arteries	2,182 (70%)	1,546 (78%)	636 (57%)	<0.001
Total Distal Arteries	632 (20%)	268 (13%)	364 (33%)	<0.001

Characteristic	Overall, N = 3,102 ¹	Severity 1, N = 1,992 ¹	Severity 2, N = 1,110 ¹	p-value ²
No Vessel recorded	288 (9.3%)	178 (8.9%)	110 (9.9%)	0.4

PAD-Group 1: PAD grade IIa and IIb

PAD-Group 2: III, IV, and diabetic foot syndrom

¹n (%)

²Pearson's Chi-squared test