

Characteristic	Overall, N = 956 ¹	Severity 1, N = 608 ¹	Severity 2, N = 348 ¹	p-value ²
Atorvastatin [mg]				0.5
10	24 (5.0%)	13 (4.6%)	11 (5.5%)	
20	135 (28%)	82 (29%)	53 (27%)	
40	261 (54%)	147 (52%)	114 (57%)	
80	47 (9.7%)	33 (12%)	14 (7.0%)	
unknown	16 (3.3%)	9 (3.2%)	7 (3.5%)	
Rosuvastatin [mg]				0.5
5	46 (19%)	33 (21%)	13 (16%)	
10	112 (47%)	76 (48%)	36 (45%)	
20	82 (34%)	51 (32%)	31 (39%)	
Fluvastatin [mg]				0.2
20	6 (38%)	6 (46%)	0 (0%)	
40	4 (25%)	2 (15%)	2 (67%)	

Characteristic	Overall, N = 956 ¹	Severity 1, N = 608 ¹	Severity 2, N = 348 ¹	p-value ²
80	6 (38%)	5 (38%)	1 (33%)	
Pitavastatin [mg]				
unknown	1 (100%)	1 (100%)	0 (NA%)	
Pravastatin [mg]				0.7
20	32 (30%)	24 (32%)	8 (28%)	
40	73 (70%)	52 (68%)	21 (72%)	
Simvastatin [mg]				0.4
10	1 (0.8%)	0 (0%)	1 (2.4%)	
20	34 (27%)	24 (29%)	10 (24%)	
40	78 (62%)	52 (62%)	26 (62%)	
80	10 (7.9%)	7 (8.3%)	3 (7.1%)	
unknown	3 (2.4%)	1 (1.2%)	2 (4.8%)	

PAD-Group 1: PAD grade IIa and IIb

PAD-Group 2: III, IV, and diabetic foot syndrom

¹n (%)

²Pearson's Chi-squared test; Fisher's exact test