



FICHE PRATIQUE

GÉRER SA COLÈRE

Le problème n'est jamais la colère : c'est ce qu'on en fait dans les trois minutes qui suivent.

REPÉRER AVANT L'EXPLOSION

La montée prend quelques secondes, la redescende environ vingt minutes. Une conversation reprise trop tôt repart en vrille.

Signes physiques à repérer : mâchoire serrée, chaleur au visage, poitrine comprimée, débit accéléré, voix qui monte.

Échelle de 1 à 10 : au-dessus de 5, le jugement est déjà dégradé. Le seuil d'action est 4, pas 8.

Mon signal physique personnel : _____

LE PROTOCOLE EN TROIS TEMPS

L'ÉTAPE	CONCRÈTEMENT
1. Annoncer, pas claquer	« Je suis en colère, j'ai besoin de vingt minutes, on reprend après ». Sans cette phrase, le départ est vécu comme un abandon
2. Bouger, pas ruminer	Marcher dehors. Vingt minutes assis à repasser la scène alimentent au lieu de calmer
3. Revenir	Sans retour, ce n'est pas une régulation, c'est une fuite. Parlez de vous, pas de l'autre : « je me suis senti... », pas « tu ne... jamais »

CE QUI NE MARCHE PAS

Frapper quelque chose pour « évacuer » : ça entretient l'excitation au lieu de la réduire.

Faire comme si de rien n'était : le sujet revient, plus tard et plus fort.

Bouder trois jours : une punition déguisée qui oblige l'autre à gérer votre état.

Parler à chaud « pour crever l'abcès » : l'abcès attendra vingt minutes.

LES CAUSES DE FOND — À REGARDER EN PREMIER

Le manque de sommeil : de loin la première cause, et la plus facile à corriger.

L'alcool, qui désinhibe précisément ce qui retient. La faim, dont l'effet est systématiquement sous-estimé.

La surcharge durable : là, ce n'est pas la colère qu'il faut traiter.

