

Section 1 – Informations de base

Champs à compléter	Réponse
PMID	37372896
Titre de l'article	Impact of multidisciplinary medication reconciliation service in older adult patients undergoing thoracic surgery (MERITS) on reducing medication discrepancies: a prospective, controlled, before-and-after study
Pays d'origine de l'étude	Corée du Sud
Année de publication	2026
Nombre de groupes à l'étude	2 (Groupe contrôle VS Groupe interventionnelle)
Type d'étude	☐ Rétrospectif ☒ Prospectif ☐ Transversal
Groupe contrôle	☒ Oui ☐ Non
Insu	☒ Aucun ☐ Insu Simple ☐ Insu Double ☐ Insu Triple
Répartition	☒ Non-aléatoire ☐ Quasi-aléatoire ☐ Aléatoire
Localisation	☐ Autre ☐ Clinique externe ☒ Hôpital ☐ Mixte ☐ Officine
Devis	Étude avant-après
Durée de l'étude	Décembre 2021 à Septembre 2023

Durée de l'intervention	13 mois
-------------------------	---------

Section 2 – Évaluation critique

Objectif(s)	Primaire : Évaluer l'impact de la conciliation médicamenteuse lors des transitions de soins chez des patients âgés opérés en chirurgie thoracique Secondaire : Evaluer - les MAI (index des médicaments appropriés) - les DRP (problèmes liés au médicament) - le recours aux soins de santé et les réadmissions imprévues dans le mois suivant la sortie de l'hôpital - Les interventions effectuées par les pharmaciens
Critères d'inclusion	Patients âgés de 65 ans ou plus, opérés en chirurgie thoracique, et qui prenaient au moins un traitement chronique par voie orale
Critères d'exclusion	Hospitalisation de moins de 48h Incapacité à comprendre ou remplir le questionnaire Décès pendant l'hospitalisation Inéligibilité déterminée par le personnel médical Intervention multidisciplinaire non réalisable
Acteurs	Pharmaciens cliniciens Infirmières Médecins
Localisation	Hôpital de l'Université Nationale de Séoul (SNUH) : thoracic surgery wards of a tertiary general hospital
Description	Les pharmaciens ont obtenu l'historique thérapeutique optimal (BPMH) dès l'admission afin de l'utiliser dans la prise en charge du patient, contrairement aux soins habituels, où le BPMH était documenté après la sortie. Les résultats mesurés comprenaient les divergences de traitement à l'admission et à la sortie, les problèmes liés aux médicaments (DRP), ainsi que les consultations médicales (service des urgences, consultation externe et réadmission imprévue) dans le mois suivant la sortie.

Limites	Étude monocentrique Étude non randomisée Pas d'aveugle Diversité des pratiques du au changement de personnel
Outils	MAI : indice de pertinence des médicaments DRPs : classification des problemes medicamenteux

Paramètre 1	Type de marqueur : Erreur Description du paramètre : Discordance à l'admission Description du paramètre (anglais) : Discrepancy at admission Résultat : Groupe contrôle 62.0% vs groupe interventionnelle 2.8% Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 2	Type de marqueur : Erreur Description du paramètre : Discordance à la sortie Description du paramètre (anglais) : Discrepancy at discharge Résultat : Groupe contrôle 46.3% vs groupe interventionnelle 0.9% Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 3	Type de marqueur : Morbidité Description du paramètre : Problèmes liés à la consommation de drogues dans le mois suivant la sortie de l'hôpital Description du paramètre (anglais) : Drug related problems within 1 month after discharge Résultat : Groupe contrôle 32.4% vs groupe interventionnelle 14.8% Type de retombée : ☒ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 4	Type de marqueur : Morbidité Description du paramètre : Consultation médicale pour quelque raison que ce soit dans le mois suivant la sortie de l'hôpital Description du paramètre (anglais) : All cause healthcare visit within 1 month after discharge Résultat : Groupe contrôle 24.1% vs groupe interventionnelle 29.2% avec $p = 0.403$ Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☒ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 5	Type de marqueur : Morbidité Description du paramètre : Consultation médicale liée à un traitement médicamenteux dans le mois suivant la sortie de l'hôpital Description du paramètre (anglais) : Medication-related healthcare visit within 1 month after discharge Résultat : Groupe contrôle 6.5% vs groupe interventionnelle 4.2% avec $p = 0.526$ Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☒ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 6	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 7	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 8	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
Paramètre 9	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)

Paramètre 10	Type de marqueur : Sélectionner Description du paramètre : Description du paramètre (anglais) : Résultat : Type de retombée : ☐ Significatif (Positif) ☐ Non Significatif ☐ Significatif (Négatif)
--------------	---