スピロジクロフェン水和剤 取扱メーカー: バイエル ダニエモンフロアブル 原体メーカー: ゴーワン 成分: スピロジクロフェン〔環状ケトエノール系〕……30.0% 性状: 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性: 普通物 消防法: —

【品目特性】

- ●既存の殺ダニ剤とは全く異なる新しい系統の構造を持つ殺ダニ剤で、作用機構が全く異なるため既存の殺ダニ剤との交差抵抗性は認められない。
- ●全てのステージのミカンハダニ, ミカンサビダニに作用するが, 卵, 幼虫に対して特に高い活性を示す。
- ●成虫に対する効果発現は遅効的だが、産卵抑制 作用が優れ、また産下卵もふ化しないので、低濃 度で長期間ミカンハダニの密度を抑制する。
- ●ミカンハダニとサビダニ類の同時防除が可能である。
- ●蚕・ミツバチ・有用昆虫に対する安全性の高い 薬剤である。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ●ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないように丁寧に散布する。
- ●連続散布はハダニ類の抵抗性を増加させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用する。
- ●ミカンキジラミの防除に使用する場合は、成虫には効果が劣るので、幼虫防除を対象とした散布を行う。
- ●本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用 に際しては容器をよく振る。

【安全対策上の注意】 ……………

●カブレやすい人は取扱いに十分注意する。





【適用と使用法】……

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤及びスピロジクロフェンを含む農薬の総使用回数	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	4000~ 6000倍		7日前まで	1 回	散布
	サビダニ類 (ミカンサビダニを除く) チャノホコリダニ ミカンキジラミ	4000倍	200 ~ 700 ℓ			
びわ	ビワサビダニ					
さんしょう (果実)	ミカンハダニ			21日前まで		
茶	チャノナガサビダニ	2000倍	200 ~ 400 ℓ	摘採14日前 まで		