

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン剤 キマリテ (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 北興、全農・バイエル・北興
成分： イプフェンカルバゾン〔トリアゾリノン系〕 ……2.5% (粒剤), 8.3% (ジャンボ), 5.0% (フロアブル) テフリルトリオン〔トリケノン系〕 ……3.0% (粒剤), 10.0% (ジャンボ), 6.0% (フロアブル) その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム〔PRTR・1種〕………1.2% (ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒, 水溶性パック入り1パック30g(ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体(フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

〈共通〉

●2種類の有効成分からなる水稲用一発処理除草剤。

●ノビエに対して、発生前から3葉期 (粒剤の直播水稲では2.5葉期) までの処理で優れた効果を示す。またノビエに対する残効性に優れ、ノビエの発生を長期間抑える。

●スルホニルウレア系除草剤に抵抗性のホタルイ、コナギ、アゼナ類や特殊雑草 (イボクサ、クサネムなど) など幅広い草種に高い効果を示す。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤・フロアブル〉

●田植同時処理が可能である。

〈ジャンボ〉

●移植直後から使用できる。

●小包装 (パック) のまま畦畔から10 a 当り10パック投げ入れるだけで処理は完了する。

●水口施用も可能である。

【使用上のポイント】……………

〈共通〉

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

●ノビエの3葉期 (粒剤の直播水稲では2.5葉期) までに時期を失しないように散布する。

●多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

●オモダカ、クログワイ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な前処理剤又は後処理剤と組み合わせて使用する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ウリカワ	3葉期まで	3葉期まで (直播水稲では2葉期まで)	3葉期まで
ミズガヤツリ	3葉期まで		
ヘラオモダカ	2葉期まで		3葉期まで
クログワイ オモダカ	発生始期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生始期まで		
シズイ	草丈3cm まで		
アオミドロ・ 藻類による表層はく離	—		発生前まで

〈粒剤〉

●田植同時処理で施用する場合、終了後はできるだけ速やかに入水する。

〈ジャンボ〉

●水口施用の場合は、水口付近の水深を2～3 cm 程度に湛水した状態で、入水時に小包装 (パック) のまま水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。施用後田面水が通常の湛水状態 (湛水深5～6 cm) に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意する。

【薬効・薬害等の注意】……………

〈共通〉

●活着遅延を生じするような低温、寡照条件下では薬害のおそれがあるので使用をさける。

●砂質土壌及び漏水田 (減水深2 cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植の水田及び浮き苗の多い水田では薬害が発生するおそれがあるので使用をさける。

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（水稻）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈ジャンボ〉

●投げ入れ処理の場合は、小包装（バック）のまま10 a 当り10個の割合で均等に投げ入れる。

〈粒剤・フロアブル〉

●稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しない。

【安全対策上の注意】

〈共通〉

●藻類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意する。

〈粒剤〉

●周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈フロアブル〉

●周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。

●無人ヘリコプター滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈粒剤・フロアブル〉



【適用と使用法】

①キマリテ1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ	移植時	1kg	田植同時散布機 で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布又は無人 航空機による 散布	
直播水稻	水田一年生雑草 ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリルトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②キマリテジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ シズイ ヒルムシロ セリ	移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g)	水口施用又は水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで		水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	

※イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③キマリテフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ シズイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	500 ml	田植同時散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布、 水口施用 又は 無人ヘリコプターによる滴下	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布 又は 無人ヘリコプターによる滴下	

※イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内