

ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン剤 センイチMX (1キロ粒剤 / ジャンボ)	取扱メーカー： 石原 原体メーカー： 協友アグリ、石原産業、シンジェンタ
成分： ピラクロニル2.0% (粒剤), 4.0% (ジャンボ) フルセトスルフロン〔スルホニルウレア系〕0.20% (粒剤), 0.40% (ジャンボ) メソトリオン〔トリケトン系〕0.90% (粒剤), 1.8% (ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤), 類白色細粒 水溶性パック入り 1パック 50g (ジャンボ) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】

〈共通〉

- ノビエ3.5葉期まで使用できる初・中期一発処理除草剤である。
- 高葉齢のノビエを始め、一年生雑草から多年生雑草に対し高い除草効果を示す。
- スルホニルウレア抵抗性の高葉齢ホタルイ、コナギに対しても高い除草効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

〈共通〉

- 共通注意事項の5、水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 移植水稻及び直播水稻に使用する場合は使用時期は、ノビエ3.5葉期までなので、時期を失ないように散布する。
- 田植え前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、完全に防除してから使用する。
- 多年生雑草は、生育段階によって効果にフレが出るので必ず適期に散布する。
- クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイに使用する場合は、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

〈移植水稻〉

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ	3 葉期まで	4 葉期まで
へらオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ		3 葉期まで
オモダカ		発生始期まで
クログワイ コウキヤガラ		草丈10cmまで
シズイ	草丈3cmまで	
エゾノサヤヌカグサ	2 葉期まで	
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生前～再生始期まで	
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで	

〈直播水稻〉

雑草名	散布適期	
	粒剤	ジャンボ
ホタルイ ミズガヤツリ	3葉期まで	3葉期まで
ウリカワ	2葉期まで	
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生前～再生始期まで	

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5、水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 水稻の根が露出する条件では使用しない。

●散布後の低温及び急激な気温の上昇に十分注意する。

〈ジャンボ〉

●小包装（パック）のまま10 a 当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

●散布時は水深を5～6 cmにする。

●藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。



【安全対策上の注意】

〈粒剤〉

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】

①センイチ M X 1キログラム粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤマカグサ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg	田植同時散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫60日前まで		湛水散布又は無人航空機による散布	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫60日前まで			

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メソトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②センイチMXジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ シズイ エゾノサヤマカグサ アオミドロ・藻類による表 層はく離	移植後5日～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫60日前まで	小包装 (パック) 10個 (500g)	水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	1回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 但し、 収穫60日前まで			

※ビラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※メソトリオンを含む農薬の総使用回数 : 2回以内