

ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤 ヒエクリンバサグラン粒剤	取扱メーカー： クミカ、サンケイ*、日農 原体メーカー： クミカ、BASF
成分： ピリミノバックメチル〔ピリミジニルカルボン酸系〕…0.40% ベンタゾンナトリウム塩〔ダイアジン系〕………11.0%	性状： 淡灰色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 2成分の中後期剤で、初期剤や一発剤との体系に最適である。
- スルホニルウレア抵抗性雑草にも高い効果を示す。
- 殺草スペクトラムが極めて広く、難防除雑草にも有効である。
- 稲に対して高い安全性を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ノビエの発生前から4葉期に有効であり、イネ科以外の雑草には生育期に有効であるので時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ウリカワ	4葉期まで
オモダカ	矢尻葉抽出期まで
クログワイ	草丈15cm前後
シズイ	草丈30cmまで

- オモダカ、クログワイ、シズイに使用する場合は、有効な前処理剤と組み合わせて使用する。
- 散布の際は、水の出入りを止めてごく浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にして田面に均一散布する。
- 散布後少なくとも2日間はそのままの状態を保ち、その後、入水し、通常の湛水状態を保つ。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。万が一散布後に降雨があった場合は、落水せずそのままの状態を保つ。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布後の数日間に著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていない。
- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（くわい、せり）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ シズイ	移植後 15 日～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで	3kg	ごく浅く湛水 して散布	1 回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ	稲 3 葉期～ ノビエ 4 葉期 但し、 収穫 60 日前まで			

※ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数：2 回以内

※ペンタゾンを含む農薬の総使用回数：2 回以内