

<b>なたね油乳剤</b> <b>ハツパ乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ，ホクサン  <b>原体メーカー：</b> サンケイ
<b>成分：</b> なたね油……………90.0%	<b>性状：</b> 淡黄色澄明可乳化油状液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> 第4類・第4石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- 使用時期、使用回数に制限はない。
- ハダニ，うどんこ病菌に対して物理的な作用を示す。
- ミツバチ、有用昆虫に対する影響は少ない。
- 有効成分は天然のなたねより抽出したなたね白絞油で、安全性に優れ、有機農産物の生産に使用できる剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- うどんこ病に対して使用する場合，発病後からの散布では効果が劣るので発生前～発生初期から予防的に散布する。
- ハダニ類に対して使用する場合，散布液が直接

かかるよう葉の表裏にていねいに散布する。多発生時には効果を高めるために7日程度の間隔で連続散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 薬液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- アルカリ性の強い農薬との混用はさける。
- ジチアノン剤の散布後は10日以上の間隔をあけて散布する。
- かんぎつには，樹勢が弱っている場合，散布後果実に油浸斑を生じるので使用しない。
- 適用作物（きゅうり，かんぎつ）の薬害などの注意は薬害注意事項解説を参照。

### 【安全対策上の注意】……………



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	なたね油を含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 ハダニ類	200倍	—	—	散布	—
かぼちゃ ズッキーニ	うどんこ病					
ばら	ハダニ類 うどんこ病					
かんぎつ	ミカンハダニ	100～200倍	夏期(5～10月)			