

<b>ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤 シグナム WDG</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，BASF  <b>原体メーカー：</b> BASF，BASF
<b>成分：</b> ピラクロストロビン〔ストロビルリン系〕……………6.7% ボスカリド〔カルボキサミド系〕……………26.7%	<b>性状：</b> 褐色水和性細粒及び微粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 作用性の異なる剤を混合する事で、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害に優れた効果を示す。
- 両有効成分とも葉内に浸透するため残効性、耐雨性に優れる。
- 胞子発芽阻害効果に優れ、予防的な散布で優れた効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加える。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- なすに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると薬害が生じるおそれがあるので、さける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにする。
- 魚類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
ね ぎ	べと病 黒斑病 さび病	1500倍	100～ 300ℓ	7日前 まで	3回 以内	散布	3回以内	3回以内
たまねぎ	灰色腐敗病	500倍	—	定植直前	1回	5分間苗 根部浸漬 5分間セ ル苗浸漬	4回以内 (定植前は1 回以内，定 植後は3回 以内)	4回以内 (定植前は1 回以内，定 植後は3回 以内)
	灰色かび病 べと病 小菌核病 白色疫病	1500倍	100～ 300ℓ	7日前 まで	3回 以内	散布		

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ビアクロストロピンを 含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む 農薬の総使用回数			
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	1500 倍	100～ 300 ℓ	7 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内	2 回以内			
	べと病	1500～ 2000 倍			3 回 以内		3 回以内	3 回以内			
はくさい	菌核病 炭疽病	1500 倍							前日まで	2 回 以内	2 回以内
	白斑病 黒斑病 べと病 白さび病	1500～ 2000 倍									
	なす	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐色斑点病		1500 倍							
すすかび病		1500～ 2000 倍		2 回 以内	2 回以内						
ト マ ト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 菌核病	2000 倍					3 回 以内	3 回以内			
	ピーマン								うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病 斑点病	2 回以内	
とうがらし類									うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病		2 回以内
す い か	炭疽病 うどんこ病 つる枯病			1500～ 2000 倍	14 日 前 まで				2 回 以内	3 回 以内	3 回以内
	菌核病 褐色腐敗病	1500 倍		3 日 前 まで			3 回 以内	3 回以内			
かぼちゃ	うどんこ病	1500～ 2000 倍			7 日 前 まで				2 回 以内	2 回以内	2 回以内
にんじん	黒葉枯病 うどんこ病 斑点病	2000 倍		3 日 前 まで			3 回 以内	3 回以内			
にんにく	さび病 白斑葉枯病 黄斑病 葉枯病	1500 倍			7 日 前 まで				2 回 以内	2 回以内	
レ タ ス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500～ 2000 倍		7 日 前 まで			2 回 以内	2 回以内			
	べと病										

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ピラクトロピンを 含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む 農薬の総使用回数
非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500 倍	100～ 300 ℓ	14 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内	2 回以内
	べと病	1500～ 2000 倍						
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	1500 倍		7 日前 まで				
	べと病	1500～ 2000 倍						
い　ち　ご	灰色かび病 うどんこ病 炭疽病	2000 倍		前日まで				2 回以内
	バ　ジ　ル			べと病				
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	1500 倍	前日まで					
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 さび病	100～ 300 ℓ						
	うどんこ病	1500～ 2000 倍						