

ピラゾレート・ベンゾビスシクロン・メタゾスルフロン粒剤 シュナイデン (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ, エス・ディー・エス, 日産
成分： ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・第1種〕 ……10.0% (粒剤), 25.0% (ジャンボ), 18.2% (フロアブル) ベンゾビスシクロン〔ビスシクロオクタン系〕 ……2.0% (粒剤), 5.0% (ジャンボ), 3.6% (フロアブル) メタゾスルフロン〔スルホニルウレア系〕 ……0.60% (粒剤), 1.5% (ジャンボ), 1.1% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状, 水溶性パック入り 1パック40g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消除法： ——

【品目特性】……………

〈共通〉

- 水稲用初・中期一発処理除草剤。
- 多年生雑草に対して効果が優れる。
- スルホニルウレア系除草剤抵抗性を獲得した雑草 (ホタルイ, アゼナなど) にも効果を示す。
- ピラゾレートとベンゾビスシクロンの共力効果でホタルイへ安定した効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤〉

- 1キロ粒剤は田植同時処理でも使用可能。

〈ジャンボ・フロアブル〉

- 移植3日後から使用可能。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	3葉期まで 2葉期まで	(移植水稲) (直播水稲)	3葉期まで
ミズガヤツリ	3葉期まで (移植水稲) 2葉期まで (直播水稲)	3葉期まで	3葉期まで (移植水稲) 2葉期まで (直播水稲)
ウリカワ	3葉期まで (移植水稲) 発生始期まで (直播水稲)	3葉期まで (移植水稲) 2葉期まで (直播水稲)	3葉期まで (移植水稲) 発生始期まで (直播水稲)
ヘラオモダカ	2葉期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		
クログワイ オモダカ	発生前～発生始期まで		
コウキヤガラ	発生始期まで		
シズイ	草丈3cm まで		—

〈ジャンボ〉

- 畦畔から小包装のまま10 a 当たり10個の割合で均等に投げ入れる。
- 処理に当たっては、水の出入りを止めて水深5～6 cmの湛水状態にする。

〈フロアブル〉

- 使用前に容器をよく振る。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 補植は必ず散布前に行う。
- 適用作物 (水稲) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物 (いぐさ, れんこん, セリ, くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害などの注意を参照。

【安全対策上の注意】……………

〈共通〉

- 蚕に影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにする。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

〈粒剤〉

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼をする。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

- 水溶性フィルムが破袋した場合は、眼に刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し眼科医の手当を受ける。
- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。
- 水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにする。

〈フロアブル〉

- 無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈粒剤・フロアブル〉



【適用と使用法】……………

①シュナイデン1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植時	1kg	田植同時散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		湛水散布 又は無人航空機による 散布	

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

※メタゾスフルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②シュナイデンジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植後 3 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	小包装 (パック) 10 個 (400 g)	水田に小包装 (パック) のま ま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで			

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内
 ※メタゾスフルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③シュナイデンフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草	移植後 3 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	500 ml	原液湛水散布, 水口施用又は 無人航空機に よる滴下	1 回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで			

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内
 ※メタゾスフルロンを含む農薬の総使用回数：2回以内