

ピラゾレート・ペントキサゾン水和剤 スウィープフロアブル	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 三井アグロ，科研製薬
成分： ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・1種〕……………20.0% ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕……………4.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 移植前後に使用できる初期除草剤である。
- ノビエを始めウリカワ等，幅広い雑草の初期発生を抑える初期除草剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5，水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので，ノビエの1葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので，必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ オモダカ	発生始期まで
クログワイ	発生前まで

- オモダカ，クログワイは発生期間が長く，遅い発生のものまで十分な効果を示さないので，有効な後処理剤と組み合わせて使用する。後処理剤と組み合わせて連年使用することにより，さらに効果が向上する。
- 処理後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保つ。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5，水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は薬害注意事項解説を参照。
- 適用外作物（れんこん，くわい，せり）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 無人ヘリコプター滴下の際は，共通注意事項2，空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 作業時に着用していた衣類等は他のものとは分けて洗濯する。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 藻類に影響を及ぼすので，河川，養殖池等に飛散，流入しないよう注意して使用する。無人ヘリコプターによる滴下で使用する場合は，飛散しないよう特に注意する。散布後は水管理に注意する。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用 方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ	植代後～移植前7日 又は移植直後～ ノビエ1葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる滴下	1回 ※

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数 ： 2回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数： 2回以内