

<b>スルホキサフロル水和剤</b> <b>トランスフォームフロアブル</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産、北興、ダウ  <b>原体メーカー：</b> ダウ
<b>成分：</b> スルホキサフロル〔スルホキシイミン系〕……………9.5%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- カメムシ目の吸汁性害虫に優れた効果を示す。幅広い種類のアブラムシ類、カイガラムシ類に効果が期待できる。
- アブラムシ類、コナジラミ類に対しては速やかに行動異常（脚の痙攣など）を引き起こし、速効的な殺虫作用を示す。
- 長期間、効果の持続が期待できる。
- 浸透移行性、浸達性に優れるため、耐雨性も期待できる。
- カイガラムシ類の一部の種では、齢期の進んだものにも殺虫効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 使用前によく振ってから使用する。
- タバココナジラミ バイオタイプQに対しては1000倍散布が望ましい。
- カイガラムシ類に対しては、幼虫歩行期が散布適期である。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉へかからないようにする。
- つまみ菜、間引き菜には使用しない。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スルホキサフロルを 含む農薬の総使用回数	
りんご	アブラムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	リンゴワタムシ カイガラムシ類 コアオカスミカメ	1000～ 2000倍						
なし	アブラムシ類	2000～ 4000倍						
	カイガラムシ類	1000～ 2000倍						
かんきつ	アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫	2000倍						
	カイガラムシ類 アザミウマ類	1000～ 2000倍						
ネクトリン すもも	アブラムシ類	2000倍		3日前 まで				
おうとう	カイガラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで				
				14日前 まで				
ぶどう								
キャベツ	アブラムシ類 ネギアザミウマ	2000倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2回以内			2回以内
だいこん レタス 非結球レタス 非結球あぶらな科葉菜類 ブロッコリー								
はくさい	アブラムシ類						3日前 まで	
ほうれんそう				14日前 まで				
しそ				7日前 まで				
きゅうり すな ピーマン	コナジラミ類			1000～ 2000倍		前日まで		
トマト ミニトマト	アブラムシ類			2000倍				
	コナジラミ類 トマトサビダニ	1000～ 2000倍						
ばれいしょ ごぼう	アブラムシ類	2000倍		7日前 まで	3回以内	3回以内		
やまのいも			3日前 まで					
きく			アザミウマ類	1000～ 2000倍			発生初期	
つつじ類	ツツジグンバイ	2000倍						