

NAC粒剤 デナボン5%バイト	取扱メーカー： サンケイ，日農，一農，琉産 原体メーカー： T K I
成分： NAC〔カーバメート系 PRTR・1種〕……………5.0%	性状： 淡褐色粒状4～7mm 毒性： 普通物 消除法： ——

【品目特性】……………

- 誘引物質を添加した粒剤で，害虫が摂食して死亡する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 作物の株の周りに散布する。土壌を混和しない。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（たばこ）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 家さん，家畜，ペット等が誤食しないように注意する。
- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	10a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	NACを含む農薬 の総使用回数
キ ャ ペ ツ	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3～6kg	14日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
	コオロギ ダンゴムシ	3～4kg				
は く さ い	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3～6kg	21日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
	コオロギ ダンゴムシ	3～4kg				
だ い こ ん た ば こ	ネキリムシ類	3～6kg	30日前まで	4回以内	株元散布	4回以内
			移植時	1回		2回以内