

ブタミホス乳剤 クレマート乳剤	取扱メーカー： サンケイ，日農，北興，住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： ブタミホス〔有機リン系 PRTR・1種〕……………50.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕……………18%〈16～20%〉 エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………16%〈14～18%〉 ポリ（オキシエチレン）=ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…1.6%	性状： 黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

●畑地の一年生のイネ科，広葉，カヤツリグサ科及びアブラナ科など幅広い雑草に対して優れた効果を示す。

●ハウス栽培・トンネル栽培・キャップ栽培・マルチ栽培などでも安心して使用できる。

●土壌に対する吸着が強く，土壌移行性，揮散性も少ないため，土壌中での挙動が安定しており，土壌表面処理により雑草の発生を長期間（30～45日間）抑制する。

●植物体内での移行が小さいため，薬剤が作用点である生長点部分，又は，根部先端に直接接触しない限り，作物に対して安全性の高い除草剤であるといえる。このため，移植作物に対し，特に移植前処理では安全に使用できる。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●砕土，整地，覆土は丁寧に均一に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

●雑草発生前処理の効果が大きく，雑草が大きくなってからの処理では効果が劣るので適期に処理する。

●多年生雑草，キク科雑草及びツユクサには，効果が劣るので，それらの雑草が優占する圃場での使用はさける。

●土壌が極度に乾燥している場合は効果が劣るので，土壌が適度の水分を含んでいる時に使用する。

●適用作物（全般，たばこ，秋播たまねぎ，はくさい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（周辺作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

●共通注意事項7．ミツバチに対する注意事項を参照。

●眼に対して刺激性がある。

●皮膚に対して刺激性がある。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器等は適切に処理する。

●自動車などにかからないよう注意する。

●甲殻類，藻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む	
			薬量	希釈水量			農業の総使用回数	
メ ロ ン 漬物用メロン す い か 漬物用すいか か ぼ ち や	一年生雑草	定植・マルチ前 (雑草発生前)	200 ～ 400 ml	100 ～ 150 ℓ	1 回	全面土壌 散布	1 回	
レ タ ス な す		定植前又は定植・ マルチ前 (雑草発生前)						
キ ヤ ベ ツ き ゆ う り い ち ご		定植前 (雑草発生前)						
ね ぎ わ け ぎ あ さ つ ぎ		定植活着後 (雑草発生前) 但し定植10日後 まで						
ば れ い し よ さ と い も に に に く ら つ き よ う や ま の い も		植付後萌芽前 (雑草発生前)						
ら つ か せ い に ん じ ん パ セ リ		は種後発芽前 (雑草発生前)						
こ ん に や く		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫120日前 まで	200 ml					
た ま ね ぎ		春播栽培の定植後 (雑草発生前) 但し収穫60日前 まで						
		秋播栽培の定植後 (秋季の雑草発生前) 但し収穫60日前 まで						
ア ス パ ラ ガ ス		萌芽前 (雑草発生前)						200 ml
ピ ー マ ン とうがらし類 は く さ い と う が ん ブ ロ ッ コ リ ー ひ ろ し ま な		定植前 (雑草発生前)						
う ど		定植後出芽前 (根株養成圃) (雑草発生前)						200 ～ 400 ml
わ ら び		株養成期 (地上部なし) (雑草発生前)						

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む 農業の総使用回数	
			薬量	希釈水量				
グラジオラス	一年生雑草	植付後 (雑草発生前)	200 ～ 400 <i>ml</i>	100 ～ 150 <i>ℓ</i>	1 回	全面土壌 散布	1 回	
き く (ポットマム)		定植後 (雑草発生前)						雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布
	アメリカネナシカズラ	定植後 (雑草発生揃期ま で)						
つ つ じ 類	一年生雑草	植付後又は生育期 (雑草発生前)	200 <i>ml</i>			全面土壌 散布	3 回以内	
た ば こ (折衷マルチ栽培)		植付 10 日前まで (雑草発生前)						1 回
ケ ナ フ		は種後出芽前						