

テトラニプロール・イソチアニル粒剤 ヨーバルトップ箱粒剤	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： バイエル，住友化学・バイエル
成分： テトラニプロール〔アントラニルジアミド系〕…1.5% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネツトムシ ニカメイチュウ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ イナゴ類	50～ 75g	は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	本剤 1回 テトラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以内，本田では2回以内)
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種前	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	
	穂枯れ (ごま葉枯病菌) イネヒメハモグリバエ		は種時 (覆土前) 移植3日前～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	

* 育苗箱は30×60×3cm，使用土壌約5ℓ