

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 スマートフロアブル	取扱メーカー： O A T, バイエル* 原体メーカー： バイエル, エス・ディー・エス, O A T
成分： フェントラザミド〔テトラゾリノン系 PRTR・1種〕…3.7% ベンゾビシクロン〔ビシクロオクタン系〕……………3.7% ベンゾフェナップ〔ピラゾール系 PRTR・2種〕…14.7%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- スマート1キロ粒剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヘラオモダカ エゾノサヤヌカグサ	2葉期まで
ヒルムシロ	発生期まで
オモダカ	発生始期まで
シズイ	草丈3cmまで
イボクサ（一年生）	再生始期まで

- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。
- オモダカは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な前処理剤又は後処理剤と組み合わせて使用する。連年施用することにより、さらに効果が向上する。
- シズイは発生期間が長く、遅い発生のもものでは十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- いぐさ栽培予定水田では使用しない。
- 直播水稲に使用する場合は、適切な覆土を行い、稲の1葉期以降に使用する。稲の根が露出した条件では使用をさける。
- 乾田直播では、必要に応じて入水前散布の初期剤との体系で使用。

【安全対策上の注意】……………

- 無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ ヒルムシロ シズイ エゾノサヤヌカグサ	移植時	500 ml	田植同時散布機 で施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布、 水口施用又は無 人航空機による 滴下	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布又 は無人航空機に よる滴下	

※フェントラザミドを含む農薬の総使用回数：1回
 ※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内
 ※ベンゾフェナップを含む農薬の総使用回数：2回以内