

# クプロシールド

成分：塩基性硫酸銅……26.9%（銅として 14.8%）

毒性：普通物

## 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む農薬 の総使用回数				
か ん き つ	かいよう病	1000～ 2000倍	200～ 700 ℓ	—	—	散布	—				
も も	せん孔細菌病	1000倍									
オ リ ー ブ	炭疽病	500～ 1000倍									
キウイフルーツ	かいよう病	1000倍	100～ 300 ℓ								
	軟腐病										
ば れ い し ょ	疫病	1000～ 2000倍									
だ い ず	紫斑病	1000倍									
野 菜 類	軟腐病	1000～ 1500倍									
	べと病 斑点細菌病	1000～ 2000倍									
ト マ ト	疫病	1000倍									
ミ ニ ト マ ト	葉かび病										
結球あぶらな科葉菜類	黒腐病	1000～ 2000倍									
レ タ ス 類	腐敗病	1000倍									
に ん じ ん	黒葉枯病 斑点病										
た ま ね ぎ 葉 た ま ね ぎ	りん片腐敗病										
プ ロ ッ コ リ ー	黒斑細菌病	1000～ 2000倍									
ア ス パ ラ ガ ス	斑点病 茎枯病	1000倍	100～ 400 ℓ								
こ ん に や く	葉枯病 腐敗病		100～ 300 ℓ								
て ん さ い	褐斑病		200～ 400 ℓ								
茶	赤焼病 もち病 網もち病										
	炭疽病	500倍									
つ つ じ 類	褐斑病	1000倍	200～ 700 ℓ	—							

〔取扱メーカー〕 カネシヨウ、ホクサン