

イソピラザム水和剤 ネクスターフロアブル	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： シンジェンタ
成分： イソピラザム〔ピラゾールカルボキサミド系〕……18.7%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- 菌核病，灰色かび病，黒星病などの子囊菌病害や，株腐病，赤星病などの担子菌病害に効果を示し，幅広いスペクトルを持つ。
- 適用病害に活性が高く，効果が長期間持続する。余裕を持ったローテーション散布ができる。
- 作物葉への浸達性を有し，薬剤散布面の裏側からの感染も防除できる。
- 耐雨性が高いため，雨の多い時期でも適用病害への効果が安定している。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 発病前から発病初期の使用により安定した効果を発揮する。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため，本剤の過度の連用はさけ，作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 石灰硫黄合剤やボルドー液等アルカリ性農薬との混用はさける。
- 散布量は，対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- 適用作物（ぶどう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 魚類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	イソピラザムを含む 農薬の総使用回数	
り ん ご	赤星病 斑点落葉病	1500 倍	200～ 700 ℓ	前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	黒星病 黒点病 うどんこ病 モニリア病	1500～ 3000 倍						
な し	黒星病 赤星病	1500 倍						7日前まで
	輪紋病 うどんこ病 黒斑病							
も も	黒星病 灰星病 うどんこ病	1500～ 3000 倍						
小粒核果類	黒星病	1500 倍						
おうとう	灰星病							
か き	うどんこ病 落葉病							
ぶ ど う	うどんこ病 褐斑病 黒とう病 灰色かび病	1000 倍	前日まで					
	い ち ご			うどんこ病 灰色かび病				
ト マ ト ミニトマト	うどんこ病 葉かび病 すすかび病 輪紋病 灰色かび病 菌核病							
な す	すすかび病 黒枯病 灰色かび病 うどんこ病 菌核病 褐色斑点病							
	きゅうり		うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 菌核病					
メ ロ ン	うどんこ病 つる枯病		7日前まで					
レ タ ス	すそ枯病 菌核病 灰色かび病							
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病							
キャベツ	株腐病 菌核病 根朽病							